



Don à l'Etat  
de







SANCTORII  
**SANCTORII**  
IVSTINOPOLITANI

**MEDICI AC PHILOSOPHI,**

*METHODI VITANDORVM  
errorum omnium qui in arte Medica contingunt*

**LIBRI QVINDECIM,**

Quorum principia sunt ab auctoritate Medicorum & Philosopho-  
rum principum desumpta, eaque omnia experimentis, & ra-  
tionibus analyticis comprobata.

*Nunc primum accessit eiusdem Authoris*

**DE INVENTIONE REMEDIORVM  
LIBER.**

*Cum triplici INDICE, I. Librorum, II. Capitulorum. III. Rerum notabilium.*



**GINEVÆ,**

Apud PETRVM AVBERTVM, Reipublicæ  
& Academiae Typographum.

**M. DC. XXX.**


AA 7013

SANCTORII

MEDICI AC PHILOSOPHI

LIBRI QUINQUE

L. 1.



DE INVENTIONE REMEDIORVM

GENEVA

M. DC. XXX.





FERDINANDO  
AUSTRIAE  
ARCHIDUCI

SERENISSIMO, ET  
INVICTISSIMO.



PLENDOREM profectò, & gloriam, Inuictissime FERDINANDE, perennes lucubrationes, & praeclara studia consequuntur, quae in hanc lucem nomine Inuictorum Principum viriute, atque excellenti religione praefulgentium, eduntur. Praesens contemplatio aduersus infinitos Empiricos instituta, cum sermonem illis sit datura, non erat in conspectum hominum promenda sine celebratissimo defensore, sine immortalis Tui nominis splendore, qui ceteris auctoritate, & virtute antecellis, & miro praeterea artis medicae amore teneris. Hac via forsitan infranari poterunt ingenia factiosa, & tetro luore contaminata,



## EPISTOLA

audaces nimirum, & teterrimi Empirici, qui pallio medico laruati, magnam cladem veræ medicinae inferunt, qui in curandis ægris aleam ancipitem subeunt, qui experti secretorum vanitatem nunquam resipiscunt, & quos demum sola pecuniæ libido stimulat, neque ullus errandi metus moderatur. Ad coercendam istorum temeritatem, si affulserit splendor nominis, & auctoritas Celsitudinis Tuae, cuius eximie virtutis decus, & ornamentum in summo apice emicat atque rutilat, & per Italiam, per Urbem, & per totius Europæ tractus radiorum instar solarium præfulget, beneficium consequar perpetua omnium memoria recolendum. Neque in hoc paucorum verborum contextu, neque in crassissimis voluminibus summi applausus, & suprema laudes, quas summis vocibus omnes Celsitudini Tuae attribuunt, possunt Encomiis extolli, tum quia humane conditionis modum excedunt, tum quia nec stylus, nec oratio suppetit. Verumtamen ne videar omnia transilire, hoc unum de excellenti erga Deum pietate, quod Te ad Celsissimum gloriæ fastigium extulit, quod Tibi gloriam nunquam intermorituram peperit, omitti vix potest: dum obsidione Turcarum quoquo versum cinctus, simul audacem hostium faciem repressisti, & animarum luem diuturnam in omnes illas provincias ferè dispensatam eluisti, & tanquam beluam diram, & immanem extemplo fugasti; ex illis quidam terri, & animo consternati, ob animi tui constan-

tiam



## DEDICATORIA.

tiam, & vigorem abierunt; quidam diuino cooperante Spiritu statim mutarunt opinionem, & supplices se Tibi ad genua prouoluerunt. Voluantur annales omnium gentium, non inuenietur, in Vrbe fuisse unquam auditum, quod tam velociter extincta fuerit inueterata, & ut ita dicam, conclamata aegritudo. Innumerabilia recenserem, nisi mihi iniiceretur metus, ne dum res gestas conspicuas, & prenitentes explicare voluero, eas ingenij mei tenuitate videar potius imminuisse. Accedit, quod innumera- biles sint, qui altiori, & feliciori spiritu animi Tui & corporis ornamenta, quotidie in cælum ferunt, qui nimirum prudentiam, artium liberalium scien- tiam, & Tuam erga studiosos singularem beneuolen- tiam, & egregiam Munificentiam percelebrant; & in posterum quando immenso rerum OPIFICE auspice in id eueheris supra quod ascendere non potest, ubi non solum Germania, sed vniuersa Christiano- rum Respub. digni animi tui domicilium fiet, resur- gent qui illam dignitatem, & gloriam in excelsis loca- tam in cælum efferent. Itaque ad tantum Patroci- nium Celsitudinis Tuae, tanquam ad decus, & presi- dium meum confugio, & Opus hoc qualecumque sit, Tibi consacro, ac si quid in illo boni sensus fuerit, pro conseruanda sanitate id totum TUÆ CELSITV- DINI dico, dedicoque: etenim nulla mea opinionis tutande cupiditate, sed vnica Philosophia incensus, quæ in magna consilij angustia de re medica mihi vi-



## EPIST. DEDICATORIA.

*sa sunt cum ratione consentire, edere sum conatus,  
cum ad commune beneficium egrotantium, tum ad  
spem promerenda saltem apud posteros honesta laudis,  
quod faxit Deus.*

Serenissimæ CELSITVDINIS TVÆ.

Seruus Humillissimus

SANCTORIVS SANCTORIVS.


INDEX









## INDEX LIBRORVM.

- I. BER est de Methodis, quibus omnes morborum formæ inquiri possint, Castiganturque Empiricorum errata.
- II. De affectuum Idiopathia, & Sympathia, & de erroribus rudiorum pertinentibus ad hanc contemplationem.
- III. De ratione inueniendi specificas affectuum differentias.
- IV. De metiendis morborum Ideis, agitur de consuetudine.
- V. De modo cognoscendi peccantes humores per signa propria.
- VI. De Syndrome signorum qua peccantes humores occulti inquiruntur.
- VII. De humorum misturis plenè agitur.
- VIII. De principiis reconditarum qualitatum.
- IX. De via cognoscendi quantitatem peccantium humorum.
- X. De pertinentibus ad motum localem humorum.
- XI. De primis principiis Methodi medendi.
- XII. De Analogismo, & experientia.
- XIII. De recta administratione remediorum.
- XIV. De Reuulsione, & deriuatione.
- XV. De Indicantium æquilibrio.

# INDEX CAPITVM.

Capita primi libri de affectuum ideis perquirendis.

- Cap. I.  ROHEMIVM operis.
- II.  De partitione totius operis.
- III. Ostenditur, quod ad quatuor capita omnes errores, qui fieri possunt, in scrutandis affectuum ideis, reducuntur.
- IV. De suprema omnium morborum divisione.
- V. De symptomatum omnium divisione breuissima.
- VI. De Methodo qua symptomata primi, & secundi ordinis reducuntur ad vnum, quod est in facto esse.
- VII. Ostenditur virtutem logicam, quod per viam diuisuam à generalissimis usque ad specifica progrediendo non possit inueniri occultus affectus.
- VIII. Ostenditur, quod signa propria affectuum præter naturam à quinque fontibus tantum possint exhauriri.
- IX. Ostenditur, quod signa communia, quæ faciunt exactam syndromem à sex fontibus solum colligantur, agiturque de primo fonte.
- X. Quomodo per viscerum dispositionem præcedentem ducamur ad cognoscendos affectus internos.
- XI. Quæ methodo ducamur ad cognoscendos locos affectos.
- XII. Quomodo cognoscatur Vetus affectus per syndromem signorum à sex fontibus collectam.
- XIII. Quomodo eadem syndrome cognoscatur empyema.

- XIV. Quomodo per syndromem propositam cognoscatur peripneumonia.
- XV. Quomodo eadem syndrome noscatur phthisis.
- XVI. Quomodo eadem syndrome noscatur tumor ventriculi à flatu.
- XVII. Quomodo proposita syndrome noscatur vlcus ventriculi.
- XVIII. Quomodo dicta syndrome noscatur vlcus renum.
- XIX. Quomodo dicta syndrome noscatur vlcus iecoris.
- XX. Quomodo per syndromem noscatur calculus vesicae.
- XXI. Agitur de communissimo Empiricorum errore, dum causam generationis morborum referunt causis procatarteticis, & non prævia viscerum dispositioni.
- XXII. Agitur de illo errore Rudiorum dum omnes affectuum ideas appellant intemperies.
- XXIII. Agitur de illo errore dum putant abscessum mesenterij esse vlcus intestinorum, & de ratione cognoscendi abscessus mesenterij.
- XXIV. Agitur de errore dum putant inflammationem iecoris esse pleuritidem.
- XXV. Agitur de errore dum colligunt ex sanguine spumoso secundum omnes partes per tussim eiecto in pulmone esse vlcus.
- XXVI. Agitur de errore illorum, qui dicunt catarrhum esse semper visum capitis.
- XXVII. Agitur de illo errore dum dicunt catarrhum semper pendere à secunda coctione laesa.
- XXVIII. Agitur de illo errore dum dicunt pragnantem ex urinis cognosci.
- XXIX.



# CAPITVM.

XXIX. Agitur de illo errore dum dicunt ex mensibus suppressis pregnantem cognosci.

XXX. Agitur de impostura obstetricum dicentium pregnantem ab illis, digitis tangentibus uterum cognosci.

XXXI. Agitur de illo errore dum dicunt conceptum nasci, si post cenam e-poro hydromelle sequantur tormina.


XXXII. Quomodo per syndromem nascitur conceptus oculus.

XXXIII. Quomodo ex signis non necessario consequentibus conceptum pregnantem cognoscatur.

¶

## CAPITA SECVNDI

libri de affectuum idio-pathia & sympathia.

Cap. I.  VOD qualibet corporis pars modo per essentiam, modo per consensum affici possit.

II. De diuisione propriorum affectuum in affectus per essentiam, & per consensum.

III. Methodus breuissima qua in cognitionem affectuum principalium, propriorum, & per consensum duamur.

IV. De diuisione sympathia in suas differentias.

V. Quod errent, qui dicunt ventriculum frigesce ob securis astum, sicuti dum lumen manus extinguere soles minus.

VI. Quod male agant, qui applicent calida ventriculo rursus pleno, & so ob caliditatem securis, in quo exemplo obseruatur affectuum protopathia, idioopathia, & sympathia.

VII. Exemplum pro declaratione sympathia generis, & vicinitatis.

VIII. Ostenditur nullam esse sympathiam inter mesenterium, & musculos rectos.

IX. Nostri corporis varia arcana à sympathia generis pendentia declarantur.

X. De sympathia inter labia, & lacum musculum in collo positum.

XI. De sympathia inter labia, & tertium par neruorum cerebri, & tertiam vertebram cervicis.

XII. De sympathia inter bregma, & maxillam inferiorem.

XIII. De sympathia inter maxillam inferiorem, & musculum temporalem.

XIV. Declaratur erratum Empiricorum dum semper iungunt maxillam inferiorem si os non potest aperiri.

XV. De sympathia inter brachia, & pedus.

XVI. De sympathia inter os sacrum, & brachia.

XVII. De sympathia inter quintam vertebram thoracis, & collum.

XVIII. De sympathia inter musculos ventris, & testiculos.

XIX. De sympathia inter sternon, & pubem.

XX. De sympathia inter os sacrum, collum, pectus, brachia, & manus.

XXI. De alia sympathia inter cervicem & quintam vertebram thoracis.

XXII. De sympathia inter septimam thoracis vertebram, & cervicem.

XXIII. De sympathia inter os sacrum, & cervicem.

XXIV. De sympathia inter cubitum, scapulam, & collum.

XXV. De sympathia inter secundos articulos digitorum manus, & humerum.


XXVI. De sympathia inter tertium articulum quatuor digitorum, & internum articulum cubiti.

XXVII. De sympathia inter externum humeri tuberculum, & quatuor digitos pollicis excepto.


XXVIII. De sympathia inter indicem, & cubitum.

# INDEX

- XXX. De sympathia inter brachiale,  
& externum humeri tuberculum.  
XXXI. De sympathia inter brachia-  
le, & humerum.  
XXXII. De sympathia inter ilia, &  
tibia.  
XXXIII. De sympathia inter pubem,  
& tibia.  
XXXIV. De sympathia inter verte-  
bras ultimas lumborum, & primas  
ossis sacri, & tibia.  
XXXV. De sympathia inter coxen-  
dicem, & tibia.  
XXXVI. De sympathia inter me-  
dium appendicem ilium, & tibia.  
XXXVII. De sympathia inter par-  
tem posteriorem ilium, & tibia.  
XXXVIII. De sympathia inter fe-  
mur, & os sacrum.  
XXXIX. De sympathia inter femur,  
& undecimam, & duodecimam ver-  
tebram thoracis.  
XL. De sympathia inter appendicem  
fibule, & calcaneum.  
XLI. De sympathia inter calcem, &  
externum caput femoris, & os sa-  
crum.  
XLII. De sympathia inter digitos, &  
tibia.  
XLIII. De sympathia inter tibia,  
& tertia internodia quattuor digiti-  
rum, & secundum pollicis.



## CAPITA TERTII libri de modo inueniendi specificas affectuum diffe- rentias.

Cap. I.  Vnde specificæ affectuum  
differentie oriuntur à  
decem differentiis partium nostri cor-  
poris.

II. Ostenditur inductione, morbos con-  
stitui in esse specifico à differentiis par-

tium nostri corporis specificis.

III. Ostenditur, ubi agendum colligi  
modo ex partium situs, & meatu, modo  
ex progressu, & exordio.

IV. Quomodo colligi modo ex par. figu-  
ra, & substantia, & compositione, mo-  
do ex numero, & effluo partium.

V. Ostenditur errare, qui dicunt situm  
pylori esse in ventriculi fundo.

VI. Ostenditur errare, qui putant si-  
cus oris venericuli esse sub mucronata  
cartilagine.

VII. Ostenditur errare, qui dicunt  
causas adequatas lithiasis esse mate-  
riam crassam, & calorem rerum.

VIII. Ostenditur errare Galenum di-  
centem in renibus esse cerebrum.

IX. Ostenditur errare, qui dicunt tra-  
ulos, & balbos ab intemperie humida  
capitis prodire.

X. Declarantur errata, quæ contingere  
solent in temperatura perquirenda.

XI. Declarantur errata, quæ contin-  
gunt ob partium corporis substantiam  
ignoratam.

XII. Declarantur errata, quæ contin-  
gunt ob progressum vasorum ignora-  
tum.

XIII. Exempla errorum ob numerum  
partium corporis ignoratum.

XIV. Exempla errorum ob composi-  
tionem, vel connexionem ignoratum.

XV. Exempla errorum ob exordium  
vasorum ignoratum.

XVI. Ostenditur, quod errant, qui di-  
cunt venas cubiti dextri melius eua-  
cuare hepar, quam sinistri.

XVII. Ostenditur errare Vesalius,  
dicentem in omni pleuritide esse à  
dextro, & non à sinistro brachio san-  
guinem euacuandum.

XVIII. Proponuntur errata adscri-  
pta Galeno ob situs, & meatum par-  
tium corporis ignoratos.

XIX. Proponuntur errata Galeno ad-  
scripta in iis, quæ pertinent ad figu-  
ram.




# CAPITVM.

ram, & progressum partium humani corporis.


XX. Proponuntur errata Galeno adscripta in iis que pertinent ad numerum partium corporis.

XXI. Proponuntur errata Galeno adscripta in pertinentibus ad substantiam, compositionem, officium & exordium part. nostri corporis.



## CAPITA QVARTI

libri de metiendis morborum ideis.

Cap. I.  STENDITVR esse metiendos recessus morbificos à statu salubri aduentio, & non à primigenio.

II. Ostenditur posse mutari sine morbi introductione temperaturam, meatum, situm, & figuram partium: reterqua vero non mutari.

III. Habet latitudinem venarum, ergo secur calidum, ostenditur consequentiam esse nullam.

IV. Ostenditur aduentitium statum solum acquirit per consuetudinem sex rerum non naturalium.

V. Ostenditur à longa consuetudine mutari omnes facultates viuentis.

VI. Agitur de consuetudine ex Galeni sententia, & agenda in hōc libro proponuntur.

VII. Ostenditur consuetudinem non posse conueri in naturam, & argumēta in contrarium adducta soluntur.

VIII. De consuetudinis definitione, cuiusq. declaratione.

IX. Vt errant qui volunt malam consuetudinem statim amouere.


X. Vt errant qui viciatam, & deterrimam consuetudinem senum, & debiliū hominū volunt amouere.

XI. Vt non vident vitiosas, sed vetustas consuetudines egrorum, vel robustorum indicare sui conseruationem, & insanitate ablationem.

XII. Ostenditur assuetum plurimis rebus minus ledi à contrariis.

XIII. Errant dum dant egrotantibus aliterantia, eaque non mutant.


XIV. Vt errant, qui introducunt consuetudinem sumendi medicamenta soluentia, & aliterantia.



## CAPITA QVINTI

libri de perquirendis humoribus per propria signa.

### Præfatio Logica.

Cap. I.  VIBVS methodis sit incedendum in occultis humoribus vitiosis perquirendis.

II. Ostenditur quomodo sapores proprie indicent humores peccantes.

III. Ostenditur quomodo colores indicent prædominantes humores.

IV. Ostenditur periodos, & morum morbi proprie indicare peccantes humores.

V. Agitur de periodorum causis.

VI. Ostenditur errare, qui ex urina humorum prædominium, & eorum coctiones necessario colligunt.

VII. Ostenditur errare, qui ex pulsa humorum prædominium, & eorum coctiones seu cruditates colligunt.

VIII. Ostenditur errare, qui ex antepositione, & postpositione paroxysmorum humores peccantes, & eorum coctiones, seu cruditates colligunt.


IX. Ostenditur errare, qui ex colore intense rubro facies colligunt sanguinis dominium.

X. Ostenditur errare Oribasium, &

Montanum dum à coloribus lumbricorum dominium peccantium humorum colligunt.

XI. Offenditur errare, qui rejciunt Oribasium, & Montanum discentes ex bile, & melancholia gigni posse lumbricos.

XII. *Vi errant, qui ex lingua egrotantium colligunt peccantes humores.*



## CAPITA SEXTI libri de perquirendis humoribus per signorum syndromem.

Cap. I. **D**ECLARATUR methodus prastantissima, qua per syndromem aperis latentes humores.

II. Quomodo omnes differentia bilis per syndromem signorum à sex rebus non naturalibus desumptam cognoscantur.

III. Quomodo biles noscantur per signa desumpta à dispositione patientis, & à morbis.

IV. *Vi biles noscantur per signa desumpta à symptomatis, locis affectis, & iuvantibus, & ladentibus.*

V. Quomodo pituita omnes cognoscantur per syndromem signorum desumptorum à sex rebus non naturalibus.

VI. *Vi pituita noscantur per signa desumpta à dispositione patientis, & à morbis.*

VII. Quomodo pituita noscantur per signa desumpta à symptomatis, locis affectis, & iuvantibus, & ladentibus.

VIII. Quomodo omnes melancholia noscantur per signa desumpta à sex rebus non naturalibus.

IX. *Vi omnes melancholia noscantur*

*per signa desumpta à dispositione patientis, & à morbis.*

X. *Vi melancholici succipracognoscantur per signa desumpta à symptomatis, locis affectis, & iuvantibus, & ladentibus.*

XI. Quomodo flatu noscantur per syndromem signorum communium à sex rebus non naturalibus à dispositione corporis desumptorum.

XII. *Vi flatu innoscescant per syndromem signorum desumptorum à morbis, symptomatis, locis affectis, & à iuvantibus, & ladentibus.*

XIII. De polyamia perquirenda per syndromem signorum communium.

XIIII. *Vi ex dispositione corporum, ex morbis, symptomatibus, locis affectis, & iuvantibus, & ladentibus polyamia noscitur.*



## CAPITA SEPTIMI libri de misturis humorum perquirendis.

Cap. I. **D**ISTENDITUR, quod omnes humores peccantes misceantur.

II. Quomodo cognoscitur quando falsedo in pituita sit per misturam intus factam, & quando per misturam humoris aliunde venientis.

III. Qua via noscitur, quando humores sunt dulces ob misturam intus factam, & quando ob misturam humoris aliunde venientis.


IV. Qua via noscitur quando humores sunt acidi per se, & quando ob mixturem acidi humoris aliunde venientis.

V. *Vi cognoscitur quando ponticus sapor indicat humorum misturam intus factam, & quando ab humore aliunde veniente.*




# CAPITVM.

- VI. Ostenditur vitellinum colorem esse simplicem, & non mistum.*  
*VII. Quorum humorum misturam indicet porraceum color.*  
*VIII. Quid albus humorum color indicet modo calidos, modo frigidos, & mistos humores.*  
*IX. Ostenditur ex peccantibus humoribus traditis fieri misturas possibiles*  
 80084.




## CAPITA LIBRI octauī de initiis reconditarum qualitatum.

*Cap. I.*  **V**ID intelligant auctores per qualitates manifestas: & cur aliqui introduxerint qualitates occultas seu substantias operantes.


- II. Qua via morborum innovatores possint conueniri.*  
*III. Potiora argumenta ab altiori schola desumpta, quae ostendere videntur, quod omnes potentiae agendi sint in substantia categoria.*  
*IV. Argumenta potissima, quibus ostendi potest, potentias omnes genere differre à substantia.*  
*V. Soluuntur argumenta in contrarium adducta.*  
*VI. Galeni auctoritatibus, rationibus, & experimentis ostenditur, qualitates occultas non à substantia, sed à multis manifestis prodire.*  
*VII. Quae sint reconditarum qualitatum differentiae, & à quo subiecto communissimo procedant.*  
*VIII. Responsio ad duas difficultates, quae ex dictis exurgunt.*  
*IX. Quomodo Galeni fundamenta faciant sensentiae nostrae.*  
*X. Experimentis confirmatur, quod da-*


*ri possint potentiae seu virtutes operantes, quae non oriuntur à quatuor vocatis primis qualitatibus.*

- XI. Experimentis ostenditur, quod qui putant, qualitates occultas esse substantias operantes faciles sint ad credendum vanissima.*  
*XII. Ostenditur, venenosos non cognosci ex veneni definitione, sed ex syndrome signorum communium à sex fontibus desumpta.*  
*XIII. Ostenditur, quod putredo februm sit, quam philosophi vocat simpliciter, & non secundum partem, & quod omnia auxilia pro putredine auferenda sint, praeservatoria, & non curatoria.*  
*XIV. Reijcitur argumentum nonnullorum ostendentium putredinem insignem esse venenum.*  
*XV. A quibus humoribus, & causis fiat pus.*




## CAPITA NONI libri de quantitate peccantium humorum.

- Cap. I.*  **U**OMODO per syndromem signorum quantitas humorum cognoscatur.  
*II. Declaratur alia Methodus quae perquiri possit quantitas peccantium humorum.*




## CAPITA DECIMI libri de motu locali peccantium humorum.


- Cap. I.*  **S**TENDITVR, quod humores non moueantur ex se, & proprio impetu sed ab alio.  
*II. Quod sex sint modi, & non plures,*

# INDEX


- quibus pars mittens est fluxionis origo.  
 III. In fluxionibus curandis in quos precipua errata incidunt. Empirici.




## CAPITA VNDE- cimi libri de principiis methodi medendi.


- Cap. I.  **ROHEMIVM** : de sectis etiam agitur.  
 II. Ostenditur ex Aristotele, & Galeno in methodo per solam indicationem perquiri posse remedia, & nequaquam per experientiam, & analogismum.  
 III. Referuntur attributa indicationis, & logica virtute detegitur errorum illorum, qui morbos in causas diuidunt.  
 IV. Unde in logica desumatur quod à generalissimo, vel subalterno genere affectus prater naturam non indicetur curatio.  
 V. Unde sit quod à singularibus non hauriantur indicationes, sed solum ab affectu specifico.  
 VI. Unde sit quod indicans vnum indicet.  
 VII. A quibus analyticis rationibus pendeat, quod indicans debeat esse notius indicatio.  
 VIII. A quibus rationibus analyticis pendeat hoc indicantis conditio, quod indicans debeat esse præsens.  
 IX. Ostenditur, quod indicans non sit externum sed sit illud quod curatur.  
 X. Quomodo altioribus principiis probeatur, symptomata non indicare.  
 XI. Quibus logicis principiis probeatur, locum affectum in methodo cu-

- rauiſe non indicare.  
 XII. Unde sit, quod quid agendum, debeat, necessario desumi ab essentia specifica indicantis.  
 XIII. Ut errant, qui pluratribus indicantia faciunt.




## CAPITA DVODE- cimi libri de analogif- mis, & experimentis.

- Cap. I.  **VID** sit analogismus Empiricorum, & quomodo formetur.  
 II. Ostenditur, quod analogismus ratione forma sit paralogismus.  
 III. Ostenditur, quod analogismus ratione materie sit paralogismus.  
 IV. Quid sit analogismus dogmaticorum, & quomodo formetur.  
 V. Ut colligitur à Medicine fundamentis, quod experientia sit fallax.  
 VI. Ostenditur ex analyticis principiis, quod experientia sit fallax, & periculosa.



## CAPITA DECIMI- tertij libri de admi- nistrandis remediis.

- Cap. I.  **STENDITVR**, quod omnia errata, que committuntur in administrandis remediis ad tria capita reducantur.  
 II. De erratis Empiricorum circa quantum diminutum.  
 III. Errata Empiricorum circa Quando.  
 IV. De erratis circa Quomodo.  
 V. De erratis circa Vbi agendum.

VI.



## CAPITVM.

*VI. Uterrant, dum in lienis affectibus putant, quod ubi agendum sit vena saluatella.*

*VII. Proponuntur cetero sophistica argumenta, quibus nonnulli probant, quod semper ad cutim debeant attrahi humores maligni vesicantium auxilio.*

*VIII. Ostenditur, quod argumenta superius allata pro vesicantium defensione sint paralogismi.*

*IX. Reijciuntur quoque argumenta illorum, qui nunquam admittunt, vesicantia in malignis febribus habere locum.*

*X. Ostenditur, quod maligni, & urgentes humores possint aliquando vesicantium auxilio transponi ad cutim.*

*derivatione reuulsione non sit, ut per distantissima fiat.*

*XI. Exemplo ischiadis declaratur, quando auxilia reuulsoria debeant applicari remotioribus, & quando proximioribus partibus.*

*IX. Quid per rectitudinem seruandam in reuulsione intelligi debeat.*

*X. Diluuntur rationes aduersariorum, dum probant per rectitudinem esse intelligendam longitudinem sursum, & deorsum.*


*XI. Declaratur, quid intelligi debeat per vasa communia.*

*XII. Ostenditur, quod retractio humorum ad fluxionis originem non conueniat per se reuulsioni.*

*XIII. Uterrant, qui dicunt sursum, & deorsum, dextrum, & sinistrum reuulsioni, ante, retro, intus, & foris derivationi conuenire.*

*XIV. Manardi, & Curtii opinio improbat, dum dicunt phlebotomiam non posse esse remedium mixtum, reuulsorium scilicet, & deriuatorium.*

## CAPITA DECIMI- quarti libri de reuulsio- ne, & deriuatione.

**Cap. I.**  **STENDITVR**, quomodo *varie sint opiniones illorum in ijs, qua pertinent ad reuulsionem.*

*II. Reijciuntur quadam definitio reuulsionis, & ostenditur, quod reuulsio non sit attractio.*

*III. Ostenditur, quod reuulsio non solum conuenire possit humoribus fluentibus, verum etiam fluxis, & fluxuris.*


*IV. Quasi sit causa efficiens reuulsionis.*

*V. Quomodo sanguis à selecta vena egrediat.*

*VI. Ostenditur, quod euacuatio per distantissima non sit conditio reuulsionis propria, & per se, sed per accedens.*

*VII. Diluuntur aduersariorum fundamenta, & apertius manifestatur, quod*

## CAPITA LIBRI DE- cimi quinti de indicanti- um æquilibrio.

**Cap. I.**  **STENDITVR**, quod *mensurandi principium sit sumendum primo ab urgente, secundo à causa, tertio ab impedimentis, & quarto à morbis.*

*II. Declaratur distinctius, cur primo ab urgentibus, secundo à causa, tertio ab impedimentis, & quarto à morbis sumitur ordo curationis.*

*III. Ut vires totius corporis collapsæ possint recuperari.*

*IV. Quomodo vires partium collapsæ possint recuperari.*

*V. De ordine, & potestate indicantium.*

# INDEX CAPITVM.

- VI. Ostenditur, quod quindecim sint indicatium comparationes, & quodnam sit illud indicans, quod in qualibet occasione magis possit.
- VII. Ostenditur, quod chirurgi illi sint amethodi, qui in omnibus ulceribus videntur exsiccantibus.
- VIII. Ut errant, qui in suppurandis apostematibus videntur duris emplastris.
- IX. Illa errata reueiuntur, quae sunt dum rudiores prius causis, & morbis, quam videntibus attendunt.
- X. Casus in quibus Empirici pluri faciunt morbum, quam impedimenta.
- XI. Errata illorum, qui prius indicantibus, quam prohibentibus potentioribus attendunt.
- XII. Ostenditur exemplo localium, quod qualibet sententia medicorum sit methodi censura moderanda.
- XIII. An febribus cum alui fluxu conueniat pharmacum, vel phlebotomia.
- XIV. Ostenditur, vanam & medico indignam esse Archigenis opinionem, quod semper a leuioribus auxiliis sit exordienda morborum cura.

Finis Indicis Capitum.

SAN-







SANCTORII

SANCTORII

Iustinopolitani

METHODI VITANDORVM

*errorum omnium in morborum & sympto-  
matum ideis perquirendis,*

LIBER PRIMVS.

*Prefatio vniuersalis.*

C A P. I.



ONSTARE arbitror in arte Medica curatrice infinitos committi errores posse vel in cognitione morbi; vel causæ; vel in auxiliorum inuentione; vel in præfagiendo; vel postremo in remediorum administratione. In hæc capita, tanquam in summas partes tota medicina, quam *ἡγεμονία* Græci vocant, distribuitur: & alia in hoc exordio accommodatiora, circa quæ omnes medicorum errores, & mali medendi vsus contingunt, nec mente fingere, vel comminisci possumus. Varia tamen sub iis & specifica magis continentur capita: quibus cunctis vel diligentissimè certa methodo præuisis, infiniti medicorum errores vitari, & præcaueri poterunt. Caterum, cum hæc tempora malam hunc casum subeant, ut nostratum plerique pluries malam in omni negotio medico doctrinæ sementem faciant, & nullum penè relinquant locum errandi tam in cognoscenda, quam in facienda medicina; proinde decreui in hac contemplatione insistere, & pro meo vitili, non solum aliquot nostratum errorum stirpes, principis medicis suffultus, elidere: verum etiam physiologicis, & analyticis initiis adiutus, semina omnium errorum, qui fieri possunt in hac medicina curatrice, extinguere: ad certissima & propin-

quissimâ capita, certa, & infallibili quâdam methodo (nisi me fallit opinio) cuncta transferre errata, quod perbelle præstabimus, si cum iis altioribus principiis methodi cognoscendi, & medendi principia in vnum quasi complexum copulabimus, ut consequamur hunc exoptatum finem: quibus pollicitis ni frustrabimur, lectorem ad extremam huius methodi coronidem sicuti manu apprehensum deferemus; & tunc ipse tanquam ab alto, & excelso loco munere analytico excirus, laqueos nostratum, & Syttes innumeras oculis penè videbit, & inde pernoscet optimos medicos, qui defixi in præstantissimarum artium studio, qui diuina exculti sunt arte, qui nunquam vlllo temporis puncto mentis aciem à vera Hippocratis, & Galeni physiologia defleunt, eosque secernent ab iis, qui pallio medico tantummodo sunt laruati, qui summa ipsorum incuria multos decipiunt, quippe consiliis, & medicinis, miseros ægotantes totis horis lacerant, & ad necem vsque deuerberant.

---

*De totius operis partitione, & intentione.*

*Capitulum II.*

**P**RÆSTABIT ergo vniuersam hanc Methodum, quam in conspectum, & lucem hominum in præsentia promere placuit, in tres vniuersales partes distribuere. In prima quarum quatuor librorum Compaginem de affectuum omnium Ideis parauimus; & tali artificio disposuimus; ut priusquam de erroribus, qui fieri possint in expendendis morborum, & symptomatum formis, ageretur, illarum omnium Methodorum inquisitio præcederet; quæ ad altissimam idearum, vel formarum affectuum præter naturam cognitionem nos eleuare potis esset: quia alius sanè vitandorum errorum omnium modus non datur; nisi profundè prius cognita veritate, quæ sola, ut ait Aristoteles text. 85. primi libri de anima, est sui, & obliqui index. Ad hos igitur quatuor primos libros in hac prima parte, ac ad quatuor suprema capita tanquam ad viuum singillatim errores omnes (ni fallor) qui possunt contingere, & ipsos imaginari possumus in Librandis morborum, & symptomatum essentiis, hoc Methodorum opificio releuari, & corrigi poterunt. In primo libro agentes de tribus Methodis, & in primis de Methodo resolutiua, quæ nos à symptomatibus secundi ordinis ad actiones læsas ducat; & ab iis ad illud, quod est in facto esse; & quod indicat, & quod medium allicit; Exinde de Methodo, quæ per signa propria ad cognoscendas morborum omnium formas genericas procedit; & tandem de Methodo, quæ per communium signorum syndromen sufficientissimam procedit: Quarum Methodorum virtute, & affectuum ideas præter naturam vniuersas commodè inquirere, & errores, dum omnium morborum, & symptomatum formæ confundi solent, anteuertere poterimus. Sicuti dum morbos in mala compositione rudiores crederent, esse in intemperie, vel vice versa: In quo primo libro hoc supremum caput de vitandis erroribus, qui sunt in affectuum ideis, præter enarratas Methodos, tam variis omnium generum affectuum splendescere exemplis curauimus; ut lector,



nisi fuerit mente obæcatus, illis excitus, atque commotus falli, neque ægros fallere poterit. Cæterum in exacta morborum essentia pernoscenda non satis est cognoscere formas; sed expedit vltcrius philosophari; an morborum, & symptomatum cognita, & perspecta ideæ, vel formæ; læsis corporis partibus, per essentiam, vel consensum competant. Scire enim optime possumus ventriculum intemperie aliqua conflictari; sed nunquid per essentiam, vel per consensum ab aliis visceribus sit facta, & adhuc fiat; hoc in primo non elucet, sed tenebratum velo, ibi est obuolutum: cum sæpenumero adsint, qui rectè affectuum formas cognoscant, & millies huic impingant scopulo, nescientes an per essentiam, vel per consensum viscus aliquod ingrauescat. Profunde erat opus de hoc tanto initio statim in secundo libro verba facere; & perquirere aliquam Methodum, quæ de affectibus vniuersis promptè doceret, quando per essentiam; & quando per consensum viscera essent iactata, atque concussa: & quæ affectio esset Idiopathia; & quæ Prothopathia, & de omni Sympathia, quæ in hac humana fabrica obseruari possit, examen diligentissimum instituere: ad quem librum multis exornatum Methodis vitandorum errorum omnium de Sympathia in musculis, & nervis longis obseruata, plurima reuocatus errorum exempla: quorum luce admoniti, expeditius cæteros infinitos eandem sortem subeuntes tradita arte cognoscere, & vitare poterimus. His de formis genericis, & de Sympathia affectuum peractis, mox in tertio libro dirigitur philosophandi spiritus ad exquirendam Methodum magis particularem, quæ nos docere posset specificas & vltimas affectuum differentias, & quæ esset ex propriis, & non ex communibus, & genericis affectuum principiis: quoniam qui ex ratione vniuersali, vel ex medio tantum generico specificam haurire cognitionem volunt: vel ex medio termino, qui sit vniuersalior conclusionis prædicato, quæ in idem recidunt, syllogizant; non possunt committere quin patalogisimo ex affirmatiuis in secunda figura illidant; cuius consequentiæ redduntur monstruosæ, & irreducibiles ad bonam figuram, ob hanc nimirum vnicam, & singularem rationem; quia contentia non possunt fieri contenta, nec verba vice: Ideo Methodum hanc particularem cognoscendi propria, & specifica affectuum principia constituimus, esse processum à locorum affectorum conditionibus, quæ sunt illæ, quæ definiunt, & constituunt specificas affectuum formas; quia priorum omnium passionum naturam, & essentiam alio modo consequi non possumus imaginetur quis quantum volet, si Aristoteli credendum est. post. quam per earum subiectum, quod solum definit passionnes proprias: Hinc est quod genericus affectus transit in specificum, quando iungitur partibus nostri corporis, & aliquo proprio fulcitur subiecto: Hinc dolor, vt dolor, naturam quandam genericam exprimens; expensus tamen in aliqua corporis particula, euadit specificus: Sic in membrana euadit pungitiuus, in carne laceratiuus, & sic de aliis doloribus: similiter si vlcus consideratur sub genu, potest illud esse cauterium aliquod salubre, si illud met in Pulmone, vlceris differentia euadit funesta, ac deplorata, vt specificæ differentia partium nostri corporis sunt illæ, quæ coarctent affectus communes, & específicos reddant, & constituent:

*Ex medio vniuersali, attributū minus vniuersale inferre, semper est patalogisimus, & cur.*

*Vnde si quod specificum affectuum differentia a locis affectis solum trahatur.*

quæ specificæ differentiæ (vt hic breuibus agam) ad has decem, vniuersæ reducuntur, ad situm, meatum, figuram, compositionem, exordium, substantiam, temperaturam, progressum, numerum, & officium: & harum quælibet specificum facit affectum, & ob harum diligentissimam inquisitionem omissam in plurimos ostendimus nos perlabi posse errores. Cæterum cum differentiæ antedictæ partium corporis aliquæ, vt temperatura, meatus, situs, & figura, aliquando alterentur, & mutantur; & præter statum primigenium à primis generationis exordiis comparatum, subire possint aduentitium introductum ab assidua sex rerum non naturalium consuetudine; quæ si callum obducit in debilibus, & senibus non sit mutanda; necessario agendum relinquitur in quarto libro de hoc aduentitio statu; vt secundum considerationem primigeniam, & aduentitiam conditiones partium corporis enarratas contemplemur; quia ab iis tantummodo metimur recessum morbificum, & specificæ formæ affectuum formantur, ideo de hoc statu aduentitio, & de consuetudine ereximus librum: vnde infinitam propemodum errorum sobolem detegere & vitare poterimus. Iis omnibus visis, quorum potentia infinitos Empiricorum errores in symptomatum, & morborum Ideis genericis, & specificis perquirendis cognoscere, & obliterare possumus: Exinde animum conuertimus ad enodandos lapsus, qui fieri possunt in humoribus omnibus præter naturam contemplandis: Quinque generalissimos modos, vel quinque suprema capita, circa quæ claudicant, atque vacillant Empirici in perquirendis humoribus præter naturam, afferimus: cum neque plura, neque pauciora esse possint: Vt primum sit, dum Medicus noxiam prædominantis humoris speciem nesciret; Secundum, cum perpetuò humores deteriore qualitate nacti cæteros inficiant, iisdemque misceantur; & inde sic mixti, & simul confarcinati inferant noxam: hoc supremum errandi genus prodit, cum sint mixti, nescire an mixtura intus facta sit vel foris. Cui scopulo quam sæpe rudiores impingant, vobis expendendum, dijudicandumve suo loco relinquam. Tertium, cum humores tota substantia aliquando peccare possint, & præter manifestas qualitates, sint aliquæ abditæ, quæ concutiant atque patientes feriant; de iis, quæ tota peccant substantia agitur, & de reconditarum qualitatum primis initiis; Quartum quia quantitate ægros euadant humores: vbi tradita est duplex Methodus, qua in quantitati humorum cognitionem ducimur; Quintum & postremum fallendi genus, est, dum aliquem humorum peccantium morus, fugeret, atque lateret. Ad quæ suprema capita (ni fallor) errores, qui possunt fieri in humoribus præter naturam scrutandis, aptissimè conferimus omnes: vt in sex libros sit dispositum totum hoc negotium; vt primus sit de Methodo cognoscendi peccantes humores, per signa propria, qualia sunt (& alia non inuenimus) sapes, colores, & Typi: Secundus liber est de communibus signis coartandis per syndromen, in tantum, vt subrogentur propriis: Tertius est de omnium mixturis; Quartus de iis, quæ peccant substantia, & de reconditis qualitatibus; Quintus de quantitate peccantium humorum; Sextus, & postremus de pertinentibus ad motum localem. Denique perceptis exordiis iis errorum omnium, qui fieri possunt, tum in perquirendis



dis formis, tum efficientibus affectuum præter naturam: & traditis illis initiis quorum opificio philosophantes ad veritatis fastigium deferimur. Inde conuertimur ad omnia illa instrumenta, quæ ad solertiam, & inuentionem remediorum in medendis ægotantibus conferre possunt. Cæterum ut laqueos omnes, & Empiricorum multorum lapsus in tanto negotio aperirem, & ob oculos collocarem, altius erexi spiritum, & me ad Logicam, & ad illa prima initia humanæ cognitionis contuli, quæ solum æternas, & infallibiles sciendi normas tradunt, & quæ animos ligant, atque deuincunt. Hinc extat in hac tertia parte de inuentione remediorum, primus liber de principiis methodi medendi à fonte logico exhauriendis, & confirmandis. Vbi indicantium veræ conditiones elucet: Vbi constituimus caput supremum: Quomodo medicus in cognoscendis indicationibus analytica doctrina excultus non possit in errores incidere. Secundus extat liber de inuentione remediorum per analogismum & experientiam, vbi ostenditur quando analogismus, & experientia sint inepta argumenta sciendi, & medendi. Tertius est de recta administratione remediorum, & ad tria capita ibi reducuntur errores omnes, qui committuntur, in remediis administrandis; Quartus est de erroribus, qui fiunt in humoribus quatenus loco mouentur; agiturque de reuulsione, & deriuatione. Quintus, & postremus est de indicantium omnium æquilibrio; & de erroribus, qui contingunt dum male librantur hæc tria, vrgentia videlicet, causæ fouentes, & impedimenta; ad quæ omnia indicantia, siue sint sumpta à virtute, siue à causa, siue etiam à morbo, vel à symptomatibus reuocantur: vbi præcedit subtilis inquisitio, cui ex illis tribus prius coniectos oculos habere præstet: De hinc erunt libri de præfagiis ferendis, vbi errores vniuersi quippe qui in humanam mentem cadere poterunt, ad certa, & generalissima capita transferri poterunt, & quo pacto sit agendum, ut labyrinthi vitentur, tales afferuntur infallibiles propositiones, & regulæ æternæ veritatis, ut (nisi me fallat opinio,) sperandum est perfore, ut lectores non improbent; Demum sequuntur quatuor libri de abusu materię Chirurgicæ. Primus est de phlebotomia. Secundus de cucurbitulis, & hirudinibus. Tertius de vesicantiis, & postremus de iis, quæ igne parantur: postremo quinque sunt libri in lucem edendi de lapsu Empiricorum circa siluam pharmaceuticam. Primus erit de malo vsu porrigendi lenientia. In secundo quod perpetrantur abusus in alterantibus proponendis. Tertius est de catharticiis: Quartus est de aperientibus. Quintus de omnibus auxiliis Topicis. His adiungendi sunt quatuor libri circa fontem dieteticum, sicuti est liber de cibo, & potu: liber de somno, & vigilia. Liber de venere, & exercitio; & demum liber de balneis. Quibus omnibus exactè cognitis, & animaduersis ad apicem, & totius artis curatricis Cardinem Lectores (ni fallor) manu ductos videbimus.

Cæterum, ut omnibus numeris absolutum hoc nostrum reddatur opus, non modo in arte medica conferens; sed in omni disciplinarum genere: ob oculos quemlibet errandi modum, quo quiuis discurrendo errare possit; cum innumeris Empiricorum exemplis, quod erit tanquam huius operis idea, proponam; ut ab hinc neque definiendo, vel discurre-

do in hac, & in quauis facultate trium librorum in limine propositorum lumine ductus; à vero defletere possit; omnibus locis à Thesauris Aristotelis (vt verum fatear) in diuitias meas congestis, sunt enim illi tres libri diuinis philosophi præceptis referti: Et videntur esse totius philosophiæ exemplaria; quia ad ipsos tanquam ad Lydium lapidem, & ad Tribunal veritatis, quælibet propositio, quælibet definitio, & quiuis discursus, an rectus, & concludens sit transferri potest.

*Vnde sit quod quatuor tantum sint suprema genera, ad qua reduci possint omnes errores qui fieri possint in scrutandis affectuum præter naturam Ideis.*

### C A P V T III.

**C**V M mihi ergo sit in animo in huius operis exordio ad quatuor certa, & suprema genera errores omnes, quos in expendendis affectuum præter naturam formis imaginari possumus; præstat in primis hic contemplari, vnde quaternus hic numerus suum trahat initium; Dicimus ergo hac orationis necessitate dispersos, atque dissociatos errores, qui fieri possunt in speculandis essentis, in quatuor capita suprema fini-ri, & coalescere. Dicentes quod errantes vel eò cadimus, vt rei de qua instituta est contemplatio, nesciamus naturam genericam, transcendentem de genere in genus; vel secundo loco philosophantes decipimur in attributis; postquam scilicet cognita est natura, & forma generica; attamen erramus credentes illam naturam genericam conuenire alicui agrotanti per se, cum per accidens competat: vel tertio loco contingit errare, nescientes nos differentiam specificam, à partibus metientes recessum secundum primigenium statum: vel quarto nescientes differentiam specificam confundentes aduentitium statum cum primigenio: Ad ista quatuor capita errores omnes circa affectuum formas contingentes, reducuntur, & plures; imaginetur quis quantum volet, non inueniet modos: Sed conferamus hos quatuor generalissimos modos in stilum medicum; dicentes primum modum errandi esse, dum affectus præter naturam ideam, & formam genericam confundimus, verbi causa, dum crederemus affectum aliquem internum esse intemperiem; nihilominus esset mala compositio, vel vice versa, & sic de omnibus morbis; ad eundem modum in symptomatibus scrutandis, veluti in exeunte aliquo, vt in alui fluore iudicaret imperitus, symptoma illud esse in actione retentrice diminuta; Vnde vellent astringentibus vt; attamen symptoma esset in actione naturali expultrice irritata; quod deberet tolli non astringentibus; sed potius refrigerantibus, & aperientibus; quem modum errandi ne in Syntes incidamus, trium methodorum virtute in hoc libro anteuerrere sumus conati: vt prima sit de resolutione symptomatum ad id quod est in facto: secunda sit de signis propriis; tertia de syndrome sufficientissima communium signorum. Secundum errandi modum esse, dum affectum per sympathiam, & per consensum; credimus per essentiam agrotantes laceßere: Tertium esse dum expendimus affectus alicuius specificam differentiam, quæ talis facta sit ab vnica ex decem illis specificis partium diffe-



differentiis ab ortu comparatis, cum dixerimus affectum genericum fieri specificum per differentias partium specificas, dum illas vel perperam, vel neutiquam expendimus; postremum dum omittimus aliquam specificam differentiam partium aduentitiam, temporis cursu per consuetudinem sex causarum non naturalium acquisitam: ut hinc in lucem, & in conspectum vestrum, lectores, quatuor priuatos ediderim libros, quippe qui tot præceptionibus, & variis relucet exemplis, quæ sum explicatus, ut hæc noua Methodus cum primis exemplorum luce splendeat: Et hac methodo exemplis exornata, atque illustrata merito incedendum duxi, quoniam hæc mentis aciem excitant, hæc scientiæ igniculos in animum iuuenum mittunt, & hæc sunt efficacissima monumenta, ut errores omnes quispiam anteuerat, & fugiat, & quæ magis semel docere possunt, quam perennis causarum contemplatio.

*De suprema omnium morborum diuisione.*

C A P. IV.

CUM in librum hunc illa Empiricorum errata, dum transcendunt de genere in genus, & ideas confundunt; non percepta affectuum præter naturam forma, & Idea concesserimus. Par est exordiri à summa omnium morborum generum, & symptomatum diuisione in suas species, & hanc vniuersalissimam à doctrinæ Galeni vbertate haurire, & strictim eam colligere; & merito postquam ab aliis libentissimè est supposita atque probata: propterea à nobis erit recipienda tanquam specimen, & exemplar præsentis cognitionis; & eò libentius, cum præuideam nostri temporis cycophantas saltem non reclamaturos aduersus Galenum, qui merito ab omnibus extollitur ad sidera, & cuius laus ita edito loco est collocata, ad quem obrectatores, vel inuidi pertingere minime potis erunt; aggrediamur ergò morborum supremam diuisionem, deinde symptomatum, ex Galeni sententia.

Morbi erunt vel intemperies, vel mala compositio, vel soluta vnitas. Intemperies erunt simplices, vel compositæ; simplices, ut calida, frigida, humida, sicca; Compositæ, calida sicca, calida humida, frigida humida, & frigida & sicca: Octo ergo erunt intemperantiæ: nec mihi obijciant, præterea dari intemperies cum materia, quoniam nullus error magis à veris initiis, & fundamentis analyticis abhorret, quam in diuisionibus transcendere de genere in genus, & viciosam proponere diuisionem; transcendimus dum intemperierum fieret diuisio in simplices, & cum materia, à genere formatum, in genus causæ efficientis: intemperies enim sunt formæ; humores vel materiæ facientes intemperies sunt causæ efficientes; ostendimus, ubi egimus de humoribus, efficientes causas: quare non est, ut de intemperiebus cum materia loquamur, & incidamus in talem laqueum tam manifestè ab Aristotele explosum 2. libro post. Octo igitur enarratarum, quælibet vel esse potest in primo gradu recedens à temperato; vel in secundo, vel tertio, vel quarto; sicut enim antiquis Medicis placuit ad quartum vsque diuidere: & quemuis gradum diuidere in

*Dum diuidentur intemperiem quod alia sit cum materia, alia sine materia, transcendit de genere in genus.*

tres mansiones: quare intemperantiæ expensæ secundum suas ideas, & formas (dimisso illo vitioso transitu formarum in efficientes causas) si enumerabimus mansiones, erunt 24. 12. in simplicibus & 12. in compositis & omnes enumerabuntur nonaginta sex mansiones recedentes à temperatissimo, hæc enim sunt supposita arque probata, & non decet perpetuo à primis exordiis litigia suscitare, sed supponenda tanquam initia præsentis contemplationis.

Mala compositio erit, vel in numero, vel magnitudine, vel mala conformatione. Numerus vel deficiens, vel superfluous: deficiens erit, dum abscinditur pars, dum vitur, dum putrescit, vel ob congelationem contrahitur; superfluous, vt pterygion in oculo: lumbrici; lapis in vesica: Magnitudo aucta, & diminuta.

Mala conformatio quatuor sub se habet subalterna genera, vel est figura vitata; vel asperitas; vel læuitas; vel cavititas.

Figura vitatur vel in vtero, vel foris, vnde nasus simus, acutus, oculi concaui; scapulæ in alarum modum; convulsiones, tabes, elephas, &c.

Asperitas, veluti dum ob acres humores aliquando in ossibus fit; vel ob medicamenta abstergentia; vel in oculis ob puluerem, vel fumum.

Læuitas, veluti ob humorem viscosum, & pinguem in ossibus, & aliis partibus: vt in ventriculo, in lienteria.

Cavititas habet duo genera; aliud quod est in angustia, vel in patefactione nimia, sub angustia quinque sunt species; coalescentia, subsidentia, obstructio, compressio, & oclusio; coalescentia fit dum coalescunt partes; subsidentia ob frigus, vel ob nimiam siccitatem, & dum expultrix facultas immodicè mouet; obstructio vel à lentis, crassis, vel copiosis humoribus, compressio, vt ob tumorem; oclusio ob carunculam.

Sub patefactione, vel nimia apertione tria sunt: diæresis, diapidifis, anastomosis.

Solutio vnitatis vel ab humoribus internis; vel ab externo ictu. nemo imaginabitur aliquam speciem, seu ideam morbi, quæ sub iis non contineatur, & quamuis Gal. 3. de Crisibus capite quarto dicat, ad rationem morbi pertinere hæc quatuor, ideam videlicet, magnitudinem, motum, & morem, attamen præter ideam; illa tria magnitudinem, motum, & morem, potius dicimus esse consequentia essentiam morbi, quoniam nos non vocamus essentiale illud, quod perpetuò saltem non conueniat, Mos, vel magnitudo, modo vni morbo conuenit; modo nequaquam, vt propterea cum non sint de omni; non erunt per se, vel essentialia: vt valeat in analyticis consequentia à de omni, ad per se negatiuè, dicendo, non est de omni, ergo non est per se: quia argumentum est à destructione consequentis, ad destructionem antecedentis; & valet, quia reducitur ad secundam figuram in baroco, vel in camestres sic: Omnis aqua est elementum, sed non est elementum, ergo non est aqua: similiter omne per se, & de omni; sed non est de omni, ergo non est per se, vel essentialiale, quod idem est; quare coacti dicimus, per essentialiale Galenum intelligere lato modo, per illud quod, vt plurimum accidit; alioquin ego nescirem ipsum defendere.



Intemperies sunt octo.	{	Simplicium, sunt quatuor genera.	{	Calida.	Quælibet intem- peries habet 4. gradus, & quili- bet gradus tres mansiones.
				Frigida.	
				Humida.	
				Sicca.	
	{	Composita- rum similiter quatuor.	{	Calida sicca.	
				Calida humida.	
				Frigida sicca.	
				Frigida humida.	

Et nonoginta sex mansiones intemperierum præter naturam à medicis  
cognoscantur, & non plures.

Mala cōpo- sicio in	Numero	{	Deficien- te	{	Dum abscinditur pars.
					Dum vritur.
					Dum putrescit.
					Dum vehementissimè refrigeratur.
	Superfluo	{	Pterygion in oculo.		
			Caro in aure.		
			Lumbrici.		
			Lapis in vesica.		
	Magni- tudine	{	Aucta.		
			Diminuta.		
Cōfor- matione	Figura.	{	{	In vtero.	Nasus simus.
				Vel foris.	Acutus.
				Ab obstetrice vt	Oculi concaui.
				A Chirurgo.	Scapulę in alarum mo- dum. Conuulsiones,
				Vel ab aliis.	tabes, elephas.
	Aspe- ritate.	{	{	In ossibus.	
				In oculis.	
				Ob medicamentum deterforium.	
				Vel ob puluerem.	
	Læui- tate.	{	{	{	In ossi- bus.
In Vē- tre.					

Cautas. A.	Angustia.	Coalescen- tia.	{	Dum coalescunt partes per cicatricem.
		Subsiden- tia.	{	Ob frigus.
			{	Ob nimiam siccitatem.
			{	Et dum retentrix immodicè mouetur.
		Obstructio.	{	Ab humoribus lentis.
	{		Crassis.	
	Compressio.	{	Copiosis.	
		{	Tumor.	
	Apertio.	Occlu- sio.	{	Caruncula quæ etiam dici- tur in numero.
			{	Dieresis.
{			Diapidifis.	
Solutio vnitatis.	Inter- na.	{	Dolores omnes, vlce- ra.	
				Anostomafis.
	Extre- na.	{	Vulnera, & similia, vt Contusiones, & mil- le alia.	

Hæc referunt specimen omnium formarum morborum, ad quod si quispiam spoliatus sanitate angitur morbis: necessario debent ad has ideas, & formas genericas omnes reduci.


### De Symptomatum omnium diuisione breuissima.

#### C A P. X.

**S**YMPATOMATA omnia in tria genera diducta sunt: cum aliqua sint Sexeuntia, aliqua qualitates mutata: aliqua sint actiones læsæ: Et actio, quæ debet esse radix symptomatum omnium tam in qualitate mutata, quam in exeuntibus mutatis, sola in suas species debet parti: cum ad actiones, tamquam ad symptomata primi ordinis omnia exeuntia symptomata, & omnes qualitates resoluuntur: actio ergo erit vel naturalis, vel animalis, vel vitalis: naturalis sub se continet alteratricem, expultricem, retentricem, & attractricem, & quælibet ex iis esse potest vel ablata, vel diminuta, vel deprauata: animalis quæ sub se continet rectricem, sensituiam, & motuiam, & quælibet ex iis potest esse vel ablata, vel deprauata, vel diminuta: verbi causa, animalis rectrix deprauata erit delirium, est affectus pertinens ad discursum. Et sic de aliis. Sensitiua continet quinque sensus: Moriua, sicuti motus totius, sicuti inquietudo: tremor, vel motus partis, vt respiratio, quæ ad pectus: singultus, qui ad stomachum, vomitus ad ventriculum, Tussis ad pectus, vitalis dum vires languent.

Sympto-





*Qua Methodo symptomata primi & secundi ordinis reducuntur ad unum quod est in facto esse & per se, vel quod indicat & Medicum allicit.*

C A P. VI.

**C**ÆTERVM altius de symptomatibus est agendum, methodum resolutionum tradendo, quomodo à qualitatibus mutatis, ab exeuntibus, vel à retentis immodicè ad actiones læsas, & ab iis ad primas radices sit incedendum. Dicas ergo, si est exiens mutatum, vel retentum immodicè, vel qualitas mutata, hæc, quæ vocantur symptomata secundi ordinis necessario insequi actiones læsas; tanquam symptomata primi ordinis. Dicas ergo, est exiens, ergo insequitur actionem retentricem diminutam, vel ablatam: nihil enim potest egredi ex corporibus nostris, quod immediate non fiat ob actionem retentricem diminutam, vel ablatam; alioquin non exiret; sed retineretur, & viceversa, si aliquid nimium retineretur, dicas, ergo insequitur expultricem diminutam, vel ablatam, non enim posset plus debito retinere, si facultas expultrix valeret. Dicas similiter, est qualitas mutata, ergo insequitur actionem læsam; & cum qualitas non veniat in conspectum Medicorum, nisi exeat, & non exeat sine subiecto; quemadmodum exiens perpetuò supponit retentricem diminutam, ad eundem prorsus modum qualitas mutata insequetur immediate actionem retentricem læsam, vel diminutam, vel ablatam; quoniam dum est ablata retentrix, humor qui fert qualitatem mutatam, subito diffluit: & tale quippiam accidere potest, dum retentrix est diminutæ virtutis.

Sed ulterius, nostrum est disquirere, & animum ad primam ideam, & primam causam transferre, dicentes, sicuti in ægrotante symptomata exeuntia insequuntur necessario retentricem diminutam, vel ablatam,

tanquam primam radicem: simili modo actiones retentrices omnes læsæ, tanquam causam insequi possunt alia symptomata, quæ sunt primi ordinis, & hæc sunt expultrices, & alteratrices deprauatæ, & diminutæ; quoniam solet accidere, quod retentrix vel sepiissime non detineat, ob id, quia expultrix irritata sit ab obiecto mordaci, & inde expellat, & tunc dicimus retentricem læsam ex accidenti, non per se; quatenus nimirum non detinet ratione expultricis irritatæ; itidem retentrix lædi potest ratione alteratricis non cōcoquentis, vnde lubricum, & viscidum illud incoctum laxitatem facit: ut in ossibus, & in intestinis lienteriam aliquando fieri vidimus. Ad eundem modum progredimur in symptomatibus illis, quæ consistunt in retentis immodicis, potest enim esse, quod aliquid immodicè retineatur; non quod læsa sit retentrix per se, sed ex accidenti, quatenus nimirum expultrix non fungatur suo officio; veluti in arquo feces diutius morantur in intestinis, non ob læsam retentricem; sed ob expultricem diminutam; quatenus porus felleus oclusus sit, & bilis cū non transeat, non vellicet, atque lancinet intestina; Vnde vires expultricis fatiscunt; vt perpetuò in expendendis symptomatum formis, atque ideis liceat rescere formas ad viuum; vt proprium genus peruestigemus, distinguentes per accidens, ab eo quod est per se; quoniam nimirum errarent, quos lateret vera idea, veluti si quis alui fluore premeretur, & diceret: est exiens mutatum, ergo retentrix diminuta; ergo astringendum, quod non sequitur, nisi ex utraque nodum, hoc modo videlicet contemplando, an retentrix læsa sit per se, vel per accidens: læsa inquā sit per accidens, quatenus expultrix irritata sit in causa floris, tunc erit obiectum irritans demulcendum; quod nō erit astringens remedium, sed potius aperiens: sicuti est serum lactis; læsa sit per se, veluti dum retentrix læditur ob fibras orbiculares, & rotundas destinatas retinendi muneribus viribus confractas, & flaccidas, tunc nisi aliæ aduersentur indicationes, erit astringendum: nouimus hæc tunc ergo initia symptomatum, & coordinationem inter primum, & secundum ordinem, vt videlicet exeuntibus, & qualitatis mutatis, prior sit retentricis læsio, retentrici prior esse possit expultricis læsio; & expultrici alteratricis vitium; & immodicè retentis expultricis diminuta læsio, vel demum expultrici prius sit vitium alteratricis, quando adeo esset perdita, vt omnino incoctum gigneret, quod ex partium debilitate, & ex superfluo quodam madore facilliter possemus animaduerrere.

Cæterum ingruī necessitas alius adhuc expēdere; & ad primos catce-res resolvere symptomatum omnium contemplationem, siquidem re vera symptoma non potest per se aliud symptoma procreare; cum nimis clarum, atque apertum sit, symptomata omnia esse in fieri, & quod est in fieri nihil agere, cum de ratione agentis sit per se existere, & in facto esse: & melius; cum symptomata sint accidentia atque ex Aristot. 4. method. tex. decimo septimo, accidens non sit accidentis accidens, sed eius cui primo inhæreat, quare si exiens prodit à retentrice diminuta, & retentrix ab expultrice deprauata, & hæc ab alteratrice corrupta; omnes istæ functiones necessariò debent prodire ab aliquo principio, quod sit in facto esse; quo ablato statim abeant, & euanescant symptomata,

alio-

*Cur errant  
Empirici dū  
inferunt, re-  
tentrix est di-  
minuta ergo  
astringendum.*

*Alius proba-  
tur sympto-  
ma nā facere  
symptoma, &  
non indicare,  
& omnia sym-  
ptomata esse  
in fieri.*



alioquin nihil esset factum præter naturam, & nihil fieret; quoniam ad hoc, vt aliquid fiat, requiritur rei forma, & efficiens causa, quæ facta sunt, & habent permanentiam; & hæc facta sunt talia, vt symptomata ab ipsis perpetuò in fieri pendeant, vt umbra à corpore, erit morbus, & causa, quæ habent esse, & permanentiam separatam, & ambo sunt in facto esse, cum agunt diuersas, & dissociatas radices; sæpissimè enim vidimus post causam ablatam relinqui morbum, & iure merito, cum morbus sit partium nostri corporis permanentis tam similarium, quam dissimilarium mala cõstitutio; quod numquam visum fuit ablato morbo & causa, symptomata relinqui, cum symptomata non sint in facto, nec vllam habeant permanentiam, & propterea non indicent neque efflagitent curationem. Nec obijciat quis ex Gal. de differentiis Morb. & alibi, dari symptomata in habitu, vt est icteritia, & plurimæ qualitates mutatae, quæ symptomata sunt in facto esse, non in fieri, quia occurrimus, dicentes, esse in habitu, non colorem, quem vocamus icteritiam; sed bilem effusam per corporis ambitum, quæ est causa: colorem verò semper pendere in fieri à bile, vt umbra à corpore. Similiter nec mihi obijciant, dolorem indicare, & propterea me falso tutari, symptomata non indicare: quia occurrimus, dicentes, anodyna non desumi à dolore, vt symptoma, sed à parte dolente, quæ est in facto esse: sic Narcotica desumuntur, ut destruantur partes: digerentia, vt resoluantur causæ: Emplastica, vt partes emolliantur vel contemperentur spiritus animales, vel ipsorum radij. Sed redeamus ad symptomata, vnde digesti sumus, & in pauca conferamus hunc symptomatum omnium ordinem: cum meum hic non sit reuocare examen vel diligentissimum de symptomatibus, cum illud præstiterim in libro de indicatione, secundum leges logicas inuenta.

*Anodyna nõ  
indicari à  
dolore, sed à  
parte dolente*

Cum igitur symptomata omnia aliqua sint primi ordinis aliqua secundi: & primi sint actiones læsæ: secundi sint exeuntia, & qualitates mutatae: haurire possumus tali pacto necessarias consequentias ordine resolutionis: est exiens præter naturam, ergo erit retentrix læsa, diminuta videlicet, vel ablata: est retentrix læsa: ergo poterit esse læsa vel per se: vel per accidens: si per se, est Gal. sententia 3. de sympt. causis primo, vel lædi læsa facultate, vel ob errorem externum, si per accidens læditur, verbi gratia, retentrix, erit ob læsam expultricem irritatam, & expultrix læditur per accidens ob læsam alteratricem vel ablatam, vel corruptam: & hæc omnes læduntur demum ab aliquo per se, quod est vel ab obiecto externo, vel à læsa facultate: vt obiectum externum, & læsa facultas sint initium, & sumum per se, vt seruetur famosa illa propositio: omne per accidens esse recessum à suo per se: & posse reduci ad suum per se: Vt per se actiones omnes lædantur ab obiecto, vel à facultatibus: intelligentes nos tunc læsam esse facultatem, quando eius instrumentum læsum est, & per eius instrumentum intelligimus constitutionem partium similarium, & dissimilarium, in quibus stant intemperantiæ, malæ compositiones, & solutæ vnitates: quæ sunt prima initia omnium symptomatum, sed in primis actionum læsarum, tam naturalium, quam animalium, & vitalium: & deinde ab iis exeuntia & ab exeuntibus, qualitates mutatae

*Radices symptomatum omnium sunt mala constitutiones vel causae effectus interna.*

prodeunt, & per obiectum intelligimus humores, vel tale quippiam, quod esse potest causa efficiens malae constitutionis. Vt primae radices symptomatum omnium sint vel malae constitutiones similarium, & dissimilarium, vel causae efficientes internae; unde malae constitutiones habent primum exordium; verbi causa, retentrix erit diminuta ob malam constitutionem similarium, tunc alia non potest esse intemperies, quae cauisset diminutam, vel ablatam retentricem per se, quam humida, quae facit fibras in orbem positas adeo flaccescere, ut nulla polleant retinendi virtute.

Si retentrix erit diminutae virtutis ob malam constitutionem dissimilarium; erit nimia apertio; ut anastomosis, quae fieri potest Galeno iudice, vel ob acrimoniam humorum, vel ob nimiam copiam, vel ob debilitatem, & debilitatem prodire à qualibet intemperie, dum calidum naturium est viribus perditum, & demolitum: si denique retentrix erit laesa ob malam constitutionem similarium, & dissimilarium, erit diarexis: id est soluta unitas. Et quod diximus de retentrice: simili modo est dicendum de expultrice, quod laedatur, vel per se, vel per accidens, & per se esse, vel ob laesam constitutionem naturalem, quae est verum facultatis instrumentum, vel ob causam efficientem externam: veluti sunt humores malam qualitatem & illam mordacem nacti: vel laeditur expultrix per accidens, quatenus alteratrix corrumpitur, & generatur bilis tunc expultrix ratione alteratricis laeditur per accidens, ratione obiecti laedentis, quod est bilis, laeditur per se, vel si alteratrix adeo est diminuta, ut sit collapsa, atque collisa, tunc cadit in anastomosis, & cum non generetur bilis, obtrunditur facultas expellendi: Sed quomodocunque laedatur actio ex accidenti: semper per accidens debet reduci ad suum per se: quia per accidens est recessum ab eo quod est per se, & non licet philosophando quiescere, quousque ad aliquod per se mens sit euecta. Verbi causa, retentrix est in statu salubri ex se, attamen non fungitur suo officio retinendi, quia expultrix irritata à mordacibus succis tanto cum impetu expellit; ut non possit retinere: Similiter expultrix laesa est à mordacibus per se, sed accidit, ut irritetur tunc expultrix, quia alteratrix sit deprauata, & talem malam sobolem sibi parauerit biliosam. Tandem ergo desinere oportet in veram causam omnium malorum, quae sit primo, & per se, & haec erit ob laesum instrumentum, id est ob malam constitutionem similarium, vel dissimilarium, quae est vera radix omnium, quae ex accidenti contingunt aegrotantibus. Concludimus ergo qualitates mutatas esse non posse, nisi vitium sit in exeuntibus, vel retentis immodicè, & haec non esse, nisi actiones retentrices, vel expultrices aliquae laesae sint, & has non laedi, nisi alteratrices prius conflictentur, & demum alteratrices non angī, vel corripī, nisi instrumenta facultatis, quae sunt constitutiones similarium, & dissimilarium laesae sint, & haec erunt intemperantiae, malae compositiones, & solutae unitates, quae erunt initia omnium symptomatum.

*Osten-*



*Ostenditur virtute Logica neminem posse per viam diuisionem, quam-  
uis progrediatur à generalissimis affectuum differentiis ad sub-  
alternas, & ab iis ad specificas, occultum aliquem  
affectum inuenire.* CAP. VII.

**A**B hac suprema omnium affectuum præter naturam diuisione iam tradita, & à resolutione symptomatum omnium in suas radices capiendum erit exordium cognitionis ideæ, vel formæ cuiusque affectus in corporis latebris delitescens. Ceterum ad explorandam alicuius rei formam ignotam diuisionem omnium affectuum ex se tanta non pollet prærogatiua, ut mentis aciem transferat ad morborum ideas penitiores, ac latentes. Quandoquidem hoc officium notificandi, quod est sua natura ignotum, viæ syllogisticæ est demandatum. Arist. 2. priorum & secundo post. circa finem mandauit memoriæ, quod nulla sit via, quæ adumbrata, & caligine aliqua obruta in lucem efferat, quam syllogistica: ut meritò Arist. reiciat illos, qui partes definitionis ignotas crediderunt, sola methodo diuisionum pernoscentas: Perutilis tamen adeo est diuisionem in venandis specificis differentiis, ut Gal. 1. ad Glauc. in limine libri, eo usque Mnesitheum Atheniensem fuisse euectum litteris tradat, ut nemini fuisse secundum in medendo ferat, quia à generalissimis (conditione rectæ diuisionis seruata) ad subalterna, & ab his specifica descendebat, dixitque quod, qui in diuidendo est adeo exactus, quantum permittitur viribus, medendo non errabit; attamen non credant Lectores, viam diuisionum solam nos ducere posse ad aliquid, quod sit ignotum; quoniam semper si cum diuisione non coniungimus demonstrationem à posteriori, incidimus in principij petitionem, quod vitium est explodendum ab omni diligenti inquisitione, diuisionem enim tantum disponit, in ordinem redigit: & ante oculos è vestigio collocat, quæ sunt pernoscentia, nihil tamen concludit, quod sua natura ignotum sit: verbi causa, sint menses suppressi ob angustiam: tunc si diuidimus angustiam in suas species: dicentes, quod angustia vel erit ob subsidentiam, vel coalescentiam, vel obstructionem, vel compressionem, vel occlusionem, tunc ante oculos obijcio, quæ illico sunt libranda: & deinde aliqua demonstratione à posteriori inferre possum reconditum, & alioquin occultum, probando non esse ob subsidentiam, quoniam forsitan habitus erit carnosus, & foris, non siccus, vel frigidus, omnis enim subsidentia ob tres causas obringere solet, vel ob nimium frigus, vel ob nimiam siccitatem; vel dum re-  
tentricæ immodicè mouente, innanita reddita sint vascula: probando similiter non ob coalescentiam, cum non præcesserint cicatrices, non ob compressionem: cum tumor non extet: non ob occlusionem, cum caruncula aliqua non præcesserit, ergo erit ab obstructione exorta angustia: ecce quod in argumento ex sufficienti partium enumeratione probando, & secludendo aliquo signo, vel demonstratione à posteriori; concludimus quoque quod sua natura est tenebrarum velo absconditum, ut diuisionem adducat in medium omnia specifica membra pernoscentia, & ante oculos collocet, quæ expendenda veniunt, nil tamen aperiat, quod ex se

*Petit in principia qui videntur argumentum ex sufficienti par. e. numer. sine alia demonstratione.*

sit delitescens: sic nil concludit: cum solum syllogistica viæ delegatum sit munus hoc inferendi, & quamuis aliquando diuisio videatur in lucem ferre, quod antea obrutū oculorū fugiebat; veluti vbi quis nesciret, quod nam symptoma esset gonorrhæa, statim dum symptomatum genera diuidit, quod aliqua sint exeuntia, aliqua mutaræ qualitates, aliqua actiones læsæ; statim inquam sine demonstratione facta diuisione, cognoscit gonorrhæam esse symptoma in genere exeuntium: quoniam differentiæ hæ notæ ex ipsis se manifestant: nihilominus si diuisio fieret in rebus obscuris, tunc nulla fieri poterit conclusio sine petitione principij: ceu aliquis diceret primo cognitum est singulare, vel vniuersale, quodnam ex iis sit, nullas diuisio ex se dat nobis in pernoscendo manus: vel si quis diceret, principium in diuiduationis est materia, vel forma, vel Heceitas Scoti, & sic de omnibus absconditis: expedit insudare, & venari demonstrationes, quæ tanta quæsitæ appetant, quoniam in his si diuisio à demonstratione à signo saltem seiungitur, petit principium perpetuo. Amplius dum inferimus ex membris diuisis consequentiam, tunc est peccatum in forma syllogistica à positione consequentis, ad positionem antecedentis: quoniam est illatio à genere ad species, veluti est animal, ergo est homo, est febris continua, ergo maligna, quæ sunt absurda: verbi causa, si diuidimus febrem continuam in malignam, & ardentem: si volumus colligere per diuisionem, esse malignam, tunc genus id est febris continua per aduersarios esset medius terminus, quare imaginemur omnes modos propositionis formandæ, & syllogizandi: vt error detegatur: & esset ergo vel faciendæ hæc maior, omnis febris continua est maligna: & sic esset in prima figura: quoniam febris continua, quæ est medius terminus, subiicitur in maiori, sed cum apertè falsa sit, alium modum formandi maiorem experiamur: sic, omnis maligna est continua febris: & hæc erit in secunda figura, quoniam medius prædicatur in maiori, & argumentum fiet ex duabus affirmatiuis in secunda figura, quod non sequitur, & argumentum reddetur ridiculum. Formemus iterum, vt experiamur omnes modos syllogizandi, tali pacto, aliqua febris continua est maligna, & hæc esset in prima figura cum maiori particulari, quod est monstruosum, quoniam maior debet esse perpetuo vniuersalis: quia continere debet minorem, & quando non continetur minor sub maiori, argumentum non sequitur, vt de hoc luculentius egimus in libris de indicatione: ecce ergo, quod per diuisionem generis procedentes ad subalternas, & ab iis ad specificas ideas, nos semper in occultis, & ignotis differentiis petimus: quoniam semper argumentum ex sufficienti part. enumeratione, dum vtimur ipso sine demonstratione aliqua in rebus inquirendis: petit turpiter principium: Hinc Aristot. i. priorum: & in fine secundæ sectionis concludit, ex diuisione consequentias esse prauas, vel si consequens est bonum: illud non colligi ex præmissis: quia à genere ad differentias nulla est illatio.

Ad hæc quod diuisio generalissimi ad specifica nullas in hauriendis consequentiis opes ferat, patebit non solum, quia peccet semel in forma, verum etiam non correspondet variis Aristotelis præceptis, veluti secundo peribet, à coniunctis ad diuisa non valet consequentia: sicuti in syl-

Ex membris  
diuisis infer-  
re consequen-  
tiam semper  
esse paralogi-  
smum.



in syllogismo diuifio duplante colligitur, dicentes, omnis febris continua vel est benigna, vel maligna, hæc est continua, ergo benigna, vel maligna: iste est syllogismus duplans, at nil concludit, nisi quod est in maiori propositione. Ex hoc sunt tamen qui inferunt, non maligna, ergo benigna: iste processus à coniunctis ad diuifa, nullus est sine demonstratione; quia est in diuerfo sensu in coniuncto, quam fit in diuifo, veluti febris continua est benigna, vel maligna: hæc non est vera, dum vero dicimus sine probatione, est maligna, est alter sensus, & non fequitur. Demum diuifione occulta inuenire, est peccatum in materia quod committitur circa vniuerfale admonitum ab Arist. 1. post. cap. de tribus erroribus circa vniuerfale, & peccatum est attribuere ex diuifione inferendo inferiori, quod superiori effer attribuentum, veluti vt inftitamus in eodem exemplo: febris continua vel est benigna, vel maligna: hoc attributum, esse benignam, vel malignam aptiffimè tanquam proprio fubiecto conuenit febrì continuæ, quia continua est vel maligna, vel benigna: at dicere febris, vt febris, est continua, & ex hoc tantum inferre, quod fit maligna, est attributum fpecificum, & non inferendum, cum inferiori fubiecto conuenire debitum fit, adeft in primis febris continua tanquam genus, fub hac continentur maligna, ardens, & variæ fpecies, & vni ex omnibus attributum illud, quod fit maligna, conuenire debet: quare attribuere inferiori, quod superiori effer attribuentum, est error in materia non excufandus. Concludimus ergo diuifionem sine demonstratione nos decipere, & nihil vtilitatis in hauriendis afferre, & hanc fummam vtilitatem venandi incognita effer deferendam demonstrationi, quæ fola obftrufa, & recondita fplendefcere facit, & in arte Medica per demonstrationem à posteriori, & per figna propria, vel communia coarctata: vt in hoc libro, & in 6. vbi docuimus, quomodo fyndromes fignorum communium fit facienda, quæ propriis fignis fubrogari poffit.

*Syllogismus  
peccat in ma-  
teria f. ex  
membris di-  
uifis inferitur  
cōfequentia.*

*Methodus quæ poteft haberi de fignis propriis affectuum omnium præter naturam à quinque fontibus exhauriendis.*

C A P. VIII.

**C**Vm ergo diuifio generaliffimi in fubalterna, & fubalternorum in fpecificas affectuum præter naturam differentias vtilis quædam via fit: fed à demonstratione feiuneta, ob petitionis vitium in cognofcendis occultis affectuum ideis, mutila & infufficiens; optimum factu exiftimauimus, in præfentia figna aliqua morborum tradere; & Methodum aliquam demonftratiuam condere: quæ poft factam fufficientem affectuum enumerationem, vel diuifionem, principij petitionem tollat, & nobis commodè, & perpetuò manifeftet, quo morbo vnufquifque patiens fit iactatus, atque perculfus. Cæterum, quia Medicus eft fenfatus philofophus, idcirco per figna, & à posteriori coactus eft, quæ fua natura aliquo funt obtenebrata velo, in lucem promere. Age, oftendamus, quænam fint hæc figna, quæ vim demonftratiuam obtinere videntur. Dicimus ergo, aliqua effer propria, quæ à determinatis fontibus, & feparatim

ex vnico tantum vnicum signum proprium aliquando colligere possumus. Sed, cum humana hæc conditio vix ferat, nos in morbis contemplandis, atque indagandis signa propria inuenire, cum reuera perpauca sint, vt in centum affectibus vix vnicus sit, qui per vnicum signum proprium splendet, ideo methodum certam de signis propriis tradere non possumus, cum de illis, quæ non sunt semper, nulla methodus, vel scientia detur. Verumtamen in capite proponimus illos fontes, ad quos (si adierint) propria signa reducuntur, & per quos poterimus in morbis cognoscendis vagari, & philosophari, an vnicum existat proprium signum, vel an fontes illi suggererint nobis aliquod proprium; exinde fontibus iis explicatis, spiritum dirigemus ad Meth. de signis communibus, quæ abundantissime à qualibet re scaturiunt, de quibus, & Methodus, & scientia dantur: aliqua ergo præter propria erunt communia, sed eò vsque illa certa methodo coarctari possunt, vt propriis bellissime subrogentur, quem modum Arist. ita extulit 2. libi. post. circa finem, quemque adeo obseruat, dum delitescunt propria signa, vt doceat syndromen signorum communium aliquando vicem subire propriorum, sicuti exemplificat Arist. de animalibus habentibus tres ventres, quæ careant dentibus superioribus, & gestent cornua, hæc duæ proprietates coarctant animal habens tres ventres: & quæ conuertuntur cum subiecto, ac vnica esset conuertibilis proprietas & sicuti nos in venandis causis efficientibus, in medium adduximus syndromen nostram communium signorum à sex fontibus hauriendorum, infallibilem, æternæ veritatis, & scientificam.

Si verò de propriis est colloquendum; Dicas ergo, quod si aliqua quandoque signa propria aderunt pro morbis cognoscendis, erunt haurienda ex aliquo ex iis 5. fontibus, vt primus hauriatur ex actione aliqua læsa, quod est immediatum symptoma: Secundus ab exeunte mutato: Tertius à qualitate mutata: quæ mediata symptomata appellati merentur, quia exeuntia, vel qualitates mutatæ non sunt, nisi prius actio aliqua lædatur, quam deinde sequuntur: Quartus fons erit à motu morbi: motus verò morbi est vel vniuersalis, vel particularis: vniuersalis est Cronicus, vel acutus: particularis, sunt periodi & paroxysmi: Quintus & postremus à iuuantibus & lædentibus: à quibus seorsum expensis, atque libratæ, non in syndromen collectis, aliquando signum aliquod proprium maxime expiscari possumus, neque alios præterea fontes, vbi propria signa collocari contingat, imaginari possumus: quoniam omnia quæcunque nexum aliquem necessarium tenent, vel pendent per se à mala corporis constitutione: & erunt symptomata, quæ constituunt primos tres fontes: vel à contentis, quæ propriè morum periodicum faciunt: vnde quartus fons: vel sunt iuuantia, & lædentia: cætera vero omnia ad hos reducuntur, vel si non reducuntur, sunt accidentalia, & paralogismos constituunt, veluti est illud à nobis alibi reiectum à simili, vel à proportionem: quod proponitur ab Argenterio & facit vel syllogismum in quatuor terminis, vel argumentum in 3. figura cum conclusione vniuersali, vel similia sequuntur inconuenientia de quibus alibi. Sed redeamus nos ad nostros fontes, dicentes, in primo fonte actiones collocari: quare si expendimus actionem animalem, vel sapissimè ab hoc solo, & vnico fonte



fonte depromere possumus, quo morbo aliquis angatur, & corripatur: sicuti exempli causa, in animali functione princeps, & non princeps in princeps, si memoria est deperdita; dicimus, ergo est intemperies frigida (ut multis placet) somnus nimium longus, ergo cerebrum est frigidum; & humidum: In non princeps, aliquis fame intempestiva laborat; ergo affectus oris ventriculi erit siccus: similiter in actione virali; pulsus ægrotantis erit valde tardus, ergo colliges esse affectum frigidum cordis, & plura quæ vnico signo sine syndrome optimè cognoscuntur: Ad eundem modum, si de exeuntibus instituimus sermonem; quàm primum pus vidimus, inferimus, ergo est vlcus, si cartilagineam tussii eiectam, ergo vlcus tracheæ, nulla interposita difficultate, certas has consequentias ex ex vnico signo, sine aliqua syndrome, morbum vel affectum internum colligere possumus: Idem si in lotio carunculam spectamus, illico affectionem renalem comprehendimus, & si in vrinis sedimentum multum, & album sine aliquo virinæ colore, depromimus affectionem frigidam, & humidam: tale quippiam in qualitatibus: si album inspicimus colorem, intemperiem frigidam, & humidam; si flauum & icterum, obliu- ctionem pori fellei; si nigrum, siccitatem, & melancholiam. Ecce ergo; quod non à multis symptomatibus, sed ab vnico tantum, & seorsum expenso, euecti sunt prius altissimam, & latantem affectionem genericam. Ad hæc præter symptomata, adest motus vniuersalis, sicut cronicus affectus, affectionem frigidam ostendit, adest quoque motus particularis, ut periodus: nam ille qui alternis diebus ingravescit, valetudinem calidior- em; qui de quarto in quartum inualefcit, affectus non adeò caloris fera- ces, & qui mouentur vespere, melancholicos, qui sœuiunt noctu, pitui- tosos; qui commouentur matutinis horis, sanguineos; & qui scintillant in meridie, effrenes biles portendunt. Postremo ex iuuantibus & læden- tibus, aliquod propriissimum signum comprehendimus, nulla facta symptomatum contemplatione, veluti si morbus in immensa caligine versaretur; & symptomata adhuc sub iudice essent collocata; an videlicet vnum magis, quàm alium affectum ostenderent; peruenies saltem ad cognitionem aliquam genericam, dicendo iuuant calida, ergo affectus debet esse frigidus, & viceuersa; frigida manus dant, ergo calida affectio, veluti dum in aliquo variis oppresso affectionibus videbis febrem ma- gnas suppetias ferre, aliud nõ poteris dicere, nisi quod affectus debeat esse frigidus; hinc Galen. 6. aphorism. 9. nouimus febrem illis tantum mor- bis conferte, quæ ex frigiditate sunt sola, vel cum humoribus crudis, & flatuosis spiritibus, & Hippocrates in Aphorismis, febris tollit conuul- sionem; quare valebit semper dicere, febris opitulatur patienti, ergo va- letudo erit frigida. Hæc signa in exempla adducuntur; cum plura signa propria alicuius affectus possem in has meas diuitias congerere, quæ cum apud præcticos nostros excellentissimos, ut apud excellentissimum Eustachium Rudium, quem honoris causa nomino, innumera legi, & obseruari possint, non par est elegantissimè, & summo eloquentiæ orna- tu in conspectum hominum ædita huc transferre, ne in maiorem molem volumen crescat: non conuenit inquam, quia hic tantum meum non est propositum, methodum de signis propriis promere à quinque fontibus

expiscandis, sed mentem præcipue est, methodum de signis communibus contrahendis in syndromem, tradere, quod fiet in sequenti capite; Non enim est laborandum in propriis colligendis: quia si in vnico morbo vnicum proprium colligimus, in centum affectibus, vt dixi, vix vnicus erit, qui in lucem ferat proprium, & per illud cognoscatur affectus. Quocirca cum scientia debeat esse æternorum, & propria non possint inueniri semper: insudabimus, vt inueniamus methodum obseruandam in quolibet morbo cognoscendo, quæ erit per communia signa contrahenda per syndromen, in cognitionem æternam, & infallibilem.

*Methodus de syndromæ signorum communium affectuum à sex fontibus tantum colligenda.*

### C A P U T IX.

**P**LANVM est, in cognoscendis internis morborum ideis, non persæpe latere morbi differentiam; quoniam proprium signum, quod nos ad illam affectus naturam ducere potest, est obtenebratum, & eadem caligine, qua morbus obductum, & sæpenumero circumseptum; ratio vero tantæ obscuritatis est, quia omnis morbus ferme est compositus, ideo per plura signa fere semper in cognitionem venimus. pleuritis, verbi causa, est inflammatio, est morbus mixtus, adest intemperies calida, & putredo: vnde febris, adest solutio continui in tunica, vnde dolor pungitiuus, adest magnitudo aucta, vnde difficultas respirandi, adest humorum confluxus in pectus, vnde tussis, eadem in mille aliis vidimus: idcirco summa debemus abundare solertia, syndromen aliquam signorum communium parandi, quæ in tantum contrahat, & conuertibilem cognitionem pariat, vt ad penitissimos illos affectus corporis peripheriæ vallo circumuentos, nos commodè deferat. Cæterum cum signa communia sint propemodum infinita, nos illa amplecti dumtaxat constituimus, quæ immediate insequuntur causas antecedentes, & subsequentes; quæ in vim propriorum subrogari, & scientiam infallibilem in animos nostros cōferre poterunt; quæ omnia apertissime ad sex fontes hos transferre possumus: vt in primo fonte videlicet sint omnia illa, quæ à procatarticiis causis hauriuntur. In secundo, quæ à dispositione patientis. In tertio collocabimus, quæ à causis efficientibus internis trahunt initium. In quarto, quæ à symptomatibus scaturiunt: In quinto, quæ à locis affectis. In postremo sint illa signa, quæ per iuuantia, & lædentia, nos poterunt excitare, & commonefacere, quo morbo quis in altissimis corporis partibus concutiat, atque iactetur. Quod vero nec plures, nec pauciores esse possint fontes, à quibus signa communia possint in hunc usum colligi, talis ingruit necessitas; siquidem factum est possibile, hominem in morbum corruere, nisi sex non naturalium rerum allecamentis aliquibus accersitis, ac delinitus vel aliis externis cadat. Similiter qui fit, vt quispiam in malam valetudinem cadat, nisi corpus ipsius sit dispositum, atque paratum vt hinc Galenus in historia Sileni dicat, vtrique Silenus non incidisset in morbum grauissimum ob externos errores, nisi antea dispositum corpus fuisset,

*Cur à sex fontibus tantum syndromes signorum communium colligi possit.*



fuiſſet, ad eundem modum requiritur, vt morbus fiat, cauſam aliquam efficientem internam ſauire, à qua petenda ſunt ſigna, vt fuimus executi pro virili noſtro in 6. lib. ſimiliter morbus non habebit permanentiam, niſi ex templo ſequantur ſymptomata, vt hinc ſons quattuſ ortuſ ſit; vnde ſigna petenda erunt à ſymptomatibus. Demum cum morbus non poſſit eſſe niſi ſit locus affectuſ; à locis affectis depromemus notas; & poſtremo à iuuantibus, & lædentibus, quo fonte vtiſur, vt eſt abundans rei probatio, vt luculentius diſcuſſimus in libro 6. quem poteris adire, vt merito vber hæc materies alibi luculentiffimè acta, hic in pauca ſit collata.

Descendamus ad primum fontem, & quenque ſeorſim expendamus: *De primo* procatartica omnes cauſæ ad has reducuntur, ad aërem: ad cibum, & potum; ad ſomnum, & vigiliam; ad motum, & quietem; ad animi paſſiones, & ad coitum, vel ad inanitionem, & repletionem, vel quod magis placeat cum Galeno libro de tuenda ſanitate, & alibi, ad quatuor capita, ad quæ hæc, & plura alia, vt alibi diximus, poſſunt reduci, & hæc ſunt, quæ aſſumuntur, quæ ſiunt animo, vel corpore; quæ foris adhibentur: & demum quæ excernuntur & retinentur; Iſtæ cauſæ extrinſecæ longo aliquo temporis tractu, temperamenta immutant; & ita altæ (ſi corpus diſpoſitum eſt) imprimere valent orbitas, vt inferant plagam in viſcera, & parum diſpoſita corpora diſponant, & ad labem ducant. Quare ſi de aëre loquimur, poteſt calefacere, refrigerare, exſiccare, & humectare, & ad omnes intemperantias corpus deducere: ſi præceſſit æſtuſoſus aër, igne penè emicans, facile erit colligere morbum calidum ſubſecutum eſſe: Si verò præter æſtum, aër non ſit perſtatuſ; ſed ventis auſtralibus expoſituſ: tunc dupliciter calefacit, per ſe, & ex accidente: per ſe quatenus caliduſ; ex accidenti, quatenus obſtruens meatus inſenſibiles: vnde retinentur perſpiratuſ illi halituoſi, vt tandem incræſſentur, & in melancholiam degenerent, veluti ſi loca erunt paluſtria, & cænoſa craſſas adeo exhalationes ſpirantia; horum locorum incolæ vbi ſe colligent in aërem perſtatuſ boreali ſpiritu, tunc triſtitia, quæ eſt melancholiæ character, exui aſſatim ſentient, quod obtingere ſolet Veneris melancholicis dum è ſuis paluſtribus in rura ſecedunt; vt ego addere ſoleam carminibus illis Lucretij 6. de natura.

*Eſt Elephas morbus, qui Nili flumina propter  
Gignitur: Aegypto in media, neque præterea vſquam  
Archide tentantur grefſus oculique in Achais  
Finibus.*

Quod eſt lippitudinem Acheis; podagram Athenis: elephantaſim Aegypto, ſauire, & Venetiis melancholiam hypocondriacam præcipuè vigere: quare ſi præceſſit aër æſtiuſ, morbi calidi ſequuntur: ſi nubilofuſ, melancholicuſ ille effreniſ; ſic de cæteris frigidis humidis, & hæc qualitates poterunt per ſe, & per accidens variis modis officere, vt nimiuſ feruor per accidens quatenus reſoluat, frigeſciant: nimium frigus quatenus obſtraet, caleſciant: vt perpetuò ſpectanda ſint eâ, quæ per reſolutionem, & ſuffocationem contingunt, non modo in aëre; verum etiam in qualibet procatartica cauſa. Si vero, eâ, quæ ex aëre colligere poteris, in vnum

complexum coalescent cum cæteris fontibus; & cum iis, quæ pertinent ad eundem; tunc facta syndrome colligere poteris morbum. Nam si de alimento loquimur, tunc ex Galeno in iis, quæ ad Glauconem, nonne habemus in Alexandria, & in Mysia, æquæ cochleas, carnes salitas, & lactem, homines comedere, verumtamen quia in Myli aër est gelidus, & in Alexandria summo æstuant æstu: idcirco in Alexandria affectus elephanticus grassatur, atque scintillat, quippe in Mysia, & in Germania non videtur sæuire, vt maiorem vim obsideat consequentia, si aëri adiungimus alimentum; præcessit enim aër feruidus, & cibus calidus; ergo affectus subsecutus erit calidus, & quod de calidis affectibus inferimus, de omnibus subaudiendum erit. Si vero aëri, & alimento adiuncta esset vigilia, vt æque respondeat, atque cohereat, certiores adhuc consequentias hauriemus; Vigilia exsiccat, somnus humectat; vnde ex Galeno, somnus demulcet sitim, & lassitudinem illam vlcerosam ex bile factam: somnus nimius ad frigidos morbos; Vigilia ad calidos, & feruentes transferunt corpora; Si præcesserunt exercitia, & motus insignes, calidos morbos. Si vero vehementissimum anteinit exercitium, tunc poteris, si aliis fontibus correspondeat hoc signum, colligere frigidos morbos ob resolutionem calcris, & quod de motu colligere valemus, de quiete contrarium esset inferendum: secludendo semper id quod est per accidens, ab eo quod est per se; per accidens enim in procatarteticis variæ sunt causæ operantes, vt suffocantia, & resoluentia vniuersa, ad eundem modum animi pathemata omnia calefaciunt, ex Galeno in methodo medendi habemus nõ solum iram, sed mærorem, & mæstitiam ad motam, vt ad causam efficientem caloris reduci; sic in iram excurrrens, vel percitus furore, furit adeò, vt flammeus scintillet feruor; eodem modo mærore enecti concentrant spiritus: quippe atctè vniti solida adeò quatunt, & vibrant humores, vt ardore & illo infestissimo melancholico miserrimi promptè præmanant. In calidis ergo affectibus hauriendis, & præcognoscendis passiones animi maximam præbent notitiam. Postremo si in hoc fonte, coitus quoque conspirat, eò certior euaderes; Coitus enim calfacit, sed imbecilla corpora refrigerat; Gal. de morb. vulg. con. text. 23. Coitus calfacit; sed corpora imbecilla refrigerat: refrigerat enim debilitando, veluti habet Gal. 6. aphor. 28. dicens, multam vini potationem debilitat, vt coitus, qui debilitat corpora, quæ robore non ita præstant, & exsiccat vsque ad hecticum tabum, vt hinc Galenus de Satyro dicat 8. de morb. vulg. 38. ob eiaculationem seminis repetitam tabidum factum fuisse, vt ex coitu nimio possis in diuersa corporum conditione, & contumacissimum, & effrenem colligere calorem, & summam haurire siccitatem; & debilitatem quoque aliquando, & aliquando frigiditatem inferri posse, quoniam omnes externæ causæ, nisi suffocent, & resoluant, per se agunt: inferas ergo breuibus: aërem calidum, alimentum calidum, vigiliam, motum, passiones animi, & coitum, nisi resoluant, vel suffocent, calidos morbos: sin minus, frigidos parere: aërem frigidum, alimentum frigidum, somnum nimium, quietem per se refrigerare, ex accidenti (quatenus obstruere valent) calidos morbos facere posse.

*Coitus quare  
de calfaciat,  
& quando re-  
frigeret.*



*Quamethodo per viscerum dispositionem pracedentem ducamur ad cognoscendos affectus internos.*

## CAP. X.

**E**X traditis in primo fonte in satis rectam semitam duci poterunt inuentores morborum, at nulla necessitate haecenus inferre aliquid valent, nisi ad secundum fontem, quem voco à proprietatibus, vel dispositionibus corporis conferant mentis aciem. Iam diximus neminem affectibus præter naturam posse illaqueari, atque irretiri, nisi præexistat in corpore illa dispositio, ut Sileno contigit, & has dispositiones ante oculos expedit collocare, ut illis admoniti, ocus internum & occultum præcognoscamus affectum: Aliquæ ergo erunt dispositiones antecedentes, aliquæ sublequentes: in feruidis affectibus antecedentes erunt, esse oriundum à parentibus, qui fuerint perpeffi eundem affectum, qui hæreditariè eandem receperint luem. Ex ætate: in iuvene scimus corpus dispositum esse ad ignitos affectus; senum ad frigidos: Ex intermissa aliqua euacuatione, nam intermisso sanguinis per hæmorrhoidas melancholicum affectum; intermissio bilis ardentem, & sic de cæteris: Ex corporis conditione, nam obæsum in frigidos, macilentum corpus in calidos est obnoxium.

*De secundo fonte signorū communium in dispositione viscerum collocato.*

Ex phsyionomicis signis; qui habent frontem rotundam, in bilem: qui maxillam inferiorem magnam, in pituitam: qui habent venas latas, in calidos: exiles, in frigidos sunt proni. Varia deinde obseruantur consequentia, quæ eandem dispositionem portendunt; quia si animales spectamus functiones, ut esse vigiles, mutabiles in sententia, celeri ingenio, in somnis videre arma, vel quæ iram incutiunt, esse agiles in motu, bilem ostendunt. Ex vitalibus, si sunt iracundi, & sint *ex ætate* in Venerem præter modum excurrant sed *per se* *per se* *per se*, & pulsus sint veloces. A naturalibus, cibum non esse molestum, bilem sortiri multam, optimè digerere, & male coquere, excrementis esse exutos, ut salina carere, & bilem in auribus esse plus debito, hæc omnia calidos affectus ostendunt.

Si verò contraria obseruantur: ut sint in sententia constantes: aquam in somnis videant: tardo sint motu, non *ex ætate* sed *ex ætate*, pulsus molles: & fere suffocati, & coitus nimia sit abstinencia, quæ ex Galen. 6. de loc. aff. 5. disponit ad sex mala, ad grauitatem capitis, ad cibi fastidium, ad periculum febris, ad coctionem diminutam, ad corporem, & ad timorem: Cibus paulo plus debito sumptus valde molestus, abundantia saliuæ, somnus longus, non siccus. frigida corpora ostendunt, & si carent moribus (cum pituitosi ex Gal. libro de natura humana non habeant mores) tanto magis frigidum, & pituitosum corpus indicaretur. Hæc & similia debent expendi, ut corporis dispositio cognoscatur; quoniam ut probabimus ex Galeno, solum disposita corpora in agriitudines procumbunt: propterea si exhauries signum aliquod à primo fonte, & coniunges eum aliqua ex iis dispositionibus, non erit difficile experge fieri, & cognoscere quo morbo quis iactetur: & tanto magis si hæc cum

*Abstinencia contra ad sex mala disponit.*

inferioribus fontibus coniunges, tunc certam comparare poteris cognitionem.

*De tertio  
fonte signorū  
communium  
ab humorib.  
peccantibus  
colligendo.*

Sequitur tertius fons, qui est ab humoribus, nullus enim reuera potest esse morbus, neque hecticus, qui corpora hæc nostra vexare solet, quin alterentur humores. Sed quoniam de humoribus omnibus peccantibus in 5. & 6. libris fuimus in illa speculatione admodum solliciti, cum duo libri in hunc finem editi sint, ideo conulto omittimus hanc contemplationem cum illuc commodè adire possis.

*De quarto  
fonte signorū  
communium  
à symptoma-  
tibus colligendo.*

Quantum igitur ad quartum fontem spectat, ubi per symptomatum cognitionem procedimus ad latentes affectus cognoscendos: ante oculos collocanda sunt omnia ægrotantium symptomata, eaque expendenda, & ad prima initia, ut superius sumus executi, sunt transferenda, dicentes, quod omnia symptomata vel sint primi ordinis, vel secundi: si primi erunt actiones læsæ, quæ immediatè insequuntur morbum; si erunt secundi erunt exeuntia, & qualitates mutata: quæ mediatè sequuntur morbum. Attamen primum exordium symptomatum est morbus, cum omnis læsio actionum, & omne exiens malum, vel qualitas mala aliquam constitutionem insequantur, sicuti superius probauimus, ut non sit quod hanc rem authoritatibus Galeni & Arist. confirmemus: supponendum igitur erit symptomata esse in fieri, & perpetuo pendere, eaque tolli non posse, nisi quæ sunt in facto esse adimantur; quoniam nil fit, nisi supposito subiecto, & efficiente, quæ sunt in facto esse, & veram permanentiam habent; rescemus ergo symptomata ad sua prima principia, & exordiamur hac methodo resolutiua. sunt exeuntia mala, ergo retentrix est diminuta vel ablata; dicas deinceps, ut peruenias per semitam infallibilem ad veritatis apicem, est læsa retentrix, ergo vel per se vel per accidens, quæ distinctio ambit omne genus entis, & omnia cadunt sub hac vniuersalissima diuisionis consideratione: si per se, est Galen. 3. de sympt. causis primo, causas lædentes per se retentricem, vel expultricem, vel cæteras corporis functiones esse facultates læsas, vel obiecta externa; læsa enim est facultas, dum instrumentum eius læsum est, quod est constitutio præter naturam, quæ prædicatur de partibus similaribus, & dissimilaribus. Vnum igitur genus, quod per se causat retentricem diminutam, vel ablatam, erit mala constitutio similarium, vel dissimilarium, si erit mala constitutio similarium, erit intemperies humida, quæ reddere potest fibras in orbem locatas eo vsque flaccidas, ut nulla retinendi vi polleant, si verò erit mala constitutio dissimilarium lædens hoc modo retentricem, erit nimia apertio vel per anastomosim, vel per diæresim facta, anastomosis vero vel ob acrimoniam, vel ob copiam, vel ob imbecillitatem fit, & diæresis quoque ob tres causas fieri solet, ob acrimoniam videlicet, ob copiam, vel ob externum ictum. Aliud verò genus, quod lædere potest per se operationes potest esse obiectum externum, nulla etiam facta in facultatibus læsione, sicuti ob humiditatem ex continuis potationibus collectam: per accidens lædi potest retentrix, quatenus expultrix irritata præmit tanto cum impetu, ut nulla naturalis virtus optimæ retentricis possit resistere: ad eundem modum de expultrice dicendum, quod per se, vel per accidens lædatur, per se irritatur à mala constitutione similarium,

*Causa anastomosis, & diæresis quæ fit.*



rium, veluti esset intemperies calida & sicca transuersarum fibrarum; per se diminui tur ab intemperie frigida & humida: lædicitur, & corrumpitur ab obiecto per se, dum effrenes biles pungunt, & vellicant transuersas fibras, quæ sunt instrumenta facultatis expultricis, vel per accidens lædicitur expultrix ratione alteratricis diminutæ; quæ esset adeo viribus exuta, vt non generaret bilem, tunc partes similes, & dissimiles destinatæ huic officio expellendi, possent optimam valerudinem sortiri, attamen expultricem in suis obeundis muneribus deficere propter læsam alteratricem, quæ est omnium functionum naturalium tanquam princeps, & domina, & quæ immediatè constitutiones in primis similes, & deinde dissimiles respicit.

Hæ igitur functiones cum aliquæ sint diminutæ, aliquæ ablata, & aliquæ deprauatæ; dicas si erunt diminutæ, vel ablata functiones naturales, tunc per se indicare passionem frigidam, quæ potest esse vel in obiectis, vel in constitutione similarium partium. Nos autem tunc cognoscemus esse in obiectis, quando ex tempore sine aliqua præcedenti corporis dispositione videbimus functiones diminutas, vel ablatas reddi; Cognoscemus deinde passiones frigidas esse in constitutione simili, quando corpus longo temporis tractu ad malam valerudinem redditur dispositum; quoniam ex Galeno passim intemperies, quæ sunt malæ constitutiones similarium, neque cito fiunt, nec cito desinunt: dicas deinde, si erunt functiones naturales deprauatæ, tunc per se indicari calidam passionem, quia contrariorum eadem est ratio, quæ similiter affectio calida erit vel in obiectis, vel in constitutione, & cognoscemus esse in obiectis, quando sine præcedentibus dispositionibus deprauatæ obseruantur: in constitutione verò, quando tractu temporis corpus ad illas passiones erit obnoxium. Quantum verò spectat ad actiones vitales, & animales; diminutæ vitales vel frigidam passionem indicabunt esse in similaribus partibus, vel indicabunt esse angustiam in dissimilaribus, hinc pulsus plus debito tardus affectum frigidum ostendet, & pulsus inæqualis affectum in angustia, quæ pertinet ad dissimilem partem, vt propterea Galen. 4. de loc. affectis vlt. cognouerit Antipatrum Medicum ex inæqualitate pulsus, & ex difficultate respirandi, habuisse angustiam in magna arteria. Si verò de functionibus vitalibus, & animalibus deprauatis loquimur, aliquando calidos affectus significant, & aliquando frigidos, & præcipue functiones animales deprauatæ, sicuti obseruamus in Epilepsia, vbi deprauantur functiones animales, attamen affectus à frigidis oritur causis, & in phrenesi vbi actiones animales deprauantur, nihilominus affectus est calidus. Si verò de functionibus animalibus diminutis loquimur, hæc potius frigidam passionem ostendunt, vt valeant hæc consequentiæ in diminutis functionibus animalibus: est memoria deperdita, vel diminuta, ergo est intemperies frigida & humida: est cæcus, ergo frigida intemperies: est mēs hebes, ergo frigida intemperies; quare diminutæ functiones animales potius frigidum affectum, quam calidum; deprauatæ verò ali-

quando frigidum, & aliquando calidum: calidum inquam non solum in phrenesi, sed in aliis affectionibus, ut quæ observantur in illis, qui sunt vigiles, qui obloquuntur, vel nugantur, qui totis horis sunt sitibundi, & à cibo abhorrentes, hæ omnes affectiones sunt in genere actionum depravatarum, & biliosos succos ostendunt, ut Galenus docet, de Historia Cleonactidis verba faciens, de quo ægrotante dixit, quod quamvis malam febrem habuerit, & biliosa vomuerit, quoniam nec sitiebat, nec abhorrebat cibum, & non erat insomnis, ex iis tamen colligebat Galen. Cleonactidem ardenti febre esse oppressum, abundare tamen potius frigidis quam calidis humoribus, ut sitis intensa, vigilia, calidos affectus significant: colligimus ergo ex læsis actionibus primas affectuum radices & quando aliqua actio nos dubios reddet, nos confugere debere ad primum fontem ubi ex procatacisticis aliquid colligere possumus. Et ad secundum fontem, ubi ex dispositionibus antecedentibus, & consequentibus, qui sint affectus cognoscere valemus, & demum ad locos affectos, & ad iuvantia, & lædencia, ut simul vniti fontes possint certissimam reconditi affectus cognitionem asserere.

*Qua Methodo ducamur ad cognoscendos locos affectos.*

#### C A P V T X I.

De quinto  
Fonte signo-  
rum commu-  
nium à locis  
affectis co-  
gnoscendo.

**P**OSTRIMO libranda sunt ea, quæ ad quintum fontem spectant: ex Galeno recepinus quinque loca, quæ ad cognitionem recondita, & delitescantis partis affecta, nos vehere possunt; quorum locorum primus est ab excrementis; Secundus ab actione læsa; Tertius à situ accidentiū, ut à situ doloris, caloris, tumoris, vel gravitatis: Quartus à propriis accidentibus; Quintus à doloris proprietate; ab ijs locis, & per hæc principia nos aptissimè locos affectos cognoscere valebimus: quibus percognitis non erit arduum, affectus internos, & penitissimos haurire; & quemadmodum aliquando ex vnico loco affectum locum consequimur, aliquando ex pluribus: similiter ex loco affecto, quod est per vnicum fontem procedere morbum sæpè comprehendimus, nulla alia facta syndrome. Age, exempla, quæ animos lectorum demulcere satis possunt, proponamus: diximus ab excrementis locum affectum quandoque pernosci, veluti ubi sanies eijcitur per vomitum sine tussi, tunc dicimus ventrem esse vlcere afflictum: sed hætenus latere, an œsophagus sit pars affecta, an ventriculus; ut hoc pernoscat, cõfugimus ad alia loca, ut ad sitū doloris, dum cibum videlicet ingerunt: si antequam ingestus sit, puncturæ sentiuntur, est in œsophago: post immissum cibum excitentur puncturæ, est in vetriculo: aliis pergamus exēpla proponere, quam reconditorū locorū; iterum ab excrementis exordientes: est pus permixtum valde cum lotio, dicas ergo

renea



renes sunt affecti; quoniam ob distantiam locorum pus valdè permiscetur. Cæterum non præstat infallibilem cognitionem, nisi ad alia loca confugiamus; quoniam etiam hepar in parte gibba potest esse vlcere oppressum, & inde per urinam pus mixtum prolabi. Situs ergo exolvere videtur nodum: nam si dolor est circa lumbos, est in rene: si in regione hepatis, est in hepate: præterea si in lotio caruncula conspicitur, renes esse affectos, solum hoc signum posset omnes discutere renebras, quemadmodum, dum aliquis patitur vlcus tracheæ arteriæ, tunc si per tussim ejicitur cartilago, hoc mirum in modum nos cogit ad credendum vlcus esse in trachea. Diximus quoque ab actionibus lætis affectos locos nos assequi posse, ut hinc pulsus inæqualis, atque intercisus, quatenus est actio vitalis, membra spiritalia esse affecta, certò significet; sin verò pulsui intercisio addatur difficilis respiratio, certissimam habebimus cognitionem tunc magnam arteriam affligi, ut obrigit Antipatro medico magnæ arteriæ angustia correpto, quippe, & pulsam intercisum & difficilem respirationem habebat. A situ cognoscere quoque poterimus affectos locos: veluti si durities in dextro hypocondrio esset, quæ lunæ bicornis specimen & exemplar emularetur, tunc iecur tumore affici esset dicendum. Sin verò hypocondrij durities in longum esset exposita, tunc non in hepate, sed in musculis rectis affectio collocaretur. Ecce quod à situ tumoris inferre valemus affectum locum, & deinceps internum, & reconditum affectum expeditius consequimur. Ad eundem modum, ut in eadem exemplorum luce insistamus, de Empiæmate verba facientes, dicemus, locum affectum nunc esse partem pectoris dextram, nunc sinistram, quando mirabili illo Avicennæ experimento observabimus in qua parte collectum pus delitescat, quod fiet si linteum madore suffusum superponatur pectori. Indeque post dimidiæ horæ tractum videamus linteæ partem aliquam ocius exsiccari, tunc si dextra citius madore exuitur, in parte illa dicemus pus esse collectum; causa verò quod exsiccetur, & promptius humor linteæ in auram abeat, est calor mordax à pure prodiens: ecce quod præter excrementa, & actiones læsas, situs valde conferre potest ad locum affectum cognoscendum: ad sunt tamen præterea propria accidentia, & dolorum proprietates. Hinc diximus flauitiem, ut in arquato, significare obstructionem, vel angustiam quatenus canales, & ductus ferentes bilem ad cistim felleam, sunt occlusi. Similiter per propria accidentia cognoscimus vesicam calculo opprimi, veluti dum scalpunt pudenda: nihilominus nisi hanc proprietatem alia signorum syndrome castigemus, sicuti per situm, per actionem aliquam læsam, hæc non prædicabitur per se: dicendum igitur præter pudendorum pruritum in calculo vesicæ, gravitatem quandam esse circa pubem; ecce quod situs adiunctus illi proprietati ostendit magis vesicam esse læsam, attamen hæcenus non consequimur infallibilem affecti loci cognitionem, quoniam obtingere posset gravitatem circa pubem à mola, à pudendorum scalptu, & ab aliis causis prodire, quare ad rectam syndromen faciendam meritò pro cal-

culosis iis cognoscendis, adiungimus mixtionem modo esse deprauatam à perpetuo vrinæ ardore, modo esse ablatam, dum patientes isti ex tempore impropria suppressione illaqueantur: ecce quomodo variè in cognoscendis occultis locis affectis distrahenda est animi acies, & per plures fontes sit incedendum, qui tanta pollent virtute docendi affectus, ac signa essent propria, & conuertibilia: postremo proprietates dolorum cum primis valent, nam pulsatiuus dolor arteriæ, pungitiuus membranam, vt in pleuritide discussum est, sola hac doloris proprietate distingui inflammationem hepatis à vomica. Similiter dolor conuellens tendines, & neruos esse affectos significat: contundens dolor, & profundus ossium membranam, quam periostium vocant: latus dolor, siue laceratiuus carnem affici significat: grauis dolor significat viscus aliquod quod sit sensus hebetioris, vt sunt renes, hepatis, pulmo, mesenterium; hæc igitur erunt illa signa, quæ tantam efficaciam in cognoscendis locis affectis habent, vt aliquando vnicum ex iis signis in affectu partis suspicionem nos adducere possit, & tanto magis omnia simul vnita: vt inde cognitis locis affectis in cognitione affectus delitescantis perueniamus, vt ab initio inquirendum proposuimus.

*De sexto fonte signorum communium à iuuantibus, & lædentibus colligendo.*

Quinque ergo animaduersis fontibus, qui ad effectus penitissimi fastigium nos ducunt: sequitur sextus fons, dum per iuuantia, & lædencia incedimus. Cæterum, vt alibi diximus, ad internam rem cognoscendam quinque tantum fontes methodus nostra continet, & non plures, vt contineatur hic sextus fons in quinque antedictis: quoniam illa tantum antecedentia, & consequentia sunt cognitioni conferentia, vel quæ res producant, vel quæ res ipsas consequuntur: veritas enim est æquatio rei ad intellectum, & res sicut se habent ad esse, ita ad cognosci. Quæ constituunt morbum quemuis sunt causæ extrinsecæ, dispositiones patientis, & humores interni. Quæ consequuntur, & à re prodeunt, sunt symptomata, suntque loci affecti: quare iuuantia, & lædencia sunt quid extrinsecum: attamen pro illis, qui non sunt vel diligentissima scientia exculti, & qui a methodum sectam colunt, cum primis conferre poterunt; eritque perinde, ac lydius calculus in probi auri experimento, quare erit abundans rei probatio, & confirmatio: verbi gratia, vt omnia exemplorum claritudine emineant, atque splendescant, vt nullomodo fluctuet, & pendeat animus; proponamus casum. Erit aliquis lassitudine conflictatus: vis scire quænam sint ex illis tribus ideis, phlegmonodes videlicet, tensiua, vel vlcerosa: tunc si confugies ad iuuantia, & lædencia, & videbis ieiunium conferre, inferes lassitudinem esse tensiuam, non vlcerosam, vel si videbis ieiunium aduersari, ergo (dices) esse vlcerosam; ex Galeno valet hæc consequentia secundo de ratione vict. 33. nocet huic ieiunium, ergo bilis peccat. Sed adeste animis, quod hæc iuuantia, & lædencia pertinent ad secundum fontem, qui est de dispositione patientis, quod iste patientis forsitan talem sit sortitus naturam, vt à ieiunio lædatur, vel pertinet, & magis propriè ad tertium fontem, vbi de causis efficientibus morbo-



morborum agitur; nam bilis ubi alicui corpori lassitudinem, vel alium morbum infert, tunc nimia inedia est fugienda: & contrarium obseruatur in pituita, quæ tenuissimam tantum parere poterit lassitudinem. Quocirca ex animo expendere oportet quinque illos primos fontes, quoniam omnia signa ad illos bellissimè reduci possunt: tale quippiam in lassitudine tenuissima, si videamus cibi paucitate sitim tolli; & alimenta sicca nullam inferre sitim; tunc non cognoscimus lassitudinem propterea esse tenuissimam, sed quia cognoscimus efficientem, quia cognoscimus esse pituitam, vel bilem: est Galeni præceptum 6. de morb. vulg. 3. text. 28. biliosos succos cibi paucitate sitim intendere, & lassitudinem: pituitosos contrarium; ut hæc sint attributa causæ efficientis, bilis videlicet, & pituitæ; ut percurrere per iuuantia, & lædantia non sit per alios fontes, quam per quinque propositos versari: similiter videbimus acetum prodesse in calida intemperie, tunc propterea confert; quia illius dyscrasie causa erit bilis, quæ est causa efficiens intemperiei; Vnde ex Galeno 3. de ratione vict. 38. quibus amara bilis, exsuperat acetum prodest, ab ipso enim dissoluitur, & degenerat in pituitam: valebit ergo inferre, iuuat acetum, ergo bilis, tunc enim bilis præbet fomentum intemperiei calidæ. Possem plura alia exempla afferre, quod fons per iuuantia, & lædantia sit per quinque propositos dispersus, sed in re manifesta non est ulterius eundum, recipiatur igitur fons iste sextus, ac si esset lydius lapis, quo fieret breue, & immediatum experimentum pro cognoscendis occultis affectibus, veluti faciunt aurifices, qui habent ingenia cognoscendi aurum igne, dum illico vero, & sine labore, & igne volunt experiri, adeunt calculum, & breuiter experiuntur.

---

*Quomodo cognoscatur veterinus affectus per syndromen  
signorum à sex fontibus collectam.*

CAPVT XII.

**P**RÆSTAT in præsentia Methodum iam traditam experiri, numquid in affectibus præter naturam inquirendis illud emolumentum afferat, quod superius sumus polliciti: Age in examen vterumque affectum conferamus. Sit aliquis igitur coinquinatus lethargo; visceris scire (si hæsit) affectum esse lethargum? ad fontes confugas, iam nosti, lethargum esse inflammationem cerebri pituitosam, dicas ergo, quo ad primum fontem, ubi collocatæ sunt extrinsecæ non naturales causæ, ægrum non potuisse pituitæ copiam colligere, nisi in rebus illis non naturalibus deliquisset, & nimium prolixius poculentis, & esculentis pituitosis forsitan indulxisset; pituitæ enim magnus acruus non colligitur sine aliquo errore in causis non naturalibus pituitam colligentibus, & in corpore, nisi esset collecta pituita nullo modo in lethargum caderet.

Expendas deinde secundum fontem, ubi dispositiones patientis

sunt propositæ, quæ vel sunt antecedentes, veluti esse ortum à similibus parentibus pituitosis, esse senem, esse obæsum: vel ex aliis signis cognoscas (de quibus in 6. libr. cap. de pituita) corpus esse multo phlegmate circumfusum; vel sunt consequentes dispositiones, sicuti quando esset intermissa pituitæ euacuatio per vomitum, per nares, per urinam, per alium, vel per alias partes, vel aliqua tantum ex iis dispositionibus contingeret, quæ ostenderet pituitosum sanguinem, sine quo est impossibile veretno, siue lethargo affectu consistari: quare si coniunges primum fontem de causis extrinsecis cum hoc secundo de dispositionibus patientis, suaderi incipies affectum esse pituitosum, quia vel maximè possunt errores externi, vniti cum dispositionibus, indicare affectum. Ostendit Galen. primo ad Glauconem, neminem incidere in acutissimum morbum ob errores in procatarticis tantum, nisi antea corpus esset dispositum ad illum affectum, & Arist. 1. phy. non vult formam educi, nisi è subiecto disposito, & simul priuato cum necessaria ad eptionem aduenientis formæ.

Sequitur Tertius fons, quod præter dispositiones corporis, conferentes ad pituitam colligendam, debeat esse in sanguine pituitosi succi dominium, quod perbellè cognoscas ex methodo tradita in 5. & 6. libris: quoniam lethargus non potest fieri sine pituitæ dominio.

Accedit deinde quartus fons, qui est de symptomatibus, quæ à posteriori declarant, an quis sit obsessus lethargo, & quinque afferuntur, quæ solæ ferme vim habent docendi lethargi præsentiam, & existentiam.

Primum enim symptoma erit memoria diminuta, & deficiens.

Secundum erit somnus, sed minus profundus quàm in Caro: in caro pituita non putrescit, neque irritat, vt in lethargo. Hinc est quod profundior est somnus, & memoria magis deficiens in caro, quàm in lethargo. Hinc sequitur.

Tertium signum, quod in lethargo interrogati, aliquando respondent, in caro nequaquam.

Quartum signum cognoscitur lethargus ex anhelitu tardo, quia facultas motrix est sopita. Hinc quoque est, quod ob pituitæ putredinem addatur.

Quintum signum, quod pulsus sit magnus, donec perseuerat irritatio pituitæ putrescentis, quem non obseruamus in comate, est quoque tardus ob distantiam cerebri à corde, & ob pituitæ lentorem; ecce quàm bellè hæc posteriora signa lethargum circumscribunt. Verumtamen quando deessent causæ extrinsecæ, quæ non generassent pituitosos humores, & non esset subiectum ad hoc dispositum, parum tuta & constantia essent illa signa consequentia, quæ forsitan possent aliqua occasione suscitari, & tractu vnus diei euanescere: quemadmodum dum ob insignem errorem in procatarticis occasionibus nascitur in corpore non disposito ad truciorem morbum ephemera, vel aliquod aliud symptoma duorum, vel trium dierum, vt placuit Galeno, in corpore non disposito ad labem, & statim cessant omnia mala signa,



ut sit necessarius omnium fontium concursus; quia in re ipsa constituenda, antecedentia necessario præcellunt, & in re constituta consequentia sequuntur. Demum quo ad quintum fontem, qui est de locis affectis, in lethargo locus affectus est cerebri substantia, non membrana, sicuti docet Gal. 4. de caus. puls. & alibi: cognoscitur enim esse cerebrum, locum affectum à propriis accidentibus, & ab actione læsa, actio læsa, qui obtusus sensus est, cum cerebrum careat sensatione: membranæ vero acutissima præditæ sint. Cætera accidentia, & symptomata sunt propria. Ex iis igitur quinque fontibus in exemplum lethargum expendentes, cognoscemus methodi nostræ veritatem, atque præstantiam.

---

*Quomodo cum nostra syndrome cognoscatur Empyema.*

C A P. XIIII.

**C**Ognoscimus aliquem esse empyemate affectum ex antecedentibus, & consequentibus; & ne longius iusto euehar, strictim quæ ad summam methodi nostræ sunt conferentia, proponamus. Ex procatartictis, si aliquis nimis comessationibus, & sympoliis se tradidisset, vel se ventis australibus exposuisset, vel veneris stimulis esset incitatus, & libidinis blanditiis fuisset accersitus, promptèque in maximam viscerum debilitatem incidisset, parientis huius viscera, ut ventriculus, caput, vel pectus, viribus fracta, tali pacto redderentur disposita, ut in empyema facili negotio incurrere possent.

Ex secundo fonte colligimus, caput reddi destilationi obnoxium, & tali pacto dispositum, ut peregrinos malos humores missos à subiectis visceribus omnibus reciperet, & inde pectus aptissimum redderetur ad recipiendam ex capite pulsa recrementa, unde tussi inciperet angere, & ad empyema disponi, vel malas viscerum dispositiones reciperet ab exordiis naturæ, vel quia aliqua fuerit intermissa euacuatio excrementorum.

Ex tertio fonte, ex causa efficiente nimirum, pariens esset talis, ut pituitosis scateret succis.

Quartus demum se offert fons, in quo hæc consequentia symptomata collacantur, ut

Primum sit, sensum gravitatis in profundo thoracis perferire, quod fiet ob copiam confluxi humoris.

Secundum sit, tussis in primis sicca, & paulo post purulenta.

Tertium sit, fluctuatio ob pus collectum, & in pectore reterentum.

Quartum, difficultas respirationis cum fæore ob pus collectum in pectore.

Quintum, maciem hecticam habeat, quatenus ob vapores puris obrepentes cor, narium robur in ruinam cadat. Ex iis consequentibus symptomatibus certam cognitionem habemus, sed certiorum comparabimus, si cum cæteris fontibus omnia ista conferemus.

Et postremò quintus fons esset, quod cognosceretur locus affectus experimento Auicennæ, superposito nimirum linceo made facto pectori, quia pars, quæ citius exsiccabitur, erit affecta; cum pus suo calore peruadens exsiccet extrinsecum linteum, qui locus affectus cognoscetur ex situ. Nunquid per uisus omnibus uis, absolutam omnibus numeris cognitionem consequeris, patientem illum empyemate conflictari?

*Quomodo per syndromen nostram cognosci possit Peripneumonia.*

C A P. XIV.

**I**Nflammatiō hæc pulmonis est à sanguine potius pituitoso, ad differentiam pleuritidis, quæ fit à sanguine bilioso: ergo externæ causæ fuerunt illæ, quæ sanguinem pituitosum colligere tecerunt; is peripneumonia correptus antequam corruat in hoc vitium raptus, victus forsitan fuit, edulis crassioris & tenacioris succi, unde impressum fuerit aliquod vestigium huius morbi; & inde sit hoc modo dispositus pulmo: quoniam sine hac dispositione, ut dicit Galenus, nec gladius scinderet, nec ignis combureret, quæ dispositiones, vel sunt antecedentes veluti si esset ortus à parentibus similem affectum patientibus; vel consequentes, veluti si aliqua intermissa esset euacuatio sanguinis pituitosi. Sequitur tertius fons in quo collocantur peccantes humores, dicimus quod in corpore dominetur sanguis pituitosus, quem cognoscere poterimus ex signis traditis in quinto, & texto libris, & demum consequentia omnia symptomata ob oculos erunt collocanda. Primū symptoma erit difficilior respiratio, quàm sit in pleuritide; quia maior est necessitas euentandi calorem, cum pulmo sit ætius, qui occupat omnes partes thoracis. Secundum, erit dolor grauatiùs occupans omnes partes thoracis, tum quia pulmo omnes thoracis partes implet, tum quia pulmo est obscurissimo sensu præditus. Tertium, tussis est magis molesta, quàm in pleuritide, quia pulmo in peripneumonia afficitur per se, in pleuritide per accidens, vel per consensum. Quartum est, facies rubicunda, tum ob euaporationem impetentem caput, cum totus pulmo inflammatione pituitosa sit obuallatus, tum quia tunica pulmonis per tracheam perreptat ad os, ut maximus quoque ratione illius tunicæ sit consensus inter pulmonem, & faciem: tum quia arteriæ surculus vestiens faciem oritur immediatè à magno arteriæ trunco, qui valde afficitur in peripneumonia.

*Quomodo cognoscatur phthisis nostra syndrome.*

C A P. XV.

**A**lectamenta non naturalia exsiccantia, quæ prima imprimant vestigia, præcedere debent, sint obsonia, aër, vel coitus, sint in turbulenta animi passio excursus, vel exandescencia; præterea dispositum



positum corpus, vt omnes sciunt, ad patiēdam tantam cladem, & tam truce[m], & scelestum affectum, requiritur: dispositum est, si sunt alati, quos Græci vocant *αίμας*, atque vbi externæ causæ, & dispositiones viscerum ad hunc sæuissimum affectum conspirarent, sine humore exedente pulmonem, non fieret Phthisis. Debet igitur esse humor acris, vt pituita falsa, vel commixta cum bile vel cum melancholia: de quibus humoribus in propriis libris, quomodo quilibet humor sit præcognoscendus, egimus. Postremo à quarto fonte symptomata scaturiunt. Et Primum symptoma est tussis vehementissima, quia ob vlcus vel maximè irritatur pulmo. Secundum est pus sine signis empyematis. Tertium signum affectus est sine dolore, cum pulmo non sit tanto sensu præditus, vt manifesti sentiantur dolores. Quartum sit hectica febris. Quintum sunt animi deliquia, & varia consequentia ab aliis symptomatibus pendentia. Sextum signum à locis affectis desumitur, cognosciturque locus affectus dum per tussim eiicitur pulmonis parua particula. Hæc morbum depositum, & conelamatum portendunt, quem soluere nec Gorgonei fontes defluuia sufficerent, vel Chironia inanus; cum vsque adeo sæuiat in robur cordis collectum pus, vt propterea medicus confertim videat in his ægrotantibus virtutem collabi; vt omnia intentent mortem præsentem, & excidium certissimum minentur, & certo certior è corporis vinculis patiense exilire debeat.

---

*Quomodo ex nostra syndrome dignoscatur Tumor  
ventriculi à Flatu.*

CAPVT XVI

**S**I de extrinsecis loquimur, in primis præcesserunt ex necessitate causæ gignentes flatus. Si de secundo fonte, id est de dispositione subiecti loquimur, requiritur vt antecellat hunc morbum ventriculus calore suo depauperatus, in quo chylus ingestus non arctè complexus, & malè dedolatus, in flatus, & clydones abierit, vel tali pacto à procatasticis dispositus, vel ex capite visceri humores pulsi in ventrem procumbentes ad flatus disponerēt stomachum, vel ob alias causas talis facta sit ventriculi dispositio: sine his obtensionem à flatu ortam ventriculus non ingrauescet. Sequitur demum tertius fons de cognoscendis flatibus per propria signa, quæ traduntur in proprio capite sexti libri. Demum signa à symptomatibus colliguntur. Primum symptoma tumoris ventriculi à flatu orti, est in regione ventriculi tensionem habere. Secundum non sentire sensum grauitatis. Tertium ventrem esse actu frigidum, & patientem sentire in ventre frigiditatem, quia flatus sua natura frigidi sunt. A quinto fonte à locis affectis nimirum, vbi sit humor, colligitur tali pacto; si dum cibis ingeritur crescit dolor, tumor est in parte interna, & ratio est, quia per

fibras rectas cibus attrahitur, si vero post quinque vel sex horas, quando videlicet cibus stomachum relinquit, & restagnat in pylorum, & mesenterium, dolor crescit, tunc in tunica externa erit tumor; quia fibræ transuersæ, quæ expellunt, sunt in tunica externa, & eò magis; quia dum spiramenta mesenterij sunt referta chylo; tunc mesenterium imbutum suauis cibo, comprimit externam partem ventriculi quæ si est tumor, ibi est dolor, si non est dolor, non est tumor. A Sexto fonte si discutientia flatus iuuant; certo certior eris, tumorem ventriculi à flatulentis causis ortum esse: videas ergo quam necessario conferant nostri sex fontes in cognoscendis internis affectibus præter naturam.

*Quomodo eadem Methodo per syndromen communium signorum cognoscatur vlcus ventriculi.*

## CAPVT XVII.

**E**Xternæ causæ essent veluti dum aliquis vteretur cibus acerrimis; sicuti dum se nimium obrueret alliis, capis: vel tale medicamentum hauriret, euacuandi causa, quod corroderet, quale est euphorbium: vel cantharides pro mictione ablata essent ei exporrectæ. Ex secundo fonte, quod sit corpus dispositum, vt plagam faciliter recipiat; adsunt enim nonnulli habitus, qui tanta pollent resistentia, vt cantharides tunicas ventriculi non exederent, quoniam tunica obduere iam callum, vt strutij Cameli ventrem emularentur; corpus quoque dispositum habent, vt Hepar virosos, & exedentes humores gignat; quod germē tam effrenem, & trucem qualitatem nactum, ventriculum exinde corroderet: vel demum à capite falsus catharrus missus in ventrem id efficiat, vel ab aliquo alio foco in viscere interno scintillante hoc virosum efficiens, proluens parietes ventriculi sauciati, & vlcerosam plagam iniiciat, & sine iis dispositionibus nil fit in corpore hoc nostro: Sequitur tertius fons de acii humore, quem cognoscemus in capite de biliosis succis, & melancholicis, quæ capira adire poteris. Sequitur quartus fons de signis consequentibus. Primum signum dum aliquid cibi descendit in ventriculum, & fit dolor pungitiuus, nisi forte haberet anodynam virtutem. Secundum symptoma sit magna inappetentia. Tertium est Sitis, quia saniei spiritus exsiccat stomachum. Quartum sunt ructus fœtidi ob pus. Quintum est sanies, quæ per vomitum eiicitur. Ex quinto fonte vbi sit vlcus cognoscitur, vt diximus de tumore ventriculi: nam immixtus cibus in ventriculum si illico pungit, est in tunica interna, si pungit post 5. vel 6. horas, quando nimirum chylus erit egressus ventriculo, in tunica externa vlcus erit: si vero vlcus esset in œlophago, vel in gula, dolor erit in posteriori parte inter spatulas videlicet, & à colo vsque ad pectoris initium; & dolor intenderetur tempore deglutionis. Si vero dolor erit circa vmbilicum, & infra, vlcus erit in intestinis, & non erit dolor dum cibus



cibus missus erit in ventrem, vel dum coquitur. Quare ex lædentibus quæ in sexto sunt collocata fonte cognoscere poterimus locū affectū.

*Quomodo cognoscatur nostra syndrome vlcus Renum.*

CAPVT XVIII.

**C**V M vlcus à corrodentibus humoribus fiat, & humores acres exordium sumant à Iecore, & à Renibus, & ab aliis; ideo caloris feracissima debent esse viscera, vel sic à parentibus orta, vel ob intermissam euacuationem bilioli succi, vel aliqua occasione externa sic disposita, vel ab aduentitio temperamento introducto à consuetudine sex rerum non naturalium, quæ Viscera, & omnia facultatum instrumenta alterare solet, vt inde in tantum vitium essent prolapsi Renes, vt vlcere violarentur. A primo fonte ergo tanquam à primis occasionibus initium capiunt Renum vlcera, vel ob calidissimos cibos, vel ob libidinem ardore sæuientem, atque furentem, vel demum ob animi passiones, dum quis ira percitus fuit, & exandescit extra rationis limites, vel dum mætores multo temporis spacio antecellant, vel qui præmant altum corde dolorem, & summam iacent pectore commotionem, quæ omnia præcætarctica adeo viscera interna calfaciunt, vt in corrodentem humorem gignant: Et à secundo fonte colligimus corpus esse dispositum ab externis causis enarratis, vel tale esse ortum à parentibus, vt non sit mirum si tanti caloris vestigia imprimantur in viscera, & in omnes humores, quibus si renes vtrinque obducti atque obuallati redduntur, vellicantur, & mox exeduntur, & in vlcus cedere coguntur. Requiritur ergo contemplatio circa tertium fontem, quinam sint isti humores corrodentes, cognoscendi in capite de bile, & melancholia. Et postremo signa consequentia colliguntur: Primum symptoma; pus mingitur per plures dies: quoniam per paucos dies posset esse abscessus sine renum exulceratione, de quo nō loquimur. Secundum est dolor circa lumbos. Tertium cum dolore excernuntur arenulæ. Quartum, pus non admodum foetet; quia ibi est maior calor, vnde pus melius coquitur, quam in vesica, & per consequens minor foetor. Quintum, pus est maximè permixtum cum lorio ob viarum distantiam. A quinto fonte, qui est de locis affectis: si qua renum portio excernitur per vrinam, quamuis raro id fiat, certissimum signum est, & solum ad iudicandum sufficit, renes esse vlcere affectos. An vero vlcus sit in parte profunda renum, vel extima, & in superficie, cognoscemus hoc modo, si erit in profunda renum parte pus erit copiosum, & permixtum cum sanguine; Si verò erit in superficie renum, pus erit paucum & sine sanguine.

*Quomodo cognoscatur vlcus iecoris.*

CAPVT XIX.

**V**Lcus iecoris, vel à gallica lue, vel à succis acribus prodit, vel succedit inflammationi, quæ ad suppurationem sit perducta. si igitur

nostra methodo expendemus hunc casum, erunt externæ, & procatarticiæ causæ depromendæ à primo fonte, quæ variæ esse possunt: vel infectio tabi gallici: vel causæ non naturales, quæ ingentissimum focum, & alta in iecur ardoris vestigia immittant, sicuti sunt cæpæ, & meracissima vina: vel quæ inflammationi præbent fomentum, sicuti sunt, quæ amplè valetudinarios nutriunt: ex iis antecedentibus extrinsecis conicimus, addi aliquid ad generationem vlcus iecinoris. Corpus dispositum quoque conspirat: adsunt enim plures gallico spiritu circumuenti, & qui sunt hepate eodem tabo illaqueato, atramen parenchyma ad vlcus recipiendum non est dispositum, tum quia à fortissimis parentibus sit deductus patiens, tum quia temperamentum minus infestetur humoribus exedentibus, & demum omnia viscera alioquin robores donata ad resistendum sint aptissima, quamuis diutissime gallicum morbum patiens tulerit; corpus ergo, vel ortum à debilibus parentibus, vel biliosum, & parum resistens erit ad vlcus proportionatum subiectum. Quo ad tertium fontem de humoribus, iam suo loco diximus. Ad quartum fontem, vbi consequentia signa continentur, eo adire expedit: sit ergo primum symptoma desumendum ab exeunte cruento, & sanioso per vrinam, vel per aluum. Secundum erit grauitas sensus in regione Hepatis. Tertium erunt puncturæ ratione membranæ, in regione Hepatis, quæ distinguunt vlcus iecoris ab aliis affectibus, quoniam cruenta sanies posset ostendere dysenteriam, vt hinc decipiantur plures credentes vlcus Hepatis esse dysenteriam. Quo ad locum affectum, si sanies cum cæteris signis egreditur per lotium est in gibba, si per aluum; in sima; grauitas enim sensus est illud signum, quod determinat esse in Hepate.

---

*Quomodo cognoscatur per syndromen calculus vesicæ.*

C A P. XX.

**V**OLENS exempla affectuum cognitu difficilia tradere; videret mihi quasi ab officio desciscere, si desererem modum cognoscendi calculos tam vesicæ quam renum; præcesserunt ergo antiquam fiat in vesica lapis, externi errores: edulia nimirum crassa, & peruiacissima coctionis, & vini polypheri seu generosi haustus, at nil sit nisi dispositum esset corpus ad exitialem hunc casum; non enim sat est crassis esse onustos humoribus, vel calore renum præmi, nisi dispositio esset in partibus dissimilaribus, vt videlicet meatus essent laxi, & debito maiores, vt habet Galen. de qua re alibi instituta est oratio; quot sunt quæso homines infarctu coinquinati crassorum humorum insidentium in imis corporis partibus, & qui renes calidissimos sortiti sint; atramen nullus sequatur lapillus, & adsint, qui in renibus & Hepate ob extremam senectam habeant repres-

sum



sum, & ferè extinctum calorem, qui gignere possunt lapidem. requiritur ergo dispositio, quæ apud me est laxitas, & apertio meatuum, quam cognoscimus in urinis dum cito, & multa, & crassa; vel sæpissime excernuntur, quoniam humores renes, & vesicam sollicitant ob hanc apertionem, & laxitatem: sed ad consequentia descendamus. Primum signum est grauitas, circa pubem, vt in mola dum præcipuè per loca inæqualia scandunt, vt per scalas, & montes Secundum scalpunt pudenda vel sæpissime. Tertium mictio arenularum. Quartum ardor lotij perpetuus; quia semper mingunt cum dolore. Quintum cum candela per sentitur quod vnicè affirmat. Sextum vrinæ repente supprimitur, & liberantur suppressione si iacebunt supini, id verò contingit quia lapis relinquit meatum cervicis, & deinde suppressione liberantur.

---

*Primum exemplum de origine errorum Empiricorum, dum causam generationis morborum referunt externis erroribus, quando prauia dispositioni esset referenda.*

C A P V T XXI.

**T**RADITA methodo, eaque exemplis illustrata, par est in præsentia errores illorum proponere, qui in perquirendis affectuum ideis, huic propositæ methodo & veris Medicinæ fundamentis aduersantur; & in primis valde conuenit errorem illorum Empiricorum, vel circularum reuocare, qui in tractandis ægrotantium morbis omnium morborum generationem acceptam solent referre solis causis externis, & ab ipsis solis in cognoscendis morbis indicium sumunt, & indicationes curatiuas colligunt, nullo facto præcedentis dispositionis viscerum examine, quod mirum in modum Galeno, Aristoteli, & methodo nostræ reluctatur: quoniam præter procatacticas causas in generatione cuiuslibet affectus, requiritur dispositio subiecti, vnde omnia, quæ fiunt, & secundum naturam, & præter naturam suum trahunt exordium. Altius igitur de viscerum dispositione est repetendum, quoniam, vt aliquid fiat, nisi subiecta sint disposita, & simul priuata adueniente forma, cum necessaria, & immediata adeptione nouæ formæ, nullum agens, quacunque virtute polleat exinde terminato subiecto, potens erit alterare, transmutare, vel loco mouere, & qui aliter sentiunt abhorrent ab Aristotelis phylologia, & ab optima Galen. doctrina, cum non vno loco memoriæ tradat Galenus, antecedentem causam neutiquam morbum gignere, nisi sub sit præcedens dispositio: Adeamus ergo Galenum primo ad Glauconem capite secundo: sæpius quidā ab antecedente causa, vt à nimia vini potatione, aut ab adustione solis, aut ab ira, & à cæteris incidūt in graues morbos, arbitrati multi totū morbū

consistere in antecedente causa, neque aliam subesse dispositionem, & aberrant: hoc est quod nonnulli videntur desistere in perquirenda morborum essentia, dum vident aliquem in morbum labi ob nimiam vini potationem, vel ob æstum solis, vel ob alias causas, autumant principia, & origines totius lapsus solas esse externas causas, illas in medium ferunt, illas detestantur, & totum ipsis acceptum referendum putant: nihilominus toto notus in orbe Galenus, occasiones has disponentes viscera ad labem, noluit vocare causas, sed occasiones, cum affectus præter naturam neque immediatè, neque necessariò trahant ortum ab iis, neque istæ præbeant fomentum principale dum sit, vel factus est morbus, cum nullam teneant permanentiam; sed fluant, & refluant: quod enim occasiones, & non cause debeant vocari, seriem verborum Galeni audiamus, tertio de morb. vulg. com. primo text. 15. quæ hoc ornatu ædita sunt. quæ tamen ad labem disponunt viscera, non vocari causas, sed occasiones, ut græcè vocarentur ab Hippocrate *πρωταίαι*, quia sensim, & sensum magis disponunt viscera, & talia imprimunt vestigia, & dispositiones in ipsa, ut in morbos tandè erumpant, non propter occasiones externas, sed ob internorum viscerum dispositionem præcedentem, & ob morbosum apparatus, ut tota vis procatarticarum haud potis sit vnicum moliri morbum (abiecta viscerum dispositione) præter ephemeram, vel symptoma aliud breuissimum, ut placuit Gale. primo de morb. vulg. com. 3. text. 19. vbi de Sileno habet hæc: quando corpus non est ad morbum paratum, propter errores incidit in diariam, sed in Sileno erat præparatio morbosa: Quare corpore non præparato, vbi summo æstu confisterentur ægroti, vbi poculis, præpotente maluatico ventriculum infarcirent, & omnia hypocaumara, quantitate, & qualitate peccantia essent ingesta, tunc non prodiret affectus ullus præter naturam: quoniam quodlibet non fit ex quolibet, sed ex suo determinato: incidit enim in hanc sententiam Galenus, ut occasiones externæ dumtaxat diariam, vel tale quippiam breue symptoma gignerent, diariam, quoniam spiritus iugiter sint dispositi, cum sint perenni motu moti, & alterabiles, aptissimi, ut afficiantur: Et hinc est, quod labes spirituum ex templo cessat, cum quæ cito fiant, cito quoque (libentissimis omnibus philosophis) desinant.

Redeamus ergo ad Silenum, cuius historiam Galen. adeo obseruat: dicit, quod ob potationes, & exercitium insigne, incidit in grauissimum morbum, quia erant præparatæ viscerum dispositiones, quæ sunt apparatus illi morbosus, quippe sunt origines, & radices generationis morborum, in quibus fundatur principium ex quo, vel terminus à quo, & priuatio; quæ licet apud Aristotelem sit principium per accidens respectu rei genitæ, attamen respectu generationis est per se. Isti inquam apparatus (liceat mihi digredi) diuersi sunt in similibus, & dissimilibus partibus: Verbi causa, Silenus in malignam febrem prolabitur, cum sua natura conspirante, tum ob multas procatarticas causas, quibus comparauerat feruorem insignem in Hepate:

calor

Calor à quibus  
causis ge-  
neratur.



calor vero insignis fix ex Galeno libro de causis morb. vel à motu, vel ab obstructione, vel ab alimentis, vel ab adhæsu, vel tandem à putredine; quorum semina, nisi omnium, saltem aliquorum in corporis Sileni latebris delitescabant: obiter hæc de causis caloris, vt ostenderem aliundè pendere immediatam causam generationis morborum, ex apparatu videlicet morbofo, qui varius, atque varius est non solum in frigidis, siccis, calidis, atque humidis temperaturis: verum etiam in qualibet mala conformatione, nec tamen apparatus omnes, sed tantum qui sunt immediati, in culpam transeunt generationis morborum: quemadmodum non sanguis est fœtus priuatio immediata, & principium per se generationis, & proximum; sed sperma tali pacto dispositum, vt transmutetur, & transmutatum in instanti ex necessitate cadat in sequentem formam. Hæc Aristotelis doctrinam redolent illam ita profundè æditam primo physicorum libro. Despiciant ergo nostrates procatarcticarum origines, quæ nullo modo per se tantorum malorum subeunt rationem, & causam: satius expendant morborum apparatusum, de quo si dabitur ortum, libellum de quolibet apparatu morbofo in conspectum hominum post hac imprimendum duxi: Vbi quomodo arceantur morbi omnium generum præcognoscemus, vt quisque spectatis signis, futuram colluuiem morbosam anteuertere, & præuenire possit. Ad rem ergo vnde exorsi fuimus, insistimus in hoc, quod externæ causæ, quamuis vehementes, & sæuæ sint, non lædant sua natura constitutionem: & ratio bellissimè à Galeno refertur libro de causis morb. capite 2. dum dicit, Cur non semper ob quamlibet harum causarum externarum, & procatarcticarum, vt vini portione, & similibus accendatur febris; quoniam efficientis causæ quantitas par non existit, & quæ constituta est ab eadem causa in corpore dispositio magnam in eo quod plus, & minus varietatem admittit, ideo differunt animalia in hoc, vt facilius, vel agrè recedant à statu naturali. Eadem vini potatione exardet Socrates, qua tamen non incenditur Plato, quia aliter quam Plato est Socrates dispositus, magis, & minus recedere à statu naturali non trahit iugiter principium ab externis efficientibus: poculentis enim calidis æstuat Socrates non Plato; quoniam apparatus morbofus calidus altius agit radices, quam morbus ab externis occasionibus prodiens: Vos scitis enim maiorem angustiam pororum, & naturalem crassitiem, vel copiam humorum, quæ obstruunt esse in causa, ne calor perspiret, & ignescat exinde totum corpus: quo circa secundum magis, & minus dissidentes inter se internæ causæ, quæ continentur, vt similes, & dissimiles, & contenta vt humores, propterea maximam nâcisci varietatem. Sit per hypotheseum quod in Platone apparatus, & dispositiones ad febrem sint, vt quatuor, & indulgeat maluatico prolixius, & non febricitet; sit ex alia parte obstructio, vel alter apparatus, vel dispositio in Socrate, vt lex, & eodem pacto indulxerit, ac Plato; tunc contingere potest, vt Socrates in febrem corruat, & tandem in exitium, nulla in Platone relicta noxa, licet eundem commiserit errorem. En, quod, vt agens agat in passum, exposcit subie-

*Contrarium  
non agere in  
contrarium.*

- etum dispositum in quod agit, vt suam introducat ideam; agit inquam agens in subiectum, non in eius formam, quoniam contrarium non agit in contrarium: agens calidum non agit in frigidum, sed in subiectum frigidi, disponendo in tantum, donec introducat suum simile; si deinceps contingit corrumpi formam, id fit quia materia disposita relinquit illam, & noua induitur, vt agentia dirigant suam vim in materiam, non in formas; & hac ratione rerum omnium vicissitudo seruetur in hoc nostro orbe, vt probatum est ab Aristot. primo phy. text. 67. dicente, à se inuicem contraria pati impossibile esse. En ergo Aristotelis monumenta, quomodo stantis, & fixis sunt plantata radicibus; quomodo sunt summo artificio exculpta: requiri in qualibet generatione tria principia interna; materiam, priuationem, & formam, & externa agentia non agere in formas; quia contrarium non agit in contrarium; sed in subiectum determininatum priuarum proxima adueniente forma: nulla enim contingere potest generatio sine priuatione, quæ priuatio non dicit tantum earentiam, esset nimium irritum, & futile principium constituere: priuatio significat ergo subiectum aptum, & dispositum cum potentia proxima, & immediata ad suscipiendam sequentem formam, & non aliam, vt vocauerit Aristot. 2. Phy. 15. priuationem quasi formam per quandam concomitantiam, vt sit forma, quæ immediatè antecedit venturam.

*Qua ratione  
veteres phi-  
losophi de  
principiis  
seriali lo-  
quentes ab  
Aristotele  
vincantur.*

Neque alio pacto philosophari poterat diuinus philosophus, vt inueniret communissima principia, quæ essent prima, & omnibus, & quibuslibet competerent generationibus, tam substantialibus quàm accidentalibus, noluit hanc suam priuationem esse determinati subiecti, quoniam destruerentur generationes substantiæ, veluti si cum Thalete diceremus aquam esse primum principium; tunc aqua est subiectum determinatum, & formæ aduenientes enti in actu essent accidentia; Altius Aristoteles erexit spiritum, quam naturales philosophi illi veteres, altius inquam quam Thales, quam Empedocles, quàm Anaximenes, qui certa principia & in actu, ex quibus omnia penderent, & fierent, & in illa omnia abirent, & illa determinata, & actu cogitarunt quia non fieret noua substantia, sed omnes formæ essent accidentia, cum enti in actu aduenirent: vel cum Democrito laxum, & densum omnes efficere formas, vel cum Anaxagora partes omnium formarum dissociatas, & dispersas esse in chao, quod esset constituere formas omnes esse accidentia; quæ cum rationi, & Aristoteli imprimis relucet, à nostra physiologia erunt, vt falsa abdicanda. Ad rem. morbus debet introduci; terminum à quo expedit constituere, & hoc debet esse subiectum dispositum, & priuatum, & tale, vt sequentem formam immediatè respiciat, non mediatè: Nemini ex ore excidet sperma fieri ex pane, quinimo neq; ex sanguine, & spiritu, sed immediatè ex materia sanguinis, & spiritus. cū formæ non hiant, vt ex principio ex quo à formis, sed à materia, & subiecto, vt sanguinis forma sit priuatio disponēs materiā sanguinis, quæ sanguinis materia erit principium ex quo oritur semē, & sic de omnibus. Hinc Galenus subdēs



loco proximè citato, subiectum debere esse proximum, & non remotum, & vnde quaque dispositum, hoc verborum apparatus; loquitur vt proximum sit, quod promptè patiendi habet naturam, quoniam & si hæc desint, nec ignis comburere, nec gladius abscindere valet: ignis qui est ætiorum primus, & potentissimus, non agit in subiectum non dispositum, sphaera ignis non calfacit cælum, cui desunt omnes dispositiones vt calfaciat, nec gladius lapidem secare potest, eò minus animi passiones, vt ira, tristitia, succendicula hypocausta, aër canosus, & palustris, & cætera non naturalia in homines non dispositos, erunt causæ potentes, vt morbi gignantur, sicuti optime Galenus ore aperto fatetur lib. de diff. febr. cap. 4. oportet autem hoc in toto sermone memoria repetere, quod nulla causarum dictarum sine patientis aptitudine agere potest, alioquin omnes commorantes in sole æstate febricitarent, vel qui nimio motu exercentur, aut vini potu grauantur, ira vel tristitia. Nihil sane excogitare possumus, quod Galenus summa eloquentia non tradiderit literis; tradidit, vt videtis, procatarticas non operari, & ipsis non esse morbum culpam inurendam; sed dispositionibus corporis suscipiens morbos; ipsas demum esse occasiones, & non causas. Abeant ergo retrorsum nostrates circulatores cum mulieribus, dū perquirentes morborum causas tempus contemunt, quænam extiterit externa, & quod est deterius ab ipsis hantiant indicationes, veluti si quis ob maluaticum vel æstum incideret in cachexiam, inferrent plures, ergo refrigerandum, quod esset cacecticum in Hydropem pellere; ipsas ergo occasiones procatarticas nimium respiciunt, ac tota ab ipsis penderet proluuius, cum ab vno, & eodem externo errore duo affectus contrarii possint prodire, à maluatico prodit ardēs affectus, & à maluatico paralysis; idcirco altiores radices sunt libranda. Vnde affectus idea est colligenda, est morbus, est causa interna, & dispositio viscerum contemplanda, & in hos coniectos oculos habere ingruit necessitatis vsus, neutiquam solum in externas occasiones. Non inciderent sanè in hunc errorem, vbi ante oculos obijcerent omnia generationis affectus alicuius principia, quæ sunt forma morbi introducenda, subiectum dispositum, & priuatum, & causæ efficientes quæ sunt morbi iam facti exordia.

*Incidit in morbum ob maluaticipotum, ergo refrigerandum, paralogismus*

Cæterum quoniam omnes errores profundius speculantes, prodeunt ex ignorantia logica; videamus breuiter de hoc: dicunt vel supponunt externas esse causas morborum infallibiles, vel referunt externis causis originem morborum, tunc si debet esse vera hæc propositio, oportet, vt sit per se, vel saltem de omni, sed neque de omni; quare eo minus erit per se: quod non sit de omni probatur, de ratione de omni postremum istici duo sunt, vt prædicatum inhæreat semper, & omnibus subiectis contentis sub illo, experiamur ergo an causæ inhæreant semper, & in omnibus, vel conspuent in generationem affectuum præter naturam. Vini potentis ergo haustus febrem accendit in vno supposito, in altero nequaquam, licet in altero tantundem quo febre accensus vini comprehenderet venter, ergo neque semper externæ causæ

prædicantur de ægritudinibus, neque in omnibus qui ægrè fiunt ob illarum causarum occursum.

*Cur causa  
procatactica  
nō possint di-  
ci nec proxi-  
ma nec re-  
mota.*

Præterea neque procatactice possunt dici causæ remotæ, quoniam saltem præstarent perpetuo cognitione in effectus, & fieri posset argumentatio in camesures, sicuti dum probamus lapidem non respirare, quia non est animal, veluti omne quod respirat est animal, lapis non est animal, ergo non respirat, habemus saltem lapidem non respirare, sed cur, non habemus, causa vero remota est animal, & semper in respirante cadit, & in omnibus, cum omne respirans sit animal, de ratione causæ remotæ est, ut sit in adæquata, & proxima virtute, quia dicebat Averroes in causa proxima, & adæquata omnes remotas contineri, sed non è contrariis rem, non est vera hæc. omnis febris oritur semper ab externo calore, cum possit aliquando ab externo frigore suboriri, ut febris non magis supponat procatacticam calidam, quam non calidam, respirans vero supponat perpetuo animal; & non animal neutiquam, cum virtute contineatur in adæquata; quia habens pulmonem pro genere sortitur animal, quod de omni, & per se prædicatur in primo modo. Et hæc est vera ratio cur procatacticæ non sint causæ, sed occasiones. Quare vnico errore commisso optimus analyticus mille animaduertet errores, cum ex vno propemodū infiniti succrescere possent, propterea dicimus si occasiones externæ non erunt causæ proximæ, neque remotæ, ergo ubi ab illis causis quis inferret conclusionem, per medium extraneum procedet, quod adeo arguit, & refellit philosophus 2. post. 25. asserens tunc medium terminum non esse adæquatum, & primum vel quando est remotus. Secundum vel quando est pars, & non tota causa, veluti si quis ostenderet lumen de Sole cum sit etiam ignis qui faciat lumen, vel quando medium est extraneus; in quo casu non est de omni propositio, ut hæc, maluiticum causat febrem: variè ergo, & variè aberrant sumentes quoque non causam pro causa.

*Aliud exemplum de origine errorum Empiricorum declaratur, dum omnium internorum affectuum ideas appellant intemperies.*

#### C A P. XXII.

**B**easutalia, vel quemlibet ventriculi affectum; sit morbis, causa, vel symptoma, nostrates nonnulli in censum intemperierum ponere videntur, ubi scilicet sputorum proluuiem, ubi diminutam coctionem, seu deprauatam, vel impeditam, ubi corrumpi cibos conspiciunt, exemplo ægrorantem illum intemperie confictari ventriculi putant, ceu nullis affectibus coinquinari posset ventriculus, quam intemperie. Cæterum, ut aliqua methodo non modo in ventriculi affectionibus; sed in quoque viscerum incedere valeamus, ut in scopulos, & in has syrtes non incidamus, ad Galenum confugiamus: & in medium adducamus præcipuas affectiones omnium viscerum, & præcipuè ventriculi, in quam diuisionem conspicati, è vestigio colligamus,



gemus, quo morbo illaqueari cætera viscera possint.

Adeamus ergo Galenum 7. meth. cap. 12. vbi varias affectiones proponit ventriculi, quas cuilibet parti corporis applicare poterimus: dicit ergo Galenus, ventriculus afficitur, vt solidæ partes intemperie, secundo vel quando humores affixi sunt tunicis, tertio vel quando sunt in cauo, & subdit aliquando primus affectus cum secundo, & secundus cum tertio, vel omnes simul copulantur, adeste animis quo pacto stata principia medicorum corypheos proponit, quibus omnium viscerum affectiones distinguere valemus peroptima diuisionis lege obseruata. Docet igitur prius ventriculum non continenter intemperie vexari, verum sæpenumero torqueri stomachum ad humoribus affixis parietibus, modo ob recrementa in cauo morantia, & demum tribus his omnibus viscus antea conflictari posse. At nostratum Empiricorum plerique, vbi aliquis patiens prauè digerat, conuertatque in sputa chylum, alium affectum animo fingere nesciunt, quàm intemperiem, perinde ac in cauo ventris non consistant humores, quin faciant dyscrasiam in similaribus partibus. Quot sunt qui ob cibarium *anxiæ*, vel qui vino, obsoniisque se nimium obruerint, sic blanditiis rapti, sic voluptatis illecebris symposiorum pellecti, qui in manifestam ventriculum transferunt perniciem, quippe tunicis intactis, optimam naturalémque temperiem sortiantur? ne illi non intemperie præmuntur, cum vitium non sese in solidas insinuauerit partes, interstitium, temporisque interuallum requiritur. Quinimo non desunt robustissimi in ventriculum tota die infarcientes esculenta, poculentane, quæ non conficiunt, vnde fluctuationes, & clydones ex hoc non dedolato chylo orodeunt. Hos, hos aliquos, non esse correptos intemperie his oculis vidi, quando iis exhibitio medicamento ex aloe, recta illico viuendi norma instituta ventriculi proluuie liberantur, non tractu, sed momento temporis, quod non vsu veniret vbi essent intemperie correpti; cum de ratione intemperie sit, quod non cito desinat, ex Galeno in methodo iis ferè verbis intemperies neque cito fit, nec cito desinit.

Erant itaque non perpendentes an ventriculi læsio sit ob eius dyscrasiam, vel prodeat noxa ab hærentibus humoribus ventriculi tunicis, vel recrementa in cauo sint illa, quæ vrgeant: ab hinc in aliam, & altiore cognitionem deberent se efferre; quia quod contigit ventriculo, aliis quoque visceribus omnibus vsu venire posse rationi est consentaneum: verbi causa sicuti ventriculus afficitur, vel quando solidæ intemperie afficiuntur, vel dumtaxat, dum humores affixi sunt parietibus viscerum; vel demum quia in cauo viscerum excrementa degant: vt primus affectus cum secundo, & secundus cum tertio, vel omnes simul copulentur. Cur in hepatis affectionibus non explorant has differentias? non discutiunt, quia iecur præmi possit? nimis sanè ridiculum esse arbitror perpetuo credere viscera esse intemperata; omnes affectiones esse intemperies; cum sæpenumero sint malæ conformationes, vt sunt peccata in angustia, sicuti est obstructio, vel com-

pressio, vel coalescentia: vel in iecoris cauo affixi sint humores parietibus hepatis, nulla posita intemperantia in hepate: pudet me in longiorem discursum trahere orationem, cum videam non reperiri doctos viros, qui hoc abnuant, nec ut verum fatear illos alloquor; verum tyrones, & iuniores, & illos qui altissimis statisque artis principiis, & fundamentis non sunt exculti.

Quocirca quod de ventriculo, & hepate tradidimus, itidem de cerebro admonere expedit: possunt enim humores in capite adhærere similitaribus partibus, nulla adhuc intemperie oborta: possunt etiam in anfractibus colligi tanquam in cauo humores, & caput repleri: potest quinetiam esse intemperies in tunicis, & cerebri carne, quæ fomes, & origo sit cathari. Quare nostrates hi non debent in qualibet affectione cerebri, in qualibet distillatione, vel coriza asseuerare caput dyscrasia coinquinari. Sæpè accidunt tusses, destillationes, & varia symptomata circa aures, oculos, nares, nihilominus caput intemperie caret: potest quinetiam, perinde ac in ventriculo, & primus affectus cum secundo, & secundus cum tertio copulari, & omnes simul adesse; ut modò sit intemperies, & simul affixi sunt humores tunicis, & aliquando nulla sit intemperies; attamen sint affixi humores, & in cauo multi morentur, & omnes simul in complexum quendam coeant: labuntur ergo maximopere nostratum aliqui in his explorandis methodi initiis, credentes omnes affectiones corporis nostri supponere intemperiem, & dyscrasiam affectionum locorum, quippe est adeo communis empiricorum error, ut circulatores etiam, quando doctrinam ostentant suam, offerunt hanc vocem, quam putant sonoram, & scientificam, dicentes morbos esse intemperies; quoniam audiunt iugiter à paulo maioribus semper viscera esse intemperata, ut meritò ægris referant ægritudines omnes esse intemperies, vel cum intemperie; quasi omnia symptomata ex necessitate supponere debeant intemperiem, & dyscrasiam. Sed licet huiusmodi controuersie negotium sapientioribus non facecant, ut calamum vltius non esset in roboranda hac mea sententia protrahendum; attamen, ut nemo hoc in dubium vocet; ad Galenum confugiamus secundo de differentiis feb. cap. vlt. vbi quamlibet affectionem capitis non esse intemperiem, ob oculos ponit his verbis: Aliquando nil patitur caput; sed solum sanguine viriato fit affectus: ecce sine intemperie caput affici posse: an ne Galenus primo ad Glauconem cap. 15. docet tantummodo ob tres causas repleri caput, vel vnicam tantum intemperiem proponit? dicit enim, caput ob tres causas repleri posse, vel ob magnitudinem febrium, vel ob imbecillitatem capitis, vel ob plenitudinem totius; ecce quod nulla facta læsione capitis; nulla cerebri existente intemperie; sanguis peccans quantitate, vel qualitate caput perturbare potest; quantitate, dum ob nimiam plenitudinem erumpit in caput forte, & bene munitum in similitaribus partibus, quæ ita diu possunt consistere, & resistere, ut nulla dyscrasia illaqueentur: qualitate dum ob magnam febrem humores caput obrepunt, vel in anfractibus cerebri morantur, vel tunicis sunt

adhæ-

Ob tres  
causas re-  
pleri caput.



adhærentes, vt affectus in mala compositione plurimi faciliter fiant: intemperantiæ vero ob robur fieri nequeant: ocyus enim malæ compositiones fieri possunt quam intemperantiæ, quia intemperantiæ non cito, malæ compositiones cito fiunt.

Hæc igitur quæ diximus de ventriculo, hepate, & cerebro, conferre possumus in alia viscera, & in omnes alias corporis partes instrumentales, veluti in splenem, in renes, in vesicam, & cæteras partes, vt symptomata ex necessitate non supponant intemperiem, nec mala compositio intemperiem: nec versauice, & quando est mala compositio, ad viuum est rescandum, an fiat, quia adhæcant humores viscosi, vel crassi tunicis; vel quia ob copiam præter naturam fiat mala compositio, quod est quando in cauo considunt humores, vel quid aliud. Cavitates enim replentur à copia: hanc doctrinam, quod symptomata omnia non supponant intemperantias, satis vberem apud Galenum habemus sexcentis in locis, manifestissimam sanè, & si qua alia res claritudine emineat, hæc est censenda, tanquam parva, sataque à diuina methodo.

Pergamus ergo, vt ipsemet loquatur, ipsumque Gal. in testem vocantes, veluti de diff. feb. cap. 3. actio læditur, vel ob læsam facultatem, vel ob errorem externum: quare error externus potest esse causa lædens actionem non læsa facultate, quare si non est læsa facultas, non potest esse læsa constitutio, si non potest esse læsa constitutio, ergo non potest esse intemperies; quia hoc argumentum, est intemperies, ergo est mala constitutio; est mala constitutio, ergo est læsa facultas, est à positione antecedentis ad positionem consequentis, quod valet & redigi potest ad primam figuram, vt alibi ostendimus: quando ergo dicimus læsam esse facultatem, intelligimus per facultatem instrumentum, quod est constitutio, quia facultas, vt facultas, est quid incorporeum, quod non patitur, vt iure merito Aristoteles 2. de anima, loquens de potentia & facultate, dixerit: si senex haberet oculum iuuenis, videret vt iuuenis. Inferas ergo: si error externus ex Galeno lædit actionem non læsa facultate, ergo crimine ignorantie sunt inurendi, qui credunt in læsis functionibus corporis intemperantias partium supponendas esse: ergo in qualibet corporis parte potest esse læsio sine dyscrasia, vel intemperie. Amplius, vt melius excitemus iuuenum mentes, in medium proponamus Galeni loca pro roboranda sententia, cū multo maxima, & merito Galeno sit cōcredenda fides. Est locus primo de loc. aff. 3. vbi de ventriculi actione loquitur, dicitque: res primas generalissimas differentias corruptionis ciborum dari. Vnam esse per proprios morbos ventriculi. Secundam à vitiosis humoribus in ipso accumulatis. Terciam dari ab alimentorum qualitate. Quid pluribus est agendum cum iis, quibus ex ore excidunt semper insulissima Empyria? propemodum erubesco huius opinionis vestigia delere: sed cū videam hos rudiores fallere ægros quodidie, intemperiem vocitantes errores externos, & malas compositiones, non mihi videtur ignorantia hæc ferenda, tanto magis, cum symptomata, & vitia, quæ

*A quibus  
visceribus  
ventricu-  
lus lædatur  
per consen-  
sum.*

per consensum lædunt, vocent intemperiem transcendentem de genere in genus, & sumentes per accidens loco illius, quod est per se, cum viscera modo per accidens, modo per se lædantur; veluti Galenus; de locis affectis primo docet de ventriculo; ventriculum lædi ob aliorum viscerum; & quod diximus de ventriculo, de cæteris omnibus visceribus est dicendum; dicit ergo Galenus loco citato, congeruntur excrementa in ventriculo, tum eius vitio, tum vitio aliorum viscerum. Subdit male habente liene sæpè ichores melancholici fluunt in ventrem, & excitant symptomata melancholica; quare ventriculo illæso, si humores illuc confluunt, & ventriculum infarciunt, quam maximè perferitur noxa in ventriculo, attamen tantæ noxæ in nullam culpam ventriculus transiit, cum aliundè mala eius valeretur pendear, vt de ichoribus melancholicis vidimus Galenum animaduertisse eos à splene in ventrem procumbere; & sexto de tuenda valetudine cap. 9. ab hepate procumbunt biliosi humores in ventrem: tunc sanè ventriculus per se non est male constitutus, sed per accidens, cum fomes morbi sit in hepate: & alibi Galenus à capite docuit restagnare in ventrem humores, non labefactatis ventriculi similibus partibus, nulla in tunicis relicta dyscrasia. Quomodo ergo ex non percepta idea poterunt affectibus manus præbere? quinimo remediis superfluis exhaurient robur, & demum trahent ægrotos in vitia oppido maiora, veluti si quispiam sit calido ventriculo præditus, referto tamen melancholicis ichoribus à splene prodeuntibus, vnde flatus, & insignes rugitus: tunc vidisti medicos aliquando suadere, vt induant ventris regionem pellibus, vel panno ostroincto, vt deglutiant diatrion pipereon, aromaticum rosatum? Vidisti in qualibet læsione ventriculi, nostrates hos supponentes esse intemperiem, consulere oleum masticinum, de absynthio, cotoneorum, astringentia varia? supponentes inquam perpetuò in omni aduersa ventriculi valetudine ventriculum esse intemperie frigida oppressum. In summa similes medicos alebat Roma, vt nunc aluntur, & ipsum audite 7. methodi, hoc verborum apparatu loquentem, vnicam solum mihi videntur habere medici nostri temporis intentionem; nam Empyrici ad imbecillitatem confugiunt; ad

*Erant qui  
in omni  
imbecilli-  
tate ven-  
triculi dæ-  
calfacientia  
& astringen-  
tia.*

cibos astringentes, calidos, amores, ad vinum de absynthio, de cotoneo, ad cerata, vnguenta calefacientia, & astringentia. Hactenus Galenus, quippe vbi his nostris temporibus fore non potuisset melius empyriam nostratum declarare. Nunc medici plerique vnicam solum habent intentionem in stomachi imbecillitate, dum confugiunt ad cibos astringentes, calidos, amores, ad vniū de absynthio, de cotoneo, & cerata, & vnguenta calefacientia, & astringentia; quemadmodum errores Empyricorum, qui erant Romæ Galeni temporibus ne latum quidem vnguem discedebant à nostratum criminibus, vel nostratum ab illis, vt aliquo modo hæreditariè in nostratum animos nugæ, & omnes lacunosæ opiniones irreperierint. Quis est enim in præsentiarum *Boaduria* correptus, & quauis affectione per se vel per accedens ad ventriculum pertinente, qui non consulat calidum, astringens,



stringens, amarum, & vnguenta huiusmodi, fascias, & pannum illum ostro tinctum. Innumerabiles Venetiis diuersa ventriculi proluuie coinquinati, & præcipuè hypocondriaca passione illaqueati iugiter gestant calida in regione stomachi, & per os roborantia, & calfacientia deglutiunt, rati intemperie frigida affligi. Nihilominus circumfusus est iecur æstu feracissimo, & splen, & mesenterium melancholia onusta, vnde flatus in ventrem, & credunt calidis his, & astringentibus medicamentis prodesse, cum trahant illos in maiora vitia; rationi ergo, & Galeno reluctabuntur vsu calidorum in omni ventriculi imbecillitate, cum Galenus clarissimè dicat in methodo se frigida aquæ potatione affectus ventriculi leuasse hac verborum serie, vidistin quosdam leuatos frigida aquæ potione? detorqueamus ergo has nugas scædas in manifestam perniciem ægros ducentes, neque his assentiatur Empiricis; esset enim potius aliis eruditissimis medicis, qui in amplissima hac ciuitate elegantissima medica exculsi sunt, assentiendum: & quod de ventriculo autoritate subnixa asseruimus, ad alia quoque viscera totum transferimus discursum; & simili methodo est incedendum, vt superius diximus, modo, & caput, & iecur, & cætera affligi intemperie, modo humoribus adhærentibus, modo in cauo existentibus, & non perpetuò intemperie frigida angî, & consiliari, cum imbecillitas ventriculi, modo sit à causa calida, modo à frigida, modo à sicca, modo ab aliis causis. Et neutiquam perpetuò morbos esse per essentiam, sed sæpissimè per consensum, & ideas propterea affectuum proprias esse assequendas; alioquin nullius momenti, ac fugis esset tantam Medicinæ artem comparare.

---

*Tertium exemplum de origine errorum Empyricorum declaratur,  
dum abscessum mesenterij putant esse vlcus intestinorum.*

C A P. XXIII.

**N**ON raro vidimus principes medicos summis difficultatibus præmi, in consequenda abscessus alicuius partis internæ idea: tot enim sunt inuoluti in nostro corpore labyrinthi, vt nec mirer acumen quoque ingenij non spernendi medici vadis illidere posse, & demum in falsa corrigare dogmata, & liceat mihi in exemplum abscessus mesenterij philosophari, & casum, quem semel tractaui proponere talem: obtrixit mihi ægrotantem tractasse cui ter quaterue in die saniei sinceræ circiter selibra per aluum efflueret, aliquando fecibus confarcta, nonnunquam seorsum, & sine dolore, sine siti, nec appetentia deiecta, lenta quadam febricula comitante; contingit inquam mihi de hoc casu cum aliis medicis habuisse consilium, & tandem mentem ita distractam medicorum vidisse, vt casus implicitus, & inextricabilis cognitionis videretur, à quo nimirum pus illud copiosum emanaret, vnde initium sumeret: plures credidere ex intestino recto exeso, cum

viderent modo pus mixtum cumcrementis, modo seorsum eietum, sed ægrotantem omni prorsus vacare dolore, hocita animum torquebat ancipitem, vt tota sententia euaderet tortuosa, ac tergiuersans, cum dispar longè sit consilium, arbitrari partem sensu donatam, veluti sunt uniuersa intestina, angi magno vlcere, & nullum ab ipsis persentiri dolorem, neque antea animaduersum fuisse. Aduit medicus alter in illa concione, qui tutaretur copiosam illam materiam non puris; sed pituitæ cuiusdam putrefactæ naturam subire; & licet defenderem, vt est in more cum aqua, igne, & diuisione puris cum specillo: occurrit ille, experimenta aquæ, ignis, & specilli non alioquin quam in pure per tussim egresso exerceri. O hebatem, & stupidum! ad quod examen debeam te reuocare in pernoscenda sanie? Quod erit certius techmirion, quod videre album pus in aqua fundum petere, quam in igne tetram redolere odorem, quam specillo diuidere, & nihil participare viscosi, & omnis tenacitatis expertem perspicere saniem? Hocci-ne est consulere vesane? Hunc in modum thesaurum comparas? non flore vel eloquentiæ fuco, vt credis tu, sed, vt ego reor, verbis tuis sequipedalibus, tuoque pharisaico supercilio, facieque illa tua vultuosa, quibus conculcas bonorum medicorum ingenia, fallis ægrotos, & autoritate qua polles, & non ingenij robore in vitium vniversam medicam physiologiam vocas, veritatem violando; gratia, gratia medicum socium obruendi, & conculcandi, ne tandem veniat illa dies, in qua lucrum mericò tibi arripiat: apage, apage hæc mendacia, quæ in populi prospectum perpetuo ejicis, alioquin vel breui tibi polliceor fore, vt æterna apud manes te expectet pœna.

*Qua metho-  
do cognosca-  
tur abscessus  
mesenterij.*

Cæterum, vnde digressi sumus, redeamus; & in medium proponamus methodum, qua tanti puris per sedem effusi proximam, & immediatam causam per signa propria consequi possimus. Et quoniam per vnicum est impossibile abscessum occultum mesenterij peruadere; licet confugere ad syndromen signorum antecedentium, & consequentium; quod videlicet præcesserint in edendo, & bibendo deliquia, vnde infarctus factus sit in mesereo, sed hæc nil indicant sola; quare ad secundum fontem, id est ad dispositionem patientis accedendum, quod videlicet ortus sit à simili parente; vel quod sua natura sentiat grauitatem in ventris parte profundiori, & percipere dum cibum prolixè infarcit an tensionem profundam sentiat: sequuntur consequentia, veluti egressio puris copiosi, aliquando confarcti fecibus, sine dolore, sine siti, nec tamen appetentia deiecta: hæc consequentia symptomata aperiuunt, esse mesenterij abscessum; postremò ad cognoscendum locum affectum eo manifestior reddetur abscessus, cognoscemus locum affectum, tum per argumentum ex suff. par. enumeratione, tum ex signis propositis pro cognoscendis locis affectis, diximus enim signa locorum affectorum esse vel excrementa, vel actionem læsam, vel firum rumoris, vel doloris, vel tensionis; vel propria accidentia, vel proprietates doloris in mesenterij abscessu, cum pus sit copiosum valde, sine latione, vel sine dolore, & situs tensionis sit in ventris parte  
profun-



profundiori, & proprietas doloris potius grauantis: hæc omnia certam pariunt doctrinam, locum affectum esse mesenterium; præterea accidit alter modus per argumentum illud efficacissimum ex suff. par. enumeratione, non omissa probatione, vel nullo commisso petitionis vitio quod adeo caliginem discutit, vt rem obscurissimam splendescere faciat, vt in prima figura, & vniuersaliter concludat. Dicas ergo, est pus copiosum, ergo a rupto abscessu, non supra septum transuersum, ergo infra, & licet visum fuerit pleura pus aliquando per inferna, & per sedem propulsum; id factum fuit cum magna febris præcedentis vehementia, sitis, & reliquorum: erit ergo infra, non in ventriculo, vel intestinis, quia in iis sine dolore esse non potest; Non in iecore, aut in liene, quoniam horum abscessus vires deiciunt, sitim, & reliqua patiunt symptomata, non in renibus; quia non in aluum, sed in urinam pus contenderet. Cogitemus ergo partem ferme sensu priuatam, alligatamve intestinis; conuertentes in hanc rem stillum anatomicum; vidistin ergo, mesenterium intestinis omnibus colligatum, & inter mesenterium, & intestina, summam sympathiam per venas mesenterij, quibus obducta sunt vsquequaque intestina, in quæ restagnant, & vnde in mesenterium reuertuntur per vias, per quas meant liquati succi? deinde an ne mesenterium ferè sensus omnis est expers, vt cognoscunt in vulneribus chirurgi, & incissores? qui non apertè obseruât nerueos furculos, quibus sensus celebrari in mesereo possit, cum exilis furculus à sexta cerebri propagine prodiens sit ille, qui circumuestit mesenterium. Dicendum ergo est per partem imam mesenterij transcolari saniem expeditè admodum ad intestinum rectum; & deinde omnia solui phænomena; quare cum sit ruptus abscessus, non est mirum, esse pus copiosissimum; quod in vlcere tantum non potest dilabi, & non est mirum, si aliquando cum fæcibus, aliquando seorsum sit, cum modo feces sint in recto intestino; modo absint, vt hinc, nunc misceri pus, nunc sincerum prolabi videamus. Hinc dolores non vexant, cum solum mesenterium ex omnibus inuolucris exili, & minimo sit contextum neruulo, vt sensu ferè sit orbatum, nec sitim intendunt, cum valde distet ab ore ventriculi, nec appetentiam tollunt, cum tetri vapores non percutiant stomachum: leuem tamen febriculam concitant; quoniam contextum est mesenterium venis, quibus recipitur spiritus aliquis saniei, & ad superna viscera delatus inficit: simili methodo processit Galenus 5. methodi 7. de inflammatione meserei; vbi dicit cum non sit inflammatio in hepate; quia tunc excernitur cruenta sanies, sequitur quod sit in mesereo. Idem Auicennas libro 3. sen. 14. tract. 3. capite 11. de apostemate meserei, dicit leuem esse febrem, & esse grauitatem cum extensione profundiore ad ventrem exporrecta, & quandoque esse tensionem, & saniem albam, ad differentiam inflammationis hepatis, vbi cruenta, & ad rubedinem vergens, red dicitur. Cæterum signis iis adiungas, neque sitim vexare, neque prostratam esse appetentiam, nec febrem fieri effrenem in miserei inflammatione, & enumeratis omnibus partibus; in prima solum con-

cludimus figura, & non in tertia vniuersaliter, vt illi qui ex particularibus vniuersalem conclusionem colligunt, vt patefecimus in propriis libris, hoc vanissimum esse argumentum, & Empyricis consuetum.

Error logicus est parallogismus in forma peccans, dicendo sanies egreditur sine sacum mixtura, ergo ab intestino recto, vel musculo sphincteri est à communibus signis, & ad secundam figuram ex duabus affirmatiuis redigitur, & vocari potest analogismus empyricorum, quem arguendi modum in libro de analogismo, & experientia declarauimus, in forma, & in materia multifariam peccare.

---

*Errant dum confundunt ideas morbosicas credentes inflammationem iecoris esse pleuritidem.*

#### C A P V T X X I V.

**Q**UO VINO tantum aspectu contemplantur signa pleuritidis pathognomica illa quatuor à Galeno .i. sect. aphorismorum com. 12. allata; quæ sunt acuta febris, spirandi difficultas, tussis, & dolor lateris; & seorsum non expendant distinctius dictorum signorum magis specificas, & particulares differentias, sicuti de lateris dolore, an dolor ille sit pungitiuus, vel grauatiuus: & de tussi, an sit sicca vel cum materia, & cætera omnia signa consequentia inflammationem hepatis, vel pleuritidinem non distinguunt, in errores vt plurimum incident; quoniam patientes correpti hepatis inflammatione necessario debent infestari tussi, febre acuta, difficultate respirandi, & dolore lateris; tussi enim tentantur ob tumorem hepatis comprimentem diaphragma; acuta febre, quoniam sicuti inflammatio pleuræ acutam febrem parit; simili modo inflammatio hepatis acutam febrem excitar; spirandi difficultate, quoniam septum transuersum ob tumorem inflammatorium commodè dilatari non potest: dolore lateris; quia lateri dextro iecur est alligatum, vnde vinculis iecoris tensis ob inflammationem excitatur lateris dolores, vt tam pleuritis quam inflammatio hepatis quatuor illa signa communia habeant: methodo ergo nostra inflammationem hepatis ab inflammatione pleuræ separare debemus, dicentes (si de extrinsecis causis loquimur) quod similes concurrant procatartici errores, quoniam pleuritis, & vinculoꝝ hepatis inflammatio eandem affectus ideam obsident, eademque dispositiones præcedunt, & causæ antecedentes: diuersa tamen sunt symptomata specifica, quoniam dolor lateris in pleuritide est pungitiuus, in hepatis inflammatione grauatiuus, quæ doloris differentia oritur à diuersitate locorum affectorum; quinimo locus affectus, vt superius retulimus capite de loc. affect. cognoscitur sæpè per proprietatem doloris; quando igitur dolor erit grauatiuus, locus affectus non potest esse membrana, quæ acutissimo sensu est prædita, & quæ dolores pungitiuos facit, sed viscus aliquod exigui sensus particeps erit læsum, quod sit in eodem ferè situ



situ collocatum, & tale non potest esse, nisi iecur, quod vinculis suis alligatur costis, & sensu adeo obtuso est præditum: & quod dolores solum grauatiuos, & nequaquam pungitiuos experiri possit: variis tamen signis pleuritis ab inflammatione hepatis separamur. In pleuritide tussis est cum sputo colorato, in hepatis inflammatione est tussis sicca: in pleuritide color faciei parum mutatur, in iecoris inflammatione valde vitatur, ut hinc Gal. 2. de loc. aff. 9. his verbis distinguat hos duos affectus, si dolor est in ipsis costis, & tussis cum sputo colorato, valet, ergo est pleuritis, & aliquando fit dolor ob hepatis inflammationem intencis vinculis internis, quibus alligatur iecur costis, sed differentia est in pulsu, ac sedimentis, & sentiunt ægri grauitatem, & dum est tumor, comprimitur diaphragma, & fit tussis, & color alteratur ubi iecur vitatum est: differentia ergo sunt petenda à doloris proprietate; proprietas enim doloris pleuræ est cum puncturis, proprietas vero doloris hepatis, & omnium viscerum tenui sensu præditorum est cum grauitate.

Cæterum cum possit aliquando fieri pleuritis ob materiæ sanguineæ affluentiam, & tunc dolorem grauatiuum habeat, distinguemus hoc modo, ut cum grauatiuo dolore in pleura sit quoque iunctus pungitiuus, in hepatis vero inflammatione sit solum grauatiuus. Hinc Gal. 5. de loc. aff. 3. habet in pleuritide continenter obseruari dolorem pungitiuum. Ad sunt similiter differentia in pulsu, quia in pleuritide est durus, & ferratilis, quoniam dum membrana aliqua est affecta, totum genus membranarum seu tunicarum eandem consentire videtur passionem, tenditur ergo pleura, quæ est membrana septum, & totum pectus intertexens, & usque ad cor pereptas, sequitur, quod arteria circumuestita ab eadem membrana eandem tensionem patiatur: sumuntur quoque alia discrimina à tussi, à faciei colore, à sedimentis, & ab aliis, & omnia hæc colligimus à Galeno, & ab Auicenna; à tussi, quia in hepatis inflammatione est sicca perpetuo, cum fiat ob compressum diaphragma ab hepatis tumore: In vomica solum primis diebus est tussis sicca, & deinde exsudat pleura materiam ichorosiorum, quæ in pectus colligitur, & condensatur à calore, & per tussim ei aculatur. Si vero contingeret ob materiæ infarctum contumacissimum, in pleuritide tussim siccam conseruari; petenda aliunde est alia differentia, à colore vitato videlicet, seu à pallore: habemus apud Galenum 2. de loc. affec. vitato hepate, consequi necessario vitium colorem, in pleuritide verò esse colores parum distantes à statu naturali: En quo pacto per plura symptomata cognoscantur differentia morborum: Præterea ab excretis, quoniam in hac hepatis labe sedimenta specimen referunt loturæ carnis, quia chylus in portam præcipitans ab hepate ob eius infirmitatem non attrahitur, & retrocedens malè dedolatus procumbit per eadem spiramenta in ventrem, & per secessum foris dilabitur ad instar aquæ carnis mactatæ: ut valeant tandem istæ consequentia, est dolor grauatiuus, & non pungitiuus, & in parte dextra, & cum tussi sine sputo, cum spirandi difficultate, cum febre

*Est dolor lateris, tussis, spirandi difficultas, & febris acuta, ergo pleuritis: paralogismus.*

acuta, cum viato colore, ergo hepatis inflammatio illa exporrecta ad vincula usque, quibus costis alligatum est hepar. Hæc signa veritatem cognitionē hepatis illaqueati hac colluie inflammatoria ostendunt. Ad eundem modum est dolor pungitius cum tussi, & sputo; est spirandi difficultas, febris acuta, ergo vomica; quare dum non distinguuntur signa proposita, nihil sequitur; & error logicus committitur, quia quatuor illa signa pathognomica vniuersaliter sumpta constituunt argumentum a positione consequentis ad positionem antecedentis, veluti si est homo est animal, sed est animal, ergo est homo, quod non valet; est enim in secunda figura ex duob. aff. & multis modis peccat, ut alibi ostendimus, est dolor lateris, tussis, difficultas spirandi, & febris acuta, ergo pleuritis, non valet: nisi fiant conuertibiles termini, est dolor lateris pungitius, ergo pleuritis; & cætera limitentur, & coarctentur signa propria, ut infra, si volumus certas inferre consequentias.

Signa pleuritidis pathognomica depræpta à Galeno.	{ 5. de loc. aff. capite 3.	1. Febris acuta.	Signa inflammationis hepatis cum tentione vinctulorum.	{ 1. A pulsu vndoso non ferrino.
		2 Dolor lateris pungitius.		
		3 Respiratio frequens & exigua.		
		4 Pulsus parvus durus, & tensus.		
		5 Tussis cum sputo colorato.		
Prima sect. aph. com. 12.	{	1 Acuta febris.	{ ab Auicenna, Fen. 3. li. 3. c. proprio.	{ 2 A dolore grauiuo.
		2 Spirandi difficultas.		
		3 Tussis.		
		4 Dolor lateris pungitius.		
Signa inflammationis hepatis cum tentione vinctulorum.	{	{	{	{ 3 A facie citrina.
Signa inflammationis hepatis cum tentione vinctulorum.	{	{	{	{ 4 A tussi sicca.
Signa inflammationis hepatis cum tentione vinctulorum.	{	{	{	{ 5 Ab egestionepatica.
Signa inflammationis hepatis cum tentione vinctulorum.	{	{	{	{ 6 Ab vrina simili hydropici lottio.

Alia ab Auicenna proponuntur signa, sed hæc sunt potiora, & sufficientiunt, quoniam & per actiones læsas, & qualitates mutatas, & excrementa propria declarant, & demum ex proprietate doloris cognoscitur, hepar esse coinquinatum, & non pleuram.



*Quinto errant, dum ex sanguine spumoso secundum omnes partes  
per tussim eiecto colligunt in pulmone esse vlcus.*

CAPVT XXV.

**E**RRARE videntur nonnulli dicentes sanguinem eiacularum per tussim, quando apparet spumoso secundum omnes partes tam intimas, quam extimas, immediate prodire à pulmone, & ex hoc signo in talem errorem prouunt, vt constanter credât esse pulmonem exesum, & manus exporrigunt medicas vlcerato pulmone, quod cum aliter possit contingere, in hoc casu confundunt ideas morificas. Quod, vt eluceat ratione, & autoritate erit certandum: an ne sanguis dillabens à capite, & in pectus procumbens secundum omnes partes fieri potest spumoso, si pauco temporis spacio firmatur? aer enim inspiratus, & expiratus agitare posset illum, & totum aëre repletum, deinde spumescere; quare falsa est consequentia: est spumoso secundum omnes partes, ergo in pulmone est vlcus: sed cum ipsi subnixi sint autoritate Hippocratis §. sect. aph. 13. expendamus illam sententiam, „ quæ iis verbis declaratur. Quicumque spumoso sanguinem expuant, iis è pulmoneeductio fit; sententia autem in consilium vocanda est, adeuntibus nobis Galeni commentum, vbi expressè negat, verè, & ex necessitate concludi in vlcerato pulmone expui spumoso, iis verbis „ discurrens, non verè vlcerato pulmone ex necessitate spumoso ex „ pui, & subdit, se vidisse sanguinem eiectum à pulmone ob disruptum „ vas benè coloratum, cum tussi, sine dolore, & non spumoso. Quod „ idem reperit Galen. septima sect. com. 30. hoc verborum splendore, sed neque semper spumoso sanguinem expuunt ex pulmone: videtur itaque, cum ex propria substantia visceris simul quicquam effertur, sanguis esse spumoso; sanè, & qui laterali laborant, spumoso expuunt, & floridum sanguinem, vt est ille, qui à pulmone fluit, vt omnino apud Galen. non teneant consequentiæ; est spumoso, ergo à pulmone, est à pulmone, ergo spumoso: & ratio subnecti optima potest; quoniam, & sputa ob agitationem, & sanguis lateralis nullis pulmonis lobis violatis spumoso aspectum secundum vniuersas partes clarissimè referre possunt. Quid veratposito efficiente spumæ, quod est agitans, & materia, quæ est humor, fieri intimius humorem spumescentem? Sicuti in sanguine è vomica per tussim eiacularo, oculis ipsis sæpè vidimus; quinimò, neque altera valet consequentia: est à pulmone, ergo spumoso, cum aliter Galenus sentiat, vt vidistis 30. illo aph. 7. sect. Idcirco sibi constans Galen. 4. de loc. aff. §. dixit, tunc signum esse efficacissimum, quando simul cum particula pulmonis eiecitur spumoso quippiam: Addit, & diligenter considerare oportet, an spumoso quippiam simul educatur, id enim efficacissimum fuerit indicium, quod ex pulmone facta sit excretio, vt si pulmonis pars, vel par-

tricular, aut arteriæ, aut venæ tunica reieciatur; quasi diceret, spumofus sanguis ita est signum efficax pulmonem esse abrasum, ac tunica, aut bronchij pars eſſet reiecta: quare in hunc ſenſum vertere debes ſpumofum ſanguinem à pulmone reiectari, ſi à parenchyma exeſo, & rupto prodit, tunc verè ſi ſanguis eiicitur, eſt ſpumofus; ſed ſi eſt vas ruptum, vt vena pulmonis, ſic non eſt neceſſarium eſſe ſpumofum, opus eſt ad hoc, vt ſit ſpumofus, propriam ſubſtantiam eſſe exeſam, & ruptam, & cum ſanguine, vel tunicam, vel bronchij partem eiaculari foris per ruſſim, vt valeat iſta conſequentia, effertur à propria ſubſtantia, vel à parenchyma pulmonis, ergo ſi erit ſanguis, neceſſario erit ſpumofus ſecundum omnes partes; quoniam pulmonis ſubſtantia eſt rara, & ſpungoſa, per quam perenni motu aër tranſiens ad compoſcendum æſtum cordis, ita iugi motione cribatur vſque ad minimas partes, & tollitur in ſpumam, vt efficiatur ſimilis ſubſtantię pulmonis, & conuertatur in illam ſubſtantiam: iure merito debet aſſimilari nutrito, & eandem ſubſtantiam in raritate emulari, quod non euenit in ſanguine vaſorum; quia vaſa magna ſunt, & ſanguis fluit, & reſluit: ſicuti in arteria venoſa, & vena arterioſa, vbi ſanguis collectus non firmatur, ſed in alias partes ſe colligit; vt non illam ſubire videatur ſortem commotionis vſque ad minimas partes, & per conſequens non ſpumefcat; colligas ergo non valere, eſt ſpumofus, ergo à pulmone, nec iſta valet abſolutè; eſt à pulmone, ergo illo modo ſpumofus, cum exedi poſſit vena pulmonis, & ab illa eſſui ſanguis expers ſpumofi aſpectus ſecundum omnes partes.

Cæterum ſi velles infallibilem cognitionem habere, quando ſpumofus ſanguis per ruſſim eiectus ſit à ſubſtantia pulmonis; melius tibi conſulere non poſſem, quam vt confugeres ad traditam methodum. Et in primis ad diuiſionem generaliſſimam, vt inuenires locum affectum de quo lis eſt, dicendo, ſanguis hic ſpumofus vel à capite in petus eſt pulſus, vel eſt à pulmonis ſubſtãtia, vel à vaſe rupto, & ſic enumeres omnia, ne cadas in ſcopulum illum inferendi cum principij petitione, quod ſatis vbique eſt à nobis exploſum: quare ſi præceſſerunt cauſæ lædentes caput, vt grauitas capitis, rubedo, & grauitas oculorum, fluxus ſanguinis narium incipiens, & deinde intermiſſus, colliges ex iis à capite prodire, & deinde ad ſecundum fontem ad diſpoſitionem videlicet illius capitis, veluti, an ſint orti à ſimilibus parentibus, an intermiſſa ſit aliqua euacuatio, vt inde ſit diſpoſitũ, & an aliàs ſimilia ſint perpeſſi: & deinde ad ſymptomata; & ad locos affectos, & ad iuuantia, & lædentia in magna conſilij anguſtia: ſic poteris ad apicem peruolare. Similiter ſi præceſſerunt cauſæ rupturæ vaſorum, & ſubiectum huic caſui ſit obnoxiũ, & ſymptomata rupturæ ſint conſecuta, veluti vbi ſanguis non coagulatur; erit tunc verum dicere, non coagulatur, ergo à vaſis pulmonis prodit; quia ſanguis pulmonis ob bilis permixtionem non coagulatur: Si vero à capite prodiit, coagulatur: ſi vero à parenchyma pulmonis, tunc præceſſere cauſæ abradentes pulmonem, vt ſaluſ catarrhus, & conſequentur ſymptomata, vt ſpu-  
moſi



mosi sanguinis excretio sine dolore, vel particula aliqua pulmonis, vel tunica ruffim exprimitur; si verò neque à capite, neque à pulmone, sed à thorace initium trahat sanguis; tunc signum erit, quod degenerat in thrombon: videas ergo quomodo in arte medica vnum signum sapè malè sit accommodatum, in significandis affectuum ideis, vt in omni obscura, & perplexa affectione præstet ad syndromen signorum communium consultò properare, quæ veritatem præbet æternam, & quam demonstrationes polliceri vidimus.

*Sanguis eij-  
citur per  
ruffim spu-  
mosus secun-  
dum omnes  
partes, ergo à  
pulmone: est  
Enthymema  
ex signo solu-  
bili.*

Error logicus erit dum dicunt, est spumofus secundum omnes partes, ergo à pulmone, & vocabitur enthymema ex signo solubili, quia Galenus fatetur in pleuriticis egredi spumofum secundum omnes partes 7. sect. apho. 30. quia laborant morbo laterali spumofum expuunt; quamvis rarò, & non spumofum secundum superficiem, sed secundum omnes partes: similiter est à pulmone, ergo spumofus, est per partialem causam, veluti est lux, ergo sol; cum ignis quoque luceat, quoniam si exesa est vena pulmonis, potest esse, vt non sit spumofus secundum omnes partes: tamen est illa, exesum est parenchyma, ergo spumofum quod egreditur, cum dicat Galen. 5. sect. aphor. 13. egredi, & sanguinem spumofum, & particulam aliquam carnis, vel tunicæ cum sanguine spumoso.

*Est à pulmo-  
ne, ergo spu-  
mosus, argu-  
mentum pec-  
cat in mate-  
ria.*

*Vt errant; qui credunt catarrhum semper esse  
vitium capitis.*

C A P. XXVI.

**I**Nter exeuntia symptomata, catarrhus principem locum tenet, & quoniam receptum est exeuntia vniuersa insequi actiones: Cadit hic breuibis expèndendum, an catarrhus perpetuò insequatur capitis vitium: Compertum igitur est in exordio huius libri, vbi egimus de resolutione symptomatum in suas radices, exeuntia vniuersa insequi actiones, quæ bissariam lædi dicantur, per se, & per accidens, quando ergo caput erit læsum per accidens, siue per aliud, quæ verba in idem recidunt; tunc si catarrhus vexabit, vitium sanè non erit in capite, sed aliunde trahet radices: breuibis hoc confirmatur Galeni testimonio 2. de differentiis feb. capite vltimo, vbi habet aliquando nil pati caput, sed solum sanguine vitiatò fieri catarrhum, ergo valebit apud Galenum consequentia, est catarrhus, ergo aliquàdo ob sanguinem vitiatum, nulla existente læsione per se in capite fiet catarrhus, quare nullo modo potest dici absolutè loquendo catarrhum esse vitium capitis, quia sententiæ absolutè prolatae sunt in potiori significatione intelligen-  
gendæ; & potior significatio est vniuersalis, & per se, & quæ sunt per se, debent esse ex necessitate, vel saltem de omni, id est semper, & in omnibus; quare cum non semper catarrhus fiat ob vitium capitis; sed

*Cur catar-  
rhus non sit  
semper vitium  
capitis.*

A tribus  
causis fieri  
catarrhum

Errant tyro-  
nes dum ca-  
piti laeso per  
consensum  
adiungunt  
remedia.

aliquando ob sanguinem vitiatum: non poterimus dicere catarrhum magis esse vitium capitis, quam vitium hepatis: Ad hæc confirmatur quod subiecta viscera, vel sæpissimè totum præbere possint fomitem catarrho, capite manente prorsus illaeso; quia catarrhus modo exoritur à corporis plenitudine, modo à subiectorum viscerum calore, & demum à capitis debilitate, quam haurire possumus cognitionem à Galeno primo ad Glauconem capite 15. vbi habet caput repleti posse ob tres causas, vel ob plenitudinem totius, vel ob magnam febrem, vel ob debilitatem: ecce quod subiecta viscera, dum copiosis sunt repleta excrementis in destillationis siue catarrhi productionem conspirare possunt; vel quia longo temporis tractu viscera fuerint malè disposita; vel quia in prima coctione error aliquis fuerit commissus, veluti dum venisset completus excrementis, & copiosis edulis longo temporis cursu essent laxatæ habenæ, vnde catarrhus fieri posset, nulla tamen in capite noxa per se relicta: sed caput tunc optima sanitate donatum solum repleti, vt diximus vel à viscerum subiectorum calore, vel à totius plenitudine. Cum igitur hoc eluceat auctoritate, experientia, & ratione, labi illos tyrones credimus, qui catarrhum vitii capitis semper inconsideratè vocitant, & vel maxima reprehensione dignos esse, quando adiungunt auxilia medica capiti tantum per consensum laeso, sicuti dum proponunt stillicidia, lotiones, & alia id genus quādo subiecta viscera, quæ sunt causæ destillationis, essent curanda, & non caput quod est sanitate præditum.

*Dum catarrhus non dependet à laeso cerebro errant, si dicunt  
semper à secunda coctione laesa exordium trahere.*

## CAPVT XXVII.

Quod tres  
sint coctio-  
nes, & in  
qualibet sint  
duo excre-  
menta, vnum  
tenue & a-  
liud crassum.

Symptomatum ideæ, nisi ad sua initia reseccentur, neutiquam cognoscuntur: reseccamus autem bellissimè traditæ methodi opificio in limine huius libri. Cadit hic, vt de hac præcipui exeuntis ideæ philosophemur; numquid catarrhus, quando non dependet à laeso cerebro, numquid inquam, semper à secunda coctione laesa exordiat: quia si Galenum legimus, vidimus ipsum dicentem, ob sanguinem vitiatum fieri catarrhum, non dicit ob repletum stomachum, vel ob malè dedolatum chylum, quare cum dicat ob sanguinem vitiatum, si non erit caput læsum per se; causa catarrhi accepta referenda erit secundæ coctioni: sanguis enim est secundæ coctionis parvus: verumtamen cum tres sint in animato corpore coctiones; prima, quæ fit in ventriculo; secunda, quæ in hepate; tertia, quæ in cæteris corporis partibus, & in qualibet coctione ex Galeno 3. methodi duorum generum excrementa consurgant, tenue nimirum, & crassum; sicuti in ventriculo crassum sunt fæces: tenuia sputum, & vrina: in hepate, crassum melancholia, tenue bilis: in tertia crassum, sunt sordes, quæ indusia maculant: tenue est



est illud quod perpetuò egreditur à qualibet corporis viuentis parte, & est illud quod miscetur cum aëre, & cuius ope canes suos agnoscunt dominos, & amissos perquirunt, & feras explorant atque venantur: cui dubium, quod excrementa harum omnium coctionum qualitate, vel quantitate peccantia, poterunt catarrhum producere; nec obstat Galeni autoritas; vbi dixit loco citato, 2. de diff. febr. cap. vltim. aliquando caput nil patitur, sed solum sanguine vitiatum fieri catarrhum, quia voluit ostendere catarrhum fieri, quamuis caput non sit læsum per se, & dixit aliquando ob sanguinem vitiatum; nō obstant inquam hæc verba quominus catarrhus non dependeat aliquando à cæteris excrementis prodeuntibus quoque à prima coctione, sicuti ab humiditate illa excrementosa primæ coctionis, quæ per fibras œsophagiascendit, & percollatur in guttur, & deinde scandens partes superiores supra os superioris maxillæ, quod palatum componit, coalescit, & illis vacuis repletis, sensim & sensim sibi viam struens sub osse giugali, in latissimis oculorum foramina colligitur, & inde spargitur per totum cerebrum; ecce qua facili, & patenti via excrementum primæ coctionis à ventriculo desciscens in caput ingruere valeat.

*Per quas partes ascendit à stomacho ad caput catarrhus.*

Ad hæc, ventriculi excrementa in auras vaporosas abire possunt; & caput inde replere, quod cum sua natura frigidum sit dehisat, & vnit, & halitus in pituitam conuertit: neque in hoc Argenterius in com. artis med. recte sentit, quod videlicet spiritus vaporosi & eleuati à ventriculo cedere non possint in pituitam, ad instar pluriæ, quia vt (dicit ille) ex vapore res crassa, & viscida, cuiusmodi est pituita fieri nequit, præsertim in cerebro actu calente; quoniam nos dicimus, ab illis vaporibus non gigni viscosam, vel Praxagoræ pituitam, sed aquosam, & quamuis caput sit actu calidum, similiter actu calidum est alembicum in illa parte qua condensantur vapores: præterea contra Argenterium est sententia Arist. 2. de par. animalium capite 7. iis verbis videlicet in iis corporibus, quibus cerebrum frigidius est quam temperamētum modicum postulet, cum enim alimentum per venas sursum respicit, vbi excrementum ob eius loci vim refrigeratum est, fluxiones pituitæ sanique mouet, quod simile generationi imbrium euenire intelligendum est, quoad magnum confertur cum paruo licet. Cum enim ex terra vapor exhalat efferturque in sublime à calore, vbi supernum aërem subierit frigidum, consistit denuo in aquam propter refrigerationem, atque in terram desinit, ecce quod Arist. vult cerebri frigiditatem condensare vapores aliunde missos, eo modo quo vapores terræ, & aquæ eleuati à solis virtute in media regione aëris condensantur, vt nihil clarius sit apud Aristot. quam quod cerebrum denset vapores, & in pituitam conuertat, dicimus tandem viscosam fieri, tum à sanguine coctionem subterfugiente, tum ab illa pituita ventriculi, quæ ab œsophagi fibris attrahitur, & ascēdit, & deinde præterlabitur in paristimiam in guttur, & supra palatum, vbi per nares emungitur.

*Errat Argenterius, dicens quod vapores eleuati à ventriculo in cap. non possint conuertere in pituitam.*

Errant quoque, qui credunt pituitam, quæ emungitur per nares, esse excrementum vitiatum, sunt in latitudine sanitatis, esse excrementum vitiatum, esse excrementum vitiatum, esse excrementum vitiatum.

*Errant, qui dicunt pituitam esse excrementum vitiatum, esse excrementum vitiatum, esse excrementum vitiatum.*

res effluunt.  
esse excre-  
mentum ter-  
tia coctionis.

coctionis cerebri; quoniam tertia coctio cerebri alia non habet excre-  
menta, quàm vapores, & sordes: præterea si esset excrementum pro-  
prium, esset perpetuum, sed dicant mihi, quæso, quot sint, qui vitam  
suam ferè totam sine hac capitis destillatione, traiciunt: quin catar-  
rhis, & capitis destillationibus obnoxij, intermittunt per menses, &  
annos, non conflictari corripit. quare cum non conueniat semper, &  
in omnibus hæc per nares destillatio, non erit per se, neq; propria ter-  
tiæ coctionis cerebri, neque in latitudine, vel extra latitudinem sani-  
tatis; causa ergo erit aliundè petenda, quæ cum varia sit, redigi poterit  
ad commune quoddam innominatum, quod erit per se causa destilla-  
tionis, quod nos tantum per syndromen describere possumus: cum vi-  
deamus, modo à stomachi repletione, modo à copioso sanguine pitui-  
toso, conspirantibus erroribus in præcatarrhicis, conspirante disposi-  
tione patientis, & locis affectis fieri; & hæc sunt antecedentia, quæ  
corripit, esse possent origines; ut modo ab errore primæ coctionis, mo-  
do ab errore secundæ, modo ab errore tertiæ, & modo à vetriculo, mo-  
do ab hepate, modo à toto corpore, & aliquando à cerebro ipso fiat,  
quæ omnes causæ catarrhi propriis signis sunt declarandæ: non tamen  
dicere possumus esse proprium excrementum cerebri; nisi per acci-  
dens aliquando contingat.

*Errant dum volunt pregnantem ex urinis cognoscere.*

#### C A P. XXVIII.

**C**ONSTITVIMVS clarioris doctrinæ causa exempla errorum pro-  
ponere; qui fieri possunt in morborum, & symptomatum ideis  
genericis cognoscendis, ut melius addiscere possimus methodi rectum  
usum; egiunusque de erroribus, qui fiunt à rudioribus in cognoscendis  
affectibus similiarum partium, & dissimiliarum; & tandem de perti-  
nentibus ad actiones lasas, & ad exeuntia, ut illis percognitis cetera  
eandem rationem subeuntia, & errores valuerit, qui fieri possunt in  
symptomatibus perquirendis, cognoscere autem ipsi præsentia de signis  
mulierum prægnantium est agendum, ut empiricorum errores omnium  
generum nostra methodo advertere possimus, & reiicienda plura si-  
gna, quæ creduntur posse certò indicare mulieres esse pregnantes, quæ  
cum sint falsa, & à natura rei aliena, erunt explodenda: Dignoscere  
enim an mulieres in illis primis mensibus vtero gerat valde proficere  
potest, quoniam si erunt oppressæ vomitu, fastidio, in appetentia, & si-  
milibus symptomatibus, & sætum gestent, non erit forsitan aliquod  
ineundum consilium illas euacuandi, & purgandi, sed sperandum fo-  
re, ut cum puerperis in partu omnes mali succi euacuentur.

Cæterum si hæc symptomata prodirent à cacochymia, vel ab aliis  
causis morbificis, essent proponenda cathartica, & mille alia auxilia,  
alioquin vestigia morbosa penitus agere possent radices, & inde adeo  
vexare,



vexare, ut vel breuit in ſeuiffimos erumpere poſſent morbos : quamobrem in conſilium vocari ſolent medici, ut difficultatem dirimant, vel ſi non vtero gerant, morbos anteuertant, arceantq; cauſarum præternaturam impetum, ne ex morbo morbi ſæuiores ſuccreſcant, vel vel ubi ſunt prægnantes ſœtum enutriti permittant, leuiuſculis tantum adiunctis remediis.

Empyrici tamen dum tractant hunc caſum, an videlicet vtero gerant nec ne, plurima obſeruant ſignatùm ridicula, tum abſurda, quia aliqui proſtitentur cognoscere prægnantem ex lotij aſpectu, aliqui ex nauſea, vomitu, ex appetitu eſculëtorum quorundam, aliqui ab egreſſu vmbilici, vel à lacte mamillis inſidente, & ab aliis multis. Huc conueniunt medici, huc obſtetrices, quæ proſtitentur digitis cognoscere, an vteruſ propter conceptum clauſus ſit, & quod miſerrimum eſt, medici aliquando inueniuntur, qui ſordidas has mulierculas conſulunt, earumque audiunt verba, perinde ac ab aliquo diuini ſpiritus afflatu eſſet ſententia expectanda.

Adſunt quinetiam, qui credunt cognoscere Hippocratis artificio, an vtero gerant, nec ne, quando potionem hydromellis aqua pluuiali conſecti ebiberent mulieres, & doloiem ventris, vel tormina perſentirent, quia dicunt, nec torminibus, nec ventris doloribus ſœtu carentes mulieres ob hydromellis potionem affici poſſe, vel experiuntur aliud Hippocratis artificio, quod eſt, dum vtuntur ſuffumigio acuto per pudenda recipiendo, dicunt, ſi ad naſes peruenire poteſt odor, & illas non eſſe prægnantes : Hæc & ſimilia infra proponenda ſunt ſigna, quæ vagantur pro cognoscendis prægnantibus, quæ cum decipiant, & ſint communia, à quibus nulla certa cognitio colligi poſſit, ſunt prorsus reiicienda.

Sunt in primis, qui dicunt vrinam ad albedinem vergentem, vel claram, conceptum ſignificare, & tantomagis ſi poſt redditum lotium in vitrea matella conſpiciantur bulloſa quædam granula milij figuram imitantia, quæ ſint ſtatu plena, & ſint aſcendentia, & deſcendentia; Ex his colligunt mulieres vtero gerere : rationem autem cur ex albedine vrinæ hæc colligi poſſit, dicunt eſſe hanc, quia in prægnante hepatis, renum, & veſicæ calor (cuius proprium eſt vrinam reddere coloratam) ad vterum ſit contractus, gratia fouendi conceptum, ut inde vrina ſua naturali tinctura priuata mulierem vtero gerere oſtendat.

Adduntque in prægnantibus claram, & perſpicuam vrinam reddi, quia in mulieribus vtero gerentibus clauditur vterus, vnde ceſſat illa iugis excrementorum proluues, quæ ab ipſo tamquam à cloaca egredi, & permixti ſolet cum vrina : demum dicunt bullas illas minimas aſcendentes, & deſcendentes in vitreo vaſculo poſt vrinæ miſtum oſtendere ſtatus, & craſſæ materiæ ſobolem, & denique caloris viſcerum imbecillitatem, quæ aliquid dicunt habere momenti ad credendum calorem eſſe ad vterum contractum ob ſœtus enutritionem.

Cæterum breuibus diluenda ſunt hæc mendacia, tanto magis tum nullos vnquam elegantes medicos deprehendimus, qui ex vrina præ-

*Albam urinam non significare conceptum.*

*Ex quibus causis alba fiat urina.*

*Sunt anatomia imperiti qui dicunt vteri sorditiam misceri cum lotio.*

*Granula ascenduntia, & descenduntia in urina non ostendere conceptum.*

*Cur urina nullam vteri cond: à nam ostendere possit.*

gnantem cognosci posse defenderent, cum vasa urinæ adeo sint separata ab utero, ut nullam generis sympathiam habeant: dicunt ergo albam urinam, & granula illa flatulenta, quæ conspiciuntur in urina, significare calorem viscerum esse diminutum, & nullam aliam causam imaginari possunt, nisi, quia calor contractus sit ad uterum; sed dicant mihi quæso, quænam sint istæ consequentiæ, lotium est album, ergo calor viscerum est debilis, est debilis: ergo contractus à utero: numquid in qualibet cacochymia calor est debilis est contractus in variis corporis partibus, unde albescere lotium potest? an ne alba urina sit quoque ob nimiam potationem? ob vigiliis? & ex altera parte, an ne prægnantes coloratâ reddunt urinâ? quare per lotiū decoloratum, & album se conferre in hanc cognitionem, quod utero gerant mulieres, est per medium extraneum, quia neque est signum, quod conveniat prægnanti per se, neque de omni, nec sæpe, ut sit de illis accidentibus ut plurimum separabilibus, quare qui hoc modo discuntur necessariò in illos paralogismos incidunt, qui vocantur enthymemata ex signis solubilibus, de qua re agemus in libro de analogismo, & de falsa experientia.

Quando verò conceptum colligunt ex claritudine lotij, ut signi huius vanitatem noscant, deberent persæpe inspicere, & animadvertere non prægnantium urinas, quæ sæpe clarissimæ esse solent, dum verò afferunt causam, cur in prægnante sit clara, dicunt quia clauso utero, non percollantur sordities perturbantes urinas, isti hæc dicentes nobis dant occasionem illos redarguendi, ut anatomix imperitos, quoniam meatus urinarius nihil habet cum vulva, & sordities vteri nullo modo possunt misceri cum lotio, cum meatus urinarius promineat in parte externa vulvæ, quinimo clausa vulva tangi, & conspici possit.

Quod aiunt de granulis, fieri nimirum causa debilitatis caloris viscerum, & ob nullam aliam esse quam propter concentrationem caloris ad uterum: occurrimus imbecillitates viscerum ob innumeras causas fieri, non solum ob conceptum, verum ob quodlibet viscerum erratum, unde urinæ albedo, vel granula sequi possunt. Hinc in molla, & in recentis mensibus, vel in muliere cachexia correpta, & in mille aliis occasionibus calor est debilis, vel contractus, modo in utero, modo in alia parte, & alba urina cum granulis observatur; quare hæc signa proposita omnino sunt aliena à natura conceptus; rationes vero cur urina vteri conditiones non significet, sunt, quia urina non fluit per uterum, neque per vulvam, sed habet ductus, & canales separatos, ut vulvæ vel vteri colluvies nullo modo possint cum lotio misceri.

Causa demum tanti erroris est, quoniam carent methodo tradita pro cognoscendis locis affectis, de qua Galenus in libris de loc. aff. & nos in proprio capite huius libri verba fecimus, & ostendimus nullum signum partem affectam ostendere posse, nisi sit depromptum vel ab actione propria, vel ab exeunte, id est à propriis excrementis, vel à qualitate mutata, vel demum à situ accidentium; at urina neque actiones



nes vteri ostendit, neque vteri est excrementum, & per consequens nullam qualitatē vteri patefacere poterit? Quid multa? numquid Galenus apertissimē fatetur lotium solum indicare humores existentes in venis, & non in omnibus, sed illos tantum humores significare qui sunt in vena caua? vt in historia illa de muliere apud Pantimidem restarum reliquit. Præterea causa illius tanti erroris dum credunt ex vrinis posse cognosci conceptum, non solum prodit ex conditionum locorum affectorum inscitia, verum etiam, quia syndromen signorum communium, quæ cognitionis *axe&as* parere solet parum accuratē colligunt, vt amethodi nostri empyrici coacti in plurimos labantur errores, quia nec propriis, nec communibus signis per syndromem collectis incedunt: ostendimus enim superius affectus penitissimos, quando per propria signa non cognoscuntur, tunc per illa signa communia, quæ prodeunt à principiis, quæ necessario concurrunt, cognosci posse: diximusque in cuiuslibet affectus productionem necessario conspirare hos fontes, externos nimirum errores, subiecta disposita, causas efficientes, symptomata consequentia, & locos afficiēdos, quando ergo aliquid erit occultum, & ab omnibus istis fontibus aliqua signa communia vnā tamen naturam significantia, & ostendentia colligemus, poterimus, quod caligine circumseptum est expedire cognoscere: dicant igitur mihi quæso empyrici quo artificio volunt ab vrina conceptum colligere? quando enim vrina conceptum significaret, vel esset signum proprium, vel commune hauriendum ex illis quinque fontibus? quoniam neque vrina proprium est signum, vt omnes consentiunt; neque commune, quia illa tantummodo debent vocari signa communia, quæ vel antecedunt, vel subsequuntur affectus produ-  
Vrinam non esse proprium nec commune signum pragnanti.

*Errant, qui pragnantes volunt cognoscere ex mensibus suppressis, & ex aliis quibusdam signis.*

C A P. XXIX.

**S**EMPER miratus sum illos, qui pragnantes à suppressis mensibus tantum cognoscere volunt, cum menses supprimantur ob plures causas, quin i non mulieres vtero gredientes inveniuntur, quæ suos lunares menses habeant per venarum surculos illos exiles extra oriticiū

*Ob quas causas supprimunt menses.*

utero collocatos, per quos virgines exonerantur. Quo pacto ergo ex mensibus suppressis cognoscere poterunt utero gerentes? præterea menses, nunquid supprimi possunt ob mille causas? sicuti ob morbos in mala compositione, ob angustiam nimirum, ob compressionem venarum uteri a tumore aliquo factam, vel ob nimiam pinguedinem, vel ob crassos humores obstruentes venas illas, quæ totum uterum intertexunt, vel ob inopiam sanguinis, & demum supprimi possint ob nimiam copiam, veluti quando fœminæ sunt desides, & oriosæ, quæ tam copiosum sanguinem colligunt, ut expultrices facultates illum expellere non possint ob nimium infarctum, & inde menses supprimantur; non valent ergo consequentiæ, sunt suppressi menses, ergo mulier est prægnans: neque valet negatiuè, habet menses, ergo non est prægnans, quoniam dari potest mulier grauida sanguinis tamen feracissima, cum plenitudo fœtus indigentiam exuperet, & inde, quod redundat excernat, non tamen per uterum, quia in prægnante oclusus est, sed per venas extra uterum, per quas Virgines terro hoc excremento exonerantur.

Cæterum cum menses in fœtus generationem necessario concurrant, cum ex mensium purissima parte nutriatur embrio, inter illa signa communia menses suppressi ponuntur, quæ syndromem sufficientissimam ad significandum conceptum constituere possunt, quam syndromem conceptum ostendentem paulò post declarabimus. Præterea adest alia Methodus, quæ in prægnantis cognitionem ex mensibus suppressis nos ducere potest, enumerantes nimirum omnes causas, quæ menses suppressere valent, & deinde demonstratione aliqua à posteriori excludenda excludere, & demum colligere, an purgationes sint retentæ propter conceptum, vel propter alias causas, de quare in fine huius libelli.

*Mulier lac  
habet. ergo  
concepit: non  
sequitur.*

Præterea certissimum signum conceptus esse putant, si in mamillis lac colligatur: nec vident in multis mulieribus lac colligi, & non esse prægnantes, & plurimas quoque esse in primis mensibus prægnantes, quæ lac non colligunt: & ratio est, quia lac ob copiosum, & crassum sanguinem generatur; in illis enim mulieribus non erit redundans: Hinc non semel vidi in mamillis marium collectum aliquid lactis, quod contigit tum ob sanguinem crassum, & copiosum illuc transmissum, tum ob naturam debito frigidiorē, rarò tamen in maribus colligi potest ob eorum vegetum, & intentum calorem, qui non solum attenuat, sed etiam euacuat excrementa superflua: attenuat, quoniam calor sua virtute omnem humorum crassiciem liquat, & liquidatos excrementosos succos vel sensibilibiter, vel per transpirationem fallentem sensum nostrum euacuat; calidi enim proprium est dilatare, & patefacere omnes meatus, ut peculiare sit, & intrinsecum naturæ caloris liquefacere, patefacere, & in halitus resoluere humores, ut hinc sit, quod sexus fœmineus diminuto calore donatus virtutes coquendi, & expellendi habens magis repressas, copiosiora excrementa colligat, quæ deinde partim in lunares purgationes, & partim in glandulas mamillares



millares decumbunt; lac enim in prægnantibus fit, quia menses, qui retinentur ob clausum vterum prægnantis, sunt copiosiores, & crassiores, quam foetus requirat; ideo in glandulas mamillares transmittuntur, ut fiat lac. In non prægnantibus simili ratione lac quoque generatur, quæ est vel ob copiam sanguinis; vel quia singulis mensibus non egreditur, quare sæpissime errare possunt illi, qui ex lacte in mamillis collecto inferunt mulierem vtero gerere, quia re vera sæpe vidimus mulieres suis mensibus carere, tumorem ventris habere, lac quoque esse collectum in mamillis, & ipsas certo credere vtero gerere, attamen transacto nono mense, & decimo mutant sententiam, & cognoscunt non conceptum, sed aliquem alium affectum præter naturam, illas vexare: Quare ex lacte, & quibusdam aliis signis nullum certum indicium habere possumus, nisi coniungantur plura, quæ absolutam syndromen facere possunt.

Ad hæc pulsatio arteriæ gulæ, quæ sit plus iusto manifesta, fallere quoque solet obstetrices, quia hæc pulsatio debito crebrior ob multas causas obtigere solet, hinc si ex hoc signo conceptum collegerint, conficiunt paralogismum ex communibus signis, vel ex iis, quæ sunt per accidens, quæ nihil docere possunt: pulsant enim velociter ob retentos menses, ob tumorem splenis, & ob tumorem ventris, atque ob pituitam in pectore collectam: ratio vero huius pulsationis tam manifestæ est, quia dum inspirant, non distenditur valde septum transversum, ut propterea sit anhelitus frequentior, & ex consequenti pulsus celerior, & cum in celeritate arteriarum concitetur calor, propterea arteriæ in maiorem attolluntur mollem ob iugem inspiratum aëtem, & præsertim arteriæ gulæ motus observatur, cum ibi maxima sit arteria, & valde prominat: His igitur constitutis, quis diuinabit ex gulæ arteriæ motu celerissimo, foeminam esse prægnantem, cum isdem effectus à mollia, à tumore splenis, ab hydropico affectu, & à retentis mensibus suboriri videatur.

Amplius aliud circumfertur signum prægnantium, ex eo quod lentigines oriantur in facie mulierum, quod signum neque omnibus, neque semper competit, & per consequens nullum nexum necessarium, & per se cum prægnantibus habet: Nescio mente fingere signa posse rerum naturas ostendere, nisi sint per se secundo, vel quarto modo, in quibus supponitur nexus necessarius passivum cum subiectis, quare quando logicis documentis philosophantes reluctentur, necessario in scopulos impingunt, Aristoteli enim solo logico artificio omnium priscorum sententias torfit: quare cum lentigines nunc sint in prægnantibus, nunc absint, nunc inuadant mulieres ob retentos menses, nunc cacochymas, & melancholicas tantum, nexum necessarium cum vterogere habebunt, quantum luna cum crustaceis.

Præterea, qui ex appetitu deiectionis, atque prostrato, & ex vomitu anre prandium colligunt prægnantem, in eandem vanitatem incidunt, quoniam omnia hæc accidentia fieri possunt ob retentos menses, & ob plures causas præter naturam, sunt in gravidis, quia meliori san-

*Arteria gula  
pulsans plus  
iusto, ergo  
prægnans: pa-  
ralogismus.*

*Superueniunt  
lentigines, er-  
go prægnans  
est mulier:  
consequentia  
nulla.*

*Errant qui  
ex appetitu  
deiectionis, & ex  
vomitu colligunt  
mulieres esse præ-  
gnantes.*

guine fœtus enutritur, & quod deterius est in sanguine, ab utero non attrahitur, sed à facultate expultrice hepatis, & aliarum partium propellitur ad ventriculum; unde vomitus, unde appetitus prostratio; & si contingit, quod venæ sint refertæ sanguine melancholico terrestri, & humor iste terrestris trāsmissa tur in ventriculum, & os ipsius coinquinat, excitatur pica, seu *μαλακία*, si verò sunt refertæ biliosus humoribus, qui trāsmissantur in ventriculum, vomitus, & aliquando cardialgiæ consurgunt; eadem tamen excitantur symptomata aliquando ob menses suppressos, & ob multas alias causas.

Amplius sæpe decipiuntur, dum ex tumefactis mamillis, & à fusco colore capitum mamillarum conceptum colligunt, quod argumentum neque est ex propriis, neque ex communibus signis ad cognitionem conferentibus, quoniam sunt extranea, & sine aliquo fructu æqui uocam intelligentiam pariunt, quia tumefactæ mamillæ, & capita fusca sūt communia retentis mensibus, & prægnantibus.

Decipiuntur quoque, dum ex pondere circa pectem grauidationem colligunt; quia in retentis mensibus, in mollia, & in velicæ calculo pondus illud obseruatur: Idem colligunt conceptum ex eo, quod venter, dum mulier anhelitum trahit, non multum detumescat, quod signum sanè non solum grauidis, sed omnibus ventris tumoribus, & plurimis aliis morbis superuenire potest, & præcipuè iis, quibus colligitur inter peritoneum, & omentum mala humorum soboles, vel flatus hypocondriacus.

*Ve cognoscatur impossu-  
ra obstetriciū  
tangentium  
uterum.*

Porro sunt obstetrices, quæ, dum in dies magis egreditur vmbilicus, & maior quadit, pollicentur conceptum, quippe à quibus, & quot causis præter naturam prominere possit, ex dictis superius faciliè est videre.

Postremò dicunt nonnulli prægnantem cognosci ex tumefactis venis illis, quæ videntur in narium angulis iuxta lachrymalia, dicuntque illas venulas magis apparere, quia partes infernæ, & vena cava à conceptu comprimuntur, unde sanguis supernas partes excurrrens inflat venas frontis, & præcipuè illas angulares, in quibus copiosus sanguis commodius colligi potest, quod signum cum insequatur abdomen compressum, & compressio fieri possit à fetu, à mensibus retentis, & à quolibet abdominis vel splenis tumore, signum nullum erit.

*Quod obstetrices tangentes uterum digitis nullo modo  
cognoscere possint prægnantem.*

#### CAPIT. XXX.

**M**ULTI omisis omnibus signis conceptus confugiunt ad obstetrices tanquam ad summos iudices, quæ digitis experiantur, an uteri orificium clausum sit; quoniam si ab ipsis inueniretur occlusum, merito non esset amplius de conceptu dubitandum; In hoc ta-  
men



men munere obeundo fallaces istæ mulierculæ, cum optime sciant, hoc ab illis non posse cognosci, an sit uterus clausus, quamuis manibus internas illas partes tractent, nihilominus, qua de re sua agitur, profirentur palam hoc ab illis perfectè cognosci, quarum obstetricum impostura non modo cognosci potest ab iis, qui arte anatomica sunt exculsi, verum etiam à quolibet viro vegeti ingenio prædito, quoniam si seorsum multæ conuocentur obstetrices, ut tangant vteri orificium an sit occlusum, facilius omnes cognoscent verba ipsarum ab animo dissentire, quia loquentes titubant, & ipsarum sententiæ contrariæ obseruantur, quod est certissimum inscitæ, & imposturæ signum; periti verò anatomia altioribus principiis cognoscunt, orificium vteri in parte, ubi tangitur ab obstetrice, non posse claudi, sed ita apertum cōseruari, sicuti erat in muliere antequam vtero gereret, quia in prægnantibus solum in parte intima, est obstructum à quodam mucilaginoso infarctu, qui adeo conglobatur, & vteri foramen illud intimum operit, ut iure Gal. dixerit de prægnante, quod adeo orificium vteri internum illud, quod videlicet nullo modo digitis tangi potest, sit clausum, quod acuum cuspides non peruaderent. Hoc vero quod diximus de vteri orificio, possumus experiri in brutis animantibus, & præcipuè in capris foetum gerentibus, quas si disseccabimus, in parte vteri interna iuxta orificium obseruabimus floccum quandam mucilaginosum cooperientem, & velantem totum vteri orificium sine aliqua orificij clausura, quare vanissimum erit credere labia ceruicis matricis coalescere, & claudi, cum semper tam in prægnante, quam in nõ prægnante aperta, & reclusa sint. Si quis vero non crederet, eat, & experietur in mulieribus prægnantibus, quia propriis manibus inueniet in vuluæ apice particulam quandam oblongam, & duriusculam, quæ exprimit exigui penis puerorum imaginem, quæ si pene humano confricatur, vel digitis tractetur, concitantur mulieres ad semen eiacularandum, sed non ocyus astra, vel ocyus æstro, ut dicit Columbus, profluet semen, sed breui aliquo temporis interuallo; in hac igitur parte oblonga, & duriuscula explorabit orificium vteri, & idem foramen inueniet eodem modo conformatum in prægnante, perinde ac in non prægnante: magna ergo sine dubio erit obstetricum inscitia, vel impostura, dum ope digitorum manus profitentur cognoscere, an uterus occlusus sit, cum semper in externa parte maneat apertus. Et multo maior erit nonnullorum medicorum inscitia, qui spreta anatomia deferunt hoc negotium summi momenti sordidis hisce obstetricibus.

Præterea aliud circumfertur signum, quod mulier iam conceperit, si in coeundo contigerit, coeuntem percepisse ab orificio matricis penem fuisse constructum, colliguntque ex illa penis coarctatione sperma ab vtero fuisse receptum, vnde conceptus habuerit initium, quod vteri conditionibus non potest conuenire, quoniam orificium vteri nullo modo in coeundo aperiri potest, ut amplectatur penem; causa vero, cur virga in coeundo aliquando constringatur, prouenit à sensu vuluæ carunculis, quas nymphas vocant, quæ carunculae inflantur, &

*Vi errant,  
qui dicunt  
orificium v-  
teri prægnā-  
tium claudi.*

*Quomodo  
inueniatur  
vteri orificiū  
in viuente.*

Cur in  
coëundo con-  
stringatur  
penis.

tumescunt, ut tumer penis, & inflata penem coarctant: signum verò certissimum, quod constrictiones illæ non fiant ab orificio vteri, colligitur ex hoc, quia si coitus exercetur cum prægnante (cuius vteri orificium ex omnium consensu aperiri non potest) eadem constrictiones, vel coarctationes virgæ in coëundo aliquando obseruantur, quare vanissimum erit illud signum, quod ex constrictione illa penis desumi possit argumentum, quod ab vtero sperma sit attractum, & inde conceperit mulier.

*Ut errant, qui freti auctoritate Hippocratis dicunt conceptum  
cognoscet, si post cœnam, epoto hydromelle, sequantur  
tormina.*

#### C A P U T XXXI.

**P**LRIMI medicorum prætentur cognoscere prægnantem, si post cœnam, epoto hydromelle, inde mulier tormina ventris sentiat; desumuntque ab Hippocrate sect. 5. aph. 41. vbi hac verborum serie videtur docere quomodo cognosci possit mulier vtero gerens, si velis noscere, an conceperit mulier, cum dormitura est, ei aquam mulsam potandam da, & si alui tormina parietur, concepit, sin minus non concepit. Galenus in commento reddens rationem huius aphorismi, dicit, ob conceptum fieri angustationem, ut flatus qui fiunt ab hydromelle promeare non possint, unde flatus retenti distendentes ventrem sunt illi, qui tormina faciunt, subditque Galenus reddens rationem, cur à sumpta cœna, & non ante debeat dari hydromel, dicit ut magis manifestè obseruentur tormina, quia si fuerit epotus à cœna, duæ concurrent causæ angustationis, altera ob cibum replentem, altera vero ob conceptum comprimentem ventrem: Cæterum quantum robore polleat hoc signum, ex superius dictis quisque cognoscere poterit, quia non solum conceptus comprimit ventrem, sed mola, menses suppressi, tumores internorum viscerum, sicuti sunt tumores splenis, hepatis, & demum tumores musculorum abdominis, & plurimi alij affectus sunt, qui comprimunt, & coarctant ventrem, ob quas causas hydromel liberè non transiens pariat flatus, & tormina inde sequantur: Quomodo igitur erit proprium prægnantium à cœna sumpto hydromelle tormina fieri, si æque in hominibus, ac in mulieribus hydromel aliquando tormina excitet? numquid homines fortasse possunt vtero gerere? & ex alia parte interdum obseruatur in prægnante hydromel nullo modo tormina facere.

Videns propterea Auicennas experimentum hydromellis pollicitis Hippocratis frustrari, animaduertit hydromel non facere tormina in illis prægnantibus, quæ sunt assuetæ potioni hydromellis; ab assuetis enim non fit passio. Quæ Auicennæ expositio est inuolvens, quoniam



niam in non assuetis prægnantibus, & non prægnantibus mellicratum excitare solet tormina, quomodo ergo poterimus distinguere mulieres prægnantes ab aliis, quando æquæ ob potionem mullæ, seu hydromellis torminibus lacerentur?

Alij quoque videntes Hippocratis aphorismum non esse æternæ veritatis, conantur interpretari alio modo aphorismum, dicentes, mellicratum in vtero gerentibus solum vermina, seu tormina intestinorum excitare, si aqua pluuiali conficeretur, quæ expositio experientiae non respondet; cum non semel sim expertus mellicratum hoc modo paratum in prægnantibus iis, quæ tamen non sunt assuetæ huic potioni, nihilominus in iis mulieribus tormina nulla à me obseruata fuisse.

Alio modo igitur est aphorismus Hippocratis à nobis interpretandus, dicendo cum Galeno aphorismos aliquos non esse æternæ veritatis, sed magna ex parte esse veros: quæ Galeni sententia habetur in commento aphorismi 58. sextæ sectionis, vbi Hippocrates dicit, Si Omentum exciderit, necessario computrescat: Galenus in commento habet hæc verba, si aliquis viderit omentum, quod pauco tempore extra prodierit, & fuisse reductum ad suum locum, & non putruisse ostendit ille non esse perpetuo veram sententiam Hippocratis, sed non tollit, quod magna ex parte vera sit: audias deinde Galeni verba, quæ sequuntur; commune est huic aphorismo, & aliis, ut perpetuum ex figura dictionis ostendatur, quamuis res ipsæ non semper eodem modo eueniant, sed licet raro, interdum etiam aliter accidar, quare Galenus fatetur hunc aphorismum non esse perpetuæ veritatis, quod videlicet quamuis omentum excidar, non necessario, & semper putrescat; quamuis clarissime loquatur Hippocrates, quia dicit, si omentum exciderit, id est, necessario computrescat; adeo enim Galenus constanter credidit plures aphorismos non esse æternæ veritatis, quamuis magna ex parte veri sint, ut voluerit aliquo modo relutari Hippocrati, dicens, non necessario excisum omentum computrescere: quanto magis etiam nos æmulantes Galenum, poterimus interpretari illos aphorismos, qui perpetuo experientiae non coherent, sicuti est ille de hydromelle, & ille de suffitu aromatum pro cognoscendis prægnantibus, poterimus inquam interpretari, ut plurimum esse verum hydromel sumptum à cæna excitare tormina in prægnantibus; sed non semper; quare si non semper verus erit aphorismus, non erit inter signa perpetua collocandus, quæ sola nos ab initio inquirenda proposuimus.

Verigitur confirmemus hanc nostram sententiam à Galeno desumptam, quod nimirum satis sit aliquos aphorismos esse veros, ut plurimum, & omnes non esse æternæ veritatis; aliquos afferamus in medium similes; numquid æternæ veritatis est ille 41. quintæ sectionis, dum dicit, si mulier grandida marem gerit, est coloratior, si feminam decolor, quis defenderet hunc aphorismum semper esse verum? quod vidimus feminas prægnantes marium decolorari, & feminarum co-

Probatu  
Galeno ali-  
quos apho-  
rismos Hip-  
pocratis non  
esse semper  
veros.

cc

cc

cc

cc

cc

cc

loratiores. Similiter 5. sectione aph. 31. si mulier grauida morbo quopiam acuto corripitur, esse lethale, quis defenderet hunc? quis non vidit aliquando grauidas acuto & peracuto affectas morbo sæpe euasisse? Ad hæc 4. aphorismo, 79. habet, quibus in vrina subsident sabulosa, iis vesica calculo laborat: nemo sane mentis defenderet hunc aphorismum esse perpetuò verum, cum sæpissime obseruetur sabulosa subsidentia sine calculi suspitione: similiter 4. sectio. aphor. 70. quibus vrinæ turbatae vt iumentorum, iis dolor capitis vel adest, vel aderit. Quid prohibet dolores capitis neque adesse, nec venturos esse, quando spiritus ille igneus in venis ardens, & massam sanguineam turbans non obreperet in caput, sed in vrinam totus ignitus spiritus contenderet? vt sæpè vidimus ægrotantes cum vrinis subiugalibus, qui nunquam in tota illa ægitudine passi sint dolores capitis: Ecce quàm sæpè Hippocratis sententiæ non sunt æternæ veritatis. Quare, vt iterum redeamus ad hydromellem, & ad suffitum aromaticum, negamus hydromellem sumptum post cœnam semper in prægnantibus tormina facere posse.

*Errant qui  
per suffitum  
aromaticum  
prægnantem  
cognoscunt.*

Similiratione negamus odorem aromaticum per suffitum administrandum per pudenda in non prægnantibus posse ad nares semper excurrere; quoniam claudi possunt meatus vteri non solum à conceptu, sed à mola, à retentis mensibus, à pinguedine, à tumoribus, & à sexcentis aliis causis, sicuti experientia cognoscere possumus.

### *Quomodo per syndromem cognoscatur conceptus occultus.*

#### CAPVT XXXII.

**C**ÆTERVM quid post tot signa communia minimè concludentia dici potest, vt conceptum occultum cognoscamus; arbitror, quod inter cæteros modos cognoscendi prægnantem, methodus, quæ fieri possit per syndromem signorum perpetuò inhærentium sit illa, quæ nos commodè ducere possit ad huius cognitionis apicem: Signa verò, quæ sufficientissimam hanc syndromem constituere possunt, omnia sunt desumenda tum ab antecedentibus necessariis, tum ab iis, quæ necessario consequuntur conceptum: antecedentia verò omnia, quæ necessario ad concipiendum concurrunt, reducuntur ad causam efficientem externam, quæ consistit in viro fœcundo, & ad corpus mulieris dispositum ad conceptum formandum; quam fœcunditatem viri, seu mulieris, si certis quibusdam signis cognoscamus, & cum aliis quibusdam signis necessario insequentibus coniungamus, infallibilem sine dubio cognitionem conceptus consequi poterimus: Signa verò, quæ necessario consequuntur, duo mihi videntur sufficere ad hanc cognitionem, vt primum sit præcognoscere an orificium vteri internū sit obcuratum (vt diximus) si vero illo mucilaginoso, quod mûchèchita infra proponenda est cognoscendum, quia hoc signū perpetuò



petuū insequitur vtero gerentem, quinimo quando cōtingeret, quod orificium vteri illud internum esset diminutū obturatum, necessario esset expectandus abortus; secundum signum consequens cōceptum est aliquis ventris tumor, qui tamen diligenter est obseruandus, cum interdum vix cognosci possit: hæc igitur sunt signa necessario consequentia conceptum, vt valeant consequentia, est conceptus, ergo orificium vteri internum est obturatum; est conceptus, ergo aliquis tumor, non tamen valent istæ, est conceptus, ergo menses sunt suppressi, ergo lac incipit apparere in mammillis, ergo mammillæ tumescere incipiunt, ergo pulsant plus iusto iuguli arteriæ, & alia similia in superioribus capitibus reiecta, quæ vt plurimum, sed non necessario insequuntur conceptum.

Colligamus ergo breuiter signa, quæ sufficientissimam syndromen facere possunt & in primis à causa efficiente externa, probantes prius virum illius mulieris esse fecundum; signa igitur fecunditatis ab aliquo ex tribus iis fontibus sunt colligenda; à primo, quod aliàs expertus sit fecunditatem, vel quando non esset expertus, à secundo colligere saltem possumus, quod à fecundissima prole ducat originem; à tertio quod tali pacto sit constitutus, vt in hoc munere obeundo nihil appareat deficiens: Simili modo cognoscemus corpus mulieris esse dispositus ad conceptus formandos, vel quia aliàs passa sit cōceptum, vel secundo, quod à fecundissimo stipite ortum trahat; vel demum nullum cognoscatur impedimentum in muliere ad hoc munus præstandum; impedimenta varia sunt, vt ætas senilis, vel puerilis, vel tali modo sit constituta, vt nunquam habuerit menses, & alia plura.

A consequentibus colligimus illa duo enarrata, tumorem videlicet aliquem ventris, & orificium vteri internum flocco illo obfactum, quæ nos certissimos reddere possunt esse prægnantem: Quare tumorem obseruare possumus rectè inspicientes mulierem stantem, vel ambulantem, & ubi videbimus ventrem eo modo tumidum, & tensum, vt proportionem quadam tumor ad mammas vsque euectus sit, tunc ex hoc aspectu totius ventris, si cætera antecedentia, & consequentia nō reluctentur, magnum sumere poterimus argumentum, quod illa mulier necessario vtero gerat.

Aliud signum, quod necessario cōsequitur grauidationem, & quod vnice ferè demonstrat, est summa cum diligentia prius inquirere, an orificium internum vteri sit occlusum; non enim cognoscitur per relationem obstetricum tangentium partem externam vteri, quæ nos fallunt, & decipiunt, vt superius ostendimus: quia in parte illa externa, quæ in viuente tangi potest, perpetuò manet apertum orificium tam in prægnante, quàm in non prægnante, vt omnes sciunt, qui diligenti anatomia sunt exculi: sed cum intrinsecum vteri orificium in prægnante sit solum occlusum (vt diximus) flocco illo mucilaginoso, illud est inquirendum, quoniam quando aliquo ingenio possemus percipere, quod sit occlusum, coniungentes deinde hoc signum cum antecedentibus, in certissimam cognitionem ducemur, mulierem il-

*Quomodo  
virtute mi-  
trenchita co-  
gnoscere pos-  
simus oculum  
conceptum.*

lam vterogere. Ergo autem cum diu mecum cogitasset quomodo  
possemus perfecte scire, quando esset clausum officium illud inter-  
num; inueni nos posse ad hanc cognitionem peruenire auxilio mi-  
trenchitæ accommodatæ, quod instrumentum apud veteres erat vel  
maximè in vsu, quando liquores volebant in vterum iniicere; ad hoc  
igitur cognoscendum sumimus hanc mitrenchitæ ad hunc vsum ac-  
commodatam, cuius apicem immittimus in foramen externum vteri  
summa cum dexteritate, in primis oportet digito indice sinistrae ma-  
nus inuenire foramen illud externum vteri, quod tamen non quilibet  
inexpertus inuenire sciet, quo inuento firmatur digitus iuxta orifi-  
cium vteri, ut volentes dextra manu specilli, vel mitrenchitæ nostræ  
apicem immittere, non erremus, apice deinde specilli immisso, statim  
exprimitur liquor aliquis suauissimus, sicuti esset vini tenuissimi pau-  
xillum, ne forte conceptu existente aliquis sequatur abortus, quo ex-  
presso hoc modo cognoscemus si est obstratum, quia si leuè aliquod  
fastidium post expressum liquorem perueniet mulier, tunc, ut expe-  
riencia cognoui, illa non erit prægnans, quia hæc de causa fastidium  
perferre arbitror; quoniam liquor penetrat in vterum, & vellicat pa-  
rum partem illam maximo sensu donatam; si vero post impulsam vini  
exiguam portionem mulier nihil perferat, tunc erit occlusus vterus,  
& per consequens erit prægnans. De cuius specilli, & mitrenchitæ  
schemate in proprio libro de instrumentis medicis nouiter à me in-  
uentis diffusè agemus, quem librum post hæc imprimendum duxi;  
concludimus ergo hæc signa, quæ colliguntur à causa efficiente, & à  
corpore disposito mulieris coniungantur cum iis, quæ necessario con-  
sequuntur, fore, ut nos certissimam conceptus quantumvis occultum  
cognitionem consequamur.

*Quomodo ex signis non necessariò consequentibus conceptum,  
possimus prægnantem cognoscere.*

### CAPUT XXXIII.

**P**RÆSTAT hic aliam methodum proponere, qua per signa non ne-  
cessariò insequentia possumus prægnantem cognoscere; quoniam  
ut plurimum conceptus supponit retentos menses, vomitus, appetitus  
deprauatos, & similia iam superius enarrata; arbitror ex iis signis quor-  
que nos posse in conceptus cognitionem peruenire, si argumento ex  
sufficienti par. enumeratione cum aliqua demonstratione coniuncto  
signa illa communia expurgemus, & omnem abiciamus contingen-  
tiam, dicentes, sunt suppressi menses, ergo vel ob inopiam sanguinis,  
vel ob tumorem aliquem præter naturam comprimentem, vel ob ni-  
miam pinguedinem, vel ob crassos & viscidos humores obstruentes,  
vel ob nimiam copiam insipientem meatus, ut fluere non possit lan-  
guis; probes deinde an ob inopiam sanguinis illud accidere possit, cum  
sanguinis



Sanguinis penuriæ signa satis sint manifesta ; & si non inuenieris illud euenire ob sanguinis inopiam , excutias deinde an ob tumorem præter naturam comprimentem, vel propter alias causas non naturales, quas cognoscere poteris vniuersas virtute methodi traditæ in capite 6. huius primi libri, vbi omnia symptomata docuimus quomodo reducantur ad vnũ, quod sit in factis esse; ea vero methodo vti hoc pacto poteris, omne retentum immodicè supponere actionem expultricem læsam, & hæc functio expultrix, vel entia læa ob facultatem, & constitutionem læsam , vel ob errorem externum, facultas, vel constitutio lædens expultricem per se , si est in similibus, debet esse intemperies sicca, si in dissimilibus , angustia; deinde signa angustia omnia sunt consideranda, quæ tradita sunt capite 7. citato, quare quando inuenies non esse ob causas morificas, tunc poteris inferre suppressos esse menses ob conceptum; id quod diximus de suppressis mensibus, idem dicendum de lacte mammillis infidente , de appetitu mulierum deprauato; quæ omnia signa licet de omni non prædicentur, cum omnibus prægnantibus non competant , attamen adeo coarctare possunt conceptum, vt certum ex illis signis quoque indicium colligere possimus, mulieres nimium vtero gerere.

Ex his enarratis in hoc libro poterimus omnes affectuum præter naturam ideas, vel formas genericas occultas inuenire , quia in exordio libri diuisionem omnium morborum, & omnium symptomatum tradidimus; deinde ostendimus viam diuisiuam per se solam in cognoscendis affectuum formis occultis esse manentem , & diminutam, cum processus diuisiuus semper sit cum principij petitione. Erat igitur necessarium, vt inueniremus occulta, vtiens philosophari; ideo incepimus capite 6. methodum tradere , qua possemus non solum omnium symptomatum coordinationes cognoscere, sed omnium affectuum, qui sunt in fieri primas radices per symptomata propria penetrare, cuius mirabilis methodi resolutiuæ virtute ad quemlibet genericum affectum cognoscendum peruenire possumus. Deinceps capite 8. tractauimus de methodo magis particulari, & quæ nos per signa propria ducere posset ad reconditos affectus cognoscendos , in qua methodo quinque proponebantur fontes, in quibus omnes morborum proprietates conuertibiles, quæ ab humana mente cognosci possunt collocabantur; sed quoniam per sæpe signa propria morborum delitescunt, vt in centum internis affectibus vix vnicus sit, qui per vnicum proprium signum cognoscatur , huc totam curam totamque diligentiam inflectimus , vt methodum de signis communibus per syndromem à sex fontibus colligendis inueniremus , qua perpetuo in omni affectu recondito nobis posset formas , & ideas morborum aperire , & ob oculos collocare , quæ deinde inuenta nouem affectibus præter naturam internis, & occultis applicauimus , & ostendimus solum per sex illos fontes nos potuisse ad tam occultos affectus peruenire; demum exemplis illustrata, exempla errorum Empyricorum in quouis affectuum genere, qui sine hac methodo incidunt, reicienda proposuimus, vt il-

*Epilogus.*

lis erroribus elisis, eadem methodus infinitos alios, qui fieri possunt in affectum ideis, aperiret : & tandem ostendimus nos per eandem syndromem signorum procedere ad cognoscendum conceptum occultum, ut ostenderemus mirabilem hanc methodum non solum conferre ad cognoscendos affectus præter naturam; verum etiam ad illos, qui inter limites sanitatis continentur, ut nullus error committi possit in cognoscendis morborum, & symptomatum ideis, qui traditis methodis perfectè non cognoscatur.

Finis Primi Libri.







# SANCTORII

## SANCTORII

Iustinopolitani

### METHODI VITANDORVM

*errorum in affectuum Sympathia, &*

*Idiopathia perquirenda.*

### LIBER SECVNDVS.

*Quod qualibet corporis pars modo per essentiam, modo per consensum affici possit.*

#### CAPVT I.



VM in primo libro methodum pro vitandis erroribus, qui fieri possunt in formis, & ideis affectuum genericis præter naturam indagandis tradiderimus, cuius traditæ Methodi virtute nos sanè omnes morborum, & symptomatum formas, quæ agrotantes vniuersos lacerare possunt, hætenus cognoscere valemus; Sequitur in præsentia, vt aliquam inueniamus methodum, quæ tenebras has discutiat, & quæ nos perfectè edocere valeat, quando istæ affectuum formæ iam traditæ corporis particulis per se, & quando per consensum competant: etenim re vera pro hauriendis indicationibus non satis est scire tantum has formas, vel ideas affectuum, nisi præterea sciamus an per consensum, vel per essentiam hæ morborum ideæ miseris premant patientes, quia possumus asse qui affectum aliquem perturbantem ventriculum, caput, & alias partes, per hypothelium esse discrasiam calidam, & siccam; verum, an hæc ca-

lida intemperies sit per consensum in ventriculo, & in quavis alia parte, vel per essentiam; atque an affectus per essentiam sit prothopathia, vel idiopathia, hactenus re vera hoc nos latet, & tenebrarum vallo est obuolutum.

Exordiemur ergo à diuisione affectionum per essentiam, & per sympathiam, & has per sympathiam, siue per consensum in suas species diuidemus; & hinc accedemus ad hanc exoptatam methodum, quæ docebit quando, & quomodo affectus sint per essentiam, & quando, & quomodo per consensum; & tandem, vt hæc methodus exemplorum luce magis splendeat, plurima Empyricorum errata, & præcipuè anatomica subnectemus, quibus ostenderetur, methodo hac spoliatos ad tantam cognitionem de Idiopathia, & Sympathia se eleuare non potuisse. Et hoc est supremum illud caput in proemio huius voluminis propositum inquirendum, ad quod innumerabiles nostratum errores redigi possunt, dum per sæpè falluntur in contemplatione formarum, credentes ægum morbo aliquo per essentiam vexari, cum tamen affectus ille sit per consensum, & sympathiam alterius labefactæ partis. Nemo in ægitudinem prolabitur, quin cadat in varias affectuum ideas, tanta in hoc nostro corpore est harmonia, & partium consensus; si aliqua pars est læsa, eadem exemplo, vel paulò post plerâsque plures in consortium allicere solet; labefactetur aliquod viscus, sit ventriculus, sit iecur, sit caput, sint denique ex illis, quæ non ita principem locum tenent, protinus variæ in consensum ob hanc summam partium sympathiam cadere videntur, vnde diuersas in quolibet ægotante mixturas affectionum suboriri vidimus; propterea quæ in tanta affectuum confusione per se, quæ per accidens partibus nostri corporis conueniant, & quæ primo, & quæ per consensum, hoc talem inquisitionem efflagitat, vt nisi considerationis huiusce cardinem prius consequamur, affectuum curatio, vel notitia implicita, & inextricabilis reddatur, & milles tunc medendo in laqueos incidemus, & ægrotos ad exitum vsque deuerberare per sæpè poterimus.

Sed quoniam in hac contemplatione hoc est sumendum pro principio, quod omnes partes corporis nostri lædi possint vel vitio proprio, vel alieno, aliqua lucidioris doctrinæ gratia in hoc capite sunt afferenda exempla de visceribus passim à Galeno proposita, quod quælibet affici possint modo per essentiam, modo per consensum; quoniam exemplorum luce rudiores adipisci omnium artium fastigium, & per hanc semitam ocyus ad exoptatum terminum peruenire poterunt; proponamus exemplum de ventriculo desumptum à Galeno s. de loc. aff. i. dum habet congeruntur excrementa in ventriculo tum eius vitio, tum vitio aliorum viscerum: cum male habente liene ichores melancholici possint in ventriculum confluere, & symptomata melancholica excitare: tunc si quis ventriculo totis horis medellam adiungeret, cum in ipso affectio sit in fieri, & dependens, & in consortium à splene trahatur, tempus prorsus contereret: Similiter dum corrumpuntur edulia in ventriculo ob aliundè transiissum succum, nul-

læxi-

*Cur, qui in aliquam ægitudinem labuntur, in plures alias deinde incidant.*

*Ostenditur omnes corporis partes lædi vel vitio proprio, vel alieno.*

22  
23  
24



la existente noxa in ipsius tunicis, sed simili succorum diluue perenni motu foueatur, quam medellam stomacho adiungere poteris? nisi fixam in aliis partibus radicem elidas, atque euellas; audias Galenum de generalissimis differentiis corruptionis ciborum primo de loc. aff. 3. has generalissimas differentiis corruptionis ciborum, vel per proprios morbos ventriculi, vel à vitiosis humoribus; vel ab alimentorum qualitate fieri; quam Galeni præceptionem applicare quoque possumus cuilibet parti læsæ; quoniam quæcunque corporis pars correpta sit, illud accidit, vel quia à proprio morbo lædatur, vel quia ab humore accumulato, vel ab alia corporis parte transmissa illa læsio partis dependeat, vel à causis procatarteticis; ut oculos vigiles in omni afflictione habere præstet in has tres differentiis, & illas expendere, & ad ipsas totum reuocare examen, quoniam sub iis omnis mala valetudo, sit propria, sit per consensum, continetur: Sed alia conferamus exempla, ut est in more nostro, quoniam video singularium lumine ad doctrinam vniuersalium expeditius euehi nos posse, & studiosos ad apicem huius considerationis melius deferri: afferamus Galeni testimonium in exemplo de cerebro 2. de differentiis feb. ultimo, dum habet, aliquando caput nil pati, sed catarrhum fieri ob sanguinem viriatum: tunc caput cum omni propria affectione spoliaturum sit, si omnia auxilia medica, quæ sunt sub orbe lunæ, capiti adiungeres tuis irritis frustrare polliceris, quia affectus in fieri tantum potest tolli, quantum umbra non ablato corpore, quod dictum, & factum est impossibile: Postremo ne prætermittamus hepar, quod quam læpissimè in consensum aliarum partium corporis degenerat, afferamus locum Galeni 3. de loc. aff. ubi sympathiam vicinitatis cognoscemus, ostendentes quomodo afficiatur hepar per consensum vicinarum partium, hoc verborum ornatu refert Galenus, hepar afficitur per consensum vel lienis causa, vel ventriculi, vel intestinorum, & maxime causa ieiunij; & mesentericæ venæ habituali intemperie refrigerare possunt omnes venas simarum partium iecoris, unde intemperies peruenit ad totum iecur. Dum per consensum à pulmone, vel à septo transverso, vel à rene primo, quæ in gibba afficitur, & tractu temporis totum iecur, & nemo inficiabitur, nisi sit natura contentiosus, & indoctus: per hæc exempla eleuari nos possumus ad cognitionem affectuum per consensum, qui contingere possunt in qualibet corporis particula, cum à Galeno sit hepar, tamquam exemplar propositum affectionum, quas per consensum à partibus circumiacentibus recipere potest: Quoniam respiciens ad consensum vicinitatis dixit, quod lien, ventriculus, mesenterium, & intestina, partem hepatis concavam ledere possunt: pulmo verò, renes, & diaphragma partem conuexam in sympathiam trahere valent: ad eundem prorsus modum, & cò expeditius cetera viscera, & cetera corporis partes, quæ non tanto pollent valore poterunt quoque uersum à partibus vicinis læsis malè vetiti, & totam malam sortem vicinarum partium suscipere: sed quoniam consensus multifariam sit, cum diuersorum generum existat; iactò hoc fundamento, quod quælibet cor-

poris particula ex se sana possit infortunium aliarum partium suscipere, & alieno morbo iactari; præstat in sequenti capite proprios affectus, siue idiopathias (quod in idem recidit) in suas partiri species; & sympathias ad eundem modum diuidere in suas differentias, ut deinde methodo certiori venari possimus specificas affectuum differentias in quouis ægrotante contingentes.

*De Diuisione propriorum affectuum in affectus per essentiam tantum, & in affectus per essentiam, & per consensum simul.*

## CAPVT II.

*Idiopathia  
alia est cum  
dependentia,  
alia sine de-  
pendentia.*

COMPERTVM est ergo vniuersas nostri corporis partes affligi posse, vel propria affectione, vel aliena, quæ vocatur per consensum: præstat hic breuibus exordiri à propriorum affectuum diuisione: Dicimus ergo propriam affectionem, quam Græci idiopathiam vocant, partiri in propriam cum dependentia, quæ partim sit facta, & partim fiat, vel in propriam sine dependentia, quæ solum sit facta, quam primariam affectionem seu protopathiam appellant: quam diuisionem à Gal. 1. de loc. aff. 3. desumplimus; & in hanc nostram iatrolariam collocauimus, de qua Gale. hac verborum serie tradidit litteris:

„ Proprius affectus dicitur idiopathia, quem vocant etiam protopathiam, id est primarium affectum; contingit tamen aliquando, aliquem  
„ simul & per consensum, & propria affectione laborare, cum in affecta  
„ particula per consensum permanens sit dispositio, neq; dicemus ipsam affici primario, sed proprio, & secundo affici. Admonet Galenus diligentissimum esse faciendum examen in affectibus complicatis, cum ferè semper corpora hæc nostra iis complicatis sint perturbata affectionibus, quia modò vidimus in vno, & eodem ægrotante passiones aliquas, quæ omnino sunt in facto esse, & principales, & hæc altas, & separatas agunt radices, quæ à Galenò protopathiæ vocantur.

Admonet ergo Galenus, ut disquiramus in omni affectuum complicatione, quanam sit illa affectio principalis, quæ solum est in facto esse, & ab alia non fouetur, & quæ sit propria, & dependens, quia sine hac cognitione de diagnostica, & therapeutica medicinæ parte actum esset; verbi causa, sit ventriculus intemperie obsessus frigida, causa fouens sint recrementa frigida, & pituitosa à capite in ventriculum procumbentia, quæ tractu temporis adeo refrigerent, ut affectum proprium in ventriculo constituent, tunc intemperies ventriculi dicitur propria, sed partim in facto esse, & partim in fieri, vel partim per se, & partim per consensum, quod idem est. Cerebri verò affectio vocabitur protopathia; quia solum est in facto esse, & independens, & tunc si tractabitur, à qua affectione esset curatio incipienda, sine dubio erit ab illa, quæ est in facto esse, quæ est in cerebro, quia illa est causa fouens, & inde-



independens, vt iure merito protopathia vocetur, alioquin illa ventri  
culi passio redderetur indelebilis.

Hinc Galenus doctissimè pro hac re discurrrens à qua nimirum af-  
fectione in mixtis, & complicatis sit cura incipienda, 4. meth. capite  
4. habet hæc verba, morbus, qui iam permanens est, vel adhuc sit, vel  
non, si adhuc sit (vt videlicet partim sit factus, & adhuc habeat fomē-  
tum quo fiat, & conferuetur) à causa auspiciandum, eamque remouen-  
do, si non amplius sit, ab affectu; & sibi consentiens 7. methodi, si duo  
affectus coniuncti sunt, vt vnus sine altero non auferatur, primo ille  
sine quo alter non tollitur, debet auferri, quam sententiam vbique re-  
petit; & præcipuè in arte medicinali in vltima parte, dicens prius esse  
causam fouentem tollendam: verbi causa fiet catarrhus ob sanguinis  
acrimoniam, & à capite pulsus obreper in artus, in pectus, & in alias  
partes; tunc non est rationi consonum, vt confugas in illa pectoris  
affectione ad penidia, ad liquiritiam, & ad cetera expectorantia, vt est  
in more Empyricorum, qui nunquam, nisi fortuito protopathiam co-  
gnoscunt, quia irritum redderes negotium, & numquam curares; qua-  
re par est tunc ad protopathiam confugere, quod esset corrigere aci-  
moniam sanguinis, & viscerum calorem compescere, & demulcere,  
vnde tora proluuius suum trahere videtur exordium. Cæterum cum  
materies hæc vniuersa vberimè tractanda sit in libro de indicantium  
æquilibrio, ac in proprio loco, & multis exemplis ibi sit illustrata, non  
est, vt de hac re in præsentia vltèrius prouehamur cum satis sit hic col-  
ligere, affectus proprios alios esse tantum in facto esse, & principales;  
alios vero in facto esse, & in fieri, & curationem esse incipiendam à  
principali, & independenti affectione, quam Græci protopathiam vo-  
cant.

*In mixtis af-  
fectionibus à  
quo affectum  
sit curatio  
incipi. nda.*

*Cur nesciant  
Empyrici cu-  
rare catarr-  
hum.*

*Methodus breuissima qua in cognitionem affectuum propriorum  
principalem, & per consensum ducamur.*

### CAPVT III.

**I**N præsentia opus est methodum aliquam perquirere, quæ nos do-  
cere possit, quando affectio propria sit principalis, & quando sit de-  
pendens, & per consensum: Quinque igitur mihi videntur constitui  
posse fontes, à quibus colligere possimus tamquam à sufficientissima  
syndrome hoc summi momenti quaesitum.

Vt primus fons, sit habere cognitionem partium primo loco affe-  
ctarum, nam scientes, quæ pars prius læsa fuerit, illico sciemus affe-  
ctionem illius partis esse independentem, & non fieri ab alia affectio-  
ne, & hanc sæpè inueniemus esse prothopathiam, vel principalem af-  
fectionem in illo agrotante: Quomodo autem cognoscatur aliqua  
pars læsa, & quando lædatur, egimus in primo libro, in capite de signis  
locorum affectorum, vnde facillimè possumus colligere, quæ pars sit

*De primo  
fonte vnde  
quo cognos-  
cere possu-  
mus protopa-  
thiam.*

affecta, & quæ primo loco afficiatur. Cæterum quamvis valde conferat ad cognoscendos proprios affectus hæc prima conditio, quæ primum fontem constituit, attamen non sufficit huius primi fontis cognitionem habere, quoniam aliqua corporis particula prius potest lædi, & deinde eadem læsio alteri parti communicari, ut ab hac secundo loco affecta parte plura, & læthalia symptomata possint emergere, quæ nullam fomentationem habeant à parte primo loco læsa, quinimo affectio, quæ est in parte secundo loco læsa sit in facto esse tantum, & independens, & quæ sit principalis in complicatione omnium affectuum, qui esse possunt in illo ægrotante; exempli causa, ventriculus læditur à nimis eduliis, ob quam læsionem caput ingruelcere incipit, & ab ipso capite incipiet salsa destillatio procumbere in pectus, interim inedia, vel aliud leue auxilium illam primariam ventriculi affectionem reprimat, tunc si ageretur de statu illius ægrotantis, & de salsa destillatione; in quem locum constitueres esse protopathiam? non in ventriculo, quamvis primo loco fuerit læsus; quia placido adiuncto auxilio stomachi labes est ferè ablata, ut stomachi illa prima ægri tudo malam valetudinem capitis non amplius foueat; ergo principalis, & independens causa erit in cerebro, quod secundo loco læsum est, valebit tamen consequentia, est affectus partis primo loco læsæ, ergo est independens, sed non possumus semper inferre est affectio partis primo loco læsæ, ergo est principalis; ecce ergo quod præter primam conditionem requiritur alter fons, vel altera potius animaduersio, quæ determinet, & declaret magis hanc affectionem principalem, quam protopathiam vocant.

*De secundo  
fonte ex quo  
protopathia  
cognoscere  
valemus.*

Erit igitur secundus fons, in quo conditiones, & proprietates locorum affectorum collocabimus, sicuti si de salsa destillatione proposita in pectore collecta, discurremus, tunc quamvis ventriculus primo loco sit læsus, attamen non est ventriculi proprium destillationem salisam mouere in pectus, sed est capitis proprium; caput enim ob eius alteratricem læsam potest colligere grandem pituitæ acervum, quippe si diutius moretur, falsedinem recipiat, & inde à capite in pectus procumbat: ecce quod capitis conditio hæc, quæ est in pectus mouere catarrhum, nos quoque ducere potest principalem affectionem: quare non solum conferat ad cognitionem protopathiæ cognoscere, quæ pars primo loco læsa sit, verum etiam cognoscere conditiones, & proprietates viscerum. Amplius, ut aliis abundemus exemplis, sit caput primo loco læsum, & ob destillationem perpetuam tussim faciat, & deinde periculis motus factus à tussi excitet magnum feruorem in partibus naturalibus, & in hepate præcipuè, quod igne ferè emicans redditum sit, & inde diarrhœa incipiat patientem opprimere, tunc nõ satis est percurrere per primam conditionem, quæ est cognoscere partem primo loco læsam, ut cognoscamus principalem affectionem, quia caput est læsum primo loco, attamen non est protopathia in capite, sed in hepate, quare per secundum fontem percurrentes, quod est expendere, quænam sint conditiones, & proprietates partium læsarum, poterimus



terimus potius principalem affectionem assequi: nam sicuti proprium est capitis pellere in pectus humores falsos, sic proprium hepatis est gignere bilem, & inde facere diarrhœam; quare quamvis in hoc egrotante sit læsum primo loco caput, & deinde pectus, & tertio loco iecur, & demum venter; nihilominus omnium horum affectionum principalis erit ille, qui est in hepate, non in aliis partibus.

Sed quia non sufficiunt adhuc hæ duæ conditiones, scire nimirum partem primo loco læsam, & viscerum proprietates, & conditiones, quoniam posset accidere, quod hepar causans diarrhœam propositam haberet fomentum ab aliquo errore externo, vel ab errore alterius visceris, ut propterea hepatis affectio non esset principalis, sed per consensum, & per accidens; propterea requiritur tertius fons, vel tertius animaduersio, quæ nos maximè docere potest protopathiam, quæ in hoc consistit, ut examen instituamus; an affectio illa, de qua agitur sit per se, vel ut clarius loquar, sit in facto esse, & permanens, quia affectio non potest esse principalis, & in facto esse, vel protopathia; nisi sit permanens, & per se, pro qua contemplatione fecimus caput sextum primi libri, ubi docuimus resolvere affectiones omnes in fieri, & dependentes ad affectum aliquem principalem, qui sit in facto esse, vel qui indicat, & medicum allicit; ibi enim ostendimus quo pacto ab infinis, & notissimis symptomatibus, quæ sunt qualitates mutatz, euehi nos posse ad cognitionem exeuntium, & retentorum præter naturam, & ab iis ad actiones læsas, & ab actionibus læis ad constitutiones præter naturam, quæ ex necessitate sunt affectiones propriæ, & quas medicus curare debet, quia sunt permanentes, & in facto esse. Ut hinc decisum sit neminem vocare posse affectum in fieri, principalem, nec proprium; & merito, quia quis vocaret icteritiam, vel fluorem muliebrem, vel gonorrhœam affectus proprios, & per se, vel principales: ratio enim vnica, & singularis est, quia exeuntia non habent proprias radices, cum sint in fieri, & supponant actiones retentrices læsas, à quibus dependent. Similiter, quis vocaret phrenesim, vel epilepsiam, vel tussim, & alios similes affectus, qui sunt in fieri, affectus proprios, & per se, cum pendeant ab alia radice, quæ in partibus similaribus, & dissimilibus sita est: quare cum actum sit in primo libro capite citato de methodo cognoscendi affectus per se, & qui indicant, non est, ut iterum eadem repetamus. Sed quoniam constitutiones partium corporis possunt esse læzæ per se, & simul per accidens, vel per consensum, quod idem est, debemus ut consequamur hanc cognitionem, quando videlicet pars sit læsa tantum per se, & quando per consensum, constitueret alium fontem in quo duo signa collocantur, quæ certo determinant, quando passio sit per se: alterum est temporis diuturnitas, alterum est corporis habitus mollis, & fragilis; temporis diuturnitas requiritur, quia si aliqua pars diutius passa fuerit affectionem aliquam per consensum, consensus versus erit in affectionem propriam seu per essentiam, & per se; deinde requiritur habitus fragilis, & mollis; quoniam si præter diuturnitatem temporis habitus quoque fuerit mollis;

De tertio fonte unde protopathia colligitur.

De quarto fonte, ex quo colligimus protopathia. Temporis diuturnitatem, & habitum mollem ostendere affectum esse per essentiam.

Temporis  
breuitatem,  
& habitum  
fortem signi-  
ficare affectū  
esse per con-  
sensum.

De quinto  
fonte,

affectio sine dubio reddita erit permanens, & per essentiam. Si verò al-  
tera conditio desit, veluti si multo temporis tractu pars corporis affe-  
ctione esset correpta; attamen habitus illius corporis fuerit fortis, cre-  
dendum est ob resistentiam patientis affectionem non esse per essen-  
tiam, quare colligimus temporis diuturnitatem, & habitum mollem  
significare affectionem esse per essentiam, temporis vero breuitatem,  
& habitum fortem significare affectionem esse in fieri, & per con-  
sensum.

Demum cum ad cognitionem affectuum, qui lacerant partes vi-  
uentes per sympathiam, valdè conferat cognitio cuiusque sympathie,  
cōstituiamus quintum fontem, in quo collocare possumus omnes sym-  
pathias, dicentes omnes consensus, vel sympathias fieri, vel propter  
vicinitatem partium, vel secundo per continuitatem partium, qui à  
Gal. vocatur consensus generis, vel tertio propter operis familiarita-  
tem; de qua triplici, sympathia in capite sequenti agemus; expedit er-  
go ad cognoscendas affectiones proprias, & per se & principales, pre-  
ter alias animaduersiones confugere ad inquirendos consensus hos,  
de quibus in præsentī libro diligentissimam faciemus consideratio-  
nem: quoniam quando cognoscemus nullos esse consensus inter par-  
tes aliquas, tunc tractantes nos de affectuum complicatione, quæ af-  
fectio sit principalis, & quæ per consensum, non errabimus; & rem cla-  
ram reddamus exemplis: si contingeret, quod intestina, splen, mesen-  
terium, hepar, & os ventriculi læsa sint, & deinde exurgeret aliquis  
tremor in extrema manu, tunc si ageretur de affectione principali, quæ  
causaret tremorem manus, deberes illico expendere an sit consensus  
inter hepar, mesenterium, intestina, & manus, & quando nullus esse  
consensus, non possemus dicere stomachum esse principaliter affectū;  
vnde tremor manus traheret ortum, in quo casu Lycus valdè errauit,  
quia dicebat à stomacho tremorem manus oriri, cuius sententia reli-  
citur à Galeno, quoniam nullus seruari potest consensus inter ventri-  
culum, & manus, non generis, quoniam tremor pertinet ad facultatē  
motiuam, quæ à stomacho non prodit, cum nullus mittatur neruus à  
stomacho ad manus: non consensus vicinitatis, & tanto minus operis  
familiaritatis: infert ex cognitione sympathiæ Galenus radicem seu  
protopathiam tremoris manus in aliis locis sitam esse, sicuti in verte-  
bris cervicis, vnde mittuntur nerui ad manus; quam cognitionē prin-  
cipalium affectionum, & earum, quæ per consensum fiunt nullo mo-  
do sine anatomia comparare possumus. Quo pacto vero tanta con-  
sensus cognitio sit comparanda, in aliis capitulis omnes cōsensus dif-  
ficiles, tum neruorum, tum musculorum pertractabimus, & infinitos  
ferè Empyricorum errores hac cognitione anatomica adiuti corrige-  
re poterimus. Colligimus ergo nos protopathiam tunc cognoscere,  
quando quinque conspirabunt fontes, vt primus sit cognoscere, quæ  
pars primo loco læsa sit, secundus animaduerrere proprietates partium  
læsarum, tertius sit cognoscere an affectio conueniat per se parti læsæ,  
quod cognoscetur per tertium, & per quartum fontem. Quinto, &  
ultimo



ultimo exactè cognoscemus affectionem esse principalem, quando nullus erit consensus illorum, qui consistunt in vicinitate, in consensu operis familiaritatis, & in consensu generis. ex quibus animaduersionibus promptè admodum affectiones colligemus, quæ sunt in facto esse, & quæ indicant, & quæ sunt principales.

*De diuisione consensus in suas differentias.*

C A P. II. II.

**O**MNIS nostri corporis sympathia, vel consensus à Galeno tum in propria disputatione aduersus Lycum, tum in libde morb. vulg. vbi casum Pythionis declarat, in tres differentias commodè diuiditur, aliam dicit esse sympathiam generis, aliàmque esse operis familiaritatis, & aliam vicinitatis: per sympathiam generis intelligimus illum consensum, qui communicatur alteri parti ob eiusdem partis viuentis cōtinuitatem, sicuti læsa ceruice læditur manus, quoniam neruus vestiēs manum à ceruice dependet, & consensus per eiusdem nerui cōtinuitatem seruatur, & quod dicimus de neruis longis, idem dicendum de musculis longis, & de venis, veluti si ventriculus coquinaretur, vel repleretur ichoribus melancholicis transmissis à splene per surculum venæ portæ, quippe à splene ad ventriculum mittitur; quæ sympathia generis non erat à ventriculi orificio ad manus, vt propterea dicat Galenus, toto cœlo errasse Lycum asseuerantem, tremorem manus à stomacho prodire, cum nullus neruus prodeat à ventriculo in brachia.

*Per qua uasa seruetur sympathia inter splenem & ventriculum.*

Consensum vero, qui fit ob familiaritatem operis, refert Galenus, esse veluti inter uterum, & mammas; & inter omnia viscera, quæ sunt ordinata ad opus aliquod commune; & quamuis dicant aliqui, consensum operis familiaritatis fieri necessario per venas, vel per vasa alia communia sensibilia, & dicant, venas prodeuntes ab utero; & à mammillis vtrinque coire, vt propterea consensus iste, qui dicitur operis familiaritatis in idem recadat cum generis consensu; attamen, qui diligentius anatomiam intuentur, nullos videbunt surculos à mammillis prodeuntes cum uteri venis coalescere; quare consensus operis familiaritatis omnino est distinctus ab aliis; sed quicquid sit de hac re, si quis aliter sentit, non certet nobiscum; sed erigat disputationem aduersus Galenum, & innumerabiles eius asseclas, cum quibus hoc habebit fastidium; nos enim ab ipso recepimus hanc differentiam consensus operis familiaritatis, quamuis nullum vas sensibile commune existat, & meritò, cum possit sympathia per insensibilia vasa seruari.

*Vt errant dicentes consensum operis familiaritatis fieri per vasa communia sensibilia.*

Consensus verò vicinitatis est differentia notissima, quia mutuo consentiunt partes vicinæ tum per meatus sensibiles, tum insensibiles; totum enim corpus est transpirabile, & per vasa nobis latentia natura admodum promptè mouet, vt partes vicinæ, quamuis nulla essent vasa manifesta, vel opus aliquod commune intercederet, videantur ta-

*Quomodo fiat consensus vicinitatis.*

*Ut liberetur  
nobilissima  
Matrona a  
periculo suf-  
fucationis ob  
esum bole-  
torum.*

men quotidie ob viciniam solam sine aliis ductibus manifestis partes alias corporis nostri in sympathiam, quam citissime trahere, sicuti obseruamus inter vesicam, & intestinum rectum, inter intestina, & anchas, inter os ventriculi, & cor, inter stomachum, & pulmonem, magnas esse vicinarum partium sympathias, quamuis nullum vas intercedat commune: numquid in affectibus vesicæ, vel in ischiade enemata varias afferunt opes? & in affectibus cordis, ore ventriculi medicato, cor emolumentum recipit. Sicuti vidimus in Matrona illa præclarissima Sophia priola malis boletis ferè suffocata, quæ animam, ut incœperat, efflasset, nisi oleo è corticibus citri extracto ei præsto fuisset; quia tunc vix respirabat, tantum vix illæ, per quas meare solent spiritus vitales, crassimo malorum boletorum halitu erant occlusæ, atque ore ventriculi illo interno roborato oleo de citro per os assumpto ad quinque guttas, tale indicum fuit robur cordi per partem vicinam, ut crassissimo flatu illius olei virtute secto, atque extincto, eius cor curatum fuerit. Ad eundem modum seruatur consensus inter œtophagum, & trachæam, inter ventriculum, & pectus; quoniam si poculenta frigida, atque glaciata hauriantur, illico tussis ob viciniam excitatur, si ædulia crassa sumantur, orthopneam asthmaticis pollicentur. Simili modo expectorantia, non solum quia laringem emollient, sed etiam, quod postquam in ventriculum regeſta sunt, viis nostrum sensum fallentibus, ob viciniam manus aliquas pectori dare vidimus. Cæterum insudabimus in sequentibus capitulis huius libri potiora aliqua exempla proponere de consensu quolibet, & præcipuè plura ab anatomia desumpta de consensu generis, qui obseruatur in longis musculis, & nervis, & cæteris corporis partibus, vnde ob magnum anatomix fructum nos in cognoscendis causis, & morbis; magnum quoque haurire poterimus emolumentum; sed à nonnullis exemplis auspicabimur de consensu vicinitatis, & operis familiaritatis, quibus explicatis ad sympathiam generis totum discursum dirigemus.

*Errant, dum dicunt magnum iecoris calorem extinguere caliditatem ventriculi, ut lumen maius extinguat minus.*

#### C A P. V.

**O**B iecoris incendium ventriculum calore suo priuari, & inde frigescere, tota propemodum medicorum schola videtur asserere; plurimi enim credunt in vnico homine esse incompatible, quod iecur, & ventriculus simul calida sint, neque alium modum quo id fiat imaginari possunt, nisi quod calor maior extinguat minorem, sicuti lumen maius destruere solet minus, & rationem afferunt; quoniam lumen maius pabulum minoris attrahit, & absumit; vnde minus cadit, & languet: Ad eundem modum dicunt iecur caloris feracissimum omnem ventriculi caliditatem destruere, quatenus ipsius pabulum absumit,



absumit, quo absumpto, deinde languet ventriculi caliditas, sicuti languet candela lumen ob solis praesentiam.

Ceterum, cum haec ventriculi frigida labes ab hepate calidissimo re vera prodeat; & ex altera parte nullus sit consensus inter caliditatem hepatis, & frigiditatem ventriculi, excutienda est materia haec, ut assequi possimus, cur ventriculus imbecillus, & frigidus fiat à caliditate intensa iecoris: Prius tamen par est fundamentum falsum radicatus eue llerere, dum dicunt, quod maior calor tollat minorem, sicuti lumen maius destruit minus, quod fundamentum si de medio leuabimus; deinde plures alios errores consequentes primam hanc radicem ex tempore euellamus; Quod verò lumen minus re vera non patiatur à maiori, sed oculis nostris hoc solummodo appareat, aliquam experimentorum seriem proponamus. Numquid remi pars immerfa in aqua curua videtur? tunc enim decipitur sensus circa sensibile ob impedimentum medij; sic lumen minus coram maiori nobis occultatur, nulla facta mutatione in minori ob medium alteratum; at hoc non dicitur tolli, sed obscurari, & sensibus nostris occultari. Præterea quemadmodum si quis voce summissa canit in loco, ubi quamplurimi clamore obstrepunt, tunc vox illa humilis, quamuis proflus non audiat, attamen ex se non diminuitur, vel de medio tollitur; quinimò in medio viget, & eo modo conseruatur, veluti quando auribus percipitur: Ad eundem modum ubi esset aliquis teter odor in cubiculis, ex templo excitantur vapores, & sumi odorati, neque ultra sensus noster percipit malum odorem; non propterea species noxij odoris, quamuis ab Arabico, & suauissimo halitu supprimitur, de medio est allata, ut merito ex Aristotele sensus, & sensibile, scientia, & scibile sint relatiua extra suum genus, quæ vocantur secundum dici, & nequaquam secundum esse, ut non valeant consequentia, non sentitur, ergo non est sensibile; non scitur, ergo non est, vel tali pacto sentitur, ergo tali modo est, vel taliter est, ergo taliter scitur; quoniam forsitan datur quadratura circuli, attamen nescitur, quare, & sensus circa sensibile; & intellectus circa intelligibile nos sæpius decipere possunt. Sed alia afferamus exempla; vina potentissima aqua castigata, quæ iuxta positionem, & non veram mixture miscentur, ut è pene tralibus philosophiæ est colligere, vina inquam cum aqua, licet respectu nostri gustus videantur diminuta, attamen vires non auferuntur vini, quoniam illa meri portio in ventre dissociatur, & suas nullas perdere potest vires, quia virtute caloris naturalis vinum ab aqua secernitur, & inde ed nutrit vinum, ac seorsum eorum esset. In tactu demum non desunt exempla, quibus possemus hanc materiam illustrare, ut de aqua feruente, quæ mixta cum frigida teporem acquirit, non quia feruor euanescat, sed quia vnitus diffunditur, & nobis solum occultatur; & simili modo aqua frigida mixta cum feruida obscuratur, non tamen in nihilum abit, sed diffusa conseruatur; quare frequentissimè aliter res se habent, quam sensus nostri percipiunt: Simili modo dicendum est de lumine maiori, quod nullo modo tollere possis minus, sed dumtaxat ob præ-

Lumen maius non ex-tinguitur minus.

sentiam maioris sensibus nostris minus lumen occultari, quare inferimus ex iis caliditatem iecoris nullo modo refrigerare posse ventriculum, quinimo caliditatem iecoris necessario ventriculum se vera calefacere.

*Quomodo  
frigescat vtricus-  
culus à  
nimia hepatis  
caliditate.*

Quomodo autem res se habeat, quod ventriculus videatur refrigerari à calidissimo iecore, ne pluribus verbis tēpus conteramus, adeamus Galenum 2. apho. 35. qui perfecte nos docebit quo pacto accidat ventriculū refrigerari à iecore calidissimo, vbi habet hæc verba. Quædam hypocondria sunt tenuiora, quædam crassiora, & hæc sunt meliora, tenuia sunt mala, vt signa, & vt causæ: signa sunt imbecillitatis in partibus eliquatis: causæ verò, quod coctio bona non fiat in ventre, neque sanguificatio in hepate, quia à crassitie hypocondriorum concalfactum vitrumque, venter & hepar iuuantur. Sciendum itaque est

*Coctionem  
ventriculi  
iuuari ab  
omnibus  
visceribus  
circumiacentibus.*

ad bonam coctionem comparandam non solū tunicas ventriculi conspirare, verum etiam consentite in hunc finem viscera omnia circumiacentia, quæ suo calore, ac si essent foci, & carbones, qui ollam ebullientem circumducerent, fouent inditos cibos, ad sunt circa partem supernam ventriculi, cor, pulmo, diaphragma, quæ suo motu, & continuato calore coctioni opitulantur: circa infernam est iecur, & proxima sunt hypocondria, omentum, & intestina, sunt quoque venæ maiores, & splen, vt omnia hæc quo magis calida sint, eo potentius in concoquendi negotio se gerant, vt talis coctionis causa non sit sola alteratrix illa sita in ventriculi tunicis, vt aiunt nonnulli, quia hæc munia concoquendi non solum eduntur à ventriculo, sed ab omnibus circumseptis igniculis, & focus, perinde ac tot carbones leberem quandam circumuenirent; quare quemadmodum magnus calor carbonum non refrigerat leberem, similiter iecoris incendium nullo modo poterit ventriculum refrigerare: omnes enim partes circumdantes ventriculum iuuant, vt ocyus elixet, ocyusque attenuet quod est in ventre ingestum, vt inde chylus recipiat formam, seu imaginem quandam

*Vnde chylus  
& sanies albedinem recipiunt.*

præstant rectè paratæ: chylus tamen æmulatur in colore præcipuè ventriculi tunicas, quæ sua natura albæ sunt, vt obseruetur effatum philosophicum, quod agens proximum, & immediatum introducat posse suum simile, & propterea albescat chylus; vt ex albedine nullo modo colligere possimus, vt nonnulli colligunt, chylum solum à tunicis ventriculi, & non ab aliis visceribus fieri, dicimus enim nos tunicas ventriculi esse causam efficientem proximam chyli; sed non totalem. Simili modo sanies cum fiat ab humore incluso inter spermaticas partes sua natura albas, albescat: & quemadmodum, vt fiat pus perfectum, & album læsis partibus adiunguntur tegumenta, vel emplastra calorem retinentia, ne abeat foris calor, & adiunguntur calida, & humida fouentia per similitudinem qualitatum: similiter dum ventriculus fouetur ab hypocondriis calidis, & humidis, & crassis, quæ sunt veluti tegumenta, ocyus concoquit, cum ob crassitiem prohibentem ne calor exiliat, tum ob calorem pinguedinis, quia simile gignit & auget. Dicimus ergo cum Galeno, quod hypocondria multa dona-

ta pin-



ta pinguedine tum calfaciunt & humectant, tum prohibent, ne amittatur calor; iuuant enim per similitudinem calorem naturalem multiplicanti dum calfaciunt, & humectant; quia concoctio est elixatio, & elixatio non potest fieri nisi à calido, & humido, & nulla inueniri potest caliditas, & humiditas magis proportionata concoctionibus viscerum, quam illa, quæ insita est in pinguedine; quinimo dum ad coctionem apostemata volumus reducere, sumimus pinguedinem; quia aliud auxilium hæcenus non est inuentum, quod magis possit ad faniem molliendam, quam animalium pinguedines, quare tanto magis hypocondria, omentum, & omnia circumiacentia viscera propria pinguedine referta in viuentibus ipsis summas poterunt afferre opes in concoquendi negotio. Iuuant denique hypocondria crassa, quia prohibent, ne transpiret virtus caloris, ut propter duas relatas causas crassa hypocondria edulia ingesta in venter tam probe arteri permittant, ut vel breui vsque ad minimas partes tractetur, & comminuetur chylus, & inde ab hepate per spiramenta mesenterij receptus in perfectissimum sanguinem conuertatur, vnde in viuentibus omnes perfectæ naturales, vitales, & animales functiones trahunt initium.

Ex traditis superius afferamus has conclusiones, ut Prima conclusio sit, quod iecur valde calidum non reluctetur alteratrici ventriculi, nisi mediate, & per accidens. Secunda conclusio, quod iecur valde calidum per se impertiarur primæ coctioni emolumentum. Tertia conclusio, quod ventriculus sua natura, vel suis tunicis calidus non possit probe concoquere, tenuissimis existentibus hypocondriis. Prima, & Secunda conclusio est Galeni, & Aristotelis dicentium, similia similibus conseruari. Tertia est Gal. 2. aph. 35. qui nullam in medium attulit causam, cur iecur calidum officiat ventriculo, nisi quia hypocondria ob iecoris incendium redduntur tenuia: ratio cur non pinguescant est, quia à seruore viscerum lique fit seuum: quare falsum est dicere caliditatem iecoris eo modo ventriculum destruere, quo lumen maius extinguit minus; vel propterea destrui calorem ventriculi, quia maior calor hepatis absumit pabulum, & humidum radicale ventriculi; de qua re ne verbum quidem Galenus, cum totam causam, cur ventriculus sit imbecillus, quando calor insignis est in hepate, referat in tenuia hypocondria; crassa enim calfaciunt ventriculum per se, & per accidens; per se, quia pinguedo cum habeat vim calfaciendi potest suo calore magnum præbere emolumentum; per accidens, quatenus ob crassitiem hypocondriorum conseruatur calor vnitus ventris, & omnium viscerum circumiacentium.

*Errant, qui utuntur remediis calfacientibus in ventriculo rugitibus pleno laeso ob caliditatem hepatis: in quo exemplo observantur affectuum, protopathia, idiopathia, & sympathia.*

## CAP. VI.

*Errant empyrici, quia in illo loco ubi symptomata videntur, errant affectum.*

**D**V M hypocondria prorsus sunt reddita pinguedine destituta ab hepatis incendio, ventriculus adeo robore spoliatur, ut non solum munus suum coquendi perfecte explere non possit, sed quod deterius est reddatur tanquam lintina, & cloaca excrementorum hepatis, splenis, & aliarum partium circumiacentium, ut hinc leuissima data causa angore, & variis passionibus vexetur. In hoc casu vel maxime errare solent nostates empirici, qui neque dubitant, nec animo concipere possunt aliquem affectum curandum esse in alio loco, quam ubi symptomata vident, & semper illum affectum primo curant, de quo patientes conqueruntur, siue sit morbus, siue symptoma, siue sit affectus per essentiam, vel per consensum, siue sit proprius, vel principalis, & propterea si in ventriculo reddito imbecillo ob iecoris nimiam caliditatem, vident dominari flatum, & rugitus, & plurima incocta, vel superna, vel inferna excerni, illa ventriculi symptomata curant; neque credunt in aliis visceribus esse posse aliam causam, unde symptomata pendent; sed quod valde deterius est, credunt illa symptomata, & omnem ventriculi imbecillitatem prodire a causa frigida, & miseros hos patientes calidis alterantibus tractant; quem errorem reiecit in primo libro capite 22. ut non sit, quod de haere amplius loquamur, nisi quantum pertinet ad perquirendas sympathias, & idiopathias dependentes, vel independentes, propter quam cognitionem secundum hunc librum composuimus.

Dicimus ergo, si ob incendium iecoris reddita sint hypocondria tenuia, & inde redditus sit ventriculus imbecillus, quod primaria affectio, seu protopathia, quae prius omnibus debet curari, sit in hepate idiopathia, quae affectio partim est in facto esse; partim in fieri sit in hypocondriis, sympathia siue affectus per consensum, qui saepe nihil indicat, sit in ventriculo; & ratio est, quia caliditas illa insignis hepatis est prima causa, quae colliquans pinguedinem introducit affectum proprium in hypocondria, quippe qui quatenus pendet ab hepate, est in fieri, quatenus vero iam reddita sunt diminuta hypocondria, est in facto esse; deum per consensum huius affectionis ventriculus redditur imbecillus, ut propter affectum hepatis primum, & propter affectum hypocondriorum proprium ventriculus male coquat, & in frequentem sputorum proluuiem cibum conuertat, vel alia parit symptomata, prout corpus vario modo dispositum est, in aliquibus enim haec incocta excernuntur per aluum; in aliquibus per vomitum; in aliquibus illa excrementa petunt caput, & in aliis, qui in paulo deteriori

*Qua mala prodeant a ventriculo imbecillo.*



riori statu sunt, faciunt tumores in specie, vel ventriculo, vel in aliis circumiacentibus partibus.

Quare si horum omnium symptomatum prima causa, & origo est iecotis incendium; qualis error maior esse potest, quam non distinguere idiopathiam à sympathia, & cæcorum more in hoc casu calida, & sicca alterantia præbere iis ægrotantibus hoc modo dispositis, vt diximus? heu miseris, quot iis oculis vidi coinquinatos rugitibus, & flatibus perpetuis, iuuenesque emaciatos, qui horum medicorum consilio perciti cina, lassa, guaiaco, iusculo galli, aquis terucij, stillicidiis aquarum thermarum, vel oleis calidis, & confectione diatrion piperon, & similibus sint vsi; quorum omnium vsu deinceps redditi sunt ita emaciat, & graciles, ob liquefactam omnisariam pinguedinem omenti, & cæterarum partium, vt nullo vnquam tempore, quod perdidere medicamentorum maleficio sint amplius comparati, sed in dies prolapsi sint in maiorem ventriculi ruinam: atque ex alia parte nonnullos alios noui ad eundem modum emaciatos ob easdem causas, qui, tpreta medicamentorum consultatione, indulxerint prolixius poculentis, esculentis, &c, qui obsoniorum omnium blanditiis; qui symplosis dominorum erant dediti, attamē temporis interuallo hilari suo animo meliorem, & tandem optimam sibi comparauerint valetudinem, vt maiorem medellam receperint ex ferculis fortuito haustis, quam ex consilio rudiorum medicorum; quare videas quantum expediat discutere, vnde prodeant symptomata, & expediat rescare affectuum omnium complicationem ad methodum, quæ doceat distinguere affectus per consensum à propriis, & proprios dependentes, à protopathia.

Nec obiciant frigida non posse conuenire imbecillo, & infirmo ventriculo, quia contra hanc sententiam apertissimum est Galeni testimonium in methodo his verbis probatum 7. meth. 4. vidisti tu quosdam vno die, vel potius hora frigida potione leuatos fuisse imbecillitate ventriculi; ad hæc numquid plures inueniantur tales, qui sunt temperamenti calidi, & sicci cum hypocondriis iis tenuissimis, & iuuenes alioquin fortes, & optima sanitate præditi, optimis alti ferculis, non crapula obruti, non libidinis blanditiis dediti, qui ob insignem hepatis calorem ab ortu nature comparatum iis symptomatibus ventriculi cruciati solent? nec mihi dicant Empyrici isti, qui credunt omnem imbecillitatem ventriculi prodire à frigida causa, esse prorsus impossibile iecore calidissimo existente ventriculum calidum conseruari; quoniam in primis contra illos est Galeni auctoritas 7. meth. iam citata vbi ostenditur imbecillitatem ventriculi aliquando prodire à calidis causis; & deinde ratione à Galeno desumpta in arte medica cognoscere possumus plures hac imbecillitate ventriculi affectos habere ventriculum calidum, quod probatur hoc pacto, numquid, quando hepat est calidum, & cor non obstat, totum corpus est calidum, vt dicit Galen. in art. medica? sed experientia cognoscimus in impulsis, qui sunt calido hepate, in illis non obstare cor, quinimo cor esse feruentissima caliditate incensum,

*Causa errorum empyricorum est nō distinguere idiopathiam à sympathia.*

*Valet consequentia iecur, & cor excedunt in calore, ergo, & ventriculus, & totum corpus sua natura sunt calida.*

& signum huius est, quia circa sternon, pilos habent copiosos, & sunt irati, & cætera correspondent signa à Galeno enarrata in ar.med.in ca. de signis calidi cordis: ergo in istis non solum erit ventriculus sua natura calidus, sed totum corpus, quia nulla est pars, quando cor, & iecur in calore excedunt, quæ non sit sua natura calida, & non excedat temperatum statum; valet enim consequentia in art.med.vt optime docet Galen.cor, & iecur sunt calida, ergo totum corpus; quoniam caliditas totius corporis, tamquam à propria officina prodit à corde, & deinde ab hepate: si totum, ergo, & ventriculus; quare erit tamquam infallibile signum, si noluerimus cognoscere dum ventriculus est imbecillus, an sit sua natura calidus, vel frigidus, vt respiciamus ad hepar, & ad cor, quæ duo viscera si præter modum calida obseruantur, inferre certissimè poterimus ventriculum illum sua naturæ esse calidum, quamuis flatibus, & perpetuis rugitibus vexaretur; si vero cor obstaret, quamuis iecur esset calidum, non possemus inferre certo, ventriculum esse calidum; quare cum plures reperiantur, qui flatibus cruciantur, & habeant cor calidum, & hepar, habebunt etiam ventrem naturaliter calidum. Causa vero cur in hepate calido, & in corde, & ventriculo calido oriatur imbecillitas, vt diximus, sunt tenuia hypocondria, non ventriculus ipse, quia non fit coctio in ventre sine concursu cæterorum membrorum, nec sanguificatio in hepate sine valetudine cordis, & cæterarum partium, nec spirituum generatio in cerebro sine subiectis visceribus adiuuantibus, vt totum hoc corpus animatum mihi videatur perbelle assimilari posse Testudini, vel Fidibus, quæ instrumenta tot requirunt cordas ad rectam harmoniam edendam, vt quæque edat sonum proportionatum, si vero altera sola laxatur, vel nimium tenditur, omnium euertitur harmonia, vt quælibet videatur dissona, & inæqualis, attamen ex vnica tantum omnis in consonantia prodit: ad eundem modum, ventriculo solo, vel alio viscere laceffito omnia aliquid patiantur per sympathiam, vel per consensum vniuersi, & primo correcto errore, omnia desinant pati, cum omnes partes in vnâ actionem, & in vnum concentum conspirent.

Sed ad nostros fontes conferamus hunc casum propositum, in primo fonte expendimus an sit pars primo loco læsa, quam notitiam de loc.aff.cognoscendis explicauimus in 1.lib.cap.ii. quare si cognoscemus iecur passum fuisse affectionem calidam, antequam ventriculus passus sit imbecillitatem, inferemus aliquo modo, ergo imbecillitas ventriculi erit dependens ab hepate; sed non sufficit hoc, nisi secundum fontem contemplemur, in quo collocantur conditiones, & proprietates locorum affectorum, quare cum iecoris calidi sit proprium reluctari ventriculo, sed non, vt lumen maius tollit minus, sicut ostendimus, sed vt docuit Galen.extenuando hypocondria, valde melius ex his duobus fontibus, qui sunt ex parte primo loco affecta, & ex proprietate viscerum inferre poterimus, dicentes, iecur passum est calidum affectum, & inde extenuata sunt hypocondria, & demum est facta imbecillitas in ventriculo; ergo alio modo tolli non poterit imbecillitas

*Comparatur  
animatū cor-  
pus fidibus, in  
quibus vnica  
laxata vel te-  
sa corda om-  
nium tollitur  
harmonia.*

*Quando ven-  
triculi imbe-  
cillitas refri-  
gerantibus tol-  
li debeat.*



becillitas ventriculi, nisi refrigerantibus, quia si vnicum viscus alterius casu cadit, nisi alteri opes præstamus, curare ægritudinem non possumus: Deinde accedimus ad tertium fontem, vbi inquirimus an affectio conueniat per accidens, vel per se; cognoscemus autem affectionem aliquam non conuenire per se parti affectæ, quando illi parti non conueniet semper; quare si volumus cognoscere an hæc imbecillitas sit per se in ventriculo, vel pendeat ab alio viscere, & per accidens ventriculo competat, est maxima diligentia obseruandum, an læsio, quæ pendet ab imbecillitate, semper, & æque conueniat ventriculo, dum exercet suum principale officium, quod est chylicare, si verò per aliquot dies melius, & aliquando peius habeat, tunc imbecillitas non conueniet per se ventriculo, sed ab alio viscere trahet originem, & ratio est, quia læsio per se erit in ipsamet ventriculi constitutione à qua pender, vt umbra à corpore, vt valeat consequentia, est læsa constitutio, ergo operationes pendentes à constitutione sunt semper læsæ, cum argumentum sit necessarium à per se ad de omni, vt propterea perpetuitas læsionis sit signum peroptimum pro cognoscenda particula per se læsa; & quod de ventriculo dicimus de cæteris visceribus intelligendum. Demum ad quartum fontem accedimus vbi consideramus duas illas condiciones, quæ faciunt affectus esse proprios, quæ sunt, temporis diurnitas, & habitus corporis mollis, & infirmus; nam si aliquo temporis tractu in habitu molli affectio per consensum morabitur, fiet affectio per essentiam, si verò habitus est fortis, scias, quod quamuis multis voluentibus annis esset laceffitus ventriculus à calore hepatis, quod affectio illa nullo modo posset fieri propria, & per essentiam: Demum in quinto fonte collocantur sympathiæ siue consensus, quoniam affectus per consensum, vel sunt generis, vel vicinitatis, vel operis familiaritatis, & hos consensus expèdere oportet, vt sciamus quem consensum præter naturam patiatur tunc ventriculus; de quibus consensibus diligentissimè tractabimus in toto hoc libro, vt simul hanc methodum, & anatomiam perdiscamus.

*vt cognoscitur, quando aliqua corporis particula sit per se læsa.*

*Errant dum putant quamlibet sitim potationibus auferri posse, in quo exemplo obseruari poterunt sympathia generis, & vicinitatis.*

CAPVT VII.

**C**Ausa cur eadem ægritudo in eodem ægrotante eodem remedio non semper tolli possit, est, quia modo ægritudo conuenit læsionibus per consensum, qui re vera non potest auferri, nisi auferatur radix, & modo ægritudo conuenit per essentiam, & est facta propria; accidere tamen potest, ægritudinem esse factam propriam, attamen fomitem aliunde recipere, quem nisi auferamus sanare est prorsus.

*Cur eadem ægritudo eodem remedio non semper sanatur.*

sus impossibile: Idem accidere solet in hoc exemplo de siti, cum sit passio oris vetriculi, modo os ventriculi siti vexabitur per consensum, modo per essentiam; Si vero sitis in ore ventriculi est per se, & per essentiam, tunc ex omnium consensu potationibus eam auferre, quamuis maximam aquæ quantitatem ager hauriret; Si verò est per consensum pulmonis, non aquæ potio, sed solummodo aeris frigidi inspiratio sufficiens est ad demulcendam ingentissimam sitim, vt testatum reliquit Galen. in pluribus locis, sitim causatam ab inflammatione pulmonis non potationibus, sed aeris frigidi inspiratione auferri; affectio ergo hæc, methodo tradita in 3. capite huius libri est consideranda, atque examinanda, quando est per consensum, & quando est propria, & independens; quoniam nullo alio modo affectuum exactam notitiam consequi possumus; nisi per hanc methodum, quæ erit clarissima, & facillima, si exemplorum luce eam explicabimus: agentes igitur de siti in qua parte primario fixa sit, accedere debes ad primum fontem, qui declarat quis sit locus affectus primarius; & cognosces ex iis, quæ dicta sunt in primo libro capite 11. locos affectos vniuersos, & quis locus prius fuerit læsus; Ex iis vero, quæ dicta sunt in capite 3. huius libri, cognosces quis affectus sit primarius: deinde ex methodo per syndromem signorum communium tradita in primo libro inuenies pulmonem correptum esse calida intemperie, & deinde subsecutam fuisse sitim: videas quomodo ex iis omnibus hætenus traditis inferre commodè poteris protopathiam esse in pulmone: præcognito hoc, quod sitis oriatur primario à pulmone, cognosces necessario ad caliditatem, & siccitatem pulmonis auferendam potationes non posse conferre, quia non possunt ingredi tracheam sine suffocationis periculo, inferas ergo illud solum remedium refrigerans, & humectans sitim à pulmone inflammato ortam compescere, quod per tracheam immitti poterit, & tale erit aeris frigidi, & humidus inspiratio; quia nullum aliud dari atque inueniri potest, quod per tracheam ad pulmonem excurrat, nisi aer. Si vero in secundo fonte examen facias, vbi agitur de potentia partium læsarum, videbimus per duplicem consensum pulmonem posse communicare affectum siccum ori ventriculi, per consensum nimirum vicinitatis, cum pulmo sit valde proximus ori ventriculi, & per consensum generis, qui per continuas partes fit: adest enim pleura vestiens pulmonem, quæ perreptat per tracheam ad guttur, & à gutture vsque ad œsophagum peruenit; deinde œsophagus suis villis continuis illam siccā, & calidā qualitatem sumptam à pleura defert ad stomachum. Postremò non satis est cognoscere protopathiam esse in pulmone, & sitim esse per consensum in stomacho, sed opus est expendere an sitis, quæ sit per consensum in stomacho, facta sit propria, vt partim sit facta, partim ratione fomentationis à pulmone sit in fieri, quoniam non solum auxilia refrigerantia, & humectantia essent dirigenda pulmone, verum etiam stomacho: si vero solum esset in fieri, esset ridiculum credere potationibus auferri

Duplex consensus inter pulmonem, & stomachū.



sicim: quare, ut hoc perfecte cognoscatur, ante oculos obicienda sunt illæ duæ conditiones, quæ declarant idiopathiam, quæ in alio fonte sunt propositæ, altera est temporis diuturnitas, altera vero habitus mollis, quoniam omnis sympathia, si diutius in parte aliqua corporis moratur, & pars affecta sit mollis, euadit idiopathia. Similiter ubi habitus est fortis, vel paucio temporis spacio ægrotudo vexet partem viventem, affectus erit adhuc per consensum, vel sympathiam, quibus omnibus cognitis ad eam apicem perueneris, supra quam (ni fallor) in arte medica ascendi non potest.

*Errant ex tensione musculorum rectorum colligere mesenterium esse obstructum: ostenditur nullam esse sympathiam inter mesenterium, & musculos rectos.*

CAPVT VIII.

**I**N immensum cresceret volumen, si empiricorum errores omnes incerpere quispiam vellet: malui ego suprema capita, quibus corrigi possunt errores, ante oculos obicere, & ad methodum variis exemplis tantam hanc de erroribus medicorum cognitionem redigere, ut methodi huius virtute infinitos alios præcauere errores possiamus: afferatur illud commune erratum, dum sine ullo consensu sprete, vel omissa omni cognitione anatomica dicunt obstructionem, vel tensionem illam abdominis utrinque in longum exporrectam, quæ re vera est rectorum musculorum, esse mesenterij, vel hepatis; & ab externa hac tensione, vel obstructione non solum putredines foueri, verum etiam inde præcipuum suum trahere exordium. Error sane est inexcusabilis, quoniam nullus omnino est consensus, vel sympathia inter musculos rectos, & mesenterium, non vicinitatis, quia mesenterium iacet sub intestinis, & nulla mesenterij pars supra intestina ascendit, quæ possit in abdomine manibus tangi, & contractari; musculi verò isti recti non modò sunt supra intestina, verum supra omentum, & peritoneum, & supra transuersales ventris musculos; quare nemo tangendo quamuis partem abdominis, poterit de statu mesenterij aliquid certo decernere; nimium sanè distant situ, & origine hæ duæ corporis partes, quia musculi recti à medio ossis pubis in externa parte pronascuntur, & rectis fibris ascendunt, usque & supra mucronatam cartilagineam, & desinunt in sternon coherentes 6. & 7. costis; mesenterium vero est inter dorsum, & intestina collocatum, deinde supra intestina sequuntur omentum peritoneum musculi transuersales, quæ omnia mediant inter musculos, & mesenterium: quomodo ergo consensu vicinitatis tensio hæc externa ostendet læsum esse mesenterium, & hanc tensionem transire poterit in culpam putredinis, & diuersarum febrium: eo magis quod millies in hominibus, alioquin optima valetudine præditis, tensio ista in longum extensa re-

*Nemo ex sanis  
abdominis  
de mesenterio  
aliquid certi  
dicere poterit.*

ectorum musculorum inueniatur, & nulla febre, vel obstructione mesenterij obfessi sint, cum integra fruantur valetudine: Nec dicant inter musculos rectos hosce, & mesenterium esse consensum generis, quia forsitan musculi isti recti sint intertexti furculis venarum eiusdem generis cum venis mesenterij; quoniam musculi abdominis circumnестiti sunt ramis prodeuntibus à caua vena, mesenterium totum à portæ venæ furculis sit irrigatum, vt nulla sit sympathia generis inter abdominis musculos, & mesenterium: Ad hæc dato, & non admissò, quod iisdem venarum furculis à vena portæ prodeuntibus ambo gauderent, & fieret propterea consensus generis, quid tum? numquid durities, vel tensio musculorum rectorum fit ex materia existente extra venas? nullus fieri potest tumor nisi ab humoribus fluentibus à venis ad extra venas, ad spatia nimirum, vt hinc optimè dicant, qui asserunt venas non apostemari, quare cum tensio fiat à materia extra venas, & procul distent musculi recti, & mesenterium, nullus erit consensus generis: neque est demum consensus operis familiaritatis, vt ad opus vel officium aliquod commune conspirent, quoniam partes, & munera mesenterij discrepant valde ab officiis musculorum abdominis: Quo pacto ergo ex duritie ista externa in longum ex porrecta in epigastrio, de statu mesenterij iudicium sumere valent?

*Venas non apostemari.*

*Quando medicorum in scitia non sit ferenda.*

Cæterum quando stat error tantummodo in cognitione, & non transit in operationem, & nihil prorsus ob inscitiam medici, periclitatur æger, vt vt sit de hominum opinione vnusquisque æquo animo, compati errores potest cum hominis proprium sit errare, & præcipuè Medici, cuius inscitiam libenter pati possumus, cum plura ad hanc artem pertinentia sub immensa caligine delitescant; At falsis iis principiis, ægros Medicinis, vnguentis, & topicis variis ad rem minimè conferentibus, quæ sæpè lacescunt, malè tractare; id sanè neutriquam est ferendum, sed pro viribus explodendum, cum acies oculorum præcipuè dirigenda sit, ne (cum medicus aliquid opis ferre nequeat) saltem doceat, vt optimè retulit Diuinus senex; Idcirco summopere semper miratus sum non solum, quia ex musculis istis tensis colligunt mesenterium esse crassissimis recrementis obfartum; sed quia propter hanc causam dant soluentia medicamenta, & alterantia aperientia, oxymel, & decocta ex agrimonio, citrach, & alia id genus pro obstructionibus his, quas animo fingunt esse mesenterij, elidendis, cum nullo modo topica hæc conueniant, quamuis inunctiones peruenirent ad mesenterium ipsum. Non conueniunt inunctiones calidæ, vel temperatæ, non aperientes, vel emollientes, sed neque roborantes, non calidæ, quia calidatum vi aliunde noua trahitur materia, & pars calore exurit, atque torretur: non temperatæ inunctiones, quoniam si erunt emollientes, partem laxabunt; & noua in ipsam tãquam in cloacam excitabitur proluuius: non astringentes, vel roborantes, quia hæc anteuertent euacuationem illam sensus nostros fallentem, vt nullo vnquam tempore illorum opinio in liniendis iis partibus tensis, febrem curandi gratia, sit recipienda: hinc multifariam errant: Errant in primis, quia

*Vt errant qui totis horis inungunt tenfiones hypochondriorum.*



quia credunt tensionem illam externam causare febrem, & putredines; cum homines absoluta omnibus numeris sanitate præditi hanc sæpissimè habeant tensionem: Errant, quia credunt febrem tolli ob inundationes illius partis: Errant, quia credunt infarctum illum pituitosum musculorum rectorum cito posse tolli linimentis insensibiliter euacuantibus: Errant, quod credant emollientia opes afferre posse, cum laxando, affectus maiores agant radices: Errant credentes calidis oleis prodesse, cum calida indurent magis, dum resoluunt tenues: Errant demum, quod aliquando, non purgato corpore iis localibus tractant abdomen, quod reluctatur Galeno 2. ad Glauco. 2. sic dicenti, in tumoribus duo esse maxima errata, alterum est non habere prius prouidentiam totius; secundum calefacere, & humectare locum affectum, ut methodici faciebant; & sicuti contigit impudentissimo Atalo Medico, qui nimis laxantibus hepati applicitis enecauit Theaginem Cynicum philosophum, ut refert Galen. 12. methodi capite 15: Errant demum, quod credant hanc tensionem tolli posse oxymelite, decoctis aperientibus ex agrimonio, citrach, & similibus, cum adeo distent venarum ferentes alimentum ad rectos hos musculos, ut omnino alterantia amittent suas in itinere vires: Nec tamen omittendum in febrientibus, ut tangantur hypocondria vel sæpissimè, sicuti erat mox Hippocratis, ut in ægrotorum Historia lib. de morb. vulg. est videre, quoniam ad noticiam valde hoc confert, quia distinguemus tensiones viscerum ab illa, quæ est musculorum rectorum.

*DUO ERRATA  
EMPHYRICORUM  
PROPRIA IN TU-  
MORIBUS CON-  
SIDERANDIS.*

*Nostri corporis varia arcana, quæ cognosci possunt per sympathiam Generis.*

C A P. I X.

CUM dixerimus triplicem in hoc nostro corpore esse consensum, Generis nimirum, operis familiaritatis, & vicinitatis, & cum proposuerimus methodum vniuersalissimam, quæ nos edocere posset, quando aliquis morbus sit proprius, & quando per sympathiam: reliquum erat ad sympathias particulares conscendere, ut simul methodum, & anatomiam perdisceremus: Sed quoniam affectiones, quæ fiunt per consensum familiaritatis operis, & vicinitatis, ex traditis superius splendent, & nisi res me fallit, breui speculatione interiecta conspicuæ, & prænitentes sunt: Idcirco totus erit incumbendus spiritus, totaque flectenda cura in affectiones illas, quæ per generis consensum fieri solent, quoniam in hac affectionum sympathia pernosceda nemo excellere potest, nisi prius in anatomie officina politus, ac limatus sit, sic uti esset si ire, unde neruorum, & venarum longæ propagationes, & musculi eminus deducti suarum in initia, & quos habeant progressus, & quibus partibus implantentur, & quæ denique expleant officia; si quidem per sæpe obtingere solet morbum esse in vno loco, &

*Quæ sint ad-  
fectus ut per-  
se de cognos-  
cantur sym-  
pathia.*

*Affectus cuius  
essentia est in  
cervicis; attamen per sym-  
ptomam ap-  
paret in ma-  
nu.*

in alio longe diuerso ob consensum, & continuitatem neruorum, siue musculorum, & aliarum partium, videri illius symptomatis imaginem, vel actionem laesam esse vbi cessant, vel inseruntur, & morbum esse vbi principium sumunt, vel dolorem esse in vna parte, & affectum dolorem facientem re vera aliam sedem tenere; sicuti possumus variis exemplis tantum fundamentum comprobare: Nunquid ex Galeno relata est historia primo de loc. affect. 6. cuiusdam Romam venientis ex casu è vehiculo icti, & percussi circa septimam vertebrae cervicis, & motionem trium digitorum amisisset? audiamus Galenum sic loquentem, tres digiti motum amiserunt ex casu è vehiculo cum Romam quidam homo proficisceretur, & coniecturam feci in exortu nerui post septimam vertebrae prodeuntis, partem fuisse inflammatae ob ictum, & scyrthosam acquisiuisse dispositionem: en quod initia neruorum, & quibus nerui ancillantur pernoscere, quam gradem utilitatem in medendo haurire possimus: Galenus enim cognita inflammatione ob ictum facta, quae in scyrthosam dispositionem degenerauit, è vestigio auxilia septimae vertebrae adiunxit, & curata scyrthosa dispositione, vnde furculi neruei, qui praestant motiones tribus illis digitis sumunt initia, ad pristinam summa cum omnium admiratione sanitatem miserum reduxit, quod numquam id praestare potuerunt Romani empyrici, licet inunctionibus perpetuo superlinirent manum: videas ergo secundum essentiam affectum esse in vertebri cervicis, secundum apparentiam esse posse in digitis, quippe ex se alioquin optima sint constitutione donati.

Hac, & simili veritatis voce Galenus castigauit Lycum dicentem, tremorem manus pendere à stomacho, cum nullus esse possit consensus inter stomachum, & manus, non vicinitatis, vel operis familiaritatis, vt omnes consentiunt; sed neque Generis; quoniam nulla nerui proptago, quae est in manu, à stomacho habet initium, vt propterea fieri possit tremor in manib. per consensum stomachi; quod sanè non dixisset Lycus, si studium in Anatomiam adhibuisset; Similiter in aliis furculis vidimus essentiam esse in vno capite, & aliubi apparentiam.

*Ledi potest  
respiratio causa  
lesionis exci-  
sante in cer-  
uice, quod em-  
pyrici non ad-  
misserunt.*

Sed liceat digredi in alias corporis partes, vt in exemplorum more artem hanc nostram vitandorum errorum simul, & anatomiam perdiscamus; an ne à quarta, quinta, & sexta vertebra cervicis, missus est furculus nerueus ad septum transuersum, vnde diaphragma motum desumit, gratia respirationis; quare, si diaphragma amitteret, vel deficeret in motu ob huius nerui caput affectum, quae affectio facta sit vel ob semi angustiam, vel ob compressionem, vel obstructionem, vel ob ictum vnde suborta esset dispositio scyrthosa, tunc vt septum transuersum in bonum statum reduceremus, esset confugiendum ad cervicem, & non ad pectus: quid magis potest, quam hoc exemplum suadere, quantum referat generis consensus? videre affectum in collo, & eius apparentiam esse in septo transuerso?

Ad eundem modum in membranis, & musculis vidimus inflammationem esse in pleura circa mediū pectoris; attamen perferri dolorem in iugulo,



in iugulo, cui alligatur hæc mēbrana, vbi nullus est humor dolorem causans: videas ergo quantum à veritate abhorreant illi, qui tam pertinaciter tutantur illam sententiam, vbi dolor, ibi morbus; dolor enim est in iugulo, morbus in pleura quæ cubiti ferè tractu, distat à iugulo.

*Vbi dolor ibi morbus, hæc sententia falsa.*

Similiter si de musculis exempla proponimus, adest in primis musculus ille quartus brachij, qui etiam oritur à dimidia parte ossis sacri; quare posset esse aliquis affectus in clunibus circa mediam ossis sacri partem, & affectus apparentia in brachio; munus istius quarti musculi est deorsum brachium trahere, quare vbi Empyricus anatomia orbarus videret affectum hunc esse in brachio, & causam circa nates; & videret dogmaticum adiungentem localia natibus brachio suppeditas afferre, adeo se confunderet; vt de sua empyria in posterum nec verbum vnum monere auderet: tale quippiam obseruatur in plerisque aliis musculis, sicuti in illo lato musculo in collo posito, qui labium infernum deorsum obliquè trahit, quippe est intertextus nervicis propaginis à tertia, quarta, & septima cervicis vertebra prodeuntibus, vt possit obtingere latum istum musculum suo spoliari officio trahendi deorsum labrum infernum ob affectum insidentem tertiam, vel quartam; vel septimam vertebra: Quis empyricus anatomia spoliatus diceret, si videret labiorum affectum curari per topica adiuncta cervici? Quomodo hanc causam diuinare posset ruditer limatus in secandis corporibus.

*Morbus quod est in clunibus, quomodo per sympathiam appareat in brachio.*

Similiter quando aliquis non posset brachium ad pectus adducere, quod munus est primi paris musculorum brachij, an ne posset vlu quādoque venire, vt hic musculus primus brachiorum suum hoc officium non expleret, quia in quinta thoracis vertebra aliqua esset facta angustia in nervea illa propagine vestiente hunc musculum? quid ergo videretur empyrico, si dogmaticus brachium ad naturalem statum transduceret inangendo quintæ vertebrae thoracis locum?

*Morbus quod est in quinta vertebra thoracis per sympathiam apparere possit in brachio.*

An ne posset præterea vlu venire, quod facile est vt accadat, digitos manus amittere motum, quia musculorum origines, quæ sumunt exordium ab humero sint confractæ casu, vel vulnere obsecræ, vel aliquo humorum infarctu circumfusæ, vt hinc motus digitorum, vel diminuat, vel extinguatur tunc veilem videre cui parti empyricus topica applicaret, quinimo millies vidi in hunc errorem incidisse, vt in simili casu inunxerit digitos, quos si in superliniendo pergeret annorum centum tractu, opus irritum, atque futile redderet, & tempus, & oleum, & opus conteteret, & quod diximus de motu digitorum manus, idem dicendū de motione digitorum pedis, qui mouentur à musculis exortis à femore, de quibus distinctius in hoc libro agemus, ne in eisdem laqueos cum empyricis incidamus.

Postremo ad pudenda missi sunt nervi furculi ab ossis sacri vertebra secunda, tertia, & aliis, & aliquando à secunda lumborum, & tunc vbi intentigo penis ob resolutos, vel compressos hos furculos in capitis accidit, medela erit adiungenda vertebrae, & nequaquam peni, qui patitur tunc per cōsensum generis, qui sit in longis nervis aliunde deductis; posse vltius pleraque; plura exēpla de hoc cōsensu afferre

*Morbus qui est in vertebra ossis sacri per sympathiam apparere possit in pena.*

sed meū est hic tārū notissima proponere, vt inde consulat medicus perpetuo an affectio sit per cōsensum, & quomodo sit per cōsensum.

*Cur læsitem  
poribus lādā-  
tur oculi, &  
versa vice,*

Sed ne prætermittam summam quandam sympathiam generis, quæ contingere solet inter oculum, & musculum temporalem, quæ est cur læso musculo temporali lædatur oculus, & vice versa læso oculo lædatur musculus temporalis, & eat in cōsensum, audias rationem antequam capiti summam imponam coronidem, secundū par neruorum cerebri fertur ad quinq; musculos oculis famulantes, & ad duos palpebram recludentes, & in quibusdam huius secundi paris ramuli in musculum temporalem inferuntur, quare non erit mirandum, si læsis oculis, in aliquibus lædi videatur musculus temporalis, tunc non est opus adiungere localia tempori, quoniam nerui in temporib. contrahuntur ob læsos oculorum musculos, vt propterea consentiant temporales musculi, nulla in ipsis existente læsione. Sed ad exempla anatomica singillatim expendenda confugiamus; & distinctè de quolibet musculo, & neruo procul deductis disseramus.

*Errant, dum labijs illorum, qui non possunt labrum infernum deorsum trahere, & ad latus mouere ob læsionem factam in lato musculo, adiungunt localia, cum iugulo aliquando sint apponenda.*

#### CAP. X.

*De lato mus-  
culo in collō  
posito cuius  
usus est tra-  
here deorsum  
labium in-  
fernum.*

**D**iximus, affectiones per cōsensum generis fieri omnes ob partium continuitatem, & læsiones omnes in loco, in quem inferuntur musculi, vel nerui prius apparere, & manifestari; quoniam ibi musculi videntur sua explere officia, verum enim uero vbi apparent hæ functionum læsiones, vt plurimum ibi nulla est noxa, & nulla constitutio mala; quoniam accidit sæpissimè, vt radices affectuum sint vnde musculi, vel nerui suum ducunt exordium, vel in alia musculi parte; & in loco, in quem inferuntur, manifestari (vt diximus) affectiones præter naturam: Quare, cum persæpe initia musculorum, & neruorum eminus locata sint, non erit mirum, si empyrici Anatomiz arcana non habentes, quæ essent, scire vnde oriantur musculi, vel nerui, quales progressus, quam figurā, & substantiam sortiantur, in qualibet fere functione læsa per cōsensum generis in sexcenta cadere possint errata.

Exordiamur ergo à musculis superioribus, & ab illo musculo lato in collō posito: Aliquis ergo labium infernum deorsum obliquè nō trahet ob factam læsionem in exordio huius lati musculi, quod est circa iugulum; empyricus lumine anatomico obcæcatus, videns labia vexari, veluti contingit in spasmo cynico, & similibus affectibus; labiis localia, sicuti vnguenta, olea, fomentationes adiungit: Adsunt alij, qui cōsultū masticatoria, gargarismata, cerata demū labiis apponere, rati aliubi nō esse affectū, nisi vbi apparet eius symptoma, spreto omni generis cōsensu, vel sympathia; errare tamē omnes possunt, quia in illa iuguli parte potest esse humor quidam pituitosus, qui sensim distēdat sine



sine dolore: solutio enim continui sensum facta; est sine dolore, ut est *Solutio continui quæ sensum fit. sine dolore fit.* videre in hydropicis in quibus tensiones maximæ fiunt sine dolore, in pedibus, & in toto corpore, quia sensum fiunt; & quæ sensum fiunt, nullos causant dolores? Similiter fieri potest tensio in hoc musculo lato, ubi est iugulum, sine dolore, quæ facta tensione, deinde contrahatur musculus, & inde sequatur, quod labium non possit deorsum trahi, quamvis nulla existat læsio per se in labiis ipsis, quare cur voluit labio adiungere medelam, si radix, & causa est circa iugulum? ibi sanè erit medicandum, cum labium iners sit factum, iuguli maleficio. Tale quippiam observatur in pleuritide, in qua iugulum caret humoribus, dum inflammatorius tumor in pleura trahit, & distendit membranam, eamque lacerat à iugulo diuellendo, unde in iugulo maximus perferri solet dolor, causa procul existente: ut hinc colligere possimus, quæ fallax sit communis illa sententia, ubi dolor, ibi morbus, nisi melius, quis eam interpreteretur, cum in pleuritide dolor perueniat ad iugulum, nullo in iugulo existente humore faciente dolorem, quinimò sæpè vidimus pleuriticos aliquando conqueri de iugali dolore; & de punctiuo in costarum regione spacio duorum, vel trium dierum non conquerantur; quamvis inflammatorius tumor sit sub pleura succingente costas, & non in iugulo, ecce quod causa dolorem faciens potest esse circa costas, & dolor circa iugulum.

*Quæ methodo cognoscatur labium obliquè non posse trahi à lato musculo ob morbum existentem, tum in tertio pari nervorum cerebri, tum in tertia vertebra cervicis.*

CAPUT XI.

**C**AVSA, cur musculus aliquis non fungatur suo officio, varia esse potest, quia modò est ob humores existentes in carne musculosa, modò ob nervos lætos, & modò ob sympathiam vicinitatis alterius læsæ partis; quare si de labio loquimur, potest contingere, labium non posse trahi obliquè deorsum, quia ramus tertij paris à maiori principio enatus, ille inquam, quia unitur cum furculo illo quinti paris, qui tortuosum nervum facit, sit læsus, & quia iste nervus hunc musculum ingreditur, propterea si accideret, ut conuelleretur musculus, non posset trahi deorsum labium, & labium, quoad apparentiam videretur læsum, quando nulla noxa in labio existeret: quis ergo tunc inungeret labium? cum lætus musculus conuulsus sit ob affectum in ramo tertij paris nervorum cerebri.

Amplius potest in labio eadem affectio contingere propter causam existentem non in labio, sed in ramo tertij paris nervorum cerebri, vel per causam existentem circa tertiam colli vertebra, quoniam ab hac tertia quoque vertebra deducitur nervus furculus, qui ingre-

ditur latus hunc musculum, cuius officium est trahere deorsum obliquè labium. Sed audias, qua arte sit incedendum, ut cognoscamus, quando musculus latus in collo positus sit læsus ob læsionē prodeuntem à tertio pari neruorum cerebri, & quando ob læsionem à tertia vertebra ceruicis: & hæc est, si dumerit læsus latus musculus, insimul læsus erit musculus temporalis, & musculi frontis, tunc inferas, læsionem pendere à cerebro; & ratio est, quia tertium par neruorum cerebri, antequam perueniat ad latus musculum, irrigat musculum temporalem, & musculos frontis variis propagininibus, ut nullo modo possit lædi latus musculus à morbo existente in principio tertiæ propaginis neruorum cerebri, nisi prius lædantur isti enarrati muscoli. Si vero cum musculo lato læso insimul lædantur musculi septimus, & octauus dorsi, qui constituunt quartum par, cuius officium est extendere superiorem partem dorsi, & lædatur quoque secundum par musculorum capitis, cuius officium est attrahere caput in posteriorem partem, inferas necessariò affectionem lati musculi pendere à tertia vertebra: & ratio est, quoniam, antequam nerui prodeuntes à tertia vertebra perueniant ad latus musculum, prius mittuntur ad septimū, & octauum musculos dorsi, & ad secundum par musculorum capitis; quare per officia horum musculorum malè acta poterimus inferre ex necessitate originem esse læsam, verbi causa, si esset facta percussio circa tertiam vertebra, veluti contigit homini venienti Romam, qui, ut dicit Galen. 1. de loc. aff. 6. ob scyrthosam dispositionem circa septimam vertebra, amisit motum trium digitorum, tunc post percussione circa tertiam vertebra si videris, non posse extendi superiorem partem dorsi, & caput attrahi in posteriorem partem; & deinde, videas consequi læsionem lati musculi in collo positi, dicas necessariò in tertia vertebra esse morbum, quia prius irrigatur quartum par dorsi, & secundum par capitis illis neruis prodeuntibus à tertia vertebra, antequam latus musculus irrigetur.

*Ut labium  
ladiunt ob  
consensum à  
tela carnosa.*

*Errant qui  
in omni a  
ctione mus  
culorum læ  
sa ad caput  
purgia con  
fugiunt.*

Præterea, ut plures consensus cognoscamus, dicimus, non solum posse accidere læsionem in labio ob neruos tertiæ coniugationis cerebri, vel ob læsionem factam circa tertiam vertebra ceruicis, verum etiam illud meri posse accidere, quia in tela carnosa, ubi utrinque latus musculus cum suo coniuge in osse pectoris vnitur, sit aliquis humor obfartus, qui fibras lati musculi adeo contrahat, ut labia ad latus turpiter mouerentur, quam affectionem cognoscemus ex tumore aliquo in osse pectoris; videas ergo quam varia esse possit radix, & causa affectionum, & quam temerè empirici suis topicis auxiliis agant, dum symptomati perpetuo occurrunt; & videas quam turpiter errent nonnulli, ex illis, qui profitentur dogmaticā scholam, dum in omni aetione musculorum læsa, si primis inunctionibus non tollitur affectus, confugiunt ad capitis purgationem, ad stilicidia, ad irrhina, & similia; ad quæ auxilia Galenus non ita in omni motu amisso confugebat, ut vidimus, dum curauit hominem venientem Romam percussum post septimam vertebra, cuius digiti licet non possent curari vnguentis, &



& aliis topicis auxiliis adiunctis ab empyticis, attamen non est usus purgationibus, stilicidiis, masticatoriis, irthinis, fonticulis, quæ admodum nostratum plures causam proximam ignorantes confugiunt ad caput euacuantia, tamquam ad sacram anchoram, sed adiunxit post septimam vertebra ceruicis emolientia, quæ tolleret scyrrhosam dispositionem, & illico ipsum liberauit; quare nisi diligentissimè perquiramus partium nostri corporis sympathias, non video quo pacto in musculis, & nervis læsis aliquid boni facere possimus, quia semper in genericis persistere, & statim inferre ex motu musculorum læso, caput illius affectionis esse originem, est paralogismus alibi à nobis in libro de analogismo non semel reiectus; non valet sane, musculus latus est læsus, ergo caput expurgandum, quādo affectus principalis est circa tertiam vertebra, qui potest tolli sine purgatione, neq; valet, musculus latus est læsus, ergo purgandum caput, quando est læsus ab humoribus collectis, & induratis in ossè pectoris, vbi utrobique lati musculi iunguntur, quæ humorum durities potest tolli sine capitis purgatione; quare non sufficiunt indicantia generica, vt placet empyricis, qui ad pauca capita, & illa parum tuta totam medicandi peritiam transferunt, & eam adeo facilem reddunt, vt non sit mirum, si consores, mulieres, & rustici homines hæc auxilia medica, quæ circumferuntur sciant, consulant, & in medium proponant.

*Errant, dum illis, qui inferiorem maxillam constringere non possunt ob læsum muscolum temporalem, inungunt semper maxillam, quando tempora tantum essent inungenda.*

## CAPVT XII.

**T**EMPORALIS musculus, cuius munitis præcipuum est edendo frangere res duras, enascitur à bregmate, vnde est ferè summum capitis fastigium, quare si hic musculus in capitis vertice vbi enascitur, læderetur, & adeo impotens euaderet, vt nullo modo inferiorem maxillam constringere posset, tunc, vt inferiorem maxillam ad pristinum officium salubre renocaremus, non esset curanda vnguentis, linimentis, inunctionibus, emplastris, oleis lubricatis, vel demum pinguedine humana, sed esset consulendum, quomodo affectionis huius radices essent euellendæ, quoniam plurimæ affectiones musculo temporali in parte eminus sita à maxilla inferiori possunt contingere, quæ essent in causa, cur aliquis constringere maxillam, & per consequens mandere non posset; in primis illa affectio obseruatur, dum tempora inflammatione aliqua corripiuntur, si post supputationem inflammationis relinquitur scyrrhosa aliqua dispositio, dicimus, illam duritiem scyrrhosam posse tollere, & auferre villis, & fibris musculi temporalis virtutem constringendi maxillam; tunc, si affectus hic præternaturam esset curandus, auxilia in duritiem existentem in principio musculi

*Vt morbus  
esse possit vbi  
est bregma,  
& cum appa-  
retur in ma-  
xilla inferio-  
ri.*

vbi est bregma, essent dirigenda, eamque auferre oporteret optimis localibus emollientibus, & non tractanda inferior maxilla topicis auxiliis; alioquin de hoc munere obeundo actum esset.

*Quid mali accideret possit si transversim incidatur musculus temporalis.*

*Duo errata propria emporicorum.*

Præterea possent tempora transversim vulnerari; vel chirurgus imperitus posset transversim altè ad carnem usque temporum abcessum aliquem aperire, & aperiendo, fibras transversim secari, & illico musculum hunc inertem reddere in claudendo maxillam, quod dignum est animadversione; quoniam fibræ descendentes deorsum, non sunt transversum incidendæ, sed secundum rectam lineam; amplius imperitus chirurgus vulnera temporalis musculi posset adeo dilatare, vt volens facere grandius foramen inconsideratè fibras abscindat, & circa reliquas fibras durum quidpiam callosum inde ingeneretur, vt ob fibrarum incisionem, seu impotentiam deinde deficiat, vel cesset musculi officium. Ad hæc temporalis musculus posset aliquem malum habitum, & cachexiam acquirere, vnde humoribus collectis in maiorem acceruum tenderentur fibræ, & tandem tendo implantatus mento tensus, & contractus redditus magno in edendo cruciaretur dolore, empiricos tunc in duo errata propria incidere vidimus, alterum est dum credunt symptomati esse occurrendum, veluti dum inungunt mentum, quando reuera tempora sunt inungenda; alterum est, dum decipiuntur communi, & vulgata illa sententia, vbi dolor ibi morbus, quia dolor in hoc casu potest esse in mento, morbus qui est doloris causa in temporibus, vel vbi enascitur musculus temporalis.

*Qua via cognoscatur, aliquem non posse constringere maxillam inferiorem ob lesionem musculi temporalis factam in nervorum exordiis.*

### *de nervorum exordiis* C A P. XIII.

**N**E M O est, qui nesciat, motum à nervis pendere, propterea cum musculus temporalis variis nerveis surculis à cerebro prodeuntibus sit contextus, atque irrigatus, poterit esse morbus in exordio nervorum, & symptoma esse in maxilla inferiori: in primis enim à secunda nervorum cerebri compagine ramus ad musculos oculorum mittitur, & deinde ad duos musculos palpebras recludentes, & tandem idem ramus pervenit ad temporalem musculum; ex altera parte adest alter ramus prodiens à quinto pari nervorum cerebri, qui sic fitur versus anteriorem partem serpentis instar, & ingreditur temporalem musculum, vt nervus durior evaderet, sicuti Galenus iudicat. En quod læsis quibuslibet ex iis propaginibus potest hoc officium constringendi inferiorem maxillam cessare, vel diminutè agere; quando ergo causa huius læsionis erit attribuenda nervis, hisce, volueris nementio, vel inferiori maxillæ inunctiones parare, & topica diuersa adjungere; volueris curationem dirigere in partem, vbi nulla est noxa, & nullus



nullus est morbus, quamuis appareat ibi symptoma: Erit ergo ad nervos producentes à capite dirigendus spiritus, vel caput ipsum corrigendum, idcirco, ut quam diligentissimam compares cognitionem, quando læsio in hoc musculo sit ob ramum tertij, vel quinti paris, & labefactatio contingat in musculo, & per consequens in mento appareat hoc symptoma, quod non possint, ut opus est, mandere: audias quomodo virtute anatomie id consequi poteris, an-ne diximus, ex anatomia ramum tertij paris vestientem temporalem musculum missum esse ad musculos oculorum, & ad musculos duos palpebras recludentes: quare si erit introducta in temporali musculo aliqua malà dispositio causata, vel à coquillione, vel à paralyti propter læsam originem tertie coniugationis nervorum, colligere necessario poteris eandem læsionem esse in oculorum musculis, & in musculis palpebras cōstringentibus, cum sit maximus consensus, & maxima sympathia inter hos musculos per eundem ramum communicata, ut nullo modo possit esse læsus temporalis musculus à causa existente in exordio suorum nervorum, quin læsi sint quoque illi musculi palpebrarum, & oculorum; Si demum malus iste affectus musculi temporalis erit factus ob ramum quinti paris nervorum, tunc est impossibile musculum temporalem lædi à læsione nervorum quinti paris, nisi audicus quoque læsus sit propter maximam sympathiam, quæ est inter ramum quinti paris pereprantis ad musculum temporalem, & ramum expensum auditum formantem, cum ab eodem stipite proximè deducantur: videas ergo quantus sit consensus, & sympathia in hoc nostro corpore, quam si exactè medicus posset adire, vno aspectu omnia in altissimis corporis latebris delitescèntia pervaderet. Sed cum datum non sit, nisi aliquarum partium sympathias cognoscere, pergamus in alias plerâsq; quæ cognosci possunt, ut, quantum fert tenuitas nostra, ad certitudinem medicam accedamus; transferamus igitur cognitionem sympathie musculi temporalis cum aliis in usum medendi. Ex traditis iam scimus musculum temporalem per nervum prodeuntem à tertio pari nervorum, cerebri consensum habere cum oculis, ergo iuvabit, si musculus per huius nervi læsionem perderet suum officium, derivare per nares, & per os humorem in nervis imbibitum; quoniam maximus est consensus inter nares, oculos, & os, & à nulla parte commodius dilabi poterit excrementum imbibitum, in tertio pari nervorum cerebri, quàm ab oculis ad nares, & à naribus ad os, cum ob vicinitatem partium, tum quia adsunt inter has vicinas partes foramina communia cuneali, & superiori maxillæ, per quæ natura medicamenti adiuta promptè excernere poterit excrementa: si ex altera parte videbimus musculum temporalem læsum esse ob defectum rami à quinto pari prodeuntis, quod cognoscemus ex auditu læso, tunc nullo modo per nares, vel per os poterimus tam commodam derivandi occasionem sortiri, & ratio est, quia quintum par nervorum est aliquantulum remotum à foraminibus illis latissimis oculorum, narû, & oris: colligas ergo esse prorsus impossibile sine cognitione consensus, & sympathie partium,

nos scire deriuare, reuellere, & euacuate peccâtes humores; quis enim sine anatomia sciret, quando esset læsus auditus; an esset melius deriuare per occipitium, quam per nâres? quando tamen sciret originem quinti paris neruorum cerebri versus posteriorem partem vergere, tunc in læso auditu ob neruum in suo principio læsum, sciret locum, per quem commodè reuulsio, vel deriuatio fieret, de qua re, cum alibi actum sit, notum est, vt hic vltcrius philosophemur.

*Errant empirici, dum illis, qui non possunt inferiorem maxillam aperire, oleis amygdalinis, vel alterius generis semper maxillam inungunt.*

#### CAPVT XIV.

**C**ERTUM est, ad musculum illum quartum à styloide processu ortum hoc munus aperiendi maxillam inferiorem pertinere; qui defertur sub aute, & ad summum mentum, vt bucam aperiat, implantatur. Vbi tamen datur in ægrotantibus hoc infortunium, vt os aperire non possint, quod ob quam plurimas causas obtingere potest, tunc Empirici in cōsuetam erumpunt insecitiam, quæ est perpetuo symptomati occurrere, non causæ, tunc enim inungunt mentum oleo amygdalino, supponens aliubi non esse localia medicamenta apponenda, quæ ubi symptomata apparent: sed age tantam inanitatem arguamus. Anne potest esse inflammatio parum manifesta, seu pituitosa iuxta aures; vtque imbibito musculo, ubi exoritur, inde non possint contrahi musculi fibræ? & per consequens non possit inferior maxilla aperiiri? attamen persæpè vidimus empiricos errare in hoc casu, quia in hominibus parotide obfessis non valentibus deorsum trahere maxillam, semper inungunt mentum, credentes causam, quæ maxillam non aperiat esse in mento, & non in parte superna sic conterunt olea, & vnguenta omnia, dum obliniunt partem illam summam, quæ aliquando (vt diximus) lædi potest per consensum musculi læsi solum in parte superna.

Amplius sæpenumero, nulla noxa per se existente in styloide, accidere solet talis impotentia aperiendi os, non ob læsum mentum, sed ob aliorum musculorum adhærentium compressionem, vt in anginis, & in capitis vulneribus, & in parotidibus vidimus quorum occasione tanta confluat circa aures humorum diluuius, vt comprimat vniuersam illam partem, & per consequens quartum istum musculum (cuius vsus est os aperire) non possit muneris sui officium explere: præterea, anne posset in destillationibus capitis cōtingere, vt glandulæ post aures repleantur catarrho, vt propterea vix aperiri possit maxilla? tunc oblinientes mentum frustra conterunt olea, & vnguenta; quia esset tunc inunctiones dirigendæ versus processum illum capitis stillum imitantem, quæ pars pituita viscosa obducta est.

*Præterea*



Præterea contingit sæpiſſimè in parotidibus dolorem perſentiri, nō ſolum in maxilla; ſed deſcendere uſque ad iugulum; quomodo ergo ſine hac de ſympathia partium cognitione poterimus difficultates haſ diſluere: audias ergo, quo pacto per conſenſum vicinitatis id fieri poſſit; iſte quartus muſculus in maiorem molem elatus, ob repletionem comprimit ſuperiacentem, qui eſt latus ille muſculus, cuius munus eſt labium deorſum obliquè trahere, & iſte muſculus exoritur à iugulo, ut hinc diſtenſo muſculo perſentiat dolor iuxta claviculam; quamvis cauſa doloris ſit in parte ſuperna; volueris ne tunc claviculam inūgeres, quomodo parum cura ſit illa ſententia; ubi dolor, ibi morbus: ad eundem modum læditur muſculus latus malè agēs ſuum officiū trahendi ad latera deorſum labium ob eandem compreſſionem factam à quarto muſculo maxillæ; attamen integra eſt ſanitate latus muſculus donatus, cum ſolum per accidens, & per conſenſum offendatur.

*Per quam ſympathiam parotides conſens dolorem in iugulo.*

Poſtremo, ut videas quot modis affici poſſit vna pars per ſympathiam generis, ſcias, neruum inſeruentem maxillæ motui, deduci à ſeprima coniugatione neruorum cerebri, quæ verſus occipitium magis habet ſuum principium, & per foramen obliquum occipitis egreditur, & ſcinditur in complures propagines, quarum maior diſcurrit ſub maxilla hac inferiori, & ad linguam vadit, ut motum, & ſenſum ei tribuat: Ex hac concepta veritate colligimus, ſi hæc maxillæ inertia, ſeu impotentia os aperiendi pender à neruis læſis, non potius debere occipitio, ubi obliquum foramen ſitum eſt, adiungere topica, quam mento, vel aliæ maxillæ parti.

*Qua via noſcatur 4. muſculum maxilla non poſſe os aperire ob læſionem neruorum in origine.*

Sed video lectorem ſummo deſiderio incenſum quærentem, qua via poſſit incedere, ut certo ſciat muſculum hunc quartum carere hoc officio ob neruorum offenſionem: Colligimus nos ex conſenſu generis omnia; in primis neruus qui reddit muſculum motus, & ſenſus participem, reddit ille quoque linguam ſentientem, & mouentem; quare ſi neruus erit læſus, videbimus non ſolum muſculum quartum labefactatum eſſe, verum etiam linguam; & ex hac læſionum ſyndrome ob generis conſenſum in hanc reconditam cognitionem peruolare poterimus, & exinde ubi agendum ſit certo cognoscemus: nam diximus per foramen obliquum occipitis diſcurrere ſeprimam coniugationem neruorum, ergo ubi deriuare eſſet opere preteritum, in occipitio auxilia, ut phlegmata, fonticuli, ſetacea, eſſent adminiſtranda: videas ergo quanti facienda ſit anatomia hæc artiſticiola, ſine qua eſt impoſſibile affectus cognoscere, & rectè adminiſtrare remedia.

*Qua ſympathia ſit inter quartum muſculum maxilla, & linguam.*

*Errant, dum illis, qui non poſſunt brachium pectori adducere ob ſu-  
nis tormentum, occurrunt lana ſuccida, linimentis iniunctio-  
nibus, brachiis, quando pectori eſſet occurrendum.*

CAPVT XV.

**O**FFICIUM adducendi brachium pectori in parte ſuperna, media, & infima peruenire ad primum muſcularum brachij, nemo ana-

*De ſympathia inter brachium, & pectus.*

romicorum est, qui nesciat, & hunc pronasci à media iuguli sede, ab osse pectoris, progredientemque versus sternon, anteriorem thoracis partem occupare, exploratissimum est, & deinde implantari in partem humeri anteriorem sub eius ceruice: qui experiuntur ergo motum huic primo musculo contrarium ob funis tormentum, tunc hic musculus in exordiis laceratur, & ferè diuellitur tanta cù violètia, vt quammaximos miseri in pectore experiantur cruciatus, & angores: tunc nihilominus videbis, chirurgos ambo brachia, & humeros utrobique lana succida, vnguentis, & oleis obducere, credentes humeris occurrendum, & suppetias toti brachio afferendas esse; quod faciunt, quia re verà sunt anatomia spoliati, nescientes à quibus partibus musculi trahant originem, & quæ partes nostri corporis consentiât; esset enim tunc circa sternon in parte anteriori thoracis medicandum; quia ibi enascitur primus brachij musculus, & ibi facta est laceratio, & pars illa angorem, & cruciatum vehementissimum passa est; lædatur enim funis tormentis hic musculus, & eius vsus ob vehementissimos illos cruciatus adeo languet, vt ferè extinctum sit officium adducendi brachia pectori.

Amplius, si in anteriori hac pectoris parte indictum esset vulnus, & post sanatum vulnus, præter cicatricem, scythosum quidpiam in fibræ esset relictum, vel tonfor volens aperire, & dilatare vulnus, vel abscissum pectoris in longum secuisset musculi fibras; tunc musculus in hoc munere adducendi brachium pectori mancus redderetur, nihilominus ob quamlibet causam accidat. Empyricus, si musculus iste non expleat partes suas, consulit, vt brachium lutea Parauina, vinacea, fonticulum, & omnia vnguenta, quæ tunc imaginatur, experiantur; quamuis brachium per se optima sit constitutione prædictum, & in omnibus peroptimè, quæ ipsi in immediatè constituunt, se habeat; quam lèSIONem, ob fibras malè incisas in pectore, vbi est principium, & exordium huius musculi, si omnia vnguenta adiungeret Empyricus, & sexcenta inureret cauteria, de medio non tolleret. Ecce igitur quæ sæpè Empyrici sine anatomia ægyptos fallant, continenter occurrentes parti, vbi videtur symptoma; symptoma est in brachio, causa est in pectore; quare nisi ad examen anatomicum omnem malam affectionem corporis nostri reuocemus, & expendamus ex animo omnes consensus, & partium sympathias, de re medica actum erit, quinimò circumforaneis iis remediis Empyricorum haustis de triuittis, & circulis additur potius aliquid ad morbi molestiam; quam detrahatur.

Cæterum, vt melius Empyricorum inscitiam cognoscamus, sit per hypothesim musculus iste brachij læsius; vel in loco, vbi est humerus, vel vbi est iugulum, vel in pectore, atque dolor affecti musculi perueniat vsque ad os pubis; tunc libenter viderem, quò se vergerent Empyrici in administrandis remediis; scio enim illa consuetà moueri sententia, quod vbi dolor, ibi sit morbus, quam tamen falsæ medicinæ sententiam non semel reieciimus; quoniam Empyrici os pubis inungerent, quia ibi viderent symptomata, & in humeri ceruice delitesceret causa

*De sympathia inter primum musculum brachij, & os pubis.*



causa doloris, at audias ex anatomia cur hoc sæpè obtingere soleat: & est, quia carnosâ membrana huius musculi adducentis brachium pectoris arctetur cum primo ventris musculo illo, cuius officium est premere intestina, & est ille, qui descendendo excurrit vsque ad os pubis, quare potest contingere morbum existentem in brachio adeo distendere membranam carnosam in illo loco, ubi arctetur cum primo ventris musculo, ut musculus quoque eo modo distendatur, ut dolor vsque ad os pubis descendat: sicuti de vomica dici potest, in qua inflammationis materia est in pleura costas succingente, & dolor peruenit ad iugulum, ubi nullum est inflammationis lignum: videant ergo morbum esse in pectore, & dolorem circa os pubis, morbum esse in primo musculo ventris, & dolorem per membranam carnosam compartiri brachio, pectori, iugulo; & dum premuntur intestina dolorem ad humerum, ad iugulum, & ad partem anteriorem pectoris, ad mammillas, per consensum, & sympathiam generis communicari. Coerceant igitur temeritatem; quoniam vis anatomica mirabilem virtutem obtinet in euellendis his erroribus, & deponant illam suam sententiam: ubi dolor, ibi morbus, nisi alio modo explicetur, & nunquam symptomati occurrant, nisi vigeat.

Postremo, ut de nervis artificium exequamur animaduerrant, & istud in consensu generis in hoc primo brachij musculo cōtingere, musculum deficere posse ob nerveas propaggines læsas prodeuntes à quinta thoracis vertebra; quia ab hoc loco prodit nervus, qui tandem excurrit ad mammillas, & ad hunc musculum; quare volentes nos curare hanc musculi læsionem ob læsos nervos in origine, ad quintam vertebra confugere, debemus, quæ est origo, & causa, cur musculus non possit ad pectus brachium adducere, & hoc modo concipiendum est, quando hoc acceptum referendum est nervis quintæ thoracis vertebra; quoniam antequam furculi nervei excurrat ad mammillas, prius irrigant deltoideum, id est, secundum brachij musculum, officium cuius est attollere brachium, & primum scapulæ, cuius usus est trahere scapulam versus pectus, quartum brachij, & secundum ventris; & propterea nõ potest in quinta vertebra læsionis exordium esse, nisi omnes dicti musculi quoque lædantur; ex quorum omnium læsione caudicem, & truncum deficere, præcognoscemus, & tunc æmulantes Galenum emollientibus adhibitis, quintæ vertebrae varias læsiones brachij, pectoris, ventris una amputare poterimus.

Qua via cognoscitur  
brachia non  
posse adduci  
ad pectus ob  
læsionem nervorum.

*Errant Empyrici, dum localia auxilia applicant brachiis per sympathiam læsis, quando potius natibus deberent applicari.*

#### CAPUT XVI.

TANTO consensu partes totius nostri corporis conditæ sunt, ut mirandum non sit, si læso capite, aut vertebri; inde digiti manus,

*De sympathia, quæ est inter os sacrum, & brachia.*

vel pedis consentiant; quoniam à cerebro, à corde, & ab hepate, tanquam à primis radicibus tales enascuntur propagines, vt quælibet ferme corporis pars per neruos, animale[m] virtutem, per venas alimentum, & per arterias vitam recipiat, & hæc est principalis ratio, cur mala, vel bona viscerum valetudo tã promptè extremis; & summis partibus communicatur: Præterea alter obseruatur consensus in longis musculis, de quibus modo loquimur, in quorum exordio, si læsio aliqua recipitur, illico mala illorum valetudo partibus, quibus muscoli inferuntur, communicari solet. Hinc obseruamus mirabilem sympathiam inter os sacrum, lumbos, & brachium factam à quarto brachij musculo illo longissimo & latissimo, cuius munus est brachium deorsum trahere. Causa igitur huius sympathiæ, est longitudo, & latitudo huius quarti musculi; quoniam habet exordium, & originẽ à vertebreis, incipiendo à sexta thoracis vertebra vsque ad dimidiam ossis sacri partem, & scandens vtrinque versus axillas, implantatur parti anteriori ceruicis humeri; vbi inseritur quoque primus musculus; inter quos duos relinquitur axillæ cavitatis; quare supposita hac quarti musculi origine, valebit consequentia ab officio læso ad musculum læsum; veluti si dicerem, brachium non potest trahi deorsum, ergo quartus iste musculus læsus est, ergo nihil prohibet, ne huius læsionis causa possit quoque esse in exordio huius quarti musculi, quod est in dimidia parte ossis sacri, vbi sunt quoque nates; proinde contingere potest, vt aliquando morbus sit circa os sacrum, & eius morbi apparentia in brachio; pro cuius curatione remedia non brachio essent adiungenda, sed potius natibus: quare si hunc in modum res se habet, cur Empyricus semper partem secundum apparẽtiam affectam remediis tractat? & cur semper symptomati occurrit, inunctionibus, fomentationibus, & similibus: occasiones enim, & causæ, quæ possent hunc vltimum quarti musculi auferre variæ esse possent de illis, quæ re vera in brachio ipso nullas haberent radices, veluti si contingeret inter sextam vertebream thoracis, & dimidium ossis sacri, fibras musculi (in quibus fibris collocata est virtus mouendi) esse læsas, vel propter humores aliunde missos, vel quia fibræ illæ ab aliquo inexperto tonsore occasione vulneris, vel apostematis aperiendi, vel dilatãdi transuersim fuerint incisæ, vnde tendo musculi ob fibras excisas virtute priuatus in suo obeundo officio, quod est trahere brachium deorsum, deficeret: quare, si propter has causas brachium esset læsum, & Empyricus brachio vnguenta applicaret, esset prorsus ridiculum, cum brachium per se careat mala valetudine. Similiter si cõsiliu[m] dabit Empyricus (sicut nuper vidimus) vt brachium hoc modo læsum per consensum induatur pellibus leporinis, vel ceratis, vel lana succida, dicat mihi, in qua re, magis tempus contereretur brachium sanè optima sanitate est constitutum, & quamuis in hoc officio trahendi deorsum brachium læsa sit brachij functio; attamen hæc mala causa est in quarto musculo brachij, qui totus est in dorso, in lumbis, & in ossẽ sacro; & nõ in brachio, quia nulla istius musculi portio brachio hæret, nisi tendo, qui ad axil-

*In dorso, & lumbis, apostemata non esse transuersim incidenda.*



las tantum discurrit. Cur igitur Empyrice, si quartus iste brachij musculus est læsus ob excisas fibras, vel ob scyrthosam dispositionem existentem in dorso, in lumbis, & in osse sacro, & nequaquam in brachio; cur inquam audes, quando tua vnguenta non iuuant, cōsulere, vt brachium experiatur luta Parauina, & vinacea, & demum, si hæc tua auxilia nullas afferunt suppetias; cur credis illico caput, & alia interna viscera esse malè constituta; & quod deterius est, incipis ægrum pharmacis vexare, & stillicidiis ceratis exsiccantibus, & lotionibus ægro- tantis caput alioquin sanum deuerberare, & in malā dyscrasiam trans- ferre sine aliqua spe, quod brachium horum remediorum ope cure- tur: quoniam morbus tunc est in dorso, vel circa lumbos, vel os sacrū, & per sympathiam tantum in brachio, & non in capite. Hinc duo pro- pria Empyricorum errata obseruantur, quæ sunt multorum errorum radices; alterum est, dum dicunt, quod vbi est dolor, ibi sit morbus, quod est falsum, & hæctenus à nobis reiectum; alterum, dum sympto- ma est perseverans, & difficilis curationis, siue sit dolor, siue motus di- minutus, vel ablati musculorum, credunt semper omnia hæc sym- ptomata à capite pendere; sequitur deinde hanc suam falsam senten- tiam aliud erratū, quod videlicet debeat purgari caput, quod est opti- mē constitutum, & ex hoc errore in alium longè maiorem incidunt, & est, de facto sanum caput purgare; addūntque nullum aliud auxi- lium inueniri posse, quod melius caput purget, quam decoctum falsæ, vel ligni; quare, si contingit, hanc functionem brachij diminutam cau- sati à dispositionibus scyrthosis existentibus in exordio quarti muscu- li, adeo virtute decocti falsæ exsiccāt scyrthosum affectum, vt tenuio- ribus partibus per virtutem sudorificam absuinptis, tumor lapideam duritiem subire incipiat, & paulò post in verum lapidē cesset, vt nulla armoniaci vis tanta polleat facultate, quanta opus esset pro euellenda duritie illa existente in ossis sacri, vel lumborum regione. Errant igitur multifariam in primis errant, dum ob musculum læsum in osse sa- cro à scyrthosa dispositione adiungunt capiti stillicidia, quæ potius podici conuenient: errant, quia proponunt fonticulos alteri brachio, quando esset inutendum potius circa os sacrum: errant, vtētes erthi- nis, & masticatoriis, & ceratis exsiccantibus caput, quādo caput opti- ma sanitate donatum est: errant, dum volunt caput sanum roborare, & eos non pudet craneum humanum in pollinem redactum præbe- re, vt per similitudinem roboraret caput: in primis errant, quia caput nō est læsum; deinde errant, quia craneum humanum puluerizatum (di- cat Trallianus quidquid vult) est remedium ridiculum, vt experientia cognoscitur.

Duo prima  
errata Empy-  
ricorum un-  
de plura se-  
quuntur.

Si demum musculus iste quartus non fungeretur suo officio ob ner- uorum surculos ortos à vertebris, quibus alligatur, cognoscemus hac

Quo via  
noscat  
brachium nō  
trahi deor-  
sum ob ner-  
uos laesos in  
origine.

femur, & musculos lumborum in suis obeundis officiis vna de ficere de (quorum officiis quoque paulò infra tractabimus) tunc certo dicere poterimus, brachium non trahi posse deorsum non ob caput laesum, non ob humores existentes in brachio; sed ob lēsos nervos in vertebis lumborum, & ossis sacri, quippe qui dant motum, non solum quarto huic musculo brachij; sed etiam sexto femoris, & lumborum musculis, & capitis; ratio enim, cur in vertebis sit causa, vel protopathia, & non in capite, est quia, si esset in capite protopathia, non solum musculus sextus femoris, & musculi lumborum essent laesi, sed omnes musculi totius corporis; quia à capite virtus totalis dependet.

*Errant, dum topicis tractant cervicem laesam per sympathiam à morbo existente circa quintam thoracis vertebra.*

### C A P. XVII.

**N**ON semel vidi aliquem fuisse percussum circa quintam thoracis vertebra, vnde post curatam inflammationem à percussione orram aliqua durities relicta sit, quæ deinde erat in causa, ne caput ad posteriorem partem, vel in latus commodè attrahi posset; empyricus tamen conuocatus, videns caput neque ad posteriorem partem, neque in latus attrahi posse; illico in erratum consuetum incidit, quod est occurrere symptomati, & misero consilium dat, vt ceruix tractetur inunctionibus, credens semper causam morbi esse, vbi videntur symptomata, & accidentia, nulla facta consultatione de hac partium nostri corporis sympathia: eius verò partes erant in primis perquirere, ad quem musculus munus hoc attrahendi caput ad posteriorem partem rectâ pertineret, deinceps vnde musculus sumeret initium, & demum contemplari, quæ musculi pars esset oppressa malorum succorum infarctu. Sciendum est ergo, dimissis altercationibus in re clara, ac prænitente, vt est anatomica facultas, hoc officium attrahendi caput rectâ ad posteriorem partem pertinere ad primum par musculorum capitis, & ad secundum; sed cum hoc discrimine; quod primi paris musculi ambo vna attrahentes id præstant, quia à quinta vertebra pronati ascēdunt ad tertiam cervicis, & inde extrorsum obliquè ascēdunt, ideo ambo concurrunt, vt trahant caput ad posteriorem partem rectâ; si verò alter musculus tantum trahit, caput in latus circulariter vertit & non rectâ; si verò de secundo pari loquimur, vnus tantum sine suo cōiuge attrahet caput rectâ in posteriorem partem; quia hic insertus est in medio occipitis; sciendum quoque est, quod secundum par musculorum capitis exoritur à transverso processu quartæ, & quintæ thoracis vertebra, & recto situ ambo ascēdentes occipitis ossi inferuntur, quare totum hoc spatium inter quintam thoracis vertebra, & occipitium est considerandum, & ante oculos collocandum; quoniam à cuiuslibet, parti illius spacij causâ, quæ impedire potest motionem hanc capitis

*De sympathia inter quintam vertebra thoracis, & col lum.*



pitis, adhærescere posset, ut aliquando circa quintam vertebra sit morbus, & imago ipsius, vel symptoma in capite, & durities sit circa quintam vertebra, & dolor in occipitio: quare, cum ita res se habere possit, cur vis tunc inungere ceruicem, cur vis, ubi circa quintam, vel alias superiores vertebra duresceret humor, confugere ad fallam? ad decocta cinæ? quorum vsa abeunt tenues humores, & crassiores lapidescunt: vel proponere audes masticatoria, stillicidia super commissuram cranialem, & erthina, ut mala docet consuetudo ceterorum Empyricorum, qui in omni morbo difficili ad purgandum caput perpetuò se vertunt; deberent sanè Galenum æmulari, qui in homine veniente Romanum non decoctis, non erthinis, sed emollientibus adhibitis septimæ vertebræ scythosam dispositionem sustulit è medio, & motionem tribus illis digitis reddidit; & hoc est mederi, agnoscendo prius corporis nostri fabricam: propterea vae illis qui adeunt Empyricos anatomia priuatos, nam iure merito ego soleo Empyricum hunc assimilare insano illo, qui, cum numquam vidisset ædificia, vellet consulere, quomodo ædificiorum reconditæ maculæ essent delendæ; vel & melius, cum nunquam vidisset quomodo internæ horologii partes sint compositæ, attamen vellet, si motus cessaret, consilium dare, quid esset agendum in ipso. Verùm quis eius consilium reciperet? ego sane, licet in maxima essem angustia, semper in iis rebus floccifacerem illum, & ad artifices, qui scirent omnium intimarum partium officia, enestigò confugerem. Ad eundem prorsus modum in vitiatæ corporis nostri functionibus nisi Medicus, quem adire intendimus, anatomia excultus sit, & calleat origines, substantiam, meatus, situm, figuram, & per consequens vsus omnium partium corporis, quamuis multo diligentissimus esset in receptis præscribendis, & in cognoscendis pulsibus, & urinis, & in recta viuendi norma, quod plurimum est, exercitatus, cum in re medica parui facerem, & ipsum despicerem; quoniam talis nasci potest occasio, ut spoliatus anatomia, aliquod det consilium adeo aduersum, ut huius rei maleficio, ægrum ad manifestam perniciem adducat.

*Medicus sine anatomia quomodo hominis insano comparatur.*

---

*Declaratur sympathia affectuum musculorum ventris: & quomodo dolor esse possit in testiculis causa doloris existente circa sextam costam.*

C A P. XVIII.

**V**IDIMVS durum timorem cum indolentia circa sextam costam, & dolorem peruenire ad os pubis, ad testiculos, & ad lumborum vertebra; in hoc casu tamen Empyricum vidimus cum topicis tractare partes dolore affectas omni humore, & mala qualitate carentes: sed poruisset sanè mensium, & annorum curriculo testiculos inungere, quod nihil ad dolorem auferendum boni fecisset: ratio deducitur

omnis à partium sympathia, quoniam musculus primus ventris oblique descendens, ita in longitudinem, & latitudinem se extendit, ut non sit mirum, si humorum infarctus vnam partem obsidere possit, & alia patiatur dolorem, quoniam musculus oritur à sexta, septima, octava, & nona costis, antequam in cartilagine cesset, & deinde abdomini toto constituit inuolucrum; oritur quoque à vertebra lumborum, & à dimidia appendice ossis ilium, & implantatur utrobique cum suo coniuge alteri parti appendicis ossis ilium, & ossi pubis, & cessat in candida linea in medio posita, tanquam in termino horum musculorum omnium abdominis: eius officium est intestina comprimere constringendo inferiora thoracis: ex hoc officio, & ex situ tumoris circa sextam costam in illa parte, antequam in cartilagine cesset, colligimus primum, hunc musculum ventris esse hoc tumore affectum: & quia ossi pubis alligatur, non erit mirandum, si ad partem illam peruenerit dolor ob generis consensum, qui fit ob distensas fibras in aduersa, & eminens sit eiusdem musculi parte: neque erit mirandum, si testiculi maximo sensu præditi consentiant, & patiantur intensum dolorem, quia musculi isti ventris in duplici loco sunt perforati, circa umbilicum, & prope os pubis, per quæ foramina, vase semen testiculis præparantia descendunt, & ascendunt deferentia, quæ in glandulas parastatas inseruntur, & per quæ foramina herniæ fiunt; quare violenter tensis vasculis semen præparantibus, & deferentibus, cum acuto sint sensu constituti, acutissimo premi possunt dolore, quamuis careant omni morbo, cum ille dolor accidat per consensum, quatenus videlicet tumor superior circa sextam costam distendit cum violentia perforatos tendines: ad eundem modum descendit dolor vsque ad lumbos, quibus alligatur musculus iste; quare nisi origines, figuras, & terminos longarum partium corporis pernoscamus, non video, quomodo poterimus diuinare affectuum per consensum initia, & causas; & nisi perfecte sciamus quomodo fibræ horum musculorum quoquoersus perreptent, non video, nos posse in hanc cognitionem peruenire, quando erit per essentiam, & quando per consensum iste affectus; & versa vice; quoniam vidimus aliquando tumores, & hernias in testiculis distendere vasa deferentia, & omnes musculos ventris, attamen dolorem ascendere ad origines, & principia musculorum: quare poterit obtingere tumor in testibus, & dolores ascendere ad sextam costam vsque, ad umbilicum, ad os pubis, ad lumbos, ad os ilium in linea candida; sicut in Ascite, sentitur dolor in osse sacro, ubi in tantum distenditur epigastrii, ut lumbi, quibus musculi alligantur, summum ob distensionem patiantur dolorem; videant ergo omnes, an verum sit, ubi dolor, ibi morbus, morbus erit in testiculis, dolor vero circa costas sextam, septimam octauam, & nonam, & versa vice; morbus circa costas, & dolor erit in testibus, vel in osse pubis. Præterea cognito usu musculorum intestinorum non vniuersaliter, quia omnes sciunt, octo musculos ventris in hunc finem esse conditos, ut comprimant intestina gratia eiiciendi feces. Sed proprius usus non ita facile ab omnibus cognoscitur, quare

*Quomodo  
fiant herniæ.*

*Vt errant di  
in hernia  
inungunt co  
stas, & in  
ascite, lum  
bos per sym  
pathiam la  
sos.*

sicuti



sicuti de descendētibz musculis, quorum officium est, inferiora Thoracis constringere, diximus valere, inferiora thoracis non constringuntur, ergo erunt lassi musculi obliqui descendentes, ergo in iis potest esse morbus vsq; ad sextam costam, vnde enascuntur, quando dolor erit circa pubem; similiter de ascendētibz musculis est dicēdum, quorum munus proprium est constringere intestina trahendo quatuor inferiores costas deorsum, quibus alligantur; & hic obiter scias, quod dilatur thorax, quando trahuntur deorsum costæ, contra aliquos, qui credunt tunc dilatari, quando sursum costæ efferuntur; dicas ergo, costæ hæc quatuor infernæ diminutè trahuntur deorsum, ergo musculi hi ascendentes sunt lassi, ergo potest esse dolor in istis quatuor costis, quibus alligantur isti duo musculi ascendētes, & morbus in ilibus, vnde sumunt principium: rectorum verò musculorum proprium officium est sternon, & mucronatam cartilaginem trahere deorsum, & simul comprimere ventrem, & dilatare thoracem, si deficiet hoc munus, erunt lassi isti recti musculi, & morbus poterit esse in medio ossis pubis, quando dolor erit circa sternon, vel versa vice. Transuersaliam denique musculorum munus proprium est constringere hypocondria, quia suis transuersis fibris amplexantur tota hypocondria, & oriuntur à vertebrae lumborum, & inseruntur ossibus ilium, & pubis, quare si deficiet hoc munus constringendi hypocondria, isti musculi erunt lassi, ergo poterit esse morbus in lumbis, & dolor circa ilia, & circa pubem, vel versa vice, & hunc in modum peruenies tandem ad cognitionem sympathia musculorum ventris.

*Errant Empyrici, dum pubem dolore affectam tractant anodynis, quando causa doloris pubis non est in pube sed inter sternon, & mucronatam cartilaginem.*

CAPVT XIX.

**F**UIT quodam malo infortunio percussus amicus in parte illa, quæ sita est inter sternon, & mucronatam cartilaginem, eique contigit post hanc percussione[m] dolorem ab ipso perſentiri circa vmbilicum, & circa medium os pubis; & quando post curatam inflammationem ob percussione[m] factam sperabat omnino fore se doloris expertem, tunc relicta dispositione scyrthosa in patiente particula cum indolentia, aliubi dolores ab ipso perſentiebantur. Et tunc Empyrici toris horis adiungebant temerè ossi pubis, & vmbilico fomentationes, emplastra, & topica omnium generum, cuius erroris occasio fuit anatomia[m] inscitia, quia res hunc in modum se habet, musculi recti à medio ossis pubis enascuntur, & rectis fibris ascendunt vsque, & supra mucronatam cartilaginem, & desinunt in sternon coherentes sextæ, & septimæ costis; his rebus fiebat, vt tensis fibris rectis in parte superna, & induratis ob scyrthosam dispositionem fibræ horum musculorum

*De sympathia inter sternon. & pub. m.*

rectorum, quæ ad pubem perueniunt magis aptæ ad cognoscendum dolorem, quam illæ, quæ in parte, vbi est scyrius factus indolens, dū amicus premebat partem anteriorem abdominis trahendo thoracem deorsum, quod est munus, & officium horum rectorum musculorum magnum pateretur dolorem, nō circa sternon, sed vbi est pubes: quare cum muscoli in parte inferna per consensum generis, & per accidēs, quod est ratione alterius partis superioris patiantur, cur in inferna parte, vbi non est morbus, vis topica adiungere esset perinde ac vellent ymbra auferre non ablato corpore: quare debemus nos respicere ad id quod per se indicat, & non per accidens, & per consensum, vt alioribus principiis ostendemus in libro de indicatione, nec valet vbi dolor, ibi morbus, quia hæc propositio est in materia contingente, vbi ambæ contrariæ propositiones falsæ sunt, veluti si diceremus, semper vbi est dolor ibi est morbus, hæc est falsa, falsa quoque est contraria: nunquam vbi est dolor, ibi est morbus; quare inferamus, subalternas esse veras, quod aliquando vbi est dolor, ibi sit morbus, & aliquando non sit dolor, vbi est morbus.

*Vbi dolor ibi morbus, huius propositionis solum subalternae sunt vera.*

*Error explicatur quorundam Empyricorum, qui topica applicarunt pectori, cernici, & brachii, quando ossi sacro læso à morbo existente in exordio quarti musculi thoracis erant applicanda.*

#### C A P. XX.

*De sympathia inter os sacrum, columnam, pedus, brachia, & manus.*

**A**LIIQVANDO vidimus, patientem conflictatum fuisse aliquo dolore circa os sacrum, & paulò post consequutam fuisse læsionem respirationis; quia ob consensum musculi extensi ab ossæ sacro ad cernicem læsio facit communicata; vnde patiens non solum in difficilem respirationem incidit, verum etiam in illo inceperunt brachia stupore aliquo affici; quis posset causas tantæ sympathiæ, atque consensus diuinare, nisi ex animo prius expenderet, huius quarti musculi thoracis initium, progressum, & quibus partibus impleretur, & officium, quod ab ipso debet expleri? est enim quartus musculus thoracis adeo longus, vt sit verum exemplar illorum affectuum, qui per consensum generis sentiuntur eminus à radicibus, atq; morborum exordiis; quoniam oritur ab ossæ sacro, & ab interno ossæ ilium, & scandēs per lumborum vertebrae pertinaciter adheret decem primis costis, quæ huius musculi ministerio arctantur causa constringendi thoracem, & exprimendi fulgines; & tandem inseritur septimæ cervicis vertebrae vt hinc non sit mirum si dum in exordio afficitur hic musculus tumore, vel dolore, vel lassitudine aliqua, quæ sit tensiva, vel vlcerosa, vel phlegmonodes, necessariò lædantur partes, quibus anectitur; huius enim musculi vsus est, ligamentorum munere, quibus alligatur decem superioribus costis, coarctare thoracem; quare, læso huius musculi exordio,



dio, nec: illud sequitur, ut cum aliqua difficultate coarctetur thorax, unde fuligines ob diminutam coarctationem thoracis retineantur, & inde tantam passionē illis retentis experiantur miseri, ut sentiant prope modum suffocari; tunc quis risum teneret, videndo Empyricos nostrates in tali symptomate uti oleo amygdalino causa inungendi pectus, cum in pectore nulla sit noxa, nulla mala causa, vel morbus consideat? potius enim ipsi deberent superlinire nates, quam pectus, quinimo, si fomentationes adiungerentur lumbis, & ubi causa hæc adesset, aliquid opis illico patiens consequeretur; quoniam contingit, ut ob hanc musculi longitudinem, causa esse possit circa lumbos, vel circa os sacrum, & circa ilia, unde nascitur, & aliquando læso principio cervicem dolere, cum in septimam cervicis vertebra[m] musculus inferatur.

Præterea ex hoc quarto musculo læso in exordio, ubi est os sacrum, consequi potest motus brachiorum diminutus, & audias cur, quoniā nervi inferuientes brachio, & manibus exoriuntur à vertebra[m] cervicis, quorum nervorum capita aliqua, si comprimantur à distenso hoc quarto musculo, qui pervenit usque ad septimam vertebra[m] cervicis, potest esse, ut propterea langueant brachia; & digiti manus semi stupore afficiantur, causa tamen existente in osse sacro; ecce igitur, quod ob consensum vicinitatis, quatenus nimirum musculus comprimit vicinos, & adhæretes nervos, deinde brachia, & manus languent, & adeo in nonnullis digiti patiuntur, ut resoluti videantur, en quo pacto morbus est in clunibus, attamen adeo potest sympathia, ut digiti manus alioquin benè constitutæ partes non expleant officiorum suorum munerum: in simili casu vidi conuocatos à præclarissimis viris Empyricos, qui videntes in ægrotante respirationem difficilem, & illi dolere cervicem, & lumbos, & insimul os sacrum, & brachia, & manus semi quodam stupore aliquando affici, asseruerunt, antedicta symptomata omnia à capite prodire, & caput à subiectis visceribus humorum malam sobolem recipere, & deinde tot pharmaca pro corrigendis capitibus, & hepatis affectibus proposuerunt, & porrexerunt præclarissimo patienti, ut interim priusquam posset vniuersa proposita medicamenta haurire, accesserit vetula pharmacheutria, quæ tempore crisis non osse sacro, vel lumbis, ubi erat opus, sed brachiis, & digitis manus, & pectori fabulosam quandam inunctionem adiunxit, & tunc natura superante morbum, vetulæ gratias patiens egit, & non medicis, qui medicinis vexarunt interna viscera alioquin optima sanitate donata, quoniam nullus erat alter modus tollendi illa symptomata in ægrotante illo melancholico, nisi adiungendo fomentationes lumbis, & osse sacro; soliti enim sunt melancholici homines, halitum crassum in musculis sæpè lacerari, & quando accidit, ut quartus iste musculus thoraci spiritibus istis melancholicis corripiatur, tunc tendines istius musculi, qui sunt affixi costis gratia constingendi pectus, ut fuligines expirentur, impotentes, & merces, à flaribus reddatur, ut hinc tendines cum non probè coarctent, atque constingant pectus; aliquando

*Ut est mor-  
bus in osse sa-  
cro eius verò  
symptoma in  
brachiis, &  
manibus.*

*Cum melan-  
cholici sæpè  
habeant re-  
spirationem  
laxam.*

per aliquod breue temporis spacium melancholici isti videantur suffocari, similiter quatenus tendines distensi sunt flatibus, ceruix, cui affixi sunt, contrahitur in posteriorem partem, vnde oritur ceruicis dolor; ex alia parte tendines huius quarti musculi thoracis, quatenus sunt tensi, comprimunt capita neruorum à septima ceruice proceduntium, & alia sequentia neruorum capita, vnde brachia, & digiti manus iisdem neruorum surculis induti semistupore affici videntur, deum tendines huius quarti musculi comprimunt musculos dorfi, & capitis, vt totum dorsum, læso hoc quarto, videatur læsum; hinc fit, vt, quarto læso, lædatur sextum pars dorfi, quod maximè arctatur huic quarto musculo, cuius officium est, dorsum, & lumbos, & thoracem dirigere, vt possit contingere læso huic musculo quarto à flatibus melancholicis, lædi respirationem, ceruicem, musculos dorfi, neruos brachiorum, & digitorum manus. Colligas ergo ex sympathia vicinitatis cognita in quarto musculo, quam multa cognoscere, & quam promptè remedia adiungere poteris.

*Error empiricorum quorundam, qui topicis tractarunt ceruicem, dum non poterat flecti ob protopathiam existentem in quinta thoracis vertebra.*

## CAPVT XXI.

*De alia sympathia inter ceruicem, & quintā vertebra thoracis.*

CONTIGIT misero cuidam seni, vt ob casum ab alto ictum in dorso circa quintā vertebra thoracis in exortu primi musculi dorfi reciperet, euenit tamen, vt post multos dies dolores in ceruice eum infestare inciperent, nihilominus percussam partem, siue accideret ob indolentiam scyrthosæ dispositionis, siue ob resolutum locū, nullo premi, & vexari dolore obseruabatur; hinc ab optimo isto sene accersiti empirici, qui semper faciles sunt ad credendum in illo loco esse merbum, vbi videntur symptomata, adiunxerunt non dorso icto, atque percusso; sed ceruici dolenti olea, vnguenta, & fomentationes, quæ re vera nullam opem præstare potuerunt, & merito; quia ceruix non erat læsa per se, sed per consensum alterius partis; erat igitur opere pretium perquirere illam partem affectam, in qua erat causa, & protopathia illius doloris: quare, cum ego quoque essem accersitus, ea methodo incedendum mihi proposui, quæ primariam affectionem posset docere, quod vt facerem, incepti prius expendere, quodnam officium in dorso illius senis deficeret, vt possem ex officio læso in cognitionem loci affecti peruenire, quare videns patientem non posse flectere superiorem partem dorfi, ex hoc læso officio statim inueni læsum esse primum dorfi musculum, quia ad hunc musculum pertinet ex omnium medicorum consensu hoc munus flectendi superiorem partem dorfi; exinde, cum hic musculus oriatur à quinta vertebra thoracis, & subiectus stomacho, & œsophago ascendat per internas partes vsque ad occipitium,



cipirium, & in primam cervicis vertebra[m] inferatur, ex hac cognitione originis, & totius progressus musculi, mihi non fuit difficile inuenire in musculo omnia loca, in quibus posset esse hæc primaria affectio: poterat enim esse, vel in principio, vnde nascitur musculus, vel in musculi itinere, siue progressu, vel in parte in quam inferitur; cognitis deinde locis quæ affici possunt, non fuit similiter mihi difficile, ex præcedente cõtusione dorsi facta in illa quinta vertebra, vnde oritur iste musculus, colligere, symptoma illud cervicis cerro trahere ortu à quinta vertebra thoracis, & in quinta illa vertebra, quamvis dolore, & tumore careret, esse primariam affectionem, quam primariam affectionem sanè non potuisset inuenire empyricus: qui origines, progressus, & terminos musculorum non cognouisset. Præterea, vt perfectissimè scirem, an in exordio huius primi musculi dorsi esset primaria causa, cur ceruix non poterat flecti, opus erat, vt executerem hunc nodum, an in exordio musculi affectio esset per se, vel per consensum viciniratis alterius musculi; cognoui autem affectionem esse per se in hoc primo musculo dorsi circa quintam vertebra[m] hac potissima ratione, quia nulla alia alterius musculi functio incæpit deficere, nisi ista, quæ est flectere partem dorsi supernam: quare ex actione primo loco læsa cognoui, primum musculus dorsi esse principaliter læsum; sed non in ceruice, quoniam ibi nullum erat signum læsionis permanentis; sed in alia parte istius musculi, vbi erat ictus factus; sepe enim contingere potest, vt causa læsionis sit in vno capite, & in alio longè diuerso illius læsionis signum appareat, sicuti euenit illi misero patienti, qui ob percussionem circa quintam vertebra[m] thoracis comparauit scyrrhosam dispositionem, & inde indolentiam, quæ scyrrhosa dispositio dorsi erat in causa, vt ceruix non posset flecti, vel dum flecteretur, magnus ab ipso perferiretur dolor.

Sed quoniam potest contingere, vt collum non possit flecti ob læsionem huius primi musculi dorsi, factam, non solum ab hac scyrrhosa dispositione, verum etiam à paralyti neruorum, qui irrigant hunc primum musculum dorsi. Expediit breuibus docere virtute artis anatomice modum cognoscendi, quando iste musculus sit læsus ob paralytin. Methodus ergo, quæ nos docere potest, an primum par musculorum dorsi deficiat ob resolutionem, vel ob paralytin, in obeundo suo munere, quod est flectere dorsum, & ceruicem, est, quia vbi accideret resolutio vel paralytis, quod idem est, nonnulli alij musculi necessarii essent resoluti, quoniam, cum resolutio fiat per neruos, & nerui vestientes primum hunc dorsi musculum enascantur à tertia vertebra cervicis, & à quarta, hoc sequeretur, quod cum à tertia prodeant quoque nerui vestientes secundum par musculorum capitis, & musculus illum quadrangularem trahentem deorsum obliquè labia, & iisdem neruis irrigetur illud par musculorum, cuius officium est trahere scapulam sursum, necessariò, si fieret hæc resolutio in hoc primo dorsi per generis consensum, qui sit per eosdem neruos, eandem resolutionem pateretur omnes isti in aliqua parte, & per consequens in suo obeundo mu-

*Methodus  
cognoscendi  
paralytin  
primi paris  
musculorum  
dorsi.*

nere deficerent; vnde ex horum musculorū lēſione certò colligere poterimus, neruos vestiētes primū musculum dorsi esse læſos inſorigine, & per conſequēs illum paralyſi eſſe affectum. Similiter ſi eſſet hæc reſolutio in hoc primo musculo dorsi per neruos à quarta vertebra prodeuntes, tunc cum iisdem neruis ab eadem quarta vertebra enaſcatur contextus cucularis musculus, & ab eadem quarta vertebra enaſcatur propago neruorum, quæ vnita cum aliis proficiſcitur ad mouendum diaphragma reſpirationis gratia, neceſſario aliqua læſio ob hanc paralyſin obſeruaretur, vel in cuculari, vel in diaphragmate; ſi vero ex alia parte cognoſcemus virtute anatomix, non eſſe ob reſolutionem neruorum; inferendum erit factam fuiſſe diſpoſitionem ſcyrrhoſam in principio, vnde enaſcitur musculus, cui parti appoſitis emollientibus tandem duci poſſet patiens ad priſtinam ſanitatē.

*Oſtenditur ex ignorata ſympathia inter ſeptimam thoracis vertebra, & ceruicem, Empyricos poſſe in plures prolabi errores.*

## CAPVT XXII.

*De ſympathia quarti musculi dorsi cuius uſus eſt extendere partem ſuperiorem dorsi.*

*Propter quos cauſas lædipotius ſeptima vertebra thoracis & vnde ceruicē conſentire.*

**P**VLſi ex capite pituitoſi humores aliquando per ſuperiorem ſpinę partem deſcendūt, & vſque ad ſeptimam thoracis vertebra perueniunt, & ibi conſiſtunt, atque firmanantur ob ſuam viſciditatē; contingere deinceps poteſt, vt ob hunc pituitoſum inſarctum ceruix, & caput non poſſint extendi. In quo caſu aliquando vidi Empyricos localia adiungere ceruici, morbo exiſtente in hac ſeptima thoracis vertebra, vbi quātum hoc par musculorum extendentium ceruicē ſumit initia; ſed errant nimium ſanē, quoniam ſymptomaticus iſte affectus in ceruice exiſtens cubito ſerē diſtat à morbo, qui re vera agit radices non in ceruice, ſed in thorace circa ſeptimam vertebra; eſt igitur operepretium in omni mala valetudine musculorum præſcire, quodnam officium deficiat, & ex officio in muscoli læſi cauſam progredi, ſicuti eſt faciendum in præſenti caſu, in quo oportet perpendere, ad quem musculus pertineat erigere dorsi ſuperiorem partem, & ceruicē, & caput per conſequens extendere; deinde cognito, hoc officium pertinere ad quātum par musculorum dorsi, illico cognoſcemus ex anatome, vel ſaltem ex Veſalij, & aliorum obſervatione musculus illum oriri à ſeptimæ thoracis vertebræ ſpina, & aſcendere per intermedia vertebrarum, & demum peruenire ad ſecundam vſq; ceruicis vertebra; quibus præcognitis, facilē eſt videre, quomodo reſe habeat; nam, ſi circa ſeptimam vertebra eſt inſarctus pituitoſus, facilē contingere poteſt, vt ceruix propterea extendi non poſſit, non tamen ceruici tunc ſunt affigenda localia, ſed ſeptimæ vertebræ: poteſt enim eſſe morbus in vno loco, & in alio eius ſymptoma apparere, poteſt



potest quoque dolor ob hunc infarctum partis infernæ dorsi excitari in ceruice, nullo humore in ceruice existente, quod fieri potest, dum maxima distensio fibrarum ab infarctu humorum facta distendit ceruicem, & ipsi communicatur affectus: potest quoque contingere, ut circa sextam vertebra[m] abscondantur à chirurgo imperito transuersim musculi fibræ, & inde sequatur, ut non possit erigi collum, in quo casu collum non esset inungendum; potest etiam contingere, ut sint ibi humores indurati, quorum maleficio fibræ non habeant facultatem erigendi thoracis partem superiorem, collum, & caput, in quo casu solum emollientibus, vel deriuantibus administratis sextæ vertebrae thoracis, symptoma apparens in collo optimè curari poterit: potest denique vsus istius quarti paris musculi dorsi, & ceruicem extendentis, non solum tolli ob scyrthosam illam dispositionem, verum etiam ob semiparalyin, quæ potest fieri ob compressionem alterius musculi adherentis, quod cognoscetur per vsu[m], & officium aliquod primò loco amissum, & inde ab vsu, & officio in noticiam musculi læi ad cognitionem affectus perueniri potest.

Diximus, quod possit esse semiparalyis causa, cur extendi nō possit pars superior dorsi; & ratio est, quia, cum sit circumuestitū istud quartum par musculorum dorsi propagine nervea prodeunte à tertia, & quarta vertebra ceruicis, si in iis vertebriis erit scyrthosa dispositio, nō permeabit facultas animalis, & fiet paralyis; cognoscemusque hos nervos ceruicis esse læsos ob paralyin, quando cæteri musculi circumuestiti iisdem nervis, eadem mala valetudine erūt correpti, veluti musculus quadrangularis mouēs obliquè deorsum labia; musculi capitis, & ille, qui mouet sursum scapulam, quippe qui iisdem nervorum surculis prodeuntibus à ceruice sunt irrigati, & si eadem mala valetudine prematur diaphragma, & propterea obseruetur aliqua difficultas respirationis, certissimè colligemus quartum musculum dorsi esse læsum, ob morbum existentem in exortu nerui, & ratio est, quoniā à quarta vertebra ramulus missus est, qui cum aliis iūctus ad diaphragma pergit, ut moueat illud respirationis gratia, à qua parte ceteri nervi vestientes alios musculos quoque prodeunt; potest demum contingere idem affectus, non propter læsos nervos ceruicis prodeuntes à tertia, vel quarta vertebra, sed quia hic quartus musculus dorsi deficiat in explendo officij sui munere ob nervos à sexta, & septima vertebriis thoracis semiobstructos; tunc quomodo cognoscere poteris si ne optima anatomia, quando ob initium horum nervorum à sexta, & septima vertebriis prodeuntium deficiet quartum par musculorum dorsi; quare, ut hoc cognoscas, scias, eosdem ramos irrigare secundum par musculorum scapulæ, & quintum musculum thoracis, & postquam circumuestitum est istud quartum dorsi iis surculis enascentibus à sexta, & septima vertebriis thoracis, deinde circumvestire quartum brachij, cuius munus est trahere deorsum brachium; inferas ergo, est læsum quartum par dorsi, & nullus cognoscitur tumor,

*Methodus  
cognoscendi  
quomodo pos-  
sit extendi  
pars superior  
dorsi ob ner-  
vos læsos in  
origine[m].*

vel infarctus, ergo ob semiparalyfin, quæ non erit in nervis illis cervicis, sed in illis sextæ, & septimæ thoracis vertebrais, quoniam quartum brachij quoque deficit in suo obeundo munere, quod iisdem nervis induitur, & nequaquam nervis prodeuntibus à ceruice.

*Errant, dum ceruicem inungunt, vel dorsum, quando postrema ossis sacri pars esset inungenda.*

C A P. XXIII.

*De sympto-  
thia inter os  
sacrum, &  
ceruicem.*

**F**REQUENTISSIME dorsum totum mala valetudine premi obseruatur, quoniam nunc in rectum ægrè extendi, nunc malè flecti, nunc dolores vnâ partem, nunc aliam obsidere vidimus, & præcipuè in senibus, vel melancholicis hominibus, in quibus iugiter halius melancholicus petens dorsum musculos distendit, vnde excitantur dorsi dolores, vnde malè flectitur, vel extenditur; nihilominus causa harum omnium passionum, quæ totum dorsum tot modis infestat, in vnica tantum parte suam sedem tenere potest, vt modo sit in parte ima ossis sacri, modo in parte interna ilium, modo in musculi exordio, vbi maxima musculi virtus est collocata, & inde per totum dorsum hæc symptomata diffundantur. Empyrici tamen, dum vident læsum dorsum, incidunt in consuetum errorem inungentes vbi symptomata vident, quamuis radix, & causa symptomatum dorsi ob longitudinem musculorum esse possit in vna parte, & in alia e minus locata symptomata appareant, quod præcipuè obseruatur in musculis duobus sexti paris, qui sunt cæteris omnibus nostri corporis longiores, quia exortiuntur ab imo ossis sacri, & ab interna parte ilium ad primam thoracis vertebra, & ad caput vsque aliquando extenduntur; cōtingere ergo potest in postrema parte ossis sacri aliqua mala humorū soboles, quæ replens musculi initium, atque exordium distendat cum violentia totum musculum, donec dolor perueniat ad tendines huius musculi affixos vertebrais thoracis, & cervicis; tunc si dolor esset in toto dorso, in ceruice, & circa primam thoracis vertebra; humor verò causans dolorem esset fixus dumtaxat in imo ossis sacri, quis opem ferret inungendo dorsum totum, quod caret humoribus, vel flatibus, quippe qui sunt collecti tantummodo in osse sacro? quare, vbi videris, dorsum in rectum non posse totum extendi, inferas affectum esse in sexto pari musculorum thoracis; dicas deinde, ergo erit in illo musculo, vel per essentiam, & per se, quod est secundum omnes partes, vel per accidens, quod est dupliciter, vel per consensum generis, vel vicinitatis; si verò per consensum alterius musculi vicini contingat, cognoscemus ex læsa aliqua actione, quæ nos docebit, quis sit ille musculus læsus; per hypothesim, si prima affectio, vel dorsi læsio, quæ inuasisset, fuisset, quod non extenderetur dorsi pars superior, tunc quartus musculus esset origo, cuius officium est partem superiorem dorsi exten-



extendere, & quia vicinusest sexto pari, quod potest ab eodem quarto comprimi, dicimus hanc lesionem, dum non dirigitur totum dorsum, pendere à sexto pari musculorum dorsii læso, quod tamen læsum sit per consensum vicinitatis quarti muscoli, qui antea erat læsus, quare tunc erit considerandum, vnde exoriatur quartus musculus, & cui parti inleratur, & deinde contemplandus est progressus totus illius musculi, quoniam hoc modo erit tibi admodum facilè, originè morbi perueſtigare. Simili modo, sicuti dictum est de vicinitate quarti musculi, de aliis omnibus musculis adiunctis, & vicinis sexto pari lubaudiendum est. Si verò in hoc sexto musculo, non in qualibet parte, quia sic esset per se, & per essentiam, & non per sympathiam de qua loquimur, sed in aliqua tantum parte; quod est per accidens (quoniam statutum est ab Aristotele, omne per aliud esse per accidens) erit aliquis humorum infarctus, & in altera parte valde distàri perſentietur morbi symptoma, veluti contingit, dum est tumor, vel flatus, vel alia causa extendens principia musculi in osse sacro, vnde contrahantur in se fibræ, & in longum ad supernas partes extendantur; tunc haud dubiè dolor vsque ad ceruicem perueniet, & ibi ſentietur non per consensum vicinitatis, sed per consensum eiusdem musculi; quæ omnia cognosci poterunt ex officiis læsis, & nisi promptè medicus omnia officia musculorum, & neruorum ſciat, & memoria teneat, est impossibile, vt ſciat mederi; cognitis deinde officiis primo loco, vel secundo læsis, cognoscuntur muscoli, qui sunt læsi per se; cognito musculo principaliter læso, illico omnes eius partes illius musculi sunt ante oculos obſiciendæ, & manibus tangendæ, & contemplandæ, quia hoc modo faciendo, adeò promptè inueniemus locum affectum, quamuis distet à symptomate, vt digito ostendi possit.

Si denique noxa sexti paris musculorum dorsii altiores ageret radices, & à semiparalyſi dependeret, cognoscemus, hoc contingere ob semiparalyſim, quando nullo dolore existente, non poterit extendi totum dorsum, quod eueniet vel per compressionem neruorum, vel per caput neruorum angustiam; sed audias, quomodo in huius rei cognitionem peruenire poterimus: nerui, quibus irrigatur sextus musculus, sunt ex illis, qui oriuntur ab vndecima vertebra thoracis, & à lumborum vertebis, & ab osse sacro, & eadem propagines deinde vestiunt quartum musculum brachij, quartum musculum pectoris, & tandem quatuor primos musculos femoris, vel duo prima paria, quod in idem recidit: inferas ergo, læsi sunt isti nerui huius sexti musculi dorsii, de quibus loquimur; ergo noxa, & affectus debet perſentiri in quarto musculo brachij quæ noxa est, non posse brachium deorsum trahi. & in musculo quarto pectoris, cuius vsus est constringere thoracem expirationis gratia; & in primis quatuor musculis femoris, quorum vsus est femur extendere; quare colligas, læsionem in sexto musculo, nullo modo accidere posse ob læsionem neruorum prodeuntium ab osse sacro, & à vertebis lumborum, & ab vndecima vertebra thoracis, nisi quartus brachij musculus, & quatuor primi femoris in læsione priorum officiorum consentiant.

8. Phy. 27. &  
alibi.

*Methodus  
cognoscendi  
semiparaly-  
sin sexti pa-  
ris musculorum  
dorsii.*

*Errant, dum cubitum, quod non potest flecti ad pectus, inungunt, quando scapula, vel collum esset inungendum.*

## CAPVT XXIV.

*De sympathia inter cubitum, scapulam & collum.*

CASVS hic animaduersione dignus est, dum humores à capite fluentes colliguntur in scapulam, & inde, si ob humorum læticiam, vel impedimentū cubitum non potest flecti, vel trahi ad pectus, tunc haud dubiè morbus est in scapula, eius verò symptoma in cubito; vel contingere potest, vt scapula percutiatur, aut vulneretur in processu ancyroide, vel in parte superna supercilij acetabuli, à quibus partibus enascitur primus musculus cubiti, qui vulgariter dicitur il pectoro, & radio implantatur, & propterea tollatur musculi officium, & vsus, qui est flectere cubitum ad pectus; vel alio modo contingere potest, sicuti sæpe vidimus in melancholicis, quos sæpissimè halitus feriunt, vt flatus, qui debito sunt crassiores tenaciter adhæreant musculorum exordiis, & spatio aliquo temporis musculorum officia maximeperè à flatibus diminuantur, & impediuntur; propter similem casum vidi, non semel esse conuocatos Empyricos, vt ipsi læso cubito suppetias afferrent, & causas doloris demerent, vel redderent melancholicum patientem sospitem; vidi tamen semper eos topica omnium generum cubito adiunxisse, & non scapulæ; quia adhuc non peruenit ad ipsorum aures, quod alia corporis pars cubitum moueat, & flectat, quàm ipsummet cubitum; & propterea, si cubitus non fungitur suo officio, medelam cubito, & non scapulæ esse adiungendam, credunt; quorum hominum inscitia, & temeritas quanta sit, sciunt anatomistæ, qui longitudinem musculorum, & progressus summa industria obseruant; sagax enim, & prudens natura in animantibus tot instrumenta composuit, quot possent vniuersa officiorum suorum munera explere; neque erat possibile in eodem puncto, in quo officia explerentur, omnia instrumenta vniri secundum omnes partes: Hinc opus est, vt Medici per musculorum officia, progressum, figuram, substantiam, & exordia incedant, & summa vtantur industria, vt possint peruenire in cognitionem instrumentorum læsorum, & ex iis colligere suas consequentias: valet enim, cubitum non potest flecti, & ad pectus trahi, ergo musculus præcipuè primus cubiti potest esse læsus, sicuti in cadaueribus secandis videre possumus; & cum primus cubiti musculus à scapula oriatur, accidere potest, vt aliquando læsione existente in scapula, & non in cubito, tollatur cubiti flexio; quod cum ita sit, cur tunc volēs cubito adiungere localia, cum morbus sit in scapula?

*Vt tollitur cubiti flexio ob sympathiam vicini musculi.*

Amplius tolli potest hoc officium flectendi cubitum per consensum vicinitatis; nam, si inflammatione musculus tertius, & quartus sunt correpti, quorum officium est, cubitum extendere (de quibus, cum sint inter breues musculos, non est, vt loquamur, cum sympto-

mata



mata non possint in his distare loco à morbis ) isti poterunt in consensum trahere musculos primum, & secundum, quorum officium, ut diximus, est flectere, & quamuis nulla mala valetudo sit per se in hoc primo cubiti musculo, esse tamen potest per consensum vicinitatis tertij, & quarti musculi, quibus re vera medicina esset adiungenda.

Similiter aliquando in iis, qui ferunt cauteria, excitatur inflammatio, & omnes cubiti motiones, & usus tolluntur, tunc diligenter esset nobis perpendendum, cuinam musculo per se, & cui per accidens, & per consensum conueniat læsio illa ab humorum diluuie facta; & si per consensum, expendere tunc debemus, an sit consensus generis, vel vicinitatis, quæ quidem cognitio est impenetrabilis, nisi originem, *Sympathias esse impenetrabiles sine cognitione situm, figuræ, & originis partium.* figuram, & progressum musculorum calleamus, & vnde enascatur, & quibus implantentur terminis; quorum omnium debet medicus exactissimam, & omnibus numeris absolutam tenere cognitionem; nam illis ignoratis, quis poterit diuinare, quibus partibus topicis sit occurrendum? debet igitur chirurgus prudens conuocatus pro curanda aliqua mala musculorum valetudine progredi per officia læsa, seruando nostras quinque condiciones enarratas in capite tertio huius libri pro cognoscenda protopathia, quæ nos certo ducent in cognitionem primariæ affectionis, expendendo prius, quæ officia sint illa, quæ primo loco læsa sint; per hypothesim in cubito hoc modo læso, dum æger ægotare incipit, primo loco officium flectendi, & trahendi cubitum ad pectus deficit, & deinde contingit, ut cubiti aliud munus deficiat, quod erit cubitum non posse extendi; hætenus nosti per primum fontem, iam traditum in huius libri exordio, primariam affectionem esse in musculis trahentibus cubitum ad pectus; & præterea nosti ex anatomia, horum duorum musculorum flectentium cubitum primum oriri à scapula duobus iniitiis, & inferi in radium; amplius cognita figura, & situ fibrarum, & progressu; tunc ex dolore, tumore, & percussione poteris coniecere, ubi collecti sint mali humores; insuper ex eodem fibrarum situ colliges, non esse incidendum transuersum, ne pereat musculi officium: Postremò ex anatomia habes, secundum musculum flectentem cubitum latere sub primo, & esse carnosum, & in ipso delitescere posse humorem, quem ubi cognoueris non esse in primo, ac percipies, hoc munus flectendi magis deficere, quàm extendendi, & primo loco fuisse læsum; magnum momentum habebis inferendi in secundo cubiti musculo latitare humorem, quod dignum est inquisitione, quia humores in alta illa parte collecti, dum in pus conuertuntur, & inde excitantur dolores truces illi, atque scelesti; tunc qua in parte sit incidendum, ex ortu, situ, & fibrarum progressu poteris colligere; quæ cum ita sint, quo pacto sine hac anatomica cognitione Empyrici, vel Medici dogmatici in simili casu scient vnum verbum mouere?

Postremò, ut redeamus ad consensum factum per neruos, asserimus, cubitum officium flectendi ad pectus amittere, non solum, quia in capite musculi sit morbus, sed quia possit esse morbus, vel impedi-

mentum in neruis; nam potest esse læsum secundum par neruorū manus, & propterea hic musculus primus cubiti, qui est indutus, & circumuestitus eodem neruo; obire non possit suum munus; quare, cum hoc secundum par neruorum enascatur à sexta vertebra cervicis, potest euenire, ut in sexta vertebra sit aliquis morbus, & eius symptoma in cubito appareat; ab hoc enim secundo pari neruorum orto à sexta vertebra mittuntur duo furculi neruei ad huius musculi principia; quare, si circa sextam vertebra erit inflammatio, vel tumor, vel scyrrhosa dispositio, quæ impedirent, ne cubitum flecti possit, non cubito, sed sextæ vertebrae remedia essent adiungenda: Cognoscemus verò, neruum hunc in ceruice esse læsum, quando cæteri musculi eodem neruo irrigati erunt læsi, cum igitur primus cubiti musculus sit hoc neruo irrigatus, & deinde neruus idem descendat vsque ad digitos, & præcipuè secundo articulo pollicis det motum; valebit consequentia, cubitum non potest flecti nulla existente causa manifesta, quæ nobis philosophandi occasionem leuaret, ut sunt vulnera, casus ab alto, &c. & insimul cum hoc musculo primo cubiti secundus articulus pollicis non fungitur suo officio, ergo, si cubitum non poterit flecti, illud eueniet ob læsam nerueam propaginem, quæ deducitur à secundo pari neruorum manus, & quæ tandem exordium trahit à sexta cervicis vertebra.

*Ut cognoscatur cubitum non posse flecti ob morbum existentem circa sextam vertebra cervicis.*

*Errant, dum digitos manus illorum, qui non possunt flectere secundos articulos, inungunt, quando causa huius symptomatis est in humero, vel in rete, vel in collo.*

## CAPVT XXV.

*De sympathia inter secundos articulos digitorum manus, & humerū.*

**F**REQUENTISSIME errant Empyrici, dum ob ictum in humero, vel ceruice accidit, ut digiti nec flecti, nec per consequens aliquid manu apprehendi possit; summam enim manum, & digitos inungunt, & non humerum, vel ceruicem, ubi est causa, & radix huius symptomatis, digitosque ipsos tractant vinaceis, lutis patavinis, oleisq; deinde lubricatis, & aliis plerisque emplastris summas implicant manus, quando causa, cur non flectantur secundi articuli digitorum, ut diximus, esse possit in humero, in ceruice, vel in rete; deberent sanè mirabilem nostri corporis sympathiam perpendere, quæ in longis musculis, & neruis præcipuè obseruari solet; & per officia læsa peruenire ad partis affectæ cognitionem; & inde perquirere, in quo loco musculi, & nerui malè constituti sint; quoniam euenire sæpè solet, ut ceruix, vel humeri internum tuberculum percutiatur, vel baculo cædatur, vel casu confringatur, aut vulneretur, & inde digitos procul valdè locatos per hanc generis sympathiam sua mouendi officia amittere; in quo casu circulatores isti Empyrici semper obliuuntur digitos, credentes in digitis esse humores, qui motum tollant: amplius consilium dare solent,



lent, dum flecti non possunt digiti, causa quoque in humero, vel in collo existente, ut in læsa manu teneatur, & manu apprehendatur pila, ut in assidua, & iugi flexione digitorum, & apprehensione pilæ continuo se exerceant, rati alibi non esse causam deperditi motus digitorum, & aliubi non esse localia applicanda, quam digitis. Quinimò licet ab ipsis ægrotantibus aliquando sint commonefacti de humeri, vel cervicis contusione, nihilominus adduci non possunt, ut credant, morbum non esse in digitis, cum ipsos læsos videant. Caterum non est opus multis verbis, ut tantum errorem reiiciamus, cum error ipsorum adeò certus sit, ut manibus ipsis tangi possit; quoniam hic musculus flectens secundos articulos quatuor digitorum, enascitur ab interno humeri tuberculo, & deinde factus carnosus iuxta longitudinem cubiti, & radij defertur, & ubi medium cubitum præterit, tendens in angustum terminatur in quatuor tendines perforatos, qui demum implantantur secundis articulis quatuor digitorum, gratia ipsos flectendi; quare, cum res ita se habeat, cur, si post læsum internum humeri tuberculum, secundi articuli quatuor digitorum flexione sua priuantur, volueris tunc auxilia digitis adiungere, & in vola manus pilam ab ægris gestari? esset opus tunc musculi initiis, & humeri tuberculo interno, vel cervici suppetias afferre, quia in humero, vel in ceruice est morbus; in digitis verò nihil aliud, quam morbi symptoma, cui symptomati, ut symptoma, nunquam est occurrendum: potest quoque esse, ut morbus non solum in humero, sed etiam iuxta cubiti, radijque longitudinem habeat suam sedem, per quam partem defertur musculus iste, & ibidè fibræ, quæ deinde cessant in tendinem sint laceratæ, vel à vulnere, vel à tonsore imperito, qui eas transuersim secuissit, gratia aperiendi apostema, vel callo aliquo durissimo ita sint obductæ, ut hinc fibræ illæ nō amplius diffundere possint suam vim in tendinem, & per consequens digiti non flectantur; tunc si digitos inungeres centum annos, oleum, & tempus contereres.

Sed audias casum, quem nuper vidi; erat inflammatio in parte carnosa musculi paulò post à suo principio, tandem collecta penitus fuit sanies, quæ truces, & insignes dolores faciebat, tunc tonsor inexperitus transuersim profundè secuit musculum, & sectis fibris, musculus inde amisit motum secundi articuli quatuor digitorum, & casus factus deinde fuit deploratus ob fibras transuersim excisas; videas igitur, quæ imminent pericula, dum tractantur hæc nostra corpora ab Empyricis, ut propterea peritissimis Medicis, & Chirurgis, & non tonsoribus sit concedendum, qui sciant & longitudines, & latitudines musculorum, & in quas partes extendantur, & quibus partibus implantentur.

Alium similem casum vidimus cuiusdam icti, atque percussi in humeri interno tuberculo, qui motionem digitorum amisit, & postquàm Empyricus multorum dierum curiculo olea, & vnguenta digitis adiunxit sine salutis spe; tandem æger bono spiritu percitus tradidit se medico anatomico, qui factis fomentationibus in illa humeri parte

*Error tonsor  
in secunda  
transuersim  
musculum  
internum ma-  
nu.*

*Error cuius-  
dam Em-  
pyrici.*

læsa, & exinde eidem parti ammoniaco in aceto dissoluto cum quo essent mucilagines radicum altheæ comixtæ, aplicito; breui temporis spacio fuit ad portum salutis translatus.

*Qua via  
noscat  
se  
cundos arti-  
culos digito-  
rum non fle-  
ti ob morbū  
existentem in  
cervice.*

Præterea cum musculus iste flectens digitos possit vires suas amittere, non solum ob læsum musculum in exordio, verum etiam ob nervos læsos in ceruice, vnde oriuntur nervi vestientes manus; propterea est inuenienda methodus anatomica, quæ ex officiis læsis nos perfecte doceat, quando morbus existens in exortu nervorum manus à ceruice prodeuntium sit in causa, cur secundi articuli quatuor digitorum non flectantur; audias igitur, quomodo sit comparanda hæc cognitio; ad sunt surculi nervi prodeuntes à tertio pari nervorum manus, quibus induitur primus iste musculus flectens secunda ossa quatuor digitorum, pollice excepto, cæterum surculi isti nervi, antequam ingrediatur primum hunc musculum flectentem hæc secunda ossa quatuor digitorum, prius peragunt per secundum musculum flectentem cubitum, & deinde inferuntur in istum primum, de quo loquimur, & post istum tandem peragunt per musculos flectentes tertia ossa quatuor digitorum, & tertium articulum pollicis; his ergo positis talem possumus demonstrationem formare, non possunt flecti quatuor ossa digitorum, pollice excepto, & simul cubitum non flectitur, neque tertius articulus quinque digitorum, ergo morbus causans hæc læsa officia nullo modo poterit esse in digitis, neque in musculo illo flectente digitos, sed in altiori exordio, quod est in capite tertij paris nervorum manus, quod par est commune omnibus illis musculis, cum ab ipso facultas motrix, & sensatrix trahant originem, quod par immediatè oritur ab illa nervorum rete, cuius imago perbelle exprimitur in Cardinalium galeris; sed demum tamquam à trūco, & stipite proprio à vertebis ceruicis trahit suum principium; ex quo discursu optimè colligere possumus, quando digiti non possunt flecti, an hæc mala valetudo digitorum prodiret à morbo existente in digitis, vel in exordio musculi, vel in ceruicis vertebis; & inde quoque animaduertimus quando in digitis hoc modo læsis sint adiungenda topica digitis, quando exordio musculi flectentis secundos articulos, & quando vertebis ceruicis; vt hinc quoque faciliè sit videre, quo pacto nostrates nonnulli, qui se dogmaticos faciunt, in errorem incidunt, dum in omni officio læso musculorum, si primis inunctionibus læsio non tollitur, volunt cerata, stillicidia capiti adiungere, perinde ac solum à capite prodirent omnes causæ lædentes officia musculorum, & nervorum; vt hinc sapè frustra administratis iis suis medicinis caput, & cætera ægrotum vitæ in ægitudines longè maiores trahant.

*Error non-  
nullorum do-  
gmaticorum.*



*Errant, dum digitis illorum, qui tertium articulum quatuor digitorum, pollice excepto, flectere non possunt, localia adiungunt, quando aliis longè diuersis partibus essent adiungenda.*

CAPVT XXVI.

**V**T magis eluceat hæc generis sympathia, quæ sit per musculos, & De sym-  
neruos continuatos, & in longitudinem extensos; agendum pro-  
posuimus de longis digitorum musculis, vt errata Empyricorum de  
consensu generis (quantum fert tenuitas nostra) anteuertamus, & cor-  
rigamus, quia licet de omnibus consensibus, qui accidere possint, non  
sit possibile, cum sint ferè infiniti, pertractare; attamen nos expergefa-  
cti horum exemplorum luce non tam faciliè in errorem corruemus:  
Contingere ergo potest, vt tertius articulus quatuor digitorum, polli-  
ce excepto, aliquando non flectatur propter consensum morbi exi-  
stentis in parte anteriori, & interna articuli cubiti, vnde hic musculus  
oritur, quique descendens, antequam ad brachiale perueniat, diuidi-  
tur in quatuor tendines, qui cum sint subiecti tendinibus primi mu-  
sculi, ante radicem secundi digitorum internodij perforant eos tendi-  
nes, & deinde inseruntur in tertia ossa digitorum, gratia flectendi, &  
trahendi digitos, vt optimè constringantur: videntes ergo Empyrici  
tertia internodia horum quatuor digitorum non flecti, ob imperitiã  
anatomiz tanta non pollent cognitione, vt sciant, vel credant, digitos  
immobiles posse esse sanos, & morbum causantem hoc symptoma es-  
se in cubito, qua sympathia horum longorum musculorum ignorata,  
cæcorum more symptomati occurrunt oleis, & cæteris remediis, quæ  
fortasse aliquid opis præstarent, si cubito ea adiungerent, vbi est radix,  
& causa symptomatis digitorum, quoniam Empyricorum remedia ali-  
quando summæ virtutis obseruantur, quare si adiungerentur oppor-  
tunè, & parti principaliter læsæ, maximoperè in illis esset sperandum:  
sed quando digiti non possent flecti, quia in exordio musculi flecten-  
tis tertium articulum sit morbus, tunc si digitis topica, quamuis per-  
optima sint, adiungantur, modus tamen iste administrandi non con-  
fert, & redditur omnino ridiculus, cum applicentur vbi non est mor-  
bus; veluti si in cubito infictū esset vulnus, & inde læsus primus mu-  
sculus iste flectens digitos non expleret suas partes, quam concipere-  
mus spem ex topicis adiunctis digitis, vel si cubitum ictum obcælum,  
vel ob alias causas reciperet, quomodo inungendo digitos curari po-  
tèrit; vel demum si tonsor aperiendo apostema circa cubitum, vel su-  
pra brachiale transversim incideret hunc musculum, & inde digiti  
non possent flecti, quis risum teneret, videndo Empyricos digitis ap-  
plicare localia?

Potest quoque contingere hoc symptoma in tertio osse quatuor di-  
gitorum, pollice excepto; quia neuus resiliens hunc musculum sit an-  
Qua via do-  
scimus tertium

articulum  
digitorum  
manus, polli-  
ce excepto ob  
lesionem in  
origine ner-  
ui.

gustia aliqua oppressus in origine, prodit enim ramus vestiens hunc musculum à tertio pari neruorum brachij, & à quinto ramquam à primo stipite, sed magis proximè deducitur à rete imaginem exprimente cordularum Cardinalium galeni; cognoscemus autem affectum existentem in digitis à neruorum exordiis prodire, quando musculi illi, qui priusquam isti, iisdem neruorum ramis induuntur, erūt læsi, sicuti est musculus flectens cubitum, nec non illi musculi qui irrigantur post istos, qui trahunt tercia internodia quatuor digitorum, quique mouēt pollicem, ipsūque ab aliis separat, vt omnis ferè motus digitorum, ab istis surculis tertij, & quinti neruorum brachij exoritur, valebit ergo hæc consequentia, non flectuntur internodia tercia quatuor digitorum, ergo morbus potest esse in tertio, & in quinto paribus neruorum brachiorum, ergo potest esse morbus in rete illo neruorum, vel in vertebris ceruicis; ergo dabitur occasio, vt digiti amittant motum ob morbum existentem in ceruice, vel in rete, ergo tunc ad curandos digitos remedia collo, vel sub iugulo, vbi est rete, erunt applicanda, quæ cum ita fiat, quid diceret Empyricus hac cognitione priuatus, numquid non admiraretur, quando oculis propriis aspiceret probum anatomicum post factam hanc consequentiam, quod digiti haberent amissam flexionem ob vitium in capitibus neruorum, in vertebris colli, vel in rete, fomentationibus adiunctis vertebris, digitis motionem dare? Nos faciemus denique hanc consequentiam, a motis percussionibus, & vulneribus, & similibus manifestis, si musculus iste flectens tertium internodium quatuor digitorum deficit, & insimul cubitum flecti non potest, & cæteri motus digitorum quoque deficiunt, ergo in capitibus neruorum est morbus, qui causat hoc symptomam in digitis. Methodus verò, qua distinguere possumus, an causa, & radix symptomatum digitorum sit in collo, vel in rete, vel demum in cerebro ipso, est, quia si primaria affectio est in rete, & non in ceruice, vel cerebro, symptomata aliubi esse non possunt nisi inter digitos, & iugulum, si in ceruice, inter digitos, & ceruicem, si in cerebro, inter digitos, & ceruicem illius, & alterius lateris obseruari possunt symptomata, qua methodo Gal. progrediens peruestigauit causam, cur in homine illo veniente Romam digiti amiserint motum, inuenitque scythosam dispositionem, circa septimam vertebram ceruicis ob lectum factam, fuisse causam, cur digiti non mouerentur, & inuento loco ceruici topica adiunxit, & paulò post motionem digitis reddidit summa cum omnium admiratione.

Vt cognosci-  
tur quando  
protopathia  
sit in rete, in  
ceruice, vel  
in cerebro.

*Errant dum inungunt quatuor digitos, pollice excepto, qui non possunt extendi ob morbum existentem, non in digitis, sed in humero, & in aliis partibus.*

## CAP. XXVII.

**N**ON raro accidere vidimus, vt digiti non possint extendi, quamuis in digitis nullus humor, vel alia causa præter naturam obseruetur,



uetur, quæ motionem digitorum tollat, nihilominus non defunt Empyrici, qui digitos hos lætos per consensum vexant vnguentis, pinguedinibus, lana succida, nec non etiam obliniunt ipsos oleo de iunipero, de terebentina, de ammoniaco, oleo phylsophorum de lateribus vocato, & aliis plerisque tractant linimentis; horum omnium localium administrationem ipsi Empyrici irriderent, si propriis oculis in secandis corporibus origines musculorum intuerentur, vt quotidie vident anatomistæ, qui in cadaueribus, suis manibus trahentes hunc musculum sub externo humeri tuberculo, mouet mortuorum hominum digitos; musculus enim extendens hos digitos oritur ab hoc humeri tuberculo, quippe qui si læditur in illa superna parte, digiti alioquin sani immobiles fierè redduntur, quare si hæc scirent, & deinde viderent post percussum humerum digitos amittere motum, ipsi quoq; non digitis, sed parti illi superiori localia applicarent; ideo non datur alter modus cognoscendi symptomata motricum facultatum, nisi per cognitionem ortus, & progressus musculorum, & neruorum. Hinc si de ortu, & progressu primi musculi externi digitorum, cuius vsus est, quatuor digitos extendere, pollice excepto, loquimur, dicimus. hunc musculum in primis nasci ab hoc externo humeri tuberculo, & deinde incedere per cubitum, & radium, & in quatuor latos tendines cessare, qui inferuntur deinde à primo vsque ad tertium articulum quatuor digitorum sub vnguibus. Ex hac concepra veritate colligimus, cur non extendantur digiti, & est, quia huius symptomatis digitorum causa, & protopathia habere potest radicem, tunc in externo humeri tubere, quo læso digiti desinunt extendi, tum inter cubitū, & radium, tum iuxta brachiale: videas ergo, quomodo causa, quæ motum digitorum tollit, variis in locis, & procul à digitis esse possit; quæ cum ita sint, quomodo vnguentis, linimentis digitis adiunctis, causa læsionis existente in humero. vel inter cubitum, & radium, vel ante brachiale, volueris digitis opem ferre? pergas toto anni curiculo iunctionibus Orientalis opobalsami, & omnium generum, quod nihil facies, & totum amittes opus.

*De Sympathia inter externum humeri tuberculum, & quatuor digitos pollicis excepto.*

Præterea contingit aliquando, vt digiti isti quatuor non extendantur, non quia sit causa præter naturam in digitis, vel inter cubitum, & radium, vel in humeri externo tuberculo; sed quia sit in parte longè magis remota, sicuti quando est in quarto coniugio neruorum brachij, à quo furculi vestientes hunc musculum extendentem quatuor nominatos digitos prodeunt. Methodus autem cognoscendi, quando digiti non extendantur ob morbum existentem in capite quarti paris neruorum à ceruice prodeuntium, erit hæc, quia omnes musculi circumuestiti iisdem neruis prodeuntibus ab hoc quarto coniugio, sentiunt eundem defectum, & tales erunt musculi cubitum flectentes, & extendentes, qui irrigantur furculis eiusdem quarti paris neruorum manus, antequam induatur iste musculus, de quo loquimur; præterea deficiet in suo officio musculus extendens brachiale, & musculi præbentes motionem pollicis, qui ab eodem neruorum stipite motum susci-

*Methodus cognoscendi quando quatuor digiti non possunt extendi ob morbum in origine quarti paris neruorum.*

læsa, & exinde eidem parti ammoniaco in aceto dissoluto cum quo essent mucilagines radicum altheæ comixtæ, applicito; breui temporis spacio fuit ad portum salutis translatus.

*Qua via  
noscatur se-  
cundos arti-  
culos digito-  
rum non fle-  
cti ob morbum  
existentem in  
cervice.*

Præterea cum musculus iste flectens digitos possit vires suas amittere, non solum ob læsum musculum in exordio, verum etiam ob nervos læsos in ceruice, vnde oriuntur nervi vestientes manus; propterea est inveniendæ methodus anatomica, quæ ex officiis læsis nos perfectè doceat, quando morbus existens in exortu nervorum manus à ceruice prodeuntium sit in causa, cur secundi articuli quatuor digitorum non flectantur; audias igitur, quomodo sit comparanda hæc cognitio; ad sunt furculi nervi prodeuntes à tertio pari nervorum manus, quibus induitur primus iste musculus flectens secunda ossa quatuor digitorum, pollice excepto, cæterum furculi isti nervi, antequam ingrediatur primum hunc musculum flectentem hæc secunda ossa quatuor digitorum, prius peragunt per secundum musculum flectentem cubitum, & deinde inseruntur in istum primum, de quo loquimur, & post istum tandem peragunt per musculos flectentes tertia ossa quatuor digitorum, & tertium articulum pollicis; his ergo positis talem possumus demonstrationem formare, non possunt flecti quatuor ossa digitorum, pollice excepto, & simul cubitum non flectitur, neque tertius articulus quinque digitorum, ergo morbus causans hæc læsa officia nullo modo poterit esse in digitis, neque in musculo illo flectente digitos, sed in altiori exordio, quod est in capite tertij paris nervorum manus, quod par est commune omnibus illis musculis, cum ab ipso facultas motrix, & sensatrix trahant originem, quod par immediatè oritur ab illa nervorum rete, cuius imago perbelle exprimitur in Cardinalium galeris; sed demum tamquam à trûco, & stipite proprio à vertebriis ceruicis trahit suum principium; ex quo discursu optimè colligere possumus, quando digiti non possunt flecti, an hæc mala valetudo digitorum prodiret à morbo existente in digitis, vel in exordio musculi, vel in ceruicis vertebriis; & inde quoque animaduertimus quando in digitis hoc modo læsis sint adiungenda topica digitis, quando exordio musculi flectentis secundos articulos, & quando vertebriis ceruicis; vt hinc quoque faciliè sit videre, quo pacto nostrates nonnulli, qui se dogmaticos faciunt, in errorem incidant, dum in omni officio læso musculorum, si primis inunctionibus læsio non tollitur, volunt cerata, stillicidia capiti adiungere, perinde ac solum à capite prodirent omnes causæ lædentes officia musculorum, & nervorum: vt hinc sæpè frustra administratis iis suis medicinis caput, & cætera ægrorum viscera in ægritudines longè maiores trahant.

*Error non-  
nullorum do-  
gmaticorum.*

*Errant,*



*Errant, dum digitis illorum, qui tertium articulum quatuor digitorum, pollice excepto, flectere non possunt, localia adiungunt, quando aliis longè diuersis partibus essent adiungenda.*

CAPVT XXVI.

**V**T magis eluceat hæc generis sympathia, quæ sit per musculos, & De sym-  
neruos continuatos, & in longitudinem extensos; agendum pro-  
posuimus de longis digitorum musculis, vt errata Empyricorum de  
consensu generis (quantum fert tenuitas nostra) anteuertamus, & cor-  
rigamus, quia licet de omnibus consensibus, qui accidere possint, non  
sit possibile, cum sint ferè infiniti, pertractare; attamen nos expergef-  
cti horum exemplorum luce non tam facilè in errorem corruemus:  
Contingere ergo potest, vt tertius articulus quatuor digitorum, polli-  
ce excepto, aliquando non flectatur propter consensum morbi exi-  
stentis in parte anteriori, & interna articuli cubiti, vnde hic musculus  
oritur, quique descendens, antequam ad brachiale perueniat, diuidi-  
tur in quatuor tendines, qui cum sint subiecti tendinibus primi mu-  
sculi, ante radicem secundi digitorum internodij perforant eos tendi-  
nes, & deinde inseruntur in tertia ossa digitorum, gratia flectendi, &  
trahendi digitos, vt optimè constringantur: videntur ergo Empyrici  
tertia internodia horum quatuor digitorum non flecti, ob imperitiã  
anatomix tanta non pollent cognitione, vt sciant, vel credant, digitos  
immobiles posse esse sanos, & morbum causantem hoc symptoma ef-  
se in cubito, qua sympathia horum longorum musculorum ignorata,  
cæcorum more symptomati occurrunt oleis, & cæteris remedijs, quæ  
fortasse aliquid opis præstarent, si cubito ea adiungerent, vbi est radix,  
& causa symptomatis digitorum, quoniam Empyricorum remedia ali-  
quando summæ virtutis obseruantur, quare si adiungerentur oppor-  
tunè, & parti principaliter læsæ, maximoperè in illis esset sperandum:  
sed quando digiti non possent flecti, quia in exordio musculi flecten-  
tis tertium articulum sit morbus, tunc si digitis topica, quamuis per-  
optima sint, adiungantur, modus tamen iste administrandi non con-  
fert, & redditur omnino ridiculus, cum applicentur vbi non est mor-  
bus; veluti si in cubito inflatū esset vulnus, & inde læsus primus mu-  
sculus iste flectens digitos non expleret suas partes, quam concipere-  
mus spem ex topicis adiunctis digitis; vel si cubitum ictum ob casum,  
vel ob alias causas reciperet, quomodo inungendo digitos curari po-  
tèrit; vel demum si tonsor aperiendo apostema circa cubitum, vel su-  
pra brachiale transversim incideret hunc musculum, & inde digiti  
non possent flecti, quis risum teneret, videndo Empyricos digitis ap-  
plicare localia?

Potest quoque contingere hoc symptoma in tertio osse quatuor di-  
gitorum, pollice excepto; quia nervus vestiens hunc musculum fit au-  
Qua via no-  
scatur seriã

articulum  
digitorum  
manus polli-  
cis excepto ob  
laesionem in  
origine ner-  
ui.

Ut cognosce-  
tur quando  
protopathia  
sit in rete, in  
cervice, vel  
in cerebro.

gustia aliqua oppressus in origine, prodit enim ramus vestiens hunc musculum à tertio pari nervorum brachij, & à quinto ramquam à primo stipite, sed magis proximè deducitur à rete imaginem exprimente cordularum Cardinalium galeni; cognoscemus autem affectum existentem in digitis à nervorum exordiis prodire, quando musculi illi, qui priusquam isti, iisdem nervorum ramis induuntur, erunt læsi, sicuti est musculus flectens cubitum; nec non illi musculi qui irrigantur post istos, qui trahunt tertia internodia quatuor digitorum, quique mouent pollicem, ipsūque ab aliis separant, ut omnis ferè motus digitorum, ab istis surculis tertij, & quinti nervorum brachij exoritur, valebit ergo hæc consequentia, non flectuntur internodia tertia quatuor digitorum, ergo morbus potest esse in tertio, & in quinto paribus nervorum brachiorum, ergo potest esse morbus in rete illo nervorum, vel in vertebis cervicis; ergo dabitur occasio, ut digiti amittant motum ob morbum existentem in ceruice, vel in rete, ergo tunc ad curandos digitos remedia collo, vel sub iugulo, ubi est rete, erunt applicanda, quæ cum ita sint, quid diceret Empyricus hac cognitione priuatus, numquid non admiraretur, quando oculis propriis aspiceret probum anatomicum post factam hanc consequentiam, quod digiti haberent amissam flexionem ob vitium in capitibus nervorum, in vertebis colli, vel in rete, fomentationibus adiunctis vertebis, digitis motionem dare? Nos faciemus denique hanc consequentiam, à motis percussionibus, & vulneribus, & similibus manifestis, si musculus iste flectens tertium internodium quatuor digitorum deficit, & insimul cubitum flecti non potest, & cæteri motus digitorum quoque deficiunt, ergo in capitibus nervorum est morbus, qui causat hoc symptoma in digitis. Methodus verò, qua distinguere possumus, an causa, & radix symptomatum digitorum sit in collo, vel in rete, vel demum in cerebro ipso est, quia si primaria affectio est in rete, & non in ceruice, vel cerebro, symptomata aliubi esse non possunt nisi inter digitos, & iugulum, si in ceruice, inter digitos, & ceruicem, si in cerebro, inter digitos, & ceruicem illius, & alterius lateris observari possunt symptomata, qua methodo Gal. progrediens peruestigavit causam, cur in homine illo veniente Romam digiti amiserint motum, inuenitque scyrhosam dispositionem, circa septimam vertebra ceruicis ob lectum factam, fuisse causam, cur digiti non mouerentur, & inuento loco ceruici topica adiunxit, & paulò post motionem digitis reddidit summa cum omnium admiratione.

*Errant dum inungunt quatuor digitos, pollice excepto, qui non possunt extendi ob morbum existentem, non in digitis, sed in humero, & in aliis partibus.*

C A P. XXVII.

**N**ON raro accidere vidimus, ut digiti non possint extendi, quāvis in digitis nullus humor, vel alia causa præter naturam observetur,



uetur, quæ motionem digitorum tollat, nihilominus non defunt Empyrici, qui digitos hos lætos per consensum vexant vnguentis, pinguedinibus, lana succida, nec non etiam obliniunt ipsos oleo de iunipero, de terebentina, de ammoniaco, oleo phyllosophorum de lateribus vocato, & aliis plerisque tractant linimentis; horum omnium localium administrationem ipsi met Empyrici irriderent, si propriis oculis in secandis corporibus origines musculorum intuerentur, ut quotidie vident anatomistæ, qui in cadaueribus, suis manibus trahentes hunc musculum sub externo humeri tuberculo, mouet mortuorum hominum digitos; musculus enim extendens hos digitos oritur ab hoc humeri tuberculo, quippe qui si læditur in illa superna parte, digiti alioquin sani immobiles fierè redduntur, quare si hæc scirent, & deinde viderent post percussum humerum digitos amittere motum, ipsi quoque non digitis, sed parti illi superiori localia applicarent; ideo non datur alter modus cognoscendi symptomata morricum facultatum, nisi per cognitionem ortus, & progressus musculorum, & neruorum. Hinc si de ortu, & progressu primi musculi externi digitorum, cuius usus est, quatuor digitos extendere, pollice excepto, loquimur; dicimus hunc musculum in primis nasci ab hoc externo humeri tuberculo, & deinde de incedere per cubitum, & radium, & in quatuor latos tendines cessare, qui inseruntur deinde à primo vsque ad tertium articulum quatuor digitorum sub vnguibus. Ex hac concepta veritate colligimus, cur non extendantur digiti, & est, quia huius symptomatici digitorum causa, & protopathia habere potest radicem, tunc in externo humeri rubere, quo læso digiti desinunt extendi, tum inter cubitum, & radium, tum iuxta brachiale: videas ergo, quomodo causa, quæ motum digitorum tollit, variis in locis, & procul à digitis esse possit; quæ cum ita sint, quomodo vnguentis, linimentis digitis adiunctis, causa læsionis existente in humero, vel inter cubitum, & radium, vel ante brachiale, volueris digitis opem ferre? pergas toto anni curriculo inuentionibus Orientalis opobalsami, & omnium generum, quod nihil facies, & totum amittes opus.

Præterea contingit aliquando, ut digiti isti quatuor non extendantur, non quia sit causa præter naturam in digitis, vel inter cubitum, & radium, vel in humeri externo tuberculo; sed quia sit in parte longè magis remota, sicuti quando est in quarto coniugio neruorum brachij, à quo surculi vestientes hunc musculum extendentem quatuor nominatos digitos prodeunt. Methodus autem cognoscendi, quando digiti non extendantur ob morbum existentem in capite quarti paris neruorum à ceruice prodeuntium, erit hæc, quia omnes musculi circumuestiti iisdem neruis prodeuntibus ab hoc quarto coniugio, sentiunt eundem defectum, & tales erunt musculi cubitum flectentes, & extendentes, qui irrigantur surculis eiusdem quarti paris neruorum manus, antequam induatur iste musculus, de quo loquimur; præterea deficiet in suo officio musculus extendens brachiale, & musculi præbentes motionem pollicis, qui ab eodem neruorum stipite motum susci-

*De sympathia inter externum humeri tuberculum, & quatuor digitos pollicem excepto.*

*Methodus cognoscendi quando quatuor digiti non possunt extendi ob morbum in origine quarti paris neruorum.*

piunt; valebimus ergo ex omnium istorum musculorum læsione (supposito prius, causas alias evidentes non esse, quæ motum impedian, veluti essent vulnera, & tumores) colligere, quantum par nervorum manus morbo vexari in ceruice; quare pro digitorum curatione remedia non digitis, sed ceruicis vertebis tunc essent applicanda.

*De sympto-  
thia inter  
minimum  
digitum, &  
humerum.*

Præterea contingere potest, ut digitus minimus non possit separari à reliquis, vel ob tumorem existentem in externo humeri tuberculo, factum à fractura, vel ab aliqua destillatione, vel ob morbum existentem in nervorum rete, vel in ceruice, propter quas causas, si digitus minimus ab aliis abduci non poterit, nunquam vnguentis ad motus digito curari poterit: præterea causa, cur minimus iste digitus ab aliis non separatur, & palma tota fieri non potest, ubique in spacio illo ab humero ad brachiale potest hære, nullo humore in digito minimo existente; tunc sanè digiti, vel palma tota non esset inungenda, sed locus ubi consider humor, siue sit in humeri capite, siue inter cubitum & radium, per quem locum defertur musculus, quos locos læsos prompre admodum quisque cognoscere poterit, si anatomica facultate erit excultus, quoniam per officia læsa cognoscer musculus læsum, cognito verò musculo læso, cognoscer illico omnes eius partes, in quibus causa principalis posset agere radices, & cognoscer, in quas partes eius symptomata posset diffundi, quæ partes illud occupant spatium, quod est ab externo humeri tuberculo usque ad minimum digitum; demumque virtute methodi traditæ in hoc libro inueniet an per se, vel per consensum alterius vicini musculi affectus lædat corporis nostri operationes. Hæc sunt principia, per quæ optimè poterimus cognoscere, ubi sit in musculis morbus.

*Ut cognosci-  
tur quando  
minimum di-  
gitus lædatur  
ob morbum  
ceruicis.*

Demum, si vis scire, quando minimus digitus non possit separari ab aliis per nervum læsum in exordio quarti paris nervorum manus, scias ab hoc quarto pari nervorum, non solum prodire nervos vestientes hunc musculus separantem minimum digitum ab aliis digitis, verum etiam prodire ab eodem pari nervos vestientes musculos flexentes cubitum, & musculus extendentem brachiale; quare si digitus non poterit separari ob vitium in capitibus nervorum, necessariò musculi cubiti, & brachialis non poterunt fungi suo officio, & eò magis hæc consequentia valebit, quia nervi à quarto pari nervorum manus prodeuntes prius irrigant musculos flexentes cubitum, quam musculus istum separantem digitum, quare per hanc singularem methodum, cognita protopathia, poteris, si erit in collo, ibi adiungere auxilia topica, & non digitis.

*Errant, dum digito indici, qui non potest extendi, adiungunt topica, quando causa læsionis est in cubito, vel in ceruice.*

#### CAPVT XXVIII.

*De sympto-  
thia inter in-  
dicem & cu-  
bitum.*

**S**I videtis hominem, qui non possit digito indice indicare, vel indicem, quod idem est, oblique extendere, illico ex hoc læso officio dicere



dicere poteris, tertium musculus externum, qui prodit à medio cubito, vbi est linea illa aspera, & oblonga, esse læsum; quia huius musculi munus est extendere digitum indicem; quare poterit contingere, vt in medio cubito, vnde oritur musculus, sit morbus, & index alioquin sanitate præditus patiatur per sympathiam cubiti: poterit quoque esse morbus in vlna, vel in cubito, vbi linea oblonga, & aspera existit, vel in brachiali, per quem locum transit musculus; vel poterit esse impedimentum in musculis vicinis, quatenus musculi cohærentes, & vicini sint onusti, atque referti mala humorum sarcina, vel quod tumidi facti sint ob œdema, vel propter alias causas, & horum omnium morborum signa solum apparere in indice; quare loca affecta sunt inuenienda, & iis adiungenda sunt localia, & nequaquam indici per consensum læso; quo pacto vero omnia hæc loca læsa cognosci possint, ex traditis in primo libro, & ex officiis læsis faciliè cognoscere poterimus.

Si verò musculus huic destinatus mueri extendendi indicem integer gauderet valetudine, & motio huius musculi diminuta, vel abiata prodiret à neruorum origine; audias methodum, quæ ad huius cognitionis apicem nos certo transferre potest: à quarto pari neruorum manus propaggines vestientes hunc musculum exoriuntur, & ab eodem truncato prodeunt nerui furculi irrigantes musculos flectentes, & extendentes cubitum, & musculos brachialis, & cæteros pertinentes ad digitorum extensionem, quare si index non posset extendi, & simul cubitum neque flecti, neque extendi posset; & similiter brachiale in suo obeundo officio deficeret, ex iis semper consequentiam inferre poteris; quod in communi truncato neruorum, qui consistit in vertebriis ceruicis, vnde oritur quarta coniunctio neruorum, sit radix, & causa, propter quam index non possit extendi; quare si volueris tunc indicem læsum subleuare, non erunt medicamēta indici, sed vertebriis ceruicis, vel reti apponenda, quod Empyrici irriderent; quomodo autem cognoscatur an causa læsionis digiti indicis sit in rete, vel in vertebriis, animaduertas, hoc cognosci posse ex præcedentibus aliis signis, quemadmodum cognouit Galenus scyrthosam dispositionem post septimam vertebra ex ictu habuisse ortum: cognoscemus similiter ex iis, quæ tradita sunt in primo libro capite 11. quod est de locis affectis cognoscendis.

*Qua methodo noscitur, indicem non posse extendi ob nervos læsos in origine.*

*Errant, dum digitum pollicem, cuius tertius articulus non potest extendi, inungunt, quando causa læsionis est in cubito, vel in ceruice.*

# CAPVT XXIX.

**C**HIRURGI in nulla corporis parte maiori diligentia vti debent, quam in cognoscenda, & curanda affectione digitorum; quoniam sæpè accidit, vt digiti ob musculorum suorum longitudi-

*De sympathia inter tertium articulum pollicis, & cubitum.*

nem nullo morbo premantur, attamen amissam suam motionem habeant ob morbum in alia remota parte habentem radicem, vnde digiti propter illius partis sympathiam munera sua explere non possint; quare, quoties videris tertium articulum pollicis non posse extendi, neque ab aliis digitis abduci; inferas, ergo quartus musculus externus digitorum est malè affectus, cuius vsus est extendere tertium articulum, & est ille, qui à cubito egreditur penes tertium musculum, quique defertur supra radij appendicem, & inseritur tertio articulo pollicis; quare contingere potest, vt in cubito sit morbus, & in pollice tantum appareat hæc functio læsa: an-ne inflammatio cubiti, vel cubiti percussio, vel vulnera in illa parte possunt auferre pollicis motum? cur ergo vis Empyricæ auxilia adiungere pollicis? quando pollex non est alicuius malæ causæ particeps, & functio sit læsa in ipso per consensum eiusdem musculi in alia parte læsi.

*Qua via  
noscitur pol-  
licem nō ex-  
tendi ob læ-  
sos nervos in  
origine.*

*Ut scitur  
quando rete  
vel collum  
læsum sit.*

Postremo potest tolli hic motus pollicis ob nervos læsos in capitibus, quæ capita sunt in rete, & in vertebriis ceruicis, vnde omnes nervi digitorum dependent, quoniam virtus mouendi pollicem pendet à rete, & à vertebriis; musculi verò existentes supra rete, qua supra iugulum sunt, à vertebriis tantum suam mouendi virtutem trahunt, quare si videris, dum tertius articulus pollicis non potest extendi, illos musculos tantum esse læsos, qui infra rete sunt, morbus erit in rete; si verò videris, non solum musculos, qui sunt infra rete, sed etiam supra rete, tunc morbus tollens extensionem tertio, articulo pollicis erit in vertebriis colli, vnde oritur quartum par neruorum. His igitur positis, quomodo si morbus erit in partibus supernis, & symptoma in pollice, volueris Empyricæ digitum pollicem inungere, vel fascis, ligaturis, pinguedinibus obducere ac obuoluere; quo nil ineptius esse potest, & à rectis phisiologiæ principiis magis abhorrens; nihilominus his nostris temporibus plurimi sunt Empyrici, qui in has syrtis incutunt; quoniam nullo modo sibi persuadere possunt, quod symptomata perpetuò non sint in eadem parte cum morbo coniuncta.

*De sym-  
ptoma inter-  
torum polli-  
cem & cubi-  
tum.*

Musculus in ordine quintus, qui extendit totum pollicem enascitur ab eadem linea cubiti propè quartum musculum, cuius progressus est obliquus pollicem versus, & in quatuor vt plurimum tendines degenerat, vt propterea plures videantur musculi, cuius primus tendo inseritur in tertium pollicis articulum, alter in secundum, tertius verò tendo in primum articulum pollicis, quartus in os brachiale, quo pollex fulcitur. Quare quis esset adeò rudis, qui, læso cubito, vnde enascitur musculus ob quam læsionem pollex non posset extendi, pollicem inungeret? quis in læsa tendinum origine, vel in læsione facta in obliquo progressu, vel in ossè quo fulcitur pollex, digitum inungeret? superlinitet ammoniacum in aceto dissoluto, & similibus? vt nonnulli ex Empyricis nostris facerent, qui, inter cætera auxilia quibus tractant digitos vtuntur chirotectis quibusdam ex pelle, vel lana succida intus obuolutis, & aliis vanissimis topicis vexant miserum patientem, quan-  
do ori-



do origini musculi, & cubito, vnde musculus oritur esset localibus proportionatis succurrendum. Si verò in nervis esset læsio, eadem methodo primarium affectum poterimus venari, vt superius docuimus, quæ est in primis expendere hunc quintum musculum extendentem pollicem, & cæteros omnes musculos, qui iisdem nervis sunt irrigati, quia est impossibile in rete, vel in vertebribus cervicis, vnde prodeunt nervi dantes motum, vt pollex extendatur, esse primariam affectionem, & primariam causam, cur pollex non extendatur, nisi cæteri musculi iisdem nerveis surculis irrigati deficiant in suo obeundo officio.

*Errant, dum semper brachiale illius, qui non potest ipsum extendere, topicis tractant, cum aliquando huius læsionis causa sit in humero.*

C A P V T X X X.

**V**IDIMVS sæpenumero, dum patientes non possunt extendere brachiale, nostrates brachiale, & totam manum simul obvolvere linimentis, vnguentis, luris, & demum vinaceis, permanentes perpetuò in hac inscitia, quod symptomata loco à morbis separari non possunt. Vidimus tamen patientem, qui nullo modo poterat brachiale extendere ob morbum non in brachiale, sed in humeri externo tuberculo, existentem; in brachiali ve. ò ipse erat affectus per consensum, in fieri, & dependens, qui in sequebatur morbum humeri, vt umbra insequitur corpus: pergamus igitur nostra methodo, & dicamus brachiale, vel manus ipsa non potest extendi, ergo læsus est sextus, & & septimus musculus manus; quoniam ab iis duobus musculis extensio brachialis proficiat, ergo læsionis causa posset esse, tum in principio, vnde exordium hi musculi trahunt, tum in aliis partibus supra brachiale: quare si in principio & origine esset morbus, vel impedimentum, necessariò appareret læsio in brachiali; perpendere igitur oportet musculi principium, & progressum, vt huius musculi sympathiam cognoscamus. Scias ergo, quod sextus iste musculus oritur à radice externi tuberculi humeri, & cubito cõnectitur, & amplectitur, & per cubiti longitudinem perreptat, quando verò ad caput peruenit, degenerat in tendinem validum, qui defertur supra cubiti appendicem in sinum tendam iuxta styloidem (est autem stylois cubiti processus) & ab hac parte suscipit suum ligamentum, deinde in os illud post brachialis inseritur, quod minimum digitum sustinet: ecce ergo quod potest esse morbus in externo humeri tuberculo, qui impediat, ne extendatur brachiale, amplius potest esse morbus in cubito, & in eius longitudine, & in sinu iuxta styloidem, & eius morbi symptoma in brachiale. Sicuti quando cubitus, & humerus vulnerantur, vel ob casum ictum recipiunt, vel percutiuntur, tunc statim potest contingere, vt

*De sympathia inter brachiale, & externum humeri tuberculum.*

brachiale non possit extendi ob morbum in cubito , & humeri externo tuberculo existentem ; præterea posset dolor concitari in brachiali ob musculos in cubito contractos ob callum , vel scyrrhum , & morbum esse in cubito, vbi nullus sit dolor. Præterea brachiale non poterit extendi ob læsionem factam in origine septimi musculi , quem vocant bicornem , iste enim enascitur ab inferiori humero supra articulum , & deinde supra radium rep. t , & circa medium radij cessat in tendinem validum, & bistidum, cui propterea nomen bicornis imposuitur est, qui postquam suprabrachiale iter fecit, inseritur in ossa postbrachialis, quibus ossibus index, & medius fulciuntur, læso ergo isto, vel altero musculo in cubito, vel in humero; ex necessitate non poterit extendi brachiale, quare si affectus erit factus in parte inferiori humeri, vnde bicornis nascitur, poterit esse symptoma in brachiali , & morbus in aliis partibus , quia sæpè accidit , vt actio læsa non sit vbi sit morbus.

*Errant, dum semper inungunt brachiale illorum , qui non possunt manum suppinam reddere, & flectere brachiale, vel ob tremorem non possunt scribere.*

## CAP. XXXI.

*De Symptoma inter brachiale, & humerum.*

**P**ERSÆPE contingit, vt manus non possit reddi supпина, vel flexio brachialis læsa, & impedita sit, vt observatur in iis, qui in scribendo tremore manus afficiuntur , qui licet in cæteris operationibus omnibus brachiale fortissimum habeant; in actu tamen scribendi ad eò redditur infirmum, vt nullo modo suo fungi possit officio; causa vero istius tremoris nulla alia esse potest, nisi imbecillitas musculorum flectentium manum, & brachiale, musculi verò flectentes brachia e duo sunt, alter est inter externos ordine octauus, & est ille quem vocant longissimum, qui enascitur ab humero , & deinde peragrans oblique radium membraneo tendine inseritur in radij appendicem; quare dum manus non potest reddi supпина, & brachiale non potest flecti , causa esse posset non solum in brachiali, verum etiam in variis locis, & præsertim in humero, vnde exoritur iste musculus, qui flectit brachiale; alter verò musculus flectens brachiale est nonus musculus, qui exoritur à copula, quæ cubitum humero connectit , & qui è superiori parte cubiti obliquus progreditur , & in medium radium inseritur, vt moueat manum suppine, & moueat radium exterius, vt flectat brachiale; & in qualibet istius musculi parte potest esse morbus aliquis impediens hæc brachialis flectionem; videas ergo quo pacto brachiale tremore afficiatur per consensum à morbo existente procul à brachiali, potest enim esse morbus in humero, in copula connectente cubitum humero, & in progressu istorum musculorum , & brachiale esse læsum quamuis per se careat omni morbosa constitutione, quo pacto ergo Empyrici audet quando



quando quis non potest flectere brachiale, & in actu scribendi maximo tremore afficitur, inungere manum? brachiale? digitos? quamvis videant nullo tumore, vel aliis affectibus manifestis partes has esse affectas.

Amplius non solum in humero potest esse causa tollens flexionem brachiali, verum etiam potest esse in rete nervorum sub clavicula existentium, & demum potest esse in vertebrae cervicis: & ratio est; quoniam musculi isti octavius, & nonus contexti sunt furculis missis à secundo, & tertio paribus nervorum manus; sed, ut certa methodo cognoscas, quando brachiale suum munus flectendi non exercet ob nervos laesos in trunco nervorum tertiae coniugationis, debes respicere an secunda, & tertia internodia omnium digitorum possint flecti, quoniam; si ipsa quoque non poterunt flecti, inferre poteris, esse in tertia coniugatione causam. cur brachiale flecti non possit, & ratio potissima est, quoniam musculi flectentes secundos, & tertios articulos omnium digitorum eisdem furculis tertij partis nervorum manus sunt induti, & ab eisdem virtutem motricem recipiunt; quare a motis aliis morbis sensibus manifestis, ut sunt vulnera, vel fractio brachialis, vel humeri ob casum ab alto, inferas ex iis hanc consequentiam, secunda, & tertia internodia omnium digitorum, & insimul brachiale non possunt flecti, ergo à communi nervorum origine lesa prodit vitium, quod potest habere sedem in rete sub clavicula, & in vertebrae cervicis, unde oritur tertia coniugatio nervorum manus, quare dabitur occasio in iis, qui malè flectunt brachiale, & in iis, qui difficulter admodum ob tremorem scribunt, ut topica remedia, quae possent aliquid opis afferre, non brachiali tantummodo, sed claviculae, vel axillis sub quibus nervi omnes, qui mittuntur ad manus transeunt, & demum cervici tamquam primo trunco conveniant, si denique brachiale non flecti potest ob morbum existentem in capite secundi partis nervorum, cognosces tali pacto, quia tunc neque cubitus poterit flecti, quia eisdem furculis nervorum secundi partis induitur, ut brachiale, neque secundus articulus pollicis, qui similiter recipit motum ab hoc secundo pari; quare si erit in hoc secundo trunco morbus tollens flexionem brachiali, neque cubitus neque secundus articulus pollicis poterunt flecti.

*Errant, dum topicis tractant tibiam, quae non potest trahi sursum versus inguen alterius tibiae ob morbum existentem in illius.*

C A P. XXXII.

**C**AUSAE, quae possunt impedire, ne tibia trahi possit sursum versus inguen alterius tibiae, modo possunt esse in tibia, modo extra tibiam in loco quoque valde remoto, & praecipue in parte anteriori, & suprema ossis ilium, unde oritur primus tibiae musculus; quoniam potest contingere, ut in hoc principio, & origine musculi sit aliquis mor-

*De sympathia & idiop.*

bus, qui tollat vsum primo huic musculo tibię, & eius symptoma præcipuè se ostendat in tibia, quam dice mus tunc esse læsam per consensum ab ilibus; veluti si contingeret, vt musculus esset vulneratus in sua origine, & excisę essent fibrę, vel post inflammationem talis factus esset callus, vel post casum ab alto talis relicta esset dispositio scyrthosa, vt propterea musculus amplius nullas haberet vires. Empyrici tamen in hoc modo læso officio inungunt tibiam, & genua, & non ilia; credentes morbum solum esse in parte illa inferna, quia non vident consensum inter genua, & ilia seruari quoque posse per primum tibię musculum illum longissimum, & gracillimum, qui ab ilibus oritur, & tibię inseritur; lædi enim potest (vt diximus) hic musculus in exordio, quod est in appendice anterioris partis ilium, & symptoma apparere potest in tibia, quę est in loco valdè remoto ab anteriori ilium parte; valebit ergo consequentia, tibia non potest tolli versus inguen alterius, ergo potest esse læsus primus musculus ille longissimus, qui oritur à suprema, & anteriori sede ilium; & deinde obliquè secū lum internam femoris partem ductus anteriori parti tibię inseritur, cuius musculi officium est (auxilio tamen musculorum femoris, & aliorum tibię) trahere tibiam sursum versus inguen alterius tibię; diximus aliorum auxilio, hunc musculum edere hunc vsum, quoniam adeò est gracilis, vt ex se tantum pondus commodè non possit attollere; & hic obiter animaduertatur error Galeno adscriptus dicenti, vsum istius musculi esse tibiam supra tibiam deferre, vt pueri ludentes facere solent, quod non est receptum, quoniam oporteret, vt esset insertus in mediam tibiam simiarum, vt potuit obseruare Galenus, sed nō in medias hominum tibias; his igitur positis, nunquid non facillè contingere potest, vt causa, cur tibia non possit trahi sursum versus inguen alterius tibię, sit in anteriori ilium appendice, eius verò symptoma in tibia; quare, si nostrates hi, qui mordicus tenent, vbi sit symptoma, ibi esse morbum, tunc inungerent tibiam, an ne esset ridiculum, videre, homines summa industria adiungere vnguenta sanę, & benè constitutę tibię, non per se læsę, sed solum per consensum ilium?

*Error Gal.  
adscriptum.*

Denique tantus est consensus in hoc nostro corpore, vt morbus possit esse circa tertiam vertebra lumbarum, eius verò symptoma appareat solum in tibia, quamuis per se sit optima constitutione donata, vnde sequatur, quod tibia non possit sursum versus inguen trahi; & audias rationem ab anatomia depromptam, cur hoc aliquando contingat. A tertio pati lumbarum oritur neruus, qui deinde peruenit ad illam neruorum implicationem, quę imaginem retis exprimit, quique tandem mittit furculum, in primum hunc tibię musculum, quo præcipuè musculus habet facultatem motricem; quare potest accidere, vt morbus sit circa tertium par neruorum pedis, quod à tertia lumbarum vertebra prodit, & symptoma in tibia; quare, si propter hanc causam tibia non poterit sursum tolli, non erit inungēda, sed inuenienda erit radix, & protopathia symptomatis existentis in tibia, & si erit causa, & origo symptomatis in lumbis, ibi inunctiones, quę pos-

sent



sent prodesse, essent applicandæ: vt igitur methodo aliqua cognoscas, quando per tam longinquum consensum id accidere possit in primo hoc tibiæ musculo, scias à tertio pari lumborum enasci propaginem prius vestientem primum hūc musculum tibiæ, & aliam propaginem deinde dantem motum septimo, & nono musculis tibiæ, cuius munus est tibiā extendere secundum rectā lineam, quare valebit consequentia, non potest tibia rectē extendi, quod munus pertinet ad septimum, & nonum musculum, & non potest trahi sursum versus inguen alterius, & nullus ictus, nullus tumor, vel vulnera præcesserunt, quæ potuerint manifestē tibiā lædere, ergo tibiæ læsio habet suam originem in tertio pari lumborum, vnde oriuntur isti nerui dantes motum musculis illis citatis.

*Qua metho-  
do noscitur  
tibia sursum  
nō posse trahi  
ob læsionem  
in tertio pari  
neruorum  
lumborum.*

Præterea, cum innumerabiles possint esse in hoc nostro corpore consensus, & sympathiæ, quas mente vix assequi possumus, ego illas dumtaxat perquirēdas mihi proposui, quæ quotidie in humanis corporibus experientia obseruantur, & quæ rationibus desumptis ab arte anatomica cognosci possunt: audias igitur antequam capiti finem imponam quendam consensum vicinitatis, qui frequenter obseruari solet in musculo de quo loquimur; aliquando contingere solet in musculis lumborum aliquis infarctus humorum ab aliis partibus missus, vel per congestionem collectus, quippe qui tollat officia primo, septimo, & nono musculorum tibiæ, quod hoc modo contingere potest; primum par neruorum, quod oritur à tertio pari lumborum, & deinde à rete descendit ad femora, & descendens adhæret, & annectitur musculis lumborum, qui si propter scyrrhosam dispositionem, vel infarctum tumidi aliquantulum erunt facti necessariò compriment hunc neruorum truncum, quo compresso virtus motrix, non amplius diffundetur, vel transmittetur ad musculos mouentes tibiā, vnde sequitur, quod tibia versus inguen alterius attolli non possit, nec in rectum extendi ob illum infarctum pituitosum existentem in musculis lumborum.

*De sym-  
thia inter  
lumbos, &  
tibiā.*

Amplius in hoc primo, septimo, & nono musculis tibiæ obseruatur alter affectus per consensum vicinitatis, qui fit à morbo existente in sexto musculo femoris, quoniam quando contingit, vt in tendine forinsecus sexti musculi sit aliquis pituitosus infarctus, illico primus musculus tibiæ (cuius vsus est trahere tibiā versus alterum inguen, aliorum tamen musculorum auxilio) cōprimitur, & tollitur eius vsus; cognoscem usque affectum horum musculorum tibiæ esse per consensum sexti musculi vicini, quando videbimus prius officium sexti musculi deficere, quod est trahere femur sursum, & flectendo femur in trorsum mouere; quare si post hunc perditum vltimū femoris sequitur amissio primi musculi, nec non etiam septimi, & noni tibiæ, erit inferendum tibiā esse læsam per consensum factum à sexto musculo femoris, cui auxilia erunt dirigenda, & non musculis tibiæ.

*De sym-  
thia inter ti-  
biā, & fe-  
mur.*

*Errant, dum topicis tractant tibiam illorum, qui non possunt tibiam supra tibiam deferre ob morbum existentem circa os pubis.*

## CAPVT XXXIII.

*De sympto-  
thia inter  
pubem, & ti-  
biam.*

**V**ALERE optimè potest hæc consequentia, tibia supra tibiam non potest deferri, ergo causa huius potest quoque esse in parte anteriori pubis propè cartilaginem iuxta longitudinem ossis pubis, quia ab illa parte secundus musculus tibiæ exoritur, cuius munus est tibiā supra tibiam deferre, vel superequirare; quare si hoc principium musculi esset morbo aliquo in mala compositione, vel in soluta unitate oppressum, non video (cum in origine, & initiis musculorum maxima sit virtus) cur non possit quoque cōtingere, ut tibia, quæ longè distat à pube, lædi possit non à morbo existente in tibia, sed in principio musculi, quod est in superna, & anteriori parte ossis pubis; quare colligere possumus, si in exordio musculi virtus est collisa atque collapsa, ex necessitate tendinem insertum in tibiam trahere non posse tibiam supra tibiam: quomodo erigunt Empyrici ita audacter ope inunctionum, & fomentationum tibiæ, agris polliceri poterunt salutem? & quomodo eos non pudet, quando suis frustrantur pollicitis, iterum versari inter illos, quos toties deceperunt?

Cæterum animaduertant lectores, non solum posse esse morbum in anteriori parte pubis, & eius symptoma apparere in tibia, alioquin sana, & optima constitutione prædita, verum etiam, quod maiori admiratione est dignum, posse esse morbum inter quartam, & quintam vertebriam lumborum, & in tibia apparere hoc symptoma, quod est tibiam supra tibiam non posse deferri; quoniam ab illis vertebreis nascitur nervus, qui descendens irrigat secundum hunc musculum tibiæ; quare si in capite istius nervi erit morbus, eius symptoma haud dubiè apparebit in tibia. Methodus verò, qua cognoscere poteris, quando illud caput nervorum inter quartam, & quintam vertebriam sit læsum, erit hæc, quia, antequam hic nervus perueniat ad hunc secundum musculum tibiæ, prius peragrat per septimum, nonum, & decimum femoris, & deinde surculos mittit ad penem, merito quorum penis habet motum voluntarium tum in extramittendo semen, tum in aliis exercendis officiis, & deinde ad secundum hunc tibiæ, de quo loquimur; & demum exoritur alter nervus ab eodem trunco petens quintum musculum femoris. Quare, quando videbis vsum septimi musculi femoris, qui est trahere femur sursum, magis tamen introsum, quàm sextus, esse læsum; & videbis quoque læsum esse vsum noni musculi, qui est femur in gyrum introsum, mouere, & decimi, cuius vsum est extrorsum in gyrum vertere & simul cum iis quintum musculum femoris esse læsum, cuius vsum est femur extendere in rectum, vel in latum, & demum videbis simul cum iis omnibus penem amittere ali-

*Qua via no-  
scatur tibiā  
non posse de-  
ferri supra  
tibiā ob  
morbum in  
exordio ner-  
uorum.*

quem



quem motum voluntarium, inferre certò poteris, morbū esse in trunco neruorum communi prodeunte à quarta, & quinta lumborum vertebreis, quoniam hi omnes muscoli citati recipiunt furculos nerueos, vt fungantur suis officiis, à quarta lumborum vertebra, qua certissima methòdo resolutiua cognosces huius affectus radicem.

Diximus penem amittere motum voluntarium ob læsionem factam, inter quartam, & quintam lumborum vertebra, idque cognosci ex læsis omnibus illis musculis, qui sunt induti nerueis furculis prodeuntibus ab illo neruorum pati, quod prodit à quarta lumborum vertebra; sed quoniam ob plurimas alias causas motus voluntarius quatuor musculorum pertinentium ad penem tolli, vel impediri potest. Propterea in hoc loco vnum, quod est obseruatione dignum, non est omittendum, & est, dum duo primi musculi penis, quorum officium inter cætera est aperire meatum, per quod semen debet foris propelli, adeò lacerantur, à Lithotomis, tum quando secant, tū quando immittunt forcipem dilarantes, & lacerantes vesicæ collum, & omnes partes vicinas, & coherentes, vt inde musculi hi duo primi penis amittant vsum aperiendi meatum, per quod sperma eiaculari debet, quo amisso dum coeunt, semen ob musculorum illorum infirmitatem cum exprimi non amplius possit in penem, sequitur, vt spòte in vesicam disfluat, & deinde cum lotio simul elabatur, quod nonnullis contigisse vidimus. Ex quo casu colligimus motum musculorum pudendorum non solum tolli posse ob morbum existentem in trunco, verum etiam ob morbum existentem in musculis ipsis. Secundo colligimus, quomodo lacerentur isti musculi, quorum vsum est aperire meatum, & expellere semen per sympathiam vicinitatis. Tertio colligimus errare Lithotomos dum nimio impetu secant plusquam par sit, & lacerant ceruicem vesicæ, vt sæpè mors propterea sequatur. Satius enim esset aliquantulum magis morari, vt tutius res ageretur, quoniam ex nulla alia causa his, quibus transponitur per sectionem calculus, mors contingere potest, quam ex hac colli vesicæ læsione.

*Vi duo primi musculi penis amittant vsum ob errorem Lithotomi.*

*Errant, dum inungunt tibiam, quæ introrsum flecti non potest ob morbum existentem in coxendice, in osse sacro, vel lumbis.*

C A P V T XXXIV.

**P**ERSÆPE vidimus in hunc errorem prolabi nostrates Empyricos, dum aggrediuntur curationem tibie, quando introrsum tibia inflecti non potest ob morbum agentem radices non in tibia, sed in coxendice, vnde oritur musculus, qui inflectit introrsum tibiam; tunc enim tibiam læsam vnguentis, lana succida, fasciis, & oleis variis circumuoluunt, perpetuò hanc hæresim insequentes, quod vbi est symptoma, ibi sit morbus; quod erratum hæctenus plurimis argumentis est reiectum; quoniam ostensum est superius sæpissimè valde distare,

*De sympathia inter vertebrae ultimas lumborum, & primas ossis sacri. & ibi.*

& loco separari morbum à suis symptomatibus; similiter in hoc capite ostenditur musculū terciū tibiæ mala lædi posse constitutione in infima, & posteriori appendice coxendicis, vnde originem trahit; vel in progressu, antequā in tibiā inseratur, veluti circa medium femoris, & inde se qui tibiā ob hunc musculum læsum in origine longè à tibiā introrsum inflecti non posse; causa enim quod symptoma possit esse in tibiā, morbus in coxendice, est, quia hic musculus tercius tibiæ oritur neruo principio ab infima, & posteriori appendice ossis coxendicis; quare morbus potest esse in neruo illo principio, & symptoma apparere in tibiā; præterea, cum iste musculus, antequam inseratur in tibiā, in medio femoris fiat carnosus, potest vsu venire, vt pars illa carnosa repleatur magna humorum sarcina, & ibi sentiatur dolor; sed non talis, vt in tendine: quia caro non est tam exquisiti sensus sicuti sunt tendines; potest igitur esse, vt illa pars carnosa repleta humoribus trahat, & contendat neruum principium ortum ab illa appendice coxendicis, & maior persentiatur dolor in coxendice, tum ob nerueam substantiam, tum quia obscureretur dolor femoris à dolore coxendicis, quia maior est; similiter pars carnosa huius musculi repleta potest excitare dolorem in tibiā contendendo tendinem musculi, ubi inseritur: Quare colligimus posse impediri, ne tibiā introrsum inflectatur ob morbum existentem in coxendice, & in femore: his igitur positis, volueris ne Empyrice, si radix, & morbus tibiæ sit in femore, vel in coxendice adiungere topica tibiæ? nemo sanæ mentis, qui hæc principia Anatomica haberet ista faceret, & talem defenderet errorem.

*Vt noscitur  
tibiā non  
posse intror-  
sum inflecti  
ob neruos la-  
sos in osse sa-  
cro.*

Præterea non solum symptoma potest esse in tibiā, & morbus in coxendice, vel in femore; verum etiam potest symptoma apparere in tibiā, & morbus huius symptomatis esse in osse sacro; quandoquidem quartus neruus pedis, qui est omnium crassissimus, & fortissimus fit ab ultimo neruo lumborum, & ex tribus sequentibus ab osse sacro prodeuntibus; iste igitur truncus mittit ramum ad primum tibiæ musculum, cuius est trahere tibiā sursum versus inguen alterius; & alios mittit surculos ad hunc tertium de quo loquimur, & ad quartum tibiæ, cuius vsus est tibiā in rectum flectere; & alium ramum ad quintum tibiæ, cuius munus quoque est in rectam flexionem facere, & alium ramum ad quintum femoris, cuius munus est femur extendere, & in latus, & in gyrum femur mouere, quia iste musculus distribuitur in tres alios musculos: Quare si volueris cognoscere, an istud munus tertij musculi tibiæ deficiat, quod esset quando non posset tertius musculus introrsum inflectere tibiā ob morbum existentem in truncō neruorum prodeuntium à vertebris lumborum, & ossis sacri; tunc videre expedit, an citari musculi, qui induuntur iisdem neruis amiserint suum officium; quia ex amissis illorum musculorum officiis valebit consequentia, quod morbus esset in osse sacro, quamuis symptoma appareret in tibiā; & tunc oporteret os sacrum, & nō tibiā inungere, inferas ergo ex his, tibiā non potest inflecti introrsum, quod conuenit tercio tibiæ musculo, tibiā quoque non potest trahi sursum ver-



sus inguen, quod pertinet ad primum tibiæ; tibia non potest flecti in rectum, quod pertinet ad quartum, & ad quintum, tibiæ; & femur nō potest extendi in latus, nec in gyrum moueri, quod pertinet ad quintum femoris, qui omnes musculi eadem neruorum propagine gaudent; inferas ergo morbum debere esse in radice quarti paris neruorum vestientium pedes, & si opus est: inungere, tunc non tibiā, sed os sacrum, vel circa vltimā lumborum vertebrā, vt diximus, esset inungendum.

---

*Errant, dum Topicis tractant tibiā, quæ non potest fl. et in rectum ob morbum existentem in coxendice.*

C A P. XXXV.

**P**OTERIT in coxendice, vnde pronascitur musculus flectēs tibiā in rectum colligi mala aliqua humorum soboles, vel accidere poterit vulnus, vel tale quidpiam in posteriori parte coxendicis, & inde in tibia apparere hoc symptoma, quod non possit in rectum flecti; ratio ab anatomia depromitur, quia hic musculus oritur à coxendice, & descendens per femoris posteriorem partem inseritur in caput fibulæ, cuius officium est tibiā in rectum flectere; sed dum peruenit ad mediam partem femoris exterius positā recipit magnā carnis molem ortam à medio femoris. Quare his positis, si in exordio istius musculi erit morbus, & inde contingat, tibiā non flecti in rectum, volueris tunc tibiā inungere, vt faciūt nostratū plures, qui solum symptomata respiciunt; Similiter, si in illa carnis positione in parte media exterius sita erit impedimentum, vel mala aliqua compositio, vel vlcus, vel vulnus, vt propterea amittatur robur illius partis, vnde prodit virtus flectendi, volueris ne tibiā tunc inungere, quæ solum læsa est per consensum? Præterea si in tibia ipsa tendo istius quarti musculi supra caput fibulæ, cui inseritur esset excisus ob aliquod vulnus; cur totis horis in casu hoc deplorato, iritis tuis vinaceis vexas tibiā, cum sit prorsus impossibile, post excisum hunc tendinem, flectere tibiā in rectum; quinimo exciso hoc tendine, non solum tollitur flexio tibiæ, sed tollitur, quod homines amplius nec currere, vel ambulare possint; vt mirandum sit, quomodo Galenus in hunc errorem incidit, quod cuidam cursori fuerit hic quartus tibiæ musculus excisus, & nihilominus dixerit cursorem, velocius cucurrisse, quod non potuit esse, quoniam si hunc musculum leuamus, nullo modo recta flexio effici poterit; & ratio est, quia cursus fieri non potest sine recta flexione, vt testis est ipsemet Galenus 2. de administratione ana. quinimo læso hoc musculo, non solum cursus omnino demitur, verum etiam incessus, vel ambulatio tollitur; quare si cursus, & ambulatio erunt adempta ob morbum existentem supra caput fibulæ, vnde oritur hic musculus, vel ob morbum existentem in medio femoris, vbi muscu-

*De sympathia inter coxendicem, & tibiā.*

*Error Galeni adscriptus.*

lus sit valdè carnosus, quis esset tam bardus, & mente captus, qui tibiam inungendo speraret salutem? ut faciunt Empyrici, qui semper illidunt iis vadis occurrentes symptomatibus, quod faciunt, quoniam origines, progressus, & officia musculorū, & neruorum omnino ignorant: vel credunt fortasse musculos oriri ex illismet partibus in quas inseruntur.

*Qua via cognoscitur, nō poss. flecti tibiam in vi. illū ob morbū ossis sacri*

Postremo cum musculus iste quartus recipiat virtutem flectendi à neruis prodeuntibus à quarto pari neruorum pedis; propterea potest accidere, ut circa quintam lumborum vertebam, & circa tria foramina ossis sacri, à quibus locis hoc neruorum par trahit suum initium, sit morbus, qui sit causa, cur tibia non possit flecti, quod hac methodo cognoscemus, quia, cum ab isto quarto crassissimo neruorum trunco prodeant rami vestiētes primum, tertium, hunc quartum, & quintum tibiæ musculum, & exinde ad quintum femoris mittat ramulos virtute quorum officia horum musculorum exerceantur, tunc si erit morbus in exordio circa summitatem ossis sacri, necessariò enumeratorum istorum musculorum officia debent cessare, & ex horum musculorum læsione, deinde nos amoris manifestis affectibus, poterimus peruenire ad cognitionem affecti loci.

*Errant, dum inungunt tibiam, qua in rectum extendi non potest ob morbum existentem in ilium appendice, vel in osse sacro.*

#### C A P V T X X X V I.

*De sympathia inter mediam appendicem ilium, & tibiā.*

**S**I morbus ob destillationem, vel ob alias causas ageret radices in media appendice ossis ilium in extrinseco latere, unde oriuntur musculi extendentes tibiam, tunc tibia nullo modo posset extendi, & causa istius læsionis non esset in tibia, sed in ilium appendice; ecce quomodo cubiti tractu morbi, vel causæ aliquando à symptomatibus distant; quam mirabilem sympathiam nec possunt, nec volunt Empyrici cognoscere; age ostendamus nos ex anatomia hanc remotam sympathiam, quæ est inter tibiam, & ilia: numquid non est munus sexti musculi tibiæ extendere in rectum tibiam? sed sic est, quod iste sextus musculus ex omnium consensu oritur à media appendice forinsecus ossis ilium, ergo dabitur occasio, quod morbus ilium ostendat suum symptoma in tibia: præterea potest quoque esse morbus in progressu istius musculi, quia in primis descendens iungitur maiori trochantirio, & ibi cessat in membranoso illum tendinem, quo in toto corpore non est maior, amplectitur enim omnes ferè musculos, qui circa femur locati sunt, & deinde rectis fibris descendens rotulam genu amplectitur, & in anteriorem tibiæ, fibulæque partem tandem inseritur: quare his positis, quid prohibet quin causa, cur non extendatur tibia, sit in ilibus, vel in trochantirio, vel in femore, & symptoma præcipuè appareat in tibia peroptima cōstitutione prædita? quinimo cum iste sextus muscu-



musculus amplectatur musculos omnes in femore locatos, posset cōringere, vt hoc læso, omnes muscoli femoris, & tibiæ, in obeundis suis muneribus deficerent per consensum vicinitatis istius musculi; videas ergo quot modis accidere potest, vt tibia non extendatur ob morbum, vel causam, aliubi positam.

Denique potest accidere, vt morbus sit circa os sacrum, & infimam *Qua via cognoscatur tibi-*  
vertebram lumborum, vnde exoritur primum par neruorum peten- *biam non*  
tium pedes, & symptoma sit in tibia in quam inferitur sextus iste mu- *posse extendi*  
sculus tibiæ: cognoscitur verò tibiā non fungi suo officio extenden- *in rectum ob*  
di ob læsum caput primi paris neruorum pedis ex lēione illorum mu- *morbum exi-*  
sculorum, qui sunt neruis eiusdem primi paris irrigati, veluti est pri- *sistentem in*  
mus musculus tibiæ, septimus, & nonus; quare si videbis tibiā non *ossi sacro.*  
posse sursum trahi versus inguen alterius cruris, quod officium perti-  
ner ad primum musculum tibiæ, qui irrigatur eadem propagine neruea  
prodeunte à primo pari neruorum pedis, & videbis non extendi tibiā  
per rectam lineam, quod munus attinet ad septimum, & nonum mu-  
sculum tibiæ; tunc magnum tibi erit argumentum, quod in capite pri-  
mi paris neruorum pedis, vbi est vltima vertebra lumborum, præcipuè  
sit morbus, quamuis eius symptoma sit in tibia; volueris ergo tunc ad-  
iungere topica tibiæ? nihil sanè esset magis abhorrens à medica phy-  
siologia, & nihil fieri posset, quod magis faueret circulatoribus, &  
quod redderet artem inarteficiōsam, & insanorum hominum propriā,  
quā occurrere symptomatibus, vt symptomata sunt; quia symptomati  
occurrere est mederi aliquando morbo in loco, in quo non est, vt hinc  
symptomata ex se nihil indicent, sed solum sint in fieri, & aliquando  
adeo loco separentur à morbis, vt diffundantur symptomata in partes  
aliquas, quæ optima sunt constitutione donatæ, & quæ medicum non  
alliciunt.

*Errant, dum  
tibiā læsam  
inungunt ob  
morbum exi-  
sistentem in  
maiori tro-  
chantirio.*

Præterea potest esse morbus circa magnum trochantirium, & sym-  
ptoma apparere in tibia, quoniam exit septimus musculus è magno  
trochantirio, & ad patellam vsque rectis fibris carnosus progreditur, &  
deinde cessat in latum, & membranofum tendinem, qui patellam cō-  
plectitur, & implantatur anteriori parti tibiæ, quare si septimus iste  
musculus (cuius officium est in suo latere tibiā extēdere) in suo exor-  
dio haberet morbum, propter quem tibia non posset extendi, tunc,  
cur vis Empyricæ vnguentis, luti, & vinaceis vexare tibiā, si morbus  
est in maiori trochantirio, in tibia verò sit solum symptoma? Amplius  
si septimus iste musculus tibiæ in femore, vbi sit carnosus, esset reple-  
tus humoribus, vel ob vulnus excisæ essent fibræ transuersæ, vnde ti-  
bia propterea amisisset vim extendendi, qua ratione, vel qua philoso-  
phia ductus topicis tibiā tractares, cum in tibia sit tantum sympto-  
ma, & non morbus?

*De sympa-  
thia inter  
tertium fo-  
ramen lum-  
borum, & ti-  
biā.*

Demum si morbus esset in tertio lumborum foramine, vnde pri-  
mum par neruorum pedum exoritur, & tibia non posset extendi, co-  
gnoscemus ex læsis illis officiis musculorum, qui irrigantur illis ner-  
ueis furculis, quibus irrigatur quoque septimus iste musculus exten-

dens tibiā, qui musculi sunt primus, & nonus tibiæ, quare si primus tibiæ musculus amitter suum munus, & similiter nonus, & insimul quoque vsus huius septimi sit amissus; signum erit, morbum esse in capite primi paris neruorum pedum; quare si topicis esset curandus affectus, tunc ad lumbos esset confugiendum, & non ad tibiā.

*De sympto-  
thia inter  
maius tro-  
chantirium  
& tibiā ob  
musculum  
octauum.*

Prætereā tibiā aliquando non potest extendi ob læsum musculum octauum eiusdem tibiæ, quia in ceruicem femoris, in locum videlicet, ubi est maius trochantirium, quod est femoris processus maior, vnde oritur, iste musculus extendens tibiā, humores confluerint, qui impediunt extensionē tibiæ, vt obseruat ut præcipuè in illis, qui ischia- dem patiuntur, in quibus, quamuis tibiā omni malo humore, & mala constitutione sit priuata, recipit tamen symptoma illius morbi, qui suā sedem tantum habet circa radices maioris trochantirij, communica- tur tamen tibiæ symptoma, quia musculus iste octauus progreditur ad patellam, & in tendinem definit, qui genu complectitur, quare si in musculi initio erit morbus, & causā huius symptomatis in tibiā, cur non vis adiungere localia musculi exordium, ubi est morbus? tanto ma- gis cum musculi virtus præcipuè conseruetur in exordiis, quibus læ- sis, musculi secundum omnes partes in suis obeundis officiis tam faci- le deficiant; quare localia erant apponenda, si tibiā erit læsa ob læsi musculi exordium, inguini, & nequaquam tibiæ.

*Vt cognosci  
tur tibiā  
non possu ex-  
tendi ob mor-  
bum existen-  
tem circa  
quartā ver-  
tebrā lum-  
borum.*

Postremo potest esse morbus, ubi est quarta vertebra lumborum, vnde oritur secundum par neruorum pedis, & eius symptoma appa- rere in tibiā, quoniam octauus musculus tibiæ, cuius munus est tibiā extendere, recipit virtutem motricem à neruis prodeuntibus à quarta vertebra, quare si morbus esset circa quartam vertebra lumborum & impeditet transitum facultati motrici, tunc nisi ad lumbos topicis auxilium confugas nihil facies, sed audias, quomodo cognosci potest, quando tibiā non potest extendi ob morbum existentem circa quartā vertebra lumborum. Pollex non mouebitur, quia eius motus quo- que pender à surculis istius trunci, & nonus tibiæ musculus non ex- plebit suorum officiorum partes, & ob eandē rationem quartus mu- sculus femoris suum non poterit munus obire, quod est femur exten- dere, & rectè stare; ex his simul læsis officiis ducimur in hanc cogni- tionem, quod morbus causans impedimentum in tibiā sit in capite secundi paris neruorum pedis, quod oritur à quarta lumborum ver- tebra, quamuis symptoma sit in tibiā; colligas ergo, quomodo iis non præcognitis, quilibet Empyricus in symptomatibus auferendis mil- lies in dies possit errare.

*Errant, dum inungunt tibiā, quæ non potest extendi ob noni mu-  
sculi læsionem, quando essent inungenda ilia, vel  
lumborum vertebra.*

## CAPVT XXVII.

*De sympto-  
thia inter*

**E**SSet potest in parte anteriori ilium collectus viscosus humor, vtq; nonus musculus sibi exorians imbibatur, & in illa or gine ob hu-  
morum



morum sarcinam vires extendendi tibiam amittat; tunc localia procuratio istius affectus essent applicanda anteriori parti ilium, & nō tibia; quia symptoma solum est in tibia, morbus verò in anteriori parte ilium; communicatur verò iste affectus tibiae ob hanc rationem, quia iste nonus musculus enascitur ab anteriori parte ossis ilium supra articulum coxendicis, & incedit inter septimum & octauum musculum, & coit cum septimi & octauae tendinibus, & vna patellam amplexantur, & in anteriorem tibiam inseruntur. Videas ergo, quanta seruari potest distantia inter originem, & terminum musculorum, & praeterea qualis debeat esse consensus, & sympathia, vt morbus existat in vno loco, eius verò symptoma in alio longè diuerso ob instrumentorum continuationem appareat, sicuti in hoc casu contingit, vt morbus sit in ilibus, motus verò diminutus sit in tibia: similiter, si de dolore musculi loquimur, potest esse imbibitus musculus in aliqua parte carnosissima, quae sit facta indolens ob tumorem, qui deinde contendat fibras, & tendines insertos, propter quam tensionem maximus sentiat dolor in partibus, quibus inseruntur tendines; quoniam illae partes mouentur, & maximos experiuntur labores, quare nisi methodo anathomica perquiras, vbi sit morbus in musculis, vel in nervis, nunquam scire poteris locum applicandi remedia, vt merito in scholis receptum sit, vbi agendum desumi à subsistentia indicantis; quare si indicans est in femore, & in anteriori parte ilium, vnde nascitur hic nonus musculus extendens tibiam, & non inueniamus hunc locum affectum, casu & fortuito de localibus ageretur.

Praeterea non solum potest acciderè, vt tibia non possit extendi ob morbum existentem in parte anteriore ilium; verum etiam ob morbum existentem in tertio lumborum foramine; à quo exoritur prima nervorum pedum coniugatio, quae mittit ramulum vestientem nonum hunc musculum, quare si in hac prima coniugatione nervorum erit aliqua angustia, propter quam permeare non possit radij spirituum animalium, necessario sequitur, tibiam non posse extendi, quare quomodo vis Empyricè tunc tibiam tractare vnguentis, balneis, lutis, atque vinaceis; apage hunc malum medendi usum, quoniam primò tempus conteris, secundò laxantibus tuis topicis confrangis vires tibiae, laxando musculos, & tendines insertos; quare si morbus est in lumbis, & symptoma in tibia, localia erunt vertebrae lumborum adiungenda, vel oportebit resolvere, vel derivare collectos humores vstionibus, vel alio ingenio. Methodus verò, qua cognoscere possumus, tibiam non extendi ob morbum circa lumbos existentem colligi potest ex laesione caeterorum musculorum, qui irrigantur eisdem propaginibus suis ab eodem trunco, sicuti est septimus musculus tibiae, qui induitur nervis prodeuntibus à primo nervorum pedum pari; & primus tibiae, qui propter eosdem surculos suum exercet officium, quod est trahere tibiam versus inguen alterius cruris; praeterea nonus iste musculus irrigatur quoque propagine prodeunte à secundo pari, quod oritur à quarta vertebra lumborum; & hoc par mittit ramos ad digitum pollicis ad

partem posterioris ilium. & tibia.

Methodus cognoscendi symptoma tibiae prodire à lumbis.

quintum musculum femoris, cuius usus est femur extendere, & est causa rectæ stationis, mittit quoque ad octauum tibiæ, cuius usus est extendere; quare ex læsis iis omnibus officiis colligere possumus, morbum esse circa lumbos, quamuis symptoma sit in tibia, & optimè sciet hac diuina arte excultus mederi affectibus, qui procul valdè sunt à suis morbis, sicuti tibia distat à lumbis, ut propterea ob hanc nostri corporis sympathiam Empyrici valdè admirentur, videntes aliquando probum anatomicum curare tibiæ læsam remediis positis supranates.

*De sympathia inter tibiæ, & foramina ossis sacri.*

Dum in externo femoris capite est tumor, vel scyrthus aliquis imperfectus, vel aliquis malus habitus, tunc cōsequitur, quod tibia obliquè non possit moueri versus exteriora, errant in hoc Empyrici inungentes tibiæ, quia morbus causans hoc symptoma est in parte externa capitis femoris. Præterea potest esse causa istius symptomatis tibiæ in exortu quarti paris neruorum pedum, quod est omnium crassissimum, exoriturque ab vltimo lumborum foramine, & à tribus sequentibus in osse sacro; quoniam neruus vestiès decimum hunc musculum tibiæ, cuius usus est obliquè tibiæ versus exteriora mouere, oritur ab hoc quarto pari neruorum, quare potest contingere, ut morbus sit in lumbis, & in osse sacro, & inde iste musculus tibiæ explere non possit suum officium. Cognoscemus autem hoc symptoma tibiæ prodire à morbo lumborum, quando omnes illi muscoli, qui ab eodē trunco neruorum recipiunt virtutem animalem erunt læsi, ut sunt primus musculus, tertius, quartus, & quintus tibiæ, & quintus femoris, & tres primi muscoli mouentes pedē, & similiter quartus, & quintus pedem mouentes, & duo illi muscoli, qui flectunt digitos, qui oriuntur à tibia, quorum officia omnia si videris esse læsa, inferre certò poteris morbum esse in capite quarti paris neruorum pedis, id est, circa postremam vertebram lumborum, & circa tria foramina ossis sacri; videas ergo quo pacto Empyrici sæpè errare possunt topicis suis auxiliis.

*Errant, dum inungunt femur, quod in rectam lineam extendi non potest ob morbum existentem in coccyge.*

### C A P. XXXVIII.

*De sympathia inter femur, & os sacrum.*

SI contingit, ut in osse sacro, vel in coccyge sit aliquis pituitosus infarctus, vel in appendice ossis ilium, & propterea femur non possit extendi, tunc non desunt Empyrici qui inungunt statim totum femur nescientes animo concipere in alia parte esse morbum, quam in femore, causa tanti erroris est, quoniam nesciunt, vnde oritur primus femoris musculus ille crassus, & carnosus valdè, qui clunes cōstituit, exoritur enim iste musculus primus femoris à dimidia appendice ossis ilium, ab osse sacro, & à coccyge, & ampla insertionem in maius trochanterium inseritur,



inferitur, eius vsus est, si secundum omnes fibras operatur, in rectam lineam femur extendere, sed si cum superioribus, vel cum decliuioribus tantum fibris operatur, modo in vnum, modo in aliud latus femur ducere poterit, vt ex læsis officiis, quæ pars musculi læsa sit colligere possimus: Quare non par est, dum non extenditur femur, semper confugere ad femur, quia nulla est consequentia, vbi est actio læsa, ibi morbus, cum plerique plures affectus fieri possint in vna parte sana, & ob sympathiam longorum musculorum, & neruorum, causa, & radix affectionis in loco valde distantia habeat radices; sicuti de femore loquentes dicimus contingere posse, vt femur non extendatur ob morbum existentem in osse sacro.

Præterea, quod magis est, potest esse morbus in primo pari neruorum ossis sacri, qui sit causa, cur femur extendi non possit: & ratio est, quia ab hoc neruorum trunco nascuntur propagines petentes primū hunc femoris musculum, quibus læsis in suo exordio, statim musculus in suo officio obeundo deficiat oportet. Methodus verò, quæ nos docere possit, quando ob hanc causam sit læsum femur, est hæc; ab hoc primo neruorum pari oritur hæc propago vestiens primum hunc musculum, & septimum femoris cuius officium est trahere femur sursum fortiter flectendo magis introrsum, quam faciat sextus musculus, & deinde alias mittit propagines ad musculos ventris, quare quando vniformiter septimus musculus femoris, & ventris musculi non poterunt explere sua officia vnā cum primo hoc musculo, de quo loquimur, inferendum erit à primo hoc trunco neruorum ossis sacri læso prodire affectionem, & in osse sacro esse morbum, quamuis symptoma appareat tantum in femore.

Si aliquis non posset femur extendere, & per consequens rectam stationem non posset exercere, tunc adiungere semper topica femori, quasi causa istius læsi officij aliubi non possit insidere, quam in femore, inter Empyricorum errores collocandum hoc esset; quoniam musculus extendens femur non oritur à femore, sed ab osse coxendicis, & à pubis humiliori sede, & insertus est posteriori femoris sedi circa capita ipsius humiliora iuxta genu; quare in hoc musculo omnium musculorum maximo potest esse morbus in osse coxendicis, vnde exoritur, & symptoma in femore; similiter potest esse morbus in parte humiliori ossis pubis, & in femore apparere symptoma hoc, quod videlicet non possit femur extendi, & inde statio recta sit impedita; tunc quando hoc accideret numquid non errarent Empyrici inungentes femur, & genu in quibus licet symptomata videantur, attamen optime sunt constituta genu, & femur.

Amplius potest esse, vt non extendatur femur, & propterea statio recta sit amissa, & morbus sit in secundo pari neruorum pedum, quod nascitur inter tertiam, & quartam vertebam lumborum: quando verò hoc accideret, methodo esset à nobis cognoscendus morbus existens in principio secundi paris neruorum; scientes prius ab hoc secundo pari oriri ramos petentes digitum pollicem octauum, & nonum mu-

*Qua via nascitur femur non potest extendi ob morbum primi paris neruorum ossis sacri.*

*Error est inungere femur, dum non potest extendi ob morbum existentem in osse coxendicis, vel pubis.*

*Vt nascitur sympathia inter femur, lumbos, & os sacrum.*

scelus tibiæ, quare, quando femur non posset extendi, & simul ostendens, & nonus musculus tibiæ essent læsi, quorum officia sunt, extendere tibiæ, dicas supra femur esse morbum recôditum sicuti in lumbis, vnde oritur secundum par, à quo oriuntur isti nerui, illūque esse morbum in angustia, & mox philosophari poteris, quænam species angustia esse possit an compressio vel subsidencia, vel coalescentia, de quibus speciebus in primo libro, & deinde illis methodis traditis inuenies affectum præter naturam. Ad hæc potest quoque accidere. vt femur non possit extendi, & homines non possint rectè stare ob læsionem factam in principio tertij paris neruorum pedis, quod oritur inter quartam, & quintam vertebram, quod par mittit ramos ad hunc quintum, ad septimum, nonum, & decimum musculos femoris, & ad secundum tibiæ, & ad musculos penis, & vesicæ; quare si omnes isti muscoli citati erunt læsi; morbus erit ex necessitate in tertio pari, id est, inter quartam, & quintam vertebram; est enim impossibile, vt quintus musculus femoris sit læsus ob morbum existentem inter quartam, & quintam vertebram, quin eandem læsionem patiantur secundus, nonus, decimus, secundus tibiæ, musculi penis, & vesicæ.

Demum potest esse inter vltimam vertebram, & os sacrum morbus, & inde sequatur, quod femur alioquin sanum non possit extendi ob hanc sympathiam, quia à quarto pari neruorum pedum enascitur ramulus vestiens hunc quintum musculum, valet ergo consequentia læsus est truncus, ergo necessariò læditur ramus: cognoscemus deinde hunc ramum non fungi suo officio ob læsum truncum, quando primus, tertius, quartus, & quintus tibiæ simili modo læsi sunt; quia omnes isti musculi sunt induriti furculis prodeuntibus ab hoc quarto pari. Quare colligas quo pacto ex læsis officiis cognoscere possumus, quādo femur læditur ob morbum existentem inter tertiam, & quartam, quando inter quartam, & quintam, & quando inter vltimam & os sacrum: cognitio enim anatomia tantum potest, vt digito bonus anatomicus sciat ostendere protopathiam. Postremò an-ne posset aliqua humorum colluies detineri inter foramen ossis coxendicis, pubis, & ilium, quæ comprimat neruum trāseuntem per foramen, & inde symptoma appareat in femore? an-ne posset in musculis nono, & decimo, qui in gyrum mouent femur, esse tumor aliquis, qui si comprimeret hunc neruum, motum femoris tolleret? quare concludimus illum Empyricum persapè fallere, & decipere, qui occurrit semper symptomati localibus.

*Errant, dum inungunt femur, quod trahi sursum, & moveri introrsum non potest ob morbum existentem in undecima, vel duodecima vertebra thoracis.*

## CAPUT XXXIX.

*De sympathia inter femur, & vesicam.*

**S**ÆPISIME vidimus in agrotantibus, femora non posse trahi, nec flexi introrsum; quod munus pertinet ad sextum musculum femoris,



moris, qui oritur ab vndecima, & duodecima vertebra thoracis, & à <sup>decimam &</sup> prima, & secunda lumborum, & progrediens per internam ilium par- <sup>duodecimam</sup> tem inferitur in minus trochantirium; quare licet in capite musculi <sup>vertebram</sup> morbus, & radix, cur femur non posset sursum trahi, & flecti intror- <sup>thoracis.</sup> sum; arbitror ego, si femur tractares topicis annis sexcentis, nihil ageres. In læso igitur hoc femoris officio erit perpendendum, an in vndecima, & duodecima vertebra thoracis, vel in prima, vel secunda lumborum sit tumor, vel dispositio scyrrhosa, vel humorum infarctus in parte interna sub vertebra, vnde sumit initium, quia de extrema supra vertebra facile esset cognoscere, cum manibus ipsis tumores, quamvis minimi sint, cognoscantur, est ergo operæpretium perpendere, an sub vndecima, & duodecima vertebra thoracis, vel sub prima, & secunda lumborum, vnde musculus iste trahit originem, possit esse, vel tumor, vel scyrrhosa dispositio, vel infarctus pituitosus, quod per optimè cognosces ex iis, quæ tradita sunt in primo libro capite de locis affectis cognoscendis; quoniam cognito, quod sit in principio musculi tumor, vel scyrrhosa dispositio, cognoscemus illico ex hoc morbo existente in principio huius sexti musculi, in primis deficere usum huius sexti musculi femoris, deinde cum iuxta hunc musculum descendat primum par nervorum pedum, sequitur necessariò, ut iste musculus sextus tumidus factus in exordio, vel paulò infra comprimat primum par nervorum, & ob angustiam ab ipso facultas animalis non mittatur ad primum, septimum, & nonum musculos utriusque tibiæ, sicuti contigit cuidam præclarissimo viro, qui amisit motum femoris, & tibiæ ob hanc scyrrhosam dispositionem in lumborum vertebra circa exordium sexti musculi existentem, quam conieci non solum ex pondere, quod in illa parte sentiebat, verum etiam, quia retulit ictum ex casu in dorso recepisse: hic tamen patiens in primis à nonnullis medicis dogmaticis fuit lacessitus, qui credebant caput fuisse originem amissarum functionum musculorum femoris, & tibiæ; & deinde ab Empyricis, qui tibiæ inunctionibus, & aliis topicis fortissimis tractarunt, vnde læsiones variæ secutæ sunt, quoniam vires tibiæ alioquin optimæ constitutionis potentissimis oleis, & laxantibus aliis topicis adeò fuerunt contrafactæ, ut ex illis amissis functionibus aliæ læsiones succreuerint; quare ne decipiamur in cognitione partis principaliter affectæ, debemus prius ortum, progressum, & figuras omnium partium corporis ante oculos obicere, & deinde ex sufficienti par. enumeratione, virtute tamen methodorum traditarum in primo libro invenire affectus, & deinde separare affectum per consensum ab affectu per essentiam, & in affectibus per essentiam distinguere idiopathiam, à protopathia, alioquin non video quo pacto reconditas ægritudines unquam possimus perfectè cognoscere, quinimo sine hac arte anatomica numquam possemus credere morbum esse circa lumbos, & os sacrum, & symptoma illius esse in tibia, quòd tamen facile esse potest, quia dum sextus musculus femoris comprimit primum par nervorum pedis, omnes musculi, qui sunt irrigati illis surculis, qui prodeunt

*Ve ager quidam ladiatur  
tum à dogmaticis, sū  
ab Empyricis.*

ab hoc primo pari neruorum pedis, sua officia explere non poterunt, & hæc anatomicus sine vlla admiratione admitter.

*Methodus  
cognoscendi  
quædo femo-  
ris symptoma  
oritur ob  
morbū exi-  
stentem circa  
primam ver-  
tebram lum-  
borum.*

*De sym-  
pathia inter pe-  
dus, brachia,  
femur, ven-  
tram, & pri-  
mam verte-  
bram lum-  
borum.*

Præterea potest contingere, vt femur non possit inflecti, & intror-  
sum trahi propter angustiam existentem in exordio primi paris neruo-  
rum lumborum, quia ab hoc pari exoritur ramus, qui fertur per inte-  
riora, & irrigat sextum musculum femoris, quo læso, femur non potest  
flecti, & sursum attrahi introrsum, quare si huius læsionis femoris ra-  
dix est circa primam vertebra lumborum, quo pacto per topica ad-  
iuncta femori poterimus huius symptomatis euellere radicem. Me-  
thodus, quæ nos certò docebit, quando in hoc particulari surculo in-  
terno est morbus, qui causat symptoma in femore, desumi debet ab  
anatomia, & est, quia ab eodem neruo mittuntur ramuli ad ventris  
musculos, & ad quartum brachij, & alij mittuntur ad nonum muscu-  
lum dorsi, quare, si circa primam vertebra lumborum in capite ner-  
ui interni primi paris erit hic morbus causans symptoma in femore ex  
necessitate officia horum musculorum debent esse læsa, & ex læsis of-  
ficiis musculorum ventris, quarti brachij, & noni dorsi, de quibus of-  
ficiis superius actum est, ducimur in cognitionem morbi ramuli in-  
terni prodeuntis à primo pari neruorum pedis, quod exoritur à prima  
vertebra lumborū; videas ergo, quot sunt in hoc nostro corpore sym-  
pathiæ, & consensus; cum læso ramulo interno primi paris neruorum  
pedis, symptomata appareant in brachio ob quartum musculum bra-  
chij, in femore ob sextum femoris, & in nono dorsi musculo qui per-  
tinet ad quintum par, quorum musculorum ministerio lumbi flectun-  
tur versus anteriora: præterea, si esset morbus in exordio primi paris,  
tunc non solum ramulus iste interior, de quo diximus iam, verum etiā  
exterior eandem passionem consentiret, quo læso symptomata obser-  
uari possunt in partibus remotissimis; quoniam exterior ramus huius  
primi paris mittit surculos ad quartum musculum thoracis ad vndeci-  
mum, & decimum tertium dorsi; interior, vt diximus ad sextum femo-  
ris, & ad quartum thoracis, quare ratione quarti musculi thoracis, cu-  
ius vsus est cōstringere posteriora thoracis, & expirationi aliquid opis  
afferre, potest esse morbus in prima vertebra lumborum, vnde oritur  
primum par neruorum pedis, & eius symptoma apparere in pectore;  
ratione verò musculorū dorsi dorsum malè agere suas partes, ratione  
verò quarti musculi brachij, qui oritur ab osse sacro, & lumbis bra-  
chium in suis muneribus deficere, ratione demum sexti musculi femo-  
ris femur esse læsum; quare ob morbum lumborum brachia, pedes, &  
dorsum pari possunt; tunc vellem videre Empyricum adiungentem  
topica femori optima constitutione donato, adiungentem brachio, &  
dorso, vbi nulla per se est mala valetudo, nisi per sympathiam; videas  
ergo quam mirabilis seruetur sympathia in hoc corpore cum in vnico  
puncto esse possit morbus, veluti obseruatur esse circa primam verte-  
bram, & symptomata huius morbi in brachio, in femore, & in pectore  
apparere; quare nisi anatomiam omnium partium corporis in omni  
læsa actione perpendamus, est prorsus impossibile nos posse rectè me-  
deri.



Præterea hic sextus musculus femoris potest lædi per consensum vicinitatis in suo exordio, veluti ob tumorem lumborum, vel ob ictū circa vndecimam, & duodecimam vertebam thoracis, vnde oritur; potest enim contingere, vt sextus iste musculus quamuis in parte sit interna, comprimatur ob tumorem aliorum musculorum, & symptoma in femore appareat; cognoscemus autem quem musculum tumor, vel ictus principaliter lædat ex officio magis, & primo loco læso, per hypotheseum, post casum è vehiculo ictus factus est in lumbis, tūc dolent lumbi, dorsum, femur, & brachia, si vis scire quis musculus principaliter læsus sit, confideres, quæ officia magis læsa sint, si erit officium extendendi dorsum totum in rectum magis læsum, inferas ex anatomia (sine qua, vt sæpè diximus, est impossibile mederi) sextum par musculorum dorsi esse principaliter læsum, cuius munus est extendere totum dorsum in rectum, ergo si hic est principaliter læsus, poterunt esse læsiones in exordio, & in progressu, exordium eius est in infima ossis sacri parte, & in interna parte ilium, progressus est in toto dorso, cum ab infimis his partibus vsque ad primam thoracis vertebam se extendat. Si verò inter officia læsa ob ictum, officium constringendi posteriora thoracis esset magis læsum, quod cognosceretur ex læza respiratione; quoniam officium istius musculi est respirationi conferre, vt superius declarauimus, confugeremus ad iniria, & progressus istius musculi, & manibus propriis inueniremus locum principaliter læsum; similiter si post ictum in lumbis inter cætera officia læsa apparet hoc, quod brachium trahi deorsum non posset, illico possemus certo inferre, quartum musculum brachij esse læsum, quia oritur ab osse sacro, & à lumbis, & ex hac cognitione principalem affectum cognoscemus, & remedia localia rectissime administrabimus.

Ad hæc potest quoque hoc accidere per consensum quarti musculi brachij, quatenus sub axillis, vbi inseritur, sit tumor contrahens, & extendens quartum musculum brachij, quippe qui deinde ob contractionem, premeret super neruum missum texto musculo femoris, & inde femur ob tumorem existentem sub axillis non posset flecti, & introsum sursum trahi; ecce quam mirabilis sympathia observatur in hoc nostro corpore, vt morbus sit sub axillis, & femur per illam sympathiam quoque ægrotet: non desunt quoque aliæ sympathiæ, quæ quotidie observantur in ægrotantibus, has autem volui proponere contra Empyricos, ne in posterum aliqui ita sint faciles ad credendum, quodd symptomata solum essent curanda.

*Vt morbus possit esse sub axillis, eius verò symptoma in femore.*

*Dum pedem, & calcem inungunt, quando internum caput femoris esset inungendum.*

C A P. XL.

**V**S v venire solet, vt patiens aliquando non possit tollere calcem digitis terram premendo ob lætos musculos in exordio, quod est

in interno femoris capite, nihilominus Empyrici nesciūt alium locum in hoc casu inungere, & topicis tractare, quā calcem, & pedem, nesciētes ad quos musculos pertineat hoc officium: scias ergo hoc officium tollendi calcem expleri præcipuē à tribus musculis, à primo nimirum secundo, & quarto pedis, quod experimentum anatomix manifestissimum est: scias præterea primum, & secundum musculos pedis, qui videntur vnus musculus, habere principium ab interno femoris capite retro iuxta genu, & deinde progredientes deorsum constituere suræ partem, & deinde cum tendine omnium robustissimo quarti musculi vniri, & fieri vnicum tendinem, qui in posteriorem calcem inseritur, quare, si morbus erit in capite illo interno femoris in origine musculi, vel in itinere in sura videlicet, vel paulò infra, volueris ne inungere calcem, vt solent nebulones isti Empyrici chirurgi. Præterea an-ne sæpè vidimus sub genu homines vulnerari, & abscindi origines horū duorum musculorum, & deinde vsum, & officium trahendi calcem sursum, & extendendi pedem digitos in terram figendo amitti? quomodo inunctionibus adiunctis calci aliquid boni facies? si aliquid esset molliendum oporteret sanè confugere ad locum affectum, & nequaquam ad symptoma: similiter, si de quarto musculo loquimur, qui maior est tibix, qui quæ oritur sub appendice fibulæ à posteriori parte, & factus carnosus tibix, & fibulæ adhæret, & deinde cum tendinibus primi, & secundi descendens desinit in validissimum illum tendinem, qui inseritur in calcaneum, quo tendine vidimus lanios suspendere in macello integra animalia, tunc, si vnde exoritur sub appendice fibulæ, vulneratur, vel transuersim exciduntur fibræ, sursum non poterit ille calcem trahere, similiter si tendo, vel origo musculi quarti sit scyrrhosa dispositione, vel infarctu pituitoso impedita, non poterit calx sursum trahi, quomodo ergo in simili casu localia applicabis calci, si morbus est aliubi?

*De sympto-  
thia inter  
appendicem  
fibulæ, & cal-  
canem.*

*De sympto-  
thia inter  
calcaneum,  
& quartam  
vertebram  
lumborum.*

Præterea, cum isti tres musculi sint contexti neruis enascentibus, à quarto pari neruorum pedum, quod potest contingere, vt calcaneus tolli non possit, & morbus non in calcaneo sit, sed circa vltimam lumborum vertebram, vnde nascitur quartum par neruorū pedum, quorum surculi sunt illi, qui dant motum calcaneis: quid magis quam hoc exemplum posset confundere Empyricos illos, qui anatomiam humani corporis despiciere solent, quam videre in calce apparere malam valetudinem, & illam alio modo, non posse curari, quam topicis adiungendis vltimæ lumborum vertebræ, & ossi sacro. Methodus verò cognoscendi, quando calx læditur ob morbum existentem in osse sacro, & lumbis, est, quoniam deficiet quoque in suis muneribus obeundis omnes illi musculi, qui facultatē motricem recipiunt ab hoc quarto pari neruorum pedum, vt sunt musculus primus, tertius, quartus, quintus tibix, & quintus femoris, & quintus pedis, & illi musculi, qui flectunt digitos, vt sit necessaria consequentia hæc, deficit calx in hoc munere se tollendi, & cæteri simul enarrati musculi, ergo morbus cau-  
sans hoc symptoma erit in quarto pari neruorum videlicet in origine, prodeunte à lumbis, & ab osse sacro.



*Errant, dum semper calcaneum inungunt, quando versus anteriora in obliquum non potest moveri, cum modo in femore, modo in osse sacro possit esse morbus.*

C A P. X L I.

**E**RRANT Empyrici, dum quis non potest mouere calcaneum in obliquum versus anteriora, inungendo calcaneum, quia hoc officium mouendi calcaneum obliquè versus anteriora pertinet ad tertium musculum pedis, qui oritur ab externo capite femoris, quare potest contingere, ut in femore sit impedimentum, & motio sit ablata in calce: præterea musculus iste recipit facultatem animalem à quarto pari neruorum pedum, quare potest accidere, ut causa symptomatis calcis sit in exordio quarti paris neruorum, quod est in extrema lumborum vertebra, & in osse sacro: oritur enim hoc quantum par ab extrema lumborum, & à tribus sequentibus ossis sacri, ut præterea sit crassissimus, & robustissimus omnium iste truncus: cognoscemus deinde, ut in superiori capite diximus, quando ob hanc causam existētem in origine quarti paris neruorum calx non moueatur, quia eodem modo, læso principio, cæteri muscoli irrigati iisdem surculis amittent sua officia, ut primus tibiæ, cuius usus est trahere tibiā versus inguen alterius, ut tertius tibiæ, cuius usus est tibiā flectere introsum, ut quartus, & quintus, quorum usus est flectere tibiā in rectum, & cū iis læsis officiis digiti quoque non poterunt flecti; tunc ex omnibus iis officiis læsis, si videbimus calcem non moueri, firmiter inferre poterimus, morbum esse posse in lumbis, & osse sacro, vnde oritur quantum par, & topica iis superioribus partibus applicabimus.

Similiter errant, dum inungunt calcem, quādo aliquis pedem versus interiora trahere non potest, quoniam manus trahēdi pedem versus interiora, & sursum tollere calcem pertinet præcæteris ad quintum musculum pedis, cuius musculi initium, & origo trahitur à tibia & fibula, & deinde descendit carnosus vsque ad extremam tibiā, & propè internum malleolum definit in robustum tendinem, & excurrit sub interno malleolo, & sub osse naviculari, & demum sub planta pedis in rarti os implantatur. Quid ergo vis tarsum inungere, si circa tibiā, & fibulam esset huius symptomatis radix? quare cognito huius musculi exordio, & progressu, est examen faciendum, an in origine, vel progressu, vel in fine sit morbus, quæ ex præcedentibus, & consequētibz signis cognoscuntur, & aliquando manibus propriis inueniuntur causæ horum symptomatum. Præterea potest contingere, ut dictum officium amittatur ob neruorum læsiones in origine, quas læsiones ex officiis cæterorum musculorum, qui eandem facultatem ab eodem stipite recipiunt facillè cognoscere poterimus, quibus cognitis non semper topica erunt applicanda tarso, ut faciunt Empyrici, sed ossi sacro, & lumbis.

*De cognitiōe sympathia, qua est inter calcem, & externum caput femoris, & os sacrum.*

*De sympathia calcis cum tibia & fibula.*

*Errant, extremos digitos pedis topicis tractare, dum non possunt extolli versus genua, calcem premendo ob morbum existentem in tibia.*

## CAPVT XLII.

*De Symptoma inter digitos & tibia.*

QUATVOR obseruantur muscoli, qui extendunt digitos pedis versus genua calcem in tertam premendo, quorum quatuor musculorum primus est musculus sextus pedis, qui oritur ab anteriori parte tibiæ, quâ illi fibula superius coarticulatur, & incedit per superiorem tarsum, & inseritur ossi illi, quo pollex fulcitur, & est ille musculus adeo euidens sub pelle versus pollicem, cuius vsus est, flectere illam partem extendendo versus genua, vt diximus; quare potest esse morbus in anteriori parte tibiæ, cuius symptoma appareat tantum in pollice. Secundus musculus digitorum, qui septimus pedis est, à fibula exoritur, & latum tibiæ externum occupat, & inseritur ossi suffulcienti pollicem. Tertius, qui octauus pedis dicitur, oritur à mediâ fibula, & implantatur radici ossis pedis paruum digitum sustinentis. Quartus, qui nonus pedis dicitur, est pars musculi mouentis quatuor digitos, & inseritur in medium ferè longitudinis ossis pedis ante paruum digitum positi, & isti omnes simul operantes extendunt, & flectunt versus genua extremam partem, vbi digiti fundantur, & horum musculorum beneficio sunt laterales motus, prout singuli magis in vna, quam in altera parte locati sunt, vt omnes simul operantes rectam flexionem, & extensionem digitorum faciant, si seorsum vnicus musculus operetur, vnâ motionem facit, verbi causa si sextus musculus pedis solus operatur, iste trahet pollicem, si septimus, vel octauus minimum digitum, si nonus rectam motionem quatuor digitorum; quare ex officiis his læsis cognoscimus musculum læsum, cognito musculo læso, cognoscimus, an morbus tollens flexionem hanc digitis sit in tibia, vnde oritur, vel sit in progressu musculi, vel in digitis ipsis, in quos inseritur, quia facilè potest cōtingere, vt in anteriori parti tibiæ ob vulnus perperam sanatum, vel quia excisæ essent fibræ transuersim, vel propter alias causas sit morbus, qui tollat flexionem, & extensionem illam versus genua pollici; ecce igitur, quod morbus esse potest in parte valdè remota, vt in anteriori parte tibiæ, & eius symptoma in pollice alioquin sano; quare Empyrici hanc nostri corporis fabricam, & harmoniam nescientes in sexcenta errata cadere possunt; præterea potest accidere, vt in fibula, vnde exoritur septimus musculus sit morbus, & eius symptoma appareat in pollice, tunc, si Empyricus suis localibus occurreret pollici, erraret valdè; quia esset occurrendum fibulæ, vnde oritur musculus qui valdè distat à pollice; similiter de octauo musculo est dicendū, qui exoritur à mediâ fibula, in qua, vel ictus, vel scyrthosa dispositio, vel similes affectus possent impedire, vt ille muscu-

*De Symptoma inter fibulam, & digitum pollicem.*

*De Symptoma inter mediam fibulam, & minimum digitum.*



musculus octauus non posset extendere minimum digitum; quare nisi origines musculorum, & progressum adiscamus, & me moriate-  
neamus, non video, quomodo diuinare aliquando possimus locum  
affectum.

Postremò musculi isti sextus, septimus, octauus, & nonus pedis, qui  
sunt illi quatuor, qui extendunt extremos digitos pedis possunt amit-  
tere sua officia ob morbum existentem in lumbis, & osse sacro adeò vt  
symptoma istius morbi re vera distare possit duorum cubitorum tra-  
ctu, & ultra à morbo; scias ergo hos quatuor musculos esse indutos  
furculis nerveis missis à ramo exteriori prodeunte à quarto pari ner-  
uorum pedis, quod oritur ab vltima vertebra lumborum, & à tribus  
sequentibus ossis sacri, & est illud neruorum par crassissimū, & omniū  
validissimum missum vtrobiq; ad pedes; quare, si in lumbis erit mor-  
bus, & symptoma videatur in digitis, vis tu localia apponere digitis  
quod si facies, quando curaberis patientem? expedit igitur morbum  
auferre, qui est causa quoniam effectus solum tollitur ablata causa, &  
quando causa est in lumbis, & in osse sacro, vnde enascitur iste trun-  
cus, ibi sunt topica adiungēda, & nequaquam vbi est symptoma. Me-  
thodus, quæ nos docere poterit, quando digiti pedis non poterunt ex-  
tendi ob morbum existentē in lumbis, & osse sacro, vnde oritur quar-  
tum par neruorum pedis, est, quoniam omnes musculi, qui sunt exor-  
nati illis furculis prodeuntibus à quarto pari neruorum pedum, erunt  
læsi, musculi verò, qui sunt induti iis furculis nerveis sunt primus, ter-  
tius, quartus, quintus tibiæ, & quintus femoris, & tres primi, qui mo-  
uent pedem, de quorum officiis superius egimus; quare ex læsis illis  
omnibus officiis colligere poterimus necessariò morbum esse in trun-  
co, in quarto videlicet pari neruorum pedum; & symptomata in digi-  
tis pedum, quæ non raro accidunt, quinimo pluries vidimus truncos  
neruorum pedum in origine lædi, & symptomata solum apparere in  
pede, & digitis; causæ enim quæ possunt capita neruorum occupare  
sunt scyrthosæ dispositiones, infarctus pituitosi, ictus, & alia id genus;  
videas ergo quænam distantia aliquando obseruantur inter morbum,  
& eius symptomata, vt Empyrici adduci non possint, vt credant, sym-  
ptomata esse in vno loco, & morbum in alio loco tam remoto.

*Methodus  
quæ cognosci-  
mus digitos  
pedis non ex-  
tendi ob mor-  
bum existen-  
tem in quar-  
to pari ner-  
uorum pedis.*

*Dum topicis tractant digitos pedis, quando tertium internodium  
quatuor digitorum, & secundum pollicis flecti non possunt  
ob morbum existentem sub genu.*

CAPVT XLIII.

**P**OTEST accidere, vt sub genu, vnde oriuntur secundus, & tertius  
musculus digitorum pedis, sit morbus, eius verò symptoma appa-  
reat in digitis pedum: quoniam, si de secundo musculo loquimur, cum  
ex omnium consensu, tum experientia ipsa patet, oriri à parte poste-

*De sympa-  
thia inter ti-  
biam & ter-  
tia internod-  
ia quatuor  
digitorum,  
& secundum  
pollicem.*

riori tibiæ iuxta genu, & deinde miſſum in plantam per partem poſtēriorem in quatuor ceſſare tendines, qui demum inferuntur tertiis internodiis quatuor digitorum perforantes primi muſculi tendines, perinde ac ſit in muſculis digitorum manus: quare facilè poteſt contingere, vt morbus aliquis ſit iuxta genu, vel in itinere, antequam inferatur in digitos, & ſymptoma hoc, quod videlicet tertia internodia non poſſint flekti, appareat in digitis. Similiter, ſi de tertio muſculo digitorum loquimur, eadem euenire poſſunt; quia hic muſculus tertius oritur à nexu fibulæ cum tibia iuxta genu, & quando eſt in planta, de generat in tendinem, qui exigua quadam portione implatur tertio internodio indicis, & medij, & demum reliquus torus tendo in ſecundum os pollicis inferitur, & auctor euadit illius flexionis, quare valebit conſequentia, quando tertia internodia quatuor digitorum, & ſimul ſecundum pollicis internodium non poterunt flekti, morbum eſſe in ſecundo, & tertio muſculo digitorum pedis, ergo hic morbus poſſet eſſe in planta, & in origine ſub genu, veluti ſi exciſæ eſſent fibræ ob vulnus, vel collectus eſſet aliquis humor, vt in illis, qui gonagram pati ſolent, qui humor tolleretur virtutem huic ſecundo, & tertio muſculis digitorum, in quo caſu topica non digitis læſis per conſenſum, ſed ſub genu eſſent applicanda.

Si verò ſecunda internodia non poſſent flekti, id pertineret ad primum muſculum, de quo nil dicimus, quia eſt brevis, & in eandem partem inferitur, à qua oritur; noſtrum enim in præſentia eſt tractare de ſympathia, quæ obſeruari poteſt in longis muſculis, quia in iſtis Empyrici decipiuntur, in quibus ſæpè morbus à ſuo ſymptomate cubiti tractu, & ultra diſtare poteſt.

Amplius poteſt accidere, vt morbus inſideat in quattro pari neruorum pedis circa os ſacrum, vnde oritur, & ſymptoma appareat in dictis internodiis, quod videlicet digiti non poſſint flekti, quia iſti muſculi ſunt neruis prodeuntibus à quarto pari irrigati: cognoscemus deinde digitos nō poſſe flekti ob morbum in origine quarti paris exiſtentem, quando cæteri muſculi, qui ſunt induri iſdem ramis à quarto pari prodeuntibus, erunt læſi, de quibus non vno in loco in ſuperioribus capitibus verba fecimus, vt non ſit, quod tam ſæpè plurima reperamus.

*Errant dum  
digiti non  
poſſunt ex-  
tendi ob mor-  
bum exiſten-  
tem in tibia.*

Præterea in parte anteriori tibiæ ſub genu, vbi fibula coarticulatur tibiæ ſub ſexto muſculo pedis poteſt eſſe morbus, qui tollat extenſionem quatuor digitorum, pollice excepto; quoniam à parte illa anteriori tibiæ ſub genu exoritur decimusquartus muſculus, cuius officiū eſt digitos illos quatuor extendere, tunc Empyricus, ſi digiti propter morbum exiſtentem in exordio iſtius muſculi non poſſent extendi, digitos ſolis tractaret localibus.

Præterea non ſolum digiti non poſſunt extendi ob morbum exiſtentem in tibia, verum etiā poteſt contingere, vt in oſſe ſacro ſit morbus, & digiti alioquin ſani non poſſint extendi, & ratio eſt, quia iſte decimusquartus muſculus extendens digitos eſt circumueſtitus ner-  
ueis.



ueis propaginibus prodeuntibus à quarto pari neruorum , quod oritur ab osse sacro, vt valere possit hæc consequentia, est morbus in quarto pari circa os sacrum, ergo digiti non possunt extendi , & vice versa, digiti non possunt extendi , ergo morbus, qui est causa , potest esse in osse sacro: modus verò cognoscendi , quando digiti non poterunt extendi ob morbum huius quarti paris neruorum ; scias quod non poterunt quoque fungi suis officiis cæteri muscoli , qui sunt irrigati iisdem neruis prodeuntibus ab hoc quarto trunco, quemadmodum sunt musculi sextus, septimus, & octauus pedis, qui recipiunt neruos, antequam decimusquartus musculus irrigetur; quare ex læsis iis officiis in cognitionem protopathiæ peruenies.

Demum potest contingere, vt pollex non posset extendi ob læsum decimumquintum musculum , cuius munus est pollicem extendere; oritur enim hic musculus ab anteriori parte tibiæ , vnde oritur membrana iungens tibiæ cum fibula, & deinde inseritur pollici vnuerfo, gratia extendendi ipsum secundum rectam lineam, quare, si morbus erit in exordio istius musculi , nihil opis præstare poteris inungendo digitum pollicem, in quo nulla est mala constitutio, vel morbus, quamuis symptoma in ipso appareat: postremo potest esse morbus & causa in quarto trunco neruorum pedis, eius verò symptoma quoque appareat in digito, & sit, quod non potest extendi, quod cognosci poterit ex læsis officiis aliorum musculorum , qui irrigantur iisdem surculis prodeuntibus à quarto neruorum pari, de quibusegimus superius.

Colligas ex traditis in hoc 2. libro , quando omnium affectuum ideæ partibus corporis nostri per essentiam , & quando per consensum competant ; quia in limine libri diuissimus idiopathias seu proprios affectus in affectus per essentiam tantum , & in affectus per essentiam , & per consensum simul: deinde in capite tertio methodum proposuimus , cuius virtute duci possumus ad cognitionem affectuum propriorum principalium , & per consensum; sed quoniam in viuentibus corporibus triplex à Galeno obseruatur sympathia vicinitatis nimirum , operis familiaritatis , & generis , erat operæpretium , vt in hoc 2. libro non vniuersaliter, & in abstracto , sed distinctè , & secundum stylum anatomix ( quæ sola tantum fructum parere poterat ) sympathias perpenderem, ideò prius de sympathiis vicinitatis, & operis familiaritatis egimus, & errata nonnulla Empyricorum in tractandis his duabus sympathiis reiecit: Demum cum artificiosissimè obseruentur sympathiæ in nervis, & musculis longis, vt sæpè in exordio neruorum, vel musculorum sit morbus , eius verò symptoma appareat tantum in fine , & in locis valdè remotis , & præcipuè in partibus in quas inferuntur, ideò egimus de omni sympathia generis præter naturam , quæ contingere potest in musculis , & neruis longis; diuissimus enim musculos breues, quoniam in iis , vbi est morbus , ibi est symptoma , ideò in breuib. Empyricus errare non potest; propterea incepimus à musculis longis labiorum , maxillæ , ceruicis , dorsi , & aliarum cor-

*De sympathia inter pollicem, tibiæ, & os sacrum.*

*Epilogus.*

poris partium, & tandem peruenimus vsque ad musculos digitorum manuum, & pedum, in quibus omnibus ostendimus quando, & quomodo potest esse morbus in vno loco, & in alio remotissimo eius symptoma apparere possit, & tales methodos pro cognoscendis morbis musculorum, & neruorum longorum tradidimus, vt adduci non possum, quin medici iis exculi methodis tale consequantur beneficium, vt perfectè cognoscant sympathias, & amplius in hac re nullo modo in errores labantur; quemadmodum errare solent illi, qui insequuntur communes illas sententias, quæ sunt, vbi dolor, ibi morbus, & vbi est actio laesa, ibi sit mala constitutio, vel quod idem est, vbi est symptoma, ibi sit morbus; cum aliquando contingere possit non esse morbum, vbi est dolor; vel non esse malam constitutionem, vbi est actio laesa, vel quod in idem fermè recidit, non esse morbum, vbi est symptoma.

## Finis Secundi Libri.

S A N.





# SANCTORII

## SANCTORII

Iustinopolitani

### METHODI VITANDORVM

*errorum in specificis Morborum, & Symptomatum Ideis perquirendis.*

#### LIBER TERTIVS.

*Quod specifica affectuum differentia exoriantur à decem differentiis partium nostri corporis.*

#### CAPVT I.



**I**N primo libro tales methodos declarauimus pro inueniendis affectuum omnium ideis genericis, vt ne tudiores quidem, modo illas caleant, credam in laqueos, ac lytes cadere posse: in secundo quando affectiones per se, & quādo per sympathiam lacerent corporis nostri partes, & quomodo sit perquirenda protopathia variis, & accommodatissimis exemplis docuimus. Nunc conferendus est animus ad cognoscendas specificas, & vltimas affectuum præter naturam differentias; quoniam ad specificas, & non genericas differentias in tradendis indicationibus oculorum acies est dirigenda: supponatur ergo, atque recipiatur alibi quoque iactum fundamentum, quod nullo alio modo cognosci possint vltimæ affectuum differentia, nisi genericas affectuum formas illas cognitās in primo libro adiungendo, & applicando huic, vel illi

*Exemplis  
ostenditur  
quomodo sint  
specifici affe-  
ctus.*

corporis nostri particulæ, sicuti, quando volumus doloris specificam differentiam assequi, eam colligimus à partium corporis quibusdam differentiis, & conditionibus, quæ coarctare possunt dolorem ad aliquod esse specificum, per hypothesein, dolor; ut dolor est affectus communis, & genericus, si tamen in membrana considerabitur, fiet punctitius, si in carne, laceratius; si in arteriis, pulsatiuus; si in nervis, conuulsius; si in periostiis, frangitiuus; si in viscere exigui sensus particeps, grauatiuus; ecce, quod varietas partium specificum reddit affectum. Ad eundem modum vlcus in variis locis seu partibus corporis consideratum varias specificas differentias affectuum constituere potest; quoniam vlcus sub genu esse potest cauterium salubre; in pulmone verò illudmet vlcus est phthisis; & sic de aliis specificis affectibus, ut paulò inferius aliis plerisque exemplis ostendemus.

*ut probatur  
cum Aristo-  
tele. affectus  
specifici fieri  
à differentiis  
part. corporis.*

Propterea volentes nos cognoscere specificas affectuum formas, alium modum præstantiorem non potuimus inuenire, quàm diligenti examine constitutiones variarum partium nostri corporis secundum quolibet earum differentias contemplari; quia specifica cognitio tota à varia partium conditione, tamquam à proprio subiecto suum verum trahit initium, quod diuinis Arist. & Galeni monumentis mirum in modum consentire videtur; numquam enim Aristoteles voluit affectum, vel accidens proprium posse alio modo cognosci, & definiri, quam per subiectum proprium, ut propterea voluerit propriissimas affectiones per sua subiecta cognosci, & definiri tanta est relatio, & nexus inter affectum, & locum affectum, ut hinc Diuinus Philosophus affectus omnes proprios collocauerit in secundo modo dicendi per se, vbi prædicatum debet definiri per subiectum, & subiectum debet esse essentia, quæ constituat totum esse, & quod quid est prædicati, & tandem tradiderit vniuersalem illam propositionem infallibilem, quòd accidentis esse sit inhærere subiecto; similiter nos volentes ideas specificas affectuum præter naturam inuenire, oportebat, ut eas declararemus, & definiremus per partes aptas, ut afficeretur, quæ sunt propria subiecta affectuum, & quæ sola secundum varias considerationes, & aptitudines possunt definire proprios affectus. Hinc Galenus iisdem principiis commotus videns, neminem assequi posse affectum specificum sine cognitione partium internarum corporis, quæ sunt subiecta affectuum; idcirco tum in libro de usu partium, tum aliis in locis summam adhibuit diligentiam in contemplatione omnium partium corporis; quoniam earum varietates varios affectus præter naturam generant, hinc, prout variantur partes in similari substantia, generantur discrasia, quatenus verò variantur in secundis qualitatibus (quæ secundæ qualitates apud Galenum primo de fac. naturalibus sexto quindecim enumerantur, suntque raritas, densitas, grauitas, læuitas, crassities, tenuitas, mollietates, durities, friabilitas, lentor, asperitas, leuitas, colores, odores, & saporés) malè compositiones exoriuntur, quatenus verò partes corporis nostri variantur in magnitudine, quantitate, numero, & figura, oriuntur quoque affectus pertinentes ad

*Quindecim  
à Galeno  
enumerari  
qualitates  
secundæ.*



ad conformationem, adeò vt quælibet partium varietas varium aliquem affectum faciat, & quilibet affectus factus supponat in partibus mutationem, vt hinc Galenus in ar. med. cap. octauo volens affectum saluberrimum declarare, signa desumpserit nō ab affectu in communi, sed ab optima cōstitutione partium tam similarium, quam dissimilarium, quoniam bonus, vel malus affectus à varietate partium oritur, hinc si variat̃ur similes, & proportionem quatuor qualitatum amittant, fiunt intemperantiæ, si dissimiles, plurimi alij affectus fieri possunt; quare colligimus ex Galeni sententia, solum ex partium nostri corporis constitutione affectus tam naturales, quam præter naturam fieri posse.

Hinc Curtius diligentissimus interpret Galeni omnia signa affectuum volens colligere à partibus ipsis tamquam à propriis subiectis, ad quatuor satis accommodatos fontes, vnde haurienda essent signa distincta, & specifica affectuum reduxit, vt primus fons contineret omnia illa signa, quæ desumi possunt à propria substantia similiari, intelligendo per propriam substantiam commensurationem, vel concentum, & symetriad quatuor qualitatum. Secundus fons amplexaretur, quæ necessariò consequuntur, vt sunt secundæ qualitates, quæ proportionem primarum sequuntur, & sunt illæ quindecim à Galeno relatæ, vt diximus. Tertius fons illa contineret signa, quæ ab iis, quæ accidunt desumi possunt, vt à quantitate, magnitudine, numero, & figura. Quartus ea, quæ desumuntur ab operationibus vitalibus, naturalibus, & animalibus; ad quos fontes vniuersa affectuum signa, quæ re vera desumuntur (vt diximus) à partibus similaribus, & dissimilaribus pro declaratione affectuum præter naturam reducuntur; quia alio modo non poterant affectus declarari, nisi per illa principia, quæ affectus constituunt, & hæc sunt partes corporis, quæ, prout variis modis constitutæ sunt, varios affectus gignunt.

Cæterum, si volumus expeditius, & distinctius affectus específicos cognoscere per signa variarum constitutionum partium corporis, hæc Galeni, & Curtij methodo alioquin vera, & artificiosa aliquantulum laborabimus, quia methodus hæc per quatuor fontes incedens potius post cognitos específicos affectus incipit videri artificiosa, quam ante cognitionem, idcirco optimum foret, si methodum non tamen ab hac distinctam perquirerem, quæ traderet nobis faciliorem modum cognoscendi específicas differentias affectuum, & quæ doceret omnes condiciones, & constitutiones partium corporis, quæ solum nos possunt promptè docere affectus, & affectuum remedia, quod bellissimè fiet, si totam hanc philosophiam ab anatomia hauriemus, vnde poterimus colligere omnes differentias específicas partium nostri corporis, quæ constituunt varios affectus, & ipsos específicos reddunt, quæ específicas differentias ad decem capita reducuntur adeò distinctè, & perspicuè, vt ab omnibus possint cognosci, & ad ipsas omnes conceptus, qui de partibus fiunt, commodè reduci possunt, quæ sunt *Meatus, Figura, Situs, Compositio, Exordium, Substantia, Temperatura, Nume-*

*Omnia signa affectuum ex Galeno. Et Curtius reduci ad quatuor fontes.*

*Quæ sint decem differentia partium corporis quæ dant esse específicos affectus omnibus.*

rus, Progressus, & Officium parium, à qualibet enim harum decem differentiarum secundum magis & minus variarum specifici emergunt affectus.

Quare, si de dolore loquimur, erit necessarium pungitium dolorem esse in membrana propter aliquā ex iis decem differentiis, quinimo arguimur potest ex sufficienti partium enumeratione dicendo, si dolor est in membrana, ergo erit pungitius vel ob situm membranae, vel figuram, vel meatum, vel ob eius compositionem, vel ob membranae temperaturam, vel ob substantiam, vel ob magnitudinem, vel ob progreſſum vasorum, vel officium membranae laesum: dicas deinde non ob situm, cum ubique membrana puncturis laceretur, & cum in eodem situ aliae quoque partes corporis praeter membranas collocatae sint, quae pungitium dolorem pati non possunt; neque ob meatum, cum a quae contexta sit, & nullos habeat meatus praeter insensibiles, & membrana habeat, dum pungitium dolorem experitur, similes meatus perinde ac quando est in sanitate constituta; non ob figuram, vel ob compositionem in membrana dolor est pungitius, quia compositio, & figura pertinent ad dissimilares partes, dolor vero est solutio continui, quae praedicatur de similiari, & dissimilari, praeterea neque per exordium, quoniam membranae perſentire possunt puncturas tam in exordio, quam in medio, & fine, neque propter numerum, nihil enim additur membranae, cuius causa illae puncturae perſentiantur: similiter neque ob progreſſum vasorum, cum in qualibet membranae parte fieri possint puncturae, & non quā solum progreſſiuntur vasa: similiter neque per officium aliquod membranae laesum puncturae fiunt; quoniam licet puncturae in membranis fiant, non tamen membranae suum officium amittunt: & postremo neque ob temperaturam membranae mutata dici possumus puncturas ſentiri, in membranis, cum temperatura non cito fiat, & cito desinat; in membranis vero cito fieri, & cito desinere possint puncturae: colligas ergo ex sufficienti partium enumeratione differentiam specificam quam dolor in membranis fieri pungitius, esse ob membranae substantiam, & consequentia est necessaria, quoniam partes nostri corporis non habent alias differentias praeter illas decem, quae possint definire passiones proprias, quare cum substantia praedicatur de molli, & denſo, raro, & caeteris, quae necessario consequuntur, inuenies puncturas fieri, dum soluitur continuum membranae ob denſitatem, quoniam, dum humor penetrat denſam partem ſensu donatam, ut est membrana, illo modo soluit continuum perinde ac acuum cuspidem peruaderent, propterea fieri non possunt dolores pungitii nisi à subtilissimis humoribus, & nequaquam à crassis, quia crassi non possunt penetrare denſitatem membranae, ut hinc Diuius Hippocrates 6. sect. aph. 33. dicat, qui acidum eructant non fieri pleuriticos, & ratio est Galeni in commento, quia tales habent crassos humores, & crassus humor denſitatem membranae peruadere haud potest, ex qua ratione colligimus quoque melancholicos non posse fieri pleuriticos, cum habeant crassos humores; videas ergo, quā facile

Ut cognoscatur nostra methodo in membrana dolorem fieri pungitium.

Cur pituitosi, & melancholici non sunt pleuritici.



cilè per differentias partium corporis naturas affectuū consequi possumus, quas methodo Curtij non tam promptè inueniremus, si quis enim percunctaretur à Curtio, vnde fiant pungitiui dolores in membrana, responderet pungitiui doloris differentiam constitui ab illis, quæ necessariò consequuntur primas qualitates, & forsitan diceret hanc esse densitatem, & nihil vltra diceret, hæc Curtij: Methodus sanè optimis subnixâ principiis debito difficilior est, sed hæc, quam tradimus, ad decem illas differentias notissimas reuocat facili negotio, & resoluit tamquam ad prima, & notiora principia omnem specificam affectuum inquisitionem.

Caterum pergamus variis exemplis, donec hæc anatomica methodus clarior, ac parentior euadat; si in musculorum carne est dolor, statim fit laceratiuus; sed quâ ob causam fiat laceratiuus, nisi ad illas differentias partium confugas, non intelliges vnquam propter quid in carne fiat laceratiuus dolor; dicas ergo non fieri laceratiuum ob substantiam carnis, non ob figuram; & inuenies omnibus aliis differentiis sepositis, euenire ob situm, quoniam subtilissimi neruorum sicuti situm, & loco ad eò in carne dissociantur, vt in subtilissimos filios disseminantur, antequam in tendinem desinant, quorum ob tantam tenuitatem à causa soluente continuum aliqui subtilissimi lacerantur, vnde per sentitur laceratiuus dolor, quippe qui in membrana non animaduertitur, quia filamenta membranæ melius, & fortius contexta, ab humoribus non possunt lacerari, & frangi, sed cum tantummodo humores penetrant, faciunt puncturas.

Si in arteriis causa soluens continuum erit, fiet dolor pulsatiuus, non ob substantiam, vel situm, vel figuram, sed (ne perpetuo enumeremus omnes) dicas ob officium, quod est pulsare, quod impeditur, & cum tristi sensu animaduertitur pulsatiuus dolor. Si in viscere aliquo sensus obtusi particeps, vt in liene, hepate, cerebro, vel pulmone erit dolor fiet grauius, eritque ob numerum; carent enim viscera hoc neruorum numero in imis partibus, vt doloris animaduersionem habeant, vel dicimus ob compositionem, cum viscerum compositionem non ingrediantur instrumenta sentiendi, nisi exilia admodum, vel dicimus ob exordium, grauius dolorem oriri, cum viscera efficiantur sarcina ligamentorum, & membranarum, quibus alligantur, & eorū sunt extrema, & veluti exordia: ad eundem modum, si dolor per sentitur frangitiuus, colligimus causam soluentem continuum esse in parte corporis omnium durissima, quia fractio solum rebus duris conuenire debet, vt sunt ossa, quæ licet sensu careant habent tamen periostiū, hoc est membranam ossa circumuestientem, quæ cum sit sensu donata animaduertit ossium continui solutionem, quæ alia non est, nisi fractio; tunc non ob situm, vel figuram, vel meatus, vel alias differentias in ossibus erit frangitiuus dolor, sed ob duritiem, quæ ad substantiam pertinet. Demum si consideratur dolor in neruis, statim fit conuulsiuus, quare oportebat, vt ob aliquam ex traditis differentiis id contingeret, erit ergo, vt breuibus, & strictim agamus, ob exordium.

*Cur in carne dolor fiat laceratiuus.*

*Cur in visceribus quibusdam grauius sit dolor.*

*Cur dolor sit frangitiuus in ossibus.*

*Cur dolor  
convulsi-  
fiat in ner-  
vis.*

Convulsio fieri non potest nisi in nervi exordio fiat aliqua contra-  
ctio, unde dolor convulsius trahit originem. Ecce quomodo hac me-  
thodo expendentes decem illas partium differentias nos peruenire  
possimus ad specificam, & ultimam affectuum cognitionem. Vnde  
& quid agendum, & recta remedium administratio tota est colligē-  
da. Postremo, si de ulcere loquamur, cum sub genu procreet affectum  
saluberrimum, ut est cauterium, dicimus id fieri ob situm: adeo enim  
distat pars illa à parte aliqua principē, ut nullo modo reluctetur visce-  
ribus, ne expleant officiorum suorum munera, quinimo illis summas  
suppetias affert reuellendo, vel deriuando aliquam mali humori col-  
luuiem: in pulmone verò cur illudmet vlcus pariat affectum illum  
depositum, & conclamatum; dicimus quoque, id fieri ob situm cordi  
propinquum, & ob substantiam pulmonis raram, & ob officiam, cum  
in respirando dinellantur vlceris labia, & numquā coalescere valeant,  
& ob raritatem in putridum, & cachoeticum necessariò degenerent  
morbum, & ob situm cordi vicinum hectica in corde consurgat; quo-  
modo ergo possumus aliam semitam præter istam venari pro cogno-  
scendis specificis affectuum differentiis, nisi isthæc erit, quæ ultimas  
differentias partium declarat? quæ partium differentię sunt illæ, quæ  
omnem genericum affectum limitant, atque coarctāt, in quarum co-  
gnitionem omnem curam, omnemque diligentiam esse spectandam  
puto in secandis corporibus, alioquin actum esset de cognitione spe-  
cifica affectuum, de indicationibus, & de recta auxiliorum admini-  
stratione.

*Probatur inductione sufficientissima, morbos constitui in esse spe-  
cifico à differentiis partium nostri corporis specificis.*

## C A P. II.

*Vt morbus  
biliosus jalu-  
bris ob variū  
situm sit le-  
thalis.*

**P**RÆSTAT aliis exemplis illustrare methodum cognoscendi spe-  
cificas morborum ideas, & per omnia morborum genera ostende-  
re specificos affectus constitui, & pendere ab illis traditis partium dif-  
ferentiis; quare si de affectibus, qui fiunt à bile loquimur, an-ne erysi-  
pelas in pleura pleuritidem facit & in cerebri membranis eadem bi-  
lis phrenesim excitat, in pede verò eadem bilis faciat erysipelas nul-  
lius considerationis? Dicant mihi cur, & afferant alias rationes præter  
illas, quæ colligi possunt ex decem propositis partiū differentiis: an-ne  
erysipelas in pleura tantum minatur perniciem, & virtutis casum ob si-  
tum cordi vicinum, in pede tamen ob situm à corde, & à cæteris visce-  
ribus remotum nullius sit considerationis? in tunicis verò cerebri ery-  
sipelas sit lethale tum ob situm parti principi vicinum, unde functio-  
nes principes, ut imaginatrix, & discursus deprauantur, tum ob nume-  
rum venarum, & arteriarum cerebri, & membranarum?

Præterea si affectus, qui fiunt ab atra bile, consideramus, an-ne di-  
cit Ga-



cit Galenus 3. de symp. causis capite secundo, si atra bilis in vniuerso redundat, fieri elephantiasim, si in parte aliqua firmatur, cancrum, sicuti, si bilis in toto redundat, iſterum; si in parte, erysipelas; vnde hæc quæso affectuum discrimina exoriuntur, nisi ab illis decem enarratis differentiis in superiori capite: amplius, si de catarrho loquimur, an-ne vidimus eandem materiam ob partium corporis varietatem sicuti ob varium situm, & ob varios meatus varios gignere affectus, nam sic a-  
rarrhus in capite firmatur epilepsiam facere potest, si illemer ex capite pellitur, & in pectus decumbit tussim tantummodo excitat, similiter si idem catarrhus, qui in cerebro epilepsiam, & in pectore tussim facit, in articulos procumbit, podagram faciet, vnde ergo prodire potest tanta morborum varietas ab vnica, & sola causa, nisi partium corporis differentiæ, & varietates sint illæ, quæ constituunt affectus communes in esse specifico, sicuti de catarrho vidimus, qui in cerebro existens quatenus inter nos meatus occludit tollere potest præstantissima munia reſtrictis, sensutricis, & motricis facultatis cerebri, vnde epilepsia; quatenus verò catarrhus est in pectore, impedit, sed non tollit inspirationem, idè expellitur per tussim, quatenus verò est in articulis, facit podagram ob progressum vaſorum, accidit enim, vt tot nerui, & partes sentientes progrediantur supra articulos, vt à catarrho particulæ sentientes vi distenſæ faciant truces illos dolores; similiter, si catarrhus colligitur inter carnem, & cutim fiet œdema, ob situm à visceribus remotum, denique si illemer catarrhus erit in cerebri substantia, & non in meatibus, faciet non epilepsiam, sed veternum seu lethargum affectum, ecce quod situs, meatus, substantia, temperatura, progressus, & cæteræ conditiones partium corporis enarratæ sunt illæ, quæ específicos faciunt affectus.

Sed pergamus ad alia exempla affectuum, vt concludere possimus omnes específicos fieri à conditione partium, an-ne intemperies frigida in cerebro obliuionem facit, eadèmq; in hepate hydropisiam? vnde hoc prodit, nisi quia intemperies frigida in cerebro tollit motum, & cū memorari sit motus quidam, vt dicit Galenus, propterea ob frigidam intemperiem tollitur memoria; ecce quod hoc officium cerebri intemperies frigida impediens facit obliuionem, deinde eadem frigida intemperies in hepate hydropisiam facit, tum quia impedit sanguificatricem, tum quia occludit meatus: similiter succus mordax, quando est in cerebro, ex Galeno 6. aph. 33. facit maniã, illemer in cute scabiem, quoniam pruritus exoriens à succo mordaci existente in cerebro facultatem discursiuam, & imaginatricem peruertit, & præcipuè imaginatricem, in qua phantasmata confunduntur ob mordacem succum perturbantem phantasmatum situm, vt hinc succus mordax non permittat, nisi deprauate cerebrum suum absolueret pensum, succus tamè mordax existens in cute cum nullum ibi alteretur officium pruritum solum facit, qui est affectus nullius considerationis.

Adeundem modum humor melancholicus feriens cerebri substantiam summum mororem, & summam mœstitiã sine causa in-

*Atra bilis in toto elephantiasim, in parte cancrum bilis in toto iſterum in cute erysipelas facit.*

*Vi catarrhus ob varium situm plures morbos gignit.*

*Vt frigida intemperies in cerebro obliuionem, in hepate hydropisiam facit.*

*Vt succus mordax in cerebro maniã in cute scabiẽ facit.*

*Vt melancholia in cerebro mœstitiã facit.*

iam in *Re-* ducit, quoniam vapor melancholicus tenebrososum spectrum facit,  
*macro fame* quoddam relucetatur non solum cerebri substantiæ, quæ sua natura alba est,  
*ficiat, in* verum etiam spiritibus animalibus qui splendidi & lucidi existunt; si  
*neruis cata-* verò melancholia feriet officium ventriculi, nō phantasma tenebri-  
*leptum.* cosum sed summam famem, & intensam picam seu malaciam excita-  
 bir; porro si ille met succus melancholicus frigidus, & siccus, qui tan-  
 tam excitare potest famem, existeret in capite, & à capite in spinam, &  
 in omnes nervos motui destinatos propelleretur, non famem, sed ca-  
 thocum faceret, quoddam fieri ob nervorum substantiam; quoniam nervi  
 sua natura molles sunt, ut recipiant splendorem radiorum spirituum  
 animalium; quare si vapore isto frigido, & sicco replentur, adeò ten-  
 duntur & indurescunt, ut propterea reddatur corpus immobile, &  
 quam simillimum lapideæ statuæ: ex altera parte si de affectibus per-

*Ut flatus &*  
*bilis porra-*  
*cea ob variu*  
*sium alu-*  
*bres, & le-*  
*thales affe-*  
*ctus faciant.*

*Mucum pi-*  
*uitosum sa-*  
*lubrem, &*  
*lethalem ob*  
*varium siti-*  
*facere mor-*  
*bum.*

*Quadam*  
*medicorum*  
*errata ob si-*  
*nam partiu*  
*à doctoribus.*

continentibus ad cæteras partes loquimur, eandem considerationem ha-  
 bere possumus, veluti (ne recedamus ab exemplis) erit exilis flatus me-  
 lancholicus in ventre, qui nullius erit impedimenti, quippe qui, si erit  
 in corde, palpitationem, quæ foliis utrius assimilari solet, efficere  
 poterit; quoniam in corde flatus ille deprauabit, & corrumpet officiū  
 systolis, & diastolis, unde cor trahendo spiritum vita fruitur; in ventre  
 tum ob loci amplitudinem, tum ob facilem exitum officium deprava-  
 re non potest: ecce ergo, quod varia officia partium corporis ab unico  
 efficiente læsa varios affectus specie differentes constituunt. Præterea  
 in concauo ventriculi potest esse porracea bilis, quæ faciat diarrheam,  
 sed curabilem, quæ bilis, si in os ventriculi obreper, cardialgiam adeò  
 trucem ut mortem repentinam, sicuti testatur Alex. Tral. inducere pos-  
 set, quoddam sanè fieri ob situm proximum cordi; videas quo pacto humor  
 malignus ob tam breuem distantiam facere potest contrarios affectus,  
 quia in fundo ventriculi curabilem affectum, in ore verò incurabilem,  
 quinimò repentinum exitum adferre potest. Similiter fiet ob lubri-  
 cum mucum læuitas intestinorum, unde retinendi potentia, & per cō-  
 sequens concoquendi officium demitur nō sine manifesto mortis pe-  
 riculo, quod lubricum, si est in ossibus, non minatur summi momenti  
 malum, cum facili negotio tolli possit, & nullum principale officium  
 ab ipso auferatur; ecce quod idem affectus communis, ut est læuitas  
 ob varios situs partium, & ob varia officia læsa varios affectus specifi-  
 cos constituere potest, possem sanè vagari per omnes específicas diffe-  
 rentias affectuum, & plenisque aliis exemplis ostendere affectus speci-  
 ficos fieri à conditione subiectæ partis affectæ, sed cum videam enar-  
 rata affectuum exempla sufficientissimè hanc veritatem declarare, in-  
 cipiemus supponere hoc fundamentum, quod ultimæ differentię af-  
 fectuum trahant ortum à conditionibus partium nostri corporis. Quo-  
 circa si medicus erit perperā excultus, & limatus anatomia, cuius mu-  
 nus est partium omnium situm, figuram, meatus, & cæteras non semel  
 enarratas condiciones diligentissimè obseruare; quomodo vitare po-  
 terit errores tam in cognoscendis, quam in curandis affectibus? Quo-  
 modo ergo, ut exemplis illustremus hanc materiam, poterit cognosce-



re an orificiū ventriculi sit lesum, si nesciet, vbi sit sicuti videtur nescire omnes illi, qui dicunt orificium ventriculi esse sub mucronata cartilagine, cum re vera longē distet. Quo pacto non errabunt illi, qui dicunt pyloron à fundo ventriculi exordiri, cum palmi tractu eius exortus ab imo distet?

Similiter, si de meatibus loquimur, multi cum Galen. dicunt os cuneale esse perforatum, vt eribi specimen exprimat, & renes colatoriū habere, de quo tam multa multi scripsere vt non sit mirum, si ignorato vero situ, & veris meatibus partium corporis medici in affectibus perquirendis, & curandis tam sæpē vacillent. Quinimò plurimos vidimus, qui se dogmaticos credunt, qui spreta illa anatomica cognitione solum per vniuersales quasdam causas remoras procedunt, vnde hauriunt indicationes vniuersales, & ab iis remediorum materias colligunt, quæ non sequuntur, quia inferre ex vniuersali medio attributum minus vniuersale, est paralogismus in secunda figura ex duabus affirmatiuis, sicuti dum curare volunt traulos (hi sunt illi, qui litteram r malè pronuntiant) dicunt homines fieri traulos ob intemperiem humidam capitis, ex qua positione colligunt, esse exsiccandum caput, & deinde cōcludunt attributum minus vniuersale, falsam videlicet, cauterium, & alia id genus, quæ exsiccandi virtutem habent, esse proponenda, quæ non sequuntur: ecce, quod isti, qui per normas, vel notiones vniuersales incedunt in perquirendis auxiliorum materiis, necessariò in paralogismos impingunt. Quocirca deberent in hoc casu illas condiciones enarratas, vt situm, meatum, & figuram palatus, & ossium maxillæ considerare, quoniam propter has condiciones talis affectus specificus, & particularis fieri debet, credimus enim nos traulos fieri ob duos meatus quarti ossis maxillæ superioris nimium apertos, quæ cum ita sint, si exsiccarent Empyrici caput decem annorum tractu, vel Oraculum mitteret balbos. vel traulos in Libiam regionem calidissimam, quæ exsiccaret caput, numquam trauli consequi possent sanitatem, nisi inurerentur meatus illi duo, qui immediatè constituunt traulum, de qua re iterum paulò infra agemus, vt res melius declaretur.

Præterea si in superna medulla spinali essent collecti humores, illi sanè dolores aliquos mites facerent, deinde tamen si ipsimet humores descenderent ad ossis sacri medullam, ibi truces excitaret dolores; vellem, vt quis mihi sine illis differentiis à nobis traditus in omni parte corporis præcognoscendis rationem redderet, cur mites dolores fiant in parte superiori medullæ, truces verò in parte inferna medullæ, quæ causa tamē alia non est, nisi, quia medulla thoracis est mollior, & ideo molles, & mites dolores, medulla verò inferior est durior, ideo sæuissimi fiant dolores, quoniam in parte dura maiori cum violentia fit cōtinui solutio, ecce ergo quod hæc substantia medullæ præcognita, causam huius rei aperit: amplius si de substantia ossis ithmoidis loquimur, quæ est rara, & spongiosa, si ob tabum gallicum ex ea è naribus portio aliqua emungitur, Empyricus non ita admirabitur rei nouitatem, si

Errata ob  
meatum  
injectionem.

Errata com-  
missa ob sub-  
stantiam partium inco-  
gnitam.

raritatem illius ossis substantię corruptioni valdè obnoxiam prius cognoscat.

*Errata ob  
progressum  
vasorum in-  
cognitum.*

Denique si de progressu vasorum loquimur, an ne errant, qui dicunt salua tellam immediatè deplete splenem? quis amabo poterit melius tantam innanitatẽ cognoscere, quam anatomicus ille, qui sciet omnium venarum progressus & origines; an ne quoque errant, dum dicunt longè melius per basilicam iecur depleri, quàm per cephalicam, cum ab vnica concauitate existente in iugulari ambæ propagines prodeant, sed quod deterrimum est, iubent tonforibus in viciis iecoris, vt basilicam aperiant, quamuis delitescat, & quamuis cephalica sit euident & conspicua, ab illis spernitur, vt in simili occasione viderim tonforem ter secasse innaniter basilicam parum cõspiciuam & exilem.

*Errata ob  
compositionẽ  
partium in-  
cognitam.*

Postremò, si de compositione partium loquimur in exemplum proponere possumus erratum illud, dum Empyricus credit mucronatam cartilaginem aliquando cadere posse: hæc tam vana nullo modo diceret, si vidisset, quomodo sit composita, & vnita ossi pectoris; vidisset enim illam vnionem esse non per diartrosim, sed per symphysim, quæ vnio, vel compositio non supponit motum, vt propterea non possit luxari. Paret ergo in omni consideratione specifica, siue sit morbus, siue sit causa, vel symptoma, nos non posse differentias específicas consequi, nisi prius cognosceantur differentię istæ decem partium nostri corporis.

*Dub.*

Nec mihi aliquis obiiciat, quòd alibi Galeni auctoritate probatum sit, locum affectum respectu affectus esse accidens separabile, vt est inflammatio respectu pleuræ; in hoc capite tamen nos asseruisse esse inseparabilem, & conuertibilem cum affectu, & affectum de loco affectu prædicari in secundo modo dicendi per se, perinde ac si diceremus inflammationem esse non posse, quin pleura quoque læsa sit. Quia respondemus locum affectum, vel considerari communiter, vel secundum differentias específicas iam citatas. Si communiter, est quid separabile, quia quilibet specificus affectus respectu loci affecti absolutè sine limitatione consideratus accidit loco affecto, vt accidit risibile animali, animal enim stat sine homine, & sine risibilitate. Similiter stat pleura sine inflammatione, cum variis affectibus affici possit. Hinc est, quod à loco affecto communiter sumpto procedere ad affectum aliquem specificum est argumentum à positione consequentis in quo colligitur conclusio affirmatiua in secunda figura, quæ non sequitur, vt alias diximus. Si verò consideratur locus affectus secundum específicas differentias in quolibet affectu, sic redditur conuertibilis, & fit proprium subiectum, quod de finit prædicatum, vt faciunt omnia subiecta, quæ ingrediuntur secundum modum dicendi per se; sic pleura affecta secundum tales meatus, talem figuram, talem situm, & reliquas differentias est inflammatio pleuræ, & viceuersa, scilicet si est pleuritis, pleura erit affecta secundum tales meatus, talem figuram, & talem situm, reliquæ enim varietates non pleuritidem, sed alios affectus facere possent: de qua re vberius in libro de indicatione agemus.

*Sol.*



*Ostenditur ubi agendum colligi modo ex partium Situ, & Meatu, modo ex progressu, & exordio.*

CAPVT III.

**N**ON solum decem illæ specificæ partium differētix enarratæ eleuare nos possunt ad cognitionem specificarum affectuum idearum, verum etiam ad notitiam eorum omnium, quæ consequuntur essentiam affectus, quod valdè cohæret Arist. sententiæ dicentis in posterioribus analyticis, quod illud, quod dat quid, det quoque propter quid eorum, quæ consequuntur. Quare si per partium nostri corporis situs, meatus, figuras, compositiones, temperaturas, substantias, numeros, officia, & progressus, internam, & singularem affectuum naturam cognoscere valebimus, inde cognoscemus quoque remedia, & remedium administrationem; remedia, quia talem relationem habent cum morbis curandis, vt ex cognita affectuum essentia remedia illico inferantur; remedium administrationem, quia non possent dici remedia, nisi rectè administrarentur, quæ recta administratio consistit in recta cognitione quatuor conditionum, quarum prima erit ubi sit medicina adiungenda, secunda quomodo sit danda, tertia quanta, & quarta quando sit adhibenda medicina.

*Vi à decem nostris conditionibus cognitio affectionum remedia, & remedium administrationis dependant.*

Quare, si de ubi loquimur, facile ostendere possumus modo colligi à situ partium corporis, modo à meatu cognitione, modo à partium progressu, & aliquando ab exordio musculorum, & venarum, & cæterarum omnium partium. Dicimus igitur situm nos docere locum, ubi agendum sit, quod exemplorum luce cognoscitur per hypothesein, si quis vellet topicum aliquod hepatis applicare, & crederet hepatis situm esse in parte sinistra, & illi parti affigeret locale medicamentum, quas suppetias afferret; quare expedit situm loci affecti callere, alioquin casu, & fortuito medicinam faceret; audias ex situ partium quarundam ignorato in quos errores incidunt celebres quoque medici; sunt qui credunt orificium ventriculi supernum situm & locatum esse sub mucronata cartilagine, quique in omni angore, & vomitionibus biliosis cerata roborantia, & calida adiungunt iuxta illam mucronatam cartilagine, credentes ibi esse orificium ventriculi, attamen ibi est iecur, vt paulò infra declarabimus auctoritate anatomistarum, & propterea lacescunt valdè: præterea est sapientissimus Galenus (cui non licuit humana corpora secare) qui de renum situ loquens, dicit renem dextrum esse altiore sinistro, vt in brutis obseruatur, quod contrarium in hominibus conspicitur, quoniam habent sinistram altiore dextro, tunc hoc situ ignorato, si alicui ren dexter, vel sinister doleret, vel alio malo affectu esset tentatus, quomodo posses appositè topica adiungere, nisi casu, & fortuito? Demum, vt non prætermittamus situm ventriculi, est Galenus, qui credit ventriculum magis vergere ad par-

*Vi ex situ colligitur ubi agendum.*

tem dextram, quam ad sinistram. Ex altera parte est sensus ipse, & anatomicorum testimonia, quibus sanè fides non est deroganda, qui dicunt ventriculum magis vergere ad sinistram partem, quam ad dextram; comprimitur enim in laevam partem à iecoris magnitudine, dicas mihi si nescires hunc situm ventriculi, quando ventriculus esset munitis extrinsecis tutandus, quomodo posses scire locum ubi essent localia applicanda? Ecce igitur, quod ubi agendum ex situ partium aliquando colligi debet.

Præterea non solum potest colligi ubi agendum à situ partium, verum etiam à progressu, ab exordio, & à meatibus ipsis. Nec mihi obiciant, dicentes, quod vnum Galeni auctoritate indicet solum vnum, ut nos quoque admitteremus, & alioribus principiis probabimus in libro de indicatione, & propterea dicant, ubi agendum indicari solum ab inhaerentia indicantis, quæ vnica est, ergo non à situ, & ab aliis conditionibus; quia respondemus nos querere, ex situ, & ex aliis conditionibus partium hanc inhaerentiam indicantis, ubi sit; eamque dicimus non posse haberi per vnicum signum tantum, per situm videlicet, vel per meatum, & ratio est, quia inhaerentia est multiplex, & est quid æquiuocum, cum modo per situm cognoscatur, modo per exordium, modo per progressum, & modo per meatum, sicut enim locus non prædicatur de loco, similiter inhaerentia non prædicabitur de inhaerentia, quare per varia signa, & per varias conditiones enarratas varias inhaerentias cognoscere poterimus, & non tollitur, quin vnum, ut vnū non indicet vnum, vel vnum indicetur ab vno. Sed redeamus, vnde digressi sumus, dicentes non solum ex situ colligi ubi agendum, verum etiam ex progressu, veluti, si de vena basilica loquamur, nos scimus nervum magnum, & arteriam maiorem sub basilica progredi, sub cephalyca verò neque nervos, neque arterias excutere; quare quando, utraque vena esset occulta, tunc latius esset cephalicam secare, quam basilicam. Ecce ergo, quod progressus vasorum docet, ubi sit agendum. Præterea ab exordio quoque colligimus ubi agendum sit, veluti cognoscentes nos ab vnica concavitate prodire basilicam, & cephalicam, cognosceamus quoque vnicum esse exordium in iugulo, & propterea eandem esse utilitatem in omni casu tam in sectione cephalicæ, quam basilicæ. Amplius à meatibus partium corporis colligere possumus ubi agendum sit; veluti contingit in illis, qui litteram r non possunt exprimere, qui trauli vocantur: hoc enim linguae impedimentum oritur, ut puto, à duobus foraminibus nimium apertis, quæ sunt sub palato inter quartum os maxillæ, quare, si vruntur, vel tunica circumstantis abscinditur, & obcale scit, ut meatus callo claudi possint, videntur deinde trauli, illa linguae hæsitantia liberari, ecce, quod à meatibus non solum colligimus affectum, sed quid agendum, & ubi vel cui parti sit adiungendum remedium; possem alia innumerabilia proponere exempla, quæ ostenderent, ubi agendum à meatibus quoque colligi posse, sed cum res sit clara, & præterens, non decet longiori discursu hanc tractare materiam: ex his tamen colligere possumus, quan-

*Ut inhaerentia est, quod æquiuocum.*

*Ut ex progressu vasorum colligitur, ubi agendum*

*Ut ex meatibus ubi agendum colligitur.*



tum errent illi, qui spretis his specificis differentiis hauriunt indicationes à communibus, veluti sunt illi, qui credunt linguæ hæsitantiam prodire ab intemperie humida, de quibus paulò infra.

*Ostenditur quomodo agendum colligi modo ex partium figura, & substantia, & compositione, modo ex numero, & officio partium.*

C A P V T I I I I.

Q U O M O D O agendum indicatur tantummodo à passione indicatis, quia vnum, vt vnum indicat vnum solum, & non plura, vt cū Galeno probabimus in libro de indicatione; quando verò nos dicimus, quomodo agendum colligi modo ex partium nostri corporis figura, modo ex substantia, modo ex partium compositione, modo ex numero, & demum ex officio, tunc nos non tollimus, quin à passione indicantis quomodo indicetur; sed illa signa colligimus à differentiis partium enarratis, quæ nos possunt docere modum, quo facilè indicans possit pati, vt melius vincatur, & superetur, dicimus id colligi modo à cognitione figuræ partium corporis, modo à cognitione substantiæ partium, modo à compositione, & à reliquis citatis; sed quoniā exempla sunt illa, quæ promptè docent, aliquot afferamus. Numquid non ex ventriculi figura, quæ assimilatur oblongæ cucurbitæ, colligimus quomodo cerata sint affigenda ventriculo pro destructione indicantis? Ex hepatis figura imitante semilunium colligimus, quomodo extrinseca auxilia debeant hepati applicari; ex figura rectorum musculorum, dum illi tensti sunt addiscimus, quomodo topica sint affigenda; vt in hac re plures errent videntes duritiem hanc oblongam in parte dextra, credentes spectare ad hepar, cum ad rectos musculos abdominis pertineat; in quæ errata non incurrerēt, si hepatis, & horum musculorum figuram cognoscerent, quod erratum reiectum est in octauo capite secundi libri: ex figura splenis quoque colligimus, quomodo sint affigenda topica splenetica, splenis enim exigua pars occupat partem supernam, quæ topicis tantum potest tractari, interna verò nequaquam ob localia pati potest, supernæ igitur partis splenis figura assimilatur plantæ pedis, sed gibba est aliquantulum, in parte verò interna est concaua; quæ cum ita sint, quomodo poteris splenem tractare localibus, nisi perfectè prius scias figuram splenis, à qua præcipuè modus operandi, vel adiungendi emplastra, & cerata colligitur. Similiter ex figura coli intestini addiscimus, quomodo sint applicanda emplastra, vnguenta, & alia id genus, inferas ergo ex figura omnium viscerum cognosci posse, quomodo sint administranda remedia.

*Exempla, quæ ostendunt, quomodo indicari à figura.*

Præterea non modo à figura operandi modus colligitur, verum

*Ut indicatur  
quomodo à  
substantia.*

*Ut indicatur  
quomodo à  
compositione  
partium.*

*Ut indicatur  
quomodo à  
numero.*

*Ut indicatur  
quomodo ab  
officio par-  
tium.*

*Ut quantum  
indicatur à  
temperatu-  
ra & à sub-  
stantia par-  
tium.*

etiam à substantia partium, quoniam alio modo est agendum in parte dura, ut in ossibus, & dentibus, & alio modo in carne, alio modo in mammillis, & cæteris partibus glandulosis; alio modo in renibus, alio in medulla inferiori, quæ æmulari videtur nervi duritiem, quam in superiori, quæ est mollior: similiter in luxatione ossiû chirurgus optimus quomodo agendum colligit à compositione; nam alio modo in diartrosi luxatæ partes in pristinum statû reducuntur, alio in atrosi, & alio modo in symphisi, ubi nullus est manifestus motus, ut sunt futuræ ossium capitis, quæ per symphisin componuntur, & simul uniuntur; ex varietate igitur connexus, vel compositionis vario modo est agendum. Amplius, si considerationem compositionis transferimus ad partes componentes, tunc eodem modo à compositione in hoc sensu usurpata colligimus quo modo agendum sit; exempli gratia, sit vulnus sub clavicula, vel in processu interno scapulæ, ubi reperitur rete illud nervorum, quod excurrit ad brachia, cui dubium, quod alio modo ob hoc rete, quod componit illam partem, erit agendum in dilatando, in secando illas partes, quam si in alio loco esset operandum: quinimo non solum in dilatando, & secando, verum etiam in localibus adiungendis esset temperatura nervorum expendenda; localia enim nimium frigida, & nimium calida nervorum temperaturam destruant; ecce ergo, quod non solum compositio, sed etiam temperatura partium nos docere potest, quomodo agendum sit. Præterea, si numerum, & progressum partium componentium aliquod viscus spectamus, addiscimus quoque quomodo sit administrandum auxilium, cognoscentes nos splenem maximo venarum numero prodeuntium à porta cõstar ex hæmorrhoidibus, quæ venæ ab eodem trunco deducuntur, euacuamus, ut splenem subleuemus: idem dicendum de qualibet corporis parte; ecce, quod quomodo à numero, à progressu, & compositione colligitur. Postremò ex officio partis quomodo agendum haurire possumus; nam præcognito officio ventriculi esse chilificationem, quæ in illa caloris partium circumiacentium symetria consistit, nos ex officio læso partem circumiacentem, si est debito calidior, per interna remedia refrigeramus, si à naturali temperamento parum recedit, cibis refrigerantibus, vel topicis eandem virtutem habentibus conamur ad illam symetriad transferre calorem.

De quanto agendum sit, nostrates optimè dicunt, quantum desumi ab actione indicantis, nos verò hic laboramus, ut inueniamus illa signa, quæ nos docere possunt, an actio indicantis sit maxima, vel parva; quoniam scire quantum desumi ab actione indicantis, est communissima, & generica scire, à quibus nulla inferri potest consequentia. Quare dicimus nos quantum agendum, vel actionem indicantis desumi præcæteris à temperatura, per hypothesim, erit indicans calidum in capite, erit quoque simile indicans calidum in iecore, tunc temperatura capitis docebit nos, quod illud frigidum, quod hepatis calido conveniret, capitis robur destrueret; quia capitis temperatura est frigida, hepatis verò calida; quare si actio indicantis debet vinci à potenti-

tiori,



tiori, nos pro hepatis calore refrigerantia eligemus intensioris virtutis, quam pro calore capitis, non quod eadem refrigerantia non superarent incendium capitis, sed quia destruerent temperaturam capitis; cerebrum enim ob suam temperaturam, & ob suam mollitiem, ita facile alteratur, ut merito sagax natura ossibus cerebrum munierit, ne aëre extrinseco alteraretur; Quare dicimus temperaturam, & deinde mollitiem, duritiem, & qualitates ad substantiam pertinentes nos docere quantum agendum. Hinc mammillæ ob mollitiem; vesica ob suam frigidam temperaturam, oculi, aures, ventriculus tum ob temperaturam, tum ob situm quantum agendum admonere. Quando sumitur à præsentia indicantis, hæc præsentia verò colligitur à variis <sup>vi indicatur</sup> symptomatibus, & aliquando à situ; sicuti videns Galenus pylorum <sup>quando à</sup> in fundo ventriculi esse locatum, dicebat, liquida esse danda in principio <sup>fin.</sup> conuiuij, ut promptè exeant, & ne impediuntur ab iis, quæ sunt difficilius concoctionis.

---

*Primum exemplum errorum nonnullorum Medicorum qui ob  
Situs partium corporis ignoratum dicunt cum Gal.  
pylorum exordiri a ventriculi fundo.*

C A P. V.

QVONIAM ostendimus decem esse conditiones, vel differentias partium nostri corporis, quæ dant esse specificum affectibus tam naturalibus, quam præter naturam, & quæ docent remedia, & remedium administrationem: nunc præstat de illis Medicorum erratis diligentius agere, quæ committuntur ob inscitiam prædictarum differentiarum, vel conditionum partium corporis, quæ sunt Situs, meatus, temperatura, & cæteræ superius enarratæ conditiones, quoniam illis erratis reiectis, reliqua vniuersa eadem methodo facile corrigi poterunt: Exordiamur itaque à nonnullis erratis ad Situs pertinentibus. Errare igitur videntur nonnulli dicentes officium ventriculi, quod in pyloron mittit esse in fundo, vel in decliuiori regione situm & collocatum, causaque huius tam communis erroris fuit sapientissimus Galenus, quoniam eius auctoritas talis est, ut non solum in totius Europæ tractus, verum in id quod Meridiano, & Septentrione finitur diffusa cultu obseruantiaque merito existimetur. Hic vir igitur, cum ei non licuerit secare humana corpora, videns in brutis quibusdam animalibus pyloron esse in fundo ventriculi, credidit in libro de tuenda sanitate, & in 4. de vl. par. capite 7. pyloron in hominibus quoque, à fundo ventriculi exordiri. Quæ opinio est falsa, & fuit multorum errorum origo. Falsa est, quia reluctatur experientiæ, quoniam in humanis cadaueribus oculis cognoscitur, pyloron ab imo ventriculo non prodire, deinde reluctatur Vesalio, Columbo, & cæteris omnibus præclarissimis anatomicis, qui quotidie humana corpora secant; quare


*Errare videtur Gal. dicens à fundo ventriculi exordiri pyloron.*

*Vi Galen. reprehendit illos, qui in præceptorum placita iurant.*

esset vecordis, & nebulonis illa hominis natura, qui sententiam aperte falsam, & quæ aduersatur experientiæ non reiceret. Quinimo est ipsiusmet Galeni præceptum 6. de morb. vulg. com. 2. vbi habet, quod omnia sint examinanda ratione & experientia, & libertinos vocat illos medicos, qui sunt addicti auctoribus: & secundo methodi vocat tyrannicam illorum doctrinam, qui semper sunt addicti præceptoribus, & in libro de libris propriis reprehendit medicos, qui se vocant Praxagoreos, vel Hippocraticos, quapropter libero ingenio præditus non pepercit Hippocrati, Platoni, Crisippo, & Aristoteli, sæpè enim horum diuinorum hominum sententias reicit atque explodit, demum 1. sect. aph. com. 1. dixit in arte medica, esse duo crura, quibus est incedendum, ratio nimirum, & experientia: de auctoritate ne verbum quidem: quare & nos Galenum æmulantes despiciemus auctoritates philosophorum, si sensibus reluctabuntur, quoniam sicuti, vt dicit Arist. 8. phy. 22. est signum imbecillitatis intellectus dimittere sensum, & quære rationem, sic dicimus longè maioris imbecillitatis intellectus esse, dimittere sensum propter auctoritatem alicuius summi philosophi; à sensibus enim cognitio nostra dependet, vt iure Plaro dixerit, sensus esse sinceros mentis inter-nuncios, eoque appellauerit quasi satellites, & duces ad veritatem comparandam.

Exequamur ergo propositum; Galen. quarto, de tuenda sanitate capite ultimo, & 6. eiusdem libri & 4. de vsu par. 7. sustinet pyloron esse in imo ventriculi, habetque hæc verba 4. de tuenda: vbi ventriculus ali præterea non desiderat imam sui partem *πυλῶρον* Græci vocant, id est, portam recludere, ac quod ciborum superfluit exprimere, ceu alienum onus trudere; dicit igitur Galenus, quod pyloros est in fundo & imo ventriculo, idem dixit 4. de vsu par. 7. quod tamen reluctatur experientiæ,

*Vt in multis erroris cadunt, qui credant pyloron oriri ab imo ventriculi.*



quoniam est in dextra parte ventriculi, quæ pars à fundo, & imo distat fermè palmi tractu, vt est videre in humanis cadaueribus, & hinc est, quod, licet ventriculus esculentis, & poculentis sit onustus, pyloro existente aperto, nihil ab ipso egrediatur, quod non contingeret, si pyloros à fundo ventriculi haberet exordium. Quod igitur ita se res habeat, ventriculi figuram obseruatam à Vesalio, & à cæteris anatomicis nostri temporis proponamus, an ne sensu patet vbi est A, ibi esse pylori exordium? an ne locus vbi est D, distat ab A, quod est ima ventriculi pars? videns igitur Ga-

lenus in simiis, & canibus esse pylori initium in fundo, credidit in eodem situ, esse quoque in hominibus.

Cæterum, quod pessimum est, hoc situ pylori malè percepto tractantur



Etantur quæstiunculæ ab iis, qui pertinaciter sunt addicti Galeno inanes, & futiles, veluti dum dicunt, à sumpto cibo esse operæpretium, se omnino abstinere ab exercitio, ne ob motum cibus incoctus in pylorum à fundo exorientem procumbat; cuius quæsti causa non habet locum in hominibus; quia orificium pylori habent in parte superna, & nequaquam in fundo ventriculi.

Similiter, dum dicunt, quæ citæ sunt coctionis esse prius ingerenda, & postremò esse comedenda, quæ difficilioris sunt coctionis, rationemque desumunt à situ pylori, credentes orificium infernum ventriculi esse in fundo; ex qua falsa positione inferunt liquida, & ea quæ facilioris sunt coctionis, esse prius ingerenda, ut promptè, quando sunt cocta descendant; ea vero quæ sunt difficilioris coctionis, postremò ingerantur, quia diutius morantur in ventriculo, quæ omnia, cum ex falso principio prodeant, redduntur vanissima: patet enim situm orificij pylori esse in parte superiori, & palmi propemodum tramite distare ab imo. Quinimò sagax; & prudens natura meritò in superiori parte locavit orificium, quod in pyloron mittit, ne liquida, & quæ poculorum affluentia, atque frequentia ingeruntur, illico sic incocta descendant in pyloron; erat enim operæpretium, antequam cibus descenderet in duodenum intestinum, ut primam coctionem susciperet, quæ aliquo temporis spacio fit, & deinde in ventriculo suscepta aliqua coctionis elaboratione fieret chylus, & descenderet; sed nequaquam spontè, ut credunt Empyrici, sed à fibris rectis attractus, & à tranversis expulsus; munus enim præcipuum naturalium facultatum est, opificio rectorum fibrarum attrahere illud, quod coctum est, quia est dulce, & suave, & ideo nequaquam graue, & onerosum quinimò tam expeditè à supernis, quam ab infernis partibus humores utiles attrahuntur, ut in libro de reuulsione ostendimus. Quæ cum ita sint, omnes cessant quæstiunculæ; cessat illa, dum dicunt, quæ facilioris sunt coctionis, prius esse ingerenda, tum quia pyloros non exorditur ab imo, tum quia cibus ingestus regulatur à facultatibus naturalibus, & nequaquam sponte labitur: cessat quoque alia, dum dicunt, ob hanc rationem post cibum non esse faciendum exercitium, quia per orificium pylori incoctus cibus in intestina procumberet, quod non sequitur; quoniam orificium, ut diximus, est in parte superna, & non in fundo.

*Ut errans  
Empyrici  
credentes  
chylum sponte  
descendere  
in pyloron.*

---

*Secundum exemplum errorum ob situm par. corporis ignotum est  
dum dicunt, os ventriculi esse sub mucronata  
cartilagine.*

C A P. VI.

**M**EDICORVM vulgus (nescio quo fato) tam sæpè in rebus adeò  
aperitis cæcuiat, & tanto tempore in hac versetur hæresi, quod

*Errant qui  
credunt os  
ventriculi  
esse sub mu-  
cronata car-  
tilagine.*


*Vi laidunt a-  
grolos qui  
credunt os  
ventriculi  
esse sub mu-  
cronata car-  
tilagine.*

*Cnr vulnus  
mucronata  
cartilaginis  
su lethale.*

videlicet sub mucronata cartilagine os ventriculi situm, & locatum sit: quilibet enim, qui semel tantum perfecte videret humani corporis anatomen, vel saltem fidem adhiberet Vesalio, Columbo, & aliis anatomicis, quibus, in hac re præcipue fides non est deroganda, is certissime non diceret os ventriculi esse sub mucronata cartilagine, horum enim anatomicorum vnica est vox, quod ventriculi os ab illa parte distet, & situm, & locatum sit in sinistra parte, & vergat versus dorsum; aiuntque sub mucronata cartilagine esse aliquam iecoris portionem, quæ occupat regionem illam anteriorem, incipiens tamen à dextro latere, peruenientque ad mucronatam cartilaginem, & aliquantulum ultra, vt amplectatur illam ventriculi partem gratia ipsum fouendi, & calfaciendi. Quare qui credunt mucronatam hanc cartilaginem, esse oris ventriculi munimentum, incidunt in plurimos errores, & illos inexcusabiles; quoniam existimantes os ventriculi ibi iacere, ex hoc error in alium longè maiorem serpunt, veluti dum curantes animi deliquium factum ob bilem ferientem os ventriculi confugiunt ad mucronatam cartilaginem, credentes ibi esse os ventriculi, & illi parti admovent calida, vt sunt olea de nuce muscata, de spica, cerata stomacalia calida, & fomentationes: errant sanè, & lædunt maximè, quia ibi non est os ventriculi, sed iecoris portio, quæ à calidis his topicis insigne maleficium recipit; quinimò audias casum, quæ m. semel vidi, erat vir quidam emaciatius ventriculo biliosis succis refertus, propter quos in anxietates & deliquia animi sæpè incidebat, erat quoque Empyricus ille notissimus ænobarbus, & obtrectator, quem tu nosti, qui misero huic patienti succurrere conabatur, admovebaturque perpetuo, vbi est mucronata cartilago, calida, quorum maleficio, cum ad illum locum perueniat iecur, in calidissimos affectus, & incurabiles illum patientem reduxit; ecce igitur quàm sæpè maximi errores fiunt ob situs viscerum inscitiam; quis posset committere, quin valdè miraretur tam crassam multorum medicorum ignorantiam, cum tales sint, vt nunquam viderint, vel obseruauerint non dicam anatomen, vel anatomie scriptores diligētissimos, sed neque schema, & exemplar aliquod humani ventriculi vbi videre potuissent orificium ventriculi in leua parte situm esse, & nequaquam sub mucronata cartilagine, sub qua portio hepatis manifestissimè iacet; insuper errare possunt ob situs mucronatæ cartilaginis, & adherentium viscerum inscitiam, quando vulnerata cartilagine non animaduertent vulnus illud esse lethale, rum quia munit septum transversum, & cor: tum, quia tendo septi transversi mucronatæ cartilagini subnectitur. Præterea aberrare plurimi videntur, qui perperam obseruant situm colli vesicæ, quoniam (dum à Lithotomo vesicæ calculo correpti inter anum, & testes secantur, gratia extrahendi lapidem) credunt in illa sectione secari quoque posse collum vesicæ, quem errorem sequi videtur Columbus anatomicus peritissimis, lib. 5. cap. 26. vbi agit de musc. colli vesicæ, dicitq; aliquando à Lithotomo, qui situm vesicæ ignorat, musculum cervicis transversim incidi, & inde nouum morbum induci, quoniam, dicit ille,



secto hoc musculo, inde vrinam non posse contineri, quæ sententia Errat Co-  
quamuis fuerit viri præstantissimi, vera esse non potest, quinimo si ali-  
quis semel videret Lithotomum secantem, & incidentem, vt calcu-  
lum extraheret, & semel vidisset vesicæ firum, illico certo sciret à Li-  
thotomo non posse incidi, & secari ceruicem, vt admiratione dignum lum vesica.  
sit, quod Columbus, qui toties secavit hominum corpora, in hac re



aberrauerit, cum tam clarè pateat col-  
lum vesicæ palmi fermè interstitio abesse  
ab illa parte, quæ inter anum & testes se-  
catur, & Lithotomi vulnus non perue-  
niat ad collum vesicæ, sed solum vsque  
ad fistulam, quâ deferretur Lorium, neque  
ultra penetrare potest, quia impeditur à  
quadam magna siringa imposita à Li-  
thotomo, quæ est tamquam vulneris ter-  
minus, & quæ immittitur, vt pars illa ex-  
terna solū secetur, in qua nullum subest  
mortalis periculum.

Quia vbi est O ibi est locus, qui seca-  
tur à Lithotomo; vbi est E ibi est vesicæ  
collum; quare nullo modo vulnus Li-

thomi poterit lædere collum vesicæ.

Præterea patet experiētia vulnus Lithotomi periculo vacare, quo-  
niam aliqui inveniuntur patientes, qui illo sæuissimo affectu vexan-  
tur, vt illis ob carunculas, vrina adeò supprimatur vt nullo modo cō-  
suetum iter facere potens exeat fistulam inter anum & testes, & sibi  
viam aperiens in loco vbi Lithotomus secare solet multorum anno-  
rum spacio sine aliquo vitæ discrimine lorium, perperuò stillat: Patet  
quoque Hippocratis auctoritate qui 6. sect. aph. 18. dicit pertusa per  
sectave vesica, cerebro, corde, septo transuerso, &c. esse lethale, quare  
inferendum est, si Lithotomi secarent collum, omnes perituros, nec  
valet dum occurrunt collum vesicæ esse carnosum, & propterea vul-  
nus non esse tanti faciendum, & Hippocratem intelligere de vesica, &  
nequaquam de ceruice; quia responsio est à veritate aliena, quoniam  
in ceruice vesicæ est maior neruorum, arteriarum, & venarum imple-  
xus, quam in qualibet vesicæ parte, & per consequens maius pericu-  
lum, neruorum enim propagines sextæ coniugationis cerebri irrigant  
vesicam, & in collum tamquam in centrum vniuntur omnes, vnde ex-  
quisitior sensus; similiter venæ, & arteriæ vesicæ in collum omnes cō-  
ueniunt, vt necis periculum si respicimus vasa, maius sit ob læsum col-  
lum vesicæ, quam ob vesicam. Errant quoque dicentes collum vesi-  
cæ esse valdè carnosum, quod reluctatur sensibus, quoniam, si inspi-  
cient summa cum diligentia collum vesicæ, non videbunt esse carno-  
sum; quinimò, vt meum sensum liberè dicam, fateor me inspexisse nō  
semel collum vesicæ, & nunquam vidisse in cadauerum vesicis aliquas  
fibras carnosas, adeò musculus ille est exilis, & ferè inuisibilis. Causa

Vulnus li-  
thotomi ca-  
vere periculo.

Vt errant qui  
dicunt vul-  
nus colli vesi-  
cæ, non esse  
lethale. vs  
vulnus vesi-  
cæ.

*Cur sæpe mori-  
antur qui  
à Lithotomu  
fecantur.*

verò, cur pereant aliqui, qui à Lithotomis secantur, est, quia post sectionem immittunt forcipem, & violenter collum dilatant, & dilatant, unde collum vesicæ sic laceratum, ob eius virtutem collisam, in cancrenam facile cedere potest, unde mors sequi solet. Quomodo autem vitari possint hæc mala, quæ à Lithotomis perpetrantur, agemus tum in lib. de mala administratione remediorum, tum in libro de ferro, & igne; nostrum enim in præsentia est animaduertere errata, quæ committuntur ab Empyricis ob inscitiam situs partium nostri corporis, & quia situs colli vesicæ à multis ignoratur, propterea in exemplum methodi nostræ proposuimus.

*Primum exemplum errorum ob Meatus par. ignoratos est, dum dicunt, causas adequatas Lithiasis esse materiam crassam, & calorem renum.*

#### C A P V T VII.

**C**ORRVNT in hanc communem sententiam medici nostri temporis, dum perquirunt causas passionis nephriticæ, dicente causas duas tantum esse sufficientissimas, materiam scilicet, & efficientem, causam verò principalem, quæ consistit in meatibus ad renes, & hepar pertinentibus omittunt, deberent enim per omnes propositas differencias partium percurrere, quia quæ adesse specificum affectum spectant, semper inueniunt. Primum enim dicunt materiam esse lentos, & crassos humores congestos, vel ob vsum ciborum crassorum, ut est lac, caseus, & alia id genus, quæ cum facile coctionis rationem aufugiant in crassâ, & viscosa excrementa cedunt. Secundò dicunt necessariò quoque conspirare efficientem causam Lithiasis, quam dicunt esse calorem immoderatum renum, qui attrahit in renes crassâ excrementa, quæ, si alicuius temporis tractu ibi morantur, in tophos, vel lapillos, vel arenulas degenerant, quæ sententia, cum versetur in vniuersalissimis, & nequaquam in specificis, aduersabitur nostræ philosophiæ, & nifallor, veritati ipsi, semper enim constanter dicimus ex notionibus tantum vniuersalibus neque specificam cognitionem, neque remedium nos posse colligere, quia incidimus in paralogismum affirmatiuum secundæ figure, de quo paralogismo alibi à nobis actum est. Cæterum exequamur propositum, & ostendamus aliquid aliud requiri in nephritica passione præter crassâ excrementa, & calorem renum, & ostendamus caloris excessum, & crassitiem humorum præter naturam non semper conspirare; an-ne innumerabiles reperiuntur homines, qui humorum crassitie sunt referri, qui semper lacte, & caleo videntur, & innumerabiles tales, quibus exardent renes, qui nullo vitæ suæ tempore lithiasim passionem sunt experti? quare quomodo poterunt defendere causas specificas lithiasis esse



esse crassitiem humorum, & calorem insignem renum: de ratione enim causarum, quæ per se sunt, est, ut positis causis, ponatur effectus, vel saltem versa vice, posito scilicet effectu ponantur causæ; inquiramus igitur nos causam seu conditionem specificam lithiasis, eamque à decem illis citatis differentiis eliciamus, & ne semper eas vniuersas repetamus, confugiamus ad Galenum, qui adæquatam, & veram causam seu occasionem nephriticæ passionis docet, quæ continebitur quoque in illis decem propositis, dicit igitur Galenus, 14. methodi capi. 16. incidunt ex victu crasso diu exhibitio in generatione calculi, & non omnibus contingit, quia quibusdam ita densi sunt renes, vel sunt angustissima ora venarum in iecinore, ut sine errore in victu hoc morbo corripiantur; ecce igitur, quod vera causa, quæ specificum reddit affectum hunc renalem, erant lati meatus, ut valeat consequentia, meatus sunt angusti, ergo (quamuis, & calor ingens, & maximus infarctus humorum sit in corpore) non fiet lithiasis.

*Occasionem  
adæquatam  
calentorum  
esse latis  
meatus, &  
non crassos  
humores. &  
calorem re-  
num.*

Præterea, ut melius cognoscamus calorem, & crassitiem nullo modo esse veras, & immediatas causas: ad experientiam aciem oculorum conferamus, numquid non inveniuntur plures, qui vtuntur summa inedia, in quibus nullus infarctus colligi potest, attramen calculum, & arenulas gignunt: quomodo ergo erit necessaria in lithiali passione multa crassities? similiter an-ne plures patiuntur hunc affectum, qui sunt omnino calore ferè spoliati, veluti sunt illi, qui ad extremam senectam perueniunt, qui calculos, & arenulas patiuntur: postremo an-ne fieri potest calculus in infantibus in utero matris existentibus, in quibus causa adæquata non potest dici pituitosus infarctus, cum fœtus, vel embrio sanguine purissimo, & nequaquam viscoso nutriatur: quare crassities, & calor non erunt causæ adæquatæ, quinimò sæpè remotæ, & extraneæ; in omni enim homine tenuissimis humoribus prædito potest esse tanta crassities, quæ lithiasim facere posset, quare crassities, vel calor neque per se, & adæquatæ erunt causæ, neque ex illis, quæ saltem sunt de omni; relinquatur itaque causam veram, & adæquatam esse meatus in renum regione plus debito apertos; quoniam iis positis, ponitur lithiasis, & posita lithiasi, ponuntur meatus multum aperti; quod clarius quoque colligitur à Galeno 6. de morb. vulg. 1. com. 5. ubi hoc verborum ornatu discurret: quicquid in venis serolum, tenuèque cum sanguine mixtum est, id à rene in se ipsum trahitur, cumque meatus, per quos id in ventriculos renum illabitur, latius aperiuntur, etiam aliquid ex crassioribus simul influit: quare Galenus vult apertos, & latis meatus esse causam lithiasis, & necessariò concurrere in generatione passionis lithiasis; cæteræ verò causæ non necessariò concurrunt, quia, ut diximus, inveniuntur senes calore nō solum renum, sed totius corporis priuati, qui calculos patiuntur, & deinde inveniuntur, qui renibus sunt calidissimis, & excrementis crassissimis sunt referti, qui nunquam patiuntur, vel passi sunt lithiasim affectionem, quare, si necessariò non concurrunt calores, & lentiores, neque necessariò indicationes à crassitie humorum, & à calore intenso hauriemus.

*Vt errāt, qui  
in lithiasi  
vtuntur re-  
frigerantibus.  
Obiectio.*

*Sol.*

*Obiectio.  
Sol.*

*Vt errant  
aliqui Græci  
de lithiasis  
causis lo-  
quentes.*

*Tophos quo-  
que cōresce-  
re ob calorem  
moderatum.*

Hinc errant illi Empyrici, qui refrigerant miseros senes lithiasim passionem habentes, qui sunt calore exuti; refrigerat enim aquis ther-  
marum, sero lactis, credentes excessum caloris necessariò concurrere  
ad gignendum calculum: nec obiciant dicentes, quòd necessariò cal-  
lor conspirare debeat, vt tennes partes resoluantur, & crassæ relin-  
quantur, quoniam occurrimus in omni viuente corpore, quamuis sit  
secundum totum frigidissimum, tantum esse posse tennem calorem qui  
possit temporis spacio lentorem illapsum cogere, & condensare. Si-  
militer, neque obiciant, non fieri lapillos sine crassitie humorū; quo-  
niam nos concedimus, in omni viuente esse posse tantam crassitiē hu-  
morum, quæ si in renibus moraretur lapillum efficeret: negamus tamē  
illum calorem, vel crassitiem illam, quæ sunt præter naturam, & quæ  
alliciunt medicum, & quæ debent tolli contrariis conspirare semper  
in arenulas, vel lapillos gignendos, cum in omni homine non pituito-  
so tanta sit pituita, quæ vnum lapillum efficere possit, & propterea re-  
prehendimus illos, qui in omni lithiasi vtuntur refrigerantibus, vt se-  
minibus mellonum, sero lactis, & similibus: vel illos, qui semper attē-  
nuantibus, & incidentibus vtuntur, quasi arenulæ fieri non possint si-  
ne stomachi, & totius corporis repletione crassorum excrementorum,  
& quasi, non inueniantur biliosissimi homines, qui sanguinem, & cæ-  
teros humores tennes habeant, qui lithiasim patiantur affectum. Pa-  
tet igitur auctoritate Galen. & experientia, crassorum humorum do-  
minium, & caloris excessum nō esse semper causas per se calculorum,  
vel arenularum; sed esse latos & reclusos meatus hepatis, venarum  
emulgentium, & renum, qui necessariò in lithiasi affectu concurrere  
debent. Hinc errant Græci vt Paulus, Ætius, & Alex. qui vbi de hac  
re loquentes dicunt, caloris excessum esse causam efficientem lithiasis,  
quæ opinio, vt ostendimus, reluctatur experientiæ, & Galeno, qui 6. de  
„ morb. vulg. 3. com. 15. habet hæc verba; calor autem vel mediocris ad  
„ hanc cogendam materiam satis est, si quidem in calidis aquis spontè  
„ scaturientibus, & si repidiores sunt moderatis, concreescere tophi con-  
spiciuntur. Quid clarius vnquam explicuit Galenus, dicēs quòd pos-  
sit esse causa efficiēs calculi calor moderatissimus, & quòd ob moram  
diutinam resoluatur humidum à quoque leuissimo, & repidissimo  
calore: Hinc in vesica, quæ longè est frigidior renibus tum ob substan-  
tiam nerueam, tum ob cavitatem, in quam aër perpetuò permeat post  
excretionem lotij, ne detur vacuum, in vesica in quam lapides con-  
creescunt, vbi est tam diminutus calor; quo pacto ergo caloris excessus  
erit efficiens causa lapilli, & arenularum? qua ratione igitur in sene an-  
nis obdito lithiasi affectione cathenato laudent refrigerantia? vt nuper  
fecit Empyricus qui tractauit hominem, in vltimo, senio constitutum  
hac passione vexatum, refrigerantibus: quo pacto, si tophi, & lapilli à  
moderatissimo calore fieri possint, volunt semper in lithiasi renes re-  
frigerare?



*Secundum exemplum errorum ob Meatus par. ignoratos est, dum Galenus dicere videtur in renibus esse cribrum.*

CAPVT VIII.

**P**RÆTEREA, vt decem conditiones partium nostri corporis diligentius expendamus, à quibus esse specificum affectuum colligitur, valdè prodesse poterit, si eas applicabimus plurimis corporis partibus; dum loquimur igitur de meatibus, se offert, vt proponamus illud erratum nonnullorum antiquorum, & ipsius Galeni, qui credebant in renibus esse quosdam meatus, qui emularentur cribrum seu colatorium, per quos dicebant lotium sincerum percolari, vt portio sanguinea superne detenta renes aleret, addebantque cribro hoc dilatato atque recluso ab aliqua causa præter naturam aperiente, sanguinem deinde egredi cum lotio. Quis amabo certo scire poterit, an in renibus sit hoc cribrum seu colatorium, nisi ipsos renes inspiciat, aperiatque, & contempletur renum figuram, situm, meatus, & reliquas enarratas conditiones? quoniam ex harum conditionum, vel differentiarum partium corporis inscitia necessariò prauæ affectuum debent fieri intelligentiæ, & omnino à veritate alienæ; & ex mala intelligentia partium corporis indicationes deinde hauriuntur sepiissimè transcendentes, & falsæ, vnde variis modis miseri læduntur ægrotantes: audias igitur cum anatomicis nostris quo pacto sint constituti renes, si vis cognoscere, an in ipsis sit cribrum, nec ne: in primis tam à vena maiori, quam ab arteria oriuntur emulgentes, per quas à renibus fit perpetua attractio ichoris sanguinis; emulgentes deinde ingrediuntur corpus renum, & coeunt simul in vnum truncum, qui deinde in ramos diuiditur, qui per vniuersam renum substantiam disseminantur, vt renes sanguinea portione nutriri possint; sed, cum serosa portio, vt inutilis, debeat propelli à renibus, & nulla adsint foramina sensibilia (vt oculis cognoscitur in anatomia) quæ imaginem habeant cribri, vel colatorii, eadem serosa humiditas penetrat quasdam renum eminentias, quæ sunt ramulis dispersæ, & per has in vtreteres stillat, vel percollatur, & deinde ad vesicam per meatus vtreteres qui sunt sensibiles procumbit; quare experientia patet, non dari hanc membranulam, quæ sit appositæ finibus sunculorum emulgentium, & quæ cribri imaginem exprimat gratia retinendi sanguinem; vt observatur in meseraicis venis gratia quoque retinendi sanguinem, quoniam sagax natura ex ipsa mer substantia renum procreauit quasdam eminentias, quæ ingrediuntur in ramulos illos dispersos, quæ eminentiæ obstant, ne sanguis dilabatur. His rebus factum est, vt quando lapillus renum detruditur ad vesicam, eminentiæ hæc diuellantur ac aliquæ lacerentur, vt exinde fluat sanguis cum vrina, donec natura errorem illum correxerit; adeò vt cribrum, vel colatorium sit abiciendum, cum re vera nulla membrana perforata, vel nihil, quod cribri specimen declaret, inueniatur; neque

*Errare videt Galen. ad. mittens cribrum esse in renibus.*

*Vt constituti sint renes.*

*In qua errata incidit, qui admittunt cribrum in renibus.*

ab anatomicis diligentissimis obseruetur; quapropter, si obtigerit de-  
flui sanguinem cum lotio, non erit credendum cribrum esse dilatarū,  
& propterea indicationes astringendi, vel incrassandi esse hauriendas,  
vt facerent illi, qui cribrum seu colatorium admitterent: vt ex iis co-  
gnosce-re possimus, in quot errata inciderent, supposito cribro, vel co-  
latorio.

*Tertium  
exemplum  
errorum eb-  
mentum igno-  
ratos esse dū  
Galen. ad-  
mittere vi-  
detur cribrū  
ossi in osse cu-  
neali.*

Præterea veteres Medici, inter quos est sapientissimus Galenus, ex-  
cogitarunt esse aliud cribrum in osse cuneali, vbi est sinus ille equi sel-  
læ similissimus, dixeruntq; quemadmodum in renibus percolatur lo-  
tium, & à sanguinea parte per cribrum secernitur; simili modo in osse  
cuneali, vbi insidet glandula colligens excrementosam pituitam cere-  
bri, debet esse cribrum; putabant enim os cuneale in superficie habe-  
re osseam squamam multis foraminibus peruiam, quæ cribrum specimen  
exprimeret, quo mucosa pituita stillaret, & deinde per nares, & pala-  
tum deflueret. Hæc sententia non debet reiici rationibus, sed expe-  
rimentis, quare cum nemo anatomicorum sit, qui viderit vnquam in  
superficie ossis cunealis foramina, & aliquid simile cribro, erit explo-  
denda tamquam sensibus, & veritati contraria; in iis enim, quæ perti-  
nent ad sensum, nulla debet esse disputandi occasio, nec rationes vllū  
habent locum: reiiciemus tamen errata, quæ falsa illorum principia, &  
positiones sequuntur, dū dicunt videlicet, cerebri excrementa omnia  
ab illa paruula glandula recipi, & deinde per cribrum descendere, &  
ad nares, & ad palatum procumbere, & propterea errhinis, & mastica-  
toris vtuntur, quasi alia non dentur foramina in capite, nisi illa, quæ  
mittunt ad nares, & ad palatum: errant primo dicentes paxillam il-  
lam glandulam tantū pituitæ excrementosæ acervum recipere, perin-  
de ac cerebrum alios non haberet meatus, quam ossis cunealis.

*Dupliciter  
errant, qui  
sentent glan-  
dulam cu-  
nealis recipi-  
re omnia ex-  
crementa ce-  
rebrī.*

*Quæ, & quos  
sint capitis  
foramina.*

Secundò errant, dum in omni destillatione vtuntur errhinis, & ma-  
sticatoriis, quia alia plura sunt foramina capitis; per quæ pituita secer-  
nitur. Audias igitur foraminum omnium capitis breuissimam histo-  
riam, nam alia vix inueniri possunt; os cuneale habet decem, & septem  
foramina propria, in temporibus octo sunt, in occipitio septem; dein-  
de quatuor foramina maiora sunt illa, quæ sunt communia syncipiti,  
cuneali, & temporibus, duo sunt in fronte, in maxilla vero superiori  
sex obseruantur foramina propria, communia verò maxillæ septem;  
deinde inferior maxilla habet duo; præterea quatuor sunt foramina  
communis oculis, maxillæ superiori, & ossi frontis, & alia aliquando  
in aliquibus caluariis obseruantur, quia re vera nunquam seruat in  
omni cadauere idem foraminum numerus ad vnguem; de qua re no-  
strum non est hic agere, satis enim mihi est ante oculos ponere pluri-  
mos meatus sensibiles esse in caluariis, de quibus Columbus, & Vesa-  
lius diligentissimè tractant: per hos igitur meatus aditum expeditissi-  
mum habent recrementa, vt sit ridiculum credere paruulam illā glan-  
dulam cunealis omnia cerebri excrementa recipere, & credere, quod  
omnia foramina ad nares, & ad palatum excremēta mittant. Ex quo-  
rum omnium meatuum cognitione in reuellendis, & detruendis ex-  
cremen-



clementis summam intelligentiam colligemus, quoniam nisi meatus per quos meare possunt humores cognoscemus, neque reuellere, neque detruere sciemus.

*Quartum exemplum errorum ob meatus partium ignoratos est, dum dicunt Traulos, & Balbos ob insempericiem humidam capitis fieri.*

C A P U T IX.

**P**RÆTEREA, ut plurimis & conspicuis exemplis ostendamus affectum genericum ob meatum varietatem fieri sæpe specificum, proponamus illos affectus, qui aperte docere possunt veram esse hanc nostram methodum, ut sunt trauli, balbi vel semilingues, qui habent tale specificum esse ob quosdam meatus existentes in maxillis: Trauli igitur illi vocantur, qui in locutione literam *r* non possunt exprimere; ut autem huius affectus immediatam causam consequamur, proposita nostra methodo est incedendum, proponendo decem illas enarratas condiciones partium corporis, & ex sufficienti enumeratione illarum colligere, quæ conditio ex illis faciat affectum specificum, veluti dicendo non fieri traulos ob figuram læsam instrumentorum pertinentium ad locutionem, quia nos vidimus figuram partium ad locutionem conspirantem eandem esse in iis, sicuti in cæteris hominibus; pergas deinde dicendo, non ob substantiã, situm, progressum vaporum, vel exordium læsum; quoniam eadem seruetur substantia instrumentorum pertinentium ad locutionem in iis, ut in aliis hac affectione priuatis, idem particularum progressus, & situs, & illudmet instrumentorum exordium. Similiter dicere valemus, traulos non fieri ob temperaturam linguæ, & cæterarum partium conspirantium ad locutionem, quia illi, qui malè exprimunt *r*, inueniuntur modo frigidi, modo calidi, modo humidi, modo sicci tam secundum totum, quam secundum omnes partes, ut trauli modo abundant sputis, modo priuètur, modo calidi, modo frigidi sint; quare temperatura traulos nullo modo constituet; inferas ergo post sufficientem enumerationem conditionum, traulos tales esse ob aliquam varietatem meatus existentium in instrumentis pertinentibus ad locutionem; quoniam non datur alia differentia partium illarum, quæ possunt affectum aliquem facere, nisi illa decem, quarum, si nouem optima ratione aliqua excluduntur, decima est illa, quæ dat esse specificum affectibus tam naturalibus, quàm morbofis; si aliquis igitur erit traulus, erit ob nimios, vel ob plures, & situ differentes meatus existentes in instrumentis pertinentibus ad locutionem. Instrumenta verò ad locutionem pertinentia sunt pulmo, trachea, larynx, lingua, palatus, dentes, & labia, dicas deinde, nullam illarum decem conditionum in omnibus iis instrumentis obseruari in traulis, quæ ad vnguem non obseruetur in iis, qui quam

*Qua morbi inueniuntur traulorum specifica causa.*

*Qua sunt instrumenta ad locutionem pertinentia.*

optimè loquuntur, præter illam differentiam, quæ consistit in meatibus, ergo meatus facient traulos, eritque affectus in conformatione, & nequaquam in intemperie: sunt enim in media palati regione, id est, in quarto osse superioris maxillæ in illis omnibus quos hucusque viderim, qui hanc iteram & exprimere non possunt duo foramina, quæ nullo modo adeò aperta, & obuia inveniuntur in iis, qui illo affectu carent, ergo causa immediata, quæ posita ponit, erit duo illi meatus aperti, & affectus erit in conformatione.

*Methodus  
inueniendi  
balborum &  
semilinguam  
immediatam  
causam.*

Eadem methodo balborum, & semilinguam immediatam causam perquirimus percurrentes decem illas differentias instrumentorum pertinentium ad locutionem, dicendo, id non fieri ob figuram, quoniam eandem obsident figuram balbi, & non balbi: neque ob substantiam illarum partium, vel progressum venarum vel nervorum vel ob exordium aliquod læsum, quoniam partes ad locutionem conspirantes neque in substantia, vel progressu, vel exordio, vel situ variantur; sequitur ergo esse ob meatus; sicuti enim diximus in media regione palati observari duo meatus, qui faciunt traulos. Similiter observamus iuxta dentes foramina (omnibus iis tamen ab ortu nature congenita) minor, per quæ pituita stillans, vel irrigans linguam in parte illa anteriori lesam locutionem facit, unde balbi, & semilingues fiunt; nec propterea dicendum est balbos fieri à capite pituitoso, vel à cerebri humida intemperie; quoniam in qualibet valde sicca cerebri intemperie tanta colligi potest pituita, quæ procumbens per illam partem irrigatè linguam, & balbos facere possit, quæ pituita, si in maxima quantitate per alia foramina maxillæ descenderet, & buccam impleret, non balbos propterea faceret.

*Ut errat, qui  
dicunt trau-  
los & balbos  
fieri ab hu-  
mida intem-  
perie capitis.*

Communis ergo sententia, quod trauli, & balbi, & semilingues fiât ob nimiam cerebri humiditatem aduersatur experientie; etenim quomodo nimia capitis humiditas erit causa traulorum, vel balborum, si non est semper & de omni? Quis non videt lesos aliquos aliquando summa capitis siccitate esse præditos, & viceversa plures inueniri insigni humorû diluuii correptos quos pituitosa excrementa ab ortu nature ad ultimum usque sunt comitata diem, qui locutionem ita facilem atque expeditam habent, ut nihil in locutione exprimitur, quod vacillet. Quin tandem hoc somno excitabimur in reiiciendis his omnibus causis, quæ non sunt adæquate, & conuertibiles? ut illos reiiciamus; qui afferunt causas, quæ non sunt de omni, quippe quæ neque infimum necessitatis gradum sapiunt, quo nihil ineptius, aut stolidius in philosophia proferri potest; causas enim, quæ perpetuò veræ sunt & in omnibus, mulierculæ, & rustici conantur venari, & quæ solum in aliquibus, vel aliquo tantum tempore veræ existunt, à pueris quoque reiiciantur. Quia veræ causæ debent esse de omni, per se, & conuertibiles: omnes enim, qui sunt lesa iteriti locutione, ut experientia docet, habent meatus maiores circa dentes, & versauice: simili modo, omnes trauli habent meatus in palato circa quartum os maxillæ, & viceversa. Quate cum intemperies cerebri humida non concurrat



currat in his affectibus, nescio quo spiritu diuinus Hippocrates ediderit aphorismum 32. 2. sectionis, Balbos fluxu tentari ob intemperiem frigidam, & humidam capitis, cum æquè frequenter eueniant fluxiones in balbis, vt non in balbis: nili dicamus in Aphorismo Hippocratis explicari causam aliquam remotam, quæ aliquando iuncta cum proxima affectum facere posset, & propterea Aphorismum aliquando solum, & non semper verificari posse.

*Aphorismus Hippocratis de balbo non semper verus.*

Similiter, nescio quo consilio ductum Oraculum apud Herodotum citatum dedit balbutienti responsum, vt in Lybiam regionem calidam se transferret, nisi hac communi doctrina percitum, quod scilicet balbuties oriatur à causa humida, & frigida; & propterea cum in Libya regione æstuet calor, crediderunt illi sacerdotes callidi, & vatri balbutientem ad eò posse calefieri in loco illo calido, vt tota humiditas consumi possit, quod est impossibile; quia prius vita, quam tota humiditas stillans, & irrigans linguam adimeretur; atqui sacerdotes parum in anatomia occupati, & maioribus rebus dediti secuti sunt communem, sed falsam sententiam, quæ erat quod balbuties à frigidityte, & humiditate cerebri semper prodiret: colligas ergo esse prorsus impossibile, vt specificos affectus cognoscamus, nisi partium affectarum perfectè sciamus, & cognoscamus illas decem conditiones, quæ sunt situs, meatus, figura, compositio, temperatura, substantia, numerus, progressus, officium, & exordium partium affectarum; quia in examine harum conditionum semper facilè inueniemus esse, & naturam specificam affectuum omnium.

*Vt errat Oraculum respondens balbutienti vi in Lybiam.*

Postremò tot sunt affectus, qui ob meatus nimium apertos, vel nimium oclusos fiunt, vt non sit mirandum, si Methodici tam facilè in illum errorem inciderint, quod omnium affectuum origo essent meatus nimium aperti, vel nimium clausi, vel mixtum ex iis, quoniam raro obseruantur morbi, qui ob meatus læsos non seuiant; audias quem morbum obseruat Auicenna, sena. doct. 4. capite 1. qui fit ob quandam meatum oclusum, diciturque quod colica aliquando contingere solet ob meatum felleum oclusum, veluti quando angustia fit in surculo illo, qui à porro felleo descendit ad intestina, tunc enim angustia transitum bilis ad intestina impedit, vnde non irritatur expultrix intestinorum, & per consequens retineantur feces, & ob moram durefiant. Et quia colum intestinum est omnium maximum, & imbecillum colligit magnam fecum copiam, & postquam est obfartum atque onustum, intentus dolor gignitur, qui non tollitur medicamentis soluentibus (vt putant Empyrici) quia attrahunt nouam materiam, vnde maior fit humorum obfartus, & per consequens maior dolor excitatur, neque tollitur Hiera, vel cæteris exsiccantibus, quia magis exsiccantur, & magis durefciunt feces; neque tollitur clysteribus, quia clausum est colum intestinum, sed solum tunc est fidendum oleo amygdalino dulci ad semilibram per os assumpto: videas ergo quo pacto meatus oclusi, vel aperti dent esse specificum affectibus: quomodo autem cognoscatur, quando hæc

*Ostenditur colicam aliquando contingere ob meatum felleum oclusum.*

*Vt errant, qui pharmacis colum dolori auferre volunt.*

proposita ægritudo fiat ob angustiam, & an angustia fiat à materia obstruente, vel ab affectu alio comprimente, vel à coalescentia, in primo lib. methodos tradidimus, quæ omnes affectuū ideas genericas promptè docere possunt, hic verò illæ conditiones, vel differentiæ partium corporis, quæ nos possunt docere specificas, & vltimas affectuum differentias, quæ sunt situs, meatus, compositio, & cætera, proponuntur, quæ maximè conferre poterunt proposito nostro.

*Errant, dum in temperatura perquirenda paralogizant, & sumitur in exemplum cor, ut pars omnium præstantissima.*

## CAP. X.

**I**NFINITI propemodum affectus specifici tam naturales, quàm non naturales à temperatura prodeunt; sed quoniam præcis, & modernis temporibus, medici semper faciles fuerunt ad credendum, affectus prodire à temperatura, ut abundè ostendimus in 1. libr. capite 22. propterea non decet, ut nos acta agamus, & conspicua & comperta exemplis illustremus. Veruntamen mihi videtur in cognitione temperaturæ partium illud plurimis negotium facessere, & rudiores in plurimos propterea elabi errores, dum non distinguunt temperaturam totius à temperatura partium; incidunt enim in paralogismum dum à partibus ad totum procedunt, veluti de corde loquendo ostendi potest, partes enim solidæ cordis omnes sunt frigidæ, attamen totum cor est calidum, ut sit paralogismus, dum dicunt, omnes partes cordis sunt frigidæ, ergo cor est frigidum, non valet; nec valet, totum cor sua natura est calidissimum, ergo & partes omnes, quoniam re vera tantum abest, ut partes cordis sint calidissimæ, ut potius sint frigidæ: atqui, ne hoc videatur paradoxum, excutiamus hanc materiam; & in primis, quibus nitantur auctoritatibus, in medium afferamus. Est igitur Galeni locus pro illorum sententia §. de loc. affe. 1. ubi hac verborum serie de corde dicit, declarauimus in aliis libris, cor esse veluti fontem innati caloris, & in lib. de fœtus formatione habent, cor esse animalibus inditum, ut esset focus ignis, & libr. de vsu. par. 6. cor caloris natiui quo animal regitur, esse quasi fontem quendam, & domicilium, ex iis alogiatri colligunt, cor secundum omnes partes esse calidissimum, adiungunt quoque Galeni placitum 8. de vsu par. cor nimirum esse refertū arteriis, & venis, quibus nulla est calidior in corpore animalis particula, quare si nulla particula est calidior corde, res erit certissima, quod secundum omnes partes cor sit caloris ferax. Præterea referunt Arist. loca lib. de sens. & sensib. cap. 2. ubi scribit, cor esse oppositum cerebro, quare si cerebrum est frigidum secundum omnes partes, erit quoque cor calidum secundum omnes partes.

Hanc sententiam in hoc loco reicere constitui, tum, quia de hac fabella semel disserui cum Empyrico, tum, ut hac occasione declarare possim,

*Est paralogismus dicere omnes partes solidæ cordis sunt frigida, ergo totum cor.*



possim, cuiuslibet visceris diuersam esse intemperiem totius, & partium, & nullam esse consequentiam à partibus ad totum, neque à toto ad partes, quia Aristot. 7. meth. text. 60. dicit, quod syllaba ba non est ipsa elementa, nec idem quod b & a, sed aliquid aliud, & 8. meth. text. 15. habet hæc verba, totum non est quasi coaceruatio partium, sed ipsum totum est aliquid aliud præter partes: & 12. meth. text. 22. dicit, formas simplicium esse alias à formis compositorum; hæc sunt principia quæ nos docent, cur à partibus ad totum non valeant consequentia. Causa autem cur temperaturam cordis proposuerimus est, quia cor est omnium viscerum principalissimum; vnde singulari hac præceptione rudiores, qui de re medica consulunt, admoniti poterunt de quolibet viscere intemperiem partium, & totius expendere, vt diuersam: & aliquando contrariam, vt de corde dictum est.

*A quibus fontibus colligitur à toto ad partes, vel à partibus ad totum, nullas esse consequentias.*

De cordis igitur temperatura dicimus, quod constat ex panniculis, & membranis, cartilaginibusve, & neruis à 6. pari prodeuntibus, quæ vniuersæ partes sua natura sunt frigida, quod fundamentum confirmatur Galeni testimonio, & Auic. in sua anatomia: Galeni, quia 3. de alimentis cap. de visceribus pedestrium habet, cordis substantiam esse carnem fibrosam, ac duram, ideo cor coctum esse difficile, & tardè permeare, quare si habet carnem fibrosam, & fibræ naturaliter frigidam substantiam obtineant, vt omnes consentiunt; cordis partes similes erunt frigida. Similiter Aristot. 1. de hist. animal. c. 16. & cap. 30. habent cor iungi arteriæ vinculis fibrosis, è quibus componitur, atqui hæc partes frigida sunt, ergo constat cor ex partibus continentibus sua natura frigidis: quare nulla erit consequentia, cor est fons caloris, ergo partes solida sunt calida, quia cor est dissimulare, cuius munus per motum systolis, & diastolis est gignere spiritum vitalem; neque potuisset gigni calor ob motum, nisi partes continentes fuissent duræ, & fibrosæ, & per consequens frigida, quoniam calor, qui à motu pendet fit ob collisionem corporum durorum. Quare erat necessariū, vt in corde duo obseruarentur temperamenta, aliud videlicet totius, & aliud partium; nullum enim est inconueniens, vt cor secundum totum sit fons caloris, & sit calidissimum; secundum partes continentes sit frigidum, secundum verò contenta, & impetum facientia. quod est secundum sanguinem arteriosum, & spiritum vitalem, sit calidissimum.

*Ostenditur omnes partes similes cordis esse frigidas.*

*In corde duo temperamenta.*

Quare posita hac distinctione temperaturarum, omnia argumenta cadunt, & euanescent, quinimo clarè vidimus, illa omnia argumenta esse à partibus ad totum, quæ argumenta sunt à diuisis ad coniuncta, vbi idem sensus non seruatur in antecedentibus, & consequentibus, & sunt argumenta falsissima, reiectaque ab Aristot. in libr. periherm. & alibi, de quo paralogismo in libr. de analogismo, & de falsa experientia quoque agemus. Concludimus ergo, solidas partes cordis esse frigidas; ratio autem, cur à natura contextum sit cor ex frigidis, & diuis partibus, desumitur ab Alberto Magno libr. de sen. & sensa. tract. 1. cap. 16. quæ est, vt magis resistat alterationibus, & perpetuis motionibus. Natura enim rerum opifex sagacissima propter finem agens, sem-

*Cur partes solida cordis frigida. & dura facta sint.*

per id quod melius est efformat ; composuit carnem illam habentem mediam quandam naturam inter carnem , & neruofam substantiam, vt dicit Alex. Aphrodiseus 1. de anima, vt ratione carnis neruis mollioribus præditæ sensum, ratione verò nerui durioris systolem , & diastolem cor haberet.

*Exemplis declaratur , Medicos ob substantiam partium corporis ignoratam in plurimos posse incidere errores.*

# CAPVT XI.

*Vt Empyri-  
cus errat ob  
partium sub-  
stantiã igno-  
ratam , dum  
vidit emun-  
gi os putridũ.*

**C**OMPERTVM hætenus est, corporis nostri partes, nunc ob situm mutatum à statu naturali recedere, nunc ob meatus impeditos, nunc ob temperaturam alteratam, & aliquando ob variam substantiam partium alterari, & variis affectibus præter naturam coinquinari; substantiam partium vocant medici secundas qualitates, vt duri- tiem, & crassitiem, & reliquas qualitates, quæ insequuntur temperatu- ram partium ab ortu naturæ. Proponamus ergo exempla, in quibus aliquem specificum affectum cognoscere possimus, qui immediatè à partium substantia læsa factus sit; age, exordiamur ab aliquo ossium affectu facto ob ossium substantiam; obseruantur duo ossa in interno naso sita spongiosa, & inæqualia, vbi mucus retinetur, quæ ob suam substantiam mollem, vel spongiosam, & corruptioni obnoxiam à gal- lico tabo tam faciliè eroduntur, vt lue infecti, dum emungunt, cum muco ex naribus aliquando detrahant horum ossium frustulum; quod si accidit, vt Empyrici videant, ad eò admirantur, vt credant morbum gallicum iam corrupisse cætera omnia capitis ossa, quia credunt omnia ossa esse eiusdem substantiæ: vidi enim Empyricum non edoctum ho- rum spongiosiorum ossium substantiam credentem ob exitum frustu- li ossis corrupti cætera omnia ossa capitis macuisse; est igitur necessa- rium in cognitione, & curatione illa principia morborum scire, à qui- bus esse specificum morborum pendet, & hæc sunt decem illæ condi- tiones propositæ, quæ in omni corporis particula affecta debent con- siderari, vt ad specifici cognitionis apicem perueniamus, Empyricus enim, vbi præcognouisset substantiam illam spongiosam corruptioni obnoxiam, & situm illorum ossium, non fuisset admiratus illorum os- sium conuptelam, & non ita turpiter in talem incidisset errorem.

*Vt dolor gra-  
uissimus spi-  
na sit conuul-  
siuus ob di-  
uersam eius  
substantiam.*

Præterea, vt superius diximus, ob diuersam substantiam spinalis medullæ in eadem quoque variæ atque diuersæ dolorum species sunt, quoniam, si ex capite pulsus catarrhus per spinalem medullam descen- dat vsque ad extremum thoracis, dolorem grauatiuum faciet, si verò ultra procumbat per medullam videlicet, quæ ad lumbos, & os sacrum pertinet, dolorem intensissimum extabit, ecce quod dolor, qui erat paulò antè grauatiuus in eadem medulla, sed in parte, vbi est mollior, in eadem medulla, vbi est durior, transit in conuulsiuum dolorem; quod



quod experientia obseruatur, quæ cum ita sint, quomodo sine cognitione substantiæ partium distinctè affectus cognosci poterunt? vellem sanè audire medicum non excultum hac nostra methodo, qui horum dolorum varietatis rationem, & causam traderet; quia nō possum credere, quin in errores incideret; etenim arbitror illum dumtaxat specificas essentias facilè perquirere posse, qui cuiuslibet partis affectū perquireret decem propositas conditiones, verbi gratia, ne recedamus ab hoc exemplo, si velles perquirere, vnde immediatè prodeat, quod in medullæ spinalis superiori parte dolor fiat grauius, in inferna verò conuulsius; tali pacto vti posse; methodos sufficientissimam videlicet enumerationem faciendo omnium illarum decem conditionum, dicendo medullam existentem in osse sacro conuulsio vexari dolore, vel ob situm, vel figuram, vel meatum, vel tēperaturam, & sic enumerabis omnes, quia illarum aliqua erit, quæ dat esse specificum affectibus, quos perquiris; & deinde enumeratis, & ob oculos collocatis omnibus, statim inuenies in spinalis medullæ parte inferna, de qua loquimur, trucem esse dolorem ob eius duriorem substantiam; ratio est, quia vbi pars est durior, ibi solutio continui fit violentior, vbi violentior, ibi dolor maior; quare, cum in vertebris superioribus vsque ad duodecimam thoracis medulla spinalis seruetur mollis, & cerebri substantiam, & mollitiem æmuletur; propterea sine violentia solutio continui fit, in lumbis verò, & in osse sacro spinalis medulla euadit durior, & neruis assimilatur, vt propterea sentiarur dolor cōuulsius, qui est neruorum proprius; ecce igitur, quòd substantiæ varietas nōs facilè docet differentiam hanc doloris spinalis medullæ, nō situs, non figura, non meatus, nec ceteræ conditiones enarratæ, quæ tamen aliis affectibus, vt ostendimus, & ostendemus, dant esse specificum.

Ex hac malè cognita, & perspecta substantia partium nostri corporis, Galenus quoque videtur aliquando in falsas corruare sententias, & præcipuè vbi agit de cerebro, & cerebello, credidit vir sapientissimus cerebrum esse molius cerebello, & cerebellum esse durius cerebro; ex qua falsa positione plurima emersere inconuenientia, quod igitur cerebrum, & cerebellū æquè mollia sint, patet sensu; omnes enim, qui experiuntur digitis propriis mollitiem cerebri, & cerebelli, æquè mollia iudicant. Quinimo Anatomici omnes, qui diligentissimè secauerunt humana corpora, & omnia anatomica scripserunt, qui Galeno, dum à verò deflexit, non pepercere, tenent, æquè molle esse cerebrum, & cerebellum.

Cæterum audias quorū falsa, & inconuenientia prodeunt ex hac duritie cerebelli falsò supposita, primo dicunt, neruos, qui sunt motui destinati, propterea prodire à cerebello, & non à cerebro; quia cerebellum est durius; in his verbis duo, quæ falsa sunt, continentur; primum, dum dicunt; cerebellum esse durius; secundum, dum dicunt, à cerebello prodire neruos, quod est falsum; quia auctoritate anatomicorum omnium patet, & sensu ipso, qui magis potest, omnes neruos à cerebro pendere, & nequaquam à cerebello.

*Qui dicit cerebellum esse durius cerebro in plures alios incidit errores,*

*Duo errata sequuntur ex duritie cerebelli supposita.*

*Errare videtur Galenus si dicat secundum par nervorum cerebri non dare motum.*

*Omnes nervi dant motum, opticus exceptus.*

*Errare videtur Galenus, dicens septimum par nervorum à cerebello oriri.*

*Idem in de tussibus.*

*Ignorata substantia locorum affectionum igno- rantur indicationes, ut sales, curatio- nes, & præservatio.*

Secundo, ut ostendant ipsi nervos prodeuntes à cerebro sensum, & non motum præstare, dicunt ex sententia Galeni, secundum par nervorum prodire à cerebro, & propterea sensum, & non motum porrigere, quod est falsissimum, quia secundum par nervorum præstat motum, & sensum, motum musculis oculorum, & palpebrarum superiorum, & musculis qui oriuntur à processu styloide: quare erit falsa illa Galeni sententia, si univ ersali er sustinebitur, quod videlicet nervi cerebri sensum præstent, & non motum, omnes enim nervi, opticis exceptis, præstant sensum, & motum, quare ego Galenum nescirem defendere, si ita est intelligendus, ut dicat omnes nervos cerebri dare sensum tantum, cum ipsemet Galenus fateatur, secundum, tertium, & quartum paria nervorum oriri à cerebro, quæ nervorum paria ex omnium consensu dant non solum sensum, verum etiam motum.

Tertio errare videtur Galenus, & ab anatomicis non defenditur, dum dicit, septimum par nervorum à cerebello oriri, & propterea ob suam duritiem tantummodo motum perhibere, quod videtur esse falsum, quoniam hoc septimum par antequam calvaria egrediatur à spinali medulla exoritur, & deinde mittit furculos musculis lingue, hyoidis, & laryngis, quibus & motum, & sensum perhibet; & quâvis egrediatur hoc septimum par perforamen obliquum occipitis, non propterea à cerebello exoritur; sed à spinali medulla, quæ ex opinione omnium anatomicorum, & ex sensu ipso prodit à cerebro; quinimo spina videtur conspicientibus ipsam esse cerebri progressus, quæ similiter obducta est pia, & dura matre: postremo ex hac substantia cerebelli malè percepta errata, quæ sequuntur, non solum stant in opinionibus, verum etiam in operationem transeunt, quoniam, qui dicunt cerebellum esse durius cerebro, & propterea nervos destinatos motui à cerebello pendere, & non à cerebro, si viderent musculos, qui sunt induti secundo, & tertio nervorum paribus, quæ ex omnium consensu prodeunt à cerebro, non explere suorum officiorum munera essent coacti in curatione confugere ad cerebellum, ad occipitium videlicet, ut eliderent symptomatum radicem, & non ad cerebrum, à quo (ut aiunt) nervi motui dediti nullo modo prodeunt.

Videant ergo omnes, quor errata contingant ob unicam petitionem principij quæ erat, quod cerebellum esset durius quæ positio, ut probauimus, est falsissima, quare colligimus tanti debere esse præcognitionem substantiæ partium affectionum, quanti ferè est sanitatis, & bonæ valetudinis adeptio, quoniam ignota partium affectionum substantia, ignorantur indicationes vitales, curatiuæ, & præservatiuæ, vitales; quia alio modo est corroboranda pars mollis, & alio modo pars dura; curatiuæ, quia modus specificus curandorum morborum pendet à parte vivente, tanquam à proprio subiecto, quod ingreditur definitionem passionis: præservatiuæ, quatenus substantiæ partium varieg, ut molli- ties, durities, crassities, raritas, gravitas, leuitas, lentor, & friabilitas, & reliquæ secundum magis, & minus læsæ varia causant symptomata: quare ignorata substantia partium ignorantur indicationes, ignoratis indica-



indicationibus non methodo, sed casu, vel cæcorum more in affectuum curatione procedimus.

Demum proponimus illud erratum Galeno adscriptum, dum loquitur de substantia appendicæ ossium 9. de usu par. dicens appendices esse duriores ossibus, quod videtur omnino falsum, quia appendices ossium sunt spongiolæ, & molles, & facilius franguntur dentibus, quam ossa, quinimo sunt succo refferæ, & propterea ob earum molliorem ad eum maximè accommodatæ, ut omnes admittant esse molliores ossibus. Adfunt plurimi, qui defendunt Galenum, interpretantes per ossa partem illam, qua appendices committuntur ossibus; quæ expositio merito non recipitur, quoniam expositio est nimis voluntaria, dum dicunt Galenum per ossa intelligere partem, qua committuntur appendices, debebant porius postquam voluntariè voluerunt interpretari dicendo, quod per ossa intellexerit appendices, & per appendices ossa, eadem enim esset interpretandi licentia, arbitror ego potius mendum fuisse in codice, quia non est rationi consentaneum credere, quod Galenus nunquam comedisset appendices vituli, pulorum, & aliorum animalium, in quibus omnibus appendices sunt molliores ossibus, quod non solum pueri, & rustici sciunt, verum etiam canes, & lupi, ut omnino reiiciendi sint illi, qui crediderunt Galenum nescivisse appendices esse molliores ossibus. Semper enim Galenus decem propositarum conditionum partium fuit studiosissimus; optimè enim novit non solum affectum specificum pendere modo à situ partium, modo à meatibus, modo à figura, & modo à substantia, & à cæteris enarratis: verum etiam affectuum cognitio, & curatio, veluti loquentes nos de appendicibus, si in aliquam dyscrasiam humidam prolaberentur, illico cognita mollior appendicem, supponimus appendices molliores magis pati, quam patiantur ossa, quia ossa magis resistere possunt. Similiter, si quis incipit premi gallica lue in ossibus iuxta appendices, cum sint molliores, & minus resistant, & ocyus patiantur, indicabimus appendices prius esse læsas, quam ossa, & deinde cum topicis, si opus esset affectum delere, appendices prius, quam ossa, essent detegendæ. Ecce igitur, quo pacto nos maximam utilitatem consequimur ob cognitam substantiam partium; idè de aliquarum partium substantia tantum egimus, & in exemplorum formam tradidimus, ut methodum vniuersalissimam cõlequi possimus, lectores tamen adire poterunt sectiones anatomicas, & deinde Vesalium, Columbum, Valuerdem, & alios præclarissimos anatomicos, & ab ipsis colligere, quod certum & exploratum est, quod verò inter illos dubio vertitur, & est perplexum *an sit illa, quæ decernat, & terminet litem;* in hunc modum quomodo omnes corporis partes sint curandæ ocyus, & perfectius addiscant.

*Tertium  
exemplum  
erroris ad-  
scripti Gale-  
no dicenti  
appendices  
esse duriores  
ossibus.*

*Defenditur  
Gal.*

*Ut cognitio  
substantiæ  
prodest cura-  
tioni appen-  
dicum.*

*Exempla errorum ob progressum vasorum ignoratum, dum nescire videntur, sub qua vena cubiti neruus, & arteria maiores progrediantur.*

## CAP. XII.

**P**ROGRESSVS vasorum non solum docere nos poterunt affectuū sympathiam, vt in 2. lib. de neruis, & musculis longis ostensum est; verum etiam vari, atque diuersi progressus venarum, neruorum, & ceterarum partium variis affectibus esse proprium, & specificum dare poterunt; in 2. libr. plurimas methodos proposuimus, quæ declarant nobis mirabiles sympathias humani corporis, quæ fiunt à longo vasorum progressu, hic verò aliqua pauca errorum exempla de venarum progressu afferuntur tum, quia de venarum progressu in 2. lib. nihil diximus, tum vt exemplis lucidissimis incipiamus videre, quomodo progressus vasorum sæpius nos doceant affectus específicos & eorum curationem; pauca tamen exempla proponimus, ne videamur in alienas menses ponere falces: præstat autem in primis proponere illud erratum Empyricorum nostri temporis, quod committitur, dum videntur nescire, sub qua vena cubiti progrediantur maior neruus, & maior illa arteria, quæ pulsum digitis medicorum accommodatum facit; quoniam ex horum vasorum progressu non solum affectus específicos præter naturam, qui in cubiti phlebotomia contingere possunt, cognoscemus, sed etiam in quo vase, vel in qua cubiti vena maius immineat periculum; an videlicet secando basilicam, vel cephalicam, vel medianam, percipiamus. Sed quia hæc, quæ de progressu venarum aguntur, ad sensum pertinent, & rationibus non possunt absolui, & tractari; ideò ad duos iudices erit confugiendum, ad anatomicos scilicet præstantissimos, vel (si inter illos esset dissidium) ad anatomicos; quæ non potest decipere quando diligentissimè secantur corpora.

*Qui sint re-  
sti iudices de  
rebus anatomi-  
cis.*

*Cur immi-  
neat maius  
periculum  
secando basi-  
licam quam  
cephalicam.*

Quæ ad anatomicos, ex illis colligimus, neruum magnum, vel arteriam magnam brachiorum non progredi sub cephalica, & mediana, sed tantummodo sub basilica: audias Columbum, qui hac verborum seriè eandem explicat sententiam capite proprio de neruis brachiorum: propè humerariam, & medianam neruum adesse nullum, propè basilicam verò neruum esse: nullus neruus maior in brachium excurrit, quàm ille, qui subreptus est basilicæ venæ: sub, vel propè cephalicam nulla extat nerui propago. Præterea quantum ad arterias attinet, ex omnium consensu arteria illa magna, quæ facit pulsum medici digitis accommodatum, excurrit sub basilica, & nequaquam sub cephalica, vel mediana.

Quæ cum ita reuera sint, patet quot immineant pericula in secanda basilica, quæ non sit prominens, & conspicua, quare errant nonnulli, qui



qui basilicam secant latentem, & profundam, credentes basilicam immediate iecur deplere, & non cephalicam; modo enim ob sectam basilicam excitantur dolores, modo pars illa venæ vulneratæ inflammatur, & quia subest nervus, contractiones, & spasmi fieri possunt; quia vero subest arteria, potest incidi, & aneurisma fieri, quæ symptomata, si secabitur cephalica, vel mediana contingere non poterunt; quoniam sub his neque nervus, neque arteria excurrit, & quamvis non pungatur nervus, vel arteria, dum læsiones fiunt post sextum cubitum, quod sæpenumero contingere vidimus, dolores maiores concitabuntur circa basilicam, quam circa cephalicam, si quidem confluxus humor extra venam comprimit nervum, & arteriam maiorem; unde dolores pulsariui, & aliquando conuulsiui sentiuntur. Quæ symptomata Strato Erasistratus, & Apemantes in secundo cubito animaduerterunt, quos tamen Galenus lib. de sect. ven. adversus Erasistratos capite 2. non propterea irrisit, quia crederet Galenus, hæc pericula non imminere; sed irrisit Erasistrateos, quia erant αἰμοφίκοι, id est, timentes sanguinis euacuationem, & sanguinis euacuationem semper despiciebant, despiciébantque phlebotomiam, non solum latentis, & profundæ basilicæ, vt nos despiciamus veram omnium venarum apertionem, quod sanè nimis ab arte abhorret.

*Cum sint ir-  
ridendi Era-  
sistratis  
αἰμοφίκοι.*

Afferamus ergo has conclusiones in omni hepatis affectu, sitque prima, si cephalica patentissima est, & oculis tonsoris certissimæ operationis, eam esse eligendam, vel saltem quam medianam vocant, quia sub cephalica neque nervus, neque arteria excurrit, vt sub basilica; sub mediana verò arteria excurrit, nervus nequaquam. Secunda, quamvis basilica aliquantulum aperta sit, ob nervum tamen, & arteriam, nisi sit apertissima, eam non esse secandam: tertia æquè cephalicam, & basilicam respicere hepar, vt ostendemus, antequam summam huic tertio lib. imponam coronidem; quare in omni casu ratione hepatis, & cuiusque visceris à cephalica sanguinem haurientes eam colligemus utilitatem, perinde ac à basilica sanguis extraheretur, præterquam vbi aliquis vellet reuellere vel deriuare à loco circa mammillas: quoniam post ortas cephalicas, & basilicas ab exteriori iugulari, à basilica propago exoritur, quæ exporrigitur ad mammillas vsque, & hæ sunt illæ venæ, quæ in mulierum mammillis nigræ, & tumidæ aliquando apparent.

Præterea, vt exemplis ostendamus, quanti sit hæc partium progressus contemplatio, & quot errata contingant ob huius progressus inscitiam, aliquot tonsorum errata afferamus, dum in apostematibus aperiendis ignorant fibrarum progressum: sed quia musculorum fibræ, vel progrediuntur in rectum, vel transuersim plus, vel minus: de musculis transuersis, qui immediate sub cute progrediuntur, qui pauci sunt, agendum, quoniam cognitis transuersis, subintelligemus cæteros non connumeratos rectâ progredi, & sectiones in iis in longam esse faciendas: scias prius musculos duos frõtis habere fibras rectas, vt notat Vesalius, quamvis neget Columbus hos musculos habere fibras rectas

*Exempla errorum ob  
progressum  
fibrarum ve-  
narum igno-  
rantiam.  
Errare viden-  
tur Colum-  
bus dicens  
musculos frõ-  
tis non habere  
fibras rectas.*

*Secundum exemplum, errant qui musculos frontis transversim incidunt.* lib. 5. capite de musculis frontis, errare enim videtur Columbus, quoniam experientia visum fuit, quando ob frontis inflammationem, vel ob alias causas tonsores, qui transversim secaverunt fibras; statim motum attollendi supercilia fuisse ablatum, quod non sequeretur, nisi fibræ essent rectæ, transversalis enim incilio lædere non potest fibras transversas: quare errarent illi, qui transversim inciderent musculos frontis.

*Tertium exemplum, errant qui in longum incidunt primum musculum brachij.*

*Quartum exemplum, errant, qui secant in longum primum musculum tibiae.*

*Quintum exemplum, dum ignoras progressum, totius, & venarum, & arteriarum sub clavicula.*

Errant quoque tonsores ob inscitiam progressus fibrarum primi musculi brachij, dum secant in longum in osse pectoris, quâ fibræ transuersæ progrediuntur, musculus enim primus brachij exoritur ab osse pectoris, & tendit ad humerum, in hoc musculo si inflammationes, vel ablesus fiunt, & profundè aperiendi detur occasio, si tonsor in longum secaret fibras, officium huius musculi, quod est adducere brachium ad pectus, deficeret, vel saltem, cum in latissimo hoc musculo omnes non possint abscindi fibræ, diminutè ageret suum munus. Simili modo si quis in rectum incideret musculum quartum circa os sacrum, unde exoritur, tolleret, vel diminueret eius officium, quod est trahere deorsum brachium, quare, si quis errare non vult in apostematibus altè aperiendis obseruet, incisionem, vel sectionem semper esse faciendam versus principium fibrarum, quia hoc modo secando nunquam officiet, quod non possumus scire sine diligētī anatomiae cognitione, quia licet pauci sint muscoli, qui transversim progrediuntur, ut musculi frontis, & primus, & quartus brachij, ceteri tamen ferè omnes in rectum progrediuntur: suntque nonnulli exiles muscoli, & qui aliquo modo obliquum progressum habent, qui nisi incidantur adunguem versus suum principium amitterent suum vsum, veluti est primus musculus tibiae, qui oritur à suprema ilium parte, & inferitur in anteriorem partem tibiae; tunc si aliquis illum altè secaret in longum, sed versus aliud crus, secaret fibras, & virtutem musculi destrueret.

Denique se offert aliud exemplum errorum Empyricorum, dum nesciunt quâ quinque paria nervorum, vena basilica, & arteria axillaris simul progrediantur: à quattuor enim colli vertebri, & à prima thoracis quinque paria illa nervorum oriuntur, quæ mirabile illud brachiorum rete constituunt, quod cum vena maiori, & arteria axillari, progreditur sub clavicula per internum processum scapulae; quorū valorum omnium progressus prævisio, atque præcognitio nos plurimos docere poterit específicos affectus, qui omnino laterent sine hac præcognitione. Verbi causa, si quis in scapulae interno processu profundè sit vulneratus: quo pacto chirurgus nesciēs progressum horum valorum scire poterit hoc particulare, & specificum, an scilicet vulnus sit lethale nec-ne nullum ingenij acumen sine cognitione progressus de vulneris exitu aliquid scire poterit; qui verò nervorum rete cognosceret illac progredi, spasmus, & inde exitium venturum prævidebit, qui basilicam, & simul videret hæmorrhagiam, pronuntiabit non forte, ut supprimatur; sed ut totus profundatur; & vita cum morte com-

mutetur.



mutetur; qui arteriam axillarem illâc progredi animaduertet, & eam ob magnitudinem vulneris necessariò iudicabit esse læsam, pronuntiabit fore, vt exiliat totus spiritus, & confirmabit mortem vsque quaque esse pertimescendam; quare inferas in omni cognitione, & operatione specifica, & singulari esse perquirendos vasorum, vel fibrarum progressus; quoniam sæpissimè tota cognitio, & curatio ab altissimo hoc principio proficiscitur.

Postremò, ne omittam alium nonnullorum abusum, qui similiter contingere solet ob venarum progressus inscitiam, dico esse illum Empyricorum proprium, dum natium hæmorrhagiam suppressere conantes, fronti valentissima astringentia adiungunt, credentes illum sanguinem è naribus exeuntem à venis frontis profluere, quod est falsissimum; quoniam non à frontis venis prouenit ille sanguis, sed ab internis venarum surculis, ad quas vis illa astrictoria nullo modo peruenire potest: colligas ergo præcognitionem progressus vasorum tam in cognoscenda, quam in facienda medicina esse adedò necessariam, vt sit omnino impossibile sine ipsa rectè cognoscere, & rectè curare affectus præter naturam.

*Vt errant  
Empyrici in  
hæmorrhagia  
narium sup-  
primenda.*

*Exempla errorum ob numerum partium corporis ignoratum.*

CAPVT XIII.

**I**NTER condiciones, quæ nos docere possunt naturam specificam affectuum tam naturalium, quam præter naturam est partis viuentis numerus; hinc varij committuntur errores ob numeri inscitiam; quoniam aliquando additur numerus aliquibus partibus non addendus: veluti (vt in exemplis famosis insitamus) Galenus addere videtur glandulam amplectentem infernum officium vetriculi, quam nemo anatomicorum, quod sciam vidit vnquam in humano cadauere, quod si quis non credat ear, & videat: audias deinde in quot errores ex falso supposita glandula quis serpere potest; concepta igitur ab aliquo hac fictitia glandula, ille necessariò imaginabitur, glandulam quoque esse sedem multorum affectuum, supposito hoc, necessariò proponet pro ficticio morbo pellendo varia irrita, & vana medicamenta, sicuti faciunt illi, qui credentes sub mucronata cartilagine esse os vetriculi variis modis, & importunis remediis, illam partem ab ore vetriculi remotam vexant, & deuerberant.

*Errare vide-  
tur Gal. dum  
dicit infernū  
officiū ven-  
triculi habere  
glandulam.*

Errant non solum, qui partibus viuentibus addunt numerum non addendum, verum etiam errant, qui demunt numerum, veluti errare videtur Galenus (nisi melius quis eum interpretetur, quam hætenus factum est) dicens in liene nec arterias, nec venas adesse, quæ sententia videtur falsa, quoniam apertissimè obseruantur venæ, quæ vestiunt totum lienem, plurimas, & copiosissimas esse, quæ omnes à vena porta exoriuntur: deinde copiosissimæ obseruantur arteriæ, quæ ab Aorta

*Errare vi-  
detur Gal. di-  
cens in liene  
non esse ve-  
nas, vel ar-  
terias.*

sub septo transuerso mittuntur in splenem, vt à venis nutrimentum, & ab arteriis vitam suscipiat: hoc experientia, & auctoritate anatomicorum omnium comprobatur: quæ cum ita sint, quis ex hoc concepto numero venarum, & arteriarum splenis non admitteret, numerum conferre ad specificam affectuum cognitionem, & curationem? numquid non scimus specificas, & vltimas affectuum differentias, quando eius principia, & causæ habentur? an ne qui sciunt esse venarum furculos, & arteriarum in splene, sciunt modum, & principium, quo in viscere colliguntur humores? quoniam perquirimus exordium illarum venarum; quod sine anatomia fieri non potest, cognoscimusque exordium esse venam portam: inferamus deinde, si à venâ porta illi venarum furculi trahunt initium, ergo abundat humor melancholicus, & crassus; quoniam in vena porta naturaliter crassus detinetur, vel quia non potest exiles meatus hepatis peruadere, vel quia à parenchyma hepatis non attrahitur, idè retinetur; deinde cognito numero venarum, & exordio, inferimus specificum, & particularem modum curandi splenem, deriuando, vel reuellendo humores fluxos, fluentes, & fluxuros in splenem, per hyruidines applicitas hæmorrhoidibus; quoniam à porta vena hæmorrhoides trahunt initium, vt maxima sit communicatio, & sympathia inter splenem, & hæmorrhoides; vel per cucurbitulas applicitas natibus, quæ induuntur venis portæ; & præcipuè sinistra parti, quæ irrigatur quadam propagine venarum ingredientium splenem, quæ immediatè & ~~est~~ respicit splenem.

Demum ex concepto hoc numero venarum splenis pleræque plures difficultates de medio auferuntur, & symptomatum causæ inueniuntur, & errores rudiorum medicorum illico cognoscuntur; quare, vt exemplis omnia, quæ dicuntur, elucescant, an ne est relata à Columbo, & Valuerde, & ab aliis Historia illa Cardinalis Cibò, qui ob vomitum copiosissimi sanguinis e didit extremum spiritum? cuius secto cadauere, statim, vnde defluxisset sanguis, visum fuit; quoniam dū comprimebant splenis regionem, ad orificium ventriculi sanguis stagnabat, quare admoniti à splene ad ventriculum mitti propagines venarum, irrigantes tum supernam, tum infernam partem, inuenerunt à splene læso sanguinem fuisse perfusum; quare si quis nesciisset splenem esse venarum numero exornatum, nullo modo potuisset in huius fluxionis causæ cognitionem peruenire, qui verò venarum numerum splenis, & exordium sciuiisset, & progressum, potuisset non solum inuenire illius vomitus vehementissimi causam propriam, & specificam, verum etiam quo pacto sanguis potuisset reuelli in contrarium, inuenisset, quoniam ille cognouisset reuulsionem per hæmorrhoidas esse faciendam, non per cubitum, vt rudiores medici affecto splene facere solent secando saluatellam, perinde ac saluatella à spene penderet, cum nulla sanè sit sympathia inter cubitum, & splenem, neque vlla propago venarum causæ venæ irrigat splenem, vt omnino sympathia lienis cum cubito nulla sit vtilitas tamen splenis, quæ aliquando à secta saluatella sequitur, est quia iecur subleuatur à suauissima illa

*Cur humor melancholicus colligitur in vena porta, & non in sana.*

*Cur hamorrhoides, & cucurbitula natibus applicita proficiant spleni.*

*Qualis sit sympathia inter venam & lienem.*

*Vi errat, qui credunt esse consensum inter saluatellam, & lienem.*



euacuatione, quo adiuto, facile omnia viscera hauriunt emolumentum.

*Exempla errorum ob compositionem, vel connexum ignoratum.*

C A P. XIV.

**S**EQVITVR alia partium nostri corporis conditio, quæ nos docere potest specificis affectus, estque compositio vel connexus, qui prædicatur de diarthrosi, synarthrosi, & symphisi, quare de ossium, vel cartilaginum compositione, vel vnione, vel connexu est loquendum, cum iis partibus solum connexus conueniat; si igitur partes vniantur simul, & habeant motum manifestum, vt habet femur cum tibia, vel vlna cum humero appellabitur hæc compositio, vel connexus diarthrosis. Si verò vniantur partes & componantur habeantque motum obscurum, vt quædam ossa brachialis inter se, & tali os cum calce, appellabitur synarthrosis, vel vniantur, & nullum habent motum nec manifestum, nec obscurum, & appellabitur hæc compositio symphysis, sub quibus generibus variæ sunt species, de quibus omnibus singillatim non est agendum, cum munus hoc ad anatomiam pertineat, nostrum enim est compositionem partium proponere, vt ex hac cognita compositione specificas quasdam differentias affectuum cognoscamus; & cæteras vniuersas animaduertamus: sed exequamur propositum secundum stylum, quem ab initio pepigimus, exemplis errorum illustrando hanc conditionem expendendam in ossium, & cartilaginum compositione.

*Quis sit connexus per diarthrosim. Quid synarthrosis. Quid symphysis.*

Errare igitur videntur nonnulli credentes decidere mucronatam cartilaginem, quam aliqui appellant gladiolum, vel scutiformem, & Arabes malum granatum; credunt enim Empyrici, & mulieres deorsum cadere hanc cartilaginem, cuius casu plurima symptomata inde contingere existimant; deinde ex hac falsa principij petitione hauriunt indicationem attollendi collapsam hanc mucronatam cartilaginem; & quod deterimum est, se exponunt mulierculis, & infimis Empyricis, qui conantur manibus trahere sursum benè constitutam cartilaginem, & topica affigunt importuna, & extranea, quibus ægrotos lacerant & in perenni detinent fastidio. Causa verò huius erroris est, quia non expendunt compositionem, & connexum huius mucronatæ cartilaginis, an videlicet sit composita, & vnita cæteris ossibus superioribus per diarthrosim, vel per synarthrosim, vel per symphysim, quod si expendere, facile specificam cognitionem haberent, an possit decidere nec ne, modus verò quo hæc compositio expendi, & cognosci possit desumitur tum ab anatomix experientia, quæ acquiritur in cadauerum diligentissima sectione, tum ab Anatomicis præstantissimis: sciant ergo experientia, & ex omnium consensu mucronatam cartila-

*Errant, qui credunt decidere mucronatam cartilaginē.*

*Quo connexus vnita mucronata cartilago.*

ginem adeo vniri partibus, quibus annexitur, & adeo esse imo pectori connatam, vt diuelli non possit, nisi summa cum violentia, quare colligimus, hanc compositionem non esse diarthrosim, quia hæc compositio supponit motum manifestum, qui non potest seruari in his partibus hoc modo connexis, & colligatis, erit ergo vel composita, & vnita per synarthrosim, quæ motum obscurum supponit, vel per symphism, quæ compositio nullum prorsus supponit motum manifestum, vel obscurum, omnia enim, quæ fortiter adherēt aliis partibus, & quæ cum primis sunt annexa, & colligata, dicuntur esse composita, vel connexa per symphism, vel per synarthrosim; dicas igitur mucronatā cartilaginem non componi, vel connecti per symphism, quoniam species symphisis, vel sunt vniones, & compositiones factæ per suturas, vt sunt futuræ commissuræ coronalis, & sagitalis, quæ in serræ modum fiunt, vel sunt vniones per harmoniam, vt est ossium vnio per simplicem lineam, vt sunt commissuræ maxillæ superioris, & præcipuè commissuræ, quæ in naso habetur, hæc verò cartilago cum osse pectoris non vnitur neque in serræ modum, neque per harmoniam, vel simplicem lineam, sed vnitur inter media cartilagine, ergo hæc vnio motum obscurum supponit, & vocabitur compositio per synarthrosim, non erit tamen talis, quæ cadere deorsum possit, quinimo adeo est vnita, vt in cadaueribus, nisi summa cum violentia diuelli possit.

*Errant, qui credunt coccygem non posse dimoueri in parturientibus.*

Errant dum dicunt caudam, quæ est vltima dorsi portio, quam coccygem vocant non posse in parturientibus loco moueri: sagax enim & prouida natura instituit & parauit omnia illa instrumenta, quibus ad exoptatum finem agentia in suis obeundis muneribus peruenire possunt, ideo parturientibus tanta mole refertis posuit inter primum, & secundum os coccygis maiorem cartilaginem, quam in viris, vt in enixu & fetus conatu cauda posset aliquantulum dilatari, & loco dimoueri, vt aditus fieret patentior, non tamen sine cruciatu insigni parturientium; quare compositio caudæ mulierum cum osse sacro est synarthrosis, quia cauda flectitur, & laxatur versus posteriora; in hominibus vero, cum magis sit connexa, & cartilago qua componitur coccyx cum osse sacro sit minor, & propterea motum non supponat, ideo potius est dicenda compositio per symphism factam, quam per synarthrosim.

*Errant mulieres dum credunt omnia ossa & præcipuè pubis in parturientibus loco moueri.*

Postremum exemplum errorum, quod proponimus pro cognoscendis iis compositionibus, est, dum mulieres, vel Empyrici credunt in parturientibus dextram partem ossis pubis à sinistra dimoueri; quæ opinio præcipuè in omnium mulierum animis est inueterata, illæ enim credunt non solum in parturientibus dextram partem ossis pubis à sinistra dimoueri; sed omnia ossa è suis sedibus exilire. Qui igitur velent certissimè cognoscere, an errent mulieres in hac re, nec ne, eant, & videant in anatome, quomodo ossa pubis sint simul composita, quia illis subito visis sine dubio asseuerabunt nullam symphism esse posse in humano cadauere maioris nexus, quam sit ista, quoniam dextra pars ossis pubis cum sinistra adeo fortiter coalescit, vt cultro, vel

scalpello



scalpello non possit sine difficultate separari. Quare cum hæc compositio pubis non supponat morum à synarthrosi, & ab artrodia toto cælo distabit, & vocabitur symphisis, quod opinionibus mulierum relictatur.

*Exempla ob exordium vasorum, vel partium corporis  
ignorum.*

C A P V T X V.

**S**EQVITVR in præsentia, vt proponamus aliquot exempla errorum, qui à rudioribus committuntur ob exordium vasorum, seu partium corporis ignorum. Cæterum, quia egimus in secundo libr. de exordiis musculorum, & neruorum; hic de quibusdā venarum exordiis ab Empyricis ignoratis tractabimus, vt exemplis omnium generum errorum illustremus decem propositas condiciones, quæ dant esse specificum affectibus omnibus; agamus igitur, an à diuerso stipite exoriantur basilica, & cephalica, quia satis vetusta, & ad hanc vsque diem in plurimorum medicorum animis inueterata est opinio, quod scilicet cephalica, & basilica vena oriantur à locis valde diuersis: dixerunt enim vetustissimi medici, & Galenus (qui forsitan sua auctoritate fuit causa huius communis erroris) cephalicam originem ducere à iugulari exteriori basilicam vero à venarum trunco magis hepatis propinquo, qui excurrat ad axillas sub clauiculam iuxta primam costam; hinc supposita hæc differentia exordij venarum cubiti non est mirum, si nostres tam sæpè digladiantur in ægrotantibus curandis, an scilicet cephalica, vel basilica sit secanda; isti enim, qui in Galeni placitum iurant, & qui plus auctoritati, quam sensibus ipsis deferunt; dicunt in affectibus capitis esse eligendam cephalicam, basilicam vero esse despicendam: In affectibus vero iecoris versa vice, scilicet basilicam esse secandam & nequaquam cephalicam; sed quod deterrimum est, tam seuerè tonsoribus præcipiunt, vt modo basilicam, modo cephalicam feriant pro diuersa morbi opinione, vt debeant tonsores sæpè se exponere ad secandam venam à medico propositam, quamuis omnino delitescat; quinimo coacti à medicis debeant cæcorum more experiri, an suo gladiolo possint eam inuenire; vt non sit mirum, si aliquando cōtingat, vt inaniter feriant bis, & ter latentem venam magno cum ægrotantium incommodo; quinimo vel tonsori, si loco basilicæ secaret cephalicam, omnes enim eum arguerent, & exploderent, & si exitium ob alias etiam causas internas contingeret, non deessent insani medici, qui necem acceptam omnia referrent tonsori.

*Errare videtur Galenus dum dicit, quod cephalica, & basilica à diuersis truncis oriuntur.*

*Quæ mala sequantur ignoratio venarum cubiti exordio.*

Expedit igitur huius inueterati erroris radicem amputare experimentis anatomis, & auctoritate anatomicorum; experimentis, quia quisque cognoscat cephalicam, & basilicam ab vnico puncto & ab vnica concauitate venæ iugularis simul enasci, si ad humanæ cadauera

*Ut colligitur  
Galenum nō  
fecisse hu-  
mana cada-  
uera.*

secunda se trāstulerit, & ramos illos examinauerit & ad proprios oculos exordium illorum ramorum, tamquam ad proprios iudices detulerit; tunc enim ipse videbit, quod Galenus, cui non licuit secare humana cadauera, forsitan non potuit videre: quod autem verum sit, Galenum in humanis cadaueribus secandis non fuisse versatum, antequam ulterius prouehamur, hoc ostendamus, cum multi sint, qui credant, Galenum in secandis humanis cadaueribus fuisse versatissimum. Legamus igitur librum primum de anat. administr. cap. 1. vbi videtur fateri, se toto vitæ cursu tantum duo vidisse humana cadauera admodum imperfecta, quoniam alterum eorum post aliquot menses sepultum à cuiusdam fluiui impetu fuit delatum ad ripam quandam; alterum erat latronis cadauer à coruis biduo dilaniatum, in quibus cadaueribus imperfectissimis vir præstantissimus non potuit omnia videre; etenim si Galeno, ut his nostris temporibus, datum esset, ut corpora humana disseccare potuisset, non esset negandum, quin multo diligentius, quam hætenus factum fuerit, de hac humana fabrica scripsisset.

*Ut aduersan-  
tur Galeno  
& Aristoteli  
qui auctori-  
tatibus ma-  
gis credunt,  
quam ratio-  
ni, & sensu-  
bus.*

Nec mihi obiciant, quod omnino temerarium sit Galenum reiicere, quia respondemus ex propria Galeni sententia 6. de morb. vulg. com. 2. citata; illos potius, qui magis credunt auctoribus, quam experientia, & rationibus, esse temerarios: hinc in libr. de liberis propriis Galenus vocat seruos illos, qui hippocraticos, vel praxagoreos se nominant, & secundo methodi Tyrannicam doctrinam contentionis, & confusionis plenam illorum, qui dictis aliorum nituntur: ut aperte à vestigiis Galeni recedant illi, qui pluris faciunt sententiam Hippocratis, vel aliorum, quam experientiam. Præterea Aristot. 8. phys. text. 21. dicit, quod illi, qui dimittunt sensum, & rationem quærent, sunt excordes; nos vero addimus, multo magis illos errare, qui sensum ob auctoritatem hominum dimittunt; quia semper apud Galenum, & apud omnes philosophos pluris est facienda ratio, quam auctoritas: quamuis hodierno die in plurimis Europæ Gymnasiis hæc infamia inualescat, ut magis Aristoteli, Galeno, & Hippocrati credant, quam sensibus propriis.

*Duo errata  
cuiusdam pe-  
ripatetici  
creditis ma-  
gis Aristot.  
quam sen-  
sibus.*

Audias vnum, quod non possum subtricare de quodam nostri temporis peripatetico Gymnasiarcha, qui in philosophia Aristotelis consenuerat, is enim videns in Anatome publica venam cauam multis, & innumerabilibus filamentis, & radicibus originem trahere ab hepate, longo verborum apparatu publicè fatebatur, venas, quo ad sensum (poterat sanè negare filamenta esse radices) ab hepate trahere ortum; sed cum dicat Aristot. venas à corde prodire, addidit quasi suffusione obtenebratus magis auctoritati Aristot. esse tribuendum, quam auctoritati, & propriis sensibus; dixitque facilius fore, ut sensus nostri decipiantur, quam Aristoteles. Insuper idem philosophus, cum videret in corde pinguedinem, & eam ad candelam liquefcere, nihilominus, ut defenderet Aristotelem negantem pinguedinem esse in corde, audebat quoque in præstantissimorum hominum cœtu negare illam esse pin-



pinguedinem, quod illis, qui propriis sensibus sibi constituerant philosophiam addiscere, fuit maxime admirationi, videre scilicet philosophum Gymnasiarcham magis auctoritari, quam sensibus deferre, tanto magis cum ipse Aristo. 2. post. circa finem, & primo meth. dicat à sensibus omnes scientias habuisse exordium; videas igitur in quor absurdum incidant, qui iurant in placita magistri.

Quotcirca, si vnica est Aristorelis & Galeni vox, vt sensibus ipsis magis sit danda fides, quam rationibus, & auctoritatibus virorum, cur, si Galenus aduersabitur sensibus, ipsum reiicere non poterimus? numquid non Galen. fuit homo? an ne hominis proprium est errare? audias verba Galeni secundo lib. de compositione Med. secundum locos capite 8. edita hoc ornatu; difficile enim est, vt qui homo sit, non in multis peccet, quædam videlicet penitus ignorando, quædam verò male iudicando, & quædam tandem negligentius tradendo; quare fuit possibile, vt Galenus, vel quia fuit homo, vel quia non secuit humana cadavera, in anatomia à veritate in paucis saltem deflitteret; quare cum Galenus neque meus fuerit affinis, & consanguineus, vel maiorum meorum auunculus, quod sciam, neque in sanctorum catalogo sit collocatus, qui afflatus diuinitate fuerit locutus, non video, cur omnes non possint honorificè, si sensibus aduersatur, eum relinquere. Concludimus ergo ex iis, quæ sunt sensibus manifesta, basilicam, & cephalicam ab vnica concauitate venæ iugularis exterioris prodire, quod quoque confirmant omnes anatomici, qui quotidie cadavera dissecant. Hinc Falopius his verbis suum sensum declarat, à vena magna duas magnas propagines excurrere ad brachia, alteram ad dextrum, alteram verò ad sinistrum sub clauicula iuxta primam costam vsque ad axillas, in qua parte diuiditur vena magna in duos ramos, quorum alter facit cephalicam, alter verò basilicam, vt vnicum tamè sit exordium, vnicum centrum, à quo fluunt cephalica, & basilica, & quamuis Falopius, & Vesalius de progressu harum venarum digladiantur, & sint discordes, attamen in hoc conueniunt cephalicam scilicet, & basilicam ab vno puncto prodire; quare audias Falopium, qui iterum his verbis vnicum venarum cubiti exordium fateretur: patet in quo pelago versentur Medici anatomes imperiti, qui in secunda vena in affectibus capitis tam magnum promunt discrimen inter humerariam, & axillarem, ac si illæ ab eodem ramo non prodirent. Similiter Vesalius, & Columbus, & cæteri præclarissimi anatomici omnes affirmant cephalicam, & basilicam ab vnico puncto prodire, vt in schemate ab illis diligenter obseruato, à nobis in sequenti capite proponendo erit videre; quia ab illa communi concauitate, vbi est n vel c in vtroque brachio exoriuntur cephalica, & basilica, quod cum ita reuera sit, secetur basilica, vel cephalica in hepatis, vel cerebri passionibus, quod eadem utilitas, & idem fructus sequeretur, postquam ab vnica concauitate existente in iugulo debeat sanguis necessariò prodire; quare nostrorum plurimi malè agunt, dum semper tonsores vexant, vt modo basilicam, modo cephalicam aperiant.

Opinio Falopij de ortu cephalica, & basilica.

Error Mon-  
dini, &  
Quinterni  
de ortu bas-  
ilica.

Hinc errat Mondinus, & Quinternius in sua institutione, & quam-  
plurimi alij veteres, & moderni, qui voluerunt potius errare cum Ga-  
leno, quam sensibus propriis credere, dicentes, basilicam sub axillis  
suum habere exordium, cephalicam vero in iugulari exteriori.

Videntes igitur aliqui ex modernis anatomicis cephalicam, & ba-  
silicam à communi concauitate re vera prodire, valde laborarunt, &  
multum studij posuerunt, vt modum aliquem inuenirēt, quo possent  
veterum opinionem defendere, quæ erat, quod cephalica magis re-  
sponderet cerebro, quàm basilica: & tandem inuenerunt, quod paul-  
lulum supra hoc commune exordium iterum ab eadem iugulari ra-  
mus quidam mittatur, qui deinde infra commune exordium adne-  
ctitur cephalicæ venæ, ex qua obseruatione colligunt, cur cephalica  
magis capiti conferat, quàm basilica; verum hoc cephalicæ patrocini-  
um nullius est considerationis, tum quia adeo raro in cadaueribus  
ramulus iste inuenitur, vt in mille vix vnico accidat cadaueri, vt videt  
illi anatomici, qui libere philosophantur; tum quia ramulus iste à re-  
centioribus obseruatus est capillaris propago. Quare neque ob ramu-  
lum hunc inuentum, qui adeo raro obseruatur, vt potius inter mon-  
struosa sit ponendus, debemus nos in affectibus capitis apertam, &  
obuiam oculis, & manibus tonsoris basilicam relinquere, & cepha-  
licam absconditam quærere, vel versa vice in hepatis affectibus quæ-  
re basilicam latentem, quando cephalica, vel saltem mediana conspi-  
cua redditur tonsori, & tanto magis, quanto tutius secari potest ce-  
phalica, quia sub ipsa neque nervus, vel arteria maior excurrit. Neque  
obiiciant aliquando fuisse inuentum, non oriri cephalicam, & basili-  
cam ab eadem concauitate, & propterea euenire posse, vt antiquorum,  
& Galeni sententia de harum venarum exordio verificetur; quia oc-  
currimus in hominis fabrica aliquando accidere monstruosa, vt non  
solum basilica à loco, sub axillis exordiri possit, verum etiam dicimus  
hepar (vt relatum est) aliquando fuisse inuentum in parte sinistra, sple-  
nem vero in parte dextra: verum de iis, quæ raro apparent non est se-  
uanda norma: certum est, quod ex mille, quæ dissecantur cadauera,  
nongenta, & ultra sortiantur basilicas, & cephalicas venas exortas à  
communi concauitate iugularis exterioris.

Vt errant,  
qui dicunt  
cephalicam  
ob surculum  
capillarem  
& monstro-  
sum conferre  
capiti.

Obiectio.

Sol.

Vt errant, di-  
centes salua-  
rellam à ba-  
silica, venam  
verdè existin-  
tem inter in-  
dicem, & pol-  
licem à ce-  
phalica oriri.  
Opinio Val-  
uerde, &  
Falsipj de ve-  
nis manus  
probatnr.

Præterea est communis rudiorum medicorum sententia, quod sal-  
uatella exordiatnr à vena basilica, vena vero existens inter indicem, &  
pollicem à cephalica, quorum sententia cum sit hausta potius è triuijs,  
& circulis Empyricorum, quàm ab anatomicis auctoribus, vel à dili-  
genti dissectione cadauerum, est reiicienda, quoniam hac supposita  
falsa sententia, & supposito quod cephalica ab alia concauitate exor-  
diatur, quàm basilica, eadem sequuntur difficultates in secandis ve-  
nulis iis, sicuti diximus superius de iis, quæ sunt in cubito: vera igitur  
opinio erit illorum hominum, qui toto vitæ suæ curriculo disseuerunt  
humana cadauera, qui vnanimiter dicunt, venas irrigantes manus à  
communi vt plurimum exordiri, audias igitur Valuerdem lib. 6. de ve-  
nis & arteriis cap. 8. à communi vena, postquam à coalitu cephalicæ,  
& ba-



& basilicæ constituta est, mox ab ipsâ cōmuni descendente duæ oriuntur propagines, quæ deorsum excurrentes demum vestiunt summam manum, altera enim ex illis saluatellam facit, quam credunt vulgares esse hepaticam, altera propago dictæ communis venæ, quam medianā vocant, excurrentes versus digitum medium facit illam venam, quæ est inter indicem, & pollicem, quam imperiti arbitrantur esse cephalicæ, furculum. Idem dicit Falopius lib. 4. suæ institutionis, & cæteri præclarissimi anatomici quod scilicet venæ illæ summæ manus exordiantur à vena cōmuni, & nequaquam à cephalica, vel basilica; quare concludimus & nos saluatellam, & venam, quæ est inter indicem, & pollicem à vena cōmuni vel mediana, ut plurimum exordiri.

Hinc errant Arabes, & nostrorum plurimi, & inter hos vanissimus Enobarbus credentes spleni sectionem saluatellæ prodesse magis, quæ sectio venæ existentis inter indicem, & pollicem; errant enim isti dupliciter, primo quia vena saluatella, & ea quæ est inter indicem, & pollicem à mediana prodeunt tamquam à cōmuni trunco: errant secundo, quia dato, quod saluatella à basilica prodiret, & alia à cephalica, quid tum? an ne cephalica, & basilica à cōmuni concavitate iugularis venæ exterioris oriuntur? quomodo ergo saluatella præcipuè splenem iuvabit, vel præcipuè hepar, cum utraque vena hepar æque respiciat? quare medici, qui disputant à qua vena manus in ægritudinebus melius sit sanguinem euacuare, tempus conterunt, & aliquando hac ignorantia ducti frustra secant propaginem occultam, & inaniter feriunt patientem sine sanguinis euacuatione proposita. Præterea, quamvis, ut plurimum verum sit, saluatellam, & illam, quæ est inter indicem, & pollicem exordiri à mediana, attamen aliquando furculi isti venarum irrigantes manus faciunt tam varios & diuersos implexus, ut eadem origo semper seruari non videatur, sed nos loquimur de iis, quæ ut plurimum contingunt; hinc Valuerdes dicit quod aliquando cephalica iungitur basilicæ, & statim suum amittit esse, cum desinunt in furculos & distribuatur in venarum ramos, ut non conspiciatur eadem venarū series, idem situs, & idem venarum numerus. Quinimo Vesalius de iis furculis loquens dicit inter quamplurimos homines vix duos æquali correspondenti quæ venarum in ramis distributione inueniri, cum in singulis variæ sint venarum manus distributiones, quæ tamen distributiones, ut diximus, plurimum à mediana oriuntur.

*Vi errant Arabes dicentes venā inter indicem, & pollicem non ita prodesse spleni ut saluatella.*

*Eandem feriem, & sitū venarum in omnibus non seruari.*

*Qui dicunt, venas cubiti dextri melius euacuare hepar, quam sinistri, videntur ignorare exordium venarum brachiorum.*

# CAPVT XVI.


**R**ECEPTVM videtur esse apud omnes, tamquam suppositū, quod venæ cubiti dextri scilicet basilica, cephalica, & mediana sint hepatis proximiores venis illis, quæ irrigant cubitum sinistrum, & pro-

pretea dicunt, sanguinis missionem è dextro brachio factam maius habere momentum, quam è sinistro in hepate euacuando, & refrigerando, & à cæteris affectibus præseruando, & sectam basilicam sinistri non eodem modo deplere sanguinem hepatis, vt dextri. Quod commune commentum vel falsa sententia eò est perducta, vt sæpè cogitauerim, neque ipsam relinere, neque de hac re vllum verbum mouere, sed opinionis meæ vestigia obliterare, sententiæque oblitisci, & ad flammam dare hanc paginam; quia lectores videntes me cæteris omnibus auctoribus reluctari faciliè despexissent, & floccitæcissent, nouam hanc sententiã, verum hoc me non deterruit, quoniam ab initio pepigi vnã veritatem liberè sectari, & omnia satius pati, quam subricere illud, quod rationibus, & sensibus ipsis obuium & apertum est. Quare exequamur propositum, & ostendamus æquè posse depleri, vel refrigerari iecur ob sectum cubitum læuum, quam dextrum, & venas cubiti dextri non esse hepati proximiores, nec magis iuuare quam venæ sinistri cubiti. Vt igitur hoc ostendatur, duo sunt supponenda fundamenta, quorum primum omnium manifestissimum est, sanguinem è vena cubiti egredientem ad cubiti venas esse missum primo à iugulari, & deinde ad iugularem venam à magno trunco, & ab hepate, vt ob sectum cubitum sanguis existens in caua vena, & in hepate prius ascendat ad communem concauitatem, & deinde ad iugulum, & à iugulo ad cubitum, antequam per sectam venam egrediat, unde iecore hoc modo exonerato sarcina, qua premebatur, veluti flabello ventiletur, & cætera sequantur beneficia, quorum merito deinde possunt malæ valetudines superari & depelli; an ne est verum hoc fundamentum? subest-ne in verbis scrupulus? mihi adeo certum esse videtur, vt nulla indigeat probatione, quinimo adduci non possum, vt credam inueniri posse hominem, qui reiiciat hoc secundum fundamentum, quod assensu omnium philosophorum & anatomicorum confirmatum est, quod scilicet vena caua omnium maxima, cū primum exportata est, ad iugulum non magis vergens ad dextrum, quam ad sinistrum brachium bipartitur in duos insignes ramos, vt alter ipsorum diffundatur in brachium sinistrum, alter in dextrum, tamquam caudex in ramos, & deinde isti rami maiores in surculos vocatos cephalicos, basilicos, & communes & communes venæ, vel medianæ tandem in germina desinant constituencia saluatellam, & cæteras summæ manus propaggines: iactis his fundamentis, non video, cur dici non possit, per sectum cubitum sinistrum æquè iuuari hepar, vt per dextrum; quoniam, si sanguis, qui euacuatur per cubitum à venis dilabitur, & ad illas venas mittitur à trunco maiori supra iecur existente, & verum est tunc iecur subleuari; quia caua vena depleatur æquè vt diximus, auxiliabitur cubito sinistro; quia non magis distant venæ cubiti sinistri à trunco maiori, quam distent dextri, diuiditur enim truncus faciens venas brachiorum in iugulo, & non magis vergit ad dextrum, quam ad sinistrum brachium, vt omnino æqualis sit distantia, quinimo vbi est cor in læuam partem potius flexit maximus truncus, cogimus ergo infer-

*Ut probetur  
venas cubiti  
sinistri aequi  
iuuare hepar  
vt cubitus  
dextri.*



re ab hac sensata hypothefi æquè hepati auxiliari sectum sinistrum, vt dextrum: sed vt melius veritas appareat experiamur, an res hoc modo



se habeat in schemate obseruato quoq; ab anatomicis præclarissimis; an-ne locus, vbi est, *a*, est illa vena maxima, quæ ad iugulum exportigitur, & quæ in ambo brachia æquè bipartitur, & sanguinem mittit ad venas cubitorum? nemo sanè audebit asserere; quod detur alia vena, quæ mittat sanguinem ad illas venas cubitorum, quæ sit hac breuior; an-ne ramus *c* excurrentes ad sinistrum brachium est eiusdem longitudinis cum ramo *n* perreptans ad dextrum brachium? quare si distantia ab *a* ad *n* est æqualis illi distantia, quæ est ab *a* ad *c*, sequitur, quod venæ cubiti sinistri eodem modo proximæ sint iecori, vt dextri, ergo sanguis extractus à cubito sinistro æquè à dextro hepatis iuuabit, quod est illud, quod erat probandum, reliquum ergo est, vt liberè communem sententiam, quæ negat brachium sinistrum hepatis auxiliari, vt dextrum, dimittamus.

Nec statim obiiciant dextram partem esse hepatis proximiorē sinistra, quia occurrimus, nos debere considerare vasa per quæ excurrit sanguis, quoniam sanguis insensibiliter non euacuatur, sed cum sit sua natura crassus, & mistus omnium humorum debet per vasa sensibilia, vt sunt venæ, euacuari, quare nos distantiam volentes metiri, necessariò debemus venas ipsas metiri, quæ cum nō sint proximiores in dextra, quam in sinistra parte, ideo sectum sinistrum cubitum æquè iuuabit, vt dextrum.

Neque primo obiiciant dicentes, experientiam iam docuisse, quod sanguinis missio facta à dextro cubito maius emolumentum afferat, quam à sinistro. Neque secundo obiiciant, naturam reuulsionis nos docere, quod ex eodem latere sit euacuandum, vt seruetur restitudo; quare cum hepatis sit in parte dextra; si fiet reuulsio ab eodem latere, ei certo auxiliabitur, quod nō eueniet, si à sinistro cubito euacuabimus. Primæ obiectioni respondemus, non esse eundem inficias, experientiam hætenus nos docuisse, sectionem cubiti dextri auxiliari hepatis, verum, dum inferunt, ergo sectio sinistri cubiti æquè auxiliari non poterit hepatis, nos negamus consequentiam; quoniam nunquam potest colligi negatiua ex puris affirmatiuis, nisi in contradictoriis; in ipsis enim eadem est disciplina; quare, qui non fidunt rationi desumptæ ab anatomia (quæ scilicet ostendit clarissimè, truncum maiorem existentem propè iugulum æquè à dextro, vt à sinistro distare, & per conse-

*Dua obiectiones.*

*Sol. 1. obiectionis.*

*Negatiua nō colligitur ex affirmatiuis nisi in contradictoriis.*

quens æquè hepar iuari à sinistro, vt à dextro brachio) longo temporis spatio experiatur in affectibus hepatis sinistrum cubitum, & summam quoque in hac experientia obseruanda adhibeat diligentiam, hac tamen conditione obseruata, vt spoliet & exuat se antiquæ opinionis beneuolentia, quoniam solum hoc modo à multis experimentis illibatum iudicium colligere poterit.

*Cur experientia sit argumentum fallax.*

Præterea non solum experientia est periculosa, quia primarum opinionum amor est impedimento, ne in nouo experimento veritas cognoscatur, verum etiam, quia experientia re vera est paralogismus, nisi seruentur illæ conditiones, quas declarabimus in lib. de analogismo; est paralogismus, quia est argumentum, quod procedit à particularibus ad vniuersale, & est tale, vt in duos errores semper incidat, quorum primus est, dum infertur in conclusione, quod non est in præmissis, secundus verò est, dum ex particularibus infertur conclusio vniuersalis, quod reluctatur diuinis Aristot. principiis, & fundamētis in libris priorum propositis, vbi probat conclusionem non posse consequi nobiliorem partem præmissarum, sed deteriorem; insuper argumentum propositum, sumptum ab experientia, quod scilicet euacuatio per dextrum cubitum semper hepati maius emolumentum attulerit, quam per sinistrum, peccat quoque in materia; quia falsum est illud assumptum, scilicet, quod experientia pateat, missionem sanguinis factam à dextro cubito maius beneficium asferre, quam à sinistro, exordium enim venarum vtriusque cubiti docet falsitatem huius assumpti, docebitque, fore vt missio sanguinis sinistri cubiti æquè ac dextri hepati auxilietur, quia exordium harum venarum est in medio, & non magis distat ab hepate sinistrum, quam dextrum, ergo æquè cubitum sinistrum, ac dextrum auxiliabitur hepati.

*Sol. 2. obiectionis.*

Quo ad secundam obiectionem, quæ est, dum inferunt ex natura reuulsionis non potius ex dextro, quam ex sinistro latere esse consecuturos beneficium in hepate refrigerando. Respondemus, quod in reuellendo sanguine iecur opprimente, æquè seruantur conditiones reuulsionis in euacuatione sanguinis per sinistrum, ac per dextrum cubitum; audiâsque rationem; an-ne quatuor sunt veræ reuulsionis conditiones? quarum prima est, vt reuulsio fiat secundum rectitudinem, secunda per vasa communia, tertia per distantissima, & quarta, vt placuit Curtio in reuulsione semper esse trahendos humores ad origines, id est, versus illam corporis partem à qua humores habent principium motus: age, examinemus singillatim omnes has quatuor conditiones; quare, de prima conditione loquimur, dicas mihi quam rectitudinem vis, vt in reuulsione seruemus, illam scilicet, quæ est vasorum, qua humores trahi possunt, vel illam, quæ est in illis partibus, per quas humor reuellendus neque excurrit, neque excurrere potest: dicere nullo modo poteris, esse seruandam rectitudinem illarum partium, per quas humores non possunt transire, esset enim ridiculum considerare illarum partium rectitudinem, qua neque excurrunt neque excurrere possunt, quoniam illæ partes cum humoribus, qui debent reuelli, nihil habent

com-

*Vi quatuor sint conditiones reuulsionis & quomodo sint intelligenda.*



cōmune, erit itaq; illa seruāda rectitudo, quę est illorum vasorum, per quā potest humor reuelli, sed sic est, quod sanguis solum excurrit per venas, & nequaquam per alias partes, ergo si reuulsio debet fieri secundum rectitudinem, non possumus per rectitudinem intelligere, nisi illam, quę est vasorum; quę cum ita sint, quis negabit, seruari rectitudinem in reuellendis humoribus ab hepate in euacuatione sanguinis æquę à cubito dextro ac à sinistro; si verum est illud, quod probauimus, sanguinem, videlicet euacuatum per cubitos primo prodire à trunco maiori venarum existente in iugulo, quippe qui non magis vergit ad dextrum, quam ad sinistrum brachium, & deinde ab hepate, vbi est sanguinis officina, vt omnino eadem sit rectitudo vasorum ab hepate ad cubitum sinistrum, vt est, ab hepate ad dextrum. Quo ad secundam conditionem reuulsionis, quę est, quod semper reuulsio fieri debeat per vasa communia, nemo anatomicorum, quamuis stolidus negaret, venam eam esse æquę communem brachio sinistro, ac dextro; quare non est, cur aliquis amplius negare possit, quod euacuatio sanguinis per sinistrum cubitum æquę non sit secundum rectitudinem, & per vasa communia, & æquę per distantissima in sinistro, ac in dextro cubito.

Videns igitur Fernellius, venas sinistri, & dextri cubiti æquę distare ab hepate, vidensque Galenum 3. de crisib. cap. 3. & alibi loquentem his verbis, oportet sanguinem recto cursu fluere ex dextra nare propter hepar, ex sinistra propter lienem, vt seruetur rectitudo partium corporis, propterea nouam quandam causam excogitauit, cur sectum dextrum cubitum iecori, & sinistrum spleni magis opem ferat, dixitq; id contingere ratione fibrarum rectarum, quę habent vim pellendi sanguinem in eodem latere, & propterea secundum eandem longitudinem corporis seruandam esse rectitudinem; perinde ac essent à splene ad sinistrum cubitum sibi: q, quę illuc, & non aliò sanguinem expellerent, vel essent ab hepate ad dextrum cubitum alię extensę fibrę, quę per illam partem dextram sanguinem pellerent, quę opinio est falsa; quoniam omnes venę habēt fibras rectas, obliquas, & transuersas, falsa quoque est, quia supponit sanguinem per sectum cubitum fluentem esse à fibris rectis propulsum, quod fundamentū est falsum, & à nobis reiectum in lib. de reuulsione, vbi ex professo de hac re agitur. Insuper sunt alij, qui dicunt, aliam non esse causam, cur sectum cubitum dextrum magis conferat hepati, quam sectum sinistrum, nisi, quia euacuato sanguine ab aliqua parte, illico sequitur magnus trāspiratus illius partis, quę transpiratio si erit in parte dextra iuuabit iecur, si in sinistra splenem, confirmantque exemplis, quanti sit hæc insensibilis transpiratio facta per partem proximam, & vicinam in pellendis affectibus præter naturam, exemp<sup>a</sup>que sunt duo, quorum primum est illud Galeni notissimum, dum dicit, vesicam vrina omnino repletam, si non potest expellere lorium ob nimiam plenitudinem, clysteribus aliquantulum depleri, & euacuari, & inde illo liberari affectu; secundum est, dum clysteres tollunt dolorem coxendicium; colligū ex

*Ve errat Fernellius, dum reddit rationem, cur dextrum cubitum hepatis, sinistrum spleni magis auxilietur.*


*Alia opinio, quomodo sit intelligendum hepar iuuari magis à dextro cubito.*

præterea dicunt, sanguinis missionem è dextro brachio factam maius habere momentum, quam è sinistro in hepate euacuando, & refrigerando, & à cæteris affectibus præseruando, & sectam basilicam sinistri non eodem modo deplere sanguinem hepatis, vt dextri. Quod commune commentum vel falsa sententia eò est perducta, vt sæpè cogitauerim, neque ipsam reicere, neque de hac re vllum verbum mouere, sed opinionis meæ vestigia obliterare, sententiæque obliuisci, & ad flammæ dare hanc paginam; quia lectores videntes me cæteris omnibus auctoribus reluctari faciliè despexissent, & floccificassent, nouam hanc sententiâ; verum hoc me non deterruit, quoniam ab initio pepigi vnâ veritatem liberè sectari, & omnia satius pati, quam subricere illud, quod rationibus, & sensibus ipsis obuium & apertum est. Quare exequamur propositum, & ostendamus æquè posse depleri, vel refrigerari iecur ob sectum cubitum laeuum, quam dextrum, & venas cubiti dextri non esse hepatis proximiores, nec magis iuuare quam venas sinistri cubiti. Vt igitur hoc ostendatur, duo sunt supponenda fundamenta, quorum primum omnium manifestissimum est, sanguinem è vena cubiti egredientem ad cubiti venas esse missum primo à iugulari, & deinde ad iugularem venam à magno trunco, & ab hepate, vt ob sectum cubitum sanguis existens in caua vena, & in hepate prius ascēdat ad communem concauitatem, & deinde ad iugulum, & à iugulo ad cubitum, antequam per sectam venam egrediatur, vnde iecore hoc modo exonerato sarcina, qua premebatur, veluti flabello ventiletur, & cætera sequantur beneficia, quorum merito deinde possunt malæ valitudines superari & depelli; an ne est verum hoc fundamentum? subest-ne in verbis scrupulus? mihi adeo certum esse videtur, vt nulla indigeat probatione, quinimo adduci non possum, vt credam inueniri posse hominem, qui reiciat hoc secundum fundamentum, quod assensu omnium philosophorum & anatomicorum confirmatum est, quod scilicet vena caua omnium maxima, cū primum exporrecta est, ad iugulum non magis vergens ad dextrum, quam ad sinistrum brachium bipartitur in duos insignes ramos, vt alter ipsorum diffundatur in brachium sinistrum, alter in dextrum, tamquam caudex in ramos, & deinde isti rami maiores in surculos vocatos cephalicos, basilicos, & communes. & communes venæ, vel medianæ tandem in germina desinant constituentia saluatellam, & cæteras summæ manus propagines: iactis his fundamentis, non video, cur dici non possit, per sectum cubitum sinistrum æquè iuuari hepar, vt per dextrum; quoniâ, si sanguis, qui euacuatur per cubitum à venis dilabitur, & ad illas venas mittitur à trunco maiori supra iecur existente, & verum est tunc iecur subleuari; quia caua vena depleatur æquè vt diximus, auxiliabitur cubito sinistro; quia non magis distant venæ cubiti sinistri à trunco maiori, quam distent dextri, diuiditur enim truncus faciens venas brachiorum in iugulo, & non magis vergit ad dextrum, quam ad sinistrum brachium, vt omnino æqualis sit distantia, quinimo vbi est cor in laeuam partem potius flectit maximus truncus, cogimur ergo inferre ab

*Ut probatur  
venas cubiti  
sinistri æquè  
iuuare hepar  
ut cubiti  
dextri.*



re ab hac sensata hypothefi æquè hepati auxiliari sectum finistrum, vt dextrum: sed vt melius veritas appareat experiamur, an res hoc modo



se habeat in schemate obseruato quoq; ab anatomicis præclarissimis; an-ne locus, vbi est, *a*, est illa vena maxima, quæ ad iugulum exporrigitur, & quæ in ambo brachia æquè bipartitur, & sanguinem mittit ad venas cubitorum? nemo sanè audebit asserere; quod detur alia vena, quæ mittat sanguinem ad illas venas cubitorum, quæ sit hac breuior; an-ne ramus *c* excurrrens ad finistrum brachium est eiusdem longitudinis cum ramo *n* perreptans ad dextrum brachium? quare si distantia ab *a* ad *n* est æqualis illi distantia, quæ est ab *a* ad *c*, sequitur, quod venæ cubiti sinistri eodem modo proximæ sint iecori, vt dextri, ergo sanguis extractus à cubito sinistro æquè à dextro hepari iuuabit, quod est illud, quod erat probandum, reliquum ergo est, vt liberè communem sententiam, quæ negat brachium finistrum hepati auxiliari, vt dextrum, dimittamus.

Nec statim obiiciant dextram partem esse hepati proximiorē sinistra, quia occurrimus, nos debere considerare vasa per quæ excurrit sanguis, quoniam sanguis insensibiliter non euacuatur, sed cum sit sua natura crassus, & mistus omnium humorum debet per vasa sensibilia, vt sunt venæ, euacuari, quare nos distantiam volentes metiri, necessariò debemus venas ipsas metiri, quæ cum nō sint proximiores in dextra, quam in sinistra parte, ideo sectum finistrum cubitum æquè iuuabit, vt dextrum.

Neque primo obiiciant dicentes, experientiam iam docuisse, quod sanguinis missio facta à dextro cubito maius emolumentum afferat, quam à sinistro. Neque secundo obiiciant, naturam reuulsionis nos docere, quod ex eodem latere sit euacuandum, vt seruetur reëtitudo; quare cum hepatis sit in parte dextra; si fiet reuulsio ab eodem latere, ei certo auxiliabitur, quod nō eueniet, si à sinistro cubito euacuabimus. Primæ obiectioni respondemus, non esse eundem inficias, experientiam hæcenus nos docuisse, sectionem cubiti dextri auxiliari hepati, verum, dum inferunt, ergo sectio sinistri cubiti æquè auxiliari non poterit hepati, nos negamus consequentiam; quoniam nunquam potest colligi negatiua ex puris affirmatiuis, nisi in contradictoriis; in ipsis enim eadem est disciplina; quare, qui non fidunt rationi desumptæ ab anatomia (quæ scilicet ostendit clarissimè, truncum maiorem existentem propè iugulum æquè à dextro, vt à sinistro distare, & per conse-

*Dua obiectiones.*

*Sol. 1. obiectionis.*

*Negatiua nō colligitur ex affirmatiuis nisi in contradictoriis.*

quens æquè hepar iunari à sinistro, vt à dextro brachio) longo temporis spatio experiatur in affectibus hepatis sinistrum cubitum, & summam quoque in hac experientia obseruanda adhibeat diligentiam, hac tamen conditione obseruata, vt spoliet & exuat se antiquæ opinionis beneuolentia, quoniam solum hoc modo à multis experimentis illibatum iudicium colligere poterit.

*Cur experientia sit argumentum fallax.*

Præterea non solum experientia est periculosa, quia primarum opinionum amor est impedimento, ne in nouo experimento veritas cognoscatur, verum etiam, quia experientia re vera est paralogismus, nisi seruentur illæ conditiones, quas declarabimus in lib. de analogismo; est paralogismus, quia est argumentum, quod procedit à particularibus ad vniuersale, & est tale, vt in duos errores semper incidat, quorum primus est, dum infertur in conclusione, quod non est in præmissis, secundus verò est, dum ex particularibus infertur conclusio vniuersalis, quod reluctatur diuinis Aristot. principiis, & fundamētis in libris priorum propositis, vbi probat conclusionem non posse consequi nobiliorem partem præmissarum, sed deteriorem; insuper argumentum propositum, sumptum ab experientia, quod scilicet euacuatio per dextrum cubitum semper hepati maius emolumentum attulerit, quam per sinistrum, peccat quoque in materia; quia falsum est illud assumptum, scilicet, quod experientia pateat, missionem sanguinis factam à dextro cubito maius beneficium asserre, quam à sinistro, exordium enim venarum vtriusque cubiti docebit falsitatem huius assumpti, docebitque, fore vt missio sanguinis sinistri cubiti æquè ac dextri hepati auxilietur, quia exordium harum venarum est in medio, & non magis distat ab hepate sinistrum, quam dextrum, ergo æquè cubitum sinistrum, ac dextrum auxiliabitur hepati.

*Sol. 2. obiectionis.*

Quoad secundam obiectionem, quæ est, dum inferunt ex natura reuulsionis non potius ex dextro, quam ex sinistro latere esse consecuturos beneficium in hepate refrigerando. Respondemus, quod in reuellendo sanguine iecur opprimente, æquè seruantur conditiones reuulsionis in euacuatione sanguinis per sinistrum, ac per dextrum cubitum; audiâsque rationem; an-ne quatuor sunt veræ reuulsionis conditiones? quarum prima est, vt reuulsio fiat secundum rectitudinem, secunda per vasa communia, tertia per distantissima, & quarta, vt placuit Curtio in reuulsione semper esse trahendos humores ad origines, id est, versus illam corporis partem à qua humores habent principium motus: age, examinemus singillatim omnes has quatuor conditiones; quare, de prima conditione loquimur, dicas mihi quam rectitudinem vis, vt in reuulsione seruemus, illam scilicet, quæ est vasorum, qua humores trahi possunt, vel illam, quæ est in illis partibus, per quas humor reuellendus neque excurrit, neque excurrere potest: dicere nullo modo poteris, esse seruandam rectitudinem illarum partiū, per quas humores non possunt transire, esset enim ridiculum considerare illarū partiū rectitudinem, qua neque excurrūt neque excurrere possunt, quoniam illæ partes cum humoribus, qui debent reuelli, nihil habent

com-

*Vi quatuor sint conditiones reuulsionis & quomodo sint intelligenda.*



cōmune, erit itaq; illa seruāda rectitudo, quæ est illorum vasorum, per quæ potest humor reuelli, sed sic est, quod sanguis solum excurrit per venas, & nequaquam per alias partes, ergo si reuulsio debet fieri secundum rectitudinem, non possumus per rectitudinem intelligere, nisi illam, quæ est vasorum; quæ cum ita sint, quis negabit, seruari rectitudinem in reuellendis humoribus ab hepate in euacuatione sanguinis æquæ à cubito dextro ac à sinistro; si verum est illud, quod probauimus, sanguinem, videlicet euacuatum per cubitos primo prodire à trunco maiori venarum existente in iugulo, quippe qui non magis vergit ad dextrum, quam ad sinistrum brachium, & deinde ab hepate, vbi est sanguinis officina, vt omnino eadem sit rectitudo vasorum ab hepate ad cubitum sinistrum, vt est, ab hepate ad dextrum. Quo ad secundam conditionem reuulsionis, quæ est, quod semper reuulsio fieri debeat per vasa communia, nemo anatomicorum, quamuis stolidus negaret, venam cauam esse æquæ communem brachio sinistro, ac dextro; quare non est, cur aliquis amplius negare possit, quod euacuatio sanguinis per sinistrum cubitum æquæ non sit secundum rectitudinem, & per vasa communia, & æquæ per distantissima in sinistro, ac in dextro cubito.

Videns igitur Fernelius, venas sinistri, & dextri cubiti æquæ distare ab hepate, vidensque Galenum 3. de crisib. cap. 3. & alibi loquentem his verbis, oportet sanguinem recto cursu fluere ex dextra nare propter hepar, ex sinistra propter lienem, vt seruetur rectitudo partium corporis, propterea nouam quandam causam excogitauit, cur sectum dextrum cubitum iecori, & sinistrum spleni magis opem ferat, dixitq; id contingere ratione fibrarum rectarum, quæ habent vim pellendi sanguinem in eodem latere, & propterea secundum eandem longitudinem corporis seruandam esse rectitudinem; perinde ac essent à splene ad sinistrum cubitum fib: e, quæ illuc, & non aliò sanguinem expellerent, vel essent ab hepate ad dextrum cubitum aliæ extensæ fibræ, quæ per illam partem dextram sanguinem pellerent, quæ opinio est falsa; quoniam omnes venæ habent fibras rectas, obliquas, & transuersas, falsa quoque est, quia supponit sanguinem per sectum cubitum fluentem esse à fibris rectis propulsū, quod fundamentū est falsum, & à nobis reiectum in lib. de reuulsione, vbi ex professo de hac re agitur. Insuper sunt alij, qui dicant, aliam non esse causam, cur sectum cubitum dextrum magis conferat hepati, quam sectum sinistrum, nisi, quia euacuato sanguine ab aliqua parte, illico sequitur magnus trāspiratus illius partis, quæ transpiratio si erit in parte dextra iuuabit iecur, si in sinistra splenem, confirmantque exemplis, quanti sit hæc insensibilis transpiratio facta per partem proximam, & vicinam in pellendis affectibus præter naturam, exemp<sup>a</sup> quæ sunt duo, quorum primum est illud Galeni notissimum, dum dicit, vesicam vrina omnino repletam, si non potest expellere lorium ob nimiam plenitudinem, clysteribus aliquantulum depleri, & euacuari, & inde illo liberari affectu; secundum est, dum clysteres tollunt dolorem coxendicium; colligū ex

*Peccat Fernelius, dum reddit rationem, cur dextrum cubitum hepatis, sinistrum spleni magis auxilietur.*

*Alia opinio, quomodo sit intelligendum hepar iuuari magis à dextro cubito.*

iis euacuationem semper partibus vicinis, quamuis non sint vasa communia, opem ferre. Quæ causa est omnino vera, si est intelligendum de illis humoribus, qui sua natura solent in spiritum, & vaporem resolui; de quibus forsitan Gal. loco citato intellexit; quoniam causa, quæ mouet hemorrhagiam narium, de qua Gal. loquebatur, vi plurimum est vaporatus, qui peruat, & penetrat ad instar ignis insensibiles

*Vi errant, qui dicunt post phlebotomiam iocur subleuari ob dextra partis transpiratum insensibilem*

poros omnium membranarum: cæterum, quia nos loquimur de massa sanguinea, quæ est crassa, & omnibus humoribus mista, ideo dicere non possumus, vt post phlebotomiam ea sequatur transpiratio insensibilis, quæ possit hepar iuuare, tum, quia sanguis excutere, solum potest per canales sensibiles & patentes; tum, quia post sanguinem euacuatam pars illa, sit dextra, vel sinistra, magis frigescit, & per consequens minus transpirat. Quare non immerito de sanguine loquentes dicimus non esse longius iter ab hepate ad sinistrum cubitum, quam sit ab hepate ad dextrum, sed esse eandem rectitudinem à vena cava ad ambos cubitos; ideo eundem fructum, & eandem vtilitatem pro affectibus hepatis pellendis esse expectandam ab vno, quam ab altero cubito. Quæ cum ita sint, facile apparet illorum error, qui in hepate refrigerando vel alio modo adiuuando volunt semper, & seuerè à cubito dextro sanguinem euacuare, quamuis illud cubitum esset sua natura debile, vel semistupore affectum, in quo casu euacuatio sanguinis non potest, nisi cubitum, & totum brachium refrigerare; deberent enim tunc eligere sinistrum cubitum minus læsum, & minus operationibus commodum, quod idem prorsus hepati beneficium præstare potest.

*In qua errata aliquando incidunt qui pro hepate solum dextrum cubitum secant.*

*Vt errat Vesalius, dum dicit in omni pleuritide esse à dextro, & non à sinistro brachio sanguinem euacuandum.*

## CAPVT XVII.

**I**N omni pleuritide, siue sit dextri, siue sinistri lateris, tenet Vesalius, solum à dextro cubito sanguinem esse euacuandum, ratio, quæ cogit Virum præstantissimum ad hoc dicendum, est, quia, postquam à corde supergressa est maxima omnium vena, illico mittit à latere dextro magnam quandam propaginem, quæ vena sola vel sine pari nuncupatur, gratia nutriendi omnes musculos intercostales dextri, & sinistri lateris; dicitque ab hac vena solum prodire sanguinem facientem inflammationem in pleura; deinde infert ex iis consequentiam (ni fallor) absurdam, & minimè necessariam, quæ est, quod in pleuritide quoque sinistri lateris sit cubitum dextrum secundum, & nullo modo sinistrum; quinimo addit nunquam in pleuritide euacuationem sanguinis à sinistro latere factam, ob huius venæ sine pari exordium collocatum in parte dextra, aliquid opis afferre posse. Quæ Vesalij sententia hac verborum serie exprimitur; omnes thoracis costas venæ sine pari



pari propaginibus enutriti, hæc Patavi, & Bononiæ vidimus multo-  
 ties, & nemo ex tanto eruditorum virorum cœtu inficiari potuit: dein-  
 de dicit cum ad nonam vertebra[m] pertingit hæc vena sola in duos  
 truncos diuiditur, quorum vnus dextri lateris costarum radicibus, al-  
 ter verò sinistri exporrigitur; & hæc vena (addit) vergit ad partem dex-  
 tram, quam ob causam in pleuritide quoque sinistra à cubito dextro  
 sanguis est euacuandus. Condonemus Vesalio, musculos intercosta-  
 les dextri, & sinistri lateris solum enutriti à furculis venæ sine pari:  
 condonemus quoque, membranam succingentem costas aliunde non  
 trahere alimentum, quam à vena sine pari, & demum omnem pleuri-  
 tidem fieri à sanguine prodeunte ab illa vena. Quid tum postea? per-  
 uenitne illa vena sine pari ad cubitum? vel ad axillas? propagatur ne ab  
 ipsa in brachium dextrum aliquod germen? nescio sanè quo funda-  
 mento vir alioquin soletissimus, & sectatores ipsius potuerint illam  
 sententiam defendere, tum, quia vena sine pari nullum mittit furcu-  
 lum ad brachia, tum quia vena caua, quæ dumtaxat varijs venarum  
 propaginibus irrigat brachia, æquè distat à dextro, ac à sinistro cubito,  
 tum demum; quia si debet exire sanguis existens in vena sine pari per  
 cubitum, plus est omnino necessarium, vt à vena hac sola, vel sine pari  
 vocata excuriat in cauam, quæ est omnium venarum maxima, &  
 deinde ascendar ad iugulum, quo in loco existens, vt ostendimus su-  
 perius æquali distàtia distat à dextro, vt à sinistro cubito. & tam com-  
 modè per vnum, quam per alterum latus sanguis hic depieri potest; se-  
 quitur ergo quod vena sine pari æquè benè euacuetur per sinistrum,  
 ac per dextrum cubitum.

Cur ergo, qui Vesalius vidit valde diligentius, quam ego viderim  
 venarum exordia, & progressus, & venas vtriusque cubiti æquè  
 distare à iugulo, & venam sine pari nullum mittere ramum in bra-  
 chia, nihilominus noluerit inanitatem huius quæstionculæ animadu-  
 uertete, quod potuisset millies in anatome rectè cognoscere. Hinc  
 Valuerdes Vesalij discipulus lib. 1. cap. 7. animaduertens venam si-  
 ne pari non peruenire ad brachia, fauere videtur nostræ sententiæ, vbi  
 dicit in pleuritide extrahatur sanguis à quouis cubito, semper est ne-  
 cessarium, vt sanguis prius egrediatur à vena maxima, & deinde à ve-  
 na sine pari.

Postiemo errare videtur alio modo Vesalius, & potest quoque alio  
 modo conuinci per fiduciam reprobationem, scilicet condonando,  
 venam sine pari posse euacuare per dextrum cubitum, & nequaquam  
 per sinistrum, quod est falsissimum: occurrimus tamen negando, quod  
 semper pleuritis fiat à sanguine egrediente à vena sine pari, quia acci-  
 dere potest, vt fiat pleuritis à sanguine egrediente è venis musculor-  
 um thoracis, qui tandem in pleuram excurrere potest, quod facile  
 fieri potest, dum ob frigus, & ventos maximos externi musculi  
 constriunguntur, quibus compressis exprimitur sanguis in pleuram,  
 vel ob nimium calorem liquefit sanguis, & factus liquidus similiter

*Vi fiduciarie  
 reijcitur Ve-  
 salius de ve-  
 na sine pari.*

*Æquè tunc  
 euacuat vena  
 sine pari per  
 sinistrum, vt  
 dextrum cu-  
 bitum.*

*Vt nostra  
 sententia fa-  
 uet Vesalij  
 discipulo.*

*Alio modo  
 fiduciarie re-  
 ijcitur Ves-  
 alius ostenden-  
 do à quibus  
 sentibus ve-  
 niat sangui-  
 nem faciens pleu-  
 ritidem.*

in pleuram fluit; quare vndequeque Vesalij sententia patitur naufragium, patitur, quia licet solum à sanguine venæ sine pari fieret pleuritis, non tamen sequeretur maius emolumentum à scâto dextro quam sinistro cubito; patitur quoque, quia negamus pleuritidem solum à sanguine prodeunte à vena sine pari fieri posse.

*Aliquot errata adscripta Gal. ob situs, & meatus partium corporis ignoratos.*

### CAPUT XVIII.

**M**AXIMA sanè esset illius hominis insolentia, & arrogantia, qui vellet in arte medica cum Galeni ingenio certare, qui tam diuinus scripsit totam artē medicam, vt merito apud omnes gentes multis ab hinc centenis annis summa veneratione eius scripta obseruentur. Verumtamen, quia viro præstantissimo, vt probauimus superius, non licuit humana corpora secare, & corporis particulas expendere, vt est in more hodierno die, idcirco cum sensus præcellat in veritate comparanda rationi, & auctoritati, nos in exemplorum formam, vt melius declaremus nostram methodum, proponimus illa Galeno adscripta errata, quæ veritas, & *ad m. fix* docuit; ex hac breuissima enarratione errorum firmiter & constantius colligemus origines omnium errorum consistere in decem partium nostri corporis conditionibus malè perceptis, quales sunt meatus, situs, & cæteræ non semel propositæ, quoniam ab illis decem solum omnes naturæ specificæ affectuū fiūt: quare, multis erroribus Galeno adscriptis dimissis, qui in bonum sensum possunt reuocari, aliquos incipiamus proponere: à quibus non videtur, quod possit vindicari.

*Errata ob  
situs partium  
ignoratum.*

*Error Gal.  
adscriptus de  
situs renum,  
& emulgentium.*

Quare si de situ loquimur, quæ est conditio partium viuientis principalissima, an-ne credidit vir præstantissimus in hominibus dextram emulgentem esse altiore sinistra? attamen clarissimè patet in omni humano cadauere sinistram emulgentem, & renem sinistram esse superiorem, & altiore dextro; hoc igitur est signum, quod brutorum tantummodo exemplaria in sua anatomia tractauerit; bruta enim habent emulgentem, & renem dextrum altiore sinistro. Ex hoc igitur malè percepto situ renum, & venarum emulgentiū Gal. longo discursu inquit, cur factum sit, vt ren dexter, & vena emulgens dextra superior sit in hominibus sinistra, & huius rei (sicuti est philosophi proprium) multas rationes reddit, quæ ob eius ingenij excellentiam sunt quoque adeo præclaræ, vt ad hanc vsque diem renem, & emulgentem dextram esse superiorem sinistra plurimis magis suadeant, quam inspectio propria.

*Error Gal.  
adscriptus de  
situs ventriculi.*

Amplius situm quoque ventriculi vir sapientissimus videtur nō rectè nouisse; quia dixit ventriculum magis esse in dextro latere, quam in sinistro, quod nullo modo est admissum, quoniam maius spatium relin-



relinquitur ventriculo in sinistra parte, quam in dextra ob hepatis magnitudinem, & lienis paruitatem: unde ex hoc situ male percepto in affigendis stomaticis plurimi possent errare, ipsi enim cerata affigerent magis dextræ parti, quam sinistræ; attramen ventriculo occupante potius sinistram, quam dextram, potius quoque in sinistra parte erunt localia affigenda.

Similiter si de meatibus loquimur, an-ne in errores aliquos incidit? an-ne primo de vsu par. credere videtur, ossa digitorum non esse concava, sed solida? quamvis apertissimè concavitatem habeâr, quod obferuatur non solum in hominibus, verum etiam in simiis ipsis: à quo errore Iacobus Syluius in suis virulentis depulsionibus aduersus Vesalium non potest vindicare Galenum, quamuis ipsum defendat variis auctoritatibus Aristotelis, & Galeni, sed minimè ad rem conferentibus. Insuper Galenus putauit esse quendam meatum inter oculos & nares, unde dicit, quod medicamenta in oculos propterea immittantur, vt per nares effluant, & versa vice, aliquando scilicet in nares immittantur, & oculis egrediantur, quod nunquam à nostratibus anatomicis est obseruatum, etenim illud quod separat oculos à naribus, est septum subtilissimum quâ peruadunt, & exsudent ichores, & lachrymæ, vt in illis, qui, lachrymis conficiuntur aliquando vidimus, quod septum subtilissimum in mortuorum cadaueribus ob suam tenuitatem rarissimè inuenitur.

*Error Gal. adscriptus de meatu suo de concanitate.*

*Error Gal. adscriptus de meatu inter oculos & nares.*

*Colliguntur aliquot errata Galeno adscripta in iis quæ pertinent ad figuram, & progressum partium humani corporis.*

CAPVT XIX.

**I**N partium figuris non semel errare videtur Galenus, & præcipuè dum simiis deceptus habet, quod processus vertebrarum colli integri sint, cum re vera sint bifurcati: Amplius de osse humeri dixit esse omnium maximum femore excepto, & non excipit tibiæ, quæ similiter humero maior est, vel saltem sacrum os, vel os ilium, quæ magnitudine tibiæ superant.

*Errata Gal. adscripta in figura partium corporis.*

Similiter de hepatis, & renum figura dicit in primis, quod hepar humanum in lobos sit diuisum, vt in brutis vidimus; quis ab hoc errore ipsum vindicaret? nemo qui semel tantum vidisset humanum hepar, affirmaret hepar in lobos esse diuisum. Similiter, dum de figura renum loquitur, dicit renes ea figura esse donatos, vt cribro in partibus internis constituti sint, de qua re superius egimus, dicitque aliud cribri specimen esse in osse cuneali, quæ omnia sensu ipso, & non longo discursu sunt ab anatomicis reiecta.

Amplius de figura spinalis medullæ loquens dixit, quod in extrema parte spinæ sit netuus quidam inconiugatus & sine pari, quem nemo in humano cadauere vidit vnquam, additque neruum hunc præ-

terlabi per quartum musculum femoris, quod si esset verum, sequeretur hoc insolitum, & monstruosum in morbis; quod non posset dari paralysis in vna parte tantum, dextra videlicet, vel sinistra quarti musculi femoris, quod est falsum, quia sæpissimè experiētia vidimus musculum quartum femoris in vnica tantum parte paralyti esse affectū, & non semper in vtraque: sequitur ergo, quod neruus ille postremus sit coniugatus; dicimus ergo cum anatomicis nostris in extrema parte medullæ fieri distributionem postremi nervi in duos surculos, quorū alter excurrit in partem dextram, alter verò in sinistram. Insuper de figura pulmonis humani habet Galenus, esse diuisum in quinque lobos, quorum tres dixit esse in dextro latere, duos vero in sinistro, quod in brutis obseruatur, in hominibus verò nequaquam, quoniam humanus pulmo tantum quatuor habet lobos. Demum lapsus esse videtur, dum ventriculi figuram obseruat, vt pylori orificium fundum ventriculi respiciat, quod mihi videtur experientię, & schemati proposito reluctari: alia adscripta errata Galeno de figuris posse afferre, voluit tamen hæc pauca subnectere, cum mihi hæc præcipuè videantur veritati, & sensibus nostris reluctari.

*Errata Galeno adscripta in vasa rum & alia vnum partium progressu.*

Si verò de progressu loqui volumus, inuenimus non pauca esse errata ei adscripta, an-ne dicit temporalem musculū in medio sui ipsius esse tendinosum, in exordio verò, & vbi inferitur esse carnosum? quod sanè in hominibus non est repertum, quamuis in lupis, & aliis brutis inueniatur. Progressus sanè huius musculi præcognitus valdè poterit conferre affectibus cognoscendis, & curandis, per hypothesim si vulnerabitur musculus temporalis in medio, vbi credidit Galenus esse tendinosum, cogetur Galenus falli in cognitione naturæ vulneris, in præfagio, & curatione; in cognitione, quoniā alia est natura vulneris partis tendinosæ, & alia carnosæ: in præfagio, quoniam vulnera in parte tendinosa sunt deteriora, & aliquando lethalia; in carnosæ verò sunt minus periculosa: in curatione; quoniam omnino diuersa sunt remedia, quæ debent applicari tendini, ab iis, quæ carnibus applicantur; docet enim ipsemet Galenus in methodo, alia esse suppurantia in tendine, aliāque in carne, alia digerentia, aliāque sarcotica, vt tota diuersa reddatur curatio partis tendinosæ affectæ, & carnosæ; videant ergo lectores quanti sit hæc cōsideratio progressus partium, quoniam sicuti, si musculus temporalis esset in medio tendinosus, vulnus in medio esset ferè lethale: pari modo dicimus, quod si musculus temporalis in principio esset tendinosus, in principio quoque esset periculofum & difficilis curationis, si verò in medio esset carnosus, vt omnes anatomici affirmant, vulnus mediæ partis minoris esse cōsiderationis.



*Proponuntur errata Galeno adscripta in iis, qua pertinent ad  
numerum partium corporu.*

C A P. X X.

**S**I de numero partium loquimur sæpè decipitur Galenus, numquid  
non dixit os sacrum ex tribus tantum ossibus constare? dixitq; tria  
tantum habere foramina, vt forsitan obseruauit in Cane, & Simia: ni-  
hilominus os sacrum seorsum tamen à coccyge consideratum (ne er-  
remus cum Syluio, qui, vt defenderet Galenum sub hoc nomine ossis *vt Syluius*  
sacri nō solum coccygem comprehenderet, sed lumborum, & dorsi ver- *vel maximè*  
tebras, adeo in Galeni placitum ex animo visus est iurasse) ex quinque, *intrauerit in*  
& sex vt plurimum ossibus contextum est, quare si ossa sunt sex, quin- *Gal. placitū.*  
que necessariò vniuntur commissuris, & quinque foraminibus vtro-  
bique præditum erit: hæc cognitio tanti est in medicina, vt sit impossi-  
bile rectè mederi numero partium & foraminum ignorato, an- ne si in  
primo, in quarto, vel in quinto ossis sacri foramine caput aliquod illo-  
rum neruorum, per illa foramina exeuntium, esset à tumore compres-  
sum, & paralyti affectum, esset impossibile rectè mederi iis affectibus,  
si numerum, & situm foraminum, & neruorum permeantium vsum  
ignoras? quomodo scire poteris, cui parti sint adicienda emollientia,  
vel deriuantia localia, quæ à profundo trahunt, veluti sunt cauteria,  
vel auxilia pyrotica, nisi perfectè scias locum, vbi sunt foramina, quo-  
rum si numerum nescis, illa perquirere non poteris.

Præterea Galenus dixit decimam vertebra[m] esse mediam verte- *Videtur er-*  
brarum dorsi, quod in canibus; & similiis obseruatur, in hominibus ve- *rare Galen.*  
rò nequaquam; quia vbi est duodecima, ibi est mediū dorsi, qui enim *dicens mediū*  
ad vnguem omnium vertebrarum numerum, & neruorum prodeun- *dorsi esse de-*  
tium ab illis cognoscer, multos affectus animaduertere, & curare po- *decimam ver-*  
terit, quemadmodum contigit quoque ipsimet Galeno, qui diuinitus *tebram.*  
potuit digitis hominis venientis Romam, percussique in septima col-  
li vertebra ob casum è vehiculo motionem dare, quod non fecisset,  
nisi cognouisset à septima vertebra pendere neruos irrigantes digitos  
illos: tunc enim si Galenus credidisset, non à septima ceruicis verte-  
bra, sed à tertia, vel quarta dorsi prodire surculos nerueos influentes  
in brachia, & dorso adiunxisset, & non collo topicum illud emolliens,  
miser ille non fuisset sanatus; est igitur necessarium, vt cognoscamus  
affectus pertinentes ad hæc humanam fabricam, prius scire numerum  
omnium partium compositarum.

Insuper Galenus putauit os pectoris contextum esse ex tot ossibus *Quanti sit*  
numero, quot sunt legitimæ costæ, vt cuilibet datum esset, cui adhæ- *scira ex quot*  
resceret, quod in canibus, & fimiis, & aliis animantibus ratione caren- *ossib constat*  
tibus est videre, in hominibus verò tria, vel quatuor ad summum ob- *os pectoris.*  
seruantur. Ex quo numero præcognito, plura colligimus necessaria in

curandis contusionibus, & vulneribus pectoris; in his enim affectibus, qui perfectè scit numerum ossium pectoris, necessariò sciet, quot sint commissuræ, vbi sint & vbi sita est cartilago, quæ est osse mollior, & tenerior; his cognitis certo sciet, an vulnus torum sternon peruat, quoniam si vbi est cartilago, vulnus sit, quia est mollior, enlis facilius penetrare potest quo percepto, naturam morbi, præfagium, & remedia colligere poterit.

Ad hæc credere videtur lib. de musculis scapulas à septem musculis moueri, attamen in hominibus quatuor tantum reperiuntur; & optima cū ratione, quoniā in scapulis quatuor quoq; obseruantur motus, sursum scilicet, deorsum, ante, & retro: quare horum musculorum præcognito certissimo numero, tūc si scapula amitteret motum sursum, vnicus esset curandus musculus, si verò essent septem musculi scapulam mouentes, necessariò plures essent præcognoscēdi, sed in iis experientia standum est. Insuper putauit quoque Galenus, musculum cucularem esse duos musculos, quia duos in similibus cuculares reperit, verum in hominibus vnicum tantum omnes anatomici inuenerunt.

*Instrumenta  
auditus no-  
mīnē inuēta*

Insuper plurima quotidie inueniuntur, non solum ad numerum, sed ad situm, meatus, substantiam, & ad cæteras enarratas cōditiones pertinentia; & ne dimittam numerum ossiculorum auris, scias ab anatomicis nostris, multis tamē ab hinc annis, esse inuenta illa tria ossicula, quæ sunt auditus instrumenta, vt primum vocetur malleus, secundum incus, tertium stapha, de quibus apud Galenum neque sub his nominibus nuper inuentis, neque sub aliis mentio aliqua facta est, quare cum quodlibet ossiculorum in formando auditu necessariò concurrat, sequitur, vt vnico læso statim lædatur auditus, quare in cognitione auditus erit necessariū cognoscere numerum illorum ossiculorum, si quis verò exoptat cognitionem omnibus numeris absolutam horum instrumentorum ad auditum pertinentium, legat mirabilem tractatum Hieronymi ab Aquapendente, qui summo studio ac diligentia de horum instrumentorum numero, & de cæterarum partium figuris & magnitudinibus adeo diligenter scripsit, vt sine controuersia omnes, qui hæcenus de hac re edidere, præcellat.

*Errare vide-  
tur Galenus  
dum dicit à  
coccyge oriri  
neruorum  
coniungatio-  
nem.*

Præterea Galenus addit neruorum numerum in coccyge, quos neruos in humano cadauere nemo vidit vnquam; dixitque à coccyge oriri coniugationes neruorum, quod re vera in brutis, quæ habent caudam, reperitur, verum in hominibus nequaquam.

Postremò habet Galenus quod inferius orificium ventriculi hoc insolito numero sit præditum, vt glandula circumducatur, alibi quoque tenet nec venas, nec arterias esse in liehe, quæ errata in capitibus superioribus sunt reiecta; in hæc, & in alia plura errata Galenus aliquin sapientissimus incidit, quia non potuit humana cadauera secare, hæc errata tantummodo proposuimus, non solum, vt methodus proposita magis eluceat, verum etiam, vt omnes videant, quod omnia errata, quæ sunt, & quæ imaginari possumus, pendeant ab inscitia decem illarum conditionū partiū corporis, quas superius proposuimus.



*Proponuntur aliquot errata Galeno adscripta in pertinentibus ad substantiam, compositionem, officium, & exordium partium nostri corporis.*

C A P V T X X I.

**S**I loquimur de substantia partiū, aliquando Galenus visus est quod *Nonnulla errata Galeno adscripta in par substantia asclerantur.* que in scopulos impingere; numquid non est falsum, dum dicit cerebelli substantiam esse cerebro duriolem: qua falsa positione data, ane de vno in alium serpere videtur errorem; dicit enim neruos duos a cerebello oriri, quia cerebellum est durius, quod est falsum, vt ostendimus, quia a cerebello nullus oritur neruus, sed omnes a cerebro, & a spinali medulla: additque tertium errorem ortum ex prima positione dicendo neruos motiuos a cerebello, sensitiuos vero a cerebro oriri, perinde ac secundum par, & tertium neruorum, qui manifestè ex Galeni sententia a cerebro oriuntur sint sensus, & non motus auctores, quod reluctatur experientiæ, quia, vt superius ostendimus, omnis neruus (opticus exceptis) motus, & sensus simul sunt opifices: ecce quo pacto parua, & exigua erroris macula in opinione, si longius progrediatur mille falsas opiniones parere possit.

Similiter secundo de temperamentis, & alibi loquens Galenus de substantia spinalis medullæ dixit esse molliorem ea medulla, qua ossa nutriuntur, quod nullus sensus admitteret. Amplius Galenus, & cum eo Aristoteles habent in calida corporis particula; vt est cor, non esse pinguedinem, cum apertè in hominis corde pinguedo sit, nisi interpretemur Galenum, & Aristotelem, quod intellexerint, non esse pinguedinem in intima cordis parte, vbi cor igne pene est emicans; vbi re vera non est pinguedo: est enim valdè rationi consonum, vt credamus Galenum, & Aristotelem cognouisse in cordis externa parte, esse pinguedinem, quoniam in cordis omnium animalium terrestrium, aquatilium, & volatiliū externa parte reperitur pinguedo; esset nimium a ratione alienum credere Galenum, numquam vidiſſe, vel comediſſe animalium corda, quæ omnia forinsecus habent pinguedinem.

Demum 9. de vlu. part. habet Galenus appendices esse ossibus duriores, quod superius est reiectum; habet enim appendix corpus molle, & spongiosum, de hac re ego quoque Galenum defendi, quod in codice forsitan sit mendum, quia vix mente concipi potest, quod Galenus in re tam manifesta errauerit, perinde ac nunquam comediſſet ossa vituli, vel volatiliū, in quibus canes, & pueri quotidie experiuntur appendices esse molliores ossibus.

De compositione partium varia Galeno adscribuntur errata; hocq; prius afferimus, quod scilicet voluerit Galenus lib. de ossibus vertebra cōiungi per tertiā tunicā vestientem spinale medullā, quod vide-

*Errata ad  
scripta Ga-  
leni pertine-  
ntia ad com-  
positionem.*

tur falsum; quoniam re vera coniungitur medio proprioque ligamen-  
to, vt mirandum sit, Galenum credidisse, vt tam subtilis tunica posset  
sustinere ossa illius magnitudinis. Ex qua compositione male præ-  
cognita plurimi errores contingere possunt in curandis dislocationi-  
bus, & contusionibus.

Præterea habet Galenus caput infimum vlnæ componi cum bra-  
chiali, quod nullo modo in hominibus obseruatur, quia cum nulla  
parte brachialis videtur habere connexum aliquem; alia quoque artu-  
limus superius pertinentia ad compositionem, propterea paucis hic,  
& per epilogum hæc collecta sunt.

*Errare vide-  
tur Galenus  
dicens quod  
officiū quartus  
musculus  
hyoidis sit  
scapulam at-  
tollere.*

Quantum attinet ad officium partium in primo, & secundo libris  
plura de officio musculorum, & aliarum partium proposuimus: cæte-  
rum, quia officia partium læsæ affectus præter naturam pariunt, par est  
hic, vt saltem vnicum exemplum proponamus: an-ne vit sapientissi-  
mus habet quartum musculus hyoidis, illum videlicet subtilem, &  
longum, ortum quoque ex Galeni sententia ab ipsomet hyoide, & qui  
terminatur in latus hyoidis, hoc explere officium, vt scapulam attol-  
lat? hoc sanè ab omnibus anatomicis merito iudicatur impossibile,  
quod scilicet tantum scapulæ pondus ab hoc solo subtilissimo muscu-  
lo attollatur: supposito ergo hoc errore ab aliquo sectatore, qui in pla-  
cita iurauerit Galeni, an-ne, si videret scapulam non posse attolli, sta-  
tim firmiter crederet musculus illum subtilem esse læsum, & illi parti  
topica summo forsitan cum ægrotantis detrimento adiungeret? ecce  
quanti sit officia omnium partium perfectè cognoscere; quare quod  
de huius musculi officio animaduertimus, de omnibus idem facien-  
dum, hac scilicet perpetua conditione seruata, vt in omni parte affe-  
cta cognoscenda, & curanda prius loci, vel partis affecta officium  
cognoscamus.

Postremò de partium exordiis loquens Galenus non semel visus  
est à veritate deflectere; afferatur exemplum; an-ne dicit substantiam  
penis exordiri à superiori parte penis? quod sanè non recipitur, quo-  
niam penis (vt patet in anatome) exorditur ab inferiori parte, & ab  
ano origine carnea.

Hæc, & alia plura errata sunt, quæ Galeno adscribuntur, quorum  
aliquot, quia sensibus aduersantur, non possunt defendi: fatemur ta-  
men aliquot esse non omnino spe destituta, vt ab aliquo, qui sit inge-  
nio excellenti, qui tamen non auctoritate tantum; sed ratione, & ex-  
perientia incedat, non possint in bonum sensum reuocari. Etenim il-  
lorum hominum ingenia in catalogum excellentium nullo modo sunt  
collocanda, quibus auctoritates magis quam sensus ipsi persuadent,  
quinimo sunt fugienda, & præcipuè his temporibus, quoniam plurimi  
alioquin celebres sunt eo ingenio, qui malunt autopsiæ, quam Aristo-  
teli, & Galeno fidem derogare, quique quod deterrimum est, tanto  
odio prosequuntur illos, qui liberè philosophantur, vt audeant con-  
uicia, & libros contumeliosos promere in sensatos, & liberos philoso-  
phos. Hinc Syluius tanti nominis vir sequens Tyrannicam doctrinam



nam tanto animi impetu inuehitur in Vesaliū, de anatomia optimè *ut in insle Syluius ad-*  
meritum, totque calumniis, vocibusque contumeliosis morder, & la- *oritur Vesa-*  
cerat eum, qui tanta industria, & tātis laboribus occultas partium no- *lium libro*  
stri corporis condiciones aperuit, ut ipsum Syluium non pudeat in suis *ingenio præ-*  
depulsionibus pro Vesalio vesanum perpetuò substituere; deinde li-  
brum Vesalij tot inuentis ornatum vocare rudem, & indigestam sar-  
raginis colluuiem & cloacam, librum Vesalij dignissimum vocare in-  
dignissimū, & hortari tam efficaciter lectores, ut ipsum lacerent, con-  
culcent, & Vulcano deuoueant; postea emò pergens Syluius impuden-  
ter dicat, quod sit multo facilius Augiæ stabulum repurgare, quam  
centonem huius ex furtis confutum, & calumniis factum, mendis etiā  
insignioribus tantum emaculare. Denique adeò recandescit ira, &  
in talem insaniam proruit, ut iis verbis implorer Cæsaream Maiesta-  
tem, quæ Vesaliū (quia sensibus propriis magis credidit, quam au-  
ctoritati Galeni) tamquam monstrum ignorantiae, ingratitude, &  
arrogantiae, impietatis exemplar perniciosissimum, domi suæ natum,  
& educatum, uti est commeritum, malè mulctet, ac omnino compri-  
mat, ne suo pestilenti halitu Europam reliquam venenet: quid vltè-  
rius dici posset, si idem Vesalius esset reus, non dicam Galeni, sed læsæ  
Cæsareæ maiestatis? Quare dimisso Syluiō, ut qui non ratione, &  
experientia aggressus est Vesaliū, sed vanissimis, & tumidissimis  
vocibus; (sicut in Apologia quoque Renatus eloquenter ostendit) &  
dimissis omnibus, qui solum auctoritatibus sunt addicti, concludimus  
primò sensibus, & experientiae esse credendum, secundò rationi, tertio  
auctoritatibus Hippocratis, Galeni, Aristotelis, & aliorum excellen-  
tium philosophorum.

Ex traditis in hoc libro poterimus omnes specificas morborū ideas *Epilogus.*  
occultas perquirere, quia in exordio huius libri ostendimus, quod  
omnes affectus specifici fiant à decē propositis conditionibus; & quia  
affectuum curatio pender à recta cognitione essentiae, idè declarauimus  
in sequentibus capitibus quo pacto recta administratio reme-  
diorum in curandis affectibus possit colligi à conditionibus proposi-  
tis, tamquam à propriis fontibus: exinde plurimis, & conspicuis exem-  
plis ostendimus, quod omnes errores, qui fieri possunt in specificis  
morborum ideis perquirendis, oriuntur ab inscitia decem proposita-  
rum conditionum: postea aliquot errata Galeno adscripta propo-  
suimus à quibus vix defendi potest, ut ostenderemus errata omnium  
generum prodire ex malè intellectis illis decem locorum affectuum  
conditionibus, quæ sunt situs, meatus, substantia, temperatura, com-  
positio, numerus, officium, exordium, figura, & progressus.



# SANCTORII

## SANCTORII

Iustinopolitani


*METHODI VITANDORVM  
errorum in specificis Morborum, & Sym-  
ptomatum ideis metiendis.*

LIBER QVARTVS.

*Ostenditur esse metiendos recessus morbisicos à statu salubri aduen-  
tatio, & nequaquam à primogenio.*

CAPVT I.

*Tantus est  
morbus quā-  
tus est recessus  
sui à statu  
salubri.*



N præcedenti libro ostendimus vniuersos affectus præter naturam fieri específicos, dum corporis nostri partes recedunt à statu salubri in figura, meatu, situ, numero, compositione, temperatura, substantia, officio, exordio & vaporum progressu; neque alias præterea imaginari potuimus partium conditiones, quæ distinctius formare, & constituere possent affectus específicos & particulares: relinquitur solum, antequam extremam manum imponamus huic contemplationi de affectuum præter naturam ideis; vt in hoc 4. libro cognoscamus, qualis sit hic status salubris, à quo, dum recedunt partes, consurgant morbi; quæ cognitio est valde necessaria, quoniam ex Galeno primo ad Glauc. cap. primo tantus est morbus, quantus est hic recessus à statu salubri.

Quare nisi expendamus & cognoscamus hunc statum salubrem, qui est terminus à quo partes affectæ recedunt, numquam sciemus metiri



metiri recessum, & numquam vltimam differentiam morbificam attingemus; quo circa, ne in æquiuoco laboremus, singularis est animaduertenda distinctio, quæ est, vt in omnibus affectibus præter naturam dupliciter considerari possit recessus à statu salubri, alter enim consideratur recessus à statu salubri primigenio, qui ab exordiis generationis comparatur, alter verò consideratur recessus ab aduëctio statu partium salubri, qui aduentitius status in viuencia corpora non illico, sed tractu temporis sensim à consuetudine sex rerum non naturalium intromittitur, quippe qui non solum est diuersus à primigenio, verum etiam sæpè cõtrarius; & de hoc præcipuè agere debemus, quoniam status salubris, quo nuper ægrotantes, dum erant sani, fruebantur, nõ potest esse primigenius, sed nouus & aduentitius; idè ab ipso metimur recessum, & ad ipsum pro viribus reducimus ægros, vt ipsos sanos reddamus, hinc Galenus 11. methodi cap. 3. dicit in morbis non debere seruari natiuum temperamentum, sed aduentitium; quæ proposita distinctio cum ab Empyricis non rectè sit præuisa, non est mirum, si in plurimos labantur errores.

*In omni morbo esse duos recessus à statu naturali.*

Labuntur in primis rudiores Medici, dum in exordiis suarum consultationum recessum ab aduëctio statu salubri cum primigenio cõfundunt, veluti dum expendunt signa temperamenti ægrotantis sine vlla distinctione duplicis huius recessus, proponunt enim signa temperamenti ab ortu naturæ comparati, & nequaquam perpendunt signa aduentitij illius temperamenti, quo nuper, dum erant sani fruebantur; quinimo ipsi errant valdè, quoniam, vt plurimum primigeniũ temperamentum, vel primigenia constitutio potest esse adeò remota à constitutione, & ab illo temperamento aduentitio, quod æger recuperare desiderat, vt non solum possit esse diuersa, verum etiam contraria, quinimò talis potest accidere, qualis si adesset, vitam ægrotantis omnino destrueret.

*Vt errant, rudiores medici in consultationum exordiis.*

Hinc Galenus lib. de tuend. sanit. prælagus tanti erroris erupit in hanc sententiam; quæ in præsentia sumitur pro principio nostræ considerationis: in debilibus, & senibus esse conseruandam consuetudinẽ, quamuis deterrimam, idem videtur quoque asserere 11. methodi cap. 3. quare si ex Galeni sententia, ægri, senes, vel debiles sunt reuocandi ad consuetum siue aduentitium statum, quamuis sit malus; quanto magis ergo licebit transferre ægros ad illum statum aduentitium non deterrimum, sed salubre, quo, dum nuper erant sani, fruebantur. Quorsum ergo nostrates in omni ægrotante proponunt signa solum primigenij temperamenti? quando in omni viuente status primigenius tractu temporis multoties alterari, & mutari possit, & sæpè tantum absit à statu salubri, quem exoptamus, quantum abest morbus à sanitate? an-ne quis nasci potest cum iecore calidissimo, & per consequens venas habere latas & amplas, & deinde temporis intervallo adeò in frigidum temperamentum properare, vt tandem cachexia, & iecoris frigiditate prematur? an-ne salubris status istius, quo dum proximè erat sanus, fruebatur, fuit potius frigidus, quam calidus? etenim natura non

*Malas consuetudines in debilibus & senibus non esse mutandas.*

transit ab extremo ad extremum nisi per media : an-ne habebat eandem latitudinem venarum in omni aduentitio statu ? quia ob temperamentum mutatum à primigenio calido in aduentitium frigidū magnitudo venarum non minuitur. Quare cum hæc ita se habeant, quomodo volueris per signa primigenia cognoscere salubrem statum aduentitium ? & quod deterius est, volueris variis pharmacis ægrum semper transferre ad statum primigenium ? Etenim latitudo venarum (ne ab hoc exemplo recedamus) conseruatur in omni temperamento primigenio, & aduentitio, quia est signum insequens conformationem; quare nulla erit consequentia à conformatione ad temperaturam, neque à temperatura ad cōformationem, quia sunt status, & naturæ admodum diuersæ, vt propterea illi Empyrici in maximos irruant errores, qui connectunt has consequentias, aliquis habet venas latas, ergo habet e cur calidum, ergo refrigerandum. Insuper quid vetat hominem esse caloris feracissimum à primordiis suæ generationis, qui tamē ob frigiditū assuetudinem, sibi naturam frigidam comparauerit, sed sanam, eadem semper manente venarum latitudine ? qualem ergo naturam cōseruare erit medici officium, præsentem sanam, vel vetustam illam primigeniam iam diu amissam neminem esse puto dicentem, dū

*Ægros ad statum aduentitium sanum esse ducendos, & non ad primigenium.*

*Cur primigenium natium temperamentum in ægro non sit seruandū.*

ægri tam remoti sunt à primigenia ipsos esse ad eam reducendos, vel eam in ipsis, cum non sit, esse conseruandam; quia iam in primo libro docuimus de ratione indicantis siue sit in methode curatrice, siue in conseruatrice esse præsentiam, docuim⁹que quod est in fieri, non indicare; quia, quod est in fieri non est adhuc exactè præsens, quoniam exactè præsens in methode debet esse in facto esse stabile firmum & non fluens, quam doctrinam colligimus passim ex Galeno, & præcipuè in methode medendi loco superius citato, vbi clarissimè dicit in ægris non esse seruandum temperamentum natium, sed illud, quo ægri incidunt in morbos, & ratio est, quia natium non est præsens, vt aduentitium.

Sed ad exempla accedamus: Socrates ab ortu nature humidissimus in ætatis progressu redditur siccus, verumtamen sanus, Socrates deinde in ægritudine cadit; tunc medici in suis consiliis proponunt esse conseruandum temperamentum naturale, & ad illud Socratem reuocandum, proponuntque à temperamento naturali esse metiendum recessum; sciscitor ab eis, vt mihi dicant, qualemnam temperamentum conseruare volunt, vel à quo volunt metiri recessum, à naturali statu primigenio, vel aduentitio dicere non possunt primigenium esse conseruandum, vel à primigenio esse metiendum recessum; quia non est, & non entis non sunt indicationes, quare nullo modo status primigenius indicabit, quinimo potest accidere, vt præsens temperamentum Socratis magis distet à primigenio, quam morbus ab eius aduentitio statu salubri; quæ cum ita sint, sequitur, vt constitutio aduentitia salubris in ægrotantibus sit conseruanda, & ab ipsa sit metiendus recessus, & nequaquam à primigenio.

*Exemplo cōfirmatur non esse seruandū natium id temperamentum.*

Ad eundem modum biliosa corpora euadunt pituitosa, eaque in-  
ter



ter latitudinem sanitatis conseruantur; quoniam sub vtraque sorte æquè benè munerum suorum officia explere possunt. Cur ergo hoc corpus, quod à primordiis suæ generationis fuit biliosum, & deinde factum pituitosum, pristina manente valetudine, si labitur in ægritudinem, vis reducere ad statum primigenium? vel à constitutione primigenia eius recessum metiri volueris? Quorsum ergo in omni medica consultatione perpendere vis primigeniam temperaturam, quæ est remotissima, & quæ potest omnino reluctari salubri constitutioni aduentitiæ? cur vis inferre à signis ortis à primigenia constitutione status præsentis conditionem. Sicuti dicendo est latitudo thoracis, & thorax hyssidus, ergo totum corpus est calidum; quod non sequitur, quia ob longam consuetudinem frigidarum rerum, nulla facta mutatione in latitudine, vel hyssiditate thoracis potest accidere, vt cor, & totum corpus acquisierit naturam frigidiusculam, & sanam, neque obiciant signa hæc, & alia id genus esse desumpta à Galeno in arte medicinali. Quia occurrimus Galeni signa tradita in arte medicinali seorsum & sine sufficienti syndrome aliorum signorum considerata arguere potius constitutionem illam, quæ est à primordiis generationis comparata, quam aduentitiam, idcirco nisi illorum omnium signorum fiat sufficientissima syndromes, numquam cognoscemus præsentem constitutionem, vel aduentitium statum, colligere ergo firmiter possumus nullam esse consequentiam à signis primigenij status ad statum salubrem vt nunc & aduentitium; cum toto cælo distent: addimûsque quod illi, qui sumunt signa primigenij status loco signorum pertinentium ad aduentitium apertissimè labantur in paralogisimum æquiuocationis, quod argumentum est in quatuor terminis, tandèmq; concludimus ægrorantes reducendos esse ad statum, quo, dum nuper erant sani, fruebantur, & nequaquam ad primigenium.

*Est latitudo thoracis vel thorax hyssidus: ergo totum corpus est calidum non sequitur.*

*Qui arguit à signis aduentitij statum ad primi genij argumentum, facit in quatuor terminis.*

*Ostenditur posse mutari sine morbi introductione temperaturam, meatum, situm & figuram partium: exordia vero, substantias, numeros, compositiones, officia, & progressus non posse mutari.*

## CAPVT II.

**O**STENDIMVS superius decem tantum esse differentias partium corporis, quæ affectus vniuersos tam naturales, quam præter naturam constituunt: hic verò paucis declaratur, quod aliquæ illarum differentiarum ab exordiis naturæ non possint per totum vitæ cursum in animantibus mutari sine noui, & aliquando lethalis morbi introductione, aliquæ verò possint mutari sine morbo. Quæ verò non possunt mutari videntur esse exordium, substantia, numerus, officium, compositio, & progressus partium, quæ verò possunt mutari sunt tem-

peraturæ, meatus, situs, & figuræ partium. Etenim multum interest in aduentitij status contemplatione scire, quæ conditiones sint mutaturæ, quoniam alio modo recessus à statu naturali est metiendus læsa temperatura, vel læsis meatibus, vel figura, vel situ, quam si reliquæ conditiones essent mutaturæ, quoniam partium temperaturæ, situs, meatus, & figuræ sæpè alterantur, & mutantur, manente tamen valetudine inter limites naturales; potest enim esse, ut aliquis habuerit iam diu, & ab ortu naturæ ventriculū calidum, attamen tractu temporis mutauerit in frigidum, & frigidum aduentitium, & acquisitum conseruauerit sine noua morbi introductione, quod non euenit in officiorum mutatione, quoniam officia videntur esse immutabilia, alterabilia tamen in viuente secundum magis, & minus; hinc si ventriculi officium, quod est chilificare, & officium hepatis quod est sanguificare, & alia omnium partium officia cōsideremus, videbimus, quod omnia, dum viuit animal, sunt immutabilia, alterabilia tamen secundum magis & minus, quoniam si destruitur officium ventriculi, quod est chilificare, fit statim illa lienteria, quæ est indelebilis, & lethalis: similiter, si iecoris officium, quod est sanguificare, adimitur, nulla amplius salutis spes est relicta, quare experientia patet, in officiorum mutatione non solum nouos morbos introduci, sed aliquando exitia, & hominum mortes.

*Temperatura, meatus, situs, figuræ mutantur sine morbo.*

Quæ sanè in temperaturis mutatis non obseruantur, vidimus enim sæpè mutari temperaturas sine noua morbi introductione, sicuti patet, dum iecur, quod est sua natura calidum temporis spacio fit frigidū sine morbi introductione, similiter caput ab ortu naturæ, & in prima generatione humidum redditur siccum, eadem manente bona valetudine. Quo ad meatus, eadem videntur dici posse, quia sæpè corporis meatus fiunt maiores, vel minores, & valde dissimiles à primigenia constitutione, attamen in latitudine sanitatis conseruari possunt; ita ut non semper affectus in meatibus recedant à statu salubri. Simili modo figura omnium partium potest ad eodē mutari, ut nulla similitudo illarum amplius conseruetur, attamen non semper ob figuræ mutationem nascitur recessus à statu salubri.

*Quæ diffinitio partium corporis non mutantur sine morbo.*

Cæterum hæc quæ dicta sunt de temperatura, meatu, & figura partium, non videntur, posse obseruari in cæteris conditionibus; non enim videmus homines conseruari sanos iam mutatis partium aliquarum exordiis, officiis, numero & reliquis propositis; quoniam, si neruorum, venarum, siue arteriarum numerum quis amitteret esset impossibile, ut inter limites sanitatis conseruaretur. Ad eundem modum, si quis amitteret alicuius partis propriam substantiam, veluti si ossa sua substantia dura euaderent mollia, absque dubio morbo aliquo vexarentur, & quod diximus de ossium substantia de qualibet partium substantia dici potest. Similiter videmus vasa, & partes corporis non amittere suū progressum sine morbo, & maximo recessu à statu salubri, quoniam si venarum, vel neruorum surculi mutarent progressum illico in ægritudinem talis fieret lapsus, ut sæpè de animalis vita actum esset; quare vasorum progressus debent seruari ab exordiis naturæ vsque ad vltimum



ultimum diem, etenim si vena magna, quæ est in iugulo vel sextum par  
neruorum mutarent suorum furculorum progressus, ut furculi venæ  
iugularis non excurrerent in caput, vel furculi sextæ coniugationis  
neruorum non progredierentur ad pulmonem ad iecur, & ad os ven-  
triculi, tunc hæc mutatio progressus non solum ægritudinem, sed cer-  
tum exitum promitteret: similiter compositio quælibet mutata, ut  
omnes sciunt siue sit lypartrosis, siue sit diartrosis, siue symphisis sine  
morbo esse non potest. Hæc sanè de temperatura mutata nõ sequun-  
tur, quia, ut diximus, ventriculus siccus si sit humidus, non solum de-  
struitur, sed conservari potest inter salubres limites; neque in meati-  
bus mutatis videmus semper sequi malas valetudines, cum magis, &  
minus aperti seruentur, eadem manente bona valetudine. Nec de-  
mum videmus, ob figuram mutatam illico ægritudines oriri, quoniã  
si de figura loquimur, ut faciei & aliarum partium externarum, & in-  
ternarum aliquando figura mutatur secundum totum, attamen nulla  
sequitur ægritudo, queadmodum in illis est videre, qui ab infantia  
vsque ad senectutem numquam in ægritudinem prolapsi sunt: in qui-  
bus figuræ omnium partium internarum, & externarum sunt millies  
mutatæ sine morbi introductione. Colligimus ergo mutari posse sine  
morbi introductione temperaturam, figuram, meatus, & situm partiũ:  
non mutari sine morbi introductione exordium, efficiũ, numerum,  
substantiam, progressum, & compositionem partium corporis. Ex iis  
quoque colligimus, quæ sint illæ conditiones, quæ magis pertinent ad  
primigenium, & quæ ad statum aduentitium; quæ enim magis perti-  
nent ad primigenium sunt illæ, quæ in vivente difficile mutantur, ut  
sunt quæ sine morbo non mutantur, cæteræ verò, quæ promptè mu-  
tantur, magis pertinent ad statum aduentitium.

---

*Habet latitudinem venarum ergo iecur habet calidum, ostendi-  
tur consequentiam esse nullam.*

C A P U T III.

**E**X traditis facillè colligimus, quomodo errent illi, qui volunt meti-  
ri morbificum recessum à statu naturali aduentitio per illa signa,  
quæ potius declarant morbificum recessum à primigenio statu; quo-  
niam ob hanc signorum æquivocationem incidunt in paralogismum  
quatuor terminorum; aduentitius enim status in ætatis progressu à  
causis externis introducitur, & valdè differt à primigenio statu, qui in  
primis generationis exordiis acquiritur; cum igitur status isti sint di-  
uersi, valdè miror nonnullorum Empyricorum inscitiam, qui ex si-  
gnis primigeniæ constitutionis colligunt aduentitiam, & præsentem  
cōstitutionem, sicuti dum ex latitudine venarum, quæ tales factæ sunt  
in prima nostra generatione, colligunt hepar esse calidum, in qua re  
maximè decipiuntur; quoniam hepatis caliditas præsens, & aduenti-

*Errant qui dicunt magnitudinem partium in dicare temperaturam.*

*Signa aut. medi. cum syndromen aliorum significare.*

*Ut errant, qui dicunt venam ab hepate prodire.*

*Ut conuin-  
catur virtu-  
te analytica,  
qui dicunt  
hepar effe-  
ctum venarum.*

tia non est illa, quam in prima nostra generatione acquisiuius, quandoquidem tractu temporis temperamenta variantur, & viscera, quæ ab initio erant calidissima ob vñ & consuetudine externarum rerum possunt in temperamenta frigidiora degenerare, & variis modis alterari tam secundum passiuas quam actiuas qualitates, eadem manente vasorum magnitudine, & figura; hinc hepar, quamuis in maximas incidat febres, & infinities temperatura ipsius nouetur, & permuteretur, magnitudo tamen hepatis & venarum seruetur immutabilis. Similiter videmus hominem capite magno præditum modo in calidam, modo in frigidam, modo in siccam, & modo in humidam dyscrasiam corrumpere eadem magnitudine capitis sub omni sorte perseverante.

Quæ cum ita sint, facile patere potest, quantum errant, qui ex venarum latitudine caliditatem iecoris necessario inferunt. Errant primò, quia confundunt signa ostendentia recessum à statu primigenio cum signis ostendentibus recessum à statu aduentitio. Secundò errant, dum credunt solam latitudinem venarum caliditatem iecoris significare, quod videretur ipsi Galeno aduersari, quoniam in arte medicinali non interebat ardorem hepatis solum ex latitudine venarum, sed ex syndrome signorum sufficientissima, scilicet ex fluxu bilis abundantia, ex atræ in consistenti ætate, ex corpore vniuersim calido, ex ventre, & hypocondriis hirsutis, & ex latitudine venarum calidam iecoris temperiem colligebat. Tertiò errant, quia magnitudo non pertinet ad temperiem, sed ad compositionem, ergo magnitudo venarum non arguet hepatis temperaturam calidam.

Præterea possumus quoque altioribus principiis probare, venas nullum habere nexum necessarium cum hepate, quoniam potest defendi, quod venæ in prima generationis nostræ origine non trahant ortum ab hepate, quod probatur tum ratione, quæ est desumpta à Galeno secundo de temperamentis, vbi affirmare videtur hepar esse parenchyma venarum: tum experientia, quæ obseruatur in formatione foetus pulli, in quibus fracto ouo, quod quatuor dierum spacio à gloriante gallina sit forum, antequam aliquod vestigium & rudimentum hepatis appareat, venula quædam conspicitur; quæ cum ita sint, dicere non possumus, quod venæ sint hepatis germina cum re vera in ipso foetu venæ prius generentur: quare nullo modo venarum conformatio caliditatem iecoris significabit, si illo erunt priores.

Præterea potest comprobari virtute analytica, quæ re vera cogit, & deuincit animos, quod scilicet nullus sit necessarius nexus inter venas, & hepar, & per consequens neque iecur calidum magnas venas facere neque magnas venas ostendere caliditatem ipsius, age, exequamur, an-ne Aristoteles 2. post. habet, si causa est temporis momento prior effectu; illam nullum habere nexum necessarium, & per se cum effectu & per consequens illam non esse veram causam illius effectus, & ratio est, quia si effectus non semper est in sua causa, sed aliquando tantum, causa illa non prædicabitur de illo effectu de omni ratione

cuius



cuius prædicationis duæ requiruntur conditiones , altera est æternitas, altera verò, quòd ille effectus sit in omnibus indiuiduis illius speciei, veluti (vt exemplis notissimis illustremus ) si homo esset prior risibilitate horæ momento , sequeretur quod homo non esset risibilis, quia hæc propositio, quæ dicit, hominem esse risibilem, non esset semper vera. & ratio est, quia non esset de omni, illud enim quod non est semper non est de omni, & quod non est de omni, non est per se, & quod non est per se est accidentale, & quod est accidentale, vt sustinet Auerroes, est falsum ergo venæ quæ erunt horis, & diebus in generatione priores hepate, vt patet per experientiam propositam, non erunt causæ hepatis, nec hepar causa venarum. similiter, nec venæ indicabunt iecoris conditiones, neque hepar verarum magnitudinem, vel paruitatem; quomodo ergo poterunt venæ latæ, & amplæ ostendere caliditatem iecoris intentam; quare nisi dicamus latitudinem venarum cum syndrome aliorum signorum tantum posse indicare caliditatem iecoris, nullo modo colligere poterimus ex latitudine venarum caliditatis inditiam, quia signa per syndromem collecta sunt omnia accidentalia, signum enim proprium, & per se vnicum est, quia vnus rei vnicum tantum est signum per se, quia de ratione signi proprii est, vt cõueniat omni, soli, & semper, & conuersum dicatur de eo cuius est proprium, & tandem propria collocentur in secundo modo dicendi per se, & hæc sola sunt, & non plura in vnica specie; quando verò sit syndromes, eo fit, quia proprium signum est ignotum, & innotinatum, idèd circumscribitur. Ecce ergo quam benè fauent sententiæ nostræ principia analytica.

Haftenus arguimus per instantiam, & ostendimus latitudinem venarum non significare temperaturam iecoris, quia venæ non procedunt à parenchyma. Nunc illud met infringi potest per fiduciarum reprobationem, dato scilicet, & non concesso, quod venæ sint hepatis germina, negamus tamen latas, & magnas venas semper fieri à magno visceris calore & ratio est, quia partium magnitudo non sequitur primas qualitates calidas, vel agentia calida, sed formatricem, & multitudinem materiæ. Quod roborari potest auctoritate, ratione, & experientia, auctoritate, quia Galenus 2 de temperamentis eap. 8 habet partium magnitudinem sequi virtutem formatricem, & multitudinem materiæ. Similiter lib. de art. medicinali vbi agit de capite paruo, & magno dicit magnum caput fieri posse, vel à virtute facultatum, vel à multitudine materiæ non regulatæ à virtute, cuius facultatis instrumentum ex Galeno est calor. Ecce ergo quod magnum fieri potest à multitudine materiæ tantum, & non semper ab aliqua virtute determinata calida, vel frigida; quare si non semper à calore, ergo non erit per se hæc propositio, calor efficit magnas partes, ergo erit per accidens, ergo erit falsum dicere, esse caloris proprium efficere magnas venas, & magnum caput, & cætera viscera maiora.

Insuper probatur ratione, quoniam si materiæ multitudo pos-

*Vi fiduciarum reprobantur dicentes venas indicare iecoris caliditatem.*

*Reijciuntur auctoritate.*

*Ratione.*

sit reddere viscera maiora, hæcque materiæ multitudo possit sequi modo frigidas, & modo calidas, causa ergo contingens erit, vt calor efformet magna viscera, contingens inquam, quia si calor debet efficere hanc viscerū magnitudinē requiritur in primis, vt materia sit proportionata, vt absint impedimēta, vt materia non sit euaporabilis, & diaphoretico modo exhallet, vel calor nimius non sit; quia exsiccaret resoluendo, & absumendo aqueum humorem, quippe qui auget continuando partes terrestres, cæque secundum omnes dimensiones distendit.

*Experientia.* Postremò experientia confirmatur, quoniam videmus Germanos, qui sunt vt plurimum procere, calore vacare, vel saltem esse feruoris expertes, vt hinc pituitæ grandem copiam coaceruent, & eorum corpora vndique pituitosis fiteant recrementis. Similiter versa vice obseruatur, inueniri homines parue staturæ; qui sunt caloris feracissimi: quinimo, vt plurimum obseruamus paruos esse calidiores, magnos verò esse frigidiores, quare nullo modo dicendum est, calorem, qui est instrumentum facultatis, efformare partes, sed dicendum, pertinere ad formatricem, quæ variis instrumentis, & non calore tantum id efficere potest; quæ autem sint hæc instrumenta formatricis facultatis, hic non est locus.

Ob quas causas  
venarum  
magna  
apparent.

Relinquitur ergo vt in hoc capite inferamus has consequentias nō valere, est latitudo venarum, ergo hepar calidū, est hepar calidum, ergo latitudo venarum, latæ enim venæ modo sua natura magnæ sunt, modo parue videntur magnæ ob distensionem factam vel à copia sanguinis, vel ab impetu spirituum, vt in violentissimis exercitiis, & balneis obseruatur. Similiter dicimus venas ab ortu naturæ magnas reddi adeò flaccidas, & paruas ob spirituum, vel sanguinis caritatem, vt vix conspici possint; quare inferimus esse vanissimum colligere ex latitudine venarum iecur esse calidum, vel ex paruitate venarum iecur esse frigidum. Demum tanto maior istorum error redditur, quia si latitudo venarum ostenderet temperamentum, quod (vt probauimus) est impossibile, ostenderent temperamentum primigenium, & nequaquam aduentitium, quod querimus, & quo metimur recessum morbosum, & ad ipsum conamur ægrotantes transferre, quare patebit experientia auctoritate & plurimis altissimisque rationibus latitudinem venarum non ostendere iecoris caliditatem.

---

*Ostenditur aduentitium statum solum acquiri per consuetudinem  
sex rerum non naturalium.*

### CAPVT IIII.

**E**X præcedentibus patet, omnes illos errare, qui in specificis cognoscendis affectibus solent à statu primigenio metiri morbosum recessum; supponunt enim morbos vniuersos à primigenio statu recedere,



dere, & ad ipsum solum ægros esse reducendos: quod est omnino falsum: etenim ægotantes alium non exoptant statum, quam illum, quo (dum proximè erant sani) fruebantur, & talis est aduentitius, & nequaquam primigenius; de hoc igitur aduentitio agendum relinquitur in hoc quarto libro. Cæterum cum aduentitia natura ex omnium opinione fiat à longo usu, & consuetudine sex rerum non naturalium, quatenus videlicet causæ non naturales alterando mutant varias constitutiones tam naturales, quam præter naturam, & mutatis illis nouæ gignuntur, proinde volentes agere de statu aduentitio, vel de nouis constitutionibus, non possumus de alia re agere, quæ melius status nouos declaret, quam de consuetudine, quoniam à longa consuetudine omnes noui & aduentitij status seu constitutiones introducuntur, vt propterea non sit mirum, si à plurimis consuetudo vocetur altera natura, quam opinionem auctoritate, & experientia nostrates confirmant, auctoritate, quia Galenus libro de assuetud. capite 2. habet hæc verba, quæ longa consuetudine sunt comparata, vim ferè proprietatis naturalis contrahere; experientia, quia à consuetudine sex rerum non naturalium omnes facultates animales, vitales, & naturales adedò alterantur, vt temporis cursu infinitos status possint recipere. Quæ omnia exemplis confirmantur: an-ne corpus quod est à primordiis naturæ calidum tractu temporis ob assuetudinem rerum non naturalium frigidatum fieri potest frigidum, eadem manente valetudine? Similiter biliosa corpora fieri possunt pituitosa, & talia inter limites sanitatis possunt conseruari. An-ne (quod maxima admiratione dignū est) ob assiduam consuetudinem, & vsum cicuræ tolli potest etiā eius venefica virtus? sicuti relatuū est à Galeno de Anu quadā, quæ cicurā ob longum vsum in nutrimentum conuertit. Similiter in facultatibus vitalibus idem obseruatur, timidos videlicet assuetudine belli fieri corpore, & animo fortes, thymodes verò ob cōtrarios vsus fieri timidos: demum animales tam reëctrices, quam cæteræ omnes longa, & varia assuetudine adeo alterantur vt nouos habitus, & nouas naturas recipiant, & tales inter latitudinem quoque sanitatis conseruentur.

Constare igitur videtur auctoritate, & experientia omnes aduentitios status à consuetudine, & usu sex rerum non naturalium habere originem. Quod cum ita sit, videtur rationi consentaneum, vt de consuetudine, tamquam de principio omnium nouarum constitutionum verba faciamus agentes prius singillatim de iis quæ à consuetudine alterantur, deinde de definitione, & proprietatibus consuetudinis, definitione enim & proprietatibus consuetudinis præcognitis, plurima ad medicinam pertinentia fient clariora. Adest enim inter cæteras consuetudinis proprietates illa admodum præcipua, quod scilicet assueti minus lædantur à contrariis, cuius rei cognitio quanti sit in arte medica infra quoque patebit. Similiter sit in arte medica vidimus consuetudinem tantum posse, vt assuetus rhabbarbo ab ipso non purgetur, assuetus lactucis à lactuca non al-

teretur, assuetus veneno ab ipso non interficiatur. Quid multa? audias demum quantum potuit consuetudo; noui hominem, qui tractu viginti annorum vitam in obscurissimo carcere traiecerat, qui ut primum tenebris carceris, & putridis illis halitibus fuit liberatus in ægritudinem incidit lethalem; eaque ægritudine liberatus vixit anni spacio malè affectus, data tamen occasione ut iterum mitteretur in carceres, incepit sanari, & sanus conseruari. Hinc Galenus dicit inter senibus, & debilibus non esse mutandas consuetudines quamuis deterrimæ sint. Quare cum tanti sit hæc de consuetudine inquisitio, summa diligentia de ipsa est agendum.

*Exemplis ostenditur à longa consuetudine, & usu externarum causarum vniuersas humani corporis facultates in varias, & aliquando contrarias naturas mutari posse.*

## CAP. V.

**C**Vm optimus Medicus vltimas affectuum differentias consequi non possit, nisi recessum ab aduentitio statu sciat metiri; & quilibet aduentitius status à longa consuetudine sex rerum non naturalium suum initium trahat; par est, antequam consuetudinis definitionem excutiamus, ut luce exemplorum pertinentium ad omnes facultates corporis ostendamus quanta perrenis rerum externarum consuetudo potentia, & virtute polleat, & quæ sint illarum animantium facultates, quæ ad eò mutantur ob longam aliquam consuetudinem, ut status aduentitios & novos acquirant: videbimus enim assiduam consuetudinem tantum posse, ut modo facultates animales, siue sit reëctrix, siue motrix, siue sit sensatrix alterentur, & in ipsis ingenerentur noui & aduentitij status; modo vitalem, & naturalem ad eò mutari, & alterari, ut diuersos & contrarios suscipiant habitus, sicuti si de intellectuua potentia loquimur, videmus solertes homines ob præceptorum consuetudinem in falsa dogmata vocari, si de vitali potentia videmus fortes malo usu, ineptos, & debiles assiduo usu in omni opere aptissimos reddi, si de naturalibus facultatibus, videmus eo usque potentiam longæ consuetudinis peruenire, ut venena in optima conuertantur alimenta, sicuti de vetula longo temporis tractu alra cicuta, Galenus refert. Expedit ergo quamplurimis exemplis tantam virtutem consuetudinis præcognoscere; quoniam illa virtute præuicta status aduentitios ingeneratos in corporibus nostris promptius perquiremus, nec aduentitias constitutiones cum primigeniis confundemus.

*Ut perturbetur facultas discretiua à consuetudine.*

Quantum igitur attinet ad reëctricem animalem (qualis est discretiua facultas) si hanc diuinam facultatem expendimus quoties ob longum, & malum usum falsarum opinionum peruertitur, atque decipitur; possem exemplis sexcentis hoc demonstrare, quomodo scilicet



cer falsæ opiniones longa consuetudine ab illis, qui sunt additi sectis iudicentur veræ, & rationi consonæ. Platonici enim ad credendum *Falsa opinio.* soliti rerum species, & ideas non hic, sed in mente sub Deo locari, eo *non Platonico-* veniunt, ut dicant in Mundo hoc sublunari non esse verum hominem, *corum.* & verum equum, vel alias species; sed dumtaxat vestigia & simulacra specierum, vel ( ut aiunt illi ) essentiarum umbras; & ulterius dicant, Deum carere intelligentia, esse tamen intelligentiæ fontem, mundum habere animam, & Demones plures variis modis vagari, & alia innumerabilia sustinent, quæ sunt veræ philosophiæ aduersa; nihilominus fabulosis istis opinionibus ita accommodantur & assuescunt, ut alio modo ob illius doctrinæ consuetudinem Platonici nec velint, nec sciant philosophari.

Peripatetici verò ita ex animo philosophi vestigia sequuntur, ut in ultimo senio credant, & ad mortem usque defendant varia ipsius dogmata, perinde ac essent coacti, & deuincti, quinimo vix illi, qui peripatetico diceret dari vacuum, dari infinitum actu, mundos plures esse posse, mundumque non esse æternum; negaretque nunc esse copulam temporis præteriti cum futuro, vel alias rationes, quæ re vera sunt paullo fortiores, sicuti veluti dum dicunt mundum non esse factum, quia ab agente antiquo non proueniat actio noua, vel quia motus quilibet semper alium motum supponat usque ad infinitum. Similiter vix illi qui negaret dari quintam essentiam, dari elementum ignis supra aërem sub orbe lunæ, vnicum esse intellectum agentem in tota humana specie, & alia plura id genus quibus firmiter credunt, sed non statim, quando addiscunt, sed quando hanc philosophiam temporis cursu defendere assuescunt, tunc enim firmiter & pertinaciter illis opinionibus, siue sint falsæ, siue veræ, æquè adhærēt; tuncque dicimus in animis ipsorum consuetas opiniones tam altas agere posse radices, ut ipsi videntes philosophos aliter sentire, illos urgeant conuiciis & putent re vera esse mentis lumine obæccatos.

Sed Aristotelem dimittamus, quia forsitan quam plurima obscura, & quæ tenebrarum velo prius erant obducta aperuit; addeamusque Aristotelis interpretes, si volumus cognoscere quantum possit opinionum consuetudo, sunt aliqui assueti principiis, & opinionibus Scotistarum, quibus si anni spacio assuescant, inde toto vitæ suæ tempore sectam illam tam constanter sequuntur, ut philosophis aliarum opinionum crimen ignorantiae liberè obiciant, dicuntque præcipuè à veritate desistere Thomistas, tantoque animi impetu pro sua opinione disputant, ut odio prosequantur alios philosophos. Ex altera parte non desunt Thomistæ de illis malè cogitare, Scoti doctrinam explodendo, sectatorisque ipsius increpando, quinimo tanta animi vi sententias aduersariorum arguunt, ut illos detrectent, & crimina seu *eximium* illis inurant: eadem ferè obseruantur contentiones inter expositores Græcos & Arabes, ut nemo sententiam longo usu creditam odio habere possit, quamuis esset falsissima. Tale quippiam in iurif-

prudentię scriptoribus accidit, vt pro consueta opinione quilibet pertinaciter in arenam conscendat.

*De consuetudine diuersarum gentium.*

Denique, si consuetudines diuersarum gentium consideremus statim obseruamus, proprios mores omnibus videri optimos, & rationi consentaneos. Liceatque mihi aliquas diuersarum regionum consuetudines hic asserere, vt videamus quantum consueta placeant. Anne Turcę consuetudinem ducendi plures vxores, vel maximę approbant? quam nos refellimus, diuino tamen afflati spiritu, qui fallere non potest. Anne in Germania vino repleri, & ebrietate lymphare, ob vsum, & consuetudinem vitium minimę considerationis iudicatur? quinimo vino hylari animo obrui apud illos (vt vidimus) erat signum probi & sinceri hominis; in Italia tamen, & variis Europę partibus, vbi non viget hæc bibendi libido, ebrietas iudicatur summum probrum, & extrema turpitudine. Similiter, anne apud Herodorum legimus libro primo, Messagetes dum senes parentes extrema ingræuiscerent ætate interfecisse & comedisse? & illorum tantummodo, qui à filiis propriis occisi atque comesti erant, seruabantur honoris condigna elogia? quos apud nos nullum esset facinus magis dirum, atque scelestum. Insuper, anne apud nos vxores violari est maximę veritum? verum audias quantum possit consuetudo. Ferunt relationes in quodam Indię loco, quando vxores ducuntur, maritos prius ipsas ducere ad sacerdotem illius loci, qui octo dietum spacio illas coëundo exerceat, & colligat primitias, & mox maritos sic stupratos recipere, vt digniores & præstantiores; quia talis est consuetudo, vt illę mulieres, cum quibus sacerdos primo non coiuerit, non sint admittę, vt inter alias versentur, quæ apud nos nulla mulierum infamia, nullaque turpitudinis nota maior esset; videas ergo quam varię sunt assuetudines gentium, quę infinitos mores monstruosos approbant; quinimo tanta obseruatur varietas consuetudinum diuersarum gentium, vt omne quod in nostris regionibus videatur turpissimum, apud aliquas gentes iudicetur pulcherrimum, & quod est apud nos falsum, apud alios ob malas aliquas consuetudines verissimum existimetur. Demum (ne prætermittamus hoc exemplum quod est ad eodẽ commune, vt quilibet ab ipso quantum possit consuetudo colligere valeat) anne qui capiuntur amore, qui est re vera quædam species humanę stultitię orta ob assuetudinem obiecti amari; aliquando tam turpissimo obiecto flagrant, vt omnes mirentur irideantque quo pacto homines alioquin sapientes in hanc insaniam cadant? quæ sanę sit, quia tones approbantur obiecta, vt inde approbandi repetitio fiat consueta, vnde à consuetudine oritur amor: quare rectę inferre possumus, quod nihil magis impediat veritatis cognitionem quam consuetudo.

*Opinio Aristotelis consuetudo quod impediatur veritatem.*

Verum ne scrupulum criminis quispiam mihi inurat, quod tanti faciam consuetudinem; adeamus Aristotelem 2. metaphisices text. 15. qui de consuetudine loquitur hac verborum serie, consuetudo maximę impedit veritatis cognitionem, quod leges declarant, in quibus pueri-



puerilia, & fabulosa magis possunt quam veritas in se; ecce igitur quod consuetudo auctoritate quoque philosophi impedire potest cognitionem, & quod deterius est facit, ut fabulosa magis possunt, quam veritas ipsa. Possem hic proponere quam plurimos auctores, qui de moribus gentium monstruosis agunt, sed ne lectores diutius demorer, dimissis aliis afferamus solum, quæ referuntur à Sexto Empyrico, qui hac verborum serie de variis gentium consuetudinibus scripsit. Indis cum primis placet cum vxoribus in propatulo congregari, quod à nobis ridiculum existimaretur. In Tauris Scythiæ lex erat, & consuetudo, peregrinos Artemidi immolari, quod apud nos adeo est vetitum, ut non solum non interficiantur homines in templis, verum si iussu principis quis debeat interfici, si templum ingreditur, sit tutus: peigrit apud Persas esse consuetudinem uti Venere præposita, apud nos verò nihil est tam vetitum: apud Persas licitum esse matris concubitus, apud Ægyptios posse cum sororibus contrahi nuptias; quare quemadmodum nos illorum consuetudinem increparemus, ita illi nostras accusarent, ut omnes assueti laudent & extollant ad sidera proprios mores, quia omnes gaudent assuetis.

*Varij mores  
gentium ex  
Sexto  
Empyrico.*

Cæterum non solum variæ consuetudines intellectum sæpè perturbant, sed quod miserinum est, decipiunt sensus ipsos, à quibus omnium nostrarum cognitionum exordia desumimus, & bona doctrinæ semina colligimus, quod potest ostendi lucidissimis exemplis; incipiamusque à sensu gustus, qui est manifestissimus omnium, & ne illico lectoribus videatur paradoxum, quod scilicet ob consuetudinem decipiatur gustus; afferamus Aristotelis auctoritatem sect. 21. problemat. 14. ubi hæc verba leguntur, consuetudine fiunt alimenta gustui suauiora, ostendamus ergo exemplis gustum ob consuetudinem, & usus varios sæpissimè alterari & mutari: quinimo aliquando accidere, ut quæ vsui nostro sint accommodata moribus diuersarum gentium sint inuisa, & ferè deleteria, & versa vice. An-ne Tartari assueti à primis aruinis incoctæ carni equinæ, ea oblectantur? quæ nobis insolitis adeo esset inuisa, ut illico gustus prorsus exploderet. Similiter nostranis vescimur, Germani, & Græci respiciunt; quinimo consuetudines variant, & alterant gustum in hominibus vnius ciuitatis, inveniuntur enim aliqui, quibus ita displicet appium, quod seleno vulgariter vocatur, ut priusquam assuefiant, variis refellant iurgiis, quippe qui, si assuescunt, nesciant carentes illo comestiones adire, & quod de appio dictum est, idem de caseo, & de sexcentis aliis potest dici; tale quippiam mihi contigit dum in Hungariam secessi; quia primis mensibus panem illum azimum Hungaricæ assuetum abhorui, at tamen paullo post, dum assuescerem dulcior mihi est visus. Similiter vinum, quod Italico erat aliquantulum dissimile mihi videbatur minus suaue, itidem de omni ferculo, demum tamen acquisita illorum consuetudine, reuersus in Italiam amissa aliquantulum nostrarum ciborum consuetudine, ægrè sanè in primis mensibus paternis cibis potui me accommodare, ut propterea nouæ introducantur con-

*Exemplis  
ostenditur  
sensum gu-  
stus à con-  
suetudine de-  
cipi.*

suetudines, quæ amitti, & iterum acquiri possunt, patet postremo sensum gustus ob usum longum omnibus accommodari exemplo illius vetulae, quæ cicuta alebatur, patet enim experientia cicutam gustui esse ingratiissimam.

*Errat, qui  
à proprio gu-  
stu colligit,  
quod vinum  
sit conuale-  
scen-  
tibus pro-  
futurum.*

Colligimus ergo, quam sæpè errare possint medici, qui degustant, an vinum sit profuturum conualescentibus, & sine alio examine colligunt ex proprio gustu, quod illis sit collaturum, quod non sequitur, quia si conualescens dum optimè sanus erat quoque assuetus illi vino, licet à medici gustu non probetur, esset tamen vinum solitum approbandum; requiritur ergo, ut obseruentur ægrotantium consuetudines, & dispositiones, de quibus dispositionibus hic non est locus, ut agamus, quia in primo libro de iis actum est, & in 6. quoque diligentissimè agemus in capite de signis dispositionum ægrotantium: hic tantum exemplis colligimus sensum gustus omnium manifestissimum à consuetudine decipi posse.

*Exemplis  
ostenditur  
sensum visus  
à consuetu-  
dine decipi.*

Quæ verò pertinent ad sensum visus, ea solum, quæ longa assuetudine oculis plurimorum hominum arrisere vocantur pulchra, quæ verò displacere turpia. Hinc cum solitissimus credere mulieres ornatas margaritis esse pulchriores, tantum potest assuetudo, ut plurimè alioquin deformes illis ornatae oculis tantum arideant, ut pulcherrimæ, & elegantissimæ videantur. Similiter soliti longo usu videre mulieres capillis ad instar cornuorum eleuatis sine hoc fuco hic eas despicimus, quibus ornamentis si ab externis excultæ videntur, putant nil turpius illis videri posse. Si verò nostrates inspiciant Germanas mulieres ornatas orbiculis super clauiculas statim illa, ut insolita spernunt, & irrident ornamenta, ut consuetudo sola videatur esse iudex pulchritudinis. Insuper si de oculorum pulchritudine loquimur, an ne in tota Europa iis temporibus creditur nigros oculos magis exornare, quam albi, & glauci, nihilominus in Africa pulchræ mulieres oculis albis donatæ præferuntur cæteris omnibus. Similiter præcis temporibus Anacreon Poëta Lyricus celebrans excellentes pulchritudines oculorum amicæ suæ, refert glaucis oculis fuisse donatam. Similiter Petronius arbiter ad Sydera extollens pulchritudines elegantissimæ iuuenis, refert habuisse oculos albos, qui stellæ lucentis, specimen æmulerentur. Hæ varæ atque diuersæ opiniones pertinentes ad sensum visus sensim fermè comparantur, quoniam à pueritia, vel longo temporis tractu incipimus ab aliis edocti dicere hoc esse melius, & pulchrius, deinde facile eò labimur, ut ob usum, & consuetudinem firmiter credamus. Præterea, ut plurimis exemplis ostendamus consuetudinem alterare sensum visus, libeat hæc subdere, qui incolunt Mauritaniam putant feminas nigras, ut atramentum, esse pulcherrimas. Qui Europam albas simulque colore roseo præditas; in Mauritania (ut audio) luciferum pingunt album, nos verò melioribus fundamentis edocti, nigrum. Concludimus ergo, dum assuescimus vocare aliquid pulchrum, vel turpe, hanc consuetudinem tantum posse, ut sensus visus facile decipiatur, quinimmo, si soliti esse-

mus



mus videre homines cornua gestare, vt boues, si duos oculos in fronte, quatuor nares, aures asini, dentésque elephantis, vbi sine his monstruosis conditionibus videremus hominem, vt insolitum iudicamus esse turpem, indecorum, & monstruosum, meritóque circulatores possent obolum pro ostensione insoliti hominis efflagitare; patet ergo experientia sensum visus omnium præstantissimum in adulescento quàm sapissimè falli posse.

Sensus odoratus simili modo ob consuetudinem decipi potest; hæcque sunt exempla, plurimi sunt, qui laudant muscum, rustici non assueti illum arguunt, & proiciunt. Viri politici alij odorem expolant, rustici verò allium præferunt musco Orientali. Indi (vt refert Nicolaus Monardes loquens de assa-fetida) ferculis, assa-fetidam, vt suauius oleant, iminiscunt. Nos autem præ fetore illius ferè motimur.

*Exemplis ostenditur sensum odoratus à consuetudine decipi.*

De auditu varia sunt exempla, quæ ostendunt, quo pacto sensus iste à consuetudine decipi possit: adest Turcarum musica auribus nostris insuauis, nostra verò artificiosa Turcis est inuisa, Turcis enim cum primis placent rithmi improporionati, quia illos audire soliti sunt, proportionales verò nostræ ipsorum auribus insolitæ reprobentur. Sed vt familiarissimis exemplis cognoscamus auditum à consuetudine mirum in modum moueri, & alterari, dicas mihi quid auditum nostrum magis lædere potest quam fabrorum limæ sonus ille acutus? nihilo secius fabri soliti, libenter elimare audiunt; quinimo, quo acutior est sonus, illis est eo gratior, quare tantum abest, vt limæ sonum acutum abhorreant, vt potius approbent, laudentque limam, dicentes ex optima materia esse factam, & eis maximè arridère; nemo sanè dicet mihi aliam causam harum variarum opinionum pertinentium ad auditum, quam consuetudinem & vsum. Concludimus ergo quemlibet sonum alicui insuauem posse, alteri assueto longo temporis cursu placere, nisi sit ita vehemens, vt sensum corrumpat, veluti sunt instrumentorum bellicorum bombi, tonitrua & fulmina potentissima, quæ suo imperu aërem ingentem auris eneruant, & expansum illum neruum valdè percutiunt, quod contigit præcipuè in debilibus, quoniam fortiores possunt quoque assuesci bombis illis vehementissimis instrumentorum bellicorum, & inde illis potius oblectari, quam vexari: ratio autem, cur vsus longus vehementissimi strepitus auditum non lædit, eadem est, cur vetula ob longum vsum cicuta non lædatur, quinimo ea oblectetur, de qua ratione, & causa infra diligentius agemus.

*Exemplis ostenditur sensum auditum à consuetudine decipi.*

Postremò tactus longo vsu, & consuetudine potest plurimis rebus contrariis atque aduersis assueticere, quemadmodum illi, qui incolunt regionem frigidissimam, si eunt in Syriam nemini dubium quod primis mensibus insolitum calorem vix possunt sufferre, cui tandem assueti aptentur illi regioni, quæ antea erat contraria, & nullo modo vexentur. Similiter si homines, qui in delitiis viuere consueuerant fiant heremita, nudisque pedibus incedant, primis diebus antequam cutis

*Exemplis ostenditur tactum à consuetudine decipi.*

calo obducta sit valdè torquentur, quippe si assuescunt adeò aptantur frigidis obiectis, vt per niues nudis pedibus incedant.

*Ostenditur  
virtutem mo-  
tiuam à con-  
suetudine ro-  
borari.*

Præterea non modo intellectiua, & sensitiua potentia à longo vsu, & consuetudine decipiuntur, & alterantur, verum etiam virtus motiua, quod experimentis plurimis ostendi potest, sicuti quando videmus homines fieri in illo motu, quem exercent validiores, quamuis debiles extitissent, antequam se illi exercitio tradidissent; imbecilles enim consuetum motum facilius exercent, & ad illum se præstant validiores insolitis, quamuis robore validissimo essent donati, vt ex iis certo colligere possumus à robore differre consuetudinem, esseque aliquid aliud: hæc quoque ab Hippocrate paucis explicata sunt 2. sect. aph. 49. iis verbis: quotidianis laboribus assueti, si inualidi sint, aut senes, in suctis, quamuis robustis, & iuuenibus facilius consueta ferunt exercitia. Potest ergo consuetudo indere robur facultatibus naturalibus, quia assueti sunt promptiores, & validiores ad actionem, quam robustissimi insoliti.

*Ostenditur  
facultatem  
vitalem à con-  
suetudine  
fortiori.*

Simuliter obseruare possumus vitalem facultatem à consuetudine alterari: spiritus enim vitales, qui sunt instrumenta huius facultatis, ob longos vsus & consuetudines diuersas, & aliquando contrarias suscipiunt habitus & dispositiones, sicut timidus diutius in bello derentus adeò assuescit, vt audax euadat, & versa vice fortis cum timidis vitam agens fit timidus, idemque obseruatur in omnibus passionibus pertinentibus ad cor, vt non sit, quod in re manifestissima tempus conteramus.

*Ostenditur  
facultatem  
alteratricem  
à consuetu-  
dine roborari*

Demum in facultatibus naturalibus obseruare possumus, consuetudinem dare robur alteratrici, expultrici, attractrici, & retentrici facultatibus; hinc Galen. 2. de ratione viſt. 33. habet pro hac opinione hanc sententiam; cibos, quibus vti consueuerunt faciliè ferunt, tamen si haudquaquam boni fuerint naturæ, idemque de potu dicit, vt alteratrix facultas ob consuetudinem cibos perniciatissimæ coctionis coquat, sed quid vltius dici potest, quod magis ostendat virtutem consuetudinis in roborandis facultatibus naturalibus, quam historia illa vetulæ Atheniensis, cuius memoria est percelebris, à Galeno quoque citata 3. simp. Med. Fac. capite 18. quod fuit enutrita cicuta, & illa Mitridatis, qui longo vsu veneni reddidit se à venenis immunem. Hinc non est mirum, si Tartari carnem crudam equinam digerant, quia à pueritia assuescere incipiunt, vnde illis redditur caro adeo familiaris, & amica, vt sine controuersia ventriculus amplectatur eam, & in sui substantiam conuertat.

Videns igitur Aristoteles in philosophia, & in Medecina perspicacissimus, naturam ope consuetudinis fieri familiarem venenis, & medicamentis, & pharmaca reddi familiaria, & similia, & per consequens nullius virtutis: quia actio medicandi non versatur inter similia, sed inter contraria, tradidit nobis mirabile præceptum in affigendis localibus, 1. sect. probl. 46. quod est, vt ex certis interuallis debeant mutari cataplasmata, quamuis sint eiusdem naturæ, vbi habet hæc verba: ca-  
rapla-



raplasmata permutari ex certis intervallis quamvis iisdem prorsus vi-  
ribus sint, si debeant sanare, quia natura contemnit consueti pharma-  
ci vires; quod Aristoteles tradit de cataplasmatibus intelligitur de  
omni locali, & de omni medicamento tam alterante, quam cathari-  
co, quoniam hæc omnia propterea agunt, quia sunt contraria, quando  
ergo ob consuetudinem fiunt similia, amplius agere non poterunt,  
quia à similibus, vel ab assuetis non fiunt passionēs. Hinc errant sæ-  
pissimè illi rudiores medici, qui in affigendis ceratis pice confectis di-  
cunt tandiu parti lætæ affixa detinenda, quandiu cerata, vel empla-  
stra sponte cadant, quod spacio aliquando quindecim dierum non  
contingit, ut adeò mollescant, ut spontè cadant, dicant mihi quæso,  
quodnam emolumentum post diem consequi poterunt ex iis empla-  
stris, si erunt reddita familiarissima, assueta, & similia. Si natura diei  
spacio venenum superat, ut de Anu, quæ quotidie veneni modicum  
comedebat, ut assuesceret, quanto magis emplastra, quæ malæ qualita-  
tis sunt expertia, poterunt vinci & superari à natura diei spacio. Præ-  
terea errant quoque, quia aduersantur Galeno, & Auicennæ, quo-  
rum vnica est vox, naturam non esse medicamentis intrinsicis, vel ex-  
trinsicis faciendam consuetudinariam, infra enim diligentius decla-  
rabimus, medicamenta eatenus operari, quatenus inter naturam, &  
medicamenta conseruatur discordia, quando verò assuescimus medi-  
cinis & venenis tunc natura, medicamenta, & venena inuicem talem  
contrahunt pacem & amicitiam, ut nullum amplius sequatur certa-  
men; colligas experimentis propositis omnes facultates viuētis cor-  
poris à consuetudine alterari, & mutari, in varios habitus, & status  
aduentitios.

*Errant, quæ  
volunt affi-  
xa teneri ce-  
rata, donec  
sponte ca-  
dant.*

*Agitur de consuetudine ex Galeni sententia, & agenda in  
hoc libro proponuntur.*

C A P. VI.

**C**UM ope consuetudinis tam varios status aduentitios cognosce-  
re valeamus, & varias morborum ideas, indicationes, prælagia, &  
remedia ex tanto principio colligere possimus, propterea, ut statis  
principiis philosophemur, valde conuenit, ut prius addiscamus ea,  
quæ nos docuit Galenus libello de consuetudine, in toto enim illo  
tractatu docet, quomodo fiat consuetudo in facultatibus naturali-  
bus, in potentiis animalibus, intellectiuis videlicet, sensitiuis, & mori-  
tuis; & demum cur in externis tantum possit consuetudo: primo igitur  
reddit rationem, cur facultates naturales assuescant, redditque ratio-  
nem cur alteratrix, si aliquo longo usu assuescit, non solum cibo ma-  
lo, & ab omnibus expulso, verum etiam veneno non lædatur, ut di-  
ctum est de vetula iam citata, affert Galenus rationem iis verbis ex dif-  
ferentia, quibus velscimur, particule nutriuntur illo sanguine, ut ad ve-

*Argumenta  
Galeni offi-  
caciissima,  
quod consue-  
tudo des ro-  
bur altera-  
trici facult-*

nepa fiat consuetudo, afficitur natura tractu temporis, & aucta differentia notabilis fit, addit, quæ sunt longa consuetudine comparata, vim ferè proprietatis naturalis contrahere; vt ostenderet igitur facultates naturales assuescere, & accommodari posse omnibus cibis, quamuis sint durissimæ coctionis, ostendit prius facultates naturales ob consuetudinem digerere, & concoquere posse venena, quia inde valebit hæc consequentia, assuetus venenis venena digerere potest, ergo eo facilius assuetus ferculis durissimis ea digerere poterit, quoniam si de quo minus videtur inesse, & inest, ergo & de quo magis, quod autem alteratrix facultas venena possit in alimentum, & in sui substantiam conuertere, patet exemplo illius vetulæ Atheniensis, quæ longo vsu cicutæ ea nutriebatur. Quo pacto autem natura id efficere possit, paucis docet Galenus, dicens naturam nutriri illo sanguine, & tractu temporis naturam fieri similem veneno, verbi causa minima cicutæ quantitas non est tantæ virtutis, vt facultatem alteratricem euincat, relinquitur ergo, vt euincatur & superetur à natura, mox superata illa exigua, & pauxilla veneni dosi conuertitur in sanguinem, quo sanguine partes corporis aluntur, altis particulis veneno, si iterum sumitur venenum, concoquendi negotium non est ita difficile, quia ob similitudinem partes corporis expeditius illud euincunt, vt longo tempore assuetus perexiguæ portioni veneni possit indeliberius illo nutriri, quod quoque à Galeno non solum in hoc libello de assuetud. declaratur, verum etiam in 3. de temperamentis cap. 4. vbi altioribus fundamentis ostendit, cur inter facultatem alteratricem, & ea quæ ingeruntur in ventrem contrahi possit familiaritas, & amicitia, sumit primò hoc principium, quod omne agens corporeum quacunque virtute præditum agendo repatiatur, & omne patiens patiendi reagat, quod principium desumit ab Aristotele tum in 3. libr. physico- rum text. 8. & text. 16. dum dicit omne mouens physice in mouendo moueri, tum in primo de generatione & corrupt. text. 53. vbi dicit, omnia, quæ conueniunt in materia, agere, & pati inuicem: deinde Galenus dicit, quemadmodum facultas alteratrix agit in obiectum, vt in sui similitudinem illud conuertat, similiter obiectum reagendo conari reddere facultatem sibi similem, vnde colligimus, agentia, & patientia concorditer in hunc finem conspirare, vt inuicem contrahant similitudinem, eaque contracta inde necessariò sequi, vt sibi inuicem non reluctentur: vbi enim est similitudo, ibi est amor & pax, vbi verò est dissimilitudo, ibi est lis & discordia, quibus positis principiis. Sequitur non esse impossibile, vt natura tunc assuescere possit veneno, cum prima vice pauxillum veneni superauerit, & in nutrimentum conuerterit, quoniam secunda vice cum minori difficultate idem superauerit, & in nutrimentum conuerterit, quoniam secunda vice cum minori difficultate idem superabit, sibi que assimilabit: huius enim rei duæ afferri possunt rationes potissimæ, altera est, quia si prima vice assimilatur, quando adhuc non est contracta similitudo, quanto magis secunda vice, quando iam incipit contrahi amicitia & familiaritas, natura

*Vt sit amicitia inter naturam, & venena.*

*Ob duas rationes homines posse assuescere veneno.*



tura illud euincere poterit? Secunda ratio est, quia veneni perexigua portio prima vice assimilata imprimit qualitates similes, sed euictus & superatus; in sanguinem quo si nutritur corpus, corpori venenum inde reluctari minus poterit. Quare non est mirum, si vetula Atheniensis, superatis primis difficultatibus libere, & copiose cicutam comederet, cicuta enim sua natura frigida non est tantæ virtutis, quantæ sunt venena corrodentia, & calida, ut est arsenicum, sublimatum, & napellus: numquam sanè vetula potuisset assuescere sublimato, vel napello: non sublimato, quia licet pauxillum quid sublimati prima vice sumplisset, attamen ob corrosiuam eius virtutem à natura non poruisset assimilari: quare illud, quod esset sumptum secunda vice, vnitum cum primo loco sumpto non assimilato maiorem dissimilitudinem fecisset, & inde maius damnum secutum esset: non napello, tum quia erosione. & putredine enecasset vetulam, tum quia est calidissimus, & per consequens insuperabilis: docet enim Galenus 3. de simp. Med. F. capite 18. calida venena non posse vinci & superari.

Quare in hoc loco non possum committere, quin valde mirer Vale-  
sij ositantiam, quia à Galeno desumens historiam vetulæ Atheniensis  
in locum cicutæ substituerit napellum, audias igitur Valesium libr. 8.  
controuersia cap. 5. his verbis loquentem, non solum alimentis, & me-  
dicamentis assuescit natura vsque adeo, ut ab illis minus alteretur, sed  
etiam venenis, quod apertè ostendit vetula Atheniensis, quæ frequen-  
ter vescebat napello; Gal. 3. de simp. med. fac. c. 11. Nescio sanè vn-  
de Valesius in Galeno hoc acceperit, cum de vetula non loquatur ca-  
pite 11. sed 18. vbi hæc verba leguntur: si verò exiguum cicutæ sumatur,  
mortem homini nequaquam inferret. Id, quod Anus Atheniensis  
experimento docuit, cuius apud omnes percelebris memoria est, ete-  
nim ea ab exigua cicutæ portione auspicata nullo detrimento ad per-  
magnam progressa est copiam; quod caput, si vidisset Valesius vti que  
non incidisset in tor errores; in primis enim errare videtur, quia Gale-  
nus non refert vetulam fuisse nutritam napello, sed cicuta. Secundo  
quia napellus, nec tempore Atheniensium, nec tempore Galeni erat  
cognitus: tertio, quia natura non potest superare calida venena, ut ipse  
Galenus capite iam citato fortissimis probat rationibus.

Cæterum dimissis altereationibus concludimus ex superius dictis,  
consuetudinem & vsum reddere omnia magis familiaria, & amica, ut  
merito Galenus lib. de assuetudine dicat, longa consuetudine compa-  
rata vim ferè proprietatis naturalis contrahere; colligimusque non es-  
se mirum, si assueti bouinæ carni eam citius digerant, quam pisces sa-  
xatiles, si insoliti sint; ratioque ex enarratis colligitur, qui assueti sunt  
similia & illico ea amplectimur, & sine lite in nutrimentum transeunt,  
quoniam inter symbola facilius est transitus: quare quanto passum est  
agenti similis, eo citius assimilabitur, quo discrepanti, eo tardius  
ad finem optatum perducetur opus: hinc omnia illa, quæ propius ac-  
cedunt ad naturam sanguinis, velocius in sanguinem conuertuntur;  
hinc caro, panis, oua, quæ sanguini similia sunt, citius quoque in san-

*Cur calidis,  
& corroden-  
tibus vene-  
nis assuescere  
non possimus.*

*Observantur  
tria errata  
Valesij loquen-  
tis de vetula  
veneno alia.*

*Cur aliquan-  
do caro boui-  
na citius di-  
geritur pifci-  
bus sanabili-  
bus.*

guinem transeunt, quam brassica, & cæpæ, nisi consueta facta sint, & per consequens similia, quoniam hæc promptè admodum à facultatibus superantur, & assimilantur.

Postquam Galenus declarauit, quomodo fiat consuetudo in facultate alteratrice, deinde ostendit, quomodo introducatur in externas corporis partes, dicitque hoc nobis innotescere, dum videmus rusticos gelida hyeme sub dio minus frigore premi, atque vexari, quam insoliti ciues vtentes hypocautis, dùmque videmus (quod melius vim consuetudinis declarat) Monachos, & heremitas nudis pedibus per niues incedentes ob assuetudinem nullas pati læsiones, licet aliqui ex iis inueniantur, qui primò luxui dediti vix hyberno tempore pellibus induti potuissent hypocautis egredi: re addit igitur rationem Galenus, cur minus externo lædantur frigore, dicendo, in iis fieri cutim densam, & callosam à frigore astringente, & exsiccante, & propterea frigus non sentiri; quo pacto vero frigus habeat vim exsiccandi, & per consequens callum inducendi, docet Galenus, id contingere posse per se, & per accidens; per se, quoniam frigus astringit, & astringendo exprimit, & absument pabulum partium proximarum, quo absumpto partes corporis statim durefcunt: per accidens quia cute frigore condensata, calor, qui perpetuò è corporibus nostris exhalare solet, illico detinetur, detentusque adeo crescit, vt inde maximè exsiccat corpus, & callum inducat, vt hinc Galenus colligat durefcere quoque externas corporis partes sole æstiuo, quoniam degentibus aliquantulum sub radiis solaribus cutis non exsiccat, quinimo humores funduntur, cutisque lenitur & mollis redditur, si verò diutius in sole quis moratur, adeò exsiccat eius cutis nimio calore radiorum, vt epidermis corij specimen æmulari videatur.

*Cur rustici  
minus lædun-  
tur frigore  
externo.*

*Cur vis in-  
telligendi, &  
memorandi,  
exercitio au-  
geantur, &  
otio conta-  
bescant.*

Postremò Galenus de consuetudinis vi in animi, & corporis exercitiis agens, dicit vim memorandi, & intelligendi exercitio augeri, otio vero contabescere; quod auctoritate Platonis, & Erasistrati confirmat, qui dicebant vsum robur addere, otium verò dissoluere, & enervare. Credimus autem nos, facultates animales vñ, & exercitio augeri, quia assiduo exercitio spiritus animales excrementis purgantur, vnde puriores redditi reddunt quoque mentem & memoriam vegetiorem, & puriorem. Etenim sicuti exercitium, vel motus corporis expurgat musculos excrementis; musculisque dat robur. Similiter si spiritus animales, qui sunt instrumenta propria intellectus, & memoriæ expurgantur per assiduam contemplationem, quæ est horum facultatum proprium exercitium, vsque adeò puri redduntur, vt acutissima, & maxima virtute pollens fiat intelligentia, & memoria: quod quoque videtur experientia constare, quoniam videmus, quando quis se tradit exercitio intelligendi, & memorandi, facultates has fieri potentiores: idem obseruatur in sensibus ipsis, qui nisi exercerentur contabescerent: quinimo exercitium functionum pertinentium ad quinque sensus vsque adeò est necessarium pro confirmandis sensuum facultatibus, vt nisi in videndo nos ipsi exerceamus, amittere quoque possemus

*Exemplis  
ostenditur  
facultates  
sensuum ob  
inassuetudi-  
nem amitti.*



possemus visionem sicuti contigit cuidam misero in obseurissimo carcere multo tempore detento, qui statim egressus cognouit se in vinculis functionem videndi propter dissuetudinem amisisse. Hinc quoque fit, ut si quis incipiat conspici illis vi, intra breue deinde spaciū sine illis minus videat, quam prius videret. Similiter, quod ob ocium facultates quoque motrices diminuantur, exempla plura sunt: in primis illi se offerunt homines, qui cum vel multos dies iacuerint, vel plures sederint horas, cum postea resurgant, vix incedere valent: se offerunt quoque auiculæ in caueis diu reterentæ, quæ si exiliunt volare nequeunt. Patet igitur vsum consuetudinem, vel exercitium dare robur facultatibus animalibus, vitalibus, & naturalibus: patet quoque id contingere, quia ob exercitium instrumenta omnium facultatum excrementis liberantur: ob ocium verò maiori copia excrementorum premuntur, & inde contabescunt, & diminuantur.

Cæterum præter hæc, quæ à Galeno tractantur de consuetudine, variæ se offerunt excutiendæ difficultates, ideo antequam huic contemplationi finem imponamus in hæc capita diuidemus tractatum.

Primò agitur, an vera sit communis illa sententia, quod consuetudo in naturam conuertatur.

Secundò quid sit consuetudo declarabitur.

Tertiò ostendemus errare, qui volunt inueteratas consuetudines, quamuis deterrimæ sint, statim amouere.

Quartò ostendemus, illos errare, qui volunt amouere senum, & debiliū deterrimam consuetudinem, cum nec statim, nec sensim sit amouenda.

Quintò ostendetur, errare illos, qui volunt ægrorum, vel robustorum malas, & vetustas consuetudines indicare sui ablationem.

Sextò ostendetur, assuetum plurimis rebus minus lædi à contrariis.

Septimò errare ostendemus, qui non mutant alterantia in ægris curandis, quando ob consuetudinem omnes vires amittantur.

Octauò ostendemus errare, qui introducunt consuetudinem medicamenta solucentia, & alterantia.

---

*Ostenditur consuetudinem non posse conuertere in naturam, deinde argumenta in contrarium adducta solvuntur.*

## CAPVT VII.

**E**S T ferè communis opinio, quod consuetudo sit altera natura; aut verò idem sit cum natura, vel possit in naturam conuertere, excutiendum est. Etenim plerique incidunt in hanc sententiam, ut credant, consuetudinem in naturam transire; idcirco præstat in primis fundamenta istorum proponere, & deinde sententiam, quam arbitramur esse veram, in medium asserere; & demum pro viribus dubia soluere. Qui

*Argumenta  
pro parte co-  
stania.*

igitur dicunt, consuetudinem in naturam posse conuerteri, illud probare videntur auctoritate Aristotelis 7. Ethicorum cap. 10. vbi philotephus non solum dicit, consuetudinē esse similem naturæ, verum etiam in testem vocat Euenum Poëtam, qui his duobus carminibus clarè affirmat consuetudinem esse naturam.

„ *Vsus longus mos est, ac meditatio crebra*

„ *Hunc tandem assero naturam mortalibus esse*

Insuper afferunt historiam illius vetulæ à Galeno citatam 3. de simp. med. fac. cap. 18. ex qua colligunt, longum vsum, & consuetudinem cicutæ versam fuisse in naturam: Demum referunt historiam Regis Mitridatis, qui ob veneni vsum se à venenis immunem reddidit, quod non contigisset nisi veneni vsus versus esset in naturam.

*Vi probatur  
auctoritate,  
conuetudinē  
non posse in  
naturam  
transire.*

Cæterum, antequam horum argumentorum inanitatem ampuremus, præstat probare auctoritate, ratione, & experientia, quod nullo modo consuetudo verri possit in naturam: audias igitur philosophum lib. de memor. & rem. cap. 3. consuetudo est tamquam natura, & naturæ similis, nunquid nō ex hac philosophi sententia statim inferre possumus, consuetudinem non esse naturam: quoniā si esset natura Arist. non dixisset, consuetudinem esse tamquam naturam, vel similem naturæ, sed expresse dixisset, esse naturam. Præterea 2. Ethicorum cap. 7. dicit consuetudo propterea est valida, quia naturæ insidet, quare si naturæ insidet, consuetudo erit accidens, natura verò subiectum; cui dubium, quod est discrimen inter accidens, & subiectum.

Amplius primo Rethoricorum cap. 45. de assuetudine philosophus habet hæc verba, consuetum quasi naturæ insitum est. Simile enim est naturæ, quod enim sæpè fit, propè accedit ad semper; ex quibus verbis colligere valemus, consuetudinem non solum in naturam conuerteri posse; verum prædicari per accidens de natura: ratio est, quia prædicatum, quod est per se, & naturale supponit inhærentiam perpetuā, si igitur consuetudo accedit ad semper, & non sit semper naturæ insita, non erit de omni, erit ergo naturæ accidens separabile. Insuper Aristoteles 7. Ethicorum capite 10. iis verbis clarissimè ostendit consuetudinem differre à natura, facilius curari possunt, qui per assuetudinem, quam qui per naturam incontinentes sunt, quare colligimus, naturam differre à consuetudine, quia nisi differret, æquè difficilis esset cura incontinentis per assuetudinem, ac per naturam; colligas ergo non solum consuetudinem esse diuersam à natura, verum etiam morbos introductos à consuetudine esse diuerso modo curandos. Postremò dicit philosophus 2. Ethicorum in exordio libri, & alibi, affectus duum generum inueniri, aliquos scilicet naturales, qui eduntur *αὐτὰ φύσιν*, sicuti dicimus naturaliter, & secundum necessitatem lapidem tendere deorsum, quem si millies (ait philosophus) sursum prouiceres nunquam lapis huic motioni assuesceret: aliquos deinde dicit esse affectus qui per consuetudinem acquiruntur, qui non sunt naturales, & & necessarii. Patet ergo plumbus philosophi auctoritatibus naturam adeo differre à consuetudine, vt nulla assuetudo, quamuis sit vetustis-  
sima,



simam, possit conuerti in naturam; quoniam sicuti lapis æterno tempore sursum proiectus, æterno tempore tendit ad centrum, & nunquam affuescit aliis motionibus, similiter affectus per consuetudinem introductus, quia nō est naturalis, & necessarius aliter se habet, quia assuetudines variæ, & aliquando contrariæ suscipi possunt, ut nullo modo consuetudo dici possit natura.

Verum, ut exactius probetur, consuetudinem non esse naturam, præstat quoque, ut secundum stylum medicum ostendamus consuetudinem differre à natura, indicationesque vario modo delumi; remediaque amouentia affectus naturales esse omnino diuersa ab iis, quæ conueniunt affectibus introductis à mala consuetudine. Exequamur ergo: sit aliquis tali modo assuetus, ut ei viginti annorum cursu annuatim secta fuerit vena, singas causam tam longæ consuetudinis fuisse, quia annuatim colligebatur bilis, quæ nisi ope phlebotomiæ fuisset repressa, & retusa, in morbos semper ille incidisset: an ne, si contingeret, ut post 20. annorum spatium bilis amplius non colligeretur, & per consequens ab illa non vexaretur, esset irritum, & vanum, sanguinem euacuare? absente scilicet bile, quæ est causa, & quæ est, indicans phlebotomiæ? Si quidem ablata causa, aufertur indicans, quo ablato amplius non debent indicata seu remedia administrari; quare si vetusta consuetudo phlebotomiæ necessario non indicabit, consuetudo non erit signum indicantium perpetuum, & verum, & per consequens toto cælo à natura distabit, quæ semper, & in omnibus est inuariabilis.

Præterea alio quoque lucidissimo exemplo ostendamus hoc discrimen inter naturam aduentitiam, & consuetudinem. Sit igitur vir temperamenti calidi in primo gradu, hicque ob consuetudinem, & usum calidorum sit effectus calidus in 2. gradu. Sitque alter temperamenti calidi in 3. qui usu, & consuetudine frigidorum ad secundum similiter peruenierit: cui dubium, quod in utrisque idem erit aduentitium temperamentum ob assuetudines tamen contrarias acquisitum; singas ambos in frigidum morbum corruere, calidiſque auxiliis ambos esse medicandos; quem credis citius curari posse, ocyusque euadere frigidus morbo? qui erat in 3. assuetus frigidis? vel alter assuetus calidis? dicere minime possumus citius curari solitum frigidis, quia hic non potest tam promptè ad calidam, quæ sunt ei insolita transire sequitur ergo quod alter assuetus calidis, qui erat temperamenti calidi in 1. citius curetur, quia derepente, & sine periculo calidis uti potest, ad solita enim facilius est transitus, & ad insolita difficilior; est enim Hippocratis, & Galeni, præceptum ad insolita non esse transeundum, & Aristotelis libris de generatione inter symbola semper faciliorem esse transitum: ecce ergo quod eadem aduentitia natura acquisita per contrarias consuetudines varias, & contrarias indicationes habet, quas non haberet, si consuetudo conuerteretur in naturam.

Insuper si idem esset consuetudo, & aduentitia natura, sequeretur, quod ambo vnum indicaret, est enim Galeni 2. meth. 13. & 9. meth. 12.

*Ut probatur  
experientia  
consuetudinē  
differre à na-  
tura.*

*Secunda ex-  
perientia qua  
probatur con-  
suetudinem  
differre à na-  
tura.*

*Si idem effi-  
natura &  
consuetudo  
vnum indi-  
caret plura.*

*Solutio argu-  
mentorum  
aduersario-  
rum.*

*Paralogis-  
mus proprius  
rudiorum*

*Consuetudo  
est similis na-  
tura; ergo  
est natura;  
est Elen-  
chus compo-  
sitionis.*

*Solutio 2. ar-  
gumenti.*

*Solutio 3.  
argumenti.*

quod vnum, vt vnum indicat solum vnum, quod altioribus prin-  
cipiis in libr. de indicatione à nobis quoque probabitur, quod vero  
consuetudo indicet vnum, & natura, vel temperamentum aduen-  
titium aliud, non solum ex ratione proposita facile est colligere, ve-  
rum ex Aristotelis auctoritatibus allatis, & præcipuè ex illa, quæ  
colligitur 7. Ethicorum cap. 10. vbi dicit, facilius curari posse, qui  
per assuetudinem, quam qui per naturam incontinentes sunt. Quæ  
cum ita sint, sequitur necessariò, quod consuetudo differat à natura  
primigenia, & aduentitia.

Quantum verò spectat ad aporismata, cognita veritate statim, quæ  
in contrarium sunt adducta, ruunt. Erat enim primum argumentum  
aduersariorum, consuetudo est similis naturæ, ergo est natura. Re-  
spondemus consequentiam esse nullam, quoniam similitudo non est  
identitas, quinimo contrarium inferimus, scilicet consuetudo est  
similis naturæ, ergo non est natura: error hic sanè est satis com-  
munis rudiorum, liceatque mihi alium similem paralogismum,  
qui per scholas, vagatur, subdere, vt melius argumenti vanitas inno-  
tescat, èstque dum colligunt calidum innatum esse cœleste, quia  
Aristoteles lib. de gen. animal. dixit proportionem, & similitudinem re-  
spondere elemento stellarum, quod tantum abest, vt sequatur, vt po-  
tius contraria consequentia sit vera, scilicet calidum innatum propor-  
tione respondet cœlesti calori, ergo nullo modo est cœleste, quoniam  
ea quæ proportionem, & similitudinem conueniunt; non sunt vniuoca,  
sed distant genere, & prædicamento, si prædicamenta vniuoca sunt: ad  
eundem profus modum errant, qui dicunt consuetudinem esse na-  
turam, quia est similis naturæ: quia contrarium necessariò colligitur,  
scilicet consuetudo est similis naturæ, ergo non est natura.

Demum, vt altioribus principiis argumenti inanitas innotescat,  
confugas ad Aristotelem, vbi de Elêchis agit, qui te illico docebit ar-  
gumentum propositum esse Elenchum compositionis, ratio est, quia  
colligitur in conclusione, quod non est in præmissis, assimilaturque il-  
li exemplo, quod proponitur pro declaratione argumenti malæ com-  
positionis, quod est tale, qui sedet potest iacere, Socrates sedet, ergo  
iacet, consequentia non valet, quia aliud est posse iacere, & aliud actu  
iacere, similiter aliud est dicere consuetudinem esse similem naturæ, &  
aliud re ipsa esse naturam; sequitur ergo, vt argumentum propositum  
sit paralogismus, qui vocatur Elenchus compositionis.

Quo ad Euenum Poëtam, dicimus in carminibus nomina su-  
mi latiori modo, quam sumantur à philosophis, qui de rerum naturis  
profundè philosophantur, poëtæque multo amplissimas loquendi li-  
centias habere; solent enim Poëtæ mores, vitia, omnesque proprieta-  
tes, & accidentia naturæ vocare naturas, quoniam furore Poëtico  
perciti non debent, antequam canant prius expendere, quid conue-  
niat per se, & quid per accidens rebus omnibus, quare in tradendis de-  
finitionibus longè melius est credere philosophis, quam Poëtis. De  
Vetula Atheniensi, & Mitridate, quod nouam comparauerint natu-  
ram:



ram. Respondemus Galenum non dixisse naturam nouam, sed consuetudinem nouam esse acquisitam. Colligas ergo consuetudinem non esse alteram naturam, neque in naturam villo vnquam tempore transire posse.

*De consuetudinis definitione, eiusque declaratione.*

CAPVT VIII.

**R**ELIQUVM est, vt breuiter, quid sit ipsa consuetudo, explicemus: commodè enim ex dictis colligi potest; quoniam patet in primis ex omnium consensu, consuetudinem esse qualitatem aduentitiam; patet quinetiam, consuetudinem ab assiduo exercitio sensim & sensim introduci, vt ex traditis exemplis colligere possumus: patet similiter, omnia agentia, & patientia ob consuetudinem & vsum sibi inuicem reddi similia. Demum patet ob longum vsum, & exercitium semper diminui patientium resistantiam, indèque agentia in obeundis officiis fieri paratiora. Quibus positis, mihi videtur, quod breuiter colligi possit hæc consuetudinis definitio. Consuetudo est dispositio constitutionis naturalis sensim introducta ab assiduo exercitio agentis, & reagentis, vt agentia, & patientia reddantur inter se similia: in qua definitione omnes quatuor causæ continentur: dispositio enim sensim introducta est causa formalis: cōstitutio verò naturalis est causa materialis & subiectiua: ab assiduo exercitio agentis, & reagentis est efficiens: vt agentia, & patientia reddantur similia, est finis quæ omnes causæ singillatim sunt declarandæ.

*Definitio cōsuetudinis.*

Quantum igitur attinet ad causam formalem dicimus esse dispositionem; per dispositionem verò intelligimus primam speciem qualitatis, quæ prædicatur ( vt optimè dicit Aristoteles ) de habitu & dispositione; habitus enim, & dispositio non sunt duæ species qualitatis diuersæ, quoniam differunt solum secundum magis & minus; quare si consuetudo erit inuerterata, vocabitur habitus, si verò erit noua, & non confirmata, vocabitur dispositio, quæ faciliè mutari, vel aboleri poterit.

*De causa formali consuetudinis.*

Valesius tamen libro 8. controuersiarum medicarum considerans quo pacto consuetudo possit dici dispositio incidit in hanc sententiam, quod consuetudo sit dispositio respectu naturæ, natura verò respectu consuetudinis sit tamquam habitus, dicitque naturam esse tamquam habitum, quia firmioribus & stabilioribus principiis innititur, consuetudinem esse dispositionem, quia est facilioris mutationis. Quæ sententia nullo modo defendi potest, quoniam natura neque propriè loquendo, neque metaphoricè potest esse habitus consuetudinis, non propriè; quia si natura propriè esset habitus, consuetudo verò eius dispositio, sequeretur hoc inconueniens, quod aliquando consuetudo in naturam transire posset; omnis enim dispositio

*vt errat Valesius dum dicit, naturam esse habitum, consuetudinem non dispositionem.*

ob vsum longum transit in habitum, & hic transitus sanè non est impossibilis, quoniam (vt dicit Aristoteles) habitus & dispositio differunt tantum inter se secundum magis, & minus: præterea, an ne natura differt specie à consuetudine? natura enim est subiectum dispositionum, & vt subiectum ingredi non potest primam speciem qualitatis; quoniam subiectum à prædicato accidentali differt genere, & genera sunt impermiscibilia, vt nullo modo detur transitus de genere in genus, nec de specie in speciem. Sequitur ergo naturam non posse esse habitum respectu consuetudinis ob hanc singularem rationem, quia nulla consuetudo conuerti potest in naturam. Demum si natura esset habitus, consuetudoque dispositio, daretur transitus de accidente in subiectum, quod reluctatur veris philosophiæ principiis; consuetudo sanè est accidens naturæ separabile; quare si propriè loqui volumus, dicere non possumus, naturam respectu consuetudinis esse habitum. Si vero Valesius non propriè; sed per quamdam similitudinem intelligeret, naturam esse tamquam habitum consuetudinis, apertè quoque erraret, quoniam dantur aliquæ consuetudines, quæ respectu naturæ videntur esse habitus, quæque tam firmis plantantur radicibus, vt potius mutantur & perpasse innoventur naturæ, quam illæ consuetudines. Quocirca sæpe videmus in senè septuagenario conseruari puerilem aliquam consuetudinem; quare natura non erit habitus respectu consuetudinis propriè, nec metaphoricè; quia experientia docet, nonnullas consuetudines inueniri, quæ sint difficilioris mutationis, quam ipsa natura; quare potius est dicendum, consuetudinem esse habitum, & dispositionem: habitum, quando est difficilis mutationis dispositionem vero, quando facilis: eam tamen in definitione vocauimus dispositionem, quia dispositio (vt diximus) prædicatur de habitu & dispositione, & sub dispositionis nomine habitus, & dispositio continentur.

*Sapè consuetudines inueniuntur difficilioris mutationis quam natura.*

*De causa materiali consuetudinis.*

Quo ad causam materiale diximus esse naturalem constitutionem, quare vera est subiectum omnium consuetudinum; naturalis constitutio prædicatur de partibus similaribus, & dissimilaribus, in similaribus tamen continentur consuetudines pertinentes ad facultatem naturalem; in dissimilaribus verò pertinentes ad animales, & vitales, vt superius docuimus.

*De causa efficiente consuetudinis.*

Quo ad causam efficientem; est virtus agentis, & reagentis assidua, non solum enim assiduum exercitium agentis parit consuetudines, sed reagentis, quia nisi patiens patiendo reageret, nulla posset patientium similitudo conseruari: confirmatur experientia, & ratione; experientia, quoniam videmus patientium similitudines in prolem, subolèmq; transire: ratione, quia omne patiens patiendo agit, & quatenus agit conatur pro viribus suam ideam multiplicare: postremo est Galeni auctoritas, qui 3. de temperamentis circa finem de cibo loquens, quatenus patitur, & in nutrimentum conuertitur, dicit cibum non solum affici & assimilari, verum etiam afficere & assimilare, & merito, quoniam nisi patiens quoque reagendo afficeret, & assimila-

ret



ret nunquam sequeretur ille amplexus, illâque indolentia, quæ temporis cursu obseruatur in agentibus, & patientibus; quinimo hæc est ratio, cur ab assuetis non fiat passio, vel cur post longam, & diuturnam litem agentium cum patientibus oriantur amicitia, & pax. Diximus *Cur consuetudines fiant ab assiduo exercitio.* itaque ab assiduo exercitio; quoniam nisi assiduè, & quotidie agentia, & reagentia sibi inuicem vestigia suarum similitudinum imprimerent, primo impressa certò euanescerent, vnde nunquam fieret consuetudo, & amicitia. Diximus tandem sensim consuetudines introduci, quia naturæ proprium est sensim & *ἡμικρὸν* omnia facere, ne agentia destruantur; etenim si anus prima vice cicutæ copiam comedisset, interisisset; si timidus illico in acerbum & exitiosum bellum se cōferret, adeo perhorresceret, vt pro ineptissimo exploderetur, idemque de aliis dici posset. Quare meritò inferre possumus, ea esse amica, cæque nos citius amplecti, & minus lædere, quæ ab assiduo, & diuturno exercitio sensim comparantur.

Hic oritur dubitatio, quod alimenta magis consueta non videntur semper minus lædere; extat enim illa satis vetusta & peruulgata sententia, videlicet omnis repletio mala, panis autem pessima, quæ videtur id comprobare, panis enim ex omnibus cibis, quibus homines *Omnis repletio mala, carnis autem pessima, non panis.* pascuntur, est maxime consuetus. Respondemus illam sententiam esse legendam, sicuti à Græcis citatur, quod scilicet omnis repletio sit mala, sed *ἡς σαρκος*, id est, carnis sit pessima, & non panis, & meritò, quia minus afflucti sumus carni, quam pani, caròque in minori quantitate comeditur, & demum caro putredini est magis obnoxia, quam panis. Nec obiciant plures homines inueniri pane parcos, qui carnis multum comedunt, & homines in Scythia, qui melle, & lacte, & nunquam pane vescuntur: quoniam concedimus, illis, qui non consueuerunt pane vesci, panis repletionem esse pessimam; credimus tamen sententiam potius legendam esse quod repletio carnis sit pessima, & non panis, quia vt plurimum homines in Europa pane replentur, in Scythia vero vbi panis non comeditur, vbique disciplinæ non coluntur hanc sententiam non esse prolatam. Demùm diximus *De causa finali consuetudinis.* causam finalem esse, vt agentia, & patientia reddantur inter se similia, & ratio est, quia non solum omnium agentium, verum etiam patientium quatenus reagunt est naturalis conditio, vt conentur introducere pro posse suum simile, ne propria species aliquando desinat, quod ab Aristotele 2. de anima text. 34. diuinitus explicatur iis verbis, cum natura non potuerit conferuare æternitatem indiuiduorum, fuit saltem sollicita speciem ipsam conferuare, quæ alio modo non conferuatur, nisi quatenus agens naturale agendo suum simile generat; & multiplicat. Colligas ergo consuetudinem esse dispositionem sensim introductam ab assiduo exercitio agentis, vel reagentis, vt agentia, & patientia reddantur inter se similia.

*Ut errant, qui volunt malam consuetudinem statim amouere,  
cum sensim sit amouenda.*

## CAPVT IX.

*Probatur  
auctoritate  
Galenī, &  
Auicennae,  
cur sensim  
amouenda sit  
consuetudo.*

**C**V M sit consuetudo dispositio sensim introducta ab exercitio assiduo agentis, vel reagentis; sensim quoque mala aliqua consuetudo erit amouenda: eadem enim est via ( ut Aristotelis exemplo utar, ) à Thebis ad Athenas, quæ est ab Athenis ad Thebas: eandem sententiam habet Galenus 2. de ratione vict. 33. quæ iis verbis explicatur, consuetudinem plurimum posse, & repentinam mutationem corpora non mediocriter offendere, ratio est quia consuetudo, quæ sensim increbuit, & paulatim inoleuit; sensim quoque, & paulatim amouenda, & *ὡς μικρὸν*. Similiter fauet huic sententiæ Auicennas, qui par. 2. cant. capite 2. dicit, quod omnis consuetudo subito, & sine gradatione ablata nocet; & offendit illum, cuius est. Ecce igitur, quod auctoritate Galeni, & Auicennæ patet, sensim consuetudinem esse introducendam, & sensim amouendam. Hinc errant plurimi, qui consuetudinem inueteratam, quæ iam callum obduxit, & quæ altas egit radices, volunt è vestigio depellere.

*Ut errant,  
qui soliti  
meraco con-  
sulunt illico  
tenuissimū  
vinum.*

His positis, an-ne facile est colligere plurima Empyricorum errata: numquid non errant, dum illis qui sunt soliti multorum annorum cursu potationibus meracioris vini dant consilium, ut illico se ad tenuissimum vinum, & *ἐλαφρότερον* transferant, spreta omnino hac consuetudinis lege, quod sensim, & paulatim sint amouenda, quæ sensim increbuerunt, & paulatim inoleuerunt, hoc præceptum sane, & inconsideratum consulendi genus reluctatur naturæ, quæ tali pacto est instituta, ut saltus non patiatur, quæque non transit ab extremo ad extremum sine gradatione; quare si esset demenda consuetudo generosi vini, in primis oporteret ut minus potente, & deinde sensim ad tenuissimum deueniendum, quod non statim, sed mensium, & annorum cursu esset faciendum: audias pro huius rei confirmatione, quid mihi contigit, dum in Hungaria Medicum agerem; erat percelebris quidam comes assuetus toto vitæ suæ cursu vino meracissimo, hic detentus lassitudine, & capitis dolore me accersuit, ut aliquid opis sibi afferrem, ego (spreta aliquantulum consuetudinis lege) dedi id consilij, ut meracissimum deponeret, haurirétque tenuissimum vinum, ille ut primum est executus, in talem lassitudinem incidit, ut anima deficere videretur, vnde consilio mutato ad solitum usum meracissimi me consulente se transtulit: & illico reuocatae sunt vires, quæ antea ferè erant collapsæ; patet ergo ex hac experientia, malam consuetudinem inueteratam in ægrotantibus, & debilibus, ut dicit Galenus libr. de tuend. valetud. indicare.



dicare sui conseruationem , in robustis verò non statim , sed sensim , & per gradus tantum esse amouendam , & ratio est; quia subita mutatio ad opposita sæpè in grauisimorum morborum culpam transire solet.

Præterea errare quoque videntur Empyrici, dum coitus consuetudinem inueteratam prorsus , & illico auferendam proponunt : errant primo , quia illico , & omnino inueteratum vsum demere , est impossibile. Secundò , quia coitus assuetis quoque debilibus non est omnino interdicens , quoniam est sua natura salubris , si tantum interualli in eius vñ adhibeatur , vt resolutio non sentiat; hæc sunt Galeni verba libr. de art. med. cap. 36. venereorum verò iuxta Epicuri sententiam , nullus est vñ salubris : re vera autem confert , si tantum interualli in eorum vñ adhibeatur , vt neque resolutio aliqua sentiat , & ipsa se ipso homo quodammodo leuior factus , ac melius spirare videatur. Tria igitur proponuntur à Galeno signa , quæ nos possunt docere quantum interualli in coitus vñ debeat adhiberi : primum , vt resolutio aliqua post coitum non sentiat. Secundum , vt homo post coitum sentiat se leuiorem : tertium , vt melius , & facilius spiret , quæ signa salubria in omnibus assuetis venereo exercitio post aliquod temporis interuallum possunt obseruari , hac tamen differentia , vt in debilibus post longum , in robustioribus verò post breue interuallum sequantur ; quare si coitus vñ est sua natura salubris , assuetis non debet omnino prohiberi. Verum data , & non concessa Epicuri opinione , quod videlicet venereorum nullus vñ sit salubris , numquid non errant Empyrici nostrates , dum illico , & omnino inueteratum vñ coitus proponunt esse amouendum ? natura sanè non patitur saltus ab extremo ad extremum sine læsione , quare si esset consuetudo coitus auferenda , in primis vñ , qui multorum annorum spacio increbuit , & inoleuit , aliquantulum esset moderandus , deinde post menses , & annos cohibendus , & non subito & immediatè consuetudo , quæ altas habet radices , esset submouenda.

Insuper falluntur , dum consuetudinem illorum , qui durissimis cibus vescuntur , reiciunt , putantque , eam esse confestim amouendam : nec vident præter allatas rationes , experientiam oppositum docere , quod videlicet qui piscibus perpetuò vescuntur , si semel paruis pullis , ouis recentibus , & similibus insolitis vtantur magnos inde languores experiantur : vt hinc quædam optima Religio Monachorum pisces perpetuò comedentium videns Monachos insuetos pullis , ouisquæ recentibus , ab iis maximè lædi , decreuerit , vt in posterum ob nullam ægritudinem Monachi carne , similibusque cibis insolitis vescantur.

Similiter aliquando conualescentes læduntur , dum id consilij recipiunt à rudioribus medicis , vt pro sanitate recuperanda aërem patrium , & consuetum mutant , eligantque siccum & subtilem , quamuis aër , in quo sanitatis suæ tempore conseruabantur , humi-

*Vi errant, qui coitus antiquum vñ subito & omnino debilibus interdicens.*

*Vi errant, qui omittunt cōsumptos cibos coctionis difficiles vt pullos insolitos edant.*

*Vi errant dñ aërem mutant conjugatum.*

duſ, & australis eſſet: falluntur primo, quia tranſitus ad oppoſita ſemper nocet: oporteret ſanè, quando aër ſiccus prodeſſet ab humido ad minus humidum tranſire, & deinceps ad moderatè ſiccum, & demum ad ſubtilem confugere. Secundò errant, quia naturæ & conſuetudini reſiſtantur; tertio quoniam iis qui ſunt aſſueti aëri humido, humidum cælum conſert, & oppoſitum nocet: idèmq; de omnibus regionibus, & aëris conſtitutionibus eſt dicendum. quod ſcilicet ad oppoſitam aëris conſtitutionem non ſit tranſeundum, niſi prius per media fiat tranſitus; meritò enim Hippocrates, & Galenus concludunt mutationes temporum morbos parere, quia alteratur aër, quo alterato, neceſſariò ſpiritus, humores, & ſolida continentia alterantur; vnde omnia morborum genera oriuntur.

*Vi errant  
dum ſom-  
num meri-  
dianum con-  
ſuetum reſi-  
ſtunt.*

Amplius aberrant, dum ſpernunt ſomnum meridianum multorum annorum curſu conſuetum, perinde ac carmina Scholæ Salernitanæ non patiantur caſtigatores, dum dicunt fuge ſomnum meridianum; tot enim ſunt craſes, & tam diverſæ conſtitutiones naturales in humanis corporibus, vt nihil ſit tam noxium, & tam incommodum infinitis hominibus, quod alicui non poſſit eſſe medicina, vel ſuauiſſimus cibus: quare, qui ſomnum meridianum conſuetum omnino reprehendunt, primo reſiſtantur conſuetudini, & deinde experientiæ; videmus enim nos per experientiam ſomnum meridianum adedò aliquos iuuare, vt niſi ſtatim à meridie paululum dormiant ſumma laſſitudine veſperi detineantur; quare vbi eſſet opus ſomnum meridianum aliquibus interdiceret ob aliquas vigentes cauſas, tunc non illico eſſet conſuetudo amouenda, ſed ſenſim, & per gradus faciendum.

*Vi errant,  
qui conſu-  
lunt antiquū  
exercitium  
eſſe omitten-  
dum.*

*Medici &  
Advocates  
nunquam  
debere ſuum  
exercitium  
omittere,*

Poſtremò ſunt, qui errant, dum plurimis perſuadent, vt exercitium toto vitæ ſuæ tempore conſuetum omittant, & ad ſubitam quietem ſe tradant, neglectis antiquiſſimæ conſuetudinis conditionibus, nec vident quanti ſit conſuetudo vetuſta, quæ licet mala ſit in ſenibus & debilibus, attamen non eſt omnino mutanda. Hinc mihi videntur omnes illi errare, qui præcipuè Medicis, vel Advocatis ſenibus id dant conſilij, vt omnino deponant vetuſtiſſimum exercitium, & ſe quieti ocioſæ tradant, quia excrementa, quæ ſolito exercitio abſumebantur, congeruntur, & in ægitudine labuntur, & miſeri ante diem è viuis decedunt his & ſimilibus erroribus illidunt, qui malè obſervant conſuetudinis vetuſtæ potentiam, & virtutem.



*Errant dum inueteratam, & deterrimam consuetudinem senum,  
& debiliū hominū volūnt amouere, cum nec sta-  
tim, nec sensim sit amouenda-*

C A P. X.

CONSTAT ex superius traditis deterrimas, & inueteratas consue-  
tudines non esse statim amouendas, sed sensim, quod temporis  
progressu fieri potest. Nunc ostendimus deterrimas consuetudines  
antiquas senum, vel debiliū, vel ægrotantium nec statim, nec sensim  
esse auferendas: ratio est, quia longè melius est permittere, vt debiles,  
& senes viuant cum malis, & inueteratis consuetudinibus, quam vi-  
tam periclitari ob consuetudines nouas, quæ licet sua natura bonæ  
sint, non possunt tamen introduci in corpora debiliū sine maxima  
virium dissolutione; quare, qui malas consuetudines vetustas debi-  
liū conantur amouere experientiæ, rationique & auctoritatibus Ga-  
leni, & Hippocratis, aduersantur; dicit enim Galenus lib. de tuend. sa-  
nit. in senibus & debilibus nec statim, nec sensim consuetudines esse  
amouendas. Hippocrates verò 2. sect. aph. 50. habet, consueta deterio-  
ra minus molesta esse insuetis melioribus; quare si consueta deterio-  
ra minus molesta insuetis melioribus, sequitur necessariò consue-  
tudines inueteratas, quamuis sint deterrimæ, non esse amouendas,  
quia amouere solita, & insolita introducere in senes & debiles, qui ha-  
bent vires diminutas, est vires ipsorum opprimere, & per consequens  
mortem illis inferre: omnes enim qui ad insolita se transferunt, debent  
magna virtute esse præditi, vt resistant insolitis obiectis, quia ægritudi-  
nes oriuntur, dum obiectis non resistimus, quare cum senes & debiles  
vix solitis resistant, non par est, vt consueta dimittant, & insolita am-  
plexentur. Hinc experientia obseruatur, dum senes, & debiles ad  
insolita se transferunt, illos in maiores ægritudines prolabi, ratio est  
manifestissima, quia ob nouas consuetudines, vt diximus, summum  
laborem patiuntur; & inde debilitantur, vnde excrementa maiora  
colliguntur, & tandem ægritudines sæpè incurabiles fiunt; & ver-  
sa vice obseruantur senes aliquin debiles assueti violenti exerci-  
tio, qui sunt fortiores iuuenibus, sicuti aliquando videmus senes  
& debiles esse saltatores, qui velocius, & excellentius saltant,  
quam insoliti robustissimi. Similiter Nauta optimis confirmatus vi-  
ribus si non est solitus equitare, multa incommoda equitando sen-  
tiet, quæ non patieretur assuetus debilis. Denique si quis robustus,  
sed non assuetus irer in triremes ad remigandum, & triduo ibi se exer-  
ceret; hic sciret vtrique explicare, quam suis viribus resolutus, &  
desertutus esset, mirareturque hominum illorum fortitudinem, qui as-  
sueti triennio, & ultra tot labores paterentur: possem alia plura

*Senes debiles  
assueti faci-  
lius omnia  
tolleant in-  
uicibus so-  
litis insoli-  
tis*

*Cur nauta  
incommoda  
equitando  
sentiat.*

exempla proponere, sed cum in re tam aperta: hæc mihi videantur sufficere, concludamus consuetudines antiquas in debilibus non esse amouendas.

*Vt non vident vitiosas, sed inueteratas consuetudines agrorum, vel robustorum indicare sui conseruationem: in sanitate vero sui ablationem.*

## C A P. XI.

**P**ATET ergo inueteratam, & deterrimam consuetudinem in senibus, & iis quibus vires contractæ sunt sui conseruationem indicare: reliquum est, vt obliteremus illud, in quod incidunt Empyrici, erratum, dum non animaduertunt consuetudinem malam non esse demendam, dum morbis vexamur, sed solummodo, quando sanitate, & optima valetudine fruimur: adsunt enim plures rudiores Medici, qui simul morbum præsentem, & malam consuetudinem euellere volunt, quamuis consuetudo callum obduxerit, & ad summum increbuerit, in quorum opinionem mulieres sæpe incidunt, quæ deinde præcipiti suo consilio in suum sensum ægros faciliè trahunt: age, tanti erroris exempla afferantur: solent aliquando homines destillatione vexari, tussi, vertigine, vel aliis plurimis affectibus à cerebro prodeuntibus, an-ne si ægotanti iuncta est antiqua consuetudo dormiendi à prandio rudiores plerique omnium morborum causam statim referunt in somnum meridianum? dicuntque primum, & principale auxilium esse tunc meridianum somnum fugiendum? vnde miseri morbis percussu incipientes consuetum somnum dimittere in tales languores inde cadunt, vt nisi sint fortes erroris huius causa aliquando ad exitium perueniant; nec vident in debilibus nullo modo esse amouendas consuetudines; nec vident ægotantium statum nullo modo posse tantam alterationem sufferre, vt mutantur inueteratæ consuetudines, quæ solum depulso morbo, essent tollendæ; quare credimus eos dupliciter errare, primò, dum tollunt consuetudines inueteratas ægotantium, quando essent tollendæ, morbo eucto, & restitutis viribus. Secundò, quia tollunt illico, quando nec statim, nec sensim essent auferendæ.

Afferatur aliud exemplum, sit quispiam vrinæ suppressione detentus, cuiusque consuetudo fuerit vti sæpe coitu; an-ne in simili casu vidimus Empyricos inscios virtutis inueteratæ consuetudinis hoc præcipere, vt à coitu prius, & immediatè se absteineat? quod sensim esset faciendum: errant enim tum, quia omnino, & subito inueteratum vsum tollunt, tum, quia coitu omnino dimisso excrementum consuetum non excernitur, sed retinetur, quo retento parastates implentur, quæque impletæ comprimunt meatum vrinarium, vnde vrina sæpe suppressitur: ecce ergo, quam maxima sit iactura, dum vo-

lumus

*Vt errant, qui malas consuetudines demunt, dum ægotant.*

*Vt errant, qui se omnino abstinere à coniugio coitui.*



lumus statim amouere inueteratum vsum ; iactura enim ex duplici *Dum statim tollatur in-*  
 causa potest oriri , vel à symptomatibus ortis à retentis excrementis *notata cō-*  
 ob consuetudinem dimissam , vel à virium dissolutione , quia nun- *suetudo du-*  
 quam potest introduci noua consuetudo , quamuis optima sit sine vi- *plex consur-*  
 rium iactura , etenim omnia insolita sunt nobis contraria , & aduersa : *git iactura.*  
 quinimo , si rectè expendimus , videmus naturam solum pati , & affligi  
 ab insolitis.

Redeuntēs igitur vnde digressi sumus , dicimus si ægrotantes  
 maxima cum difficultate possunt morbi impetum superare , cur vo-  
 lunt in ea naturæ afflictione , in eoque naturæ certamine , amouen-  
 do solita & consueta , naturam vexare ? deberent sanè Medi-  
 ci sua arte auferre contraria , & non similia ; consueta enim omnia  
 sunt similia , quinimo nihil est naturæ similis consuetudine ; qua-  
 re merito dicere possumus , dum consuetudines ægrotum tollunt ,  
 ægrotantes habere duos hostes , scilicet morbos , & Medicos : Con-  
 cludimus ergo nullas malas , & inueteratas consuetudines in ægro-  
 tantibus esse omnino , & subito auferendas ; quinimò si hac æta-  
 te inuenitur illa vetula , quæ olim cicuta nutriebatur , & inci- *Si vetula ci-*  
 deret in febrim , ego pro eius salute ( si vera sunt illa duo pri- *cuta alta hic*  
 ma Medicinæ axiomata , vt sunt verissima ; alterum scilicet quod *esset. & inci-*  
 similia similibus conseruentur , alterum verò , quod contraria *deret in fe-*  
 contrariis curentur ) nescirem imaginari amuletum pro eius virtu- *brim quale*  
 te conseruanda præstantius cicuta , quæ cicuta erat vsque adeò fa- *amuletum ei*  
 cta ob longum vsum similis , vt in nutrimentum abiret ; quare *conueniret.*  
 in ægrotantibus non oportet malas , vetustasque consuetudines  
 euellere , & nouas introducere , quia hoc facientes euellemus si-  
 milia , & introducemus contraria , vel in labores nouos reduce-  
 mus miseros ægrotantes ; quia , sicuti quilibet robustissimus vir ,  
 isque sanus ob nouum , & insolitum exercitium languet , & fa-  
 cta assuetudine nihil patitur ; similiter ægrotus non solum debilis , ve-  
 rum etiam ille , qui firmioribus est viribus in tollenda consuetudine  
 vetusta , nouaque introducenda patietur , & vires amittet , & demum  
 vita ipsius in discrimen adducetur.

*Ostenditur assuetum plurimis rebus minus ledi  
 à contrariis.*

## C A P. XII

**S**i consuetudo est dispositio , qua agentia , & patientia redduntur  
 similia , sequitur necessario , quod consuetudo sit causa , cur agen-  
 tia promptius , & sine indolentia amplectantur consueta obiecta ,  
 quia simile non patitur à simili , sed à suo contrario . Sequitur quo-  
 que , quod quanto copiosiores , & potentiores sunt impressæ in  
 agentibus dispositiones , & consuetudines , tanto minus agentia à

contrariis lædi possint. Quare mihi videtur necessariò sequi, quod plurimis rebus assuetus minus lædatur ab extrinsecis occurrentibus; hincque assuetus plurimis cibis tam facilis, quam difficilis digestioni ob tam multas dispositiones, & usus habeat virtutes naturales digerendi, & concoquendi meliores, & fortiores: ratio verò potissima est, quia usus longus diuersorum esculentorum imprimit illorum omnium similitudines in ventriculum, hepar, & cæteras corporis partes; quibus impressis, ventriculi, vel hepatis facultates non refugiunt diuersos cibos, sed promptius amplectuntur, quod exemplis ostendi potest: an-ne venter senis, & debilis rustici hominis alium melius, ocusque digerit, atterit, & in nutrimentum conuertit, quam viri politici robustissimi, qui illud comedere non sit solitus? an-ne solitus aquæ potioni sine læsione tempore hyberno eam vincit, & superat? quam insolitus summòque robore donatus non audet haurire. Similiter, qui solum pullis, ouisque recentibus vtuntur, & dimittunt cætera firmiora fercula, si aliquando suillam carnem, caules, fabas, & cætera duriora comedunt, non conficiunt, sed summo angore in digerendo afficiuntur, quod assuetis omnibus ferculis non accidit, quamuis debiles sint.

*Prima ratio.*  
cur assueti  
minus lædantur à contrariis.

Causæ verò, cur assueti minus lædantur à contrariis, ex dictis, & ex dicendis quoque colligi possunt: ex dictis enim colligimus, assuetum minus lædi ab obiecto simili, quia agentia non refugiunt obiectorum similium amplexum, quare, cum non refugiant, minor sequitur resistentia, & per consequens actio fit celerior; quod enim impedit, & moratur actionem, est solum passiva resistentia, quæ consistit in dissimili, quia inter symbola semper facilius est transitus. Præterea assuetus minus læditur, quia plurimarum rerum assuetudo reddit fibras fortes, quod probatur rum auctoritate Erasistrati, & Platonis dicentium, usum robur dare, ocio verò omnia contabescere, & enervari: tum ratione superius allata, quæ scilicet est, quia usus absorbet corporis excrementa, quibus absumptis, semper facultatum instrumenta efficiuntur validiora. Insuper assuetus plurimis rebus minus læditur, quia non solum ab iis, quibus est assuetus, verum neque à similibus læditur; habet enim hic omnibus rebus assuetus tot dispositiones, & consuetudines impressas, ut data occasione noui obiecti (vel si de cibis loquimur) noui obsonij, & non amplius visi, quamuis sit senex, & non valde robustus melius conficiet, quam ille, qui paucis est assuetus. verbi causa, si esset aliquis qui nunquam comedisset cepas, haberetque consuetudinem comedendi allium, cui dubium, quod ob similitudinem, quam habet allium cum cepis promptius iste digeret, quam alter assuetus pullis, quamuis fortis sit?

*Secunda ratio.*

*Tertia ratio.*

Demum assuetus paucis cibis adeò eius natura abhorret insolita, ut in ipsa non agat, sed semper refugiat, quare non est mirum, si ab illis patitur, & aliquando vincitur, qui enim vincere vult non debet refugere, quoniam obiecta reagendo possent eum vincere, & superare; quod

*Quarta ratio.*

quod



quod in illo, qui est omnibus assuetus, numquam accideret, quia non fugit certamen, sed agit quantum potest, & agendo, facilius est, ut vincat, & superet.

Postremò an-ne experientia patet plurimis rebus assuetos difficilius in morbum prolabi, quam paucis? ratio sanè est, quia tot habent consuetudines, ut raro accadat, ut ab illis omnibus sint dissimiles, etenim isti non possunt morbis premi, nisi recedant ab omnibus illis consuetudinibus; vetula enim ob cicutæ usum poterat cætera venena similia superare. Vnde colligimus, quod quanto maiores, & copiosiores sint usus, & consuetudines externarum causarum, tanto minus ab illis nos lædi possimus; quod cum ita sit, si solitus paucis, & solitus plurimis exempli causa vnâ proficerentur in Regionem remotam, ubi aër, cibis, potus, & omnia externa essent illis insolita, absque dubio assuetus plurimis minus altero læderetur; ratio est, quia plurimis assuetus, quamuis externis illis non esset assuefactus, faciliè tamen fieri posset, ut haberet aliquas consuetudines similes, quibus faciliè posset amplecti objecta illa noua, & ipsa vincere, & superare, hic enim plurimis rebus assuetus alii posset herbis, quia habebat aliquas impressas herbarum consuetudines ob usum saltem acetiariorum; hic hauriret nutrimentum ex capis, omnium generum, ex carnibus durissimis, & tandem ex glandibus, si pasceretur illis; nec tamen faciliè incideret in morbum: huic non officeret aër nocturnus palustris, & conuallium, quia eius corpus ob plurimas consuetudines externarum rerum tam firmis, & duris filamentis est contextum, ut aliquando paruipendere possit, non dicam aërem nubilosum, verum etiam pestilentem. Qui verò admodum paucas habet consuetudines, ab infinitis lædi poterit, & quotidie vita periclitabitur, & innumerabilibus morbis erit obnoxius.

Audias quam leui morbo potentissimus, & ditissimus vir, quia paucis erat assuetus è viuis decessit. Hic, ut diutissimè huius lucis usura frueretur, deposuit antiquam consuetudinem omnium ferculorum, quibus liberè toto vitæ suæ tempore erat usus, proposuitque sibi in posterum Caponis stillato solum vesci, ratus non solum eo viuendi genere naturam melius, & sine labore foueri, verum etiam ex tam substantifico alimento ea tangeri non posse excrementa, quæ possunt morbo excitare; ista tamen non multo post intervallo, in leuissimam incidit diarrhoeam, quæ incepit ob animi passionem; contingit deinde, ut protracta affectione, non amplius potuerit conficere, & in nutrimentum conuertere illud substantificum edulium, quare conuocauit Medicos, ut innirent consilium de nutrimento, quibus conuocatis, mille fuerunt proposita obsonia, quorum nullum ab illo poterat confici, quia omnia erant difficiliora, & insolita magis; itaque nullo deprehenso obsonio, quo posset refici, adeò confirmata fuit illa ventriculi leuitas, ut immature obierit. Videas ergo quo pacto homines paucis assueti faciliè pereant, ille enim si consueuisset uti carnibus omnium generum, caseo, fabis, &

*Experientia probatur assuetum plurimis rebus minus lædi & contrarijs.*

*Ut potentissimus vir quia erat paucis assuetus immature perit.*

cæteris cibis peruiacacissimæ coctionis sine difficultate in affectu illo nullius considerationis stillatum confecerit, & per consequens euasisset.

*Cur rustici  
sine pharmaci-  
is sauisimis  
morbis libe-  
rantur.  
Obiectio.  
Sol.*

Hinc quoque fit, ut rustici omnibus cibis, & omnibus incommodis in sanitate accommodati, si in morbum sauisimum corruant, ubi quiescunt, & optimo vino vtuntur, ad eò reficiantur, & recreentur, ut sine pharmacis ipsorum spiritus resurgant. Nec obiciant, quod leuia cibaria rusticis sint insolita, & propterea consuetudinem non esse causam facillioris coctionis sed propriam naturam. Quia occurrimus, Rusticos omnibus assuesce i, & aliquando inedia, quæ est omnium (ut ait Hippocrates) tenuissimus victus; quare omnibus ferè accommodantur rustici, quia multos vsus, & multas consuetudines habent impressas, merito quaruin omnibus externis accommodantur. Præterea dicimus ab illo, qui est solitus durissima superare & vincere, leuissima quoque vinci, & superari posse. Neque iterum obiciant ex Galeno passim & in methodo, quod biliosi bouinam carnem melius, & facilius coquant, quam pisces saxatiles. Respondemus hoc ab aliis prodire causis dicit enim Galenus, quod bilis collecta in ventre digerit dura obsonia, sed non conuertit illa in biliosum succum, dicitque, quod eadem bilis non solum digerit saxatiles, verum etiam eos conuertit in bilem, quod non accidit in carne bubula, quare si qui durissima coquit, aliquando non coquit leuissima, accidit ratione bilis collectæ in ventre, & nequaquam ratione virtutis concoquentis.

*Quod dam-  
num sequi-  
tur ex vi-  
ciborum te-  
nuium.*

Ex dictis ergo patet, satius esse indifferenter pasci quolibet obsonio in proportionata tamen quantitate, quam ea ciborum tenuitate nutiri, quæ ægrotantes a'untur; accedit, quod sanguis ex cibis tenuibus confectus reddit homines debiles, & effæminatos, spiritus enim vitales à sanguine tenui prodeuntes fiunt ad eò languidi, & flacidi, ut faciliè resoluantur. Similiter spiritus animales sequuntur mala vestigia vitalium, quoniam sicut sanguis est pabulum spirituum vitalium. Simili modo spiritus vitales sunt pabulum animalium, & quod diximus de cibis, idem de omnibus sex rebus non naturalibus est dicendum, quod videlicet sit melius omnibus assuescere quam paucis.

*Due condi-  
tiones obser-  
uanda, anteq-  
quam omni-  
bus assuesca-  
mus.*

Conditiones verò, quæ sunt obseruandæ, ut aliquis omnibus assuescat, hæ sunt; prima, ut sit sanus, & satis robustus, in senibus enim, & debilibus hæc conditio non habet locum, quia ubi senes, vel debiles se inueteratis moribus spoliarent, & novos induerent. Secunda debet à teneris annis, vel saltem à iuuentute se firm assuescere omnibus externis causis, & cibis videlicet, vigiliis, aëri & exercitiis omnium generum, quibus obseruatis habitus ad eò firmus in membris ingeneratur, ut nili magnum quidpiam accadat, sanus, & incolumis ad extremam senectam commodè transferri possit.



*Errant dum dant agrotantibus alterantia, eaque  
non mutant.*

CAPUT VII.

**O**STENDIMVS, quod omnibus rebus assuetus minus læditur à contrariis, quoniam ea, quæ prius erant contraria, ob longam assuetudinem redduntur similia, & ea quæ sunt similia nullam habent vim alterandi, quod probatur tum auctoritate Aristotelis dicentis, quod alteratio versatur inter contraria, & nequaquam inter similia, tum Galeni 3. de temperamentis loco citato. & sexcentis aliis in locis, ubi dicit lactucam assimillatam non refrigerare; quam philosophiam cum Empyrici non animaduertant, in plurimos errores incidunt dum alterantibus vtuntur. Etenim si de alterantibus extrinsecis, vt vnguentis, empiastis, & reliquis topicis loquamur, in iis administrandis sæpè falluntur, dum ea permittunt debito diutius adhærescere partibus affectis: nec vident consuetudinem reddere topica calori partium similia, reddidæque similia nullas amplius habere alterandi facultates, & ratio est manifestissima, quia alterantia vniuersa tamdiu alterant, quamdiu sunt dissimilia.

Cæterum errata illorum animaduertamus: sunt, qui semel in die oleum rosatum, vel in frigidans Galeni adiungunt renibus gratia ipsos refrigerandi; cui dubium, quod spacio quatuor vel quinque horarum amplius hæc topica non refrigerent: quoniam à calore partis hæc topica illo intervallo à natura adeo superantur, & redduntur similia. & consuecunt, vt ferè amittant totam reagendi virtutem: alterantia enim non agunt, vt alimenta, quæ solum, dum sunt victa, & superata nutriunt, & augent vires, sed priusquam vincantur; verbi causa alterantia frigida dum reagent, refrigerant, quando verò sunt superata, certamen, & alteratio cessat, & inde ab illis nullum est sperandum refrigerium. Hæc sanè ex tam firmis philosophiæ fundamentis pendunt, quod, si cum philosophis agerem, nullum vltius esset mihi verbum proferendum; sed, quia cum iudiciis loquimur, propterea vberius omnia debent explicari, auctoritatæque, & ratione confirmari. Audiamus in primis Aristotelem 1. 1. et 46. probl. 46. ubi ostendit consuetudinem vires alterantium auferre: cur mutari cataplasmata debeant, an vt plenius sentiantur, solita enim, vt ea, quæ ventriculo mandamus, non amplius medicamenta sunt, sed pro alimentis recipiuntur; sic etiam hæc fungi suo munere nequeunt: philosophus in hoc problemate supponit tamquam notissimum, quod debeant sæpè mutari cataplasmata, cur verò sint mutanda, docet, inquit igitur, sicuti ea, quæ ventriculo mandamus, si medicamenta existunt temporis intervallo non amplius medicamenta sunt, sed alimenta; ad eundem modum cataplasmata, consuecunt suo non funguntur.

*Vi errant,  
qui semel  
tantum in  
die oleum  
rosatum &  
alia topica  
renibus ad-  
iungunt.*

munere. Quod verò de cataplasmate dicit philosophus, de omnibus alterantibus extrinsecis, & intrinsecis est intelligendum, quòd ob consuetudinem reddantur similia, & in similibus non oriatur passio, quia omnis actio, & omnis passio versatur inter contraria, & nequaquam inter similia. Eadem ferè explicantur à Galeno 3. de temperamentis capite 4. ubi dicit omnia alterantia afficere, & affici agereque, & pati, dicitque alterantia vires alterandi amittere, quando sunt superata: habetque hæc verba; lactuca, prissana, & quælibet alterantia intrinsecus exhibita afficiunt, antequam sint assimilata, assimilata non afficiunt, sed augent calorem nostrum, & non refrigerant: dicit igitur, quod lactuca refrigerat tantum, antequam sit assimilata, quando verò est assimilata, & conuersa in nutrimentum calfacere, & nequaquam refrigerare; & quod de alterantibus intrinsecis dictum est, de omnibus est intelligendum. Quare his positis principiis, numquid non errare videntur Empyrici (vt de topicis loquamur) dum erisipelati apocrustica, & cætera refrigerantia semel, vel bis in die applicant? deberent sanè, dum pars aliqua ardore deflagrat non bis, sed decies in die superlinire, cum quia topica quanto minus consueta sunt, tanto magis alterant, & per consequens iuuant, tum, quia singulis horis partes affectæ ob perustos humores fluentes recandescunt, nouo indigent refrigerio.

*Errant dupliciter, qui iubent cerata affixa teneri, donec cadant.*

Præterea errare quoque videntur, dum spleni, vel stomacho læso iubent, vt cerata eo vsque teneantur affixa, quousque spontè cadant, quod post quinque & sex dies, & ultra accidere solet; creduntque ceratorum calum esse signum perfectæ sanitatis illius partis. Errant in hac re dupliciter, primo quia diei spacio euanescit omnium localium virtus, calor enim diei cursu assimilatur capas, allium & similia, tanto magis poterit ceratum reddere sibi amicum, & familiare: quare frustra eo intervallo affixa tenentur cerata. Secundò errant, quia cerata affixa non redduntur mollia, quia trahant forinsecus humores causantes morbum, sed quia retinent & colligunt halitus transpirantes, quibus collectis cedunt in excrementosam humiditatem, quæ est illa, quæ adedò mollia reddunt emplastra, vel cerata, vt amplius cum non possint adhærescere necessariò decidunt.

*Aliquando errant, qui dant syrupum de lactuca, vel cichorea.*

Insuper errant dum pro alterantibus refrigerantibus dant ea, quæ sunt valde consueta, vt est cichorea, & lactuca: errant, quia natura cum his talem consuetudinem, amicitiam, & familiaritatem contraxit, vt ab iis nullum certamen, & per consequens nullum beneficium sit expectandum; quoniam iis assueti, dum sani sunt, integram lactucæ, vel cichoræ partinam quotidie comedunt, quare vanissimum est credere, quod homines iam diu nutriti lactuca, & cichorea possint duobus, vel tribus foliis refrigerari; quinimò est valde ridiculum tam sæpè audire medicos pro morbis difficillimæ coctionis præscribentes duo, vel tria folia lactucæ, vel cichoræ pro illorum salute, qui erant soliti in prima mensa maxima lactucæ, vel cichoræ copia se implere.



Idem dicendum de cæteris oleribus consuetis, vt de petroselino, & similibus, quæ ob amicitiam contractam ab illis, qui soliti sunt iis pasci, nullum afferre possunt fructum, quia ab iis natura non patitur: audias cuiusdam medici erratum, quod accidit ob neglectam consuetudinis virtutem. Erat æger quidam pertinaci arthritide carenturus, hicque accersit hunc Medicum, vt sibi aliquo modo præsto esset pro morbo demulcendo, hic multis anodynis prætermisiss, quæ potuissent ægrotanti aliquam pacem afferre, proposuit pro singulari remedio, vt quotidie duas petroselini radículas in iure coctas comederet: primo errauit, quia æger erat consuetus non duas tantum radículas quotidie comedere, sed decem, & ultra: ab assuetis enim certamen non fit. Secundo ex duabus radícibus expectare victoriam conclamari affectus erat ridiculum. Tertio petroselinum non poterat demulcere dolorem, cuius occasione fuit vocatus: hinc podagricus ille cognoscens remedij vanitatem, non potensque se continere in Medicum, me præsentem, his verbis erupit, abi vane, neque dicas amplius radículas duas petroselini tam graui affectu vexati allaturas beneficium, quia si paululum auxiliarentur, ego non duas, sed saccum integrum radicum illarum quotidie comederem: videas ergo quo pacto iudes homines inanitatem remediorum non animaduertunt: videasque quanti facienda sit inquisitio omnium consuetudinum, antequam præscribantur alterantia ægrotantibus, nisi enim recte examinemus, quæ sint consueta ægrotantibus & quæ non, committere non possumus, quin sæpè erremus in præscribendis receptis.

*Vi errauit quidam Medicus negligens consuetudinis vim.*

*Vt errant, qui introducunt consuetudinem sumendi medicamenta soluentia, & alterantia.*

CAPVT XIII.

EX traditis optimè colligere possumus non esse introducendas consuetudines sumendi medicamenta soluentia, vel alterantia. Colligimus enim à definitione consuetudinis, quod patientia ob vsum longum fiant agentibus adeo similia, vt ætissimo amoris vinculo deuinciantur, & facta pace, nulla sequatur discordia, vel alteratio, & merito, quoniam discordia, & alteratio excitatur inter contraria, & nequaquam inter similia. Quod autem ita res se habeat, pater experimentis, sicuti numquid non vt refert Galenus 3. de simp. med. facultatibus 18. vetula assimilauit sibi cicutam? an-ne historia Michridatis est percelebris, quod ob vsum, & consuetudinem non læderetur veneno? an-ne vt refert Auicennas libro de viribus cordis ex sententia Ruffi, fuit puella, quæ veneno alebatur, quæque suo amplexu alicui venenabat: an ne plures inueniuntur infecti gallica peste, qui ob vsum illam non sentiant, alios tamen inficiant? Similiter an-ne pluriimi inficiuntur peste, quippe qui, vbi semel curantur, amplius ab ea non læ-

*Vt probatur experientia consuetudinis medicamentorum esse resellendam.*

dantur, alios tamen inficiant? quare, si consuetudo tantum potest, quæ ratione igitur moti nostratum plures introducunt consuetudinem medicamentorum soluentium, & alterantium? numquid non vident, lues varias, & mortiferas longo post intervallo reddi adeo similes naturæ humanæ, ut nullam alterationem, vel discordiam pariant? quanto igitur magis ob longum usum medicamenta soluentia, & alterantia amittent suas vires purgandi, & alterandi?

*Auctoritate.*

Præterea patet Galeni auctoritate, quod usus & consuetudo medicinarum non sit introducenda; audias igitur Galenum 3. aphorismorum 14. sic loquentem, & si volueris ne aggregentur superfluitates, bis in mense, aut semel uti pharmaco, præter quam nocebit, trahet corpora in malam consuetudinem. Ecce ergo, quod Galenus clarè docet, si semel in mense pharmaco utimur, nos in malam consuetudinem trahere corpora; audias demum Avicennam libro primo fen. 4. ubi habentur hæc verba, naturam non esse faciendam consuetudinariam medicinis; quid clarius apud celeberrimos auctores esse potest, quam hoc, quod non assuecamus medicinis?

*Ratione.*

Rationes demum, quæ nos cogunt medicinarum consuetudinem refellere, plurimæ sunt, omnēsque à definitione consuetudinis colliguntur, prima colligitur, quia ob usum obiecta evadunt similia, inter quæ non est alteratio. Secunda ab assuetis non fit passio. Tertia, quia, si medicamenta ob consuetudinem non euacuant, necessariò assimilantur, si verò non rectè assimilantur, saltem ex Galeni sententia convertuntur in illud humoris genus, quod debebat euacuari. unde medicamenti consuetudine affectus præter naturam non auferetur, sed augebitur. Tertia ob usum medicamentorum necessariò naturales facultates expellendi, & reliquæ, desides, & ociosæ reddentur, item quia tollitur expultrici facultati expellendi occasio, tum, quia medicamenta promptè euacuant materiam biliosam, quæ est naturalis nostra medicina, quæque vellicans partes corporis sentientes est tamquam calcar excitans, & irritans facultatem expultricem ad excrementa expellenda. Quarta ob usum medicinarum alteratrix, cuius robur fouetur solum à calidis, & humidis læditur, quia omnia medicamenta exsiccant, & impediunt coctionem, qua impedita, plura excrementa congeriuntur. Quinta consueta omnia non afficerent, neque agerent; sed solum afficerentur, & paterentur, & per consequens non euacuarent, quia essent facta similia naturæ, ut Galenus docet libro de assuetud. capite secundo his verbis, quæ longa assuetudine comparantur vim ferè proprietatis naturalis contrahere. Quare concludimus coacti experientia, auctoritate, & ratione fugiendam esse consuetudinem medicinarum, quia consueta purgantia tandem eo venient, ut non euacuent; alterantia verò, ut non alterent.

*Epilogus & minor/alis.*

Egimus in his quatuor libris de omnibus methodis quibus possemus non solum affectuum omnium præter naturam ideas cognoscere, verum etiam omnia Empyricorum errata, quæ in perquirendis morborum formis contingunt, corrigero. Etenim in primo libro

egimus



egimus de tribus methodis, quibus genericas morborum ideas cognoscere valemus: sed quoniam affectuum idearum modo per essentiam, & modo per consensum competunt partibus nostri corporis, idcirco in secundo libro illas methodo declarauimus, quæ possent nos docere omnes sympathias, & idiopathias partium humani corporis: cognititis iis genericis morborum formis, in tertio libro egimus de methodis quibus perquirere possumus ultimas, & específicas morborum differentias: quibus cognititis, reliquum erat antequam ad extremam coronidem de ideis perueniremus, vt declararemus modum, quo possemus metiri omnium morborum recessus, ideo in quarto libro in primis ostendimus, omnes affectus nos metiri oportere à statu aduentitio, & non primigenio: deinde diligentissimum examen instituiamus de statu aduentitio, ostendimusque primò omnem statum aduentitium acquiri ob vsum, & consuetudinem sex rerum non naturalium: deinde quantum possit assidua consuetudo in mutandis, & alterandis omnibus corporis potentiis, & facultatibus. Demum ostendimus in plurimos errores rudiores medicos incidere ob naturam consuetudinis ignoratam, sicuti dum falluntur volentes in debilibus, & senibus consuetudines inueteratas mutare cum non liceat deterrimas consuetudines ab iis, qui sunt debiles; amouere similiter, dum falluntur non mutant alterantia extrinseca, & intrinseca; & tandem errare ostendimus dum introducunt consuetudinem medicinarum.

Finis Quarti Libri.

Kk





# SANCTORII SANCTORII

Iustinopolitani

*METHODI VITANDORVM  
errorum in Humoribus peccantibus per  
propria signa perquirendis.*

LIBER QVINTVS.

*Prefatio.*

**H**ACTENVS eò vsque Lectorem transtulimus, & in tali semita ipsum locauimus, vt nullo modo in perquirendis morborũ ideis & formis (nisi me fallit opinio) errare possit. Nunc expedit efficientes morborum causas perquirere. Cæterum, quia causarum omnium, quæ efficiunt morbos, aliquæ sunt internæ, & aliquæ externæ, quæ sunt sex res non naturales, de quibus agemus in sequenti libro, & præcipuè in libris pertinentibus ad fontem dieteticum; internarum verò aliquæ sunt, vt morbi causantes alios morbos, de quorum omnium ideis egimus in quatuor libris superioribus; & aliquæ demum sunt efficientes internæ, quæ in contentis collocantur; reliquum est, vt in sequentibus sex libris agamus de illis causis efficientibus, quæ in contentis, vel in humoribus continentur.

De humoribus ergo adturi, valde conuenit, vt hic acta, & probata à Galeno supponamus, & ex iis ad alia maximè conferentia medicinæ mentis aciem intendamus. Supponamus ergo in primis cum Galeno, quatuor esse suprema humorum genera, pituitam videlicet, bilem, melan-



melancholiam, & sanguinem, & deinde sub his, quindecim esse famo- *Quindecim*  
sas humorū species, in primis enim sunt ( vt dicit Galenus ) 2. de diffe- *species famo-*  
rentiis feb. capite 6. quatuor pituitæ, dulcis videlicet, acida, vitrea, & *la humorum*  
falsa: deinde ( vt refert libro de atra bile capite 2. & alibi ) septem sunt *qua sint.*  
biliosorum humorum species, quarum prima est pallida bilis, quæ est *Septem spe-*  
nitior omnibus. Secunda est flaua: tertia vitellina: quarta porracea: *cies bilis.*  
quinta æruginosa: sexta cerulea, quæ isatidis dicitur: septima est rubra,  
quæ est ille sanguis serosus, qui dicitur bilis, quia ob nimiam tenuita-  
tem ( vt dicit Galenus ) non potest concreescere: & quamuis Galenus  
10. de simp. med. fac. dicat esse duas biles isatides, & primo de natura  
humana text. 4. dicat dari præterea alias species biliosorum humo-  
rum, quæ nomine carent, nihilominus hic solum ea censemus esse  
supponenda, quæ ex omnium consensu approbantur, etenim alibi *Tres species*  
in loco magis opportuno de iis locupletius agemus: præterea tres sunt *melancholia.*  
melancholiæ, vt 3. de loc. aff. & lib. de atra bile, & alibi attestatur Gale-  
nus, melancholia, quæ est fex sanguinis, melancholia, quæ est fex san-  
guinis adusta; & melancholia, quæ est bilis adusta: postremo est san-  
guis, qui copia tantum peccare potest; hæ sunt igitur efficientes causæ  
internæ in humoribus collocatæ, quæ certissimis methodis sunt præ-  
cognoscendæ, vt rectè sciamus quando extra limites naturales ela-  
buntur, & quando vario, & diuerso impetu modo vnam partem, mo-  
do aliam adoriuntur, perturbantque viuientia, ab iis enim innumera-  
bilia morborum germina exundant: cum igitur ego viderim, Tyro-  
nes Medicos de humoribus loquentes vel læpissimè in errores prola-  
bi, optimum factu existimaui, in quolibet libri limine asserre metho-  
dos perquirendi omnes modos, quibus partes humani corporis à pec-  
cantibus humoribus vexantur, & perturbantur; etenim veritate me-  
thodice comparata, quisque melius, & facilius animaduertet an deci-  
piatur nec-ne, & numquid à recto calle abscedat, & demum promptè  
vniuersos errores, qui fieri possunt in peccantibus humoribus per-  
quirendis, cognoscat.

Quinque in sex libris sequentibus proponuntur capita generalissi- *Qua capita*  
ma, quæ methodis declarantur, & ad quæ errores omnes, qui fieri *proponantur*  
possunt in peccantibus humoribus perquirendis reducuntur. Pri- *in sex libris*  
mum, quod proponitur, quodque methodis est declarandum, est co- *sequentibus.*  
gnoscere, an humor peccans sit pituita, vel bilis, vel alter humor;  
quod in hoc libro, & in sequenti perficitur: quia in hoc quinto libro  
agemus de signis propriis, & in sexto de syndrome signorum commu-  
nium ostendentium peccantes humores. Cæterum, quia, vt pluri-  
mum humores peccantes sunt misti; ideo hoc secundum caput se of-  
fert statim examinandum, an scilicet mistura peccantium humorum  
sit facta ab humore intrinsecus ob varias alterationes transmutato,  
vel ab humore extrinsecus adueniente, per hypothësim, an-ne potest  
esse in venis, vel in alia corporis parte bilis, cuius portio tantum, & non  
tota ob nimium calorem aduratur, & conuertitur in atram melan-  
choliæ: hæc igitur portio adusta, si erit commista cum reliqua bile

non adusta, faciet mixturam, quam vocat Auicennas intrinsecus factam. Si vero mistio fiat ab humore non ibi existente, sed aliunde proueniente; mistio erit alterius generis, & vocabitur mistio ab extrinseco humore facta, quarum misturarum varietas non solum cognitionem, verum etiam curationem morborum variat. Cognitis ergo sigillatim omnium humorum misturis: cadit considerandum quo pacto humores tota substantia, & abditis qualitatibus operentur, agereturque de primis reconditarum qualitatibus exordiis, quibus initus perceptis, magna rudiorum medicorum confusio ob perpetam intellectas qualitates occultas animaduerneretur. Exinde, qua quantitate humores perturbant patientes, methodo declarabitur: postremo ageretur de iis, quæ pertinent ad peccantium humorum motum.

*Utilitas sex  
librorum sequentium  
de humoribus.*

Quæ omnia si percipiemus, plurimos quoque Empyricorum errores inde animaduerrere, & reicere poterimus, quorum omnium intelligentiam, si rectè assequemur, quam sit profuturum, cæteri iudicent; quoniam nullus datur effectus, pro cuius recta intelligentia, & medella non conspirent interni humores, quia illos in omni morbo euacuamus, illósque alteramus: quinimmo neque de tabidis tractamus, quine eorum humores aliquando alteremus, & euacuemus: denique adeo hæc humorum peccantium cognitio medicis utilis est, ut quando morbi idea specifica omnino lateret, peccantes tamen, & prædominantes humores internos consequeremur; nostras quoque pacto in re medica adhuc videremur absolueret partes; quoniam ab humoribus præcognitis saltem indicationes alterandi, & euacuandi colligeremus; quibus si satisfaceremus, aliquis opis necessario ægrotantibus asserere possemus.

---

*Quibus methodis sit incedendum in occultis humoribus  
vitiosis perquirendis.*

#### C A P V T I.

**C**V M in hoc, & sequenti libro nostrum sit propositum, vias aliquas tradere, quibus faciliè cognoscere possimus, quidnam sit humor peccans in quolibet malè affecto corpore, an bilis videlicet, vel pituita, an melancholia, vel sanguis peccet; idcirco in tanto negotio si profundè philosophari velimus, non possumus committere, quin ad principia analytica, tamquam ad proprios fontes confugiamus; ab iis enim solum haurire possumus infallibilem sciendi modum, quem dum consequimur, illico animaduerrere quoque possumus quam sæpè rudiores in qualibet facultate, & præcipuè in arte medica curatrice, dum in salubria corpora sibi proponunt considerata, atque curanda, falluntur. Etenim sæpè contingit, ut in corporum latebris causa



causa morborum sit melancholia, attamen non desint Empyrici, qui credant esse bilem; interdum vero corpora ægrotantium sunt biliosis recrementis vexata, atque perculsa; nihilominus hauriunt indicationes à pituita, vel viceversa; itaque sæpissimè nesciunt nostrates alogiatri an sit vnus, vel alter humor, qui peccet. Causa vero, & radix tantorum errorum est, quia sine methodo, & cæcorum more, signisq; communibus inartificiosis examinant peccantes humores, quò sit, vt non sit mirum, si curationes crebro instituunt in magnam ægrotantium pernitiem.

Quatuor per scholas circumferuntur loca, quibus occulti humores peccantes indagantur, quæ tamen, nisi ad bonum vsum reuocentur, potius confusionem, quam rectam intelligentiam nobis afferunt. Loca vero sunt quatuor, scilicet antecedentia, consequentia, iuuantia, & lædentia, quippè quæ, (si philosophicè loqui volumus) ad bimbrem diuisionem bellissime redigi possunt: omnis enim diuisio melius, & commodius docet, si (vt ait Boëtius) ad bimbrem reducat. Dicimus ergo, quod omnia loca, per quæ animaduertimus, & perquirimus humores peccantes in aliqua penitissima corporis parte sunt antecedentia, vel consequentia, quia omnia iuuantia; & lædentia sunt consequentia; afferamus igitur distinctius omnes modos antecedentes, & consequentes, qui possunt nos ad cognitionem peccantium humorum ducere, vt possimus antecedentia, & consequentia vtilia ab inuilibus separare, exordiamurque ab antecedentibus. Antecedentia omnia, quæ in congerendis humoribus præter naturam concurrunt, & quæ possent docere, quisnam sit humor peccans, ad tria genera dumtaxat reducuntur, quoniam aliqua antecedentia sunt sex res non naturales: aliqua sunt causæ remotæ, quæ differunt, vt infra patebit, ab iis sex rebus non naturalibus: & aliqua demum antecedentia sunt causæ proximæ efficientes humorum peccantium; alia non dantur, quæ possint nos docere, an peccet humor, & quando peccet, & an sit bilis, vel pituita, melancholia, vel sanguis.

Cum igitur sex res non naturales primæ sint, quæ collocantur in numero antecedentium, videamus, an ab ipsis colligere possimus aliquam notitiam peccantium humorum: sex sunt genera rerum non naturalium vt dicit Galenus libro de tuend. sanis. scilicet aër, cibus, & potus, somnus, & vigilia, exercitium, animi passiones, inanitio & repletio; subiistamen non omnia externa continentur, quoniam nec medicamenta, vel alterantia extrinseca, vt vnguenta, & alia topica id genus, quæ alterant, & sunt externa, & sunt res non naturales sub aëre, cibo, & potu, & sub aliis enarratis continentur; ideo longe melius Galenus s. de tuenda sanitate capite 10. reduxit omnia externa procatactica, vel omnes res non naturales ad quatuor capita, vt primum contineret ea, quæ assumuntur: secundum ea, quæ fiunt animo, vel corpore: tertium ea, quæ excernuntur, & retinentur: quartum ea, quæ foris adhibentur: ad quæ summa genera omnes res non natura-

*Quatuor loca ostenduntur peccantes humores.*

*Ad tria genera omnia antecedentia reduci.*

*Vt errant, qui credunt sex tantum esse res non naturales.*

*Omnes res non naturales ad quatuor capita reduci.*

les, quas possumus imaginari, reducuntur.

*Exemplis ostenditur humores peccantes non posse colligi ab erroribus externis.*

Hæc igitur antecedentia externa, quæ vocantur res non naturales, quamuis alterent humores, ab erroribus tamen in iis externis causis non possumus cognoscere peccantes humores, quia, ut humor euadat vitiosus, alæ plures causæ internæ cōcurrunt, sicuti est dispositio multorum viscerum, ut ostendimus in primo libro capite 9. & 10. hic tamen exemplis confirmare possumus eandem sententiā, quod scilicet externi errores occultos humores peccantes non manifestent. Sit igitur æger in aëre feruido, isque in malam valetudinem cadat, valebitne dicere, aër feruidus præcessit, & deinde in morbum est lapsus, ergo humor peccans est bilis? nemo sanæ mentis inferre poterit hanc consequentiam minimè necessariā, quoniam potest contingere, ut in calida illa aëris constitutione collegerit magnum pituitæ acerrum, quo in anasarcam potius esset lapsurus, quam in ardentem febrem. Similiter numquid nō videmus in gelido anni tempore multos biliosis humoribus premi, & in solstitius hiemalibus aliquando corpora ignitis conflagrare humoribus? Simili modo, si de cibo loquimur, non semel observauius in cachexiam illos cecidisse, qui continuo aromatis, & calidissimis potationibus se tradidere, quare causæ istæ externæ nos fallere possunt, calidæ enim frigidos, & frigidæ calidos morbos aliquando facere solent. Ad eundem modum de ætate dici potest, quia non valet, est ætas senilis, ergo humor frigidus, & melancholicus necessario peccat, quoniam sæpè vidimus, senes effrenabilem ferreos in ardentissimas febres cecidisse. Postremò, neque longa consuetudo harum omnium rerum non naturalium erit tanti, ut necessario hunc, vel illum humorem prædominari doceat, quoniam sæpè contingit, ut videamus affuetos maluarico vino, veneri, exercitio, & cibis calidis vexari paralyti, & cachexia: qui affectus à frigidis humoribus fiunt, sequitur ergo, quod nullo modo possimus inferre ab externis rebus non naturalibus calidis, calidos humores in corporibus prædominari; neque ab externis frigidis, frigidos. Sequiturque, ut omnino errent illi, qui ex antecedentibus externis (nisi ad meliorem usum antecedentia reuocentur) solent colligere humores peccantes.

*Ostenditur ratione, & auctoritate res non naturales non esse causas remotas morborum.*

Insuper ratione, & auctoritate patet, ab externis rebus non naturalibus non posse colligi peccantes humores, quia res non naturales nec signa, nec causæ peccantium humorum esse possunt; non signa, quia hæc externa sunt antecedentia, & priora morbis, de ratione vero signorum est, ut sint morbis posteriora: nō causæ, quia vel essent proximæ, vel remotæ; non proximæ, quia causa illa, quæ posita non ponit effectum, vel non est causa, vel si est causa, est remota; nemo est, qui dicat, posita ætate statim sequi febrem: neque sunt remotæ, quia effectus fieri non potest sine causa remota, attamen sine procatartecis calidis calidus humor fieri potest, sicuti dum gignitur bilis sine errore in rebus non naturalibus calidis, & pituita sine errore commissio in frigidis, quod non euenit in causis remotis, quoniam remotæ nec statim ad effectus productionem concurrunt. Hinc Auerroës videns effectus



Etus non sequi sine causis remotis in libris post. passim dicit, remotas causas omnes esse virtute in proximis, sicuti virtus solis, quæ est causa remota hominis, est in homine ante generationem filiorum: quinimo, si auferantur causæ remotæ omnia sequentia pereant oportet. Hinc philosophus de remotis causis efficientibus verba faciens 9. metaphysices text. 17. dicit, nisi darentur substantiæ separatæ, quæ sunt motores primi, & remoti, nil ulterius reperiretur; & Auerroës 2. de substantia orbis, si cælum non esset, desinerent inferiora moueri, & mundus rueret, vt remotæ causæ necessario concurrant in effectuum productionem; quod de sex rebus non naturalibus respectu generationis humorum dici non potest; quoniam, quamuis omnia externa frigida auferantur, attamen morbi & humores frigidi gigni possunt; similiter, si omnia calida externa amoueantur, humores tamen calidi fieri possunt, quod non euenit, si amouerentur causæ remotæ humorum quare sicuti valet consequentia fuit homo, ergo fuit Sol; & valet fuit bilis, ergo fuit hepar, fuit homo, fuit animal, & fuit Sol. Similiter hæc non valebunt, fuit bilis, ergo fuit ætas florens, fuit ætatis tempus, & aër calidus. Præterea principiis analyticis ostenditur sex res non naturales non esse causas remotas generationis humorum, quoniam omnes causæ remotæ de effectibus affirmatiuè, & de omni, quod est semper, & in omnibus prædicantur, quæ conditiones non possunt conuenire externis rebus non naturalibus, cum neque semper pituitosis humoribus antecellant procatarctica humida, & frigida, neque in omni pituitæ generatione.

*De potentia  
remotatum  
causarum ex  
Aristotele,  
& Auer.*

*Principijs a-  
nalyticis pro-  
batur sex res  
non natura-  
les non esse  
causas remo-  
tas.*

Postremo non solum hæres non naturales separatim consideratæ possunt dici causæ remotæ, verum neque omnes simul collectæ tantam efficaciam habent, quantam remotæ causæ, quæ ex Aristotele dare possunt quæsitum, quod res sit, ab iis verò procatarcticis nullo modo quæsitum quod colligi poterit, quare ex illis peccantes humores non colligemus: per hypothesim sit aliquis morbo correptus, sitque hydropicus, ponamus præcessisse aërem æstiuum, vsum ciborum calidorum, animi passiones, coitum, exercitium, & adesse ætatem iuuenilem, quæ omnes sunt res non naturales calidæ, ex iis poterimus ne inferre necessariò hanc consequentiam, quod scilicet humor, qui dominatur, sit bilis? posset forsitàn, vt plurimum contingere, sed quod semper accideret, nemo sanè affirmaret; quia hydropici, & paralytici, & cachexia correpti mille inueniuntur, quibus omnes res non naturales calidissimæ præcessere, quare cum non sit de omni, consequentia, nulla erit; videmus enim sæpissimè post vsum calidorum in ætate ægrum pituitosis destillationibus conflictari. Hinc Hippocrates, & Galenus videntes res non naturales nullo modo esse posse causas proximas, vel remotas internorum affectuum, eas noluerunt appellare causas, sed *ætiologas*, id est, occasiones; rationes demum, cur non sint causas, longiori discursu à nobis allata sunt in primo libro capite 21. diximusque causas peccantium humorum esse dispositiones viscerum, & quæ necessariò ad has

*Exemplis o-  
stenditur, res  
non natura-  
les omnes u-  
nitæ non in-  
dicare pos-  
santes hu-  
mores.*

dispositiones concurrunt. Galenus enim libro de causis morb. capite 2. dicit, quod sine subiecti aptitudine neque ignis comburere, nec gladius abscindere valeret; & Aristoteles 2. de anima text. 24. dicit, quod actus actuatorum est solum in patiente disposito; quare hic inferre rectè possumus sex res non naturales omnes vnitas sine viscerum dispositione non posse esse causas generationis peccantium humorum; & per consequens ab illis nec indicationes, nec cognitionem necessariam de statu peccantium humorum, sed solum τὸν συχασμὸν, id est, eundem coniecturam nos colligere posse, vel signa, quæ concurrunt ad faciendam perfectissimam syndromen, de qua in sequenti libro agemus.

*Cur per causas proximas humorum procedentis non possumus cognoscere humores peccantes.*

Singitur externæ illæ sex res non naturales antecedentes certò non poterunt naturam humorum peccantium nobis significare, sequitur, vt diligenter inquiramus, an per alia antecedentia, vel consequentia possimus in morbis cognoscere, quis sit humor peccans. Alia igitur præter sex res non naturales antecedentia non sunt, nisi causæ proximæ humorum, vel remotæ. Si de proximis loquimur, facile patebit causas proximas nobis præstare non posse quæsitum quod, vt scilicet cognoscamus in morbis, an peccet vnus, vel alter humor; & ratio est, quoniam causæ proximæ dant propter quid, nos autem quærentes humores peccantes, quærimus an res sit, quod quæsitum, consentientibus omnibus logicis, non habetur per causas proximas: præterea per causas proximas generationis humorum procedere, est ardua, ac difficilis via, quoniam vt plurimum causæ sunt effectibus magis obstrusæ, & reconditæ, debemus ergo aliquam viam facilem inuenire, quæ nos semper doceat illud, quod quærimus, & per notiora nobis, ne in principij petitionem incidamus.

*Duplicem tantum esse methodum ostendentem aliquid esse in aliquo. Cur per causam remotam an insit bilis vel alter humor, non cognoscimus.*

Quare cum quæsitum, an sit vnus, vel alter humor in corpore ægrotantis, non possit colligi ab erroribus commissis in sex rebus non naturalibus, nec à causis proximis, relinquitur ergo, vt colligatur, vel à causis remotis, vel à signis consequentibus; quia non datur alter modus cognoscendi, an insit aliquid alicui; hinc diuinus philosophus, cui in tradendis methodis summum deferri debet fastigium, primo post. capite 10. clarissime docet, duplicem esse methodum, quæ nos docere potest, an aliquid inexistat, aliam scilicet esse demonstrationem quia, aliam verò demonstrationem à causa remotâ; aliâque nec Aristoteles nec posteriores philosophi vquam inuenire potuerunt. Cæterum, quia demonstratio per causam remotam nihil affirmatiuè concludit, cum nullus detur concludendi modus affirmatiuus per medium remotum, vt probat Aristoteles in prioribus analyticis, idcirco nos, qui volumus affirmatiuè colligere, an peccet bilis, vel alter humor, sequitur, vt demonstratio per causam remotam pro inueniendis humoribus vitiosis, qui sunt causæ efficientes morborum, sit prorsus inutilis.

Sequitur ergo, vt demonstratio quia, quæ procedit per signa consequen-



sequentia, sit illa, quæ nos vnice docere possit, an sit vnus vel alter humor: Sed quoniam signa consequentia, quæ necessariò & non per coniecturam docent, debent esse conuertibilia; de signis conuertibilibus erit agendum: Scias igitur conuertibilia signa esse duplicis generis, alia propria, & alia communia, sed per syndromem collecta, & coarctata determinatio subiecto, vt docet Aristoteles 2. post. dum coarctat animal habens tres ventres per condiciones illas habere cornua, & carere dentibus superioribus, & Galenus in tota arte medicinali procedit declarando viscerum temperaturas per syndromem signorum communium; idcirco nos æmulantes diuinos hos Auctores, non solum per propria signa, verum etiam per syndromem communium signorum procedemus: Agemus enim in hoc quinto libro de signis humorum peccantium propriis, quæ tria solum videntur esse, sapores videlicet, colores, & periodi, vel motus humorum; ostenditurque quod, qui ex propriis credunt procedere in perquirendis humoribus per alia signa, quam per illa tria, necessario incidant vel in signa communia, quæ faciunt paralogsimum secundæ figuræ ex duabus affirmatiuis, vel in signa partialia, quæ faciunt paralogsimum à particulari ad vniuersale, quod est monstruosum, vel in signa extranea, vnde oritur elenchus vocatus non causa pro causa, quia sumitur pro medio signum, quod nullomodo potest esse causa cognitionis, cum sit extraneum & alterius generis. Deinde in 6. libro agemus de signis communibus per syndromem collectis æmulantes Aristotelem, qui solum virtute logica potuit veteres philosophos conuincere, potuitque primo phy. inuenire materiam primam, & veteres philosophos reuocare, eademque via primo post. in principio inuenit dari scire de nouo, & alius in locis quanti sit ostendit; vt nihil videatur esse inuentum ex omnium memoria, quod sit ea facultate diuinius, illa enim expurgat in scientiis contingentiam & probabilitatem, & sine illa difficile admodum est in rebus arduis, & obstrusis consequi veritatem.

*Signa conuertibilia peccantium humorum esse duplicis generis.*

*Qui nō procedit ex propriis in tria genera paralogsimorum incidunt.*

*Ostenditur, quomodo ex saporibus, tanquam ex signis propriis colligere possimus, quinam sint humores prædominantes.*

C A P. II.

**Q**uindecim videntur esse famosæ humorum omnium nostri corporis differentię, in primis enim Galenus 2. de differentiis febr. capite 6. enumerat quattuor species pituitæ, dulcem videlicet, acidam, vitream, & saliam, deinde lib. de attrabile capite 2. & alibi proponit septem differentias humorum biliolorum, scilicet pallidam, flauam, vitellinam, porraceam, æruginosam, ceruleam quam Græci *ioxanthinē* appellant, & rubram, demum eodem loco, & 3. de loc. affectis tres melancholias, faciem sanguinis adustam, & bilem flauam assaram, postremo est sanguis: ad quindecim igitur has differentias à Galeno ob-

*Quindecim humorum differentię ex Galen colliguntur.*

securas referuntur humores omnes, qui copia, vel qualitate humana corpora perturbare possunt: Qui quantitate solum peccant, sunt pituita dulcis, bilis pallida, flava, rubra, sanguis, & sars sanguinis; quoniam in quolibet sano corpore hi humores reperiuntur, quique dum quantitate non excedunt, magnum fructum afferunt humanis corporibus: quinimò, si horum aliquis deficeret, vivens non posset conservari. Humores vero, qui qualitate peccant sunt vitellina bilis, porracea, æruginosa, cerulea, sars sanguinis adusta, & bilis assata, pituita vitrea, salta, acida, ab hisse vera prodeunt innumerabiles affectus præter naturam: quare erit pernecessarium, ut prius per signa propria, antequam ad signorum syndromem accedamus illos omnes peruestigemus.

Cæterum, quia superius dictum est, quod omnia signa propria peccantium humorum reduci videntur ad tria capita, ad sapores, colores, & periodos humorum; de saporibus prius est agendum: Sapores igitur humorum peccantium, quantum mente, animoque colligere potuimus reduci videntur ad ista sex capita, quæ sunt distincte declaranda, si volumus humorum existentias peruestigare: in humoribus

igitur nostri corporis videntur observari posse vel solum hæc sex genera saporum, quæ sunt	{	dulce insipidum —	pituita aquosa similis vel dissimilis
		dulce manifestū —	sanguis
		amarum —	bilis
		falsum —	pituita falsa
		acetosum —	melancholia, & pituita
		ponticum —	melancholia adusta, vitrea & pituita.

Hæ igitur valent consequentiæ, est sapor insipidus, ergo est pituita aquosa similis, vel dissimilis, hinc Galenus 2. de differentiis feb. capite 6. dicit, quod insipidus sapor convenit pituitæ aquosæ: Est sapor dulcis manifestæ dulcedinis, ergo est sanguis per se, ichor verò sanguinis, vel rubra bilis per accidens; quia ex Galeno 9. methodi 12.

*Ad unicum saporis unum tantum humorem per se indicari, & non plures.*

& ex Aristotele 2. post. vnum vel vnum solum vnam indicat naturam, & 2. priorum habetur, ab unica naturam unicam tantum prodite proprietatem, & unicam proprietatem unicum fontem, & unicam solum originem arguere, quare licet dixerimus insipidum significare pituitam aquosam, vel dissimilem, quæ est illa, quæ patrum cruda, partimque est cocta, unicum tamen intelligimus, quod est aquosum, experique aliorum humorum; Ad eundem modum dicimus saporem dulcem manifestæ dulcedinis, sanguinem, vel ichorem indicare; quia sanguis est per se dulcis, ichor verò per participationem, quia dicit Galenus 2. de fac. naturalibus 9. quod dulcedo est proprietas sanguinis, quare ichor est dulcis per accidens: quapropter supponere semper oportet, quando duo humores habent eandem qualitatem, vel non esse diversos, vel alteri eorum per se, alteri vero per participationem, & per



per accidens illam qualitatem conuenire.

Post dulce sequitur amarus sapor, ex quo necessario colligimus biliosorum humorum genus, ut est bilis pallida, flaua, vitellina, porracea, æruginosa, &c. quæ bilis species sunt omnes amarissimæ, & nullus in corpore datur succus amarus, qui non prodeat ab his speciebus, *Quæ nã sine signa propria biliosorum humorum.* vel saltem sit mistus ex illis: Quo pacto autem possimus distinctè cognoscere, quando est bilis flaua, vel porracea, vel æruginosa, vel aliæ species enumeratæ, ex coloribus facile colligemus, quoniam si humor erit amarus & pallidus, arguet bilem pallidam, quæ est mitior omnibus, mista enim est ex flaua & aquosa humiditate, ut dicit Galenus lib. de atra bile capite 2. & alibi; si vero humor erit amarus & citrinus arguet flauam bilem, quæ est paullo calidior, quinimmo hæc flaua bilis si eruperit per aluum, ex solo colore eam cognoscemus; Si verò sapor amarus erit cum colore præ se ferente specimen vitellorum ouorum, vitellinam bilem significabit: Itidem amarities cum porraceo colore prasinam choleram ostendet; demumq; eadem amarities cum ferri æruginis colore æruginosam bilem declarabit: si verò amarities copulabitur cum colore tendente ad ceruleum isatidem colligemus, & demum, si videbitur sanguis, qui non possit congelari, dicemus cum Galeno loco citato esse rubram bilem: & demum si congelabitur, dicemus esse sanguinem.

Si de saporibus pituitosorum humorum loquimur. Salsus sapor *sapores proprii pituitosorum succorum qui sine.* illico pituitam salsam, non bilem, vel melancholiam indicabit; quia bilis, vel melancholia non potest salsedinem acquirere: Quo pacto autem fiat salsedo, & à quibus causis, an à putredine; vel à mora, vel tandem à mistura biliosi succi cum pituitoso, & cui per se, & cui per participationem conueniat in libro de misturis, ut in proprio loco sententiam meam explicabo: Sufficit in præsentia, ut salsus sapor salsam pituitam perpetuò ostendat: Quantum attinet ad acetosum saporem, dicimus significare rem siccam, & frigidam, etenim sapor acetosus ostendit in halitum resolutum fuisse humidum tenue, & calidum proprii temperamenti; audias experimenta, an ne dulcia dum ebulliunt resoluunt tenue; quod sua natura est humidum, & calidum, unde mutata crassi, vel temperamento dulcia euadunt sicciora, frigidiore, & acetosa: hæc enim obseruantur in officinis, quia dum mitta, & cæteri succi dulces sponte ebulliunt acetosi euadunt: tale quippiam in vino contingit, quia si à calido extraneo separatur aqua vitæ, quæ est pars tenuis, & calida vini, illico fit acetum, acetum enim est vinum, sed sine aqua illa ardente; experientia enim docet, à vino in acetum conuerso nullam, vel per exiguam extrahi posse aquam ardentem; hinc melancholia, quæ est læx sanguinis, quia est priuata parte tenui calida, est acida, quoniam acetum fit ob resolutas portiones illas calidiores & humidiores, quæ aquam vitæ constituant, ad differentiam vappæ, quæ fit ob resolutum humidum non tenue, sed oleaginosum, quo mistum est mistum, sed de iis in libro de misturis diffusius agemus, hæc dicta sunt, ut experientia aliqua edocti

*Acetosus sapor unde predeat.*

*Vappa vana fit.*

possimus colligere acetosum significare vnicam naturam, id est sic- cum non ad iustum, sed terreum, frigidum, ob separationem aquæ vi- tæ; quod vero acetum sit frigidum, legi potest caput 19. primi de sim- pl. med. fac. ubi potentissimis rationibus, & experientis ostendit Galenus acetum esse frigidum: An vero acidus sapor indicet pitui- tam acidam, vel melancholicam, quæ est fæx sanguinis, vel aliam na- turam, non hic, seu in libro de misturis sermonem habebimus.

*Ponticus sapor  
à frigido &  
calido effi-  
ciente prodit.*

Postremo ponticus sapor, cum sit in pituita vitrea, vel in fæce me- lancholica illa adusta, & in atra bile, quæ fit ab adustione flauæ, vni- cam tamen naturam solum declarare potest, cum vnum (vi dictum est) vnum indicet: indicat ergo solum siccitatem intensiorem, quam illa, quæ est in salso; ponticitas enim introducit modo à frigido congelante, & resolvente humidum, modo à calido adurente, & re- solvente; quare eò maior erit ponticitas, quo calor, vel frigus vehe- mentius fuerit: cur autem, & quomodo hæc fiant in libro septimo declarabimus.

*Quomodo ex coloribus colligere possimus prædominantes humores.*

### C A P V T III.

**Q**UEMADMODVM humorum sapores vnicè declarare possunt, qui sint illi humores, qui peccant & prædominantur in corpore; similiter varias humorum species prædominari colligi potest ex colo- ribus excrementorum, & humorum sub cute immediatè existentium, dicimus immediatè sub cute existentium, quia faciei, & aliarum par- tium colores non possunt indicare humores alias partes insidentes vt ait Galenus 1. aphorismorum com. 2. dum recitat hanc Hippocratis sententiam, humorem autem superabundantem ex colore debemus coniectari, nisi aliqui fortè in profundum recesserint, color enim si- milis efflorescit humoribus, si non retidè regurgitauerit: Similiter 4. in 6. de morb. vulg. com. 28. docet ex colore oculorum perueniri posse in cognitionem internæ valerudinis, habetque hæc verba, si oculi be- nè colorati sunt etiam, hoc est corpus totum, declarant esse offen- sum, atque in oculis propter eorum mundiciam atque nitorem cele- rius, quam aliis in partibus coloris mutatio perspicitur: subdit, ex si- gnis, quæ in oculis apparent nos peruenire posse ad totius corporis cognitionem: nec obiciant, naturam, & quidditatem non posse co- gnosci ex coloribus, quia occurrimus hic nos proponere, quoniam sit in corpore humor peccans, & nequaquam quid sit.

Dicimus



Dicimus ergo, quod omnes humorum colores, qui possunt observari in humanis corporib. ad hæc colorū genera reducantur.

ad	Album	est pituita
	rubrum	est sanguis & bilis rubra
	pallidum	est pallida bilis
	flauum	est citrina bilis
	vitellinum	est vitellina
	porraceum	est porracea bilis
	æruginosum	est prassina bilis
	cæruleum	est fatidis bilis
	nigrum turbidū	est melancholia, quæ est fæx sanguinis
	nigrū splendidū	est atra bilis

Modo colligimus peccantes humores ex solis coloribus, modo ex coloribus & saporibus simul: Ex solis coloribus, veluti, dum videmus album colorem in humoribus, statim dicimus esse pituitam aquosam similem, vel dissimilem: dissimilis est species pituitæ aquosæ adhuc crudæ, quia caloris actione adhuc non est æquata, minus sanè cruda est, quam similis aquosa, quoniam dissimilis est crassior, dicit enim Aristoteles 4. meteororum capite de coctione, quod coctio fiat incrassando, propterea diximus, quod dissimilis pituita partim est cocta, & partim cruda, quia partim crassa, & partim tenuis existit.

Similiter rubeus color primo, & per se ostendit sanguinem, secundo bilem rubram; pallidus color, pallidam bilem, flauus, flauam, porraceus significat porraceam, quamvis porracea sit mixtura ex æruginea, & pituita, de qua in libro de mixturis agemus; vitellinus color vitellinam bilem significat: fit enim hæc bilis vitellina, ut dicit Galenus 5. in 6. de morb. vulga. tex. 13. ex flaua crassescens, crassescit enim dum à calore aliqua portio aquosa absimitur, sed hæc seruata lege, ut sine adustione humiditas illa serosa resoluarur, quia, quæ adurantur, nigrum vel obscurum colorem necessario acquirunt, quousque enim conseruatur color flauus, & vitellinus, eo usque humores non possunt dici adusti, videmus enim persapè in officinis, dum rectè coquitur mel, vel iulapium, quæ flaua sunt, nisi adurantur, flauities suas conseruare, & nequaquam nigrescere, si verò plus iusto ebulliant, incipiunt nigrescere, & amara fieri, quare donec conseruabitur color flauus, vel vitellinus in humoribus, minime dici poterunt adusti.

*Quæ sint signa propriissima biliosorum suorum.*

*Flauus color, & vitellinus non indicant adustionem.*

Æruginosus color supponit æruginosam bilem, quæ fit à calore magis adurente, humores enim si plus iusto coquantur, eo usque aliquando absumentur ipsorum ichores, ut inde supramodum torrefiant, fiantque æruginosi, & deinde cærulei. Hinc Galenus 2. præfag. capite 47. loquens de gradibus adustionum habet hæc verba, flauus color fit seroso absumpto, pallidus fit immixto ex missione flauæ bilis in serosa humiditate, æruginosus fit seroso valde torrefacto, niger fit seroso supramodum torrefacto, qui nunc atra bilis exedens vocatur.

„ quomodo autem fiat cærulea bilis, & quem gradum teneat adustionis inferius agemus.

*Quid indices  
color niger  
turbidus.*

Niger turbidus ex Galeno 3. de loc. aff. 7. alter est in sēce sanguinis, estque admodum spissus, & est fæcibus vini haud abfimilis, estque melancholia naturalis acida; hic humor subit naturam terre, vt ex colore, & spissitudine cognoscitur, est fæcibus vini haud abfimilis. quia sicuti fæx vini est tartarum, quod est sua natura acidum, similiter hæc melancholia terrestris est acida nigra, spissa, turbida, & nequaquam splendida, tum quia non est à calore ingenti perusta, tum quia est confusa, & non supercocta à calore, neque reddita ad paucas superficies, cum sit opaca.

*Quid indices  
color niger  
splendidus.*

Postremo est color niger splendidus, qui indicat validam adustionem, quæ in fæce sanguinis esse non potest, quia fæx non est capax tanti ignis, valebit ergo consequentia, est color niger & splendidus in humoribus, ergo est atra bilis facta à combustione flauæ, quod Galenus clarissimè 3. de sympr. causis capite 2. docet, quare merito colligere possumus prædominari atram bilem, si color niger, & splendidus apparebit in excretis humoribus per aluum, per vomitum, vel per urinam: Adest vltimo color niger turbidus cum sapore pontico, qui non potest conuenire atræ bili, quia atra sua natura splendet; neque conueniet fæci sanguinis, quia hæc melancholia sua natura est acida; Sequitur ergo, quod conueniat fæci adustæ, quæ est nigra, & turbida ob terrestres portiones inequales, estque pontica, quia est adusta, omne enim quod est sua natura acetosum, si aduritur, amittit acetositatem, & ponticitatem potius acquirit.

*Vt ex colore,  
& sapore col-  
ligimus pec-  
cantes humo-  
res.*

Possumus quoque persapè ex coloribus, & saporibus simul sumptis humores peccantes cognoscere, sicuti colligimus ex amaritie, & flauitie flauam choleram; ex amaritie, & ex colore simili luteis ouorum vitellinam; ex amaritie & viridi, porraceam; ex amaritie, & aruginoso colore prassinam bilem; ex amaritie & cæruleo isatidem prædominari: Similiter ex acido sapore, & albo colore pituitam acidam: ex acido, & nigro melancholiam, quæ est fæx sanguinis colligimus. Ad eundem modum ex sapore pontico, & nigro colore cum splendore, colligimus subesse atram bilem illam exedentem, quia ab intensissimo calore necessario oritur splendor, vt in officinis videre possumus, dum emplastra à vehementissimo igne vsque adeo indurantur, donec splendorem acquirant; ex sapore verò pontico cum nigredine turbida colligimus melancholiam illam, quæ est fæx sanguinis adusta, non melancholiam naturalem, quæ non est pontica, sed acida, & turbida; turbidus color in nigra, & pontica melancholia significat humorem illum esse dumtaxat à calore commotum, & confusum, sed non combustum, quia vbi calor comburit, semper gignit splendorem, vbi commouet tantum, turbidum efficit colorem; quemadmodum videri sæpè potest in vrina subiugali, & in musto, quæ turbida apparent, quia eorum partes similes à calore confunduntur, & nequaquam comburuntur. Hinc optimi medici (& hoc obiter adiiciatur)

*Vnde fit quod  
in malignis  
febr. deter-  
rior sit vrina  
splendida,  
quam subin-  
galis.*

dum



dum vident in febribus malignis vrinam splendidam, magis de patientis vita verentur, quam si turbida, & subiugalis reddatur: Hinc Hippocrates in Sileno cum vidisset quinta die vrinam lucidam apparuisse, mortem futuram die vndecima iudicauit, vt maiorem calorem indicet vrinæ splendor, quàm turbulentia.

Ex iis igitur confici possunt propositiones conuertibiles, sicuti dicendo est albus color in humoribus, ergo est pituita aquosa similis, vel dissimilis; est pituita aquosa, ergo albus color; est flauus color, ergo bilis flaua, & vice versa; est viridis, ergo porracea, est porracea bilis, ergo viridis color, est niger splendidus color, ergo atra illa exedens, & furiosa, & è conuerso; est niger turbidus cum acetositate, ergo est melancholia, quæ est sæx sanguinis non adusta; est niger turbidus color cum ponticitate, ergo est melancholia, quæ est sæx sanguinis adusta, & viceversa, & sic de aliis: ex iis ergo, quæ inuicem conuertuntur solum poterimus infallibiles conclusiones colligere in iis, quæ pertinent ad peccantium humorum cognitionem.

---

*Quod ex periodis, vel ex motu morbi tamquam à signis proprijs colligere possimus peccantes humores.*

C A P. IV.

**I**NTER signa propriissima malorum humorum corporis in parte aliqua penitusissima residentium sunt periodi, & temporum morborum velocitas, & tarditas: quando igitur neque coloribus, neque humorum saporibus ad cognitionem humorum peccantium peruenire poterimus, tunc virtute periodorum, & aliarum motionum morbi certò illos cognoscemus, & ratio est, quoniam si peccant humores, necessario edere debent insultus, & motionem aut tardam, aut velocem, & quæ determinatis, certisque temporibus fiat: humores enim præter naturam quatenus causæ morbi, cum non vincant naturam, vel ab illa vincantur in vnico certamine, necessario nature, & morbi conatus iteratis inuasionibus fieri debent, vt superentur, & quemadmodum omnia, quæ fiunt, & moventur, certas, & infallibiles periodos sortiuntur, similiter humores peccantes, & perturbantes corpora debent certis Typis, & motionibus viuientia corpora adoliri, quarum motionum, seu inuasionum varietas nobis certò indicare potest varietatem peccantium humorum; quod inducendo per omnes morbos, qui fiunt ab humoribus peccantibus ostendi potest; etenim, si obseruatur inuasio, quæ fit alternis diebus, bilem peccare dicimus; si de quarto in quartum, melancholiam, si quotidie, pituitam; & demum, si inuasio est sine periodicatione, sanguinem peccare colligimus, insultus tamen à sanguine facti tres habent differentias, suntque vel homotoni id est vniiformes, vel acmastici id est crescentes, vel paracmastici id est decrecentes.

*Ostenditur  
periodicatio-  
nem nō con-  
uenire solum  
febris pu-  
tridis.*

*Qui sine mor-  
bi, qui sine  
febre habent  
circuitus.*

*Periodus cer-  
ta in nephri-  
tica passione*

Nec mihi est obliuiscendum, quod in febribus putridis tantummo-  
do periodicatio obseruetur, & nequaquam in morbis particularibus,  
& propterea periodos non esse collocandas in catalogo signorum pro-  
priorum prædominantium humorum: Instantia est nulla, quia ex-  
perientia relictatur; innumerabiles enim inueniuntur morbi, qui si-  
ne febre, & sine putredine certas habent periodos; quare afferantur  
exempla: an-ne, qui patiuntur dolorem capitis prodeuntem à morbo  
gallico, quotidie vexantur vespere? doloresque certis, ac determinatis  
horis in solis occatu redeunt? perinde ac contingere solet melanchol-  
licis, qui vespere semper magis infestantur; medici dicunt, & optimè,  
quod lues venerea comitetur, hæreatque prædominantibus humo-  
ribus nostri corporis, illosque inde exsiccare, & in melancholicos  
conuertere; hancque dicunt esse causam, cui infecti lue gallica, ea-  
dem hora, qua melancholici, vexantur; sed ut sit, mihi in præsen-  
tia satis est, quod inueniri possit periodicatio in morbis sine febre: Ad  
hæc, an ne hemici: nea consuetati determinatis quibusdam temporib-  
us, & statis quibusdam diebus solent inuasionibus tentari? Insuper  
quis negabit non obseruari periodos in Epilepsia? in melancholia  
hypocondriaca? in morbo articulari? in lippitudinibus? in aurium  
dolo: audias Galenum primo de differentiis feb. Lippitudines non-  
nullæ quotidie, nonnullæ alternis diebus magis infestant: Similiter  
aurium dolor, atque articularum: Amplius obseruatur periodicatio  
in passione nephritica, in qua statis quibusdam temporibus dolores  
non solum excitantur nephritici, verum etiam lapilli conglobantur:  
vidimus amicum, qui semper post quattuor menses lapillum excer-  
neret, præsciretque lapilli partus diem: Præterea circuitus obserua-  
tur aliquando in gonorrhea, in morbo arquato, in eruptionibus cuta-  
neis, in verrigine, in cancro, in morbo pediculari, in alopecia, in cor-  
dis palpitatione, & in aliis pluribus affectibus præter naturam: Postre-  
mo, si hæmorrhagias narium, vteri, hæmorrhoidum, & aliarum par-  
tium examinabimus, videbimus firmis, & statutis temporibus sangui-  
nis fluores redire, quinimmo illis suppressis, varia inde sequi sympto-  
mata obseruabimus: Sed quid multa? an-ne aliquando leues quidam  
insultus determinatis quibusdam horis diei obseruantur in illis, qui  
nulla febre, nulloque alio affectu præter naturam premuntur? sicuti  
est videre in melancholicis adhuc inter limites sanitatis constitutis,  
quorum humores sæpè alterantur vespere, nulla tamen actione læsa  
existente, sicuti quoque est videre in pituitosis, qui noctu qualibet  
grauantur, in biliosis, qui meridie, & in sanguineis, qui prima luce;  
quare vanissimum erit credere, quod periodi febribus putridis, vel  
morbis per se conueniant: ratio autem, cur non ita aperte periodi in  
morbis particularibus, ut in febribus putridis obseruentur, est, quia  
halitus putredinosi, dum adoriuntur partes solidas non obcure, sed  
aperte vellicant, & pungunt facultates expultrices, vnde necessario  
humores peccantes debent patefacere periodos prædominantium  
humorum, quod in cæteris morbis particularibus non ita aperte ob-  
seruatur.

Amplius



Amplius, si periodicatio per se conueniret morbis, sequeretur, quod omnibus morbis conueniret: ac quis dicet periodos, vel circuitus pa-  
roxismorum conuenire febribus hecticis? & cæteris morbis, qui sunt in habitu, & non amplius fiunt, sed facti sunt: ut sunt vlcera, luxatio-  
nes, lapides in vesica, & cæteri innumerabiles affectus facti. Quocirca, cum periodicatio per se non possit conuenire morbis; & præter mor-  
bos nihil aliud sit in corpore agrotantium, quod possit esse princi-  
pium eorum, quæ fiunt, nisi humores peccantes, & prædominantes, in  
illos potius tamquam in causas efficientes reducemus circuitus, & ex  
circuitibus necessariò colligemus, qui sint humores peccantes.

Accedit, quod non solum ab humoribus prædominantibus pen-  
dent periodi, verum etiam velocitas, & tarditas omnium affectuum  
præter naturam; eatenus enim morbi dici possunt veloces, vel tardi,  
quatenus continud ab humoribus crassioribus, vel tenuioribus pen-  
dent, suntque in motu, & per cõsequens in fieri: Qui verò nõ amplius  
ab humorib. fiunt, sed sunt facti, ut est hectica, & cæteri morbi in habi-  
tu, nullo modo poterunt dici veloces, vel tardi, quia de ratione motus

*Vi velocitas,  
& tarditas  
morborum  
indicant per  
se humores  
per accidens  
morbos.*

3. phy. text. 6 est actus entis in potentia, ut in potetia, i. in fieri; morbi  
verò in habitu sunt actus entis in actu, & in facto esse, quare cum mo-  
bis in habitu non possit conuenire motus definitio, morbi per acci-  
denstantum dici poterunt veloces, vel tardi: Insuper, cum quattuor  
morborum tempora insequantur per se motum, sequitur, quod mor-  
bi in facto esse, & in habitu, quatenus non sunt amplius in fieri, & de-  
pendentes ab humoribus, non habeant, neque habere possint quat-  
tuor morborum tempora, principium scilicet, augmentum, statum,  
& declinationem, quoniam eatenus fiunt, habent insultus, & sunt  
veloces, vel tardi, quatenus pendent; quando verò non amplius pen-  
dent ab humoribus, cessant periodi, cessant morborum tempora, ve-  
locitas, vel tarditas, iure merito ergo nos ex moribus morborum per-  
ueniemus in cognitionem peccantium, atque prædominantium hu-  
morum; qui sunt efficientes causæ motionum vniuersalium, & parti-  
cularium; æmulabimur Aristotelem qui hac via 8. phy. ex motu sci-  
licet æterno Motorem æternum cognouit, & primo cœli ex motu cir-  
culari simplici inuenit cœlestia corpora quintam habere naturam, di-  
uersam scilicet à quatuor elementis, quod consequi non potuit Pla-  
to, quia non ex motu, ut Aristoteles, sed ex lumine colligere volebat  
cœlorum essentiam, dicebatque cœlestia corpora, quia erant lucida,  
constare ex igne; & solem formaliter esse calidum, & demum ex e-  
minentis elementorum cœlum constare; causa erroris Platonis fuit,  
quia non poterat imaginari, lumen ex alia causa, quam ab igne prodi-  
re; ex moribus ergo procedendo firmiter colligemus peccantes, &  
prædominantes humores hac consequentiarum serie; morbus ab hu-  
moribus pendet, ergo fit; fit, ergo habet morborum tempora, ergo est  
velox, vel tardus, est velox, ergo humor peccans est tenuis, calidus, &  
biliosus, est tardus, ergo humor peccans est crassus, & viscosus: Nec obui-  
dicant, nos in sortitem syllogismum vitiosum incidere, dum ex coa-

*Quatuor  
morborum  
tempora per  
se pendere ab  
humoribus,  
& non à  
morbis.*

Sol.

Duplex fori  
iii.

cernatis consequentiis colligere velimus peccantes humores esse calidos, vel frigidos, tennes, vel crassos, quia occurrimus forites vitiosos esse illos, qui congregant, & coacervant prædicata accidentalia, dicimusque foritem propositum in cathalogo optimi syllogismi collocari, quia ex prædicatis essentialibus constat; etenim ab humoribus pendere; fieri, habere tempora, esse velox, vel tardum, sunt prædicata essentialiter connexa, quare si ex iis colligimus humorem esse crassum, vel tenuem, calidum, vel frigidum, mihi videtur, quod necessario alterum ex duobus sequatur.

Quomodo ex  
velocitate,  
vel tarditate  
vnius tempo-  
ris morbi  
tarditas aut  
velocitas to-  
tius morbi  
colliguntur.

Denique velocitas temporum morborum tam necessario indicat humores tenues, & calidos, & tarditas contrarium, ut velocitas quæ vnius temporis morbi possit nobis significare velocitatem, vel tarditatem totius morbi, & per consequens caliditatem, vel frigiditatem peccantium humorum; Quod igitur ita re vera sit, quod scilicet, ex veloci principio morbi breuitatem, & ex tardo, totius morbi longitudinem necessario possumus inferre, confugiamus ad historias Epidemicas Hippocratis, vnde Galenus omnia medicinz arcana desumpsit; Loquens igitur Galenus de Philisco, qui acutissimo & velocissimo morbo corripiebatur habet, si tertius, & quartus dies habent graua symptomata, expectabis iudicium sexta, vel septima die; in Philisco tertia die apparuerunt grauissima symptomata, quia nigra minxit, & lingua inaruit, habuitque spiritum magnum, & rarum: hæc sanè signa lethalia non apparuissent in principio, nisi morbus ob velocissimum, & acutissimum motum humorum esset valde progressus: Colligit ergo Galenus ex velocitate principij aliorum temporum breuitatem, dum dicit expectandum iudicium sexta, vel septima; valebit ergo consequentia apud Galenum, & Hippocratem, morbi principium est velox, ergo erit velox augmentum, status, declinatio, nisi post principium contingeret recidiua, & morbus nouus, quippe qui supponeret humorem peccantem esse alterius generis: Ad eundem modum ex tardo, & longo principio colligitur tardum esse augmentum, statum, & declinationem, sicut obseruatur ab Hippocrate in casu Anaxionis pleuritide affecti, qui octaua die adhuc habebat ruses ficas, cuius principij tarditatem cognoscens Hippocrates in 8. die secuit cubitum præuidens tarditatem aliorum temporum; peruenit enim cum Anaxione ad 34. diem: valebunt ergo consequentia; velox est principium morbi, ergo morbus totus breuis, ergo bilis peccat: valebunt quoque, tardi morus est principium morbi, ergo longus erit morbus, ergo lentus, vel crassus humor peccabit.

Exurgens



*Exurgens dubitatio ex superius dictis soluitur, agiturque de periodorum causis.*

CAPUT V.

**V**ERVM magna confurgit dubitatio, quia non videtur, quod pituita, quæ est frigida, & viscosa habeat tardam motionem, bilis vero, quæ est tenuis, & calida velocem; quoniam pituita quotidie inuadit, bilis vero solum de tertio in tertium diem, & melancholia de quarto in quartam: pro cuius dubitationis solutione Prisci, & Moderni valde laborarunt, ut nodum hunc soluerent, quare breuiter aliorum solutiones proponantur, quia ex huius dubitationis solutione cognoscemus, non solum cur pituitosa febris paroxysmi velocius moueantur, verum etiam, quænam sit periodorum causa.

*Dubitatio  
cur pituita  
quotidie bilis  
de tertio in  
tertium mo-  
uantur.*

Auer. 4. coll. cap. 27. dicit has periodos pendere à natura & calido innato, redditque rationem, dicendo, naturæ & calidi innati proprium esse mouere, coquere, attrahere, & retinere amicum, & familiare; & expellere inimicum, & naturæ noxium; Quæ Auerrois solutio tantum abest, ut tollat dubitationem, ut maiorem reddat difficultatem, quia frigidi humores pituitosi deberent à calido innato, & à natura tardius moueri, & nequaquam velocius, biliosis: Præterea non soluit nodum, quia iterum querere possumus, cur natura citius moueat pituitam, quam bilem: amplius afferendo pro causa periodicationum naturam, transcendit de genere in genus, scilicet ab iis, quæ sunt secundum naturam, ad ea quæ sunt præter naturam; paroxysmi non mouentur à causa naturali, sed à causa præter naturam: Denique videtur Auer. supponere febrilem motum non oriri ab halitibus putridis, sed esse connatum naturæ, ut tenet Christoforus à Vega, quæ sententia in Galeno non potest defendi.

*Opinio Auer.*

Conciliator differentia 88. soluens instantiam dicit, periodos à motu lunæ, & ab humorum forma pendere: afferens verò causam, cur pituita quotidie inuadat, & bilis alternis diebus, dicit, lunam præesse omnibus humiditatibus, ut patet dum fluxum, & refluxum maris facit, quare pituita, quæ est aquæ similior, citius ab ipsa luna mouebitur; additque in pituita modicam pausam comprehendi, quia in luna ob epicycli paruitatem non percipitur statio, directio, nec retrogradatio; deinde sequitur bilis, cum plurimis abundet ichoribus, & postremo melancholia, quæ est aquæ minus similis: Primò errare videtur Conciliator, quia, ut alias diximus ex causa remota nihil affirmatiuè colligi potest, ut Aristoteles in prioribus analyticis altissimis rationibus probat: Secundò, quia vnius rei vnica debet esse causa, & non duæ; ille enim vult motum lunæ, & formam humorum efficere periodos: Tertio, dicere formam humorum, & lunam esse causam circuituum non tollit dubitationem, sed eam reddit obscuriorem, quia nec quomodo luna, nec quomodo forma humorum periodos faciat, declarat:

*Opinio Con-  
ciliatoris.*

Postremo dum colligit esse modicam pausam in pituita, quia in Luna non percipitur ob eius epicycli paruitatem statio, directio, nec retrogradatio, videtur errare; quoniam dum hæc dicit, supponit lunam re vera esse posse retrogradam, stationariam, & directam, alioquin modicam quietem à luna colligere non potuisset, quod suppositum est falsum, quia concentricus lunæ ferens epicyclum mouetur 27. diebus epicyclus vero 32. dierum cursu suam perficit motionem; implicat contradictionem dicere: concentricum esse velociorem, & epicyclum tardiozem, & lunam existentem in epicyclo pari stationem, directionem, & retrogradationem, quare nullomodo quies & pausa illa lunæ admitti potest.

*Opinio Ferneli.*

Fernelius libro 4. de feb. cap. 11. dicit, causam periodorum esse qualitatem quandam insitam, & propriam, quæ vocatur *insuavitudo*, dicitque hanc qualitatem esse contractam à putredine, explicat suam sententiam in his verbis: Non igitur sola excrementi copia, sed alia quædam vis maior necessario vnumquemque huiusmodi ordine, certaque regula ciet, ac impellit: hæc autem non propria est contractæ putredinis, qualitatisve natura, atque conditio, quæ omnem corporis statum immutat, vt Epilepsia infusus, aut hydrophobia impetus, non humoris genus, sed qualitaris natura in humore sic exoritur, hinc mensuræ purgationes, quæ imis paucus sanguis sit, singulis mensibus erumpunt, & sic de aliis omnibus refert. Quæ sententia non recipitur, quoniam sequeretur, quod humores possent putrefieri, antequam mouerentur, quia vult, de putridis febribus loquendo; vt prius à putredine contrahatur illa qualitas propria, quæ non subito fit, quæ solum contracta, & non ante, vult humores periodicè moueri, quod videtur inconueniens, quoniam non post factam putredinem, sed dum fit, excitantur paroxysmi: deinde asserere hanc qualitatem propriam pro causa periodorum est nihil docere, quia æquè scio de periodicis, dicendo causam esse qualitatem propriam, ac si nunquam loqui audiuisset de periodicis.

*Opinio Gentilis & Herculanus.*

Gentilis, & Herculanus in com. Auicennæ dicunt, periodos à proprietatibus occultis prodire: quorum opinio supponit substantiam primo, & per se edere operationes, quod fundamentum, quod est falsum, & origo multorum errorum, nos in octauo libro longo discursu conabimur euertere, ostendemusque cum Diuo Thoma nullam omnino operationem immediatè prodire posse à substantia, sed à qualitatibus, & per consequens non dari illas occultas proprietates.

*Opinio Capiuacei.*

Hieronimus Capiuaceus libro 6. de feb. cap. 12. dicit periodum causam esse naturam humoris: Huius viri excellentiss. opinio nihil videtur docere; quoniam dicere causam periodicationis esse naturam humorum æquè docet, ac Fernelius dicens esse qualitatem propriam humorum, ac Gentilis, & Herculanus dicentes esse proprietatem occultam, ac Conciliator, qui præter lunam, dicit esse formam humorum; quare his dimissis conuertere expedit mentis aciem ad causas magis sensatas, & quæ aliquantulum saltem possent animum nostrum componere.

Valesius.



Valesius ergo lib. 3. c. 15. controuersiarum; & plurimi recentiores *Opinio Valesii.* causam magis sensatam quærentes dixerunt; copiam humorum causare periodos, atque pituitam moueri velocius bile, quia est cæteris humoribus copiosior; Horum tamen sententia, quamuis sit magis sensata, non recipitur, quia primò sequeretur, quod bilis in maxima copia extra venas existens ocius moueretur, quam si esset pauca, quod non videtur, cum semper tertiana de tertio in tertium moueatur, videmus enim aliquando de tertio in tertium moueri omnes paroxysmos cum vomitu copiosissima bilis, nihilominus de tertio in tertium sine paroxysmi antepositione moueri, ergo copia non potest esse causa periodorum.

Est demum Recentioris excellentiss. opinio, quod inquinamenta varia putredinis varias periodos faciant; deficit quoque hæc causa, primò, quia non declarat, cur inquinamentum putredinis pituitæ moueat quotidie, bilis de tertio in tertium, nisi dicat hanc esse naturam illius inquinamenti, & sic incideret in opinionem illorum, qui dixerunt causam periodorum esse naturam humorum, esse propensionem, esse proprietatem occultam, inciderentque in principij peritio- *Opinio recentioris.* nem inexcusabilem afferendo pro declaratione quæsitæ ignoti aliquid, quod sit ignotius: Secundò inquinamenta non possunt esse causas periodorum omnium, sed affectuum tantum, qui sunt à putredine. Qui circuituum causas quærent, quærent aliquid vniuersalius, quia dum melancholici vesperti affliguntur magis, dum hæmicranæ, vel epilepsia determinatis diebus redeunt, hæc ab inquinamenti fieri non poterunt.

Postremo est Franciscus Parellus lib. de feb. intermit. qui dicit causam periodicationis esse distantiam illorum viscerum, quæ sunt domicilia humorum, ab ore ventriculi, nam ventriculus, qui est sedes pituitæ, cum sit proximus ori ventriculi, si peccat eius humor quotidianos facit circuitus; ite- *Opinio Parelli.* cur, quod est humoris bilioli domicilium, cum magis distat, eius humor de tertio in tertium mouetur; lien, qui est sedes melancholiæ & maximè distat à stomacho, facit periodos de quarto in quartum; quam sententiam colligit ex Galeno primo ad Glau- c. 5. ubi dicit quotidianam in ventriculo, tertianam in hepate, quar- ranam in liene fieri. Quæ opinio propius re vera accederet ad veritatem, si melius fuisset explicata; quoniam in primis videtur errare, dum supponit non fieri tertianam, nisi humor peccans sit in iecore; non fieri quartanam, nisi in liene sit humor melancholicus, etenim fit tertiana, bile peccante extra iecur; & quartana melancholia peccante extra lienem, deinde vult periodos varias esse ob distantiam ab ore ventriculi, quasi quod febris sit affectus oris ventriculi, debebat potius dicere variam distantiam à corde periodos varias facere, quam ab ore ventriculi.

Dicimus ergo nos coacti altissimis medicinar, & philosophar prim- *Opinio prioris.* cipiis, quod humores prædominantes ob locorum, & partium affectuum situm, & distantiam à corde sint causas periodorum; ostendi-

mus quoque 3. lib. à decem locorum affectionum conditionibus omnes affectus naturales, & præter naturam trahere esse specificum; atque ne quis admireretur, audiat quot modis tantum fundamentum comprobati possit; an ne ex Galeno in primis patet, 3. de sympt. causis capite 2. quod bilis in toto faciat icterum, in parte erisipelas? ergo locus, & non humor dat esse specificum morbis, & periodis morbos consequentibus: Similiter, an-ne eadem bilis, si est in pleura, faciat pleuriticum affectum, si in cerebro, phrenesim? Si in venis proximis cordi, ardentem? si in venis meserei, tertianam? ad eundem modum pergens Galenus loco citato, an-ne dicit, si atra bilis redundat in toto, elephantiasim facere? si in parte cancrum? quare si humores ob locorum affectionum differentias variant affectus, & periodos; causa proxima, & immediata periodorum nullo modo poterit esse in humoribus, sed in partibus affectis, & vario modo dispositis: Amplius à Galeno adeo aperte, & perspicue eadem sententia exprimitur 2. de differentiis feb. cap. ultimo in postremis verbis, ut nihil apertius dici possit; hæc sunt verba: Quæcunque per circuitus aliquos ægitudinum accessiones sunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent: quare si periodi habent ortum ab iis dispositionibus, sequitur necessario, quod membra ob varias dispositiones pariant omnes differentias morborum, & periodorum; decem enim tradita sunt differentia membrorum lib. 3. de quibus hic non est locus, ne iterum acta proponamus: Præterea, si humores per se causarent periodos, ut plurimi, & fere omnes videntur asserere, valeret hæc consequentia, ergo semper, & ubicunque essent collecti humores facerent similes circuitus, quod experientia omnino reluctatur, quia iam dictum est, bilem in venis proximis cordi facere ardentem febrem, in cerebro phrenesim: Insuper altiora adhuc sunt initia, quæ nos cogunt ad dicendum, quod periodi, & affectus vniuersi humani corporis trahant esse à locis affectis, & audias; an-ne affectus sunt proprietates subiecti? definiunturque per subiecta? suntque in secundo modo dicendi per se? nemo hætenus est inuentus philosophus, qui tantum principium non veneretur, ergo & periodi quatenus sunt affectus debent definiri per subiecta, quæ sunt loca affecta, ergo vanum erit desumere rationem, & causam immediatam periodorum ab humoribus, cum debeant desumi à locis affectis, tamquam à subiectis; Hinc, si humores bilioli sunt in loco proximo cordi natura adurit malos humores sine circuitu, quia agens proximum patienti non impeditum semper agit, & patiens reagit, quando vero peccantes humores sunt in loco magis distanti, & remoto à corde, tunc cor variis partibus circumseptum exemplo in humores non agit, nec humores in illud reagent, sed solum per circuitum: hinc sequitur, quod quanto maior sit distantia loci affecti à corde, tanto periodus erit longior: quibus principiis nixus Franciscus Parellus recte dixit causam circuituum esse distantiam membrorum, confirmauitque suam sententiam Galeni auctoritate 1. ad Glauconem cap. 5. ubi habentur hæc verba, quotidiana ratio aduenit, quia



nit, quin os ventriculi patiatur. quemadmodum quartana ex malè affecto splene generatur, tertiana ex hepate laborante: dissentimus tamen ab illo, quia dicebat causam periodorum esse distantiam ab ore ventriculi; nos à corde; ille credebatur bilem facientem tertianam semper esse in iecore, melancholiam in liene, quod non potest defendi, cum bilis faciens tertianam modo sit in hepate, modo in mesenterio, modo in variis partibus hypocondriorum: melancholia vero, quia magis distat à corde, cum eius sedes sit in liene, causat quartanam, modo tamen est in porta vena, modo in cæteris partibus: pituita tamen faciens quotidianam inmittentem semper suam sedem habet in ventriculo; & quia proximus est cordi; ideo quotidie movetur, namque si pituita putrescens esset in pedibus, utique ob hanc distantiam non faceret quotidianam, similiter si bilis esset in inguine, vel in alia parte inferiori, non faceret tertianam. Neque ubi ciant, quod febris *Obiæ.* continua fieri possit, quamvis melancholicus humor sit in vena cava infra renes in loco magis distante, quam sint hypocondria; quia occurrimus dicendo quemlibet surculum venæ cavæ à corde remotissimum propter communem meatum adeo cordi respondere, perinde ac esset in loco proximo, per eandem enim cavitatem halitus putredinosi petunt cor, & febrem excitant, absque eo, quod aliqua pars corporis impediat transitum putredinosi exhalationibus: concludere ergo recte possumus, primam & immediatam causam periodorum esse à locis, ubi peccant humores, desumendam, & nequaquam à humoribus peccantibus, quia sunt causæ remotæ.

Huic nostræ sententiæ non solum favent præcipua fundamenta, rationes & experientia, ut ostendimus, verum etiam per celebres plurimi auctores, inter quos est Eustachius Rudius vir perspicacissimus, qui lib. 3. de serie omnium causarum periodorum loquens habet insitam, & naturalem propensionem cuiuslibet humoris ad putredinem concipiendam esse causam communem periodorum: deinde profundè considerans rationem magis specificam cur pituita, de qua lis est, quotidie inuadat, & velocius moveri videatur bile, addit capite 9. in fine, & capite 27. citati libri, in pituita esse lentorem, cuius ratione portio putrescentis pituitæ, necessario cum ea quæ iam putrescet contigua est, quò sit, ut portione unica absumpta, illi eo putredo aliam fomiti contiguam inuadat, quòd non evenit in bile lentore spoliata: postremo cap. nono & 27. de immediata causa loquens dicit à loco desumi debere, itaque argumentari cum illo tali pacto possumus, ab illa causa debet desumi prima, & immediata ratio periodorum putridarum febrium, à qua oriuntur differentiæ putridarum, sed differentiæ putridarum oriuntur à loco, ergo & periodorum à loco desumi debent; maior his altioribus principiis probatur, in qualibet contemplatione, quod dat quid, dat quoque consequentia quid, & est Aristotelis primo, & secundo post. omnem quæstionem esse medijs: quod vero à locis affectis desumi debent circuitus, est Galeni secundo, de differentiis feb. ult. à membrorum scilicet dispositionibus cir-

*Vi facies senti-  
tentia nostræ  
Rudium.*

cuitus oriri, quare non possum committere, quin valde mirer nonnullos qui scripserunt, ipsum credidisse propensionem humorum esse immediatam causam, cum clarissimè dicat primo requiri propensionem humorum, addatque de pituita loquens, quod pituita lentior, & viscositas sit causa magis proxima, cur quotidie moueatur, & demum eloquentissimo discursu referat circuitus, seu periodos putridarum febrium in locum venarum portarum, ad differentiam continuarum, quæ fiunt, ab humoribus peccantibus in cauis venis, ut apud illum est videre locis citatis.

*Exsurgens  
dubitatio.*

Verum ex superius dictis apparens quædam contradictio magni momenti videtur emergere, quoniam in limine libri diximus ex periodis nos cognoscere humores peccantes; hic vero dicimus periodos non causari primo, & immediatè ab humoribus, quare videmur versari in antilogiis; quoniam ex Aristotele res sicut se habent ad esse, ita & ad cognosci: quare si humores non sunt causæ periodorum, ut probauimus, non valebimus quoque ex periodis humores cognoscere, quod est contra illud quod pro fundamento huius libelli posuimus. Tollitur apparens contradictio dicendo, quod cognoscere ex periodia peccantes humores dupliciter intelligi possit, vel quo ad existentiam, vel quo ad essentiam humorum: dicimus, quod periodi nobis declarare possunt humores quo ad existentiam, scilicet humorem peccantem esse bilem, pituitam, vel melancholicam, & nequaquam quo ad essentiam, & quidditatem humorum, quoniam humorum natura & definitio aliis principiis est perquirenda: audiasque quibus fundamentis suffulti hæc dicimus, humores sunt causæ remotæ periodorum, & non proximæ, hinc valet consequentia, sunt periodi; ergo sunt humores prædominantes, & non versa vice, scilicet sunt humores prædominantes, ergo ex necessitate debent obseruari periodi. Hinc philosophus primo post. tex. 30. loquens de causa remota dicit, quod causa remota non potest dare propter quid, sed tantum quod, quare humores peccantes, cum sint causæ remotæ periodorum, ut ostensum est, nullo modo poterunt dare propter quid, fiant periodi, sed solum quod fiant, sed non per argumentum affirmatiuum, quia à causa remota nullum affirmatiuum colligi potest: quo pacto vero quod colligi possit ex causa remota, hic non est locus de hac re loquendi, cum ad logicum pertineat. Ex his igitur, & ex enarratis superius facile erit colligere, quo pacto periodi possint nos docere, qui nam sint humores peccantes siue prædominantes, & quænam sit potior periodorum causa.

*Uterram,*



*Errant, qui ex urina inspectione prædominantes seu peccantes humores, eorumque coctiones, & cruditates necessario colligunt.*

CAPUT VI.

SEQUITUR ergo, quod cætera signa; à quibus empyrici colligere solent peccantes humores, quæ non desumuntur à saporibus siue à coloribus, siue à periodis, vel motu morbi, sint communia, vel partialia, vel extranea, quia signa, quæ non sunt propria, sub iis tribus generibus continentur: Cæterum, quia multi inter propria, & præcipua signa peccantium humorum, eorumque coctionum, & cruditatum collocant urinam, & pulsus; ideo in præsentia præstat istorum sententias examinare: Isti igitur, qui putant ex urinis colligi posse peccantes, & prædominantes humores, tali pacto argumentantur: Qui cognoscent coctionem, & cruditatem humorum, cognoscent humores prædominantes, at ex urina coctionem, & cruditatem cognoscent, ergo ex urina humores prædominantes cognoscent: Confirmant maiorem, quia ex veloci coctione colligunt peccare biliosos humores, ex tarda, melancholicos, & pituitosos: deinde minorem probant ex consuetudine omnium ferè medicorum, qui ut cognoscant coctionem, vel cruditatem humorum in omnibus morbis urinas inspiciunt: Quod argumentum reluctari videtur auctoritati Galeni, rationi, & experientiæ; quoniam re vera urina (si propriè loqui volumus) neque est proprium signum peccantium humorum in omni morbo, neque eorundem peccantium humorum coctionem, vel cruditatem semper ostendere potest, quod, ut melius pateat, confugiamus primo ad Galeni auctoritatem, ubi declarat Historias Epidemicas Hippocratis, à quibus sanè omnes medici ante Galenum, & Galenus ipse potiora totius Medicinæ arcana desumpserunt. Loquens igitur Galenus de Pythione, qui febre, & pectoris affectione erat correptus, dicit iudicationem factam fuisse in Pythione die decimo, sed cum urinis crudis; videns igitur Galenus post coctum morbum perseverare urinas crudas, subdit, coctionem, vel cruditatem humorum in pectore residentium non cognosci per urinas, sed per sputa; quo pacto ergo volunt Empyrici coctiones, & cruditates humorum in omni morbo, & in qualibet parte corporis residentium ex urina colligere? Si in Pythione est cruda, quando cocti sunt humores pectoris? propterea meritò Galenus cognoscens urinam non posse indicare coctionem humorum extra venas residentium, habet hæc verba 4. aphorismorum com. 77. cum enim ex venis urina veniat, in renibus autem percolatur, in vesica vero aggregetur; quicquid in ea præter naturam apparuerit, aut venas, aut renes, aut vesicam male se habere indicabit, videas ergo urinam minimè ostendere posse hu-

*Et errant, qui ex urina colligunt humores existentes in pectore esse coctos, vel crudos.*

*Que cognosci possunt ex urina.*

mores peccantes in ventre, in pectore, & in cæteris partibus corporis residentes, quoniam dicit clarissimè Galenus, vrinam solum ostendere venas, renes, aut vesicam malè se habere: Similiter legitur 4. de tuend. sanis. in principio libri, de his, quæ intra venas sunt nullum sanè nec manifestum, nec euidentem signum habemus præter solam vrinam, sequitur ergo, quod reluctentur Galeno, & veris Medicinæ fundamentis, qui in omni morbo ex vrina credunt, colligi posse coctiones, vel cruditates humorum.

*Vrinæ ostendere quæ sit in caua vena: emacuationem vero per album, quæ in porta*

Verum quo pacto lotium ostendat humores peccantes in venis, & quarum venarum humores ex lotio cognosci possint, non video, quod ab aliis melius nodus hic discutatur, quam à Galeno; quare aliis dimissis confugiamus ad præcipuum Galeni locum, vbi agit de Muliere decumbente apud Pantinidem ibi habet hæc verba, vrinæ crudæ ostendebant in gibbo iecoris redundare succos crudos; euacuationes vero tenuium in venis meserei; patet ergo vrinam potius ostendere conditionem humorum existentium in caua vena, quam in porta, & in venis meserei à porta prodeuntibus.

*Cur aliquando vrina non potest rectè ostendere, quæ sunt in caua.*

Amplius dicere possumus cum Galeno, si ex propriis volumus philosophari, vrinam aliquando coctam apparere, crudis existentibus humoribus in caua vena, pro qua re legamus Galenum, vbi de Historia Cleonactidis verba facit, dicit enim in Cleonactide vrinam, quæ modo cocta, & modo cruda redditur, indicare humores aliquos coqui, & alios manere crudos; ecce igitur, quod existentibus in venis humoribus crudis, reddi potest aliquando vrina cocta, quare si semel eam coctam videbimus, non poterimus dicere in venis non esse crudos humores, quia die sequenti potest reddi cruda; Similiter si cruda apparebit, non poterimus absolute dicere, humores crudos esse, quia die sequenti posset cocta externi, vt contigit Cleonactidi; Similiter

Galenus 2. prælag. com. 16. habet, contingere potest, vt aliquis vrinam, quæ reprehendi non potest, emittat, attamen sequenti nocte, aliam reprehendendam reddat, & rursus sequenti die manè bonam, vesperti malam, quæ vrina ostendit partem humorum in venis esse coctam partem incoctam, addit illam vrinam optimam esse, quæ inter coctas nulla cruda reddita sit: quare, qui colligent ex vrina cocta semel visa morbi victoriam, valde errabunt: ratio vero, cur vrina potest nos fallere, est, quia humor crudus non totus simul coquitur, sed prius vna pars, deinde alia, quare vrina cocta non potest ostendere primo, & per se coctionem rotius humoris, sed solum illius portionis humoris nuper cocti: consequitur enim natura in certamine cum morbo non vnicam victoriam; sed multas, quia post multos insultus, & post coctiones multarum portionum peccantium humorum ad portum salutis transferri solet.

*Cur errant qui ex vrina semper cocti*

Insuper, si lotium per se, & propriè ostenderet speciem peccantium humorum, vel coctionem, & cruditatem, sequeretur, quod humores mali semper per vrinam euacuarentur, quod aduersatur Galeno, & experientiz, Galenus enim ad Posthumum cap. 3. habet hæc verba, multæ



multæ sunt viæ, quas natura aperit pro expellendis excrementis, per <sup>gunt condi-</sup> vomitum videlicet, per alui profluuium, per sudorem, per sanguinis <sup>tionē peccan-</sup> eruptionem, per hæmorrhoidas, & per alias vias; cur ergo volunt vrinam semper, & in omni morbo ostendere conditionem peccantium humorum, si per sputa expectanda est crisis? ut de Pythione dixit Galenus: Cur, si per alui profluuium eiiciuntur excrementa, volunt per lotium statim, & conditionem humorum peccantium cognosci? cum euacuationes per aluum sint illæ, quæ hoc debent declarare, ut de Muliere decumbente apud Pantimidem docuit Galenus: Quare concludimus urinam præcipuè ostendere cruditatem, vel coctionem humorum in vena cava residendum, & non in aliis partibus, hac seruata conditione, ut per duos, vel tres dies cocta emittatur, ut dicit Galenus 2. præfag. com. 26. An verò vrina ostendere possit determinatam aliquam humorum dominantium speciem in venis peccare, an scilicet peccet bilis æruginosa, vel vitellina, vel porracea, dicimus solum per probabilem aliquam coniecturam, & nequaquam certa, & demonstratiua cognitione nos consequi posse, quandoquidem cognito ex periodis de tertio in tertium peccare bilem, alia præterea requiruntur signa, quæ nobis melius ostendant varias has biliosorum succorum species, veluti si peccat bilis vitellina, vel flaua, hæc sanè in primis cognoscitur ex periodis de tertio in tertium, quare adduntur alia signa, veluti si natura promptè, & ordinatim aggreditur coctionem, scilicet determinatis diebus, & horis, dicimus peccare biles non valde exitiosas, ut sunt vitellina, & flaua: demum ex mitiori morbo colligimus flauam, ex paulo vehementiori vitellinam: Similiter si in vrina coctio, vel breui incipit apparere, colligimus humores tenues, & biliosos, non melancholicos, & pituitosos, si tardè coctio in lotio appareat, colligimus melancholicos, & pituitosos, quare si volumus peruenire ad cognitionem specierum humorum melancholicorum, & pituitosorum peccantium, debemus ex periodis, saporibus, & coloribus colligere, vel à syndrome aliorum signorum, de qua in sequenti libro agemus, itaque nullo modo vrina erit proprium signum peccantium humorum.

Postremò si vrina posset nobis significare peccantes humores, eatenus id præstaret, quatenus est excrementum; quia, ut dicit Galenus 2. de natura humana com 7. excrementa cuiuslibet particulæ corporis, quæ nam affectio particulam ipsam vexet, declarant: Cum igitur tres sint in corpore animato coctiones, primaque sit in ventriculo. secunda in iecore, & tertia in cæteris partibus corporis, & in qualibet harum coctionum duo sint excrementa, alterum crassum, & alterum tenue, & vrina sit tantum excrementum vnius coctionis, cur dicere volumus urinam ostendere ea, quæ pertinent ad cæteras coctiones? si in pectore erunt excrementa, si in capite? & ea prodirent à tertia coctione? cur volunt illa cognosci per urinam? Similiter an-ne excrementum crassum primæ coctionis sunt fæces? quare si in hoc excremento erit aliquod signum proprium, quod ostendet læsiones primæ

*Qua ratione  
vrina possit  
ostendere do-  
minium præ-  
uorū humo-  
rum.*

coctionis, id non posset ab vrina propriè significari, sed per accidens, & ratio est, quia quod conuenit vni per se, & propriè debet ex necessitate alteri conuenire per accidens, quod principium ab Aristotele primo cœli, & à Galeno in methodo est probatum: Præterea neque dicere possumus, quod vrina propriè ostendat pertinentia ad secundam coctionem, quia secunda coctio habet tria excrementa, quæ sunt bilis, melancholia, & vrina, quare sequitur necessario, quod ea, quæ propriè ostenduntur à bile, non possint ostendi ab vrina, vel à melancholia: Similiter, quæ à melancholia, vel ab vrina ostenduntur non possint ostendi per se à bile, quoniam vnum per se, vnum indicat, & quod vni conuenit per se, alteri per accidens debet conuenire.

Postremò experientia docet, vrinam aliquando adeo crudam reddi in fine morbi, vt post consecutam sanitatem multorum dierum spacio cruda perseveret, quod potest contingere, quia causa morbi erat extra venas, vel in pectore, sicuti accidit Pythioni, vel in capite, vel in venis meserei, vel demum in venis ipsis cauis, quoniam sæpè contingit, vt superata putredine in vena caua existente cruda reddatur vrina, vel ex nimia potatione, vel ob vigilias, quilibet enim conualescens, & qui sit optima valetudine præditus, si diminutè dormiret ob cogitationes, vel ob alias animi passiones crudas redderet vrinas, cocto etiam & superato morbo: & demum coctam reddi vrinam, morbo aliquandò existente in augmento, veluti dum quis diarrhæa tentatur, quoniam materia mouetur per aluum vrina cocta redditur, quia non est significatrix illius affectus, & sic de aliis: possumus ergo colligere, quod qui in omni morbo, & in omnibus humoribus vbi-que locorum peccantibus volunt ex vrina, spectis sæpissimè aliis signis, colligere coctionem, & cruditatem, & naturam, & speciem peccantium humorum, decipiuntur, quandoquidem id est impossibile, nisi id per syndromem aliorum signorum fiat, quemadmodum doctissimus Galenus expendens casum mulieris decumbentis apud Tiflumenum, quæ iliaco affectu erat correpta, admonet, spem in illo sa-  
*Vnde est, quod*  
*ex vrina cõ-*  
*iacturam col-*  
*ligimus de o-*  
*mnī morbo.*  
 uissimo morbo sumendam esse ab vrinis bonis, quia (vt inquit) si bonæ sunt, signum est viscus nutritionis, quod est hepar, non pari: subdit deinde, non solum in iliaco, verum etiam in morbis thoracis, ventris, pulmonis, & neruorum bonam vrinam bonum significare, quia colligimus ex illis morbos hos non tantum scire, vt iecur possint destruere, quo illæso deinde bonam spem comprehendimus, quia re vera exitiales euentus non possunt accidere sine maxima præcedente iactura hepatis: videas quo pacto Galenus colligit quid dici possit in morbis, qui per vrinam propriè, & per se cognosci non possunt.



*Ut errant, qui credunt pulsus per se indicare predominantes humores, eorumque coctiones, & cruditates.*

C A P. VII.

**S**EQVITVR quoque, vterrent, qui credunt pulsus ægrotantium propriè & per se indicare, quinam sint in ægrotis humores peccantes, & eorum coctiones, & cruditates: radix erroris est, quia non animadvertunt hoc philosophi fundamentum, quod per se vni convenit, aliis per accidens necessario convenire, & vice versa, verissimum enim est, quia vnica species, & natura non potest habere nisi vnicam proprietatem, & vna proprietas non potest nisi vnicam naturam, & non plures indicare, quo infallibili principio Aristoteles primo, cæli suffultus, ad quintæ essentiæ cognitionem nos transtulit, quique illud negaret, totam seriem illarum demonstrationum philosophi destrueret, quare quælibet species pulsus propriè, & per se indicabit vnicum cordis affectum, & non plures, quamuis per coniecturam, & per accidens, & sine necessitate infinita ostendere posset.

Hinc qui dicunt ex pulsibus certò cognosci posse humores esse in venis, vel extra venas: humores esse coctos, vel crudos, reluctantur nò solum Aristoteli, sed etiam Galeo, qui semper sustinuit, quod vnum, *ut ex pulsu* *ve vnum* solum vnum indicet, & non plura, & si plura ab vno, id per *cognoscitur* *coctio humo-* *rum.* accidens, & per coniecturam indicari; quare cum humores immèdiate non respiciant cor, à pulsibus illorum statum, & conditionem ex necessitate colligere non poterimus, & quamuis Galenus semel dixerit, quod humorum coctio ex valido pulsu cognoscatur, non propterea ei aduersamur, quia optima coniectura, & non certa, & infallibili scientia ex valido pulsu colligebat coctos esse humores; etenim pulsus validus per se indicat vnum solum, scilicet validam virtutem vitalem, cætera verò per accidens, & per coniecturam à valido pulsu indicari, si vera sunt Galeni, & Aristotelis prima philosophiæ principia; Hinc, cum ea, quæ per accidens indicantur ex Aristotele possint aliter se habere, & per consequens non sint semper vera, non est mirum, si tam sæpè manifestè errent, qui ex valido pulsu semper coctionem humorum colligant, & quod magis est, optimis medicis, & philosophis risum concitent, quia non solum rationi, verum etiam experientiæ aliquando aduersantur: sæpissimè reperiuntur homines validissimis pulsibus donati, qui humorum crudorum copia referti: validas actiones, & vitales sortiantur.

Cæterum ostendamus per inductionem variarum differentiarum pulsuum, quod ab vnica pulsuum differentia vnicus tantum affectus *Qua pulsus* *inequalitas* per se indicetur: incipiamusque à generalissimis affectuum differen- *indicas per se* *febrem pu-* *tridam.* tiis: an-ne pulsus inæqualis in eodem ictu secundum eandem arteriæ partem, sed inæqualis secundum diuersas partes non arteriæ, sed illius

dilatationis ostendit febrem esse putridam: Hanc inæqualitatem Galenus primo ad Glau. capite 6. & 2. de causis puls. capite 14. dicit esse communem omnibus febribus putridis, quæ inæqualitas est, quia arteria in vnico ictu habet dilatationis principium velocius, & in medio dilatationis velocitatem amittit, in fine iterum velocitatem recuperat; ex hac igitur inæqualitate febrem putridam necessario, & per se colligimus: Hinc Galenus primo ad Glau. 2. de vnico pulsu ostendente ephemeris dicit, cum pulsus nullum inflammationis signum habuerit, neque omnino inæqualitas in vnica arteriæ compulsionem apparuerit, erit febris diaria: Similiter vnicus tantum erit pulsus significans inflammationem, si vera est sententia Galeni 4. de causis puls.

cap. in scripto de pulsu inflammationis: habet enim hæc verba, omnem inflammationem habere pulsum veluti ferrantem, & proinde durum, causa autem cur in lethargo, & peripneumonia non appareat durus; vel ferratilis infra declarabitur; quare concludimus inæqualitatem in vnico ictu per se ostendere febrem putridam, & ab alio pulsu non posse ostendi, nisi per accidens, & per coniecturam; æqualitatem vero in vnico ictu ostendere ephemeram, & ab alio pulsu non indicari, duritiem vero ostendere tumorem, & ab alio pulsu tumorem, vt tumor est, non significari.

*Pulsus prodiens ab inflammatione per se quis sit.*

*Pulsus molli, latus, & vndosus quid per se, & quid per accidens indicet.*

Ad eundem modum obseruatur in qualibet pulsum differentia, vnicum affectum, & non plures indicari, an ne pulsus mollis latus, & vndosus indicat per se molliem arteriæ? per accidens tamen potest indicare peripneumoniam, vel anasarcam, in quibus affectibus cor, vel ab ingenti humiditate læditur; & fit molle, vel à pulmone sua natura molli communicatur hæc mollietates cordi; nulla tamen erit consequentia, est pulsus vndosus, ergo pituita dominatur, ergo anasarca, ergo peripneumonia, & alia id genus in corpore existere; quia accidit cordi, & accidit arteriæ, vt fiat lata, vndosa, & mollis ab anasarca; pluri enim possunt esse affectus, & causæ, quæ impertiuntur cordi humiditatem, & molliem.

*Pulsus durus & ferratilis: quid per se, & quid per accidens indicet.*

Similiter pulsus durus, & ferratilis an ne significat per se duritiem arteriæ? an ne hæc durities per se ostendit duritiem membranosi generis? an vero hæc durities sit facta à pleuritide, vel Tympanite, vel ab aliis affectibus, hoc non potest sciri ex pulsibus, quia ex signis generis colligere specificas ideas est prolabi in paralogismum secundæ figuræ ex duabus affirmatiuis. Sed antequam vterius prouehamur; audias erratum manifestissimum cuiusdam, qui omnia ex pulsibus proficebatur diuinare: Erat æger tussi affectus ob frigidæ potum, huic aderat pulsus durus, & ferè ferratilis, illico ex pulsu tantum, nulla alia signorum syndrome expensa, colligebat ægrum pleuritide detineri, quia putabat ferrinum pulsum esse proprium non inflammationis, vt inflammatio est, sicuti ex Galeno 4. de causis pulsum colligitur, sed pleuritidis, quæ re vera non à pulsu ferrino, sed à quatuor illis signis à Galeno propositis prima aph. & à nobis limitatis primo libro cap. 24. ratio autem potissima cur pulsus ferrinus per se, & propriè ostendere

*Erratum cuiusdam modici.*



ostendere non potest pleuritidem est, quia vnum per se vnum indicat, an-ne ferrinus pulsus propriè ostendit duritiem arteriæ, & cordis: ergo per accidens ostendit pleuram esse læsam; paret enim, quia ferrinus quoque fit, non solum in pleuritide, verum etiam in aliis affectibus, hinc Auicennas lib. 4. fen. prima tract. 2. cap. 2. dicit; durities pulsus fit quoque à potu aquæ frigidæ, & ab aliis causis, quæ indurant pulsum, & sic non ostendit semper apostema esse in membrana: Præterea loquens Auicennas de pulsu adeo duro, vt serratactum æmuletur libro 3. fen. 10. capitibus de pleuritide dicit, vt fiat serratilis pulsus, duo concurrunt, primum durities, secundum facultas aliquomodo imbecillis, & cum acuto calore, quare cum nemo pleuriticorum in morbi limine possit esse imbecillis, non habebit pulsum ferrinum: hinc primo colligimus, ægrum, de quo loquimur, non habuisse ferrinum pulsum; Secundò ferrinum non esse proprium pleuritidis, quia si verus pulsus ferrinus esset proprium; conueniret soli, & semper; Tertiò omnes causas, quæ habent vim exsiccandi tunicas extendendo, vel constringendo durum efficere pulsum; si vero inualesceret affectio, facultas fieri quoque posset adeo imbecillis, vt æqualiter arteriam non valeret attollere, vnde statim fieret serratilis pulsus, quia quando in vnica pulsatione in diuersis arteriæ partibus motu intereiso inæqualitatis persentitur, nascitur pulsus ferrinus, qui non solum in pleura valde læsa contingere solet, sed in omni inflammatione, & præcipuè in omni affectu partium corporis, quæ in thoracis concauo continentur, quia omnes sunt induræ eadem pleura, hinc si diaphragma inflammatur, manifestissimè ferrinus pulsus obseruatur ratione inflammationis, cui per se competit ferrinus pulsus, tum quia diaphragma supernè induitur pleura; Hinc in Tympanite serratilis obseruatur, quia flatus distendit spiritales partes, & petuadit membranas, & extendit, atque duritiem cordi inducit; non valebit tamen consequentia, est serratilis pulsus, ergo tympanites, ergo pleuritis, ergo inflammatio diaphragmatis, quia per accidens contingit, vt durities fiat ab inflammatione pleuræ, vel à Tympanite.

*Pulsus ferrinus non esse proprium pleuritidis.*

Sed ex dictis duæ dubitationes videntur emergere. prima, dum diximus ex Galeno 4. de causis pul. cap. de pulsu inflammationis, scilicet omnem inflammationem habere pulsum ferrinum, quod videtur falsum, quoniam in pulmonis inflammatione, & in lethargo pulsus est mollis, & nequaquam durus, & ferrinus: Secunda, non videtur, quod durus pulsus, & ferrinus sit proprius inflammationis, quia pulsus ob potum frigidæ quoque fit durus: Primæ dubitationi occurrimus dicendo duritiem pulsus in peripneumonia, & lethargo occultari à pituita dominante, & fluente, & magis posse pituitam in mollitie introducenda, quam inflammatio cerebri, vel pulmonis in duritie efficienda, & ratio est, quia durities pulsus cum proueniat à læsis membranæ, atque pulmo, vel cerebrum tenuissima, & per exigua meninge sit intertextum, adeo ipsa durities exigua fit in pulsu, vt à dominante pituita omnino occultetur, & mollietates aperta introduca-

*Prima dubitatio.*

*Secunda dubitatio.*

*Sol. primæ dubitationis.*

*Sol. secunda  
dubitationis.*

tur: Secunda occurrimus, duritiem, de qua loquimur, & quæ fit ab inflammatione, esse permanentem, quæ vero fit ob frigide potum breui, & facile mutari.

*Vibratus pul-  
sus quid per  
se. & quid  
per accidens  
indices.*

Insuper, si alias pulsuum species expendemus, idem luce clarius colligemus: age, breuiter exequamur: Vibratus pulsus per se indicat instrumentum facultatis vitalis esse induratum, indicatque ex maiori duro nasci in motu necessario maiorem collisionem, & ex maiori collisione per se prodire maiorem calorem: per accidens vibratus indicabit conuulsionem, vel pleuritidem, aliquando enim in pleuriticis adeo tenditur, & induratur plena ob tensionem factam ab apostemate, ut cor vibratum pulsus efficiat; hinc dicere solent medici, quod vibrati sint serratilibus similes, quare, qui inferret ex vibrato pulso conuulsionem, erraret, quia incideret in argumentum à positione consequentis ad positionem antecedentis, scilicet, si est conuulsio, est vibratus pulsus, sed est vibratus pulsus, ergo conuulsio, consequentia est absurdissima; valeret tamen, est conuulsio, ergo est vibratus pulsus.

*Pulsus for-  
micans quid  
per se. & quid  
per accidens  
indices.*

Ad eundem modum pulsus formicans per se significat facultatem imbecilliolem; causas tamen imbecillitatis antecedentem ab hoc pulsu colligere non possumus, quoniam modo accidit, ut reddatur pulsus formicans ob veneni potum, modo ob pestem, modo ob egressum à balneo, & ob mille alias causas, quoniam causæ, quæ alicui conueniunt per accidens, non mille, sed infinitæ esse possunt, quare qui ex hoc pulsu formicante vellet colligere summam malignitatem esse in venis, cum per accidens malignitas humorum formicantem pulsus efficiat, vel maxime erraret.

*Quid indices  
vermiculares  
pulsus.*

Similiter vermiculares pulsus indicant quoque absumi natium calorem, sed cum non ad sint ita exiles, ut fornicantes, non ostendent tantam cordis ruinam; qui igitur vellet ex pulsu vermiculari colligere causam efficientem, vel humorem peccantem, cum per accidens vermicularis pulsus possit fieri ab humoribus, transcenderet de genere in genus, quia ea, quæ per accidens alicui conueniunt, genere differunt ab iis, quæ per se: Hinc est valde ridiculum audire Medicos aliquos dicentes à pulsibus per se cognosci posse causas antecedentes ægritudinum, & coctiones humorum.

*Errororum,  
qui colligunt  
coctiones hu-  
morum, ex  
pulsu.*

Hinc simili errore capiuntur, qui in febribus putridis ex pulsu colligere solent, peccantes humores esse bilem, vel melancholiam, nec non ipsos humores esse coctos, vel crudos, nisi id coniectura, & non certa scientia cognoscere profiteantur: Dum Galenus dixit, se ex pulsu pleno, & valido colligere coctionem humorum, id solum coniectura consequi, ut, quæ nisi aliqua artificiosa syndrôme roboretur, potest quoque milles fallere, ratio enim huius est, eaque potissima, quia si erit verum, quod coctiones, vel cruditates humorum existentium in caua vena ab unico signo ostendantur, ut prima philosophiæ inuita docent, scilicet unicum ab unico indicari, & non à pluribus seorsum consideratis, erit quoque verum, coctiones horum humorum cognosci



cognosci ex vrina, & nequaquam à pulsibus, vt valeat hæc consequentia, ab vrina ostenditur coctio, ergo non à pulsu.

Demum non solum pulsus propriè indicabunt coctiones humorum, verum adeo sunt difficiles, vt ex pulsibus vix quæ per se ab illis prodeunt colligere aliquando valeamus, tanta est affectuum in hoc nostro corpore varietas, & implicatio; an-ne superius ostendimus ex Galeno, omnem inflammationem habere pulsum durum? quamuis peripneumonia, & lethargus habeant mollem; causa obscuritatis est, quia occultatur durities ab ingenti mollitie membrorum, & à copiosa pituita putrescente.

Quocirca si ex pulsibus aliquid diuini in arte medica colligere volumus, duo mihi videntur seuerè obseruanda: alterum est, vt illa tantum arcana pulsuum præcognoscamus, quæ per se & propriè cuilibet speciei pulsus conueniunt: alterum est, vt in applicatione, & (vt aiunt) in actu pratico sciamus exactè conferre pulsus præteritarum accessionum cum pulsu præsentis; quoniam solum ex hac collatione certum & infallibile iudicium colligemus, an æger sit in meliori, vel deteriori statu; solet enim medicus aliquando inuenire pulsum sani hominis adeo inæqualem, intermittentem, & aliis deterrimis conditionibus donatum, vt Medicus, qui alias non tetigerit, & obseruauerit, in cognitione, & curatione, cæcorum more incedat: esset igitur operæpretium in sanis hominibus semper motum præcipuè obseruare, quia in ægritudine longè melius crebritatem pulsus, & cæteras conditiones metiri, & certo scire possemus, quantum recedant à naturali statu, possemusque omnes proportionales obseruare, & intermittentiam, si adest, dimetiri, & plura alia ad motum pertinentia: pro qua cognitione exactè, & cirò comparanda instrumentum pulsilogium inuenimus in quo motus, & quietes arteriæ quisque poterit exactissime dimetiri, obseruare, & firma memoria tenere, & inde collationem facere cum pulsibus præteritarum dierum; Exhibet enim instrumentum omnes æqualium motuum differentias, quæ sunt centum & triginta tres incipiendo ab obseruatione rarissimi motus vsque ad creberrimum, cur autem non sint plures, in proprio libro de instrumentis medicis non amplius visis Deo fauente declarabitur: totidem obseruantur differentie inæqualium motionum; Ex cuius pulsilogij obseruatione primò colligimus qualibet die, & hora quantum ægri recedant in crebritate à statu naturali: secundò infallibilem notitiam præbet, qua hora desinat augmentum, incipiatque status, & declinatio: tertio obseruatur virtute proportionum æqualium motionum in pulsilogio obseruatarum, quam crebritatem, quam intermissiorem, & quietem externam quodlibet indiuiduum perpeti, & non perpeti potest: quarto metiri possumus quietem diastolis, & quanta sit quies externa, qua cognita, illico morbi magnitudo, & cachæxiæ vehementiam præcognoscuntur: postremo quilibet sensatus Medicus intermittentiam cognosceret, an scilicet arteria per vnum ictum quiescat, vel per duos, an per vnicum cum dimidio, vel cum tertio ictu

Vnde oritur  
cognitionis  
pulsus diffi-  
cultas.

Duo in pulsu  
esse contem-  
planda.

De pulsilogij  
usu.

parte, vel quarta, & sic vsque ad decimam, quæ, sine instrumento est prorsus impossibile, dimetiri; sed quia in proprio libro de hacre summus acturi, non est vt omnes instrumenti vsus referam: Satis enim est in hoc cap. nos ostendisse per inductionem multarum specierum pulsum, non posse scientia infallibili cognosci peccantes humores, sed solum ex accidenti & per coniecturam, quod erat ostendendum.

*Et errant, qui ex antepositione, & postpositione paroxysmorum peccantes humores, eorumque coctionem, vel cruditatem colligunt.*

## CAPVT VIII.

**Q**VAMVIS dictum sit periodos propriè indicare prædominantes humores, non propterea antepositio, vel postpositio paroxysmorum indicabunt humorum dominium, quoniam eo modo antepositio, vel postpositio accidit humoribus præter naturam, quo longitudo & breuitas paroxysmorum, quia temporis breuitas, longitudo, antepositio, & postpositio, inter se differunt solum secundum magis & minus; quare quemadmodum ex Galen. sententia 2. de diff. feb. capite 11. accessio fit longissima ob quatuor causas, quarum prima est materię inutilis multitudo, secunda crassities, & lentor humoris, tertia imbecillitas potētiz, & quarta meatuū angustia; & breuissima accessio fit à cōtrariis causis, quarū est prima materię inutilis subtilitas, secunda materię paucitas, tertia potētiz vigor, & quarta meatuū apertio; Simili modo dicimus, si materia vel fuligines, quæ excitāt paroxysmos, erūt multæ, fiet antepositio, si materia erit tardi motus, fiet postpositio, si velocis motus, antepositio, si potentia erit fortis, & materia fuliginosa non possit alio modo, quam à calore febrili absumi, antepositio; quare ex iis mihi videtur satis patere, antepositionem, & postpositionem non indicare determinati humoris dominium, quia modo antepositio fiet ob meatus apertos, modo ob oclusos, modo ob potētiz vigorem, modo ob copiam peccantium humorum, & modo ob mordacissimas qualitates irritantes, & postremo fiet quoque antepositio, quia cinis in quem putredo præteriti paroxysmi est resoluta, totus cadat super illum humorem præparatum, qui die sequenti putrescere posset: quæ cum ita sint, sequitur, quod antepositio, & postpositio non possit indicare peccantium humorum dominium.

*Accessio fit longa vel brevis ob quaslibet causas.*

*Et errant, qui ex antepositione accessio-  
nis colligunt  
crudos, & ex  
postpositione  
coctos esse  
humores.*

Insuper maximè errare videntur, qui ex anticipatione paroxysmorum colligunt crudos esse humores, & ex postpositione coctos, agrosque esse in declinatione: Error hic est adeo manifestus, vt nulla esset ineunda disputatione, si cum viris artis medicæ expertis loquerer, sed cum in hoc capite alloquar Tyrones, non g. auabor probare, quod anticipatio paroxysmorum neque materię cruditatem, neque morbi augmentum ostendat, & similiter postpositio neque coctionem, vel morbi declinationem: Ratio in hac re, quæ sensu, & experientia patet, non habet locum; sæpiissime enim videmus paroxysmos anticipare

non



non solum in morbi augmento, & statu, verum etiam in declinatione, quando scilicet materia est cocta, & expulsionem prona arque propensa, quinimmo aliquando contingere solet antepositio illa die, quæ æger morbo omnino leuatur: Præterea est Galen. auctoritas 1. de crisi-  
 bus, manifestissima, ubi dicit, quod anticipatio accessionis non semper arguit incrementum; quid clarius dici potest? Demum ex natura rei colligere possumus anticipationem non insequi cruditatem, quoniam insultus seu accessiones non fiunt immediatè ab humoribus peccantibus, sed ab alitibus acerbis, & mordacibus ob adiapneustiam retentis, qui cum non possint per poros cutis, vel per alias latiores vias diffiliari, necessario omnes corporis partes irritant ad eorum expulsionem, unde nascitur febris, quæ deinceps tamdiu durat, quamdiu dissipantur, in quo motu seruetur principium, augmentum, status, & declinatio: obiter hic reiecitur opinio illa citata à Traliano libro 12. quæ deinde fuit Christofori à Vega, & multorum dicentium febres esse solum naturæ conatus ad expellendas noxias causas, & propterea ob naturæ laborem, & conatum incendi calorem, & nequaquam ob halitus putridos, & perustos ferientes cor, quorum error cognoscitur ex pulsu, & respiratione; ex pulsu, quia in principio accessionis pulsus sunt contracti, habentque systolem maiorem diastole, quia arteria attrahit aerem gratia refrigerandi cor, in fine, quia propelluntur fuligines à corde transmissæ, per vniuersas arterias; diastoles deinde fit maior, quia per diastolem fuligines expelluntur, ergo ex fuliginibus putridis petentibus cor fit febris, & non ex conatu tantum; similiter expiratio, quæ diastoli respondet, maior erit systole, quæ inspirationem respicit. Ad rem igitur redeuntes dicimus accessiones fieri ab halitibus retentis; quare quanto copiosiores erunt halitus, eo citius accessio infestabit cor, quanto prohibita transpiratio fiet maior, eo citius quoque accessio inueheretur, tum, quia colliguntur halitus copiosiores, tum quia magis acres, & mordaces, redduntur: Similiter quanto potentia naturalis erit vegetior, eo citius cor animaduertet accessionem, quo latiores erunt meatus, si copiosæ erunt fuligines, maxima fiet antepositio, quia aura illa putrida ocysus trahet: Demum data paritate loci, si eleuentur fuligines à bile, citius, quam à pituita sola fiunt accessiones, & antepositiones, si à pituita mixta cum bile, citius quam à pituita sola, si à pituita cum melancholia tardius, quam à sola melancholia, nisi locus, ubi resident humores, impediatur, attramen ex antepositione colligere non possumus humores peccantes, quia humorum quantitas vel eadem non seruatur, vel non seruatur qualitas, vel diuersus est locus, quamuis enim quantitas, & qualitas humorum accelerent paroxysmum, non tamen periodorum sunt causa, ut superius ostendimus: Similiter melancholia aliquando redditur adeo effrenis, abique in tam ignitos spiritus, ut multo antè inuadant paroxysmi: Demum ex alio Galeni loco infra citato rationem antepositionis, vel postpositionis colligimus, & nequaquam ab humoribus peccantibus, & est, quia exhalationes, quæ

*Antepositio  
accessionis nõ  
impitarguit  
morbi incre-  
mentum.*

*U. eryas  
Christoforus  
à Vega dicens  
febrim esse  
solum conatu-  
sum naturæ.*

fecerunt præteritum paroxysmum (vt dicit Galenus) in cinerem conuertuntur, quo cinere, si portio illius humoris apti, vt proximè accendatur est respersa, cinis ad instar fermenti adeo redit humores mordaces, vt illico ab illis eleuentur halitus putridi, qui irruunt in cor, & à corde ad ceteras partes, vnde fit antepositio: verum, quia cinere præteriti paroxysmi non semper æquè materia obnoxia putredini est respersa, quia potest contingere, vt cinis parum immoretur super materiam procliuem ad putredinem pro adueniente paroxismo, & euacuetur per vrinam, vel alias partes, & inde difficilius incendatur materia apta putredini, & per consequens cunctetur insultus, & fiat postpositio. Quod vero cinis reddat humores propensos ad putredinem, non vno loco à Galeno declaratur, sicuti 3. prælag. 32. & 2. de differentiis feb. 11. dum dicit; sed si natura illum veluti cinerem humorum  
 „ supramodum adustorum vacuare non anteuerterit, ille rursus in cor-  
 „ pore manens, & concalefactus contrahit propensionem iterum ad  
 „ putredinem, & addit, concepto feruore aliam febrem denuo suscitatur,  
 quare si cinis erit copiosus, cum subeat fermenti vicem in excitandis  
 putridis halitibus, citius fiet putredo, & fiet antepositio, si humores  
 erunt respersi cinere, & cinis non euacuetur, citius quoque ebullitionem,  
 & putredinem excitabit, similiter postpositio fieri potest ex contrariis  
 causis; nullæ ergo erunt consequentiæ, est anticipatio paroxysmi, ergo  
 morbus est in principio, vel augmento, ergo humor est crudus; similiter  
 est postpositio, ergo coctus, ergo declinatio morbi, non valet, quoniam  
 in principio morborum aliquando paroxysmi irruunt postponentes,  
 & aliquando accidit mors, omnibus tamen paroxysmis cum postpositione  
 irruentibus, & aliquando homines illa die febre liberantur, quando  
 maxima sit accessionis antepositio; quare vanissimum erit credere ex  
 postpositione declinationem, & remissionem affectus; & ex antepositione  
 læticiam, & cruditatem affectus colligi posse.

---

*Vt errant, qui ex colore intenso rubro faciei colligunt sanguinis dominium.*

C A P. I X.

**O**STENDIMVS superius ex coloribus eorum, quæ excernuntur, necessario colligi posse peccantium humorum dominium, sicuti ex colore flauo colligimus bilem citrinam, ex viridi porraceam seu prassinam, ex æruginoso æruginosam, & ex nigro melancholiam: Verum, quia colores faciei, & aliarum partium corporis non possunt indicare humorum interiorum dominium, quia dicit Galenus prima aph. com. 2. hac conditione colorem ostendere humores, si in profundo commorantes non differant ab iis, qui sub cute sunt effusi, ideo illos



illos errare credimus, qui ex colore valde rubro faciei colligunt sanguinis dominium: errant primo, quia dato, quod rubor intensus faciei indicet sub cute copiosum sanguinem esse effusum, non tamen valet consequentia, ergo idem est in profundo; quia Galenus loco citato habet hanc sententiam, humores ex colore coniectari, nisi aliqui forte in profundum recesserint: Secundo errant, quia Galenus negat valde rubrum colorem faciei ostendere sanguinis dominium, ut legere est secundo prædictionum 14. dum dicit, quod valde rubrum est, id ad melancholiam idoneum est, ait in epidemiorum secundo, cuius signum mœstitia existit; ecce, quod Galenus vult valde rubrum, si mœstitia præcipue existat, significare melancholiam, dicitque si mœstitia existat quia in parte interna potest esse alter humor, mœstitia non potest à melancholia externa solum gigni, nisi in penitioribus partibus habeat altiore sedem: Experientia tamen docet, rubros in facie ut plurimum esse melancholicos, vel saltem in melancholiam proclives; ab Aristotele, & à natura rei colligere possumus valde rubrum esse melancholicum; ab Aristotele, quia ruber color inter medios colores collocatur, constat igitur ex opaco, & diaphano, ex nigro videlicet, & albo, ex pituita, & melancholia, valde ruber color ex multo opaco nigro, & melancholico humore constabit, quare merito intensè ruber in facie ostendet multum opacum dominari, vel saltem magis opaco, quam diaphano participare; quare nisi erit melancholicus, erit saltem proclivis valde ad melancholiam: Ex natura rei, quia dum tinctores exoptant colorem intensè rubrum non semel tingunt, sed bis, & ter, & donec partes tenetres vberimè adhærescunt.

Nec mihi obiciant colores non intendi ratione quantitatis materię adhærescentis, sed ratione qualitatis, ut optimè docet Galenus primo de humoribus, iis verbis: neque nix potest esse candidior, si infusissetur, neque pix nigrior, vel aurum fulvius, datoque quod fulvius redderetur, illud esset non ratione quantitatis materię, sed ratione qualitatis extensæ in materia, quare intensè rubrum non fiet à maiori quantitate materię, neque infestores valde rubrum facient ex maiore quantitate tincturæ: Respondemus enim cum Galeno ratione qualitatis colores intendi, sed tincturas differre à niue, & pice, quæ sunt similia, tincturæ enim sunt dissimilares, similium enim minima pars perinde ac infinita præ se fert eandem qualitatem, sic dicimus minimam niuis quantitatem tantam albedinem ostendere, ac infinita; proinde, cum in dissimilaribus qualitates sint dispersæ, tinctores toties tingunt, donec qualitas copiose adhærescat, quia in maiori quanto dissimilari, qualitas maior est. Hinc est, quod sanguis, qui sua natura est dissimilari, in maiori opaco erit intensior color: quare concludimus in valde rubro esse copiosius opacum nigrum videlicet terrestre, & melancholicum, quam in rubro minus inter fo, & in pallido; sed cum duplex sit melancholia, sæx sanguinis, sæx sanguinis adusta, & bis flava exuccata, & adusta; dicimus in valde rubro esse

*Quodnam sit melancholia signum.*

*Cur rubri in facie melancholiam significant.*

*Obiect.*

*Sol.*

*Qua melan-  
cholia sit in  
valde rubris*

melancholiam, quæ est fæx sanguinis, cognoscimus verò hanc faciem sanguineam aduri in iis, qui intensum ruborem habent in facie, si in morem, & mœsticiam sunt propensi: Verum, qui exactè cupit scire, quænam humor peccet, & prædominetur, adeat tres propositos fontes, colores scilicet, humores, & periodos: vel syndromem signorum sufficientissimam pro cognoscendis humoribus libro sequenti proponendam.

*Obiect.*

*Experimenta  
ostendentia  
colores non  
prodeire à tri-  
mis qualita-  
tibus.  
Sol.*

Neque iterum obiciant, nos dixisse colores esse signa propria ostendentia peccantes humores, quod manifestè reluctatur Galeno, Aristoteli, & experientiæ: Galeno, quia 3. de sympt. causis cap. 4. dicit colorem aut parum, aut nihil conferre ad cognoscendum temperamentum: Aristoteli, quia secundo de anima non dixit colores oriri ex temperatura, sed ex opaco, & diaphano: experientiæ, quia inveniuntur frigida, quæ sunt nigra, ut opium; & frigida, quæ sunt alba, ut nix, & diaphana, quæ sunt calida, ut stibium, & elementum ignis; & diaphana, quæ sunt frigida, ut camphora, glacies, & crystallum; & alba, quæ sunt frigida, ut nix, & alba, quæ sunt calida, ut calx; quare, qui vellent ex coloribus rerum naturas, & temperaturas colligere; errarent toto cælo. Occurrimus tamè nos non dixisse ex coloribus colligi posse naturam, & temperaturam humorum peccantium, sed existentiam, & per consequens dominium; quod vero signa ostendentia naturam, & signa ostendentia existentiam inter se differant, & nihil habeant commune, declaremus exemplis: an-ne eclipsis est signum, quod terra sit interposita inter solem, & lunam; attamen eclipsis non declarat naturam, & essentiam terræ; Simili modo colores possunt ostendere humores existere, & dominari, quamvis non declarent naturam; quattuor enim sunt dumtaxat humores principales in corpore, quorum unus est ruber, & hic est sanguis, & alij non dantur humores, qui rubrum colorem habeant; alius est flauus, & ex flauo colore necessario inferimus bilem; quia non datur in corpore alius humor flauitiem habens, qui non significet bilem, alius datur color albus, & ex hoc inferimus pituitam; & demum est niger, ex quo melancholiam, ecce igitur, quod signa existentie, & essentie valde differunt.

*Vt errant Oribasius & Montanus, dum à coloribus Lumbricorum volunt dominium peccantium humorum colligere.*

#### C A P. X.

**O**RIBASIVS, & inter recentiores Montanus non solum ab humorum coloribus dominium peccantium humorum indicari et debant, verum etiam à coloribus lumbricorum, quod nullo modo videtur esse admittendum; dicebant igitur rubros Lumbricos sanguinem, flauos bilem, albos pituitam, & nigros melancholiam indicare: Moxque



Moxquæ à lumbricis flauis hauriebant indicationem euacuandi bilem, ex rubris sanguinem, ex albis pituitam, & ex nigris melancholiam, quæ opinio ob plurimas rationes argui potest.

Prima ratio est, quia, si sit mixtura pituitæ cum bile æruginosa, an-  
ne ex omnium medicorum consensu generatur porracea bilis? at sic  
est, quod adueniente porracea statim color pituitæ, & bilis æruginosæ  
destruitur, ergo tanto magis destruetur color bilis, vel alterius hu-  
moris generantis Lumbricos, quoniam plures alterationes præcede-  
re debent generationem insectorum viuentium, quam porraceæ  
bilis.

Prima ratio  
contra Ori-  
basium. &  
Montanum.

Secunda potest ab altioribus principiis desumi, quia apud Aristo-  
telem admitti non potest, quod accidentia corrupti conseruentur in  
genito; est enim definita generatio primo libro de ortu, & interitu  
text. 23. quod sit mutatio totius in totum nullo sensibili remanente,  
quare non solum accidentia corrupti, verum etiam tota substantia  
mutatur, quia illud quod fit, fit ex eo, quod non est, quæ definitio  
æquæ conuenit mistis viuentibus, & non viuentibus: Præterea expe-  
rientia docet, dum homo fit ex semine, semen in aduentu formæ ho-  
minis vnâ cum omnibus suis accidentibus destrui, idemque esse di-  
cendum de plantis, de insectis, & cæteris omnibus viuentibus; & me-  
rito, quod iam destructa substantia, statim destruuntur & cessant om-  
nia accidentia: Nec obiciant colorem rubrum esse accidens com-  
mune, atque accidentia communia in generatione non destrui; quia,  
primo errarent, dum vellent ex communi signo colligere naturam  
specificam, quod reluctatur principiis analyticis. Secundò, quia dicit  
Auerroes, in generatione misti omnia accidentia communia, & pro-  
pria rei corruptæ corrumpi, & cessare, alioquin, si aliquod seruetur  
post destructas misti formas in aduentu nouæ formæ, sequeretur ex  
necessitate, quod præter materiam, & formam daretur aliud inter-  
num principium generationis, quia seruatum accidens non posset in-  
herere primæ materiæ, quæ ex Aristotele 7. meth. tex. 8. non est quid,  
nec quale, nec quantum, nec vllum aliorum generum, quinimmo si  
materia haberet accidens terminatum, per se esset forma, & termina-  
ta, & esset quid: Similiter non posset inherere formæ, quia forma  
in generatione destruitur, ergo daretur tertiam, quod reluctatur Ari-  
stoteli.

Secunda ratio.

Obiect.

sol.

Tertia, si aliquod accidens à forma humorum, qui debent corrumpi,  
& destrui, antequam lumbrici fiant, transierat ad insectum nouiter  
genitum, daretur transmigratio accidentis de subiecto in subiectum,  
quod est omnino impossibile.

Tertia ratio.

Quarta si transierat aliquod accidens determinatum à re corrupta  
ad rem genitam, necessario in generatione duo inconuenientia seque-  
rentur, quorum primum esset, quod in generatione misti perfecti non  
destruerentur omnes formæ componentium, quoniam accidens ter-  
minatum, quod transit, necessario supponere debet propriam for-  
mam; Secundum sequeretur, quod noua forma, quæ gignitur, nun-

Quarta ratio.

quam esset substantia, sed accidens, quia adueniret rei formatæ; hinc Auerroes primo phys. com. 63. probat, quod omne adueniens enti in actu sit accidens, quare si ruber color sanguinis, ante quam hoc infectum fiat, non cessat esse, sed transit à sanguine ad lumbricos, necessario transit cum aliqua forma, quia non datur accidens terminatum, quod à forma non terminetur, quare his positis lumbricorum forma adueniet rei formatæ, & per consequens erit accidens, & non substantia, quod est falsum; nullum enim datur animal viuens, quod saltem duas non habeat formas substantiales, vegetatiuam scilicet, & sensitiuam.

*Obiect.*

Neque obiciant, destrui hominem, attamen seruari cicatricem: Similiter plantas mortuas, exsiccatasque odores suos conseruare, vt de rosis, & de aliis omnibus videmus: Similiter ne dicant de illis lumbricis, qui fiunt à sanguine, sanguinem nimirum destrui, eius tamen colorem conseruari: Respondemus enim cicatricem, odorem rosarum, & cæterarum herbarum non esse accidentia mistorum, vt mista sunt, propterea cicatrix non homine ablato, sed misto corrupto tollitur, similiter de rosis dicendum: similique modo respondemus, quando fit infectum animal, tunc fieri nouum mistum, quia immediatè ab humoribus, qui sunt veluti elementa in animantibus, generantur, quare adueniente forma misti omnia accidentia humorum debent destrui.

*Obiect.*

Neque iterum occurrant, scilicet lumbricos tam prompte fieri, & per tam simplicem alterationem, vt colores humorum generantium vermes non sint adhuc rectè alterati, & mutari: Quia instantia nulla est, quoniam, si in mistura duorum humorum bilis nimirum ærugino-sæ, & pituitæ, illico mutantur colores, & viridis color statim emergit, quantum magis in mistione humorum generantium lumbricos mutabitur color? similiter, si quis vinum nigerimum bibit, an-ne post horam vrina incipit moueri albissima?

*Varia experimen-  
ta, quod  
colores non  
fiant à primis  
qualitatibus.*

Præterea non solum in mistione miscibilia amittere solent colores proprios, verum etiam in iuxtapositione, in qua nulla suboritur alteratio, colores abeunt, & euanescent; liceatque experimentis hæc confirmare, sicque primum, accipiat quoque aqua in qua ebullierint gallæ, quæ est clara, & perspicua, accipiat quoque aqua in qua ebullierit calcanthum, vtramque videbis seorsum claram, & perspicuam, attamen, si vnâ in alteram infundas, illico sine aliqua alteratione maxima cum admiratione videbis fieri colorem nigerimum, similemque atramento scriptorio. Secundum experimentum, accipias aquam rosaceam stillatam per plumbeum alembicum, quæ sit perspicua, & clarissima, accipias deinde aquam communem, & has simul misceas, illico videbis ex illa mistione lacteum nasci colorem; quinimmo ex lacteo hoc colore animaduertimus alembico plumbeo fuisse stillatam rosaceam aquam, etenim cerulæ vis, quæ à plumbo producit addita aqua comuni

*Secundū ex-  
perimentum.  
Modo cognos-  
cenda aquam  
rosaceam sse  
plumbeo ale-  
mbico stillatā*

con-



conspicitur: Tertium experimentum, quod mutantur colores in iuxtapositione sine alteratione, erit, si accipies acetum stillatum lymphidum, & tartarum stillatum, quod erit quoque clarum, si infundes, & miscebis, protinus color suborietur similis lacti, idem observatur, si aqua fontis miscetur cum aqua anisorum stillata: postremò audias experimentum pulcherrimum, ex quo illico cognosces, colores mutari ex sola iuxtapositione sine vlla alteratione; accipias vitrum rubrum, & iuxta ponas cæruleo vitro, protinus videbis ex vitrisque vnitis emergere colorem violaceum: Similiter, si vnies vitrum cæruleum cum luteo, consurget statim viridis color; quare si in iuxtapositione mutantur colores, quanto magis in iis, quæ miscentur, & alterantur, & in generatione insectorum mutari debent, in quibus formæ substantiales nouæ fiunt? Alia quoque sunt experimenta plurima apud Pictores, & Infectores, quæ possent huc afferri, si hic esset locus de his verba faciendi, satis enim est nobis, vt pro comperto habeamus, quod ea, quæ miscentur, & iuxta ponuntur, sine aliqua alteratione primarum qualitarum mutant colorem, & nouum induant, quoniam, hoc supposito, ruit sententia dicentium in Lumbricis ob perexiguam alterationem sanguinem, vel ceteros humores generantes vermes, non amisisse colores proprios: etenim argumentamur experimentis propositis suffulti tali pacto, si ex simplici vnione sine alteratione illico mutantur miscibilium colores, quanto magis in mitione humorum generantium insecta mutari debent? in qua mitione primò introducitur vita plantæ, deinde vita animalis, quod non potest fieri sine maxima alteratione, & mutatione colorum, & substantiæ humorum: Quibus propositis fundamentis incipit clarè patere in omni mitione, & iuxtapositione illico mutari colores, neque in mutatione esse necessarium, vt concurrat aliqua alteratio, sicuti colligere possumus ab experimentis citatis: Similiter patere videtur, colores re vera non pendere à primis qualitatibus, tum quia colores ex miscibilium non alteratorum vnione illico oriuntur, quod non accideret, si colores fierent virtute primarum qualitarum, quoniam primæ qualitates in tempore alterant, & mutant, & nequaquam in instanti, cum quia nulla coloris species indicat primam aliquam qualitatem: etenim si quis diceret, albedinem significare frigiditatem, quia nix est frigida, statim quis obiceret, calcem significare caliditatem, si quis diceret nigredinem significare caliditatem, quia atra bilis est huiusmodi, illico proponi posset opium, quod est nigrum, & frigidissimum, si quis colorem rubrum diceret significare calorem, non deerunt plurima rubra, quæ frigida sunt, & sic de aliis sexcentis, vt nullus color indicet aliquam primarum qualitarum. Quare, si rationibus, & experimentis standum est, dicere non possumus, colores insequi primas qualitates, sed alia sortiti principia, & exordia, quæ sunt illa duo à Perspectiuis rectè expensa, & considerata, scilicet diaphanum, & opacum. Quinimmo ipsemet philosophus videns ab opaco, & diaphano sine alteratione primarum qualitarum fieri colores in definitione coloris proposita li-

*Tertium experimentum.*  
*Quartum experimentum.*  
*Quintum experimentum.*

*Opacum & diaphanum esse colorum principia.*

bro de sens. & sensu. 3. non per primas qualitates eos definit, sed per diaphanum, & opacum, dicens, color est extremitas perspicui in corpore terminato: ecce quod Aristoteles in hac definitione vniuersali vult omnium colorum principia esse perspicuum seu diaphanum, quod idem est, & corpus terminatum, quod est opacum habens perspicuitatem non penetrantem; neque poterat diuinus philosophus alia principia adinuenire quæ omnium colorum essent prima, & immediata, quam illa duo proposita, quoniam posito, quod perspicuum terminetur à diaphano, statim perspicuum in colorem migrat, & varij confurgunt colores, prout diaphanum illuminatum variis modis terminatur ab opaco: arbitror, plurimos peripateticos in colorum essentia perquirentia à veritate desistere, quia pace multorum non intelligunt quid sit diaphanum, & quid opacum: quibus ignoratis colorum principis non est mirum, si dicant essentiam colorum pendere à primis qualitatibus. Albertus dicit diaphanum siue perspicuum à raritate corporis constitui; opacum à densitate: Iacobus Zabarella libro 1. de visu cap. 3. à corpore tenui fieri diaphanum, habet enim hæc verba, perspicuum quatenus est medium deferens colores ad visum à duobus his partibus constitui, à corpore tenui tamquam à materia, & à lumine tamquam à forma; quorum excellentium, viorum sententiæ manifestissimè reluctantur experimentis; quis enim non videt cristallum, & adamantem esse densissima, & non rara, & tenuia, attamen esse transparentia, & diaphana, quinimmo si cristallum, vel adamans in tenuissimum puluerem redegeris, an-ne cristalli, seu adamantis substantia facta puluis tenuissimus erit rarior, & tenuior? ergo (si vera esset sententia Alberti, vel Zabarellæ, quod scilicet diaphanum constituatur à raritate, vel tenuitate materiæ) puluis cristalli esset transparentior, quod sensui aduersatur: Præterea aqua transparens, & splendida, si eo vsque agiteretur quousque spumescat, non-ne fit rarior? attamen perspicuitatem amittit: adhuc fumus est rarissimus, attamen est opacus, quare nec raritas, vel tenuitas corporum constituent diaphanum; neque densitas, & crassities opacum: Vera igitur est sententia Perspectiuorum, quod illud sit diaphanum, quod nullas, vel paucas habet superficies, vbi enim multæ sunt superficies, lumen in qualibet refrangitur, & refractum amittit vim penetrandi, hinc est quod per cristalli puluerem ob multitudinem, & varietatem superficialium granorum, radij toties refringantur, vt nihil eorum penetrare possit, & inde fiat opacum: Similiter diuina aqua agitata spumescit, ob spumam variæ sunt superficies, vnde lumen non amplius tranat; hinc est, quod cum nodum asseris pauliores habeat superficies, quam asser, nodus quamuis densior, sit tamen peruius, & transparentior: Similiter qui volunt speculari reddere perspicua, eo vsque perficant, donec ad vnicam certam superficiem reddant cristallum; itidem lapides terri, & optime dedolati, & læuigati diaphanum quid tenere videntur, quia artifices ob iugem confractionem inæqualitates auferunt, & ad pauciores superficies reddunt, vnde lumen parum refran-

*Error Alberti. & Zabarellæ de natura diaphani.*

*Experimenta ostendentia diaphanum non fieri à raritate, vel tenuitate materiæ.*

*Quid sit diaphanum secundum perspectiuos.*



refrangitur, & potentius tranat; quinimmo, si lapidum innumerabiles internæ superficies possent confricari, & ad pauciores reduci, possent componi lapides transparentes, sicuti vitra, quæ re vera dum funduntur repurgantur, & aliena substantia demitur, quæ plures superficies faciebat, dempta igitur aliena substantia à vitro. deinde fit splendidus, quia ad pauciores redactum est superficies: Quocirca si colores sunt extremitates perspicui in corpore terminato, & totum suum esse prodeant ab opaco, & perspicuo, & opacum non fiat à crassitie, & densitate, sed ab innumerabilibus superficiibus, in quibus refranguntur radij, donec penetrandi facultatem amittant, & diaphanum, vel transparens corpus sit peruium hac de causa, quia radij, vel nihil, vel parum refranguntur ob paucas superficies: nemo dicere poterit colores indicare primas qualitates, indicare temperaturas, & tandem prodire à primis qualitatibus, quia si ab illis prodirent, illas quoque indicarent: Similiter, qui rationibus, & experimentis philosophantur, non poterunt defendere cum Auerroe 2. de anima, & cæteris Peripateticis dari colores, qui habeant suum esse, antequam adueniat lumen, quoniam si color ut color recipit hanc definitionem (ut dicit Aristoteles) quod sit extremitas perspicui in corpore terminato, & non detur perspicuum, vel diaphanum, quod idem est, nisi lumen aliquod transeat, refrangaturque ab opaco, numquid non esset ridiculum dicere absente lumine aliquod esse perspicuum? quare si perspicuum ingreditur definitionem coloris, ut color est; in obscuro, & sine lumine colores nullum esse, nullamque quidditatem habebunt; erit igitur vera sententia illorum, qui dicunt ex diaphano illuminato, & terminato ab opaco oriri colores, sicut Auerpaces ex Auerroe citatus 2. de anima, & Alhazen optime sentiunt, dicunt enim quod colores sunt lumina vario modo refracta, & colores nullum esse in tenebris habere, & omnes esse huiusmodi, quia vnicus effectus ab vnica tantum causa prodit, quando vnica definitione traditur: dicendum igitur est cæruleum colorem lapidis lazuli, & cæruleum Iridis ab eadem causa prodire, idemque de aliis coloribus: sed quia de hac re hic non est locus, vterius non prouehar, ne in alienas menses videat ponere falces, satis mihi sit in hoc capite ostendisse, quod illi, qui dicunt colores lumbricorum ostendere dominium humorum, reluctentur experientia; & Aristotelis fundamentis, dum tradit, quæ ad naturam generationis pertinent, & demum naturæ propriæ coloris declarata.

*Cur colores non fiant à primis qualitatibus.*

*Errat Auerro. dum dicit dari colores antequam adueniat lumen.*

*Quid sit color.*

*Vi errant, qui reijciunt Oribasium, & Montanum dicentes  
ex bile, & melancholia gigni posse  
lumbricos.*

## C A P. X I.

*Argumentū  
Mercurialis,  
contra Ori-  
basium.*

**Q**UAMVIS superius diximus colorem flauum lumbricorum non indicare bilem, nec nigrum melancholiam; nihilominus credimus cum Oribasio 3. aphorismorum 30. & Montano, lumbricos fieri posse à bile, à melancholia, & à cæteris corporis excrementis: quia, quando Aristoteles 5. de generatione animalium cap. 19. loquens de iis, quæ oriuntur à putredine dicit, aliqua ex animalium excrementis oriri, atque hæc ipsa in iudicet seu lumbricos esse, loquitur absolūtè, de omnibus scilicet excrementis, non magis intelligendo de pituita, quam de aliis, quamuis natura proprius à pituita, quam à bile, & melancholia vermes educat: Qui igitur reijciunt Oribasium, inter quos quoque fuit doctissimus Mercurialis, vtuntur tali argumento, si insecta fierent ex bile, & melancholia, sequeretur, quod bile, & melancholia possent nutriri iuxta Aristotelem 2. de gen. text. 50. dicentem, omnia nutriri ex eisdem, ex quibus sunt, at illis ob amaritiam, & acrimoniam non possunt nutriri, ergo illis quoque non poterunt constare: roborat argumentum auctoritate Galen. 4. de simp. med. fac. vbi scribit, in mari mortuo, in quod flumen Iordanis recipitur, nullum animal generari, vel conseruari propter bitumen, quo aqua illa redditur amarissima: Confirmant quoque, quia Paulus Ægineta libro 4. cap. 27 dicit, hæc insecta non posse gigni ex humoribus vllis calidis: addunt ex Galeno 3. aphorismorum 26. lumbricos fieri ex humoribus crudis, quare inferunt ex bile, & melancholia vermes non fieri.

*Vi reijciunt  
Mercurialis  
argumentū.*

Quo ad argumentum admittimus Aristotelis sententiam citatam 2. de gen. text. 50. asserimus tamen in omni humore putrido, & amaro aliquid dulcis inueniri, quo fieri, & nutriri possent vermes, quoniam omnis humor putridus duo habet, humorem coctum, qui est causa materialis, & spiritus acres, & fermento similes, à quibus vt à causa efficiente, totus humor coquitur, & fit dulcis, & suauis, & ex quo immediate, vt à causa materiali generatur animal: Hinc solertissimus philosophus 3. de gen. anim. c. 11. loquens de iis, quæ fiunt ex putri dicit, cum enim dulce in principium constituendum seceratur, & quod superest talem accipit formam, nihil autem gignitur putrescens, sed concoctum, putredo verò, & putridum rei concoctæ est excrementum, quare materia proxima vermium, vel eorum, quæ generantur ex putri non est putrida, quia fiunt ex eo, quod coctum est, & quod est dulce; quæ cum ita sint, dicere quoque possumus ex bile, vel melancholia putrescente fieri posse lumbricos, quando ab iis humoribus seceratur aliquid dulcis apti generationi, & nutritioni vermium.

Dum



Dum dicunt, de mari mortuo, quod ob amaritiam non generentur animalia: Respondemus, ibi non gigni animalia ex putredine, quoniam bitumen reluctatur putredini, namque sine putredine non potest crudum coqui, & reddi dulce, & aptum generationi, & nutritioni: Dum roborant sententiam auctoritate Galen. dicentis ex crudis humoribus gigni vermes, & Pauli Aeginetæ, quod ex calidis non fiant vermes, nobis non reluctantur, quoniam omnia concedimus, scilicet ex crudis humoribus fieri vermes, quatenus putrescunt, & ex calidis non fieri, quia causa materialis animalium generatorum ex putri est suavissimum, dulcissimum, & temperatissimum, causa verò efficiens est calida, & acerrima; dum Paulus Aegineta dixit ex calidis non fieri, intellexit de causa materiali, non de efficiente, quia Galen. 3. aphor. 26. clarissimè dicit ad generandos vermes putredinem, & plurimum calorem requiri.

Confirmatur experimentis Alchimiatarum, quod in omni re amarissima, salissima, & bituminosa fit aliquid dulcis, quoniam per sublimationem à calidis omnibus, ut à sale, ab aromatis virtute ignis aliquid dulcis colligere possunt, quod est naturæ amicum, ex quo animalia, quæ ex putri fiunt gigni, & nutriri possunt; quare quanto magis à biliosis, & melancholicis humoribus putrescentibus natura virtute plurimi caloris seliger dulce, & amicum animantibus; quæ gubernantur facultatibus, quæ attrahunt dulce & expellunt amarum, ut hinc in mari generentur pisces dulcissimæ carnis, quia facultates naturales attrahunt, quod est dulce, & expellunt amarum, quod est naturæ animantium inimicum.

*Confirmatur  
experimentis  
in omni a-  
maro esse ali-  
quid dulcis.*

Hinc obiter animaduerti potest illorum error, dum pro necandis lumbricis utuntur odore Theriacæ, vel leuissimis quibusdam remediis, quæ diminutam habent virtutem necandi, illosque occidendi, quoniam vermes sua expultrice facultate leuia amara, & alia leuiora expellunt; hoc enim obseruamus, dum pueri tentantur lumbricis, & diarrhæa biliosissima, bilis enim sua natura amara eos non occidit, quare nisi in lumbricis necandis ad valida præsidia confugiamus, ut ad aloem non loram, vel ad mercurij scrupulum cum aloes, & terebentinæ pauxillod pillulæ perexiguæ formam recepti, nihil fit.

*Ut errât, qui  
leuissimis re-  
medijs utun-  
tur pro lum-  
bricis necan-  
dis.*

*Potentissima  
remedia pro  
necandis lum-  
bricis.*

Præterea vellem, ut mihi diceret aduersarius, cur lumbrici, sicut dicit Hippocrates 3. aphorismorum 26. in lactentibus pueris non generantur? Si Galeno credendum est, dicit in com. quod sola hæc putredo in pueris non est sufficiens ad generandum, sed & calore plurimo indiget, ecce quod, quæ plurimum habent calorem, ut bilis, & melancholia, non possunt impedire, quin lumbrici, & ascarides ab ea generentur: causa vero, cur in lactentibus non gignantur vermes, est lactis maxima dulcedo, quæ adeo obtundit acrimoniam putredinis, ut non possit educere de potentia ad actum lumbricos. Hinc est, quod pueri, qui pubertati sunt proximi, præcipuè lumbricis tentantur, incipit enim calor ex humido putrefacto gignere vermes, si dulcia, ut jac, carnes multas, & alia humida ædulia comedunt, & præcipuè si

*Cur in lacten-  
tibus non gene-  
rantur ver-  
mes.*

*Ex pane al-  
bissimo lum-  
bricos facile  
gigni.*

*Ut errat qui-  
dam dicens  
ex omni dul-  
ci gigni ver-  
mes.*

soliti sunt comedere panem triticeum albissimum; dicit enim Gale-  
nus de morb. vulg. com. 7. text. 7. Lumbricos ab hoc pane fieri; pro-  
pterea panis laudatur, qui cum pauco fufure est confectus, quo-  
niam hic abstergit, & occasionem gignendi lumbricos aufert; quin-  
immo omnia deterforia, quamuis sint dulcia, vermibus erunt inimi-  
ca: Hic non possum committere, quin reliciam erratum cuiusdam  
nostratis, qui mihi præscribenti decoctum ficuum pro puero variolis  
affecto, ut materiam truderem ad cutim remedium exprobrauit, di-  
cens dulcia gignere lumbricos, credens omnia dulcia gignere posse  
vermes, quod est à ratione alienum, quoniam dulcia deterforia, ut  
sunt ficci, cassia, liquiritia, & alia id genus, quæ incidendi & detergen-  
di virtutem habent potius prohibent, ne gignantur, dulcia verò apta  
generationi lumbricorum sunt alterius generis, ut butirum, lac, car-  
nes, fructus, panis albus, quæ omnia vim incidendi, & abstergen-  
di non habent: hinc Galen. 7. in 6. de morb. vulg. tex. 7. dicit à legu-  
minibus, & ab oleis, & à crudo succo debent pueri abstinere; quia  
hæc apta sunt generationi lumbricorum.

*Ut errant, qui ex lingua agrotantium semper profitentur colligere  
prædominantes humores.*

## CAPUT XII.


**N**ON desunt Medici credentes ex aliis fontibus, & præcipuè ex  
lingua agrotantium colligi posse peccantium humorum domi-  
nium, eò magis, cum Galenus quinto in 6. de morb. vulg. text. 14. de  
lingua habeat hæc verba: linguam non secus quam urinam indicare,  
quænam sit affectio in humoribus: cui difficultati occurrimus, quia,  
quæ ex lingua certò colliguntur prodeunt à sapore humorum linguæ  
hærentium, vel à colore humorum linguam tingentium, quæ, si lin-  
gua ex aliis causis maculatur, & alteratur, dicimus nos ex signis lin-  
guæ non posse semper aliquid certi colligere de internis humoribus  
prædominantibus: Hinc, qui inferunt hanc consequentiam, lingua  
est aspera, nigra, & sicca, ergo humores peccantes sunt calidi, & fer-  
uentes, valde errant, quia consequentia non est de omni & per se, cum  
multi sint, qui habeant glabram, & siccam linguam non ob bilem pec-  
cantem, sed ob alias causas; etenim non vno in loco à Galeno, &  
Hippocrate relatum est, linguas asperas, & siccas reddi in illis, qui te-  
nent os apertum, quia aer absorbit linguæ madorem, similiter asperam  
reddi, dum catarrhus stillat à capite, & hæret linguæ; ad hæc aliquan-  
do nos videre in hypocondriacis sine febre linguam reddi adeo aspe-  
ram, & siccam, ut corij specimen æmulari videatur, & demum talem  
reddi ob immoderatam caliditatem peccantium humorum; quare  
dum volumus accuratè constituere aliquod decretum, & rectissimè  
examinare, & philosophari, nisi id ope logicæ fiat, necessario confuse  
agimus:

*Ut errat, qui  
ex glabra lin-  
gua inferunt  
feruentes hu-  
mores.*



agimus: pro qua re audias Galenum 1. de elementis, neminem vn-  
quam posse decretum aliquod accuratè constituere absque ope ipsius  
logicæ disciplinæ, quocirca licet Galenus dixerit linguam non secus,  
ac vrinam indicare humorum affectionem; nihilominus est distin-  
guendum, quando vrina ostendit affectionem humorum, & quando  
non ostendit, & quando lingua sit læsa, quia os fuerit apertum, vel ob  
alias causas; proponendæque sunt omnes causæ illius effectus, & eli-  
gende, quæ sunt per se, alioquin in tam prolixo Galeni colloquio tot  
verba, & sententias possemus inuenire, vt iis sine methodo logica ac-  
ceptis, omnem inanitatem defendere possemus; quinimmo nulla ef-  
fer tam mala opinio, quæ non posset aliqua apparente Galeni auctori-  
tate defendi, & roborari. Sed redeamus vnde digressi sumus scilicet  
ad linguam glabram, asperam, nigram, & siccam, ostendamusque non  
supponere in humoribus summum ardorem, audias Auicennam lib. 1.  
de hac re loquentem, & quandoque denigratur lingua ex duritie  
splenis, quæ durities aliquando est cum febre; aliquando sine febre,  
ergo non semper nigra lingua, glabra, & sicca ostendet humores æru-  
ginosos, & feruentissimos: Præterea Auicennas libro 1. sen. 1. doct. 3.  
cap. 3. dicit, cognoscere ex colore linguæ complectionem stomachi, &  
intestinatorum, est difficile, quare si est difficile ex colore linguæ cogno-  
scere quæ sunt in ventriculo, quanto difficilius erit cognoscere hu-  
mores peccantes in venis, & in aliis partibus? Ex traditis ergo patet nos *Epilogus.*  
posse ex saporibus tamquam ex signis propriis colligere humores pec-  
cantes: deinde ex coloribus, sed non partium affectarum, sed excreto-  
rum, & demum ex periodis colligere, quinam sint humores peccan-  
tes, & prædominantes in humanis corporibus: patet similiter nos non  
semper ex vrina certa, & infallibili scientia posse perquirere peccantes  
humores neque ex pulsibus, nisi per coniecturam, & per accidens, &  
demum ostendimus solum ex coloribus excretorum humorum, &  
nequaquam partium affectarum, & lumbricorum nos ad cognitio-  
nem humorum peruenire, & de natura colorum secundum senten-  
tias Opticorum peregrinus, vt nonnullorum errata clariora, & paten-  
tiora fierent, & methodus melius eluceret.

## Finis Quinti Libri.



# SANCTORII

## SANCTORII

Iustinopolitani

### METHODI VITANDORVM

*errorum in Humoribus peccantibus per  
signorum communium syndromem  
perquirendis.*

#### LIBER SEXTVS.

*Declaratur præstantissima illa Methodus, quæ per syndromem  
signorum communium conuertibilem aperit  
latentem humores peccantes.*

#### CAPVT I.



STENDIMVS superius nullam viam dari, quæ melius perquiri possint famosæ peccantium humorum differentia, quam illa, quæ progreditur per signa consequentia, quæ sunt conuertibilia: verum, quia horum signorum aliqua sunt propria, de quibus in superiori libro actum est: aliqua verò communia, sed per syndromem collecta, quousque conuertantur, declarantque humores in imis corporis partibus existentes: propterea in hoc libro de hac syndrome signorum communium pro virili nostro agere conabimur. Occasio verò huius inquisitionis est, quia, dum humores insident penitissimas corporis partes, nos re vera non possumus semper per sapes, vel colores eos cognoscere, quinimmo neque per periodos, quoniam acci-  
dere

*Cuz periodi  
non possint  
semper obser-  
uari.*



dere potest, vt periodi occultentur, vel ob diuersam humorum mixturam, & farraginem, vel quia à medicis, qui perpetuò non assistunt ægrotantibus, non possint animaduerti: Quocirca, cum propria aliquando maneant adumbrata, & quodammodo caligine obuallata, expedit aliquam Methodum perquirere, quæ omni tempore, & in omni ægrotante possit nos docere occultos humores peccantes: Hæc Methodus erit, quam philosophus 2. post. circa finem docet, scilicet quo pacto ex syndrome signorum communium aliquod immanifestum, & carens proprio signo, cognoscatur: hæcque est illa, qua vtitur quoque Galenus in arte Medicinali, dum per syndromem multorum signorum communium perquirat viscerum temperaturas, hæcque nos æmulantes diuinos viros in 1. libro ad cognoscendas affectuum occultas ideas, vti fuimus, & in hoc loco vtemur ad cognoscendos inter nos humores prædominantes.

Verum, cum signa cuiuslibet rei sint propemodum infinita, illa tantum, cæteris omnibus prætermisissis, hanc demonstratiuam syndromem ingredi debent, quæ ex antecedentibus, & consequentibus necessariis colligi possunt; quia hæc solum vicem propriorum subeunt, & certissimam cognitionem humorum peccantium afferre possunt: antecedentia verò necessaria, quæ habent hanc prærogatiuam docendi occultos humores, sunt haurienda à duobus fontibus, qui necesse ario antecedunt generationem humorum; consequentia verò à quatuor, per hypothesein, an-ne humores, antequam æruginem, vel porraceum colorem acquirant, fiunt tales à visceribus tali modo dispositis: an-ne quoque viscera disponuntur ab usu rerum non naturalium: Quod cum ita vera sit, sequitur, quod omnia antecedentia ad duos fontes reducantur: vt primus comprehendat omnes res non naturales disponentes viscera: Secundus verò omnes viscerum dispositiones, quarum merito gignuntur humores peccantes; at quia genitihumoribus peccantibus ab iis antecedentibus, & externis causis procacitatibus necessario consurgunt morbi, & à morbis prodeunt symptomata, quapropter dicimus tertium fontem signorum esse à morbis colligendum: quartum à symptomatibus, quia morbi, & symptomata necessario insequuntur suas causas. At quoniam humores peccantes, pro vt in diuersis resident partibus, varios efficiunt morbos, & varia symptomata pro diuersitate locorum affectorum, propterea oritur quintus fons, qui est de locis affectis; bilis enim si est in corde facit syncopem, eadem si in cerebro, phrenesim; si in venis, ardentem febrem si extra venas, intermittentem; si in pulmone, peripneumoniam; si in toto, facit morbum regium, si in parte, erysipelas. Melancholia si est in corde facit palpitationem, si in corporis superficie impetigines, & phagædenas; si in toto melancholia adusta redundat, excitatur elephanticus affectus, si in parte, cancer; audiasque de hac re Galenum 3. de sympt. causis cap. 2. amara bilis si peccat in toto facit morbum regium, si in parte erysipelata, si melancholia adusta redundat in toto, elephantiasim, si in parte, cancerum facit. Si-

*Signa humorum communium, quæ vicem propriorum subire possint à quibus fontibus hauriantur.*

militer pituita in capite existens apoplexiam facere potest; eadem in pectore asthma, & sic de aliis infinitis dici posset affectibus, quippe ob partium affectarum varietatem varij atque diuersi fiunt ad instar Prothei, qui semper idem manens, varijs atque diuersis formis indutus, varius, & multiplex esse videtur: Postremò nos ex iuuantibus, & lædentibus necessario aliquando colligimus peccantes humores, quia, si iuuant calida, inferimus humores peccantes fuisse frigidos, & versa vice. Patet ergo sex esse fontes signorum communium necessarios, sed vt sciamus fructus, & vtilitates, quæ colligi possint ex iis fontibus, singillatim omnes sunt examinandi.

*Quæ inen-  
tur in primo  
fonte pro co-  
gnoscentis  
humoribus  
peccantibus.*

Primus fons continebit omnes res non naturales, quæ omnes à Galeno 5. de tuenda sanitate. cap. 10. ad quattuor capita referuntur, dicique primum continere omnia, quæ assumuntur. Secundum, quæ fiunt animo, vel corpore. Tertium, quæ excernuntur, & retinentur. Quartum, quæ foris adhibentur. In quibus capitibus (vt alibi ostendimus) plura continentur, quam in illis sex rebus non naturalibus in scholis citatis. Vt igitur aliquem fructum ex hoc primo fonte colligamus, expedit philosophari, & videre quæ res non naturales viscera ad calidorum, & quæ ad frigidorum humorum generationem disponant. Sed, quia à Galeno hæc omnia colligi possunt, ad illum confugiamus, & in eius auctoritate conquiescamus: dicit igitur libro de causis morborum. cap. 2. loquendo de causis caloris, quod omnes causæ caloris ad quinque, & non plura capita reducuntur, scilicet ad motum, ad vicinitatem corporis calidi, ad alimentum, ad putredinem, & denique ad stipationem: statim loquentes de procatarteticis calidis colligimus tria ex iis pertinere ad res non naturales disponentes corpora ad bilem, motum nimirum, vicinitatem, & alimentum, quia stipatio, & putredo ad affectus præter naturam pertinent: Ex iis inferimus, si causa non naturales efficere debent humores calidos, nullo alio modo posse operari, nisi motu, vel vicinitate corporis calidi, vel alimento, quia Galenus alios calefaciendi modos inuenire non potuit; ad hæc tria igitur omnes res non naturales disponentes viscera ad generandos humores biliosos, & adustos reducuntur: Ad motum referuntur vigilæ, coitus, exercitia, & omnes passionēs animi, dicimus, quod omnes animi passionēs calefaciunt, ne credant solum iram suscitare, & intendere calorem, quia Galenus multis in locis testatur, non solum iram ratione motus calfacere, verum etiam mærorem, & mæsticiam, & præcipuè 1. de differentiis feb. cap. 3. dum habet

*Quæ res non  
naturales  
motu  
calefaciant.*

- hæc verba, ob iram aliquando calefit spiritus, & aliquando sanguinis
- substantia, vnde oritur febris, dicimus igitur hanc febrem ab ira fa-
- etiam habere originem à motu, arque feruore naturæ caliditatis; Quæ
- autem ex tristitia fit, ex solo motu, non autem ex feruore generatur, ecce igitur, quod omnes animi passionēs calefaciunt ob motum spirituum, quia vel concentrantur, vel feruescunt, vel cum impetu diffunduntur. Ad vicinitatem, vel adhæsum (quod idem est) corporis calidi reducuntur acris, vnguenta, & omnia externa, quæ habent virtu-



tem calefaciendi. Ad alimentum vero cibus, & potus.

Similiter ex Galeno cap. 3. de causis morb. colligimus, quibus, & *Qua res non*  
 quot modis res non naturales disponent corpora ad generationem *naturales di-*  
 humorum frigidorum: refertque sex esse causas extinctionis caloris, *spontans cor-*  
 adhæsum rerum frigidarum, alimentum, stipationem, rarefactionem, *pora ad gene-*  
 ocium, & motum immodicum: ex quibus eligimus quattuor, quæ *rationem hu-*  
 pertinent ad res non naturales disponentes viscera, vt generent hu- *morum frigi-*  
 mores frigidos, adhæsum nimirum, alimentum, quietem, & motum  
 immodicum; stipatio enim, & rarefactio ad constitutiones præter  
 naturam pertinent. Ad rei frigida adhæsum aer, aqua, vnguenta, frigi-  
 da, & alia topica id genus innumerabilia reducuntur. Ad alimentum  
 cibus frigidus, aqua potio, & cibi quantitas nimia; ad quietem, ni- *Abstinentia*  
 mius somnus, & ocium, nimiaque coitus abstinencia, quæ (vt obiter *coitus indu-*  
 hoc quoque dicamus) ex Galeno 6. de loc. aff. 5. præter alia mala in- *cit tororem,*  
 ducit torporem, & reddit coctionem diminutam. Ad motum immo- *& coctionem*  
 dicum referri possunt nimius coitus, nimia vigilæ, nimium exercitiū, *diminutam.*  
 & immoderate animi passiones, quæ omnia immoderata non per se,  
 sed per accidens refrigerant, quatenus scilicet resoluunt calorem, quo  
 resolutio, necessario frigidi gignuntur humores. Ex iis ergo collige-  
 mus modos, quibus res non naturales disponunt corpora ad genera-  
 tionem peccantium humorum, esse quattuor tantum, suntque adhæ-  
 sus; motus; alimentum; & qui s.

Sed, vt ex hoc fonte colligamus aliquem fructum in cognoscen- *Singularis*  
 dis peccantibus humoribus semper est distinctio hæc animaduerten- *distinctio ad-*  
 da, & ante oculos proponenda, an scilicet res non naturalis operetur *uertenda in*  
 per se, vel per accidens, & ratio est, quia motus, adhæsus, & alimen- *cognoscendis*  
 tum per se disponunt corpora ad generationem humorum calidorum, *procatartica-*  
 per accidens verò ad generationem frigidorum; etenim videmus per *cis.*  
 experientiam, nimium motum resoluere calorem, & inde viscera eo  
 priuata humores frigidos gignere: Similiter videmus adhæsum cali-  
 dissimum resoluere, & resolutio calore, frigidos à visceribus fieri hu-  
 mores: ad eundem modum videmus alimenta calidissima, qualia sunt  
 aromatis confecta, & vina potentissima, si calorem resoluunt affe-  
 ctus efficere frigidos, vel si nimia quantitate hauriantur, suffocare, & in-  
 de paralytici, & sexcentos frigidos affe-  
 ctus molliri posse. Ingruit igitur  
 necessitas, si volumus aliquod signum à rebus non naturalibus  
 colligere, quod vnitum cum aliis possit indicare humorum domi-  
 nium, vt nos examinemus prius, an dispositio viscerum sit introducta  
 à motu, vel ab alimento, vel ab adhæsu per se, vel per accidens; quia  
 hoc non præcognito esset impossibile aliquid certi ex hoc fonte colligere:  
 Demum est quies, vel ocium, quod si nimium est, semper suffocat,  
 & per consequens ad frigidos humores generandos corpus disponit.  
 Si verò quies est moderata per se iuuat, & disponit viscera potius  
 ad calidos, sed temperatos humores. Isti igitur sunt modi quibus ex-  
 terna procatartica agunt, quæ si, vt posuimus, considerabuntur, illa  
 ab hoc fonte colligemus signa, quæ cum aliis ab aliis fontibus hau-

*Exemplum  
admonens  
quando per  
se & quando  
per accidens  
aliqua, ut ope-  
ratur.*

riendis coniuncta necessario aperire poterunt humores peccantes alioquin occultos. Afferatur exemplum, præcessit aer æstiuus, quod signum pertinet ad adhæsum corporis calidi, tunc illico expendere opus est, an illa aeris caliditas fuerit talis, quæ potuerit resolvere, nec ne, quia ex resolutione caloris viscerum colligemus frigidos, ex colore non resoluti calidos. Idem examen faciendum est in iis, quæ pertinent ad motum, scilicet an coitus, animi passionēs, vigiliæ, exercitium fuerint in excessu, quoniam ad frigidos tunc disponent viscera. Similiter quæ ad alimentum, an fuerit calidum in excessu, vel copiosissimum, quia calidum in excessu resoluit, copiosissimum suffocat: omnia enim capita sunt examinanda, quia quanto ex vno fonte plura haurientur signa idem ostendentia, tanto magis demonstratiuam syndromem colligemus.

*Signa, quæ in  
secundo fonte  
continentur  
pro cognos-  
cendis humo-  
ribus peccan-  
tibus.*

Secundus fons continebit omnes patientis corporis dispositiones sine quibus, ut optimè dicit Galenus lib. de causis morb. cap. 2. nec gladius abscindere, nec ignis comburere posset, de quo vberimè egimus lib. 1. cap. 21. diximusque nullam esse causam non naturalem, quæ tantum possit, ut sine dispositione subiecti suam intromittat ideam: res quoque experimentis redditur manifestissima, quia sæpè vidimus in ætate aliquos repleti vino maluatico, attamen calore non vexari, aliquosque ob maluatici ciathum in ardentissimas febres prolabi, caloreque exuri, & tandem è viuis decedere: quare præstat, ut lectores promptè dispositiones corporum sanorum præsciant, quia illis animaduersis facilè poterunt cognoscere non solum quibus humoribus premantur egrotantes, verum etiam in quas humorum proluuiēs corpora sanorum hominum sint prona atque propensa. Signa igitur erunt desumenda in hoc fonte, vel ab antecedentibus, vel à consequentibus.

*Quæ sint an-  
tecedentes di-  
spositiones  
corporum.*

Antecedentium dispositionum quinque constituuntur capita in quæ illico oculos conicere debemus. Primum caput continebit dispositiones hæreditarias, quare in examine dispositionum viscerum ægrotantium primo est considerandum à quibus parentibus æger ortus sit, quoniam si parentes fuerint biliosi (nisi aliquod signum ægrotantis ab aliis fontibus depromptum obstiterit) dicemus in filio peccare bilem. In secundo capite expendemus ætatem, dicimus enim, senes esse refertos frigidis humoribus, iuuenes calidis. In tertio considerandum est, an æger sit debilis, vel fortis, quoniam ex debili pituitosos & crassos, ex forti calidos, & tenues humores colligemus. In quarto expendimus corporis proprium habitum, an sit macilentus, & gracilis, quia inde calidos, & an sit obæsus, quia inde frigidos humores dominari dicemus. In quinto & vltimo, quod est summi momenti, inquirimus, an sit intermissa aliqua euacuatio, quia si fuerit intermissa bilis, colligemus bilem peccare, si melancholia, quæ per secesum, vel hæmorrhoidas euacuabatur, erit suppressa, melancholiam, si pituita, pituitam dominari iudicabimus. Hæc sunt quinque loca seu capita.



capita ante oculos obucienda, quæ valdè conferre poterunt ad cognoscendas viscerum dispositiones.

Subsequentes verò dispositiones, vel dispositionum subsequencia <sup>Quæ sint subsequencia signa ostendentia dispositionem corporis.</sup> signa in quatuor capita diuiduntur generalissima, quoniam dispositionum signa colliguntur ab actionibus animalibus, vel vitalibus, vel naturalibus, vel ab excrementis. Quantum attinet ad actiones animales, si æger sua natura est vigil, mutabilis in sententia, ingenio celeri, in motu agilis, inedia deditus, & sæpè in somniis ei arma, vel alia iram mouentia occurrant, erit biliosus. Si verò erit discursu tardus, attamen in re apprehensa firmus, somnumque habeat longum, non facile fitiat, neque abhorreat cibum, cibus tamen sit molestus, dum à somno excitatur, indicabitur pituitæ dominium. Si verò erit ingeniosus, astutus, & cautus, melancholia dominabitur.

Quantum attinet ad actiones vitales, si pulsus erunt sua natura veloces, hique in venerem sint furiosi, sed <sup>mutati in iracundiam</sup> bilis prædominabitur, si vero pulsus sunt tardi, & molles, pituitam colligemus. Quoad naturales functiones pertinet, si cibus in ventre numquam est molestus, signum est bilis, contrarium dicimus indicare pituitam: Ab excrementis quoque plurima signa colligimus in cognoscendis viscerum dispositionibus. Hinc dicimus, si homines carent sua natura salua, vel in auribus excrementa citrina colligant, indicari bilem, & contrarium ostendere pituitam: verum paulo infra, dum de quolibet humore peccante agemus, declarabimus differentias humorum, & hauriemus à propriis fontibus signa magis particularia, quæ firmiorem adhuc præstabunt cognitionem.

Tertius fons continet morbos, à quibus sæpissimè humorem peccantem cognoscimus, quod exemplis variis declaratur: an-ne à quartana humorem melancholicum dominati colligimus? à tertiana biliosum? à quotidiana pituitosum? an-ne erysipelas, & phrenesis ostendunt bilem peccare? hydropisis pituitam? & sanguinis plethora melancholiam? tertio enim de morb. vulg. 3. ex. 7. dicit Galen. si aliquis nimia quantitate sanguinis vexaretur, faciem esse melancholicam, quia in multo sanguine est multa sæx, vnde symptomata melancholica prodeunt: Similiter ex aliis plurimis morbis colligi potest humor peccans.

Quartus fons continet symptomata, quæ sunt excreta, qualitates mutata, & actiones læsæ: si de excretis loquimur, plura sunt exempla, quæ per viresam, per sudores, per vomitum, & per alias partes ostendunt humorum prædominium; namque ab urina colligimus humores, quia si apparet multum sedimentum in urina alba, statim pituitam peccare dicimus: A sudoribus, quia si corpus sæpè madore diffuit, tunc pituitam peccare dicimus. A sudoribus, quia si corpus sæpè maiore diffuit, tunc pituitam exundare putamus. A vomitu si excernitur bilis, statim dicimus bilem peccare: Neque obiciant, si ex symptomatibus certò colligimus peccantem humorem nos non indigere cæteris fontibus: quia respondemus hæc signa sumpta tantum.

*Et ab excretis cognoscitur humor peccans.*

*Obiect.*

*sol.*

à symptomatibus non esse æternæ veritatis, quia symptomata per se morbum sequuntur, per accidens humores; hinc contingit aliquando euomi bilem; attamen humorem redundantem in corpore esse pituitam, vt doctissimè Galenus in historia Cleonactidis 1. de morb. vulg. 3. com. 23. obseruat, ibi enim legitur, Cleonactidem per vomitum eiecisse bilem æruginosam: attamen ex syndrome aliorum signorum Galenus colligebat humorem redundantem esse pituitam: Syndromes, quæ docebat in Cleonactide humorem frigidum dominari, quamuis euomuerit æruginosa, erat tribus signis confecta, quorum primum erat non abhorreere cibum. Secundum non sirire: tertium non esse insomnem, dixitque hanc syndromem tantum posse, vt magis ostendat in corpore esse dominium pituitæ, quam æruginosa, dominium bilis. Si vero de qualitatibus mutatis loquimur, dicimus corpus albi coloris, & tactu frigidum pituitæ dominium indicare. Si flauo coloris, & corpus tactu calidum sit, bilis redundantiam: si demum de actionibus læsis loquimur, si naturalis actio est diminuta, & præcipuè alteratrix, tunc dicimus dominari pituitam: si corrupta, bilem si fame non naturali æger irritatur, dicimus melancholiam redundare, si sensus sunt obtusi, & mens hebes, pituitam indicari, si insomnis erit, bilem sæuire: hæcque dicimus summam vim in indicando habere, si cæterorum fontium signa iis consentire videbimus.

*Vt à qualitatibus mutatis, & actionibus læsis colligitur bilis.*

*Vt à locis affectis colliguntur humores peccantes.*

Quintus fons continebit locos affectos, qui nobis quoque manifestare possunt humores peccantes: partes enim affectæ, vel sunt aliquomodo manifestæ, vel occultæ: inter manifestas sunt membranæ, glandulæ, & aliæ partes: Scimus enim membranas læsas indicare bilem: quoniam apud Hippocratem, & Galenum videtur valere hæc consequentia; est pleuriticus, ergo bilis peccat, quia alij humores membranarum densitatem non peruadunt, nisi biliosi; idcirco Hippocrates 6. aphorismorum 33. habet, qui acidum eructant, non sunt pleuritici; quia, qui acidum eructant sunt pituitosi, vel melancholici, qui humores non possunt subtiles poros membranæ penetrare, & per consequens excitare inflammationem pleuræ: Similiter, si glandulæ sunt læsæ, dicimus peccare pituitam: Similiter, vt plurimum læsus ventriculus, pulmo, & cerebrum ostendunt dominari pituitam. Demum, si hypocondria sunt longo temporis tractu læsa, colligimus fæcem melancholicam adustam redundare, & ratio est, quia omnia vasa, & omnes turculi venarum hypocondriorum retinent succum melancholicum, crassum scilicet, & terrestrem, qui tamen, si diutius moratur, aduritur, & affectionem mirachialem efficit: Simili modo, si splen sit læsus, vel habeat æger hæmorrhoidas innatas, illico inferimus patientem melancholico premi humore.

*Quinque loca, quibus cognoscitur locus affectus.*

Si vero locus affectus ignoratur, tunc debet præcognosci per quinque locos à Galeno propositos 1. de loc. aff. cap. 5. quorum primus est per excrementa: secundus per actiones læsas; tertius per dolorum proprietates; quartus per sirum; quintus per propria accidentia. Sed quia vberimè 1. libro cap. 11. declarauimus methodum, qua affecti loci possint



possint cognosci, non est, vt iterum acta agemus.

Sextus fons continet iuuantia, & lædentia, quæ vel maximè possunt, quia affectus præter naturam tolluntur contrariis, & consequentiæ contrariorum necessario sequuntur, valet, iuuatur à calidis, & læditur à frigidis, ergo humor redundans est frigidus, & pituitosus; Similiter euacuatur pituita, & iuuat, ergo humor peccans est pituita, & sic de aliis humoribus est dicendum: Fert faciliè ieiunium, ergo pituita abundat; dicit enim Galenus 2. de ratione vict. 32. & 2. de morb. vulg. 3. tex. 28. pituitosis cibi paucitate sitim tollimus, & lassitudinem biliosus contrarium accidit; valebit ergo, ieiunio tollimus sitim, ergo erit pituitosus, non tollimus, ergo biliosus; Idem dicimus de lassitudine, tollimus ieiunio lassitudinem, ergo pituita exuperat, non tollimus, ergo bilis: ad eundem modum dicimus, acetum prodest, ergo amara bilis est copiosa: nocet, ergo melancholia, si vera est sententia Galen. 3. de ratione vict. 38. quibus amara exsuperat acetum prodest, & ab ipso dissoluitur, & degenerat in pituitam: nigra verò ob acetum multiplicatur, attolluntur in sublime, quia nigra est acida; hæc igitur, & alia plura ostendent iuuantia, & lædentia; Cæterum, si ex quolibet fonte saltem vnicum expiscabimur signum, & cum cæteris signis desumptis ab aliis fontibus copulabimus, id colligemus ex hac signorum syndrome, quod à qualibet præstantissima demonstratione ex propriis facta colligi possit; quia signa ex necessario antecedentibus, & necessario consequentibus collecta tantum possunt, quantum propria.

Qui verò alios præterea fontes proponunt, ( vt facit Argenterius, qui in libro de signis Medicis, & alibi excogitauit pro cognoscendis occultis humoribus locum, vel fontem à similitudine, vel à proportionione ) aberrare videntur, vel quia fontes diuersi ab iis propositis nihil prorsus ad hanc cognitionem conferant, vel si aliquid vtilitatis præstent, ad sex propositos reducantur; Fons igitur à proportionione propositus ab Argenterio est, verbi causa, si aliqua sczuerit endimia in populum, & Medici nescirent, quibus humoribus danda esset endimie culpa, & propterea cadauera aperirent, viderent esse atrum succum; dicit ex hoc experimento oriri fontem à proportionione, dicendo sicuti in cadauere erat ater succus. Similiter in alio homine eadem ægritudine vexato erit similis ater succus; Primo reiicitur hic fons à proportionione, quia non potest collocari in catalogo signorum necessario antecedentium, vel necessario consequentium, profiteamur enim nos syndromem necessariam fieri non posse, nisi ex signis necessario antecedentibus, vel necessario consequentibus, quare vt topicus, & contingens reiicitur; deinde si aliquid docere potest, eatenus id facit, quatenus morbum, vel locos affectos docet; per apertionem cadaueris cognoscimus, quæ pars sit affecta, & à parte affecta colligimus, qui sit morbus; quare fons à proportionione, si aliquid docet, id merito aliorum fontium declaratorum præstabit; Insuper ex apertione cadaueris in perquirendis humoribus possumus decipi, quia humores in cor-

*Vi à iuuantibus, & lædentibus cognoscuntur humores peccantes.*

*Vi errat Argenterius proponens locum à proportionione.*

*Qua sint vi-  
sia loci à  
proportionis  
desumpti.*

poribus mortuorum existentes differunt forma, & qualitate ab hu-  
moribus viuentium; corpus enim viuens vt primum fit cadauer, amic-  
tit formam, colores, & omnes humorum qualitates, quæ in viuenti-  
bus obseruabantur; quod cum ita sit, quomodo non errabunt illi, qui  
ex cadaueris apertione credunt sciri posse à quo humore quispiam sit  
enectus. Postremò, vt clarissimè videamus, quod hic fons Argente-  
ri, qui est à proportionem non possit collocari inter signa necessario an-  
tecedentia, vel consequentia; audias analyticam, & infallibilem ra-  
tionem, an-ne transitus à proportionem, vel à simili, quod in idem reci-  
dit, est analogismus empyricorum toties reiectus à Galeno? an-ne  
fons à proportionem, & analogismus progreditur à particulari ad par-  
ticulare, an-ne hoc argumentum cadit in tertia figura cum conclusio-  
ne vniuersali? quod est ridiculum, & monstruosum; quare, si hæc vera  
sunt, fons à proportionem erit omnino reiciendus, & explodendus:  
Neque obiiciant nos quoq; sextum fontem minus necessarium pro-  
posuisse, qui est ex iuuantibus, & lædentibus, quia respondemus  
consequentias à contrariis esse necessarias, valet enim iuuat calidum,  
ergo affectio est frigida, non tamen valet consequentiæ à propor-  
tione, vel similitudine depromptæ, sicuti in Socrate fuit ater succus  
inuentus, ergo inuenietur etiam in Platone, qui simili morbo labora-  
bat, hoc enim argumentum est elenchus malæ compositionis, infer-  
tur enim in conclusione, quod humor peccans sit humor ater, quia  
morbus est similis, quibus post mortem factum est cadauer, & in-  
uentus est ater succus. Possem sanè inferre ex eo, quod ob similem  
morbum repertus sit ater succus, esse quoque posse in hoc ægrotante  
atrum succum, sed nequaquam quod actu sit ater succus; quare cum  
in argumento transeant ab iis, quæ possunt esse, ad ea, quæ actu sunt,  
incidunt in elenchum malæ compositionis.

*Quomodo omnes biliosorum humorum differentia cognosci possint  
per syndromem signorum communium à rebus non  
naturalibus desumptorum.*

## C A P. I I.

**T**RADITA Methodo, quæ per signorum communium syn-  
dromem sufficientissimam potest docere latentes humores, pe-  
nitissimæque corporis partes insidentes: patet, vt eam in perquiren-  
dis quatuor humorum generibus experiamur: itaque incipiamus à  
biliosis succis, tanquam ob eorum impetum, & calorem omnibus  
manifestioribus, & euidentioribus. Bilis communiter diuiditur in  
quatuor famosas differentias, flauam scilicet, vitellinam, porraceam,  
& æruginosam; verum ex Galen. sententiâ lib. de atra bile cap. 2. & aliis  
in locis septem biliosorum humorum differentia proponuntur, qua-  
rum

*Septem diffe-  
rentia bilio-  
sorum succo-  
rum differen-*



rum prima est bilis pallida. Secunda est flaua; tertia vitellina; quarta porracea; quinta æruginosa; sexta cærulea, quæ dicitur isatodis; septima hæ differentia bilis differunt tantum secundum magis & minus, quoniam ex maiori & minori calore variaz biliosorum humorum differentia conflantur: quæ sententia colligi potest ex Galeno multis in locis, & præcipuè 4. prælag. 47. dum dicit, flauus color fit seroso torrefacto, pallidus fit ex mistione flauæ bilis in serosa humiditate, æruginosus fit seroso valde torrefacto: unde colligitur, quod secundum maiorem, & minorem serosi humoris torrefactionem oriuntur differentia humorum biliosorum. Hinc cum differant tantum secundum magis, & minus, aliæ quoque à Galeno biliosorum succorum differentia multis in locis enumerantur, quia quæ differunt secundum magis, & minus sunt maximè diuisibilia, & maximam varietatem differentiarum faciunt; quæ verò specie, & quid ditate inter se distinguuntur, cum species sint sicuti numeri, diuidi, & multiplicari minimè possunt. Galenus igitur cognoscens alias plures differentias biliosorum succorum libro 10. de simp. med. fac. cap. de fele dicit, quod bilis isatodis duplex sit, altera dicitur isatodis à colore isatidis glaucæ, altera à colore fusco brasice. Et primo de natura humana text. 4. proponit dari biles, quæ nomine carent, dicitque has generari præcipuè in morbis, qui ex putredine fiunt.

Verum satius est, ut hic famosas biles, quæ à Galeno passim obseruantur, breuiter examinemus, atque exordiamur à bile pallida, quæ est omnium mitissima; de qua Galenus lib. de atra bile loco citato, & 5. in 6. de morb. vulg. tex. 13. dicit ex humiditate, & flaua bile fieri, esseque eiusdem generis, cuius est sudor, & vrina; hancque pallidam choleram nonnulli vocare serosam bilem. Post pallidam sequitur flaua, quæ ex Galeno 10. de simp. med. facul. cap. de fele, est calidior & crassior pallida. Hinc 2. de ratione vict. in ac text. 31. dicit, quod bilis flaua fit ex sanguine plus iusto calefacto, & 10. de simpl. med. fac. cap. citato dicit, quod flaua est calidior, & crassior pallida; & primo de natura humana text. 35. quod flaua à pallida specie non differat. Sequitur deinde vitellina, quæ, ut dicit Galenus 5. in 6. de morb. vulg. text. 13. fit ex flaua crassescente: deinde sequitur æruginosa, quæ, ut dicit Galenus 4. prælag. 47. fit ex serosa bile valde torrefacta, de qua loquens Galenus 5. de loc. aff. dicit æruginosam fieri ex vitellina à calore adusta. Demum est porracea, quæ fit ex mistura bilis æruginosæ cum humore pituitoso, ut probabimus in libro sequenti, inde sequuntur plurimæ differentia ex maiori, vel minori torrefactione dictorum succorum biliosorum, ut sunt biles cæruleæ, & illæ innominatæ species à Galeno primo de natura humana propositæ. Postremo in catalogo biliosorum humorum collocatur rubra bilis, quæ est ichor sanguineus genitus ex portione alimenti tenuiori quæque, ut dicit Galenus libro de atra bile proxima est sanguini, dicitur tamen bilis, quia ob nimiam tenuitatem non concreuit, quinimmo bilis

*tes secundum  
magis & mi-  
nus propo-  
nuntur.*

*Vi fiat bilis  
pallida.*

*Vi fiat flaua.*

*Vi fiat vitel-  
lina. & æru-  
ginosa.*

*Vi fiat porra-  
cea.*

*Qua sit ra-  
bra bilis.*

propterea ab antiquis potius nominabatur, quam sanguis.

Tempus nunc est, ut iis præcognitis, traditam methodum in superiori capite experiamur quia inde colligere poterimus, quando in ægrotantibus peccabit bilis flava, quando vitellina, vel æruginosa, & cetera enarrata biliosorum succorum differentia. Exequamur ergo propositum, & videamus quid in primo fonte, qui est de procatarcticeis causis, colligi possit pro comparanda hac cognitione; an-ne (ut dicimus superius) tres externæ non naturales causæ sunt, quæ disponere possunt viscera ad generationem bilis, & caloris? quæ sunt motus vicinitas corporis calidi, & alimentum; an-ne, quæ calefaciunt hoc ordine imprimunt caloris vestigia, ut minor caliditas minorem imprimat calorem in viscera, & per consequens pallidam bilem, quæ est mitior gignat? paulo maior caliditas vitellinam? & deinde, si adhuc vehementior erit, porraceam, & æruginosam, ut propterea Galenus 5. de loc. aff. dicat vitellinam fieri æruginosam à maiori calore; & 4. prælag. loco citato dicat æruginosam heri ex seroso valde torrefacto, quare si verum est, quod à calore, ut à causa efficiente disponantur viscera ad generationem omnium biliosorum succorum, & verum sit, quod calor in animantibus solum ab iis tribus prodeat scilicet à motu, adhæsu corporis calidi, & ab alimento calido erit quoque verum, quod maior motio seu agitatio maiorem imprimat, & maxima maximum, & adhæsus corporis moderatè calidi moderatum calorem, vehementissimè calidi vehementissimum intromittat; & demum alimenta moderatè calida mitiorem calorem, & potentissimè calida potentissimum calorem faciant; unde cognitis iis viscerum dispositionibus colligi poterit, an peccet in biliolis affectibus bilis flava, an vitellina, vel æruginosa, non enim possent viscera à vehementissimo calore calefieri, & inde morbum oriri biliosum ex flava bile.

*Ut colligatur  
varia bilis  
differentia ab  
erroribus ex-  
ternis.*

*Ut à coitus  
calidi humo-  
res.*

Cum igitur motus præcipuè disponat viscera ad calorem, nostrum est videre, quot sint illæ res non naturales, quæ ratione motus calefaciunt; dicimus ergo coitum, animi passionem, vigilias, & exercitium ratione motus calefacere, & disponere viscera ad generationem bilis: Quo ad coitum est hæc Galeni sententia com. 5. de morb. vulg. text. 23. concubitus corpora omnia calefacit, quare ex præcedente libidine moderata, moderatum calorem, & bilem pallidam seu flavam, nisi alia obstiterint signa, colligemus, ex immoderata, & effreni intensum calorem, & bilem æruginosam, & porraceam esse factam credendum erit. Hinc Adolescens Melibee, ut patet 5. de morb. vulg. tex. 23. coitus blanditiis valde acersitus, & assiduè plectus non corrumpit in febrem mitem; sed in malignissimam, & caloris feracissimam in qua æruginosa, & non flava, vel vitellina bilis vexaret. Similiter Satyrus, ut dicit Hippocrates 8. de morb. vulg. 38. ob nimiam seminis ei aculationem tali fervore ob tam grandem agitationem à coitu prodeuntem fuit correptus, ut tabidus, vel breui euaderet: ecce igitur, quod vehementior motus magis incendit atque adurit. Ad motum quoque reducuntur.



reducuntur vniuersæ animi passiones, quare ex vehementiori animi passione maior quoque agitatio sanguinis, & spirituum fit, unde maior calor, & deterior biliosus succi differentia suboritur. Qui igitur simpliciter in iram excurrunt moderatè calefiunt, qui vero extrâ limites rationis excandescunt possunt ob tam concitarum motum adeo incendio flagrare, vt ad æruginosæ bilis generationem perducantur. Mæiores & mæstitiæ quoque calefaciunt, sed non, vt ira, quoniam, vt dicit Galenus primo de differentiis feb. 3. ira calefacit, tum quia incendit natium calorem, tum quia cum impetu mouet spiritum ad differentiam tristitiæ, quæ solo motu concentrando scilicet spiritum calorem excitat, & ad differentiam perichariæ seu nimij gaudij, quod diffundendo spiritum ad circumferentiam calefacit; omnia igitur animi pathemata ratione motus calefaciunt, & disponunt ad bilis generationem, hac lege seruata, vt ex passione vehementiori, nisi alia obtent signa, malignior differentia biliosa semper confurgat. Vigilia, *vt à vigilia.* quia in perenni motu detinet spiritus, auget calorem, & quo diuturnior erit, eo acutior gignetur bilis. Hinc docet experientia propter vigilias fieri rubras vrinas. Demum est exercitium, quod, si non erit immoderatum, numquam æruginosam bilem acervabit. Ecce igitur, quod ex coitu, animi passionibus, vigiliis, & exercitio secundum magis, & minus à naturali statu recedentibus (nisi alia obstiterint signa à cæteris fontibus depromenda) nos faciliè colligere poterimus, an humores biliosi sint adusti, & æruginosi, & an flauus, vel vitellini coloris; flauus enim & vitellinus color, vt ostendimus superius, non supponunt adustionem, sicuti porraceus, & æruginosus.

Post mortui alię res non naturales pertinentes ad vicinitatem seu adhæsum rei calidæ succedunt: & in primis ab anni tempore calidissimo, veluti ab aere æstiuo prout magis, vel minus feruore participat, viscera disponuntur ad biliosos succos magis, vel minus perustos. Similiter à regione feruida corpora disponuntur ad morbos biliosos; A constitutione, dum aer æstiuus non fauonio, sed potius ventis australibus perflatur, vbi à tergo montes septentrionales arcant ventos salubres. Insuper ab hypocaustis viscera redduntur prona ad generationem adustorum humorum; demum à balneis, vnguentis, & medicamentis ob contractum adeo iniquè viscera premuntur calefaciendo, & comburendo, vt aliquando ex his maximè adusta bilis generetur.

Postremò inter externarum causarum calidarum censum est alimentum calidum, quod calefacere potest bifariam per se, vel per accidens; per se dum homines in aromatis delinquant, vel in esu dulcium, quæ in bilem vertuntur, dum permeare non possunt, vt notat Galenus 6. de morb. vulg. com. 5. vel dum calices meracissimi integros exhauriunt; per accidens, dum cibis crassissimis, & viscosissimis vescuntur, qui magnas faciant obstructions, vel dum obsoniis obtruantur, & se assiduis comestationibus tradunt, ob quos errores incidunt in tales obstructions, vt calor nativus vel maxime exardere in-

ciat; per accidens quoque calefaciunt edulia ingesta, & infarcta, quæ sua natura frigidi sunt temperamenti, vt cerata, ponia, & reliqua id genus putredini obnoxia: hæc enim, dum corrumpuntur, & putrescunt, priscam suam temperaturam relinquunt, & aliena calida, & acri induuntur, vnde alui fluores, vnde calor iecoris insignis suboritur.

*Vi errant qui non distinguunt ea quæ calefaciunt per se, ab iis, quæ per accidens.*

Hinc Galenus libro de const. ar. med. cap. 14. videns Medicos plures errare, quia non distinguunt quæ per se ab iis, quæ per accidens calefaciunt, admonet nos iis verbis, spectabit ad medicum ne in eum illabatur errorem in quem, qui putant frigidam aquam in omnibus, quæ refrigeratione egent, conuenire, & calidam in iis, quæ calefactione; ignari ex accidente fieri sæpè, vt frigida calefaciant, calida verò refrigerent: per accidens demum alimentum calefacit, quatenus adeo perexiguum est, vt ob inopiam, vel inediam calor accendatur, & accensus depopuletur humidum proprium; vnde Hippocrates 2. de ratione vi& text. 30. dicit inediam accendere calorem, & bilem reddere amariorem: & secunda sect aphorismorum 22. inediam biliosis febrem afferre; & Galenus aduersus Erasistratum dicit, inediam eliquare carnes, & reddere homines biliosiores, & omnia excrementa facere acriora, & maligniora; & 8. methodi cap. 2. inediam pichrocolos interficere, quare perexiguum alimentum potest per accidens bilis varias facere; nos verò ex maiori, vel minori inedia colligere possumus biles magis, vel minus adustas. Ecce igitur, quod ex alimento per se, vel per accidens secundum magis, vel minus agente colligere possumus viscera multum, vel parum recedere in calore à naturali statu; & modo esse disposita ad generationem flauæ, modo vitellinæ, & modo æruginosæ bilis.

*Vt inedia bilis gignat.*

Præcognitis his principiis, vnde calores in visceribus generantur, debemus in primis quemlibet propositum fontem in qualibet occasione contemplari, & videre, an vnus alteri consentiat; quoniam, si (exempli causa) aer esset calidus, & cibus frigidus, tunc vix bilis gigni posset, nisi esset crassus, & viscidus, qui obstruens per accidens calefaciat: propterea Galenus 2. ad Glauconem capite 10. dicit, non solum concurrere in generatione attri, & calidi succi cibum crassum, verum etiam aerem feruidum, habet enim hæc verba. In Alexandria Elephantico morbo plurimi corripiuntur propter victus modum, & regionis feruorem. At in Germania, Mysia, & apud Scythas, vbi lac, cochleas, & cætera crassissima obsonia comedunt, nunquam fere apparuit elephanticus affectus; quia aer gelidus non permittit, ex crassis eduliis fieri atrum, & calidum succum, quare non ex acre, vel ex alimento tantum, sed ex vtriusque simul certitudinem habebimus, quod genitus sit humor proportionatus causis externis non naturalibus. Si verò aeri, & alimentis motum adiungemus, maiorem adhuc cognitionem ab iis externis colligemus.

Verum ob quos errores in sex rebus non naturalibus commissos disponantur corpora ad febres malignas, siue ad generationem bilis adustæ, & æruginosæ, res est satis difficilis, quoniam aliquando vide-



mus hominem debilem coitu, vel alia causa non naturali abuti extra rationis limites, attamen in illo non aduri humores, non fieri æruginosos, atros, vel porraceos, & per consequens illos non disponi ad malignas febres, quæ (nisi me fallit opinio) ex maxima humorum aduſtione prodeunt: ex alia parte videmus hominem fortem, eumque temperaturæ optimæ ob ſimiles errores illico disponi ad æruginosæ bilis generationem, & per consequens ad malignas febres. Credimus igitur nos, hanc deterrimam dispositionem promptè à procatacticis erroribus in iecur immitti propter duos errandi modos, quorum primus est, dum in rebus non naturalibus delinquant non in vnico tantum genere, sed in pluribus, ſcilicet in cibo, & potu, venere exercitio, & animi paſſionibus: exempli cauſa, ſi quis erraret in potu tantum nullo in cæteris procatacticis errore commiſſo, natura ab vnico hoſte tantum vexata facile poſſet eum euincere, & prima illa erroris veſtigia corrigere: ſi verò à pluribus errorum generibus premeretur, sæpè calor, & malignitatis veſtigia tam altas figerent radices, vt corrigi vix poſſint. Secunda, & præcipua occaſio malignarum febrium à procatacticis deſumpta eſt, quando committuntur errores in illis rebus non naturalibus, quæ motibus contrariis premunt naturam; nihil enim magis vexat, quam illud quod violentè agit, & nihil eſt nobis violentius contrariis motibus eodem tempore factis: cauſæ, quæ oppoſitis motibus torrent viſcera, & ad dololum affectum hominem perducunt, ſunt, vt exemplis declaremus, veluti dum quis patitur eodem tempore aerem calidiſſimum, & mœrores animi; oppoſitio, vel contrarietas conſiſtit in hoc, quia aer feruidus ad circumferentiam, mœrores verò ad centrum pellunt ſpiritus, & ſanguinem; vnde ob motus hos contrarios non ſolum ardor in ſanguine excitatur, verum, quia mœrores calefaciunt pellendo ad centrum, dolofus & malignus affectus ſuboritur. Similiter acri calidiſſimo, ſi cibus copioſiſſimus adiungitur, violentius ager, & dolosè; violentius, quia non ſolum aer calidus violentè incendit viſcera, verum etiam cibus copioſiſſimus non permittit, vt calor effundatur ad externas partes, ſed occultetur in viſcerum latebris, & dolosè agat, & violentè naturam opprimat: ſimiliter ſibi contrariantur ær æſtius, & ſomnus nimius, & præter naturam; hæ mihi videntur eſſe cauſæ, quæ diſponunt ad maligniſſimos morbos; errores tamen in illis procatacticis, quæ ſibi non aduerſantur, non faciunt malignas febres, ſicuti ær æſtius, & coitus, quoniam ambo ad circumferentiam calorem pellunt: poſſunt tamen coitus nimius, & ær feruidus ardentem febrem molliri, ſed non malignam, niſi error contrariæ motionis adiciatur, & ratio eſt, quoniam ær æſtius aperit meatus, mouetque ad cutim calotes, & coitus agitâdo propellit ad exteriora accenſos, & peruſtos humores, quare affectus ab iis prodians erit apertus, omnibus conſpicuus, & nequaquam dolofus, vel malignus: ſimiliter errores, qui ſunt ob aerem æſtium, exercitium, & ob vigiliam immoderatam facere poſſunt valetudinem apertam, & omnibus notam, & nequaquam dolofam, & mali-

*Qua ſit præcipua occaſio malignarum febrium.*

*A quibus erroribus in rebus externis commiſſis ſunt ardentes febres.*

gnam; errores tamen prodeuntes ab iis causis pellentibus calorem ad circumferentiam coniuncti cum iis, qui concentrant, ut sunt mærores, & mæstitiæ in tam imis, & profundis partibus collocantanti caloris focum, ut febris, quamvis sit malignissima, non cognoscatur, vel percipiatur ab astantibus, quia natura non potest eam flammam dissipare, & ad externas partes pellere; hoc tamen non eueniet, si coniungatur cum ira, vel cum pericharia, quæ animi passiones semper aperte calefaciunt, quoniam à centro auocant calorem: ad eundem modum ceteræ non naturales causæ, quæ contrariis motibus sibi aduersantur, hostilitatis arma occultant; sicuti est coitus insignis, & usus ciborum copiosorum, coitus enim calefacit auocando, cibus vero reuocando calorem, similiter coitus, & mærores; exercitium nimium, & cibus copiosus; vigiliæ, & cibus copiosus; aer frigidus, & vigiliæ; aer feruidus, & nimius somnus eadem ratione sibi aduersantur; quare si in aliqua magna febris inueniemus errores non naturalium causarum præcedentium fuisse plures: eosque contrarios, scilicet aliquos mouendo ad circumferentiam, aliquos vero ad imas, & profundas corporis partes calorem, facile poterimus colligere febrem ingentem, & dolosam scire; etenim maligna seu dolosa hæc febris non ab expanso, sed à concentrato calore generatur. Demum si ab extrinsecis iis causis non consequemur cognitionem omnibus numeris absolutam, sed adhuc penderet, & fluctuaret animus, tunc virtute syndromis signorum desumptorum ab illis antecedentibus; & consequentibus, quæ necessario in humoris productionem conspirant, vel rem genitam consequuntur omnem ambiguitatem euellere poterimus.

*Ut biliosi succi innotescant per syndromem signorum desumptorum à dispositione patientis, & a morbis.*

### CAPVT III.

**S**EQUITUR, ut post causas procatacticas, examinemus dispositiones patientis, facile enim in ægrotante colligi potest bilis peccans, si erit dispositus ad generationem biliosorum excrementorum. Signa igitur, quæ indicare poterunt hanc corporis dispositionem desumuntur ab antecedentibus, & à consequentibus: antecedentium igitur dispositionum quinque sunt fontes seu loci, à quibus possumus depromere, an patiens sit propensus ad succos biliosos; quorum primus est expendere à quibus parentibus ille ortus sit, quoniam parentes, ut plurimum generant filios sibi similes; si vero ex parentum dispositionibus aliquid certi non habetur, adest secundus locus, qui est ab ætate: ætas enim iuuenilis, & consistentiæ est magis apta ad bilem colligendam, & gignendam, quam senectus. Tertius locus consistit in habitu corporis, continetque sub se tres locos, quorum primus est habere

*Quinque loci  
antecedentes  
unde sumun-  
tur signa di-  
spositionum  
corporum ad  
generatio-  
nem bilis.*



habere corpus macilentum, & gracile; ab dominis enim, & cæterarum partium gracilitas arguit bilem. Secundus est habere venas latas, namque Galenus libr. de ar. med. cap. de signis calidi hepatis dixit venas latas calorem ostendere, & contrarium venas exiles. Tertius locus desumitur à physionomicis, quia illi qui habent frontem rotundam, habitum sortiuntur talem, ut valde sint accommodati ad bilem colligendam. Quartus locus sumitur à virtute, quia si æger sua natura est fortis optimisque viribus confirmatus, & prolabitur in ægitudinem, ut plurimum causa est bilis. Quintus locus declarans manifestè, quando corpus est dispositum ad biliosos affectus, quique est omnium certissimus, desumitur à suppressa, & intermissa aliqua biliolorum succorum evacuatione: illico enim si quis, post suppressam evacuationem consuetam bilis per aluum, vel per vomitum cadit in morbum, dicimus bilem esse illius affectus causam.

A consequentibus quoque colligimus signa corporis dispositi ad bilem, & quinque observantur loci, scilicet ab Actionibus animalibus, Vitalibus, Naturalibus, Ab excrementis retentis, vel exeuntibus, & à qualitatibus tangibilibus. Actiones vero animales ostendentes corpora accommodata ad congerendam bilem sunt non esse somnulosos, sed vigiles; levi data occasione siti vexari, esse mutabiles in sententia, esse ingenio celeri, ab inedia & ieiunio adeo lædi, ut venter, caput, & totum corpus bile faciliè impleatur: in somniis ignem, combusta, cædes, fulgura, arma, lites, & prælia sibi offerri; & demum agiles esse in motu: Vitales verò erunt tales, ut in iram præcipientes ferantur, & in venerem sint furiosi, sed hac conditione, ut illico post factum sint penitentes; & postremo pulsus habeant veloces. Naturales autem actiones, & præcipuè expultrices irritatæ significant biliosum hominem; hinc dicunt medici, cibum in stomacho biliolorum non esse molestum; & ratio huius est, quia bilis promptè omnia excrementa expellit, nec non etiam ventriculi pituitam abstergit & purgat; aliaque id genus possent observari in actionibus naturalibus, quæ bilis dominium ostenderent; pauca tamen sufficiunt, quia hic non de actionibus naturalibus agimus, sed solum de methodo cognoscendi humores latentes. Ab excrementis quoque idem sæpe colligimus; etenim si aures bilioso excremento abundant, coniecimus biliosam esse naturam; si videbimus corpus carere excrementis, carereque saliva; idem colligimus: Denique à qualitatibus tangibilibus, si in manibus, & toto corpore observabimus calorem mordacem, colligemus homines esse ad biliosos affectus propensos: alia præterea sunt signa biliolorum succorum, quæ potius conveniunt biliosis affectibus præter naturam: de quibus paulo infra, quoniam hic solum, quæ ad dispositiones corporum spectant tractare ab initio pepigimus; volumus enim à quolibet horum propositorum fontium, saltem unicum signum colligere, illudque deinde coniungere cum aliis signis depromendis à procataëticis, à morbis, à symptomatibus, à loc. aff. & à quantibus, & lædentibus; quia horum signorum syndromes certò demonstra-

*Quinque loci consequentes unde sumuntur signa dispositionum corporum ad generationem bilis.*

bit, an peccet bilis; quomodo vero biliosorum succorum differentia cognoscantur, dicimus quod signa potentia, & minus potentia bilem magis, vel minus effrenem indicabunt.

*Qui morbi  
inducant pec-  
care bilem.*

Expenlis locis pertinentibus ad externos errores, & ad viscerum dispositiones, nunc animum ad morbos conuertimus, & deinde ad alios fontes, quippe qui si non dissentient, tam certò cognoscemus biliosos succos in penitissimis partibus residere, perinde ac propria inspectione ipsos videremus. Morbi igitur varij sunt, qui apertè indicabunt humores calidos scire, sicuti sunt intemperies admodum calidæ, quæ si erunt feruentes, maligniores indicabunt biles, hinc & ardentissimæ intemperies bilem non flauam, vel pallidam, quia hæc inter limites naturales continentur, sed vitellinam, vel porraceam indicabunt, si vero hæc febres acutæ erunt mali moris, colligemus bilem æruginosam altas habere radices, quia maligni, & dolosi affectus non possunt fieri sine adustione, neque adustio in humoribus biliosis sine ærugine, ut experimentis probauimus in libro præcedenti cap. de coloribus. Insuper ex velocitate morbi, & ex periodis conicimus biliosos succos esse causas morborum; superius enim non solum declarauimus motum de tertio in tertium ostendere bilem, verum etiam motus veloces principij, vel augmenti; quandoquidem Galenus loquens de physico habet hæc verba: vbi tertius, & quartus dies habent grauius symptomata, cito expectabis iudicium, ergo ex sola principij velocitate possumus colligere velocitatem totius, atque ex velocitate totius, morbum esse acutum, & inde humorem esse tenuem, & biliosum. A determinatis quibusdam horis, veluti si morbus mouetur in meridie, erit bilis. Ab obstructione vesicæ felleæ, valet enim esticteria, ergo peccat bilis. Ab inflammatione membranarum, valet est pleuritis, ergo bilis, quoniam densitatem membranæ alij humores non penetrant, nisi biliosus sanguis, qui tenuis est, & hæc est ratio, cur Hippocrates dixit, qui acidum eructant, non fieri pleuriticos, in iis enim sunt crassi humores, qui tunicas, vel membranas penetrare non possunt. Ab inflammatione sine tumore, & pondere bilem peccare colligimus; hinc valet est herpes, in quo affectu nec tumor apparet, nec pondus persentitur, ergo peccat bilis, eaque syncera, & non mista cum ichore sanguineo ad differentiam erysipelatis, quod (ut dicit Galenus libro de tumoribus præter naturam cap. 10.) fit non à bile syncera, sed mista cum ichore sanguineo, qui leue aliquod pondus facit: valebit quoque est erysipelas legitimum, ergo est bilis mista cum ichore sanguineo sine tumore, & pondere; est erysipelas phlegmonodes, ergo erit bilis mista cum sanguine, facietque tumorem, & pondus; dicit enim Galenus lib. de plenitudine cap. vltimo, quod sola bilis nec tumorem, nec pondus producit, quia antequam tumorem, & sensum ponderis faceret, exulceraret, & herpetem excitaret. Demum valebit quoque hæc, est phrenesis ergo bilis peccat, eaque syncera, & non mista, ut placuit Galeno cum ichore sanguineo; dicit enim 3. de loc. aff. 7. quod phrenesis exquisita fit à bile syncera.



lyncera. Nec tamen est obiciendum bilem lynceram erodere, & pro-  
pterea non posse phrenitidem facere, quia sequeretur hoc incon-  
ueniens, quod erosio membranis cerebri, nemo phrenitide eua-  
deret. Occurrimus enim bilem lynceram non habere hanc ero-  
dendi potentiam in partibus internis tum ob maximam rarita-  
tem partium per quas lyncera bilis transit sine erosione, tum ob  
robur internarum partium. Hæcque est causa, cur allium cuti ex-  
ternæ applicitum erodat, comestum tamen non erodat ventricu-  
lum, sed nutriat. Colligas ergo, quod à morbis octo scaturiant lo-  
ci, qui docere nos possunt, an peccet bilis, quique data qualibet occa-  
sione occulti humoris biliosi sunt examinandi, primus est desumptus  
ab interperie admodum calida, & sicca; secundus à malignitate fe-  
bris: tertius à typis tertianariis; quartus à velocitate temporum morbi;  
quintus ab horis meridianis; sextus ab icteritia; septimus ab inflam-  
matione membranarum; octauus, & postremus ab herpete: ab iis igitur  
signa colligere poterimus, quæ cum aliis vnita certam syndro-  
mem pro cognoscendis biliosis succis in corporis latebris existentibus  
facient.

*Octo loci à  
morbis de-  
sumpti pro  
cognoscenda  
bile peccante.*

*Ut biliosi succi præcognoscantur per syndromem signorum com-  
munium desumptorum à symptomatis, locis affectis,  
inuuantibus, & ledentibus.*

CAPVT IV.

**A** Symptomatum sylua depromimus quoque varios locos, à  
quibus colligere possumus biliosorum humorum dominium;  
quot enim erunt symptomatum genera, tot erunt loci, à quibus præ-  
ceptionem colligere valebimus pro cognoscendis noxis, & peccanti-  
bus humoribus. Genera symptomatum sunt læsæ actiones anima-  
les, vitales, & naturales, deinde sunt immodicè excreta, vel retenta, &  
demum qualitates mutata: ad quæ genera omnia symptomata, quæ  
animantibus contingere possunt, reducuntur; & ab iis sæpè colligi-  
mus certa signa peccantium humorum. Experiamur in primis, an  
possimus à symptomatibus rectricum facultatum cerebri cognoscere  
aliquam particularem differentiam biliosorum succorum scire; est  
enim Galeni sententia secundo in primum Epid. 17. ubi peccat bilis, ut  
in ardentibus febribus, & aliis plerisque affectibus humores extolli  
ad caput, & inde è naribus profluvia sanguinis, & deliria suboriri; de-  
lirium ergo, quod est symptoma in actione animali principe depraua-  
ta ostendere poterit bilem peccare. Audias deinde, quomodo ex va-  
riis delirij conditionibus varias quoque differentias biliosorum suc-  
corum colligere possumus, an-ne, si phreniticus habuerit ex candes-  
centiam cum studio, in eaque perseverauerit sine fletu, & sine ferina

*Ut à sympto-  
matibus col-  
ligimus pec-  
care bilem.*

*Ut ex vario  
delirio varia  
differentia  
bilis noscitur.*

desipientia, tunc dicere poterimus cum Galeno illam bilem peccare, quæ neque omnino adusta, vel putrida sit? si vero incipiat habere excandescentiam cum fletu, an-ne dicemus tunc peccare illam atram bilem, quæ est putrida? quia fletus melancholiam; studium vero melancholiam putridam peccare indicat, si vero fletui adiungitur, ut phreneticus velit percutere, credatque quod omnes, quia ingrediuntur cubiculum, sint hostes, tunc haud dubiè peccabit atra bilis adusta, & non putrida, quia quatenus est putrida, non est ferina, & adusta, de qua ferina desipientia Galenus primo prædict. com. 25. abundè loquitur. Præterea, si ægrotantes sine aliqua tamen desipientia hoc tantum habeant, ut magis, quam antea, loquantur, & non labantur in alias maiores desipientias, signum est bilem peccare, verum non putridam; quia hæc parit excandescentiam cum studio, non adustam, quia hæc ferinam desipientiam inducit; peccabit ergo flava, seu vitellina bilis, non putrida, quia maiora symptomata faceret; non adusta, quia hæc duæ species, quæ servant colores flavos, & vitellinos, non sunt adustæ, ut ostendimus superius: moderata itaque symptomata ostendent flavam, paulo maiora vitellinam, vehementiora vero æruginosam, vehementissima atras biles significabunt. Quod verò multum loqui ostendar bilem, legi potest Galenus 3. in tertium Epid. com. 86. ubi habet multum loqui esse phreneticorum, tacere verò melancholicorum; immo Galenus loquens ibi de vxore Dealcis, quæ aliquando multum loquebatur, aliquando perpetuo tacebat, dixit delirium illud fuisse mistum, quia ex bile, & melancholia pendeat.

*Ut in somnia  
ignita & vi-  
gilia bilem o-  
stendant.*

Similiter ex aliis functionibus animalibus læsis pertinentibus ad imaginativicem facultatem aliquid in perquirendis moribus colligere possumus, quoniam, si de somniis loquimur, conspicua, & ignita somnia: ut primo prædict. 5. humores siccos, & calidos significant, aquea vero pituitam. Similiter, si aderit vigilia morbofa, statim inferemus bilem, nisi obstitierint aliorum fontium signa, namque Galenus primo de morb. vulg. 3. com. 23. dicit, in Cleonactide vomitum fuisse biliosum licet fuerint alia signa, quæ magis potuerint ostendere peccare pituitam, fuit enim insomnis, non sitiuit, nec cibum abhorruit, quæ certum dominium pituitosi succi ostenderunt. Nos verò ex contrariis colligemus bilem ex vigilia nimirum, siti, & inappetentia. Hinc Galenus de inappetentia loquens primo de morb. vulg. loco citato habet, à bile redundante fastidiosi, id est inappetentes, & appetitu carentes; de siti vero loquens tertio in tertium Epid. 34. & 46. dicit, quod sitis, quæ sedari non potest, ostendit exurentem caliditatem, quæ necessario à bile exurente prodibit, quare valebit consequentia (nisi alia signa, ut sæpè diximus ab aliis fontibus collecta iis reluctentur) est sitis, vigilia, & inappetentia, ergo bilis peccat: postremo sunt quoque symptomata pertinentia ad sensum tactus, quæ bilem indicabunt, ut sunt dolores mordicariui capitis, intestinorum & aliarum partium, suntque puncturæ narium, à quibus signis colligimus peccare bilem.

*Inappetentiam, & sitim  
ostendere bi-  
lem.*



Insuper ex actionibus vitalibus bilem prædominari colligimus, si-  
cuti dum Galenus 3. de diff. respir. cap. 10. & alibi dicit, pulsus durio-  
res bilem indicare, & ratio est, quia bilis dum peccat peruatit mem-  
branas, quas cæteri humores penetrare non possunt, membranæ im-  
butæ hoc succo tenduntur, vnde arteriæ ob generis sympathiam du-  
ritiæ afficiuntur, quare ex pulsu duro, tanquam à loco proprio colligere poterimus bilem.

Deinde, si conuertamus mentis aciem ad naturales actiones. Ab  
alteratrice deprauata coniicimus corpus biliosis succis affluere. Ab  
expultrice irritata quoque illudmet inferimus, vt plurimum enim bi-  
lioli humores irritant, & pungunt facultatem expultricem. Hinc à ri-  
gore febrili colligimus bilem peccare, quia rigor significat materias  
biliosas per partes sensu præditas expelli, ad differentiam frigoris,  
quod ostendit pituitam, & horrores, qui ostendit melancholiam. Nec  
mihi obiciant Galenum 2. de diff. feb. 3. dicere rigorem aliquando fie-  
ri à pituita acida; quia respondemus rigorem ab acida pituita fieri si-  
ne febre, & caloris consecutione. Hinc Galenus loquens de vxore  
Epicratis obseruauit differentiam inter rigorem biliosum, & pituito-  
sum, dixitque in ea muliere fuisse rigorem sine caloris consecutione,  
quia erat crudis, & viscosis excrementis obfessa, vt solum valeant con-  
sequentiæ hoc modo limitatæ; est rigor cum caloris consecutione, er-  
go bilis; est rigor sine consecutione caloris, ergo pituita acida, & cru-  
dus humor.

Ab exeuntibus excrementis varios locos colligimus ostendentes  
bilem, in primis ab vrina rubra, & flâmæ coniecturam facimus, cor-  
pus biliosis succis scatere. Ab excrementis quoque affectuum exter-  
norum, veluti si in tineâ, vel simili affectione, quod egreditur, est  
pallidum, bilem peccare colligimus, vel si in porrigine materia fursu-  
racea decidens est madida statim bilis indicatur, ad differentiam por-  
riginis à melancholia prodeuntis, in qua summa siccitas obser-  
uatur.

Si verò spectamus qualitates mutatas, se offert flauities in albo ocu-  
lorum, vel in adnata, vnde dominium bilis ilico inferimus; si amari-  
tudinem in ore ægri perferunt, credendum est bilem esse in ventri-  
culo. Præterea si ægrotantes in morbi limine habent faciem colora-  
torem, quam dum sanitate truebantur, coniicimus bilem esse in san-  
guine; quia Galenus, & Hippocrates 2. prædict. 14. habent, quod fa-  
cies coloratior febrientium, vel minetur sanguinis profluuium è na-  
ribus, vel ab aliis partibus, vel abscessum; post aures, vel demum ali-  
quam capitis inflammationem; quæ affectiones præcipuè à bile pro-  
deunt. Denique ex tactu, si perinagnum senties calorem in corporis  
periferia, bilem colliges, si verò in hoc signo, vel in aliis hæsit, illa  
castigare, & roborare poteris facta contemplatione in signis aliorum  
fontium; sicuti (vt exemplis illustremus) si tactu obseruemus in cor-  
poris periferia maximum esse calorem, an ne hoc signum est de illis,  
quæ possent nos fallere? maxima enim caliditas obseruatur quoque in

pituitosis, & in heëticis febribus, quare vt difficultas dicimatur, confugas ad primum fontem, & videas, an causæ procatareëticæ, vt cibus, potus, aër, & aliæ præcesserint calidæ, quia ex iis non febrem pituitosam, sed biliosam colligere poteris; similiter sunt consideranda signa in secundo fonte contenta: ibi enim, si videris ægrum non esse macilentum, vel antequam in ægritudinem prolaberetur, aliquam bilis euacuationem fuisse suppressam, tunc firmiter colliges calorem illum tactu perceptum non à pituita, neque à febre heëtica, sed à materia biliosa pendere. Tandem cognito, causam antecedentem esse bilem, colliges eam esse flauam si mitiora fuerint signa: vitellinam, si validiora: æruginosam, si potentissima.

*Quintus fons  
signorum  
pendentium  
bilem.*

Quintus fons consistit in cognitione locorum affectorum: hæcque cognitio, vt dicit Galenus in limine librorum de loc. aff. solum ab exercitatis in dissectionibus comparatur; secundo enim singulas corporis partes optimè obseruare possumus, quæ læduntur à pituita, quæ à bile, & quæ à melancholia; quare sicuti de glandulis loquentes obseruauimus ob substantiæ raritatem glandulas esse domicilium pituitæ, & à pituita præcipuè lædi, eadem ratione membranæ, cum ob suam densitatem difficile ab humoribus crassis, & viscosis penetrentur, si erunt læsæ, eas non à pituita, vel melancholia, sed à bile, quæ ob eius tenuitatem habet maximam penetrandi virtutem, lædi dicemus: hoc enim est præcipuum fundamentum, cur Hippocrates, & Galenus 6. aphorismorum 33. dixerint pituitosos, vel illos, qui acidum eructant, non fieri pleuriticos. Nos verò addimus quoque pituitosos, & melancholicos, quatenus tales sunt, non fieri phreniticos: quemadmodum enim pituitosi non possunt fieri pleuritici, quia pituita non potest peruadere pleuram, eadem ratione non fient phrenitici, quia pituita non penetrabit piam, vel duram membranam cerebri: quare optimis iis fundamentis suffulti semper poterimus ab inflammatis membranis colligere bilem. Præterea à locis affectis non solum colligemus, quando peccat biliosum genus, verum aliqua coniectura percipiemus, quando peccabit bilis flaua, & vitellina, quando porracea, & æruginosa; etenim, si ventriculus à bile læditur, ea erit vt plurimum porracea, quoniam sedes bilis porraceæ, vt dicit Galenus, est ventriculus; si caput bile læditur, sæpe erit flaua, seu vitellina, quia caput ob suam frigiditatem æruginosam bilem non patitur, si ventriculus læditur bile, sitque animi deliquiū, febris maligna & delirium, sequitur bilem esse æruginosam; sed quoniam hanc specificam humorum differentiam coniectura tantum colligimus, ideo erit opus, vt virtute signorum aliorum fontium contingentiam, & probabilitatem expurgemus.

*Vt à iuuantibus, & lædentibus coli-  
gi possit  
bilis.*

Postremò à iuuantibus, & lædentibus cognoscemus antecedentes causas, quoniam, sicuti quando iuuant calida, & sicca dicimus humores esse frigidos, & pituitosos; similiter dum iuuant frigida, & humida, dicimus calidos, & biliosos in corpore peccare. Ex Hippocrate secundo de ratione vict. 33. habemus, ieiunium biliosis officere, valebit ergo



bit ergo hæc consequentia, nocet huic ieiunium, ergo peccat bilis: similiter Galenus 6. de morb. vulg. 3. tex. 28. dicit, quod biliosi paucitate cibi adaugent sitim, & lassitudinem; valebit ergo hæc consequentia, Socrates cibi paucitate in sitim, & lassitudinem procumbit, ergo est biliosis succis refertus. Denique ex Galeno habemus 3. de ratione vi&t. 38. quibus amara bilis exuperat acerum prodest, ab ipso dissolvitur, & degenerat in pituitam: valebit ergo, iuvat acerum, ergo erit bilioſæ naturæ: posuimus hunc fontem distinctum ab aliis, quamuis in aliis contineatur, quia eo utemur, perinde ac esset in hac inquisitione alter lydius calculus: imitabimur Aurifices, sicuti illi, ut aurum perfectè experiantur, ad ignem, sic nos ad omnes propositos fontes configimus: sicuti illi, dum sine ignis labore illico aurum calculo probant, sic nos dimissa altiori inquisitione virtute huius fontis probamus, an peccent frigidi, vel calidi humores.

---

*Quomodo pituitosorum humorum differentia cognosci possint per  
syndromem signorum communium à rebus non naturalibus desumptorum.*

C A P. V.

**E**ANEM methodo est perquirenda syndrome, quæ possit nobis manifestare pituitosos succos. Eamſæ differentia apud Galenum 3. de loc. aff. 7. & libello de plenitudine sunt quatuor, pituita dulcis, falsa, acida, & vitrea: vnde verò quælibet fiat, dictum est in libro superiori cap. de laportibus & dicitur in sequenti. Quomodo autem humor phlegmaticus, dum in absconditis partibus delitescit, nullumq; proprium sui sensum exhibet, inquitur, supra quoque docuimus, diximusque sex esse fontes, vel locos communes, qui nobis possunt indicare differentias pituitosorum succorum existentium in penitissimis corporis partibus.

Primus fons continebat sex res non naturales refrigerantes: ut igitur rectè sciamus, quanam sint, confugiendum est ad Galenum lib. de causis morb. cap. 3. ubi refert omnes causas refrigerantes ad sex capita; inde enim omnia huic contemplationi conferentia colligemus. In primo cap. collocat adhæsus, vel vicinitates omnium refrigerantium: in secundo ciborum, & potionum quantitatem, vel qualitatem: in tertio stipationes validas in foraminibus factas: in quarto rarefactiones nimias: in quinto ocium: in sexto motiones vehementes & immodicas. Verum, quia nostrum est in hoc loco de causis externis refrigerantibus loqui, ideo ex iis à Galeno propositis eligemus tantum quatuor capita, ad quæ omnes causæ externæ refrigerantes, & disponentes corpora ad pituitæ generationem, reduci possunt, suntque vicinitas refrigerantium, ciborum & potuum quantitas, & qualitas,

ocium, & motus immodicus; ex iis igitur colligemus, quando corpora erunt magis, vel minus disposita ad varias pituitosorum succorum differentias; etenim quanto vehementiores refrigerantes causæ præcedent, tanto magis indicabunt corpus esse dispositum ad frigidiores pituitas; frigidissimæ enim causæ externæ disponunt corpus ad pituitam vitream, minus frigida ad acidam, adhuc minus frigida ad inspidam.

His positis, expedit (si volumus causas refrigerantes cognoscere) distinguere quæ refrigerant per se, ab iis, quæ per accidens; dicit enim Galenus lib. de const. ar. med. cap. 14. quod sæpè frigida per accidens calefaciant, & calida refrigerent habetque hæc verba; spectare ad medicum ut rectè videat, ne in eum illabatur errorem, in quem, qui putant frigidam aquam in omnibus, quæ refrigeratione egent, conuenire; subdit, quia sæpè frigida ex accidenti calefaciunt, & calida refrigerant. Dicimus itaque positiuè, & per se duas solum ex propositis causis refrigerare, alimentum videlicet frigidum, & adhæsum corporum frigidorum: ocium verò, motum immodicum, & reliqua paulo post afferenda ex accidenti: ocium tamen suffocando, motumque immodicum resoluendo calorem refrigerare, omnia enim, quæ ex accidenti habent vim refrigerandi ad duo hæc capita solum reducuntur, ad suffocantia, & resoluentia.

*Qua refrigerant suffocando.*

Ad calorem suffocantia, præter ea, quæ enarrata sunt, alia reducuntur, ut nimia stipatio, nimia quies, vel ocium, nimia coitus abstinencia, nimius cibus, & nimius somnus: ab iis igitur tamquam à quinque locis indicantibus suffocationem caloris colligemus viscerum refrigerationem, & per consequens dispositionem ad generationem pituitosorum succorum. Quod igitur nimia stipatio ex accidenti refrigeret, declarari potest clibani exemplo, etenim in clibano, nisi esset aliquod foramen apertum, unde flāma reuisceret, per suffocationem extingueretur, & inde ex accidenti refrigeraretur: ocium quoque, vel quies ad calorem extinguentia, & suffocantia reducitur, & ratio est, quoniam ex quibus principiis constamus, per illa quoque conseruamur; calor per se trahit originem à motu, per motum ergo debet conseruari: quare cum quies, vel ocium opponatur motui, ocium erit causa frigoris, quatenus reddit partem viuētem priuatam motu & euentatione. Hinc quoque nimia coitus abstinencia, quatenus tollit animantibus motum salubrem, impedit ne dissipentur crassa, & pituitosa

*Sex mala oriuntur à nimia coitus abstinencia.*

excrementa, unde torpores, & sæpè caloris suffocationes sequuntur; quapropter Galenus 6. de loc. affe. & cap. 5. dixit, coitus nimiam abstinenciam sex mala posse hominibus inferre, grauitatem nimirum capitis, cibi fastidium, febris periculum, coctionem diminutam, torporem, & timorem. Præterea impensè somniculosi per suffocationem refrigerantur, quia eorum calor ob somnum immoderatum tanta circumfunditur, & obruitur humiditate, ut rectè non possit euentari, & conseruari. Demum alimentum nimium eo modo suffocat, quo lumen copia olei extinguitur: ex iis igitur causis calorem suffocantibus facile



facile colligere poterimus, corpora impleri pituitosis succis.

Ad eundem modum præcedere debet examen illarum externarum causarum, quæ refrigerant, calorem resoluendo: resoluentia calorem sunt nimia rarefactio, alimenta calidissima, motus immodicus, adhæsus corporis validissimi, nimius coitus, nimix vigilix, & immoderatæ animi passiones, à quibus tanquam à locis per accidens indicantibus refrigerationes, & pituitæ generationem varias differentias pituitosorum succorum colligemus. Rarefactio ex accidenti refrigerat, quia calor ob ineatus nimium apertos non potest detineri, quare quanto magis erunt aperti, tanto frigidior pituita fiet: alimenta calidissima resoluendo refrigerant, quatenus robur resoluunt, vt hinc Galenus 6. aphorismorum 28. de vino potente loquens habet hæc verba, multa, & potentia vina præcipue ieiuno stomacho percutiunt substantiam neruosa eius robur resoluendo: iidem vigilix, & animi passiones potentissima, nimius coitus, quæ ad immoderatum motum referuntur, eneruant proprium calorem, & partem relinquunt frigidam, quia resoluunt spiritus, & calorem.

*Quæ refrigerant resoluendo.*

Reliquum est, vt quæ per se refrigerant, sint (vt diximus) alimentum frigidum, & adhæsus rei frigida, sicuti est aër gelidus, aqua frigida, & cætera extrinseca, quæ adhærendo refrigerant. Supponimus hic cum Aristotele, & Galeno frigus esse qualitatem positiuam, & non priuatiuam, vt perperam sustinuit Hieronymus Cardanus, cuius sententia duobus experimentis clarissimis infringitur: alterum colligitur à Galeno libro de causis morb. cap. 3. dum dicit, quod apud Istrum sub dio frigidissimo, nullo aëre flante, lucerna accesa à frigiditate illa intentissima extinguatur, quod sanè non eueniret, si frigiditas esset qualitas priuatiua: omnes enim actiones prodeunt ex omnium consensu à posituiis, & non priuatiuis efficientibus: alterum experimentum afferimus nos, estque, quia hyeme aliquando vidimus, copiosissimas esse collectas niues, easque adeo velociter ab ingentissimo superueniente frigore (nullis flantibus ventis) absumi & resolui, vt tam breui calida constitutio austrina eas absumere non posset, quod reuera non accideret, si frigus esset solum quid priuatiuum, vt dixit Cardanus: quibus suffulti experimentis merito cum Galeno, & Aristotele locauimus frigus in catalogo causarum positiuarum, & per se.

*Vt reijciatur Cardanus dicens frigus esse quid priuatiuum.*

Ex traditis causis externis per se refrigerantibus colligimus duos locos indicantes pituitam, alimentum nimirum frigidam, & vicinitatem, vel adhæsum frigidi corporis: dicere ergo valemus, præcessit alimentum frigidum, vel vicinitas corporis frigidi, ergo corpus est refrigeratum, & inde facile est, vt pituita sit collecta. Quomodo autem differentia pituitosorum humorum colligantur, à Galeno docebitur 3. aphor. 12. qui volens ex procatacticis colligere pituitæ differentias dicit, insipida pituita sit à pauca præcedente frigiditate: nos vero, vt rationi consonum, colligemus pituitam acidam, vt est frigidior, fieri à fortiori: vitream ab ingentissima præcedente frigiditate, alimenta igi-

*Quomodo ex vin. sex. veris non naturalium colligi possint species pituitosorum.*

rus, vel corpora adhærentia si fuerint moderatè frigiditatis, insipi-

dam pituitam, si frigidiora, acidam, si frigidissima, vitream, quam vocant Praxagoræ aceruabunt. Similem quoque coniecturam colligere poterimus ab iis, quæ per accidens refrigerant, quoniam si de valde suffocantibus, veluti de maxima potionum, & ciborum ingluvie loquemur, dicemus inde viscosam, & vitream pituitam aceruari: si de iis, quæ non adeo vehementer suffocant; dicemus pituitam insipidam, vel acidam aggregari; diximus ciborum præcedentem ingluuiem indicare viscerum calorem esse suffocatum, & inde genitam esse copiosam pituitam; quia copiosum cibum ventriculus, dum non potest arctè amplecti, & vnde quaque atterrere, & comminuere, illum vertit in rudem & imperfectam pituitam, quæ deinde in mesenterium, & iecur restagnans sanguinem imperfectum facit: hic igitur sanguis, si caput, & alias partes petit, vertitur in pituitam modo insipidam, modo vitream, pro vt magis vel minus rudis extiterit chylus; sæpè enim videmus in iis, qui nimium prolixè indulgere cibis, & potionibus à capite expelli pituitam per nates modo insipidam, modo ponticam, quæ si iugi præcipitio procumbat in pectus, in articulos, vel in alias partes, pro vt variis vitiis est imbuta, variè etiam modo percutit, & lacerat viscera: quare si pituitæ læsiones erunt insignes pituitam vitream, si moderatiores, acidam, si adhuc mitiores, insipidam peccare coniiciemus: similiter de resoluentibus dicemus, præcessit motus immodicus, coitus, animi passiones, & cætera, quæ resoluunt calorem, ergo pituita, verum hac lege seruata, vt à diminuto & paucò calore acida, à minimo & ferè extincto vitrea fiat; causæ enim admodum calefacientes aperiendo, & rarefaciendo meatus internos, & externos per accidens partes corporis viuientis refrigerant, quia calor naturalis per expeditos meatus abiit, vnde pituita frigidior fiet, quanto causæ resoluentes fuerint potentiores.

*Vt succi pituitosi innotescant per syndromem signorum desumptorum à dispositione patientis, & à morbis.*

#### C A P V T V I.

**E**X corpore disposito ad generationem pituitosorum succorum facile colligere poterimus pituitæ dominium; signa harum dispositionum desumuntur tum ab antecedentibus, tum à consequentibus. Antecedentium quinque sunt loci indicantes hanc dispositionem, quorum primus desumitur ab hæreditate, filij enim orti à parentibus pituitosis, vt plurimum sunt pituitosi, hæreditarièque mores animi, & corporis parentum sæpè suscipiunt, quod confirmatur experientia ab auctoritate antiquorum desumpta, apud illos enim (vt refert Plutarchus) tantus erat timor, ne filij morbos parentum reciperent, vt consueuerint plures hac superstitione natos ex parentibus rabidis, præseruare, vt scilicet filij detinerent pedes in aqua, donec mortuus pater

*Quinquæ loci  
antecedentes.  
qui ostendere  
possunt cor-  
poris esse dis-  
posita ad pi-  
tuitosos suc-  
cos.*



pater combureretur, ne forſan morbus paternus communicaretur filiis. Secundus locus conſiſtit in ætate ſenili, vt plurimum enim qui ſunt annis obſiti ad pituitoſos ſuccos congerendos ſunt proclives, quia calor ætate illa langueſcit, vnde alimentum non in ſan guinem perfectum, ſed in pituitoſum ſuccum ſæpè cedit. Tertius locus conſiſtit in habitu corporis, continetque ſub ſe tres alios locos, quorum primus eſt habere corpus obefum, obefitas enim ſigniſicat craſſos, & viſcoſos ſuccos congeſtos eſſe: ſecundus locus eſt habere venas exiles, quæ (vt placuit Galeno in ar. med. vbi loquitur de temp. iecoris) oſtendunt iecoris frigiditatem, & per conſequens inclinationem ad congregandam pituitam, quæ frigida eſt: tertius locus eſt phyſiomicus: etenim ex Ariſtorele, qui magnam habent maxillam inferiorem, & ex Auert. qui albos oculos habent obnoxij ſunt pituitotiſ ſuccis. Quartus locus ſumitur à virtute debili, quia virtus robuſta in ægrotante, vt plurimum ſuperequit humores, debilis diminurè coquit, & inde congregat pituitoſa excrementa. Quintus locus, qui eſt omnium certiſſimus, ſumitur ab intermiſſa aliqua conſueta pituitæ euacuatione: etenim, ſi poſt ſuppreſſam euacuationem pituitæ euacuandæ per vomitum, per nares, per aluum, vel per alias partes probabimur in morbum, illico conſiciamus illius morbi cauſam eſſe pituitam.

A conſequentibus diſpoſitionibus corporis quinque ſcaturiunt *Quinque loci* loci indicantes corpus eſſe propenſum ad viſcidos humores: ſcilicet *con equentes* ab actionibus animalibus vitalibus, & naturalibus, ab excrementis *corpus diſpo-* terentis, vel excretis, & demum à qualitatibus ſenſibilibus. Actiones *ſitum ad pi-* animales oſtendentes pituitoſam diſpoſitionem ſunt eſſe ſomniculoſos ſiti non vexari, deiectionumque habere appetitum, niſi fortè pituita acida abundaret, hæc enim comedendi appetentiam excitat æquè, ac melancholia: ſed quomodo hæc cognoſcatur, ex aliis ſignis patebit. Demum ex ſignis reſtricum facultatum cerebri colligitur diſpoſitio hæc pituitoſa: etenim, ſi habent tardum, reuſumque ingenium, illorum capita ſunt pituitoſa: ſimiliter, ſi tardè percipiunt, atque præcipuè, dum ſemel apprehendunt, firmantur in illo, ſintque tales, vt ad alia ægrè tranſeant, ſintque diligentiffimi, vt ſunt Germani, & omnes inhabitantes Regiones frigidas, qui horologia, & multa alia ſumma diligentia efficiunt, ſunt pituitoſi. Poſtremo, ſi mores animi ſpectemus, inferimus ex paucis, vel nullis moribus pituitam, dicebat enim Galenus i. de nat. hum. com. 19. animi aciem à bile, conſtantiam & prudentiam à melancholia, ſtoliditatem à ſanguine prodire à pituita vero nullos mores conſirmari. Quare ſi erunt inſulti, moribusque carentes, inferre poterimus eſſe pituitoſos. A vitalibus deſumuntur hæc ſigna, vt ſcilicet non ſint in iram proni, neque in venerem furioſi, pullique habeant molles, tardos, & ſuffocatos. A naturalibus, vt expultrices, & alteratrices ſuorum munerum officia tardè expleant, ſentiantque cibum in ſtomacho ſæpè eſſe moleſtum: noctuque præcipuè poſt primum ſomnum in horis antelucanis cibo adeo ingra-

uescant, ac paululum ante comedissent, & demum tales à ieiunio summam hauriant vtilitatem, quod experientia quoque ostenditur, quia, quod digeritur à bilioso quatuor horarum intervallo, à pituitoso vix octo horarum cursu concoquitur; bilis enim est humor, qui attenuat, atterit, & promptè expellit. Ab excrementis, videmus per nares, per os, per rissum plurimis corpus scatere viscosis excrementis, salivaeque abundare. Postremò à qualitatibus sensibilibus in toto corpore observamus calorem mitem, colorem album; pilosque fieri cito canos, qui cum Galeno 2. de temp. cap. 5. pituitam significant. Verum plura alia sunt à Galeno in ar. med. & alibi proposita, sed quia hic non est locus agendi de omnibus signis, sed solum tractandi methodum, qua penetrare possumus quando succi pituitosi in absconditis partibus nostri corporis peccent, declarata methodo ulterius de iis signis non prouehar.

*In tertio fonte octo continentur loci ostendentes quando pituita peccat.*

Expensis locis pertinentibus ad viscerum dispositiones. Nunc mentis aciem dirigimus ad tertium fontem, qui continet morbos, nisi enim ab aliis propositis locis morbi disenserint, certissime succos pituitosos alioquin occultos indicabunt. Cum igitur, ex Galeno 3. de crisibus cap. 4. quatuor sint de ratione morbi, Idea videlicet, motus, magnitudo, & mos; rationi erit consentaneum, ut hæc quatuor indicare possint humores ipsos efficientes. Quare cum Idea morbi essentialiter de morbo prædicetur, principales loci in hoc fonte ab Ideis morborum merito colliguntur. Hinc intemperies frigida & humida cuiusque partis, quatenus est affectuum Idea, indicabit pituitam. Similiter hydropis omnes species, quatenus sunt intemperies humidae, pituitam ostendent. Insuper ex pondere, & tumore apostematis duo

*Quatuor loci ab ideis desumpti indicantes pituitam.*

orientur loci, à quibus conicere poterimus pituitam, quia sicuti ex inflammatione sine tumore, & pondere, ut superius ostendimus de erysipelate, & herpetæ indicatur bilis: similiter ex pondere, necessatio colligemus crassos, & viscosos humores: hinc valet consequentia, est lethargus, qui est cum maximo pondere, ergo peccat pituita, est hydrocephalea, ergo frigidus & aquosus humor; est melenterij abscessus, ergo sanguis valde pituitosus: hic abscessus reuera est cum ventris pondere & ob melenterij situm sine vlllo externo & apparente tumore: huncque affectum, dum medicum agerem in Ungaria non semel tractavi, quia homines ibi nimium prolixè indulgentes poculentis, & esculentis in melenterij affectum facillè prolabantur, quod Italici, & Hispani raro contingere videmus: quin immo fateor in Italia abscessum melenterij me hætenus non vidisse. Præterea à morbis glandularum illico inferimus (nisi alij loci aduersentur) causam esse pituitam, quibus positis, valebit, sunt strumæ, ergo pituita, est bubo in glandulis inguinum, vel axillarum, ergo pituita.

*Tres loci ori à motu morbi indicantes pituitam.*

Præterea à motu morbi oriuntur tres loci, quorum primus est à motu totius morbi, estque quatenus sunt cronici, vel acuti, id est tardi, aut veloces, valet enim consequentia, morbus est cronicus, & tardus motus, ergo pituita, vel melancholia peccat: cognoscemusque primis diebus motum totius morbi fore tardum ex moti principio

tardo,



ardo, cognoscemusque huius tarditatis causam esse pituitam, & non melancholiam ex signis aliorum fontium, quia hic non per vnicum signum in re difficili est incedendum, sed per signorum syndromem, quæ sola vehere potest nos ad veritatis apicem. Secundus locus oritur à motu periodicationis, ostensum est libro 5. cap. 4. & 5. inuasionem de tertio in tertium bilem, de quarto in quantum melancholiam, & quotidianam ostendere pituitam. Tertius locus desumitur à tarditate paroxysmorum, etenim paroxysmi, si erunt tardi motus, indicabunt crassum, & lentum succum dominari.

Cæterum, quia paroxysmi longi non semper fiunt à lentis succis, cum dicat Galenus 2. de differ. feb. 11. longas accessiones fieri vel ob multitudinem materiæ, vel ob crassitiem, & lentorem, vel ob imbecillitatem potentie, vel ob angustiam meatuum. Idcirco, vt hanc veritatem certò consequamur, duæ sunt viæ, quibus inuenire possumus, quando tarditas paroxysmi à melancholia, vel à pituita, vel ab alia causa fiat; altera consistit in argumento ex sufficienti part. enumeratione, percurrendo scilicet per omnia membra diuisa, nullamque committendo principij peritionem, probando per signa propria, vel communia bilis superius proposita non esse ob multitudinem bilis; & deinde non esse ob crassitiem melancholicam, non ob imbecillitatem, neque ob meatuum angustiam; etenim his omnibus membris exclusis quisque inferre poterit paroxysmum esse tardum ob lentorem pituitæ: si vero aliæ tarditatis causæ nobis se offerrent, veluti sunt illæ à Galeno propositæ 3. prælag. 28. dum dicit, longam febrem fieri ob tres causas, scilicet aut propter aliquam particulam malè affectam, cui ægrè curatio adhibetur, aut ob crudos, & crassos succos, aut ob errorem commissum; simili modo procedimus, quia primo argumentari possumus non esse ob errorem commissum, neque ob particulam malè affectam, neque ob melancholiam, quibus exclusis inferimus esse ob pituitam, eodemque modo in omni consilij angustia procedemus: altera via consistit in recto examine syndromis signorum omnium humorum: etenim est omnino impossibile, quod syndrome signorum ostendentium pituitam respondeat melancholiz, & versa vice.

*Dua metho-  
di quib. scire  
possumus  
causam tar-  
ditatis paro-  
xismi.*

Insuper est locus ab horis nocturnis; si mouetur humor meridiæ, est bilis; si vesperi, erit melancholia, vt in iis, qui afficiuntur lue gallica, obseruatur: si media nocte, erit pituita: dicit enim Galenus 12. meth. cap. 5. qui ex crudis succis laborant, hos quotidie accessiones exercent, præcipueque ad vesperam, & noctu, non mane, nec vique ad meridiem: per crudos succos Galenus intelligit crassos, & viscosos, per crassos intelligit melancholiam, per viscosos pituitam, crassi moventur vesperi, visci noctu: colligas ergo, quod in morbis octo præcipui obseruentur loci ostendentes pituitæ dominium, quorum primus est desumptus ab Ideis, vt ab intemperie frigida, & humida. Secundus ab inflammationis pondere. Tertius à tumore inflammationis. Quartus à morbis glandularum. Quintus à motu totius mor-

*Locus ab ho-  
ris nocturnis  
ostendens pi-  
tuitiam.*

bi. Sextus à motu periodicationis. Septimus à motu vnius paroxysmi. Octauus ab horis nocturnis. Ab his signis optimè colligere poterimus, quando morbi fiant ob pituitam.

*Ut pituitosi succi præcognoscantur per syndromem signorum communium desumptorum à symptomatis locis affectis, & à iuuantibus & lædentibus.*

# C A P. VI.

**T**ANDEM loci, qui commodè nobis inseruiunt pro cognoscendis pituitosis succis, desumuntur à symptomatis, locis affectis, & à iuuantibus, & lædentibus: symptomata sunt actiones læsæ, excrementa, & qualitates mutæ: actiones verò sunt Animales, Vitales, & Naturales. Ab Actionibus animalibus reëtricibus, & non reëtricibus læsis colligere poterimus pituitæ redundantiam; à Reëtricibus, velui à memoria deperdita, ab ingenio repente factò obtuso, ab apoplexia, caro, comate, eatocho, ab omnibus iis morbis sæpissimè colligemus lentos, & viscosos succos.

*Dub.*

Verum statim exurgit dubitatio, quia, si exempli gratia de causa memoriæ deperditæ ageretur, non valeret hæc consequentia, memoria est deperdita, ergo pituita dominatur, quia causa huius affectus non solum potest esse pituita, verum etiam ingens aliquod externum frigus; similiter, si de apoplexia dubitaremus, non videretur bona hæc consequentia, est apoplexia, ergo pituita redundat, quia licet ut plurimum apoplexia fiat à pituita, attramen est Galeni sententia 6. aphorismorum § 6. quod aliquando fiat à melancholia; occurrimus concedendo locos à symptomatis, vel à morbis non posse nisi iunctos cum aliis locis antecedentibus & consequentibus ostendere absolutissimam illam cognitionem, quam quærimus, quare, si pendet animus, dum ex memoria deperdita pituitæ redundantiam inferimus, facilè omnem dubitatem auferemus, si rectè viderimus locos aliorum fontium non reluctari, vel non esse discordes, sed omnes in eandem veritatem conspirare. Etenim si viderimus ante memoriam deperditam præcessisse alimenta copiosa, & frigida generantia pituitam, incipiemus confirmari, quod memoria deperdita à pituita procedat, sed quoniam res non naturales, nisi corpus sit dispositum, non imprimunt vestigium aliquod, ideo, ut certiores redderemur, posuimus in secundo fonte varios locos, quibus melius confirmaremur, ibi enim exquirimus locos pituitam arguentes, quos si inuicem non viderimus dissentire, certum & exploratum iudicium faciemus: loci non dissentientes essent, dum simul videremus ægrum habere venas exiles, esse ortum à parentibus pituitosis, & interceptam esse consuetam pituitæ euacuationem, eam cognitionem ab hac concordia locorum colligemus, quæ scientiæ demonstratiuæ æquiparari poterit.

*Qua methodo cognoscitur quando memoria læsa causa sit pituita.*

*Simi-*



Simili modo de causa apoplexiæ est dicendum, quia, quamvis ut *Vi cogno sci-*  
plurimum pituita crassa, & copiosa tollat actiones rectrices anima- *tur quando*  
les, nihilominus hoc aliquando à melancholia, à copioso sanguine, & *apoplexia fit*  
ab aliis causis potest prodire. Idcirco tot locos proposuimus, quot *à pituita.*  
sufficerent ad tollendam omnem ambiguitatem; etenim, si apoplexia  
fieret à melancholia, esset necessarium, ut loci primi, & secundi fontis  
illud manifestarent, veluti, si de primo fonte loquimur, dicimus lo-  
cum desumptum à cibo crasso iunctum cum loco desumpto ab aëre  
feruentissimo arguere posse illam melancholiam, quæ est fæx adusta.  
Galenus enim secundo ad Glauco. cap. 10. ex alia causa noluit elephan-  
ticam melancholiam, quæ est fæx adusta, prodire, quam ex cibo cras-  
so, & aëre feruentissimo. Mox expensis locis causarum externarum  
examen fieri potest in secundo fonte, ostendendo habitum non esse  
melancholicum, ægrum non esse lienosum, non fuisse antea passum  
biliosos morbos, qui forsitan in melancholiam degenerauerint, non  
fuisse suppressas hæmorrhoidas, parentisque non fuisse melancholicos,  
quibus conditionibus seculis, inferri certa scientia poterit, il-  
lam apoplexiam non prodire à melancholia, sed potius à pituita: ve-  
rum, si in animo vigeret scrupulus, & adhuc videretur non eminere  
omnem claritudinem, cum apoplexia à sanguine, à lumbricis, & ab  
aliis causis fieri possit; tunc confugere expedit ad locos à quibus pi-  
tuitæ dominium colligimus, quia ibi statim inueniemus, an procatar-  
ctica frigida, & humida præcesserint, an consueta euacuatio pituitæ  
sit suppressa, an ætas senilis sit, & demum confirmabimur per locos à  
iuuantibus, & lædentibus desumptos, si enim à calidis & siccis, à ieiunio  
æger leuamen sentiat, statim iudicabimus apoplexiæ causam esse  
pituitam.

Præterea sunt alia plura symptomata pertinentia ad actiones ani- *Symptomata*  
males, quæ, si erunt tradita methodo expurgata, certo indicabunt pi- *animalia ou-*  
tuitam, valere enim videntur consequentia, est coma, ergo pituita *stenduntia*  
peccat, est conuulsio, ergo lenti, & crassi succi, ut placuit Galeno 5. *pituitam.*  
sec. aph. 70. est paralytis, stupor, ergo pituita, & quamvis stupor à me-  
lancholia aliquando possit fieri, omnem euellere dubietatem, si ex-  
penderis locos pertinentes ad melancholiam, & pituitam ostensionem:  
ad eundem modum ex tremore ut plurimum inferimus pituitam, &  
perbellè præcognoscemus tradita methodo, quando à melancholia  
procedet. Insuper, si viderimus, ægrotantem affligi dolore grauati-  
uo, inferemus pituitam ipsum vexare. Similiter, si quis fuerit obses-  
sus colicis doloribus, ut plurimum iudicabimus pituitosum succum  
acidum, vel vitreum esse doloris auctorem; verum, quia aliquando  
colica passio à bile prassina, vel à melancholia fieri potest, ingenij a-  
cumen in his symptomatibus pro viribus est exacuendum, quod fiet  
cribrando omnes locos declarantes melancholias, & biles.

Verum pro maiori declaratione proponamus casum colicum, sit  
paciens temperamenti pituitosi, qui sit vsus nimio coitu, isque paulo  
ante animi passionibus turbulentissimus sit implicatus, & concussus, *Quamethodo*  
*cognoscatur*  
*peccat humor*  
*in colica pas-*  
*sione.*

atque illius naturæ fuerit, ut ob ieiunium non leuamen, sed lassitudinem semper maiorem acquireret, fueritque prolixè admodum usus aqua frigida, & esculentis calidis, & paulo ante biliosis affectibus fuerit inuolutus: deinde huic accidat colica passio, accidatque sitis nimia; quid diceret de causa efficiente? quomodo te in peruestiganda gereres, nisi proposita methodo incederes? an-ne, dum diximus patientem esse temperamenti pituitosi, inde quoque dicemus esse valde dispositum ad congerendam pituitam? & si inuenerimus aliquod signum consequens pituitæ dominium, colligemus necessario ægrum illa passione contorqueri ob pituitam? Similiter, si inuenerimus indulsisse potioni frigida, an-ne inferre poterimus pituitam acidam? & ubi signa antecedentia, vel consequentia fuissent validiora, vitream rursum, si inuenerimus ægrum perpeßum fuisse animi passiones insignes, vltimumque esse coitum, & obsonijs calidissimis, an-ne inferemus pituitosis succis succos calidos, & biliosos confarctos esse, qui potuerint facere truciorem colicam passionem? verum omnino confirmabimur, si viderimus signa consequentia biliosa sequi, veluti ægrum febre, & siti insigni vexari, vel confugiendo ad postremum fontem, qui est de iuuantibus, & lædentibus, ob ieiunium scilicet, & inediam, lassitudinem, & dolorem truciorem fieri. Cæterum, si vis quoque altius penetrare, qua bile æger hic vexetur, flaua, vitellina, porracea, vel æruginosa, hac via exquirere debes, dicendo non esse flauam, quia hæc bilis est mista cum pituita, quæ mistura in ventre, vel intestinis facit porraceam: est enim Galeni vulgata sententia, porraceam fieri in ventriculo ex mistura bilis cum pituita; comprehensa hac peccante causa, deinde prælagies summa cum astantium admiratione fore, ut paulo post per alium vel per vomitum ab ægrotante excernatur porracea bilis; prælagiesque si temporis longioris tractu hæc bilis à calore præter naturam aduratur fore, ut excernatur per alium æruginosa bilis, si sanus fieri debeat; quo diutius enim moratur bilis in ægrotantibus, eo deterior fit.

*Ut ab insomnijs colligi possint humores peccantes.*

Ab animalibus actionibus læsis, ut à somniis niuium, glaciei colligitur pituita: audias Galenum primo de morb. vulg. com.; text. 1. si aliquis in somnijs videt imbres, niues, & grandinem, signum est abundare frigidum humorem, si incendium flauam bilem, si somniat se esse in foetido loco putredinem humorum; si cristas gallorum rufas videt, signum est abundare sanguinem. Demum colligimus differentias pituitosorum succorum per signa tradita à Galeno libro de plenitudine cap. 11. ubi dicit somnolentos indicare dulcem pituitam: famelicos acidæ redundantiam: siticulosos salis, & appetitus amissionem

*Quamethodo potuit Galen. inuenire Antipatri Medicum habuisse tuberculum.*

crudæ pituitæ dominium indicare. A vitalibus actionibus læsis quamplurima scaturiunt symptomata quæ arguere possent crassos, & frigidos humores, veluti erat illud symptoma Antipatri Medici, qui, ut refert Galenus 4. de loc. aff. vltimo, habebat magnam pulsus inæqualitatem, & difficultatem respirandi. Ex hoc symptomate optima ratione Galenus colligere poterat in magnis arterijs esse factam angustiam ab humo-



ab humoribus crassis, vel à tuberculo in vasis spiritalibus oborto: verum ab vtra ex illis causis fieret illa angustia in Antipatro, & qua via illa cognosci possit, mihi videtur quod ex propositis fontibus eam commodè assequi potuissimus: exempli causa, si à nobis obseruatum esset Antipatrum Medicum solitum non fuisse in errores illos exterritus, qui pituitam augent, prolabi, vel non habuisse conditiones disponentes corpus ad pituitosos laqueos, nec demum vlla conspirasse signa, quæ consequuntur pituitæ redundantiam: iis visis cum Galeno potuissimus firmiter tenere in Antipatro angustiam à tuberculo, & nequaquam ab humoribus crassis ortam fuisse; quando enim ob duas tantum causas oriri potest affectus, & altera illarum excluditur, sequitur necessario, vt causa non exclusa sit illa, quam quærimus, & quæ efficit affectum.

Sed conuertamus eundem stylum in naturalia symptomata, in primis semper colligimus ab alteratrice diminuta pituitam redundare, per diminutam non intelligimus impeditam, sed imbecillam, & quæ ab Aristotele 4. meteorum dicitur *μολυσις* & quæ opponitur optimæ elixationi: ait enim philosophus *μολυσις δ' ἀπὸ πῶς μὲν ὅλη αἷμα δ' ἐξ αὐτοῦ* ex hac enim alteratricis facultatis imbecillitate generatur pituita, quæ est semisanguis, generaturque ille succus, quem vocat Aristor. *ἰσχυρὸν* id est crudum & immaturum, ad differentiam illius succi incocti, qui dicitur *ἀπαρῶς*, qui (vt placuit philosopho) prædicatur de diminutè cocto, & de supercocto, quando igitur erit hoc modo imbecillis alteratrix facultas, faciliè colligemus pituitæ redundantiam, quia alimentum in iis prius in pituitam, quam in sanguinem abeunt.

Ab expultrice quoque diminuta colligimus pituitam, munus enim promptè expellendi excrementa demandatum est biliosis succis: sæpè tamen occurrit, vt loci isti seorsum considerati non sint æternæ veritatis, quoniam aliquando accidere solet, vt expultrice sit irritata non à bile, sed à pituita acida, vt docet Galenus in casu vxoris Epicratis, quæ mulier passa est rigorem sine caloris consecutione, rigor enim fit à expultrice irritata, valet ergo apud Galenum hæc consequentia, rigor superuenit sine febre, & caloris consecutione, ergo pituita acida est illa, quæ pungit partes corporis sentientes, nullus est alter frigidus, crudus, & pituitosus humor, qui sine caloris consecutione habeat vim irritandi expultricem, nisi acidus, falsa vero, si pungit, id facit cum caloris consecutione, rigor verò à bile factus differt à rigore procedente ab acida pituita, quia si bilis pungit partes sentientes, necessario corpus seruescat oportet, quod non euenit, si pituita acida vellicat partem sensu dominatam.

Denique à nutritione diminuta, vel ablata, vt est atrophia, sæpè colligimus pituitam mucosam; dicit Galenus 2. de fac. naturalib. 9. mucus sanguinem nutrire impedit: verum, quia atrophia potest fieri ab intemperie in habitu, percurramus (vt diximus superius) per propositos fontes, vt auferatur ambiguitas; tot loci enim ea de causa preponuntur, vt in qualibet consilij angustia eorum plures simul

*Vt ab alteratrice diminuta colligitur pituita.*

*Vt ab expultrice irritata colligitur pituita acida.*

*Vt à nutritione laesa colligitur pituita.*

coniungamus; iuncti enim necessario indicabunt, quia sunt humores peccantes.

*A quibus exeuntibus colliguntur pituita.*

Ab exeuntibus coniicimus pituitam redundare, ut ab vrina alba cum multo sedimento inferimus statim pituitam peccare: à vomitu albo, & viscoso illico colligimus corpora pituitosis succis grauati: ex albis vteri profluuiis pituitosum succum altas habere radices cognoscimus; an verò hæc pituita in vterum procumbens, vel in alias partes à stomacho, à capite, à toto, vel ab vteri acetabulis originem primariam trahat. colligi poterit à locis pro cognoscendis partibus affectis propositis in libris superioribus. Præterea ab exeuntibus cutaneis albis, viscosis, veluti dum corpus madoribus diffluit, non decipiemur, si inferemus, tunc pituitam dominari; hinc si in tinea, vel simili affectione cutanea videmus, exiens esse viscidum, dicemus cum Alexandro capite de tinea, pituitam illius affectionis esse causam; si verò sudor erit salus, dicemus cum Auerroë prima canticæ tract. 2. text. 338. pituitam salisam dominari, si dulcis, sanguinem, si acerbus, & austerus erit sudor, melancholiam. Nec Mercurialis libro 3, de excrementis capite primo rectè obicit Auerroë, sudorem scilicet sua natura salsum esse, quia nos dicemus Auerroë intellexisse de insolita sudoris falsedine. Insuper, si sputum erit album, crassum & rotundum; valebit dicere, ergo est assata pituita, de qua re loquens Galenus 2. prognost. cap. 46. habet, quod quādo hoc sputum apparet, sit signum læthale. Demum dum egreditur ab oculis serosa humiditas, ut in epiphora euenire solet, aquosam pituitam colligimus; an verò sit mista bilioso succo, vel salso, vel pontica melancholia, eas (ut hoc exploremus) seruabimus normas, quas superius docuimus in perquirenda colica passione: per hypothelium; si quis haberet epiphoram, isque multo ante vidisset lacte, & aliis esculentis calidis & crassis, & calidam inhabitasset regionem, an-ne ex iis procatarteticis suspicari inciperemus, serosam humiditatem effluentem ex oculis mistam esse melancholico humore? an-ne, si in ipso explorarem aliquam conditionem disponentem corpora ad melancholicos succos, eo certiores redderemur & demum si in tertio fonte, qui est de morbis inueniremus ægrum esse lienosum, vel alium affectum melancholicum pati, nunquid non certissimi essemus, serosam humiditatem facientem epiphoram mistam esse ichoribus melancholicis? videas ergo quo pacto per fontes propositos sit facile inuenire in quolibet affectu præter naturam quamlibet speciem humorum peccantium. Postremo sunt qualitates mutaræ, colligimus enim ab albo colore, ab externo si gore, & à plurimis aliis superius citatis pituitæ dominium.

*Methodus inueniendi quando epiphora sit ab ichoribus melancholicis.*

A partibus affectis colligimus quinque locos ostendentes pituitæ redundantiam, suntque glandulæ, cerebrum, ventriculus, pulmo, & articuli: hinc si viderimus glandulas esse effectas, dicemus statim inquinamentum esse pituitosum, idcirco, si tactu cognouerimus esse tumidas glandulas circa inguina, guttur, axillas, vel collum, quæ vocantur *glandulæ*, vel circa alias partes, illico dicere poterimus corpus affluere pituitæ.



re pituitosis excrementis. Solers enim, & alma natura instituit adenas, vel glandulas internas, & externas, ut excrementosa pituita redundantis essent domicilia: duum generum sunt glandulae, internae, & externae, externae sunt omnibus conspicuae, & manifestae, & nulla methodo, an sint refertae excrementis, egent, ut perquirantur; internae sunt explorandae methodo, quam tradidimus pro cognoscendis locis affectis internis; inter internas, quae possunt repleri, in primis adest glandula capitis, quae iacet sub calloso corpore, quae assimilatur pinæ, quae veteri consuetudine dicta est conation: estque alia ibidem cuneali osse circumsepta, in quam (ut dicit Galenus) restagnant vniuersa excrementa cerebri pituitosa, quae deinde per os, & per nares percolantur; ex harum igitur glandularum affectionibus colligimus pituitam redundare. Adhuc plurimae sunt glandulae in mesenterio, quae imbibuntur crassis, & viscolis succis, quas glandulas re vera si affectas esse cognouerimus, non solum pituitam, illius affectionis causam esse posse, iudicare poterimus; verum etiam melancholiam; pituitam, ratione proprietatis glandularum, quae hac sorte effectae sunt, ut sint propria receptacula pituitosorum succorum; melancholiā, quia quaelibet glandula mesenterij circumdat aliquem venae portae ramulum, à quo exprimi potest in glandulas crassus, & melancholicus sanguineus ichor: quinimo si copiosus in glandulas pancreas vocatas exprimitur, fieri potest passio hypocondriaca. Quo pacto vero ex laesis iis glandulis colligitur pituita, vel melancholia, per syndromem aliorum locorum, rem adeo certam reddere poterimus, ut nihil sit quod amplius dubitemus. Praeterea plerisque aliis in locis sunt glandulae, quarum affectiones ostendunt pituitam, veluti ubi flectimus genua, in collo vesicae, in duodeno intestino, in omento, in quo pancreas habent suam sedem, & demum ubicumque vena, vel arteria aliqua bipartitur, solers natura in diuisionis centro glandulam amplectentem ambobus furculos locauit, ne ramuli frangerentur. Postremo cum mamillae, & testes sint in glandularum catalogo collocatae, ex iis laesis ut plurimum pituitosum succum redundare colligimus.

Ceterum non solum ex glandulis laesis incipimus suspicari pituitam abundare, verum etiam ex aliis praecipuis corporis partibus affectis; habemus enim ex Hippocrate libr. ne glandulis, caput esse pituitae metropolim, quare facile contingere potest, ut in qualibet laesione capitis concurrant quoque pituitosi succi, quinimmo ægritudines, quae conueniunt propriè, & per se capiti, necessario à pituita pendere debent, non à bile, vel à melancholico succo per se, quia non fiunt à capite, sed à subiectis visceribus mittuntur, ergo per accidens & per consensum, & non primo laederetur caput ab iis succis, per se tamen à pituita, quia in capite pituita fieri potest.

Eadem ratione dicimus pituitam colligi posse per se, & semper à laeso ventriculo, quia eius munus est quoque pituitam generare, & non bilem, vel melancholiam, ut valeat consequentia, laesum est caput, & ventriculus per se primo, ergo pituita est laesionis causa, qua me-

*ut à capite  
per se laeso  
colligi possit  
pituita.*

*ut à ventri-  
culi per se &  
primo laeso  
colligitur pi-  
uita.*

thodo vero sit incedendum, ut cognoscamus, quando pars aliqua corporis sit læsa primo, & per se, declarauimus in 2. lib. cap. 3.

*Vi à pulmone  
læsa colligitur  
pituita.*

His adiungimus pulmonem, tamquam pituitæ receptaculum, quia excrementa pituitosa cerebri iungi præcipio procumbunt primo in glandulam ossis cunealis, deinde in os, & per alia foramina in foramen trachæ præcipitant, & tandem in pulmone colliguntur, sæpissimè enim accidit, ut læsiones pulmonis oriantur à pituitosis excrementis.

*Vi ab articulis læsis colligitur pituita.*

Addas denique articulos læsos, quia ut plurimum valet, articuli sunt malè affecti, ergo pituita; hinc quæ pituitam augèt arthritide cætenatis sunt maxime infensa; non admittimus tamen Fernelij sententiam, quod podagra fiat solum à pituita, & nunquam à cæteris humoribus; nec contra Fernelium disputamus, tum quia hic non est locus de hac re verba faciendi, tum quia de hoc egerunt plurimi præstantissimi auctores, inter quos est percelebris Æmilius Cæpionigius vir dignitate, scientia, ingenio, & innumerabilibus virtutibus exornatus. Satis erit nobis colligere, quinque esse præcipuos locos à partibus affectis desumptos, qui nobis ostendere possent pituitæ redundantiam, suntque glandulæ, cerebrum, ventriculus, pulmo, & articuli: verum, quia sæpe loci seorsum expensi probabiles sunt, concludimus probabilitatem peroptimè expurgari per syndromem signorum ex aliis fontibus collectorum.

*Quinque loci  
à iuuuibus.  
Glandentibus  
collecti indi-  
cantes pitui-  
tam redun-  
dare.*

A iuuuibus & lædentibus quinque hauriuntur loci, qui saltem lectorem illico excitabunt in pituitosis succis cognoscendis: primus est examinare an pituita euacuatio iuuet, quoniam si iuuauerit, nemo audebit dicere, patientem non abundare pituitosis succis. Secundus locus illud idem demonstrans, est iuuari à calidis & siccis, valebunt ergo consequentiæ, iuuatur ab euacuatione pituitæ, & à calidis & siccis intus, vel foris administratis, ergo est pituitosus; similiter læditur à frigidis, ergo est frigidus, & phlegmaticus. Tertius locus desumitur à ieiunio, si enim ieiunium facile ferunt sunt pituitosi Galeno auctore 2. de ratione vi & rex. 32. Similiter dum tollitur ieiunio lassitudo, & sitis, indicatur pituita: est Galen. auctoritas 6. de morb. vulg. com. 3. rex. 28. si ieiunium tollat lassitudinem, & sitim homines abundare pituitosis succis. Quartus locus est à somno desumptus, nam si somnus tollit sitim, valet, ergo pituitosus sanguis abundat; ratio huius consequentiæ diuinitus à Galeno 6. de morb. vulg. comm. 4. rex. 23. iis verbis traditur, somnus tollit sitim, quia in somno sanguis humectat partes internas, quas petit; quare, si sanguis esset biliosus, calidus nimirum & siccus partes internas, & os ventriculi non humectaret; sed exsiccaret, & sitim augeret. Quintus locus à febre colligitur, dum iuuat, valebit semper consequentia, iuuat febris, ergo pituita, est Galen. auctoritas 6. aphor. 44. nouimus febrem illis tantum morbis conferre, qui ex frigidityte sunt sola, vel cum humoribus crudis, & flatuosis spiritibus: similiter 4. aphor. 57. Hippocrates dicit febrem soluere. spasmus, & tetanum, quæ ægritudo à frigidis humoribus fit: videas ergo



ergo quam solidos hic postremus fons contineat locos, qui nobis indicare, deiegere, & aperire possunt humores pituitosos alte repositos, & tenebrarum velo obductos, quique (si cæteri fontes non dissenferint) poterunt demonstratiuam scientiam parere.

*Quomodo omnes Melancholicorum succorum differentia cognosci possint per syndromem signorum communium à rebus non naturalibus desumptorum.*

CAPVT VIII.

**E**ADEM via est perquirenda locorum syndrome, quæ nobis possit manifestare melancholicos humores: tres sunt melancholicorum succorum differentia, vt colligitur ex Galen. 3. de loc. aff. cap. 7. & ple-  
*Tres esse melancholia differentias.*  
risque aliis in locis, alia est veluti fæx sanguinis fæcibus vini haud ab-  
similis non adusta: alia est bilis flaua supra modum assata, alia est melancholia, quæ est fæx sanguinis adusta. Hæ differentia quomodo fiant adeo est manifestum, vt non sit, quod de generatione horum humorum loquar: omnes sciunt fæcem melancholicam à cibo crassiori prodire, atram bilem (vt dicit Galenus) à bile flaua superassata: similiter fæcem melancholicam adustam ab efficiente calidissimo interno, vel externo.

Nostrium est vt in hoc libri vestibulo traditam methodum iterum experiamur, quia inde faciliè colligere poterimus, quando in agrotantibus peccabit melancholia, quæ est fæx sanguinis non adusta, quando atra bilis, quæ fit ex flaua superassata, & quando adusta fæx melancholica: exequamur ergo propositum, & confugiamus primò ad procataceticas causas, quæ disponunt viscera ad generationem melancholicorum succorum. Procataceticæ causæ disponentes viscera ad melancholiam duum generum sunt, calidæ scilicet, & frigida: quia duæ melancholiæ species sunt calidæ, & alia est frigida: calidæ sunt atra bilis facta à flaua superassata, & fæx sanguinis adusta: melancholia verò, quæ sua natura est frigida, vt dicit Galenus lib. de trem. & pal. cap. 7. est naturalis fæx sanguinis, quæ copia tantum peccare solet, etenim homo sine hac (vt dicit Galenus libro 5. de vsu par. capite 4.) nullo modo viuere posset. Calidæ procataceticæ melancholiam augentes, de quibus vberimè Galenus egit libro de atra bile cap. 6. Omnes, quotquot sunt, referri possunt ad tria suprema capita, ad motum scilicet, ad vicinitatem corporum calidorum, & ad cibum, & porum calidum. Ad motum (vt diximus superius) referuntur vigilie, coitus, exercitia, & omnes animi passionnes, dicimus omnes animi passionnes, quia Galenus 1. de diff. feb. cap. 3. vult non solum iram, verum etiam mærores, qui sunt affectus contrarij, vim habere calefaciendi, & exurendi humores, donec melancholici fiunt: famosa enim est historia ab Hippocrate relata de Muliere terrena, quæ ob nimios animi mæro-

*Vi mæstitia  
gignant hu-  
mores melan-  
cholicos. &  
adufios.*

resauit humores adustos, & melancholicos: modus vero, quo mæstitiæ adurunt humores, traditur à Galeno 4. de causis pul. cap. 4. & 1. de hum. cap. 1. vbi dicit, mæstitiam calefacere, quia contrahit calorem ad internas partes, quo contracto intensius exurere sanguinem, & spiritum. Frigidæ vero sunt vicinitas corporum frigidorum, alimentum frigidum, motus immodicus, & nimia quies, ad quam referuntur nimius somnus, & nimia coitus abstinencia: dicit Galenus 6. de loc. aff. cap. 5. nimiam coitus abstinenciam inducere torporem, & diminueret coctiones, & homines melancholicos reddere, & per consequens refrigerare: quare, si viderimus ægrotantem melancholicum, & ignorauerimus, an melancholia sit calidâ, vel frigida & sicca, ex præcognitis his procatacticis colligemus locos, qui nobis hoc ostendere poterunt, dum enim Galenus dicit abstinenciam coitus reddere homines melancholicos, intellexit de melancholia, quæ sua natura est frigida, & sicca, & quæ est fæx sanguinis, dum enim semen continetur, augetur sanguis, & per consequens fæx ipsius. Hi loci vniuersi consistunt in hoc examine, vt videamus, an præcesserint causæ procatacticæ calidæ, vel frigidæ, colligemus ægrotantem facie melancholica non adusta abundare, quæ melancholiæ species (vt colligitur à Galeno libro de inequali intemp. cap. 5. 2. de temperamentis cap. vlt. & 3. de loc. aff. 7. & 2 prælag. 47.) est frigida & sicca. Tanti erit horum locorum examen, vt in affectibus melancholicis, si quis illo non vtratur, facile ignorare poterit melancholiæ differentias, & per consequens præposterè curare ægrotos, quia melancholia, quæ est fæx sanguinis indicat calefacientia, cæteræ verò calidæ, & adustæ indicabunt refrigerantia.

*Quatuor loci  
indicantes  
specificam me-  
lancholicorum  
succorum dif-  
ferentias.  
Primus ab  
aëre.*

Loci verò valde viles pro cognoscendis specificis melancholiæ differentis, tres ex hoc primo fonte colligi possunt, quorum primus desumitur ab aëre calido & feruente; etenim, si affectibus melancholicis anteuerit aër æstuosus, igneque pene emicans, inde certò colligemus melancholiam non posse esse frigidam, & siccam, sed calidam & adustam; an vero sit, quæ ex flaua superassata, vel quæ ex facie adusta sit, hoc facto examine cognoscetur, scilicet si cum aëre feruido, vel alia extrinseca causa calida anteuerit vsus crassorum ciborum, necessario colligemus melancholiam illam esse faciem adustam, si vero calida procatactica anteuerint sine esu crassorum esculentorum, dicemus atram orram ex flaua superassata redundare.

*Secundus lo-  
cus à cibo.*

Hinc oritur secundus locus in hoc fonte, qui est à cibo, & potu crasso desumptus, est Galeni 1. de loc. aff. 7. cibum crassum, vt est caro bubula, aprina, limaces, brassica, lens, gignere melancholiam, quæ est fæx sanguinis: similiter subdit Galen. loco citato vinum nigrum, & crassum apertissimum esse ad gignendam melancholiam: à cibo igitur & potu crasso faciem melancholicam colligemus, cognoscemus tamen faciem non esse adustam ex hoc præcognito vsu ciborum, & quando causæ externæ calidæ non anteuerint; adustam vero, si cum cibo crasso præcesserint quoque procatactica calida, sicuti est aer æstuo-

sus;



sus, exercitium immoderatum, & vsus pharmacorum calidorum; est enim Auicennæ opinio, quod sepius homines fieri possint melancholici ob vsum pharmacorum calidorum; duos hos locos colligimus à Galeno 2. ad Glau. cap. 10. dum adfert causam, cur multi in Alexandria patiantur Elephanticum affectum; in Germania, Mysia, & Scythia ferè numquam hunc affectum apparuisse; dicit, quamuis æquè, qui incolunt Germaniam, Mysiam, & Alexandriam comedant cibos crassissimos, attamen ob aëris frigiditatem in Germania, & Mysia hos melancholicos non fieri: colligere ergo possumus duo requiri ad generationem fecis adustæ, primum cibos, vel potiones crassas. Secundum intensum aëris calorem; omnis sanè calor externus potest adurere humores, aërem tamen, quia perpetuo corpus ingreditur, & quamlibet partem penetrantem citius, & valentius calefacere: quibus positis (nisi alia obstituerint signa, quæ ex aliis fontibus possunt depromi) quisque Galeni admonitu scire poterit, quando redundabit fæx non adusta, & quando adusta, & quando atra illa, quæ ex flaua superaffata dependet.

Tertius locus desumitur à mœstitia sine causa, valet, mœstus est si-  
ne causa, ergo melancholia redundat: verum, quæ melancholia sit ex-  
illis tribus, non apparet: audias igitur distinctionem; si mœstitia ante-  
reuerit morbo, dicas esse adustam, ratio potissima desumitur à Gale-  
no 1. de diff. feb. capite 3. ubi concludit mœstias; vel mœstos ratione  
motus aliquando eo vsque spiritus agitare, quousque exurantur, &  
deinde incalescant humores, & melancholici adusti fiant: si verò mœ-  
stitia secuta fuerit melancholicum affectum, præcesserintque edulia  
crassa, dicemus multans faciem non adustam peccare, quia non ante-  
iuit causa exurens, & calefaciens, valet enim consequentia, non præ-  
cesserunt causæ efficientes calide, ergo humor peccans non erit cali-  
dus; hinc non semel Galenus dixit humorem melancholicum gigne-  
re mœstiam, & mœstiam melancholiam facere, quia mœstia mo-  
do præcedit, modo sequitur melancholicos succos, si præceder fiet a-  
dusta, quia, ut dicit Galen. 4. de causis puls. 4. & alibi in omni mœstitia  
contrahitur calor ad internas partes, & temporis spacio exurit: si non  
præcedet, sed sequetur morbos melancholicos, non illico adusta e-  
rit: si denique non præcesserint vsus crassorum alimentorum, sed so-  
lum procacitæ exurentes atram bilem, ex flaua ortam redundare  
iudicabimus.

Quartus locus desumitur ab autumno, valet morbus est autumnus  
lis, & longus, ergo melancholia adusta peccat; ratio vero, cur in au-  
tumno solum adusta melancholici peccent, & nequaquam fæx natu-  
ralis, desumitur tum à præcedente æstatis calore, qui exurit fecem san-  
guinis, vel flauam bilem, tum à natura autumnus, in quo facillimum  
est, ut adurantur humores, manè enim tunc frigus inualefcit; & inter-  
rim prohibetur transpiratio humorum; qui sunt exusti ob præceden-  
tem æstatem, in meridie verò calor persentitur ferè æstius. unde ob  
has causas, & has mutationes de cōtrario in contrarium vnico die fa-

etas, vel maximè incenduntur humores, & melancholici adusti fiunt. Cæterum, quæ differentia melancholiæ adustæ in autumnno dominetur, an scilicet fæx adusta, vel atra ex flaua superaffata orta, faciliè, si fiet examen superius propositum, cognosci poterit, quia, si præcessit vsus ciborum crassorum, ob quos Galenus quoque putabat in Alexandria sœuere elephanticum, erit fæx adustasi vero processerint signa abundantissimæ bilis, erit atra ex flaua orta, quia omnes tenaces humores biliosi, si recandescunt, exuruntur, & in aliam melancholiæ speciem non possunt conuerteri, nisi in hanc exardentem, & furiosam melancholiam ex bile flaua combusta enatam.

*Vt melancholici succi innotescant per syndromem signorum desumptorum à dispositione patientis, & à morbis.*

### C A P. I X.

*Ex hoc fonte  
quinque loci  
antecedentes  
colliguntur  
qui indicant  
melancholiā.*

*Primus à pa-  
rentibus.*

*Secundus ab  
ætate.*

**S**EQVITVR, vt proponamus locos indicantes corporis dispositionem ad succos melancholicos cumulandos: dum enim cognoscemus patientem esse valde obnoxium passionibus melancholicis, promptè virtute syndromis signorum sciemus, quando actu succi melancholici vexant illum; & quia (vt diximus) melancholiæ sunt duum generum, frigidæ scilicet, & adustæ; propterea duæ dispositiones sunt aduertendæ; qui enim sunt dispositi atq; bili furiosæ & exardenti, sunt valde dissimiles ab iis, qui proni & obnoxij sunt facibus melancholicis: locorum aliqui erunt antecedentes, aliqui verò consequentes: antecedentes quinque sunt, quorum primus est perquirere à quibus parentibus ortus sit patiens, quoniam parentes sæpius gignunt filios sibi similes, si parentes igitur fuerint soliti atra bile furiosa, vel melancholia illa terrestri, & frigida sæpè vexari (nisi alia obstituerint signa) incipiemus suspicari patientes suos æmulari parentes.

Si vero ex hoc loco aliquid certi non collegerimus, adest secundus locus, qui est ab ætate, sed, quia melancholiæ sunt frigide, vel feruentes & siccæ, excluditur ætas puerilis, & adolescentiæ, vt inepta pro cogerendis succis melancholicis, tum, quia pueri, & adolescentes sunt humidi, & per consequens contrarij omnibus melancholicis succis, tum, quia tanto ardore opprimi non possunt, vt in atram furiosam faciliè incendant; dicimus ergo ætatem iuuenilem, consistentiæ, & senilem esse obnoxiam affectibus melancholicis, iuuenilem, & consistentiæ præcipuè atræ bili; iuuenilem, dum ingentissimo calore exuruntur; consistentiæ ob rationem traditam à Galen. 3. prælag. com. 33. vbi dicit, sicuti autumnus ætate frigidior non sunt dissilari exustos humores in ætate feruefactos, sed in atrâ bilē eos conuertit, sic in ætate magis declinante exusti humores florentis ætatis ob transpirationem minus apertam in atram bilem conuertuntur, quare, si iuuenis sua na-

*tura*



tura calidus non fuerit atra bile vexatus, in ætate consistentiæ certo vexabitur: senilem vero dicimus præcipuè esse dispositam ad congerendam melancholiam frigidam & siccam, diximus præcipuè, quia inueniri quoque possunt iuuenes, & qui in ætate sunt constituti, qui si copiosum habeant sanguinem, necessàrio plurimam fæcem melancholicam frigidam, & siccam sortiantur oportet.

Tertius locus consistit in habitu corporis, continetque sub se duos locos, quorum primus est habere venas lãtas: dicit enim Galenus 3. de loc. aff. 7. quibus lãtæ sunt venæ aptissimi sunt, vt humor melancholicus in ipsiis cumuletur. Secundus locus est videre an corpus sit macilentum, vel gracile, Galenus 1. de hum. dicit, graciles, nigriores, hirsutos, quique lãtas venas habent esse aptissimos ad gignendum humorem melancholicum: ratio vero, cur omnes melancholici sint macilenti, est, quia omnis melancholia conuenit in hac qualitate, vt siccus humor sit; hinc, qui in furiosam bilem inclinant, & qui abundant fæce melancholica, vt plurimum sunt macilenti. Nec obiiciant, quod, qui habent multam fæcem melancholicam plurimum quoque habeant sanguinem, & qui plurimum habent sanguinem, non possint esse graciles, Galeni est sententia 3. de morb. vulg. 3. text. 70. quod semper vbi sanguis multus est, ibi necessàrio sit multa fæx, & viceuerſa, vbi scilicet est multa fæx, ibi multus sanguis sit. Respondemus non esse negandum in multo sanguine necessàrio esse multam fæcem, negamus tamen quod habentes multum sanguinem non possint esse graciles; fauet nobis Galenus 6. de morb. vulg. com. 3. text. 29. vbi dicit inueniri graciles, qui sanguine abundant, habetque hæc verba: aliqui graciles habent multum sanguinis, & aliqui crassi paucum, itaque non valet, est gracilis, & emaciatus, ergo non potest habere multum sanguinis, & versa vice, quia, vt dicit Galenus loco hoc citato exrenuatio corporis non semper ab inanitione proficiscitur, cum aliquando ex repletionem fiat; hinc Galen. loquens de muliere emaciata dixit fuisse detractum multum sanguinis maxima cum utilitate; nisi enim plurimo sanguine mulier esset referta, non potuisset pati tantam sanguinis euacuationem: patet ergo melancholicos calidos, & feruentes & illos qui plurima abundant fæce melancholica frigida, vt plurimum esse graciles, & macilentos.

Quartus locus est physionomicus, in quo plura signa ab auctoritate philosophorum desumpta collocantur, quippe quæ creduntur aliquid posse in succis melancholicis indicandis; ex physionomia Aristotelis colligitur, aures paruas versutiam, & melancholiam indicare, habeturque concauos, & macros oculos, & mœstam faciem indicare melancholiam: præterea 30. se & probl. 1. legitur, cutim duram, & venas tumidas, & varicosas indicare dominium melancholiæ; apud Auicennam libro 3. fen. 14. tract. 1. cap. 3. legitur longitudinem digitorum ostendere iccoris magnitudinem, quæ est causa caloris, & Polyæmiæ, vnde omnes melancholiæ habent initium, à calore oriuntur melancholiam adusta: à polyæmia fæx melancholica non adusta, idem

*Tertius ab habitu corporis.*

*Quartus à physionomia.*

quoque colligitur lib. 1. fen. 2. doct. 3. cap. 1. vbi dicit breuitatem digitorum ostendere iecoris paruitatem, longitudinem magnitudinem, & per consequens caliditatem, & copiam sanguinis; locus iste physiologicus non solum expensus, sed iunctus cum aliis pariet exactam certitudinem dominantium humorum.

*Quintus locus est à consueta euacuatione suppressa.*

Quintus, qui est omnium certissimus desumitur ab intermissa, & suppressa euacuatione consueta melancholiæ, quæ per hæmorrhoidas, vel menses, vel per alias partes euacuabatur; valet enim consequentia, suppressa est euacuatio consueta humoris melancholici, ergo corpus non solum est dispositum ad augendam melancholiam, sed actu multa melancholia refertum est.

*Vi cognoscitur fax melancholica per actiones animales.*

A consequentibus quoque colligimus signa corporis dispositi ad melancholiam, & quinque obseruantur loci, qui desumuntur ab Actionibus Animalibus, Vitalibus, Naturalibus ab excrementis retentis, vel exeuntibus, & à qualitatibus sensibilibus. Ab Actionibus animalibus reëtricibus alteratis colligemus melancholiam, quæ est fax sanguinis ex eo quod ægri sint cogitabundi, taciturni, non furiosi; Galenus de vxore Dealcis loquens dixit, quod tacere erat signum melancholicorum succorum: præterea ij sunt tristes, morosi, ingeniosi, astuti tamen & cauti, constantes, & firmi in sententia; est Galeni de natura humana comm. 39. quod sicuti acies animi à bile, ita constantia, & firmitas à melancholico succo prodit. A somniis alteratis, quia omnis melancholia excitat nigra, & terra spectra, & imagines. Præterea Albertus Magnus lib. 1. de anim. tex. 2. de melancholia frigida loquens dicit, quod melancholici, graues, & terribiles imagines patiantur propter sanguinis melancholici frigiditatem, & horrorem; quia imagines receptæ in horrido fiunt horribiles; denique ob alteratam imaginatricem ab obscuris & tenebrosis phantasmatibus semper timeant aliquid non timendum; & sæpè in vnicâ firmantur insania: horum sunt, qui putant habere in ventre magnum lumbricum: aliqui, si audiunt medicum loquentem de aliquo morbo, illico illo vexari credunt: si vero melancholia est adusta, tunc præterea excitantur symptomata sæuiora, quæ inferius declarabuntur.

*Vi colligitur melancholia, quæ est fax sanguinis à vitalibus levis.*

Quoad vitales actiones, istæ illico alterantur ab alteratis functionibus animalibus: horribiles enim imagines incutiunt metum, & terrorem cordi, vnde ex timoris excessu exsiccantur humores, & melancholici fiunt: deinde ex timore nascitur insignis quædam auaritia, ob timorem enim perpetuo machinantur, quomodo possint effugere omnia mala, quæ ipsis offeruntur. Hinc Aristot. 7. Ethicorum cap. 14. videns melancholicos semper timere, refert proprium esse melancholicorum, medellam semper postulare, & semper versari cum Medicis: Demum, qui melancholia hac terrestri sunt repleti habent pulsus valde tardos, & raros, quod atræ bili non conuenit.

*A naturalibus animalibus.*

Ab actionibus naturalibus varia scaturiunt signa, videmus illos præter naturam esse famelicos, & promptius digerere cibos; causa depromitur à Galeno 5. de vsu part. cap. 4. vbi dicit melancholiam natu-

ralem



ralem vi sua astrictoria tenere cibos in ventriculo, donec sint percocti, atque ob eius aciditatem citius chylum fermentare. Præterea in iis in tempestiua fames excitatur, quia per quartam portæ venam, quæ coronæ in morem amplectitur ventriculi orificium, transmittitur hic terrestri succus debito copiosior, qui sua frigiditate, & acetositate contrahit in rugas orificium, & in tempestiuam famem excitat; ex fame ergo in tempestiua colligemus abundare humorem melancholicum terrestrem; promptè digestio fit; quia hic, & alter venæ portæ furculus in ventriculi cavitatem euomit quotidie copiosissimam melancholiam, quæ vt copiosa efficacius astringit, & melius digerit: vt valde acida, promptius arretit, & comminuit; valebit ergo cōsequētia; alteratrix promptè suum explet officium, & obseruatur in tempestiua fames, ergo humor melancholicus & terrestris abundat. Hic obiter notare possumus contra nonnullos, qui dicunt alteratricem ventriculi à calore, & non ab aliis causis fieri potentem, videntur errare, *Vt errant qui putant ventriculum bene digerere solum ob calorem.* quia melancholia, quæ est bonæ coctionis auctor, est frigida: deinde experientia confirmatur, quia videmus pisces sua natura frigidiores hominibus integros caneros comminuere, & digerere, quod nullus homo posset. Ab expultrice diminuta colligitur melancholia, redditur enim tarda, & segnior ob virtutem astrictoriam humoris.

Ab excrementis quoque melancholiæ abundantiam colligemus; de melancholicis enim loquens Galenus lib. de plenit. cap. 11. dicit, hos esse saliuā abundantes, & à potu abstinentes, causa vero abundantia saliuæ, & abstinentiæ potus colligi potest à Galeno, ab Aristot. & Hippocrat. à Galen. 6. epid. vbi dicit sanguinem melancholicorum esse serosum, quare, si sanguis est serosus, facile fiet, vt saliuā sint abundantes, & à potu abstinentes. Aristot. in problematibus de melancholia loquens dicit, humorem melancholicum delectari serositate, & 2. de par. animal. 4. dicit; corpora sanguinem dilutum habentia esse timidiora; quare & melancholica, quia timor præter rationem semper arguit melancholicos succos. Hippoc. 4. de morbis dicit lienem esse aquæ locum. Causa autem, cur melancholia magis quam pituita sit referta serositate, est virtus astrictoria melancholiæ, quæ prohibet, ne serum subito diffluat, & euacuetur: ostendimus cum Galeno 5. de vsu part. 4. melancholiam tenere cibos diutius in ventriculo ob vim suam astringendi; argui ergo hoc modo; potest, si cibos diutius detinet, quanto magis proprium ichorem? si vero melancholia hæc naturalis, & frigida incipiat calefieri ab aliquo calore præter naturam, sicuti si quartana febris premeretur melancholicus, tunc febrilis calor magis potest in propellendis ichoribus, quam vis astrictoria melancholiæ in cogendo, & retinendo serosam humiditatem. Hinc quartanarum, & omnes, qui melancholia calefacta, vel adusta sunt referti, tam *Vt in excrementis, & recentis distinguuntur species melancholice.* copiosis sudoribus interdormiendum madesunt, vt ter, quaterve in nocte vsquequaque sudore circumfundantur, perinde ac in balneum immergerentur, ob eandem rationem copiosum lotium in melancholicis mouetur; valebit ergo cōsequētia, maximi sudores, & vrinæ

debito copiosiores excernuntur, ergo terrestris melancholia incipit fieri calida, & adusta.

*Ut in excre-*  
*tibus, & re-*  
*tentis distin-*  
*guantur spe-*  
*cies melan-*  
*cholia.*

Ex aliis quoque exeuntibus melancholiæ differentias colligemus, veluti à sanguine hæmorrhoidali; etenim, si egredietur sanguis ater sine magno morfu, & puncturis, colliges abundare melancholiam naturalem; si vero erit mordicativus, inferes adustam faciem melancholicam exire. Ab excretis per alium, si nigræ fæces sine morfu excernuntur, colliges melancholiam naturalem, si cum morfu atram bilem. A ructibus, si erunt acidi sine nidore, & ponticitate melacholiam naturalem copia peccantem, si erunt fumosi, & nidorosi, colliges atram bilem. Demum sunt retenta excrementa, quæ indicabunt melancholicos succos, veluti quando suppressæ sunt hæmorrhoides, tunc enim inferre poteris has consequentias; nuper sunt suppressæ hæmorrhoides externæ, ergo melancholia naturalis, quæ est fæx sanguinis, peccat, quia surculi facientes hæmorrhoidas externas prodeunt à porta vena, quæ est sedes huius melancholiæ. Iam diu suppressæ sunt; ergo peccat melancholia naturalis adusta, est enim impossibile, ut diutius retentus humor frigidus in corpore talis conservetur; oportet enim ut in loco calido caleat, & aduratur, est Galeni sententia 2. de differentiis febrium capite 5. nullum humorem permanere in vivente corpore, sicut erat prius: si vero erunt suppressæ hæmorrhoides internæ, & illæ præcipuè, quæ circa intestinum rectum sunt, quæ omnes ferè à surculis cavæ venæ prodeunt (si alia signa non obstiterint) non colligemus faciem sanguinis abundare, sed atram bilem factam à flava superaffata, & combusta, quæ potius domicilium in cauis venis habet.

A qualitatibus sensibilibus externis colligimus hæc signa, si erunt actu frigidi, facièsque sit colore plumbeo, & nigro, ut dicit Galenus, libro de atra bile, cap. 6. inferre tunc poterimus, dominari melancholiam terrestrem: si vere erunt actu calidi cum eodem colore, atram bilem.

*Quomodo à*  
*morbis colli-*  
*guntur loci*  
*indicantes*  
*melancholia*  
*differentias.*

Vilis locis pertinentibus ad externos errores, & ad viscerum dispositiones: nunc ad locos qui à morbis desumuntur expedit transire, quippe qui, nisi fuerint discordes ab aliis, certò indicabunt melancholicorum succorum differentias. In primis desumuntur loci à morborum ideis, in primis que se offerunt ideæ in mala compositione, in quibus observantur quinque loci præcipui: quorum primus colligitur à tumore splenis: secundus à varicibus: tertius à tumore hæmorrhoidum: quartus à molla, quæ est morbus in numero: quintus est à scabie, lepra, & similibus cutaneis morbis: si de primo loquimur, valebit consequentia, splen intumescit, vel durus sit, ergo peccat fæx sanguinis, & nequaquam atra, quæ oritur à flava adusta; facialis enim melancholia copia peccat attollere potest in maiorem molem lienis locum, quod non faciet atra bilis: cognoscemus vero esse faciem adustam, si antiqua fuerit illa durities, quia humores quoque frigidi diutius detenti in aliqua corporis parte necessario exsiccantur, calefiunt, & tandem aduruntur;

*Ut à tumore.*



runtur; valebit ergo, nuper intumuit lien, ergo fæx sanguinis non adu-  
sta peccat, iamdiu est quod intumuit, ergo fæx peccat adusta.

Secundus locus desumptus à morbis indicantibus melancholiam *Vi à varicib.*  
sunt varices, hæ enim sunt venæ plus æquo intumescences, obseruan- *colliguntur*  
turque in temporibus, testibus, inguine, ventre, in mamillis, & præ- *differentia*  
cipue in cruribus: ostenduntve humorem melancholicum fæcalem; *melancholi-*  
dicit enim Galenus, 2. ad Glauc. melancholicum sanguinem sæpe ad *corum succo-*  
varices, & hæmorrhoidas decumbere: valet consequentia, sunt vari-  
ces, ergo humor melancholicus, quia ex omnium consensu varices  
sunt à melancholia: an vero hic humor melancholicus indicatus à  
varicibus redundet in corpore, vel tantum in aliquo viscere, vel sit so-  
lum in loco varicoso, id cognosci debet communium signorum me-  
lancholicorum syndrome, quæ amplectitur signa ostendentia mor-  
bos, symptomata, locos affectos, & alios propositos fontes, inde e-  
nim docebimur, quando poterunt varices turo secari, quia si videri-  
mus à visceribus ad varices melancholicum succum actu decumbere,  
corpusque redundare melancholia, tunc nullo modo varices erunt  
secandæ, quia Galenus, libro de atra bile, cap. 4. profert hanc senten-  
tiam, periclitantur varicosi, ne si varices seces, fiant melancholici:  
quando vero sint secandæ, nos docet Auicennas lib. 3. fen. 22. capite *“*  
de varicibus dicens, si à visceribus non detruditur melancholia ad va- *“*  
rices, sanguisque mundus sit, possunt incidi sine timore; si vero detru-  
ditur, sanguisque sit impurus, non sunt secandæ; quia homines fient  
melancholici, & in deteriores affectus corruent. Errant ergo vel ma-  
ximè insani Empirici, qui indiscriminatim sine vlla distinctione om-  
nibus varices secant, ut non sit mirum, si in melancholiam, si in ca-  
chexiam, & hydropim varicosi ab iis tractati sæpè prolabantur: quo-  
modo autem ex varicibus cognosci possint differentiæ succorum me-  
lancholicorum, confugiendum est in primis ad causas procatacticas;  
quia, ut experientia patet, modo fiunt ex nimio exercitio, modo ex ni-  
mio ocio: quæ post nimium exercitium fiunt arguent melancholiam  
adustam: quæ vero post ociosam vitam, melancholiam fæcalem terre-  
strem: quod fiant à nimio exercitio, est Auicennæ loco citato dicentis,  
curiores fieri varicosos: quod fiant quoque ab ocio, & à nimia desi-  
dia, est Iuuen. Poeta sat. 6. dum dicit, varicosus sit Aruspex ex diutur-  
na statione.

Tertius locus desumitur à tumore hæmorrhoidum, sicque argu- *Vi à tumore*  
mentamur: nuper intumescere cœperunt, & causæ calidæ externæ *hæmorrhoi-*  
non præcesserunt, ergo melancholia non adusta peccat: similiter, *dum.*  
multo ante intumuerunt, & calida procatactica præcesserunt, ergo  
atra adusta redundat.

Quartus locus à generatione mollæ desumptus: valet enim (judi- *Vi à mollæ.*  
ce Aristot. 4. de generatione animalium) mollæ fit, ergo corpus crassa,  
& non adusta melancholia abundat, quia si esset adusta exciteret do-  
lores, & exulceraret.

Quintus locus indicans melancholiam, desumitur ab affectibus

*Vi à lepra.* cutaneis, vt à lepra, elephantico affectu, & scabie: Galenus lib. de tum-  
præter naturam dicit, lepram elephanticum, & scabiem à melancholia fieri. Auicennas, lib. 4. fen. 3. cap. de lepra dicit, si melancholia spargitur in toto, & non putrefit, lepram: si vero putrefit, febrem facere.

*Ab intemperie* A morbis ab intemperie duo consurgunt loci, alter ab intemperie frigida, & aliquando congelante: alter ab intemperie calidissima, & siccissima: ab intemperie frigidissima, & congelante colligimus humorem frigidum, & siccissimum, qui solet efficere cathocum, qui re vera non fit ab atra, nec à fæce adusta, quia cathochi causa debet esse congelans, erit ergo fæx melancholica frigidissima, & siccissima orta à simili intemperie; verum quia cathocus citò fit, & citò desinit, indicabitur, vaporem frigidum, & sicum ortum ab hac melancholia esse immediatam causam illius affectus. Valebit enim consequentia, est cathocus, ergo in corpore abundat melancholia frigida, & sicca. Si vero intemperies frigida, & sicca generans melancholiam auferatur, fæx tamen melancholica longo temporis spatio in aliqua corporis parte relinquatur, necessarium quoque est, vt aduratur, deinde morbi fiant calidi: hinc si diutius retineatur fæx melancholia in porta, necessarium est, vt aduratur, & sic adusta, si stomachum petat, gignat picam, si vero

*Vi errant di-*  
*cētes ab atra*  
*bile furiosa*  
*fieri picam,*  
*& hypochondriacam passionem.*

mesenterium, vel omentum diutius occupet, hypocondriacam passionem efficiat. Hic non possum omittere, quin reiciam sententiam nonnullorum dicentium, picam, & hypocondriacam passionem ab atra illa melancholia, quæ à flaua combusta fit, nasci, quia clarissime patet in anatome, venas vestiētes stomachum, & mesenterium, vel omentum à porta vena, quæ est terrestris melancholiæ domicilium, nasci, quare non fiet ab atra illa exedente, quia hæc ibi non habet suam sedem: præterea hypocondriaca passio fit ex stomacho frigido, & hepate calido: atra à materia frigida fieri non potest.

Ab intemperie calidissima, & siccissima diutius affligente atram bilem furiosam dominari posse colligimus: reddimur nos certi, si mæstitiæ sine causa vexare incipiant. Hinc post febres ardentes, post constitutiones aëris calidissimas, post diurnos labores, & mætores atram bilem adustam redundare videmus.

*Vi à latis vl-*  
*ceribus spe-*  
*cies melan-*  
*choliæ cognos-*  
*cantur.*

Denique à latis vlceribus indicatur melancholia, valet enim lata sunt vlcera, ergo melancholia, verum non frigida, & terrestris, sed adusta; quia continuum erodere pertinet ad adustam; cognoscemus eam esse atram ortam ex bile combusta, si quotidie magis exedet: si vero lata conseruabuntur, & in deterius non prolabantur, erit melancholia, quæ est fæx sanguinis adusta.

*Vi à motu-*  
*riantur loci*  
*indicantes*  
*melancholiam.*

Amplius cum motus morbi pertineat ad essentiam morbi, vt docet Galenus 3. de crisi bus, cap. 4. motus quoque pariet locos ostendentes. Verum quia motus est vniuersalis, vel particularis, ab utroq; colligemus locos indicantes melancholiam. Ab vniuersali, dum videbimus principium alicuius morbi esse valde tardū: à particulari duos locos colligemus, alter est à typis, valet enim consequentia, morbus mo-  
uetur



netur de quarto in quartum, ergo peccat melancholia: alter est à motu morbi in determinatis quibusdam horis, valet mouetur vesperti, ergo melancholia peccat: sed quia de motu morbi, libro 5. cap. 4. diffusè egimus, non est, vt hic eadem repetamus. Colligamus itaque à morbis vndecim enasci locos indicantes melancholiam, quorum primus est tumor splenis: secundus varices: tertius tumor hæmorrhoidum: quartus generatio mollæ: quintus morbi cutanei quales sunt lepra, elephanticus, & scabies: sextus intemperies frigidissima: septimus intemperies feruentissima, dum citius vexant patientes: octauus lata vlcera: nonus mortus tardus morbi: decimus typus quartanarius: vndecimus motus morbi in horis vespertinis.

*Vt melancholici succi præcognoscantur per syndromen signorum communium desumptorum à symptomatis, locis affectis, & iuuantibus, & ledentibus.*

C A P. X.

**A** Symptomatum serie colligi quoque possunt loci melancholiam indicantes: quot erunt genera symptomatum, tot erant loci potentes indicare melancholicos succos: genera symptomatum sunt læsæ actiones animales, vitales, naturales, excreta & retenta præter naturam & demum qualitates mutatae. Ab actionibus restrictibus animalibus ab imaginatrice scilicet deprauata in primis colliguntur nonnulla symptomata ostendentia melancholiam in communi, deinde tres obseruantur loci indicantes determinatas succorum melancholicorum differentias: symptomata, quæ sunt communia euilibet succo melancholico, pertinent ad imaginatricem læsam, tradunturque à Galen. 3. de loc. aff. 7. vbi dicit, omnes melancholici timent non timenda, & mærent ob non mærenda, vitam damnant, & odio habent homines; isti dum audiunt melancholicos de aliquo morbo loquentes, subito illo morbo vexari putant: creduntque ob varios internos timores quæ sunt prorsus impossibilia: fertur fuisse melancholicum credentem se in ventre gladium transigentem perferens, alium (referente Galeno loco citato) credentem se esse gallum, alium verò testam esse factum.

*Quæ sint symptomata communia omnibus melancholicis.*

Verum, quia hæc sunt symptomata communia, à quibus nullum remedium haurire possumus, est necessarium, vt illa perquiramus symptomata, & locos específicos, qui vltimas differentias succorum melancholicorum nos possint docere. Specifica igitur symptomata ab imaginatrice desumpta varia sunt; alia enim ostendunt habent iustitiam cum audacia & furore, isti enim audaces melancholici semper potius mærent, quam timent: de iis loquens Hipp. libro de morb. vi. g. dicit, melancholicos aliquando se strangulare, & in puteos demergere, vel alio modo sibi mortem consciscere; videtur igitur va-

*Locus à maiestatis sine causa cum audacia indicans atrabilem furiam.*

lere consequentia, mœstitia est sine causa cum audacia, & furore, ergo peccat atra bilis orta ex flaua superaffata. Similiter, Galenus de hac melancholia loquens 6.aphor. 53. dixit, hanc cognosci ex studio, & temeritate: oritur ergo locus cognoscendi atram bilem à mœstitia sine causa cum audacia & furore, vel temeritate iuncta, ex quo loco semper & necessario atram bilem colligemus.

*Locus indicans faciem adustam sumitur à summa formidine sine audacia.*

*Quis sit locus indicans faciem sanguinis non adustam.*

Symptomata verò ab imaginatrice desumpta ostendentia fœcem melancholicam adustam potius consistunt in timore, quam in mœstitia, quia magis potest phantasma tenebricosum eleuatum ab hac fœce adusta nigerrima in timorem incutiendo, quam possit eius calor in furem, & audaciam promouendo. De iis, qui sunt vexati hac melancholia terrestri adusta, plurima referuntur. Galenus 3. de loc. aff. 7. refert fuisse melancholicum, qui timeret, ne Atlas, qui mundum sustinere dicitur, grauatus sub tanto onere ipsum à se excuteret, atque ipse cum illo collideretur, ac nos quoque cum ipso periremus: ibidem pergens Galenus concludit, hanc melancholiam potius in timore, quam in mœstitia consistere; valebit ergo consequentia, timor est sine causa, sine audacia, ergo peccat melancholia terrestris: amplius Galenus declarans libello de plenitudine capite 11. signa, quæ consequuntur acidam, & terrestrem melancholiam, habet hæc verba, isti sunt morosi, timidi, sine siti, salina abundantes, & famelici, cur autem non sitiant, & abundant salina superius declarauimus: ex iis duo loci pro cognitione terrestris melancholiz colligi possunt; alter à summo timore & formidine sine audacia, qui ostendit fœcem sanguinis adustam, & nō melancholiam naturalem copia peccantem, summus enim timor & summa formido fit à phantasmate nigerrimo, & tale non potest fieri sine adustione; quare sequitur quod ex summa formidine sine audacia, & temeritate colligatur locus indicans fœcem sanguinis adustam: alter locus à salina abundantia, & sitis carentia cum timore sine causa colligitur, qui indicat melancholiam, quæ est fœx sanguinis non adusta.

*De erant qui credunt melancholiam cum risu à sanguine fieri.*

Verum, quia melancholici ob imaginatricem deprauatam modo sunt cum risu, modo cum fletu, modo cum studio, & temeritate, modo multum loquuntur, modo præter rationem tacent: ex Galeno, & Hippo. vnde hæc fiunt, est videndum: Hippo. & Galenus 6.aphor. 53. dicunt, quod desipientiz cum risu sunt securiores, quia arguunt copiam sanguinis, qui est succorum omnium suauissimus, sed reuera non à sanguine fiunt, sed à fœce sanguinis, dicit tamen à sanguine, quia, vt plurimum vbi est multa fœx, sanguis quoque est copiosus; ostendimus superius valere consequentiam, sanguinis maxima est copia, ergo eius fœx quoque copia peccat. Quare videntur errare credentes melancholiam cum risu à sanguine prodire: à sanguine sanè nulla prodit mœstitia, & melancholia; concedi tamen potest, melancholiam cum risu indicare posse copiosum sanguinem, quia vbi est fœx copiosa, supponitur sanguinem multum esse; non propterea dici potest à sanguine prodire: addit Galenus, quod desipientiz



desipientiæ temerariæ sunt omnium periculosissimæ, quia fiunt ab atra bile, quæ vero fiunt cum studio sine temeritate medio modo se habent, quia non ab atra bile, sed à facie adusta fiunt; videntur igitur valere hæ consequentiæ, est desipientia cum risu, ergo fæx sanguinis dominatur, est cum fletu, qualis erat in vxore Dealcis, ergo fæx adusta, non atra bilis furiosa; quia furor vel audacia non admittit fletum, fæx tamen adusta faciens fletum, vel est valde adusta, vel putrida facta, quia fæx melancholica moderatè adusta non putrida tantam mœstitiam parere non potest, vt fletum inducat; est desipientia cum studio, temeritate, & audacia, volunt percutere, vel mordent proprias carnes ergo atra bilis dominatur, ex iis quoque colligimus eisdem locos indicantes differentias succorum melancholicorum, quia à risu indicatur fæx sanguinis non adusta, à fletu fæx sanguinis adusta, vel putrida: ab audacia, & temeritate atra bilis exædēs, & furiosa.

*Vi à risu. fletu, & audacia indicantur omnes melancholia.*

Denique ex nimio, & non naturali silentio, quod pertinet quoque ad functiones animales, colligimus locum ostendentem melancholix redundantiam; Galenus enim declarans libris de morb. vulg. Historiam vxoris Dealcis habet, præter rationem tacere, esse signū melancholicorum, & multum loqui phreneticorum: videndum est, quæ melancholix species indicetur à nimio ægrotum silentio, dicimus itaque multum tacere non arguere atram bilem, quia eius proprium est furere, adurere pungere, irritare, mouere linguam, & omnia corporis instrumenta, arguet ergo faciem sanguinis sua natura frigidam, cuius vapor non solum potest silentium inducere, verum etiam catochos, qui reddunt homines similes lapideæ statuæ: qui vero multum loquuntur sunt biliosi, phrenesis enim est erysipelas, si vero post multam locutionem fiunt melancholici, illa melancholia erit atra bilis orta ex flaua superaffata, quæ phrenesim faciebat; valebunt ergo consequentiæ, silentium est nimium, & non naturale, ergo melancholia fecalis frigida, & congelata peccat; post multam locutionem sunt facti melancholici, ergo dominatur atra bilis orta à flaua combusta.

*Vi ex nimio silentio faciem melancholicam noscimus.*

*Vi ex nimio locutionis atram bilem.*

Verum, quia hæc symptomata sæpè miscentur; videmus enim melancholicos temerarios, & audaces aliquando eadem die ridere, & fletu, multum loqui, & nimium tacere, dicimus esse mistos quoque humores melancholicos: namque potest cum facie sanguinis misceri atra bilis, & potest fæx secundum aliquam partem aduri, & secundum aliam conseruari inter naturales terminos.

Quo ad vitales functiones læsas attinet, inter cætera symptomata est palpitatio cordis, quod est summi momenti, præcipuè si solibus vitium assimilatur, contestim enim vitam aufert: verum, quia symptomata à melancholia prodeuntia modo fiunt à facie adusta, modo ab atra bile, tunc vt ambiguitas expurgetur, expedit locos aliorū fontium adire, vbi millia inueniemus veritatis testimonia: afferatur exemplum, sit æger palpitatione affectus, qui antea crassissimis cibis fuerit pastus, quales sunt lentes, caseus, brassica, & alia id genus, ibi in primo fonte propositus est locus à cibo crasso, qui melancholiam fecalem

*Vi ex palpitacione cognoscimus melancholia diffusam.*

indicat: si præterea æger in regione, vel aëre calido vixerit, locus à corporis calidi vicinitate iunctus cum in cibo crasso indicat (vt probauimus) faciem sanguinis adustam: similiter, si in secundo fonte locum melancholiam adustam indicantem inuenies, veluti, quod hæmorrhoides fuerint suppressæ, vel splen ante fuerit subtumidus, eo magis confirmaberis in sententia, quod scilicet melancholia facialis redundet. Denique si locos his propositis respondentes inuenies in tertio & quarto fonte, veluti quod æger hypocondriaca passione vexaretur, vel latis vlceribus præcipuè circa partes infernas premeretur, quis non affirmaret palpitationem à facie melancholica adusta pendere? Ecce igitur, quod in palpitatione perquirenda, & in qualibet consilij angustia nos virtute locorum propositorum penetrare possumus omnes peccantes humores in qualibet corporis penitissima parte existentes.

*Vi diminuta,  
vel ablata  
expultrice in  
dicit melan-  
choliā re-  
dundare.*

Quo ad læsas functiones naturales, est locus desumptus à diminuta, vel ablata facultate expultrice; quare, si viderimus expultricem tolli, facit inde (si alij quoque loci non obstituerint) colligemus melancholiam terrestrem non adustam redundare; est enim Galeni 4. de vlu part. 5. melancholiam naturalem vim adstrictoriam sortiri, quod non conueniet melancholiæ adustæ, vel atræ bili ortæ ex flaua superaffata, quia hæ suo ardore vellicant partes, & expultrices irritant ad expellendas fæces: neque conueniet bili osis, vel pituitosis humoribus; non biliosis, quia irritant, non pituitosis, quia laxant, & non cohibent.

*Vi ab immodicè retentis excrementis veluti, quando supprimuntur hæmorrhoides, vel mensium purgationes, statim inferre possumus melancholiam permisceri cum sanguine, & deinde aduri, quia omnes humores præter naturam retenti temporis spacio adurantur. Hinc puerperia, si retineantur, necessatio arguunt faciem melancholicam adustam: dicit enim Galenus in historia mulieris morantis apud frigidam aquam, fortum attrahere meliorem, & puriorem sanguinem, & deteriorem relinqueret: dum tractat quoque historiam mulieris Cyzici, dicit melancholiam ortam à puerperis retentis fuisse causam delirij, & omnium malorum ab adusta melancholia prodeuntium: habemus quoque ex Galeno lib. de atra bile cap. 4. quod melancholia adusta permista cum sanguine, si febrem faciat, carbonem molitur, si vero sine sanguine sit, & faciat tumorem atrum, tumorem in cancrum degenerat, si vero mista cum sanguine ad cutim pellatur, elephantiscus affectus gignatur: valebimus ergo ex iis sic inferre, est elephas, ergo fæx sanguinis adusta peccat, mistaque est cum sanguine: est carbo, & febris, ergo melancholia crassa adusta est mista cum sanguine; est cancer, ergo redundat fæx melancholica adusta sola sine mistione sanguinis. Ab exeuntibus quia Galenus loquens de facie adusta, & de atra bile, lib. de atra bile cap. 3. dicit, non concretescere, nec muscam, vel aliud animal eas degustare velle, terramque fermentare.*

*Vi à qualitatibus sensibilibus colliguntur differentia melancholice.*

Ab immodicè retentis excrementis veluti, quando supprimuntur hæmorrhoides, vel mensium purgationes, statim inferre possumus melancholiam permisceri cum sanguine, & deinde aduri, quia omnes humores præter naturam retenti temporis spacio adurantur. Hinc puerperia, si retineantur, necessatio arguunt faciem melancholicam adustam: dicit enim Galenus in historia mulieris morantis apud frigidam aquam, fortum attrahere meliorem, & puriorem sanguinem, & deteriorem relinqueret: dum tractat quoque historiam mulieris Cyzici, dicit melancholiam ortam à puerperis retentis fuisse causam delirij, & omnium malorum ab adusta melancholia prodeuntium: habemus quoque ex Galeno lib. de atra bile cap. 4. quod melancholia adusta permista cum sanguine, si febrem faciat, carbonem molitur, si vero sine sanguine sit, & faciat tumorem atrum, tumorem in cancrum degenerat, si vero mista cum sanguine ad cutim pellatur, elephantiscus affectus gignatur: valebimus ergo ex iis sic inferre, est elephas, ergo fæx sanguinis adusta peccat, mistaque est cum sanguine: est carbo, & febris, ergo melancholia crassa adusta est mista cum sanguine; est cancer, ergo redundat fæx melancholica adusta sola sine mistione sanguinis. Ab exeuntibus quia Galenus loquens de facie adusta, & de atra bile, lib. de atra bile cap. 3. dicit, non concretescere, nec muscam, vel aliud animal eas degustare velle, terramque fermentare.

Quo ad qualitates mutatas, iæcteria nigra, colores nigri, plumbei insoliti ostendent melancholiam. Sapores excrementorum per vomitu



tum exeuntium acerbis, pungentes, & mordicantes linguam faciem adustam ostendunt. Galenus libro de atra bile cap. 5. docet nos per sapores, & colores cognoscere omnes melancholias: dicitque primo faciem sanguinis non adustam esse acerbam, habere acorem; esse aceto acerrimo similem: subdit, melancholiam factam à flava superaffata esse hac perniciosiorem, quatenus flava bilis est efficacior, quam sit sanguinis subsidencia; hæc enim exedit, & plura excitat symptomata, de quibus superius egimus: melancholia vero naturalis, ut habetur loco citato, nec intensam mordicationem, nec acorem, vel odorem foetidum habet: denique Galenus notat errorem multorum non cognoscentium discrimen inter euacuationem nigrorum, & atræ bilis: multi enim dum vident nigra euomi, vel per aluum deiici, putant esse adustas melancholias, putantque ægrum ad læthalem affectum disponi; quod erratum Galenus animaduertit, habetque ferè hæc verba. Ego à Pelope præceptore meo percepi, & inde obseruavi toto vitæ meæ tempore humorem puræ atræ bilis cum ægri perniciæ excerni, nigrorum verò euacuationem non raro salutauerit fieri, quia atræ bilis excretio supponit sanguinem esse exsiccatum, indicatque vitam non posse consistere; excretio vero nigrorum humorum sine morfu, sine acore, qui nullam potentiam exedendi habent, est potius salutaris. Ex coloribus ergo, & saporibus possumus colligere melancholiæ differentias, de quibus luculentius in quinto libro egimus.

Quintus fons continet locos affectos, qui arguent melancholias; *Quintus fons de locis affectis.* Primus locus erit hypocondrium sinistrum longo temporis cursu offensum: ostendimus superius, splenem læsum arguere melancholiam fæcalem. Secundus sunt hæmorrhoides in quas natura tamquam in cloacam faciem sanguinis superfluam propellit; valet, læsio est circa hæmorrhoidas, ergo melancholia. Tertius, omnes partes varicollæ ostendunt melancholiam dominari. Quartus continebit quasdam internas partes corporis minus conspicuas, quæ irrigantur furculis venarum prodeuntibus à porta, omnes enim istæ partes, dum afficiuntur præter naturam, ut plurimum melancholicis succis premuntur, quia porta vena est sedes melancholiæ, partésque istæ sunt ventriculus, intestina, splen, omentum, hæmorrhoides, vesica fellea, & cæteræ partes inferioris ventris.

Ventriculus, quia eius orificium coronæ in morem vena à porta iuxta splenem germinans amplectitur, & continuo melancholicum sanguinem in ipsum exprimit, ut aliquando picca, seu uariæ, vel similia symptomata excitentur; habemus enim hæc verba 4. de vlu par. capite 15. sanguis elaborationem splenis effugiens à natura transmittitur ad ventriculum, quare cum perpetua sit hæc transmissio, non possumus, nisi putare, quod ut plurimum affectus, qui excitantur in stomacho, sint melancholici; accedit, quod vena porta scandit ventriculi fundum versus dorsum: quare, cum sit referta humore melancholico, ventriculus redditur quoque subiectus infortunio melancholicorum affectuum, ibi enim ichor melancholicus per diaphanum potest

*Ventriculus subiectus est affectibus melancholicis.*

*Erratum cuiusdam empyrici.*

egredi, & dolorem exasperatuum excitare: ibi quoque potest porta adeo impleri, vt comprimat ventriculi fundum, & angustum reddat, vnde sexcenta symptomata sequantur: audias erratum cuiusdam empyrici; erat pateriens sentiens circa internam dorsi partem insignem dolorem exasperatuum, & præcipuè post assumptum cibum; empyricus accersitus nullum aliud remedium excogitare potuit, quam dorso inunctiones, & fomentationes applicare, quod sine aliqua vtilitate factum fuit. Qui verò eum sanauit, sibi ante oculos proposuit locorum affectorum signa desumpta à Galeno 1. de loc. aff. 5. quæ sunt actiones læsæ, eorum situs, doloris proprietates, propria accidentia, & excrementa: quibus rectè expensis deprehendit, ventriculum fuisse læsum, quia actio ventriculi erat impedita, augebatur enim dolor post cibum; situs similiter ostendebat, ventriculi fundum esse læsum, vergit enim versus dorsum; erant quoque propria accidentia, quia vomitu aliquando premebatur, & tandem dolor exasperatuum melancholiam ostendere debebat, quæ cum necessario prodeat à vena porta, & vena porta circa ventriculi fundum versus dorsum collocata sit, erat rationi consonum, vt dolor dorsi exasperatius ab humore melancholico prodiret. Rationalis medicus statim aperuit hæmorrhoidas; & copiosum permisit sanguinem defluere, sanguine euacuato, venaque porta depleta, dolor ille occupans internam dorsi partem, & cætera symptomata eadem die fuerunt sublata.

*Vnde lapilli vesicæ felleæ, & icteritia aliquando prodeant.*

Splen, omentum, intestina omnia sunt furculis à porta prodeuntibus irrigata, quare ab iis partibus læsis desumi poterunt loci melancholiam ostendentes; à vesica fellea, quia eius collum duplici venarum germine à porta originem trahente est indutum, eiusque vesica eadem venarum sobole irrigatur, vt sanguine melancholico nutriatur, & hæc est causa, cur vesica fellea sæpè vexatur: arbitror quod lapilli, qui aliquando inueniuntur in vesicula à melancholia, quæ sua natura est terrestris, facti sint: icteritiam verò sæpè fieri, quia venulæ eius ceruicis ob melancholiæ copiam tumescunt, & tumidæ claudant orificium: tunc non curabitur atquatus rhubarbaro, scolopendria, asfaro hæc enim conuerterent terrestrem sanguinem in syrhum; curabitur tamen reuellendo sanguinem melancholicum, & terrestrem per hæmorrhoidas, quæ reuulsio erit omnibus numeris absolutæ, quia fiet per vasa communia, secundum rectitudinem, per distantissima, & trahetur humor ad originem.

*Errant qui discutitis tollere sentiant flatus hypochondriacos.*

Quintus locus desumitur à læsis glandulis omenti, quæ vocantur pancreæ, hæc enim venulis à porta prodeuntibus sunt intertextæ, suntque repletæ sanguine melancholico, quippe qui, si adurit, tumbar totum ventrem infernum, excitatque flatus, qui implent omentum, & nullis remediis possunt auferri, nisi causa fouens adustionis tollatur: suntque propterea irritandi empyrici, dum flatus illos demere credunt calefacientibus; augent enim magis affectus radicem.

A iuuantibus, & lædentibus colligimus quatuor locos, qui ostendere poterunt melancholicos succos: quorum primus est examinare,

an me-



an melancholiæ euacuatio iuuat. Secundus est, dum videbimus iuuari ab humidis alterantibus; omnes enim melancholici conueniunt in siccitate; sed obseruandum est, quod melancholia, vt sæx non adusta, non tollitur refrigerantibus mitescunt; valebūt ergo consequentiæ, iuuatur æger ab euacuatione humoris melancholici, & ab humidis alterantibus, ergo est melancholicus: similiter læditur ob retentionem melancholicorum succorum, ergo melancholicus. Tertius locus erit à ieiunio, melancholici enim non possunt ieiunium ferre, adfunt tamen nonnulli, qui acida affluunt pituita, quippe eadem fame sæpè vexantur, tunc per alia signa erit excutiendus nodus; sat est in præsentia, quod vt plurimum vera sit consequentia, fame nimia, & non naturali afficitur, ergo melancholicus succus peccat. Quartus locus, ab aceti vsu suspicari possumus melancholiæ dominium, dicit enim Hippocrat. & Galen. 3. de ratione vict. 38. quod atra bilis ab aceto dissoluitur, degeneratque in pituitam; nigra vero bilis, quæ est melancholia, fermentatur, attollitur, & multiplicatur; quia nigra acetum parit: addit Galen. in comm. melâcholicis acetum esse aduersissimum, si viderimus ergo acetum aliquem lædere, merito ex læsione aceti colligemus melancholiam: quilibet locus propositus docere poterit, si verò erit coniunctus cum aliquo, pariet tunc demonstrationem infallibilem in cognoscendis humoribus præter naturam. Quintus & postremus, si loquitur de atra bile adusta, dulcia nocent; dicebat Galenus 2. de naturalibus facultatibus cap. 8. omnia dulcia in iis, qui calida, & adusta natura sunt, in bilem conuertri; dulcia enim, vt mel solum in iis, qui naturam frigidam habent, vt dicit Galenus 2. de facultatibus naturalibus viderimus dulcia nocere, iudicabimus melancholias adustas dominari.

*Quinque loci  
ab hoc fonte  
desumpti in-  
dicantes me-  
lancholiam.*

*Quomodo status præcognosci possint per syndromen signorum communium à rebus non naturalibus, & à dispositione corporis desumptorum.*

C A P V T X I

**I**N numero causarum, quæ aliquando occultè laceffunt corpora, sunt quoque status: in hoc libro agere decreui de iis, quæ nullam sui propriam, & apertam notam præbent coarctando analytico artificio superius declarato omne, quod delitescit, quodve septum est obscurissimo vallo. Nec obiciant, me ab incepto munere desistere, quia status illico ab omnibus cognoscitur, coeat enim vbi vbi; nescit stare loco, exitum quærit, & è vestigio se prodir; propterea delitescere hand sanè diu potis est, verum non solum ob eius mobilitatem, & inconstantiam, dum vagatur per omnes partes totum vellicando, ab omnibus cognoscitur, sed etiam per sentitur, dum cum manifesto murmure foris erumpit. Cui respondemus aliquando status in corpore de-

*Omnes partes  
vexari pos-  
sunt status.*

litescere, quia non modo in ventriculo, & intestinis, vbi sentitur, coire solet, verum etiam in qualibet densa parte, & quod admiratione est dignum, in ossibus. Hinc Auicennas, lib. 1. fen. 2. cap. 9. vbi de ventositate agit, dicit, non solum ossa flatibus corripitur, verum etiam aliquando à flatibus frangi: hac igitur causa moti methodum pro inueniendis flatibus proponendam esse duximus.

*Causa efficiens, & materialis flatuum.*

Sed, quia natura flatuum perfectè doceri non possunt, nisi causæ, & modus generationis eorum declarentur, ideo de iis prius agendum: causæ igitur generantes flatum continentur in breuissima hac definitione, quæ à Galeno 9. de comp. med. per loca. cap. 9. traditur, flatum ab humore crasso, & viscido, & à moderato calore fieri: in quibus verbis causa materialis, & efficiens proponuntur: dum dicit à crasso, & viscido humore, proponit causam materiale; quia à melancholia, vt crassa; à pituita, vt viscida eleuantur flatum; dum vero dicit à moderato calore explicat causam efficientem; causa enim efficiens non potest esse calor insignis; nec calor omnino diminutus, vel suffocatus: non insignis, quia resolveret materiam flatuum in spiritus insensibiles, & extinctus, quia vbi nullus est calor, nullus quoque fit vapor, vel flatum, hinc Galenus 3. de symptomatum causis 2. dicit, flatulentias fieri in ventriculo, dum non admodum frigidus est, quia si valde perfrigeratur, nullus inde gignitur flatum: ecce, quod causa efficiens flatum est calor moderatus, & non omnino diminutus, vel extinctus.

*Modus generationis flatuum.*

Modus generationis flatuum iis verbis declaratur ab Auicenna lib. 3. fen. 14. tract. 1. cap. 7. dum retinentur vapores inspissantur, & conuertuntur in flatum; vapores igitur, vt fiant flatum, retinentur, quia ob calorem diminutum non possunt ita attenuari, vt per insensibilem euacuationem absumentur, retenti adeo inspissantur, vt in crassos, & flatuosos spiritus conuertantur: hinc Galenus 2. ad Glauc. cap. 6. dicit, quod flatuosus spiritus, & crassus comparatur aëri austro, qui discuti non potest nisi à magno calore; magni enim caloris munus est, vapores crassos promptè attenuare, & adeo expedire vias, vt insensibiliter, & sine murmure flatum exeant.

*Prima dubitatio.*

Verum nonnulla prius occurrunt soluenda dubia, antequam ulterius proueamur, quia multa sunt, quæ in igne spirant flatum cū murmure, vt castaneæ, poma; similiter, si hæc à fortissimo & caloris feracissimo homine comedantur, flatum gignantur; ergo causa efficiens nullo modo erit calor diminutus. Secunda non videtur, quod causa materialis adæquata flatuum sint cibi crassi, & viscidos, quia obseruatur in multis, quod esculenta paucifera, vt oua, caro vitulina, & iuscula paruorum pullorum in flatum plurimos conuertantur. Primæ dubitationi nonnulli sic occurrunt; calorem intelligi diminutum dupliciter, vel quia absolute, & per se sit talis, vel respectu obiecti: hac posita distinctione dicunt, ignem, vel quemuis alium ventriculi calorem respectu obiecti siue edulij, difficillimæ coctionis, vt sunt castaneæ, poma, & alia id genus, dici diminutum. Quæ responsio improbat, quoniam, dum dicunt, ignem respectu obiecti esse diminuti ca-

loris,



loris. nimis improprie loquuntur; omnes enim fateri debent, ignem absolutè, & respectuè esse summi caloris; definitur ignis, quod sit agens omnium potentissimus in calefaciendo; quare non dabitur unquam obiectum, cuius respectu ignis possit dici diminuti caloris. Melius igitur respondebimus, si dixerimus, aliam esse causam generationis, aliam expulsionis flatuum: dum obiciebant, causam efficientem flatus aliquando esse ignem, vel calorem intensum ventriculi, dicimus hanc esse causam expulsionis, & non generationis flatuum; hinc intense calida, quæ flatus expellunt, vocantur à medicis carminatiua, quæ non gignunt flatus, sed genitos, & inclusos repellunt: dum enim crescunt in arboribus fructus sua natura frigidi, quales sunt poma, castaneæ, & similes, in his plurimi halitus, & vapores crassi fiunt, qui insensibiliter ob eorum diminutum calorem non euacuantur, sed adeo inspissantur, ut degenerent in flatus; quando vero iniiciuntur ignitis carbonibus, vel maiorem calorem experiuntur, cum magno murmurere eorum flatus, qui antea erant inclusi, erumpunt, & à nobis persentiantur: nullam itaque erit instantia, quia experimentum pomorum, vel castanearum indicat virtutem expultricem, & non generatricem flatuum. Secundæ dubitationi potius adaptari potest responsio, quod scilicet ova, & iuscula in quibusdam respectu diminuti caloris sint obiecta crassa, & viscida; & ratio est, quia vapores eleuati à tenui cibo in iis ita non possunt ob caloris paupertatem discuti, & attenuari, ut per insensibilem transpirationem egrediantur, ideo est necessarium, ut inspissentur, & per consequens conuertantur in flatus: dicimus quoque, calorem fortiolem dici diminutum respectu obiecti intelligendo de flatu qui fit, & non de illo, qui est inclusus, & inspissatus, qui debet omnino erumpere, sit in igne, vel in corpore ingentissimo calore prædito.

*Solutio prima.*

*Solutio secunda.*

Itaque par est, ut methodum in hoc libri initio proposuimus experiamur, quia inde cognoscemus, quando flatus erunt redundantes. Quo ad procatarticas causas, si de flatibus, qui fiunt, & non de iis, qui sunt inclusi in esculentis loquamur, aliæ non sunt, nisi, quæ generant pituitam viscidam, & melancholiam, & quæ calorem diminutum, & moderatum reddunt. Quæ verò calorem diminutum reddunt, erunt illæ causæ externæ, quæ suffocando, vel resoluendo calorem diminuunt: quæ suffocant est cibus quatenus est crassus, & viscosus, ut sunt boleti, vel quatenus est nimius: quæ resoluunt calorem, inter cætera declarata in capite de pituita, est nimius coitus, à quo omnes sciunt fieri dolores colicos scelestissimos. Verum, quia pituita, ut viscida, & melancholia, ut crassa sunt flatuum semina, ab horum humorum causis externis colligemus quatuor locos, qui poterunt indicare flatuum redundantiam ut Primus desumatur à procatarticis gignentibus pituitam viscidam. Secundus à gignentibus melancholiam crassam, & terrestrem. Tertius ab esculentis, in quibus actu inclusi sunt vapores inspissati, vel flatus; quod idem est. Quartus à nimio coitu.

*Quatuor loci ab externis causis sumpti indicantes flatuum redundantiam.*

Quinguo loci  
indicantes  
corpora dispo-  
sita flatibus.

Quo ad secundum fontem, vbi de dispositis corporibus ad flatus congerendos agitur, omnia loca antecedentia, & consequentia conspirantia in generationem melancholicæ crassæ, & pituitæ viscidæ obseruantur. Primus locus sumitur ab hæreditate parentum: parentes enim toto vitæ suæ tēpore flatibus obnoxij filios sibi similes gignūt. Secundus ab ætate senili, in qua congregantur humores crassi, & viscidum ob diminutum declinantis ætatis calorem. Tertius à debilitate, valet enim, sunt debiles, ergo ad flatuosos affectus sunt dispositi, sunt flatu, ergo debiles, prætermisiss tamen flatibus, qui nō fiunt, sed sunt inclusi, hos enim in fornace ardenti egredi cum strepitu obseruamus; quod vero debilitas flatum facere possit in ventre, & in aliis partibus à ventre remotis audite Galenum 2. de composit. med. per loc. cap.

10. tanta esse potest ventris debilitas, & caloris inopia, vt ex cibis, &

potibus flatu ventosi eleuentur, qui capitis dolores efficiant: ecce ergo, quod ob ventris debilitatem non solum flatu in ventre aggregantur, verum etiam caput à ventre remotum illis impletur: neque mirandum est, à ventre mitti flatu in caput, quia Galenus 3. de sympt. causis 2. habet, aliquando ab intestino recto flatu, & acres succos moueri vsque ad ventriculum, & ad caput, habetque hæc verba, nam

Error amici  
dicentis ab  
intestino recto  
ad caput non  
peruenire fla-  
tus.

& clysteris aliquid nonnullis in ventrem subiit, ita vt vomerent; quare, si aliquid clysteris euomi possit, eo magis flatu ascendet superius; subdit deinde Galenus, acer quoque succus, & crepitus, qui ad sedem aliquando fuerat violenter retentus in foro, rursum est sursum ductus, & ventrem, & caput impleuit: ecce igitur, quod flatu in intestino recto existentes caput implere possunt, quod negabar in quodam medicorum cœtu amicus. Quartus locus sumitur ab habitu gracili; obesi enim raro flatibus premuntur, quoniam hypocondria pingua conseruant calorem narium, qui flatu resoluit attenuando vapores, prohibendoque ne inspissentur, & in flatu degenerent. Quintus sumitur ab intermissa expulsionem flatuum consueta; qui enim soliti sunt per infernas, vel supernas partes flatu pellere, si supprimantur ab aliqua causa suffocante, vel resolvente calorem, in deterrimos morbos, eosque sæuissimos prolabuntur: vidimus in Vngaria non semel insanos quosdam ægros, qui dum magno dolore colico premerentur, ad potum aquæ frigidissimæ confugerent, & dolore tunc liberarentur; sed post diem, in sæuiorem colicam passionem, vel in paralysem inciderent: supprimebant flatu, quia stupefaciendo sensum vires expultricum, & alteratricum tollebant, deinde cum parum reuiuisceret alteratrix, flatibus crassissimis incipiebat caput impleri, & apoplexia, vel saltem paralytis excitabatur.

Quæ consequuntur disposita corpora ad flatu gignendos plurima sunt: plurimi quoque sunt inter sanitatis limites, qui perenni flatuum stridore premuntur. Primus locus oritur ab alteratrice naturaliter diminuta; valet, diminute coquit cibum, ergo flatu cumulat. Verum, quia retentrix diminuta, & expultrix irritata sunt in causa, ne alteratrix, quamuis naturaliter fortis sit, suum officium explere possit, sed



sed diminute coquat, & inde flatus aceruet: propterea duo loci oriū-  
tur, alter erit ab expultrice irritata, alter à retentrice diminuta: quoties  
igitur quis diminutè retinebit chylum, irritatamque habuerit expul-  
tricem, perpetuis flatibus vexabitur. Deinde ab exeuntibus tres lo-  
ci confurgunt, duo ab vrina, quorum primus est, dum suspensa (vt di-  
cit Galenus 2. de comp. med. sec. loc. & alibi) sursum tendunt, quod  
signum numquam fermè decipit: flatu enim, qui nihil aliud est,  
quam vaporosus spiritus inspissatus, debet naturaliter sursum ferri;  
quoties igitur videbimus suspensa superficiem supernam petere (si alia  
non obstiterint signa) iudicare optimè poterimus, illius rei cau-  
sam esse flatu. Secundus locus à lotio depromptus, est vrinæ spu-  
ma, quæ vel obseruatur, dum in vrinæ superficie diutius moratur, vel  
dum eleuantur spumosa granula, vel paruulæ bullæ ab imo matellæ  
ad superficiem supernam, quæ experientia obseruatur in iis, qui viri-  
bus fracti sunt, & præcipuè in vtero gerentibus, in quibus renes, &  
vasa omnia ad vrinam, & vterum pertinentia debilia existunt. Tertius  
locus sumitur ab alui excrementis, quæ sunt spumosa, & cum pluri-  
mis flatibus emittuntur. Demum qualitates tangibiles, quæ obser-  
uabantur in iis, qui erant dispositi ad gignendam pituitam viscidam,  
& melancholiam crassam & terrestrem, eadem erunt hic obseruandæ,  
quia flatuum semina sunt humores pituitosi viscidi, & melancholia  
crassa & terrestris. Demum ex Auicenna sumitur locus, qui est à ta-  
ctu, etenim libro 1. fen. 2. cap. 9. dicit, per tactum nos cognoscere par-  
tem flatibus repletam, quando cedit pressioni digitorum. Colligas  
ergo septem dari locos indicantes flatu desumptos à dispositione  
corporis: primus est ab alteratrice diminuta. Secundus ab expul-  
trice deprauata. Tertius à retentrice diminuta. Quartus à suspensis  
vrinæ sursum tendentibus. Quintus ab vrinæ spuma, seu bullis sur-  
sum tendentibus. Sextus ab excrementis spumosis. Septimus dum  
parstumida cedit pressioni.

*A consequen-  
tib. di. positi-  
onibus septem  
loci oriuntur  
indicantes  
flatu.*

*Ut flatu innotescant per syndromem signorum desumptorum à  
morbis, symptomatis, locis affectis, & à iuuau-  
ribus, & lædentibus.*

C A P. XII.

**S**YNDROME perfectissima esse non potest, nisi ex quolibet fonte  
unicum saltem locum, qui ab aliis non dissentiat, colligamus. Pro-  
positi sunt loci externarum causarum, & dispositionum viscerum in-  
dicantes flatu: reliquum est, vt à morbis, symptomatis, locis affectis,  
& à iuuantibus, & lædentibus apertiores colligamus, vt in hac solertia  
locis vel maximè abundemus. A morbis duo præcipui oriuntur, al-  
ter à sensiuo tumore sine pondere, & grauitate; alter à celeri motu  
tensionis; motus enim libro 3. de cūlibus 4. pertinet ad morborum

*A quib. mor-  
bis duo loci  
indicantes  
flatu oriun-  
tur.*

essentiam; valebit ergo consequentia de primo loco loquendo, tensio ab ægris per sentitur sine gravitate & pondere, ergo flatu dominantur: hinc à tympanitico non sentitur gravitas, ut ab ascitico: similiter, dum flatu occupant penem, & priapismum constituunt, tensionem sine pondere efficiunt: si de secundo loquimur, inferimus flatu à celeri motu tensionis: etenim, si cito fiunt tensiones, hæc & cito desinunt, ab aliis causis pendere non possunt, quàm à flatibus: & licet erysipelata legitima cito fiant, & cito desinant, arguere tamen flatu non possunt: quia non efficiunt tensionem, & tumorem. Ab intemperie, & soluta unitate loci indicantes flatu, qui sint utiles, non colliguntur: non ab intemperie calida, quia hæc discutit: non à frigida, quia Galenus 12. methodi cap. 8. nos docet crassâ, & glutinosâ excrementa flatu solum facere, dum calefiunt, habetque hæc verba: crassa, & glutinosa excrementa gignunt flatu, dum calefiunt; quare intemperies frigida, & humida ex se nullo modo flatu gignere poterunt; quatenus enim intemperies frigida impedit, ne crassa & glutinosa excrementa calefiant, prohibet generationem flatuum: quinimmo frigidorum usus flatu genitos pauco temporis spacio magno tamen cum ægrotantium detrimento supprimi: audias ut malè agunt in Ungaria nonnulli vecordes, qui patiuntur colicum dolorem ob flatu retentos, aquam frigidam copiose hauriunt, & statim liberantur, sed paulo post in scelestissimam colicam, & tandem in paralysem incidunt. A soluta vero unitate locus indicans flatu colligi non potest, quia flatu ulcera & soluta unirares moliri haud possunt.

*Decem loci à  
symptomatib.  
di. prompti  
qui indicant  
flatu.*

A symptomatibus oriuntur decem loci, quorum primus sumitur à celeri motu symptomatum sine periodicatione venientium; omnes enim humores statim quibusdam diebus homines vexant, quare, si viderimus symptomata cito adori, & cito desinere, iudicabimus à flatibus causari. Hinc dicemus immediatam causam cataplexis esse flatum, vel vaporem crassum, quia cito fit, & cito desinit; flatu enim in hoc affectu eleuatur à melancholico succo. qui sua frigiditate nervos destinatos motui densat, & congelat, perinde ac homines ob capitis Medullæ conspectum in lapides conuerterentur, cito tamen reuiuiscunt: solet enim quatuor, & pluribus vicibus eodem die hoc symptoma reuerti. Incubus quoque affectus, quo patientes, dum dormiunt, se strangulari credunt, est symptoma, quod fit à flatu crasso, vel viscido semiobstruente nervos inseruientes thoraci; quia parum durat; similiter symptoma, quod saltus dicitur, Italicè ganfo à flatu fit, cito enim fit, & cito discutitur: etenim, si manus calida parti saltu laceratæ adiungitur, illico tollitur: recipiatur igitur tamquam experientia notissimum, quod symptomata omnia, quæ oriuntur à flatu cito fiant, & cito desinant. Nec obiciant, epilepsiam aliquando cito fieri, & cito desinere, arguere tamen humores, & non flatu; quia negari potest, epilepsiam ab humoribus immediatè fieri; pro hac sententia est Auerroes qui similiter tenet epilepsiam fieri à flatuosis spiritibus, & quâvis Auicennas, ubi agit de hoc affectu, dicat, fieri ab humoribus, non  
potuit



potuit tamen omittere, quin diceret, pituitam facientem epilepsiam puerorum esse flatulentam, & quamvis Galenus 3. de loc. aff. 7. dicat ab humoribus; & non à flatibus fieri, dicere possumus, humores esse causas medias, auras flatulentas vero immediatas: sed quicquid sit de hac re, nos non defendimus, quemlibet locum seorsum syndromen summam in docendo efficaciam habere.

Secundus locus est à doloribus extensiuis sine grauitate, & pondere desumptus, hic colligitur ab Auicenna lib. 1. fen. 2. cap. 9. vbi vult, dolores extensiuos sine pondere ventositatem significare: tales dolores extensiuo sine pondere sæpè obseruantur in colo intestino, de quibus Galenus 12. methodi ca. 18. habet, tunc excitari dolores extensiuos colicam facientes, quando inter spacia tunicarum intestinorum includuntur humores efficientes colicam; flatus enim ibi vi sua extensiuia scelestissimos dolores sine aliquo pondere efficere possunt.

Tertius locus flatum indicans sumitur à symptomate huc, & illuc errante: si viderimus dolores diuagari, & modo vnam partem, modo aliam ambulando lacerare, flatum prædominari iudicabimus, valebit enim, symptoma diuagatur sine locorum affectorum pondere, & cito dimouetur, ergo vapor, vel flatus, quod in idem recidit, peccat; etenim vapor omnis vel est subtilis, & sic per insensibilem transpiratum sine læsione resoluitur, vel est inspissatus, & hic est (vt ostendimus superius) flatus.

Quartus locus desumitur à læsis actionibus vitalibus inter quas præcipue est palpitatio: Galenus enim 6. de loc. aff. dicit flatus efficere palpitationes.

Quintus ab actionibus naturalibus, vt ab alteratrice, vel ab expultrice diminuta necessario clydones & inflationes ventris fiunt; ab aliis vero actionibus naturalibus læsis quomodo flatulentia colligantur in secundo fonte declarauimus.

Sextus ab excrementibus, quæ cum manifesto crepitu, & spuma excernuntur.

Septimus à retentis flatibus, quia Galenus libro de plenitudine dicit, quod intercepti flatus summos dolores excitant: tertio de sympt. causis 2. dicit Galenus, cum flatus non excernantur per os, neque per sedem, sit symptoma, quod emphysematis, id est inflatio ventris dicitur, quod symptoma oritur ab expultrice diminuta, vel ablata.

Amplius tres loci admodum vtiliter obseruantur ab Auicenna lib. 1. fen. 2. cap. 9. quorum primus colligitur à motu membrorum, ex saltu enim, vel palpitatione partium cognoscimus flatus redundare: mulieres sæpè flatibus refertæ putant vtero gerere, dicuntque manifestas foetus motiones pati, easque sub manibus propriis foetum se mouentem sentire, attamen post 8. menses vice foetus flatus patiunt. Secundus à sono colligitur, ex ventris enim rugitibus flatus noscuntur: hinc tympanitum ab ascite per ventris sonum distinguimus: hinc aurium sibilus soni campanæ specimen præ se ferens indicat ibi flatus dominari, necessario enim inferimus est sibilus aurium, tympanitis, suntque

que rugitus ventris, ergo flatus. Tertius à tactu desumitur: etenim si locus affectus cedit pressioni, & illico reddit, erunt flatus: patet experientia in vesicis flatibus extensis, quæ, si digitis comprimantur, illico redeunt. Galenus 14. methodi cap. 7. tradit differentiam inter œdema, & tumorem factum à flatibus, dicitque tumores flatulentos digitis pressos non retinere vestigium, sed sonitum veluti tympanum red-  
dere, œdema verò vestigium retinere.

*Quintus fons.*

*à Quinto  
fonte septem  
lovorum secundum  
Galenum col-  
ligi.*

Quantum attinet ad quintum fontem, dicimus, quod omnes partes in quibus naturaliter pituita, vel melancholia suam sedem, & domicilium habet, si affectæ sint, possint indicare flatus, etenim pituita viscida, vel melancholia terrestris diutius in illis partibus detenta, si caler est debilis, in flatu resolui potest, si fortis, in auram subtiliorem abit, & per fallentem sensum nostrum transpiratum exhalat: partes vero nostri corporis, quæ præcipuè flatibus vexantur, sunt illæ, quæ obnoxie sunt pituitosis, vel melancholicis affectibus, quas declarauimus in capite de pituita, & melancholia: à Galeno tamen partes, quæ præcipuè à flatibus vexantur, 14. methodi cap. 7. referuntur, dicitque inflationes aliquando colligi sub cute, aliquando sub periostitiis, & sub membranis, quæ musculos, vel viscera includunt; aliquando in intestinis, ventriculo, in medio spacio horum, & Peritonei.

*Methodus co-  
gnoscendi par-  
tes corporis  
flatibus cor-  
rupta.*

Præterea, si partes affectæ ignorantur, confugimus ad quinque illos vniuersales locos pro cognoscendis affectis partibus propósitos à Galeno 1. de loc. aff. 5. quæ sunt excrementa, proprietates dolorum, propria accidentia, situs, & actio læsa. Ab excretis per aluum cum spuma, & sonitu ex Hippo. colligimus caput esse læsum; sonus acutus indicat flatum esse in loco angusto; sonus vero, qui imitatur bombos in loco amplo: hinc Galenus tertio de symp. causis capite secundo de flatibus. intestinorum loquens dicit, si spiritus flatuosus acutus, & tenuis sonet, deferatur per vacuū, & prorsus angustū intestinū: subdit flatus si sonum edat exiguū in tenuib. voluitur intestinis, si nec prorsus acutum, nec tenuē, indicatur ieiunū flatibus premi, si verò adhuc minus sonori sint, signum est ad alia tenuia intestina descendere, quæ sunt latiora, flatus verò qui bombos imitantur, sunt in crassissimis intestinis, quando excrementorum sunt vacua. A dolorum proprietate, diximus ex Auicenna quod ubi sunt dolores extensiuī sine grauitate, ibi sint partes, quæ excruciantur flatibus. A propriis accidentibus, qualia sunt, quæ cito desinant, vt saltus, vel palpitatio partis. A situ accidentium prodeuntium à flatu, qui cognoscitur ex illis tribus signis ab Auicenna propósitos, scilicet ex motu membrorum, ex sonitu, & ex tactu, dum partes cædunt pressioni, & redeunt. Demum ab actione læsa illius partis; valet enim consequentia, flatus sunt in ventre, ergo venter diminutam habet actionem, & versa vice. Per hos locos cognoscere poterimus partes corporis flatibus laceratas: quibus præcognitis, cognoscemus, quando causa efficiens affectionis erit flatus.

*Ut à inuan-  
tibus, & lad-  
duo oriuntur  
loci indican-  
tes flatum.*

Postremo est sextus fons, qui est de iuuantibus, & lædentibus in quo collocantur duo loci, primus consistit in hoc examine, vt videa-

mus,



mus, an euacuatio, vel expulsio flatuum maximè viuet, & an retentio noceat: quia si euacuatio ægrum subleuauerit, & retentio affectum auxerit, colligemus flatum in culpam illius ægritudinis transire. Secundus, si iuuantia sint calida & sicca, nocentia vero frigida, & humida eò magis confirmabimur, flatum in corpore redundare. Calida & sicca, quæ flatum discutiant, inter cætera à Galeno 12. methodi cap. 8. probantur allium, & anisum, dicit allium coctum est ex illorum ciborum generatione, qui & flatum discutunt, & minimam sitim inferunt: septimo de simp. med. de ciminio dicit, inter omnia discutientia inspissatos & nebulosos flatus ciminum valenter dissipare, & eodem lib. cap. de nigella dicit, nigellâ summâ præstare opem in elidendis flatibus. Similiter ruta, vt dicit 8. de simp. med. mirabilè virtutem in flatibus discutiendis habet. Præterea, si iuuat cucurbita à Galeno proposita 12. methodi cap. 8. quæ cum magna flamma sit administrata spiritum flatuosum tam excellenter tollit, vt simile quid incantamenti efficiat, dicimus propriam causam ægritudinis esse flatum Lædencia & flatum cumulantia, vel sunt, quæ habent inclusum flatum, quæ non solum vbi est diminutus calor, sed in ardentissima fornace edent crepitus, vt poma, castaneæ, faseoli, cassia, & alia id genus: vel sunt frigida & crassa, quæ actu non habent inclusum flatum, sed ex illis fit, vt sunt pisces, lac, caseus, quorum vapores inter concoquendum ob vires viscerum collatas, & fractas adeo crassescunt, vt amplius per angustissimos meatus insensibiles non possint exire, sed sic inspissati in flatum degenerent: si igitur viderimus, flatum illico gigni, non ab iis, quæ inclusum habent flatum, quia quilibet fortissimus, & robustissimus ex iis pati potest; sed ab illis crassis propositis ferculis, quæ flatum solum ob diminutum calorem efficiunt, tunc colligere poterimus in illo corpore redundare flatum: alter dum æger subleuabitur à flatuum euacuatione, & intendetur affectus flatuum retentione: alter, vt rectè sciatur, quæ alterantia iuuent, & quæ noceant.

*Allium coctum discutere flatum, & non inferre sitim.*

*De Polyæmia, seu de sanguinis vbertate per signorum communium syndromem perquirenda.*

CAPVT XIII.

**D**E sanguine hic non esset agendum, quoniam in peccantium humorum censum venire non videtur; quia, si alteratur, & supra modum calefit, ex Galeno 3. de causis sympt. & 2. de diff. feb. 9. & 2. de crisib. 12. & ex Auicenna lib. 1. doct. 4. cap. 1. pars tenuior fit bilis, crassior verò melancholia, de quibus humoribus egimus superius; Verum, quia sua vbertate aliquando ita venas distendit, vt eas frangat, & inde homines ducat ad hæmorrhagias adeo præcipites, & periculosas, vt cachexias, & mortes adferat: proinde erit necessarium, vt methodum proponamus, quæ nos possit docere, quando in corpore sit polyæmia; quæque desumi poterit à procatarticis, à dispositione patientis, à morbis, à symptomatibus, à locis affectis, & à iuuantibus, &

ludentibus, vilissimus erit discursus non solum pro comparanda hac methodo, verum quia cognita polyæmia sciemus quoque, quando erit administranda phlebotomia.

*Quinquæ loci  
ab externis  
causis collecti  
qui indicant  
Polyæmiam.*

In causis procatacticis sex obseruantur præcipui loci indicantes polyæmiam, quorum primus desumitur ab aëre calido, & humido, sed temperatissimo. Secundus à cibo, & potu simili. Tertius, à somno. Quartus à balneo. Quintus à læticia. Sextus ab exercitio consueto prætermisso. Quo ad primum est aër calidus, & humidus temperatus sanguinem augens, qui inuenitur tempore veris; vel, vt putant medici, in regione seu clymate omnium temperatissimo; aërem veris dicit Galenus 1. de humoribus comm. x. & alius in locis, sanguinem augere, æstatis bilem, autumnii melancholiam, & hyemis pituitam: ratio autem, cur aër veris sit accommodatus polyæmiæ, est, quia sanguis, vt dicit Galenus 2. de naturalibus fac. cap. 9. & alibi copiosus fit à moderato seu mediocri calore, & talis calor moderantia inueniri non potest in aliis anni temporibus, nisi in vere, vel vt aiunt in regione vel climate omnium temperatissimo, ibi enim dicunt, calorem ad æqualitatem peruenire.

*Quod septem  
sint climata,  
& quæ sint.*

Verum, sicuti apud omnes philosophos, & medicos res est certa, quod aër veris temporibus omnibus sit temperatior, non tamen contentiunt de climate, quodnam scilicet temperatissimum: hoc igitur breuibus est videndum, prius tamen quid sit clima, & quot sint, dicamus; clima significat spatium duobus parallelis clausum quo diei longitudo ad dimidiam horam variatur, climata septem sunt. Sub primo, quod vocatur diameroes, quia transit per Meroem insulam, continentur plura loca, scilicet insulæ fortunatæ, pars Arabiæ, Nubi populi, Goa famosissima ciuitas, insula Sancti Thomæ, & plurimæ aliæ Prouinciæ. Sub secundo, quod dicitur Diasyenes, sunt Getuli Fierum Persici sinus, Regni Chinæ maior pars. Sub tertio, quod vocatur Diaalexandros, quia transit per Alexandriam, est Ægyptus, Persia. Sub quarto, quod dicitur Diarhodos, quia transit per Rhodum, est Cyprum, Creta, tota Sicilia, & Coos Hippocratis patria. Sub quinto, quod appellatur diaromes, quia per Romam transit, est Bizantium, Hispania, & media Italiæ pars: sub sexto, quod dicitur Diapontos, quia transit per pontum mare, est Lombardia Veneriæ, Vngariæ, & Galliæ magna pars: sub septimo, quod Diaborysthenes vocatur, est Germania superior, Polonia, & plura alia. Qui vero distinctius scire vult sub quo climate sint omnes prouinciæ, adeat Geographiam Ptolomæi.

*Quæritur  
quod clima  
sit temperatissimum.*

Magnum est dissidium inter medicos sub quo climate inueniatur aër temperatissimus, vel saltem habitatio cæteris omnibus temperatior, & accommodatior. Auicennas lib. 1. fen. 3. cap. 1. tenet, quod sub æquatione diei, vbi incipit primum clima, nisi montes, vel maria impendant, sit locus habitationis omnium temperatissimus, quia rectitudo solis super capita minus ibi malum operatur, & minus mutat aërem, quam solis propinquitas apud nos, & apud eos, qui sunt in maiori latitudine; subdit Auicennas, & dicit, quod post istos, qui moran-



tur sub æquinoctiali magis temperati sint, qui in quarto morantur climate, quia non aduruntur propter moram solis, ut in secundo, & tertio, neque congelantur, sicuti contingit his, qui in extremitate quinti climatis habitant: neque Aristoteles ob stare potest Auicennæ, quamuis 2. meteor. summa 2. cap. 2. dicat, sub æquatore locum esse inhabitabilem propter radiorum solis rectitudinem, quia experientia hætenus docuit Aristotelis opinionem falsam esse; iamdudum enim repperat fuerunt Insulæ, & Prouinciæ plurimæ sub æquatore habentes aërem temperatum, & terram fecundissimam, inter quas est Insula Sancti Thomæ, Abissia, & aliæ innumerabiles Prouinciæ.

*Opinio Auicennæ.*

Præterea est auctoritas Ptolomæi, qui fuit tempore Antonini Imperatoris anno post aduentum Saluatoris 140. qui 2. Almag. cap. 6. & 2. quadrip. putat sub linea æquinoctiali esse regiones temperatissimas, & habitabiles, & in Geographia sub primo climate multas collocat prouincias temperatæ habitationis, ut mirandum sit, quomodo Auicennas, qui fuit post Ptolomæum aliquot centenis annis, nesciret, an montes, vel maria impedirent habitationem primi climatis, cum plurimæ Prouinciæ, & Regna à Ptolomæo sub illo descripta sint.

*Opinio Averrois.*

Auerroes quoque, qui tempore Auicennæ fuit, in verba Aristot. iurans negat, sub primo climate esse locum habitationis, putare enim quintum clima, sub quo ille erat, esse omnium temperatissimum. Manardus Ferrariensis 7. Epist. nostrum sextum clima sub quo ille erat cæteris omnibus anteponit. Albertus Magnus, cuius patria est Ratisbona, quæ inter sextum, & septimum collocatur lib. de nat. loc. dist. 1. capite 12. dicit, sextum & septimum esse temperatissima, quia homines illorum climatium sunt pulcherrimi, corporumq; procerum, pulchræ staturæ, & venusti coloris: omnes ergo suam patriam laudare videntur.

*Opinio Manardi.*

Vera tamen opinio (ni fallor) est quod omnia climata præter frigidissima, & remota à mari possunt vocari temperatissima, & ratio est, quia hic consideramus climata per relationem ad hominem, cuius temperamenti æqualitas refertur ad iustitiam, & non ad pondus æquale elementorum, quod non datur, nec dari potest, quia, ut optime dicit Aristot. 1. cæli text. 12. & alibi, omnia mista mouentur à prædominante, ergo clima diceretur temperatum facta collatione cum misto æquali ad iustitiam, quod potest inueniri in omni climate, quare quando agemus de homine temperatissimo, intelligemus esse rationem facta collatione non cum hominibus aliorum climatium, sed cum temperatis proprii climatis; similiter dum dicimus volam manus esse partem temperatissimam, intelligimus respectu illius hominis, & non absolute, quia cutis manus hominis temperati primi climatis respectu temperati septimi, est intemperatissima. Præterea, si per intemperatissimum intelligeremus absolute, & non per relationem ad proprium clima, sequeretur quod temperatissimus in omni climate esset temperatissimus, quod nullo modo esse potest, quinimmo vir temperatissimus primi, sub septimo intemperatissimam vitam ageret. Amplius, si per intemperatissimum intelligeremus absolute, & non respectu

*Opinio Alberti Magni.*

*Propria opinio.*

Amplius, si per intemperatissimum intelligeremus absolute, & non respectu

*Vi omnes va-  
riate coacti  
dicant pro-  
prium clima  
esse aliis tem-  
peratius.*

Et proprii climatis, sequeretur, quod qui in primo nimio ardore viscerum torretur, quique sanus ibi vivere non potest, dici quoque posset temperatissimus respectu septimi, sub quo dio eius incendium ob insigne frigus adeo miresceret, ut temperatissimum habitum sibi compararet: patet itaque climata dici temperata, vel intemperata respectu aliquarum temperaturarum, & non absolute; ac in omni climate inueniri posse homines adeo temperatos, ut illis temperatiores non dentur, & denique omnia climata vocari posse eque temperata. Tantum potuit hæc veritas, ut per celebres medici, & philosophi, qui de hac disputarunt, veritate coacti in bonam opinionem inciderint, quæ erat, quod proprium, & patrium clima, ut omnibus magis accommodatum, sit temperatissimum omnium; hinc Hippoc. Galen. & Auicennas laudant quartum clima sub quo vixerant; quartum enim per Gnidum, & Coon, ut dicit Galen. 3. aphorismorum 14. transit: Auerroes Cordubensis, cuius patria est in Hispania; quintum, Manatus Fertariensis, suum sextum aliis anteposuit. Albertus Magnus Germanus Ratisbonæ natus dicit, esse credendum septimum (quod suum erat) esse temperatius, quia homines sub illo sunt pulchriores, & proceræ staturæ. Hinc Galenus, quamuis defenderit quartum esse ætemperatius, non tamen potuit omittere, quin diceret loco citato, quod omnes regiones respectu priorum habitatorum sint temperatæ illis exceptis, quæ sunt frigidissimæ, & calidissimæ, vel remotæ à mari: excluduntur frigidissimæ regiones remotæ à mari, & non proximæ, quia vapores algidi ventis maritimis contemperantur: fertur ab omnibus Londinum Angliæ metropolim, quamuis eius altitudo sit grad. 52. non excellere in frigore aërem Venetum; Concludimus ergo in quolibet climate inueniri posse temperatissimos, dicimusque temperatissimum Germanum æquiparari posse temperatissimo Arabo, vel Abissino; sola enim propria habitatio à primordiis constitutionis acquisita est animantibus accommodata, & temperata, alienæ vero sunt incommodæ, & ferè omnes intemperatæ: si elephantes in Italiam ducantur, ob climatis diuersitatem virtutem generandi amittunt, vivere tamen diutius possunt: si vero in Germaniam, & regiones frigidiores ducantur, non solum facultatem gignendi amittunt, verum quam citissime moriuntur, nisi in calidis locis conseruentur; similiter animalia regionis frigidæ, ut Sabelini, & elia id genus, si in Italiam ferantur (ut experientia probatum est) viuunt, speciem tamen propagare non possunt; si vero in Africam ferantur, virtutem generandi, & simul vitam quam citissime amittunt; itaque vanum erit inquirere, quod clima absolute melius sit; quia in quolibet climate inuenitur temperatum, quo temperatius esse non potest; quilibet enim homo temperatus in proprio climate, erit intemperatus in alienis, & quilibet intemperatus in proprio, inueniet clima respectu illius magis temperatum: itaque valde conuenit, ut inquiretur quod clima conueniat frigidis, quod calidis, quodve siccis, vel humidis: habet igitur Galenus 3. aphorismorum 14. ubi aër est succus, humidæ naturæ sen-

tient



tient vtilitatem, naturæ vero sicca in aëre sicco ob constitutionem, vel ob climata incidunt in febres, & lippitudines, & aliquando in attras biles, quia portio humida in bile absumitur & exsiccat; similiter natura frigida in frigidissimo aëre congelatur, calida contemperatur; quare non est inquirendum, quod clima absolute sit temperatus: sed quod sit magis accommodatum humidis, quod siccis, quod calidis, & quod frigidis temperaturis: dicendum igitur est, quod his, qui natura calidissimi sunt, primum clima sit valde contrarium, & inimicum, septimum vero amicum: frigidissimis septimum est contrarium, primum vero est accommodatum. Hinc Delphicum Oraculum (vt refert Herodotus) dedit responsum cuidam humida, & frigida affectione correpto, vt in Lybiam regionem calidam se trāsferret, quia ibi habitum frigidum ad temperatum reduceret, vnde promptius sanguinem, & non pituitam amplius auget. Ex aëre igitur veris, & climate temperaturis accommodato, quod erit facile, vt inueniatur, colligemus polyæmiam.

A cibo & potu colligimus sanguinem: à cibo, quia 3. de alim. fac. Galenus dicit, panem, volatilia vt perdices, & quæ facilis digestionis sunt, conuertuntur in sanguinem. A potu 3. de alim. fac. cap. 4. habet vinorum omnium rubra, & crassa sanguini generando esse accommodatissima, vt quæ minima egeant mutatione, vt sanguis fiat; verum, sicuti omnia climata possunt esse temperata, & intemperata respectu diuersorum; similiter alimenta respectu diuersarum naturarum possunt conuerti in sanguinem, & in malos humores. Doctrina hæc colligitur à Galeno 2. de naturalibus fac. cap. 8. vbi dicit, quod mel in naturis calidis vertitur in bilem, quia calidum cum sit, vbi calido adiungitur, mediocritatem temperamenti facile amittit, & sanguinem generare non potest, subdit, mel enim in frigidis naturis, & senibus vertitur in sanguinem: hac igitur ratione coacti de omnibus cibis poterimus cognoscere an polyæmiam fecerint; si viderimus hominem calidi temperamenti comedisse mel, & alia id genus calidi nutrimenti, & facilis digestionis, dicemus bilem, & nō sanguinem in illo esse acervatam: si frigidi, dicemus potius sanguinem esse accumulatum. Idem de cæteris omnibus cibis erit dicendum. Ex cibo ergo, & potu locus oritur indicans polyæmiam, qui consistit in hoc, vt examinemus quibus temperaturis conueniant alimenta gignentia sanguinem, quia inueniemus in frigidis alimenta calida sanguinem augere, & frigida in calidis, & humida in siccis, & moderata in moderatis.

A somno moderato sanguinem augeti colligimus, de qua re au-  
dias Galenum 12. methodi cap. 3. somnus moderatus cruditatem le-  
uat. Subdit deinde somnus concoquit, vigilæ digerunt; causæ ve-  
ro, cur somnus concoquat, & vigilæ digerant, traditur à Galeno 4. in  
6. de morb. vulg. tex. 14. iis verbis, in somno calor ad internas partes  
reuocatur, & melior coctio fit. Hinc Galenus 4. de tuend. sani. cap. 4.  
semper sibi consensiens habet, somnum, & quietem semicoctos hu-  
mores.

mores optimè coquere & perficere. His positis quisque ex somno moderato non intercepto colligere poterit polyæmiā.

*Ut balneum  
aqua dulcis  
sanguinem  
auget.*

Ab vltu balnei aquæ dulcis ob duplicem rationem idem colligitur: prima est, quia inducit somnum: ostendimus superius somnum semisanguinem perficere, & cruditates tollere. Galenus verò 3. de loc. aff. 5. reddit rationem, cur balneum soporiferum sit, dicitque, balneum eo quod caput madefacit, soporiferum esse: multæ enim sunt lotiones ex aqua dulci, & papauere paratæ, quibus, si abluantur capita, illico somnus inducitur. Secunda est, quia balnea dulcis aquæ calefaciunt, & humectant, & trahunt sanguinem ad nutriendas partes, quæ dum bene nutritæ sunt statim conspiciunt in copiosi sanguinis productionem.

*Ut lætitia.*

A lætitia moderata augetur sanguis, quia sicuti balneum diffundendo causat meliorem nutritionem, & auget vires alteratricis facultatis, ad eundem modum lætitia idem præstat; hinc Galenus de lætisia loquens lib. de hum. com. 2. tex. 31. dicit, nam cogitare, & videre quæ iucunda sunt, animum lætitia perfundit, natiumque calorem dilatat: dum igitur ob lætiam natius calor dilatur, necessario secum fert sanguinem ad rectè nutriendas partes, quia natui caloris domicilium, ut sæpè dicit Gal. est sanguis, & necessario calor cum sanguine mouetur: præterea 4. de causis puls. cap. 3. habet, quod lætis diffunditur per vniuersum corpus calor, vnde meritò sit maior pulsus, ex hac igitur dilatatione caloris moderatur internum incendium viscerum, vnde melior coctio, & ad omnes corporis partes fertur pabulum, vnde melior nutritio: ex meliori igitur coctione, & nutritione necessario copiosus, & optimus sanguis gignetur: diximus moderatam lætiam augere sanguinem, quia nimia lætitia destruit, & dissoluit vires facultatum alteratricum, & minuit sanguinem. Galenus 12. methodi cap. 5. dicit, ob vehementem timorem, & excessum lætitiæ aliquos perisse homines: timorem subitum, & vehementem vocat Galenus ecplexin: voluptatem maximam perichariam, id est quasi excessum gaudij: legitur perichariæ occasione Dionysium Tyrannum, & Sophoclem accepto tragicæ victoriæ nuncio præ nimio gaudio statim periisse: similiter Romana mulier prius intelligit filium in canario prælio esse occisum, deinde cum post tot lachrymas eum videat sanum redire domum, præ nimia lætitia moritur. Ab exercitio consueto omissio colligimus statim auctum esse sanguinem: locus hic à Galeno obseruatur primo de hum. 1. ut valeat consequentia, omittit exercitium, ergo magis, quam antea, sanguine abundat.

*Qui mortui  
sunt præ  
nimio gaudio.*

*Ut exercitiū  
consuetum  
omissum.*

*Ut ex*



*Ut ex dispositione corporum, ex morbis, symptomatibus, loc. aff. & iuuantibus, & ledentibus polyamia cognoscitur.*

C A P. XIV.

**L**OCI indicantes corpora esse disposita ad polyamiam sunt antecedentes, vel consequentes: antecedentium primus oritur à sanguineis parentibus, qui ob copiam sæpe fuerint soliti in hæmorrhagiis erumpere: si verò ex hoc loco aliquid certi non colligitur, est secundus locus ab ætate florida desumptus; iuuenes enim, & qui ætate consistentiæ gaudent, ut plurimum sanguine abundant. Tertius locus consistit in habitu corporis, continetque sub se tres locos, quorum primus est esse carnosum, ut erant Atletæ, sed non pinguem; quia pinguedo ex frigidityte, & non ex sanguine nascitur; dicit enim clarè Galenus 2. de temp. cap. 4. quod adeps ex habitus frigidityte gignitur, corpulentia siue carnis abundantia ex sanguinis copia: præterea Galenus 1. de hum. cap. 1. dicit ex corporis grauitate, & leuigine ad motum sanguinis vbertatem colligi: & quamuis Galenus 6. de morb. vulg. capite 3. tex. 29. dicat inueniri emaciatos cum plurimo sanguine, & crassos cum paucis, dicatque iis verbis se copiosum sanguinem detraxisse emaciatæ mulieri: mulieri emaciatæ, cui suppressi erant menses primo die sanguinis sex qui libram detraxi; postmodum verò eius diei iterum libram, tertio die octo uncias: occurrimus emaciatos abundare posse sanguine seroso, vel alio modo vitiatò, & non sincero, de quo nos loquimur, dum vero refert, crassos inueniri cum paucis sanguine, nos per crassos intelligimus pingues, & non perfectum habitum carnosum, qui re vera supponit semper sanguinis sinceri abundantiam. Secundus locus est venas habere elatas, & eminentes, ut colligitur à Galen. 1. de hum. 1. & 6. de morb. vulg. 3. tex. 29. dum de muliere emaciata cui sanguinem multum detraxit loquitur, ibi habet hæc: non possunt sanè venæ esse angustæ, & flacidæ, & sanguinem copiosum continere. Tertius locus est physionomicus, etenim sunt admodum hirsuti ratio est, quia copia sanguinis indicat copiosam esse fœcem melancholicâ, quæ est causa propria pilorû. Præterea ex Aristo. sanguinei habent magnâ frontem, & aures erectas: ex Hipp. & Galeno 4. de ratione vict. in ac. tex. 26. sanguinei habent constantiam seu immobilitatem oculorum. Quartus locus desumitur à virtute corporis, nisi enim facultates animales fortitudine donatæ sint, sanguinem augere non valent. Quintus locus, qui est omnium certissimus, colligitur ex consuetudine sanguinis euacuatione intermissa per nares, hæmorrhoides, & per alias partes; ex hoc enim fonte, & ex aliquorum saltem syndrome non erit difficile sanguinis vbertatem cognoscere.

A consequentibus, scilicet ab actionibus animalibus, vitalibus, naturalibus, ab exeuntibus, & retentis, & à qualitatibus tactilibus colligimus, quando corpus est dispositum ad polyamiam. Quo ad facul-

*Quinque loci à dispositionibus antecedentibus desumpti indicantes polyamiam.*

*A physionomia.*

*A virium robore. Ab intermissa sanguinis euacuatione.*

*Loci à consequentibus & dicentes polyamiam.*

tates animales principes attrinet, vt est discursus, memoria, & imaginatrix, dicimus esse retusas; & hebetes; sanguineos enim vocat Galenus, 2. de hum. tex. 30. & 1. de nat. human. tex. 39. stolidos; vtque stolidi ex Galeni auctoritate dicuntur esse ad risum profusi, incontinentes, & imprudentes. Quo ad actionem imaginatricem, dicit Galenus 1. de humoribus com. 1. & alibi, quod somniant sanguinem egredi, vel ab alto cadere, & rubra videre: non potest enim sanguinis redundantia in venis contineri: quin ad cerebrum mittantur sanguinei vapores, & spectra sanguinea offerantur. Quo ad morticem facultatem attrinet, obseruamus sanguineos difficilè montes ascendere, ratio est, quia caua vena tumida, & onusta sanguine comprimens diaphragma necessario reddit inspirationem frequentem, & laboriosam.

Ab actionibus vitalibus locus à pulsu desumitur; dicit Galenus 2. de causis pul. cap. 2. quod sanguinis copia facit illam sanguinis inæqualitatem, quæ facilimè sedatur sanguinis missione: valebit ergo consequentia, post sanguinis euacuationem illico tollitur pulsus inæqualitas, ergo polyæmia erat in corpore.

A naturalibus, quia aptissimi sunt ad coctionem, sicut enim biliosi ad attractionem, & expulsionem, & melancholici ad retentionem; sic sanguinei in concoquendo cæteris omnibus præstant. A nutritione idem colligitur, dicit enim Alexander Aphrodisæus 2. probl. 10. sanguineos benè alere, dicitque sanguinem primo loco alere; secundo loco pituitam; valebit ergo perfectè alitur, ergo sanguinis optimi est abundantia.

Ab exeuntibus, quia faciunt excrementa sanguinolenta, & vt plurimum rubra; etenim dum sani quoque sunt, rubrum reddunt lotium, rubra sputa, & fæces sanguineo colore sæpè resperfas. Amplius duo oriuntur loci à semine, & lacte copioso; quia Galenus 16. de vlu. par. cap. 10. dicit, quod sanguinei omnes lac, & semen copiosum faciunt, valebit ergo, lac copiosum gignitur, vel semen, ergo polyæmia.

A qualitatibus rusticis, quia, si habent oculorum venas rubentes, & linguam plus debito rubram, sanguinis habent abundantiam, valebit ergo oculi & lingua naturaliter rubent, ergo sanguinis vbertas; Galenus 1. de hum. com. 1. dicit, si corpus vergat ad rubrum colorem, signum est polyæmiæ, hæc sunt verba: si corpus se ipso albidius sit factum, neque vlla sit perturbatio, pituitam abundare plerumque indicatur, cum vero sit pallidus, aut magis flauum, bilem; si ad rubicundius vergat, quam naturæ status ferat, sanguinem; si ad nigrum atram bilem. Ex iis antecedentibus, & consequentibus locis polyæmia colligi poterit.

*Vt à morbis  
colligitur po-  
lyæmia.*

A morborum generibus omnibus idem colligitur: ab intemperie scilicet calida, qualis est febris synochus sine putredine, quæ triduo soluitur, quæ est homotona, id est semper manens in eodem vigore vsque in finem, vel acastica, quæ scilicet semper augetur, vel paracastica id est semper decrescens, sanguis colligitur; valet enim est synochus, ergo sanguinis redundantia. A mala compositione, vt à tumore rubro



re rubro cuiuslibet partis corporis, & præcipuè oculorum, in quorum venulas sanguis redundans faciliè procumbere, & restagnare solet: locus iste à tumore rubro est Galen. 14. method. cap. 9. A soluta unitate, ut sunt venarum rupturæ, non ob casum factæ, vel iram cum clamore, vel ob aliam causam extrinsecam, sed ob plenitudinem.

Symptomata sanguineos morbos insequentia sunt actiones læsæ, *ut à symptomatibus.* exeuntia, & retenta, & qualitates tactiles præter naturam, suntque illa ferè symptomata declarata in locis pertinentibus ad secundum fontem, veluti rubra somniare, pulsus habere inæquales, & alia superius proposita. In sanguineis tamen ægrotantibus hæc symptomata adhuc fiunt vehementiora. Etenim risus, sanguinis fluxus per hæmorrhoidas, per os, per nares, sanguinisq; suppressio, suggillatio, color rubeus totius corporis, & lippitudo sine morfu in ægrotantibus modum excedunt. Præterea debent quoque observari symptomata, quæ insequuntur polyæmiam ab Hippocrate, & Galeno 4. de ratione vict. rex. 26. relata, dicit enim ibi Galenus, manuum porrectiones, dentium stridores, & maxillarum contractiones à sanguinis nimia abundantia lædente nervorum originem provenire, additque sanguinis multitudinem inducere torporem, & inde oculorum constantiam, & immobilitatem. Ex iis ab Hipp. & Galeno propositis symptomatibus insequentibus sanguinis vbertatem duo oriuntur loci, alter à vitiosa motione, scilicet à stridore dentium, à maxillarum contractione, & à manuum porrectione: alter à torpore, & ab oculorum constantia, & immobilitate.

Si vero varia signorum genera ægrotanti contingerent, ut partim indicarent sanguinis multitudinem, & partim vitium aliorum humorum, tunc esset dicendum cum polyæmia peccare quoque alios humores, exempli causa, sit aliquis carnosus, habeatq; linguam plus debito rubram, oculos suggillatos cum lippitudine sine morfu, ex iis polyæmiam colligemus, verum si patiens habebit adiunctam tertianam, dicemus cum vbertate sanguinis mistam esse bilem; denique, si huic superueniet symptoma melancholicum, conticiemus sanguinis portionem esse permutatam in succum crassum. Ex methodis propositis non solum simplices humores, sed mistos quoque colligemus: quomodo autem mixturæ fiant, in lib. sequenti declarabitur.

A locis affectis idem colligitur, partes affectæ, quæ sæpè sanguinem peccare ostendunt, sunt iecur, & venæ. Iecur, quia est sanguinis auctor, dicebat Galen. 4. de usu par. cap. 13. in iecore sanguinem fieri, & bene coqui, quia multi in eo sunt sinus; venæ, quia sunt sanguinis domicilia; valebit ergo ut plurimum, iecur afficitur, ergo in sanguine morbus est: morbus à venis dependet, ergo sanguineus: si vero in consequentiis aderit scrupulus, virtute signorum aliorum fontium faciliè illum tolles.

A iuuantibus & lædentibus colligimus duos locos indicantes sanguinis vbertatem, quorum primus est, dum iuvat sanguinis missio, quod signum, quamvis indigeat, ut aliis roboretur signis, ex Galen. ramen 4. de tuend. san. 4. sæpè valet consequentia, iuvat sanguinis euas-

*ut à locis affectis colligitur polyæmia noscitur.*

cuatio, ergo polyæmia. Secundus locus sumitur ab illa cibi paucitate, quæ tollit lassitudinem, & sitim, est Galen. 6. de morb. vulg. cap. 3. tex. 28. sanguineos scilicet, & pituitosos cibi paucitate tollere sitim, & lassitudinem. Postremus hic fons continetur virtute in quinque superioribus, qui soli necessario concurrunt; ratio necessitatis illorū ex eo pendet, quia ut aliquid fiat duo necessario semper præcedunt, externæ scilicet coctiones, & subiectum dispositum, alioquin nihil noui in hoc mortali & caduco statu emergeret: hinc philosophus pro rerum caducarum principis posuit causas efficientes externas, & priuationem, quæ aliud non significat, quam corpus dispositum, estque principium, tum quia sine ipsa nihil heret, tum, ut euitaret illam vanitatem Anaxagoræ dicentis, quodlibet fieri ex quolibet: positis igitur causis efficientibus & corporibus dispositis necessario formæ seu morborum ideæ fiunt, & deinde eorum symptomata, quæ morbos sequuntur, ut umbra corpus. At denique oportet, ut in aliquo loco, vel aliqua corporis parte sint. Quæ cum ita sint necessario quinque fontes oriri debent: ut Primus sit ab externis causis efficientibus ortus. Secundus à dispositione corporum. Tertius à morborum ideis. Quartus à morborum symptomatis. Quintus à locis affectis. Postremus, qui est à iuuuantibus, & lædentibus in aliis re vera contineatur fontibus, ut alibi ostendimus: illo tamen utemur, ut aliquando facilè, & sine longo discursu peccantes, & occultos humores cognoscere possimus.

*Epilogum.*

Ex traditis patet, quomodo per signorum communium syndromem artificiosam potuimus cognoscere omnes peccantes humores in corporis latebris absconditos: ostendimus prius modum, quo septem biliosorum succorum differentiæ, scilicet pallida, flaua, vitellina, porracea, isatidis, æruginosa, & rubra, cognoscantur: deinde modum cognoscendi quatuor pituitosorum succorum differentias, quæ sunt pituita acida, salsa, vitrea, & dulcis: exinde quomodo tres melancholiæ, scilicet fæx sanguinis, eadem adusta, & atra bilis cognoscantur. Demum egimus de cognoscendo flatu, & de polyæmia: quorum omnium cognitio adeo medicinæ conferre potest, ut credam sine exacta hac notitia, esse impossibile, ut ægitudines cognoscamus, & ægrotantibus superpetias afferamus.

Finis Sexti Libri.





# SANCTORII

## SANCTORII

Iustinopolitani


*METHODI VITANDORVM  
errorum in misturis humorum peccan-  
tium per sapores, & colores perqui-  
rendis.*

LIBER SEPTIMVS.

---

*Ostenditur, quomodo omnes peccantes humores misceantur.*

### CAPVT I.



**I**N præcedenti libro ostendimus, quomodo virtute syndromes signorum communium possint perquiri humores in imis corporis partibus existentes: in præsentia sequitur, ut statim agamus, quomodo misceantur, & qua via humorum misturæ cognoscantur. Omnes humorum peccantium misturæ (ut à communissima diuisione exordiar) vel sunt intrinsecus factæ, vel ex humoribus à variis, & separatis partibus missis. Intrinsecus factæ ab Auicenna dicuntur, quando (exempli causa) peccaret bilis flaua, accideretque, ut eius portio à calore præter naturam fieret æruginosa, eaque cum flaua misceretur; si vero accideret, ut æruginosa ab alio loco mitteretur, & flauæ bili adiungeretur, mistura ab humoribus aliunde missis vocaretur. Auicennas lib. 1. fen. r. cap. de humoribus dicit, nullam esse humoris speciem, quæ aliquando misturatum vtrumque genus non experiat: nullus tanè est patiens malis humoribus vexatus, qui mala aliqua humorum miscella non graueretur, quoniam nemo ab vnico solo humore peccante, qui non alteretur, & transmutetur, vexari potest; et Galeni sententia 2. de diff. feb. 5.

*Vi errant Ty-  
rones medici  
dum ineunt  
consilia pro  
curandis  
morbis.*

humores non posse eodem modo manere, sicuti erant prius; quia in perpetua alteratione versantur, & semper inuicem miscentur: est quoque corporum viuentium natura, quæ idem persuadet, quia iners & otiosa manere non potest. Hinc, si bilis flaua in morbi limine exuperat, ante quam æger ad augmentum, vel statum perueniat, tam variis modis alteratur, ut in varias humorum prauorum differentias sæpè mutetur; modo enim fit porracea, modo æruginosa, modo atra, & denique ex variis transmutationibus variæ quoque mixturæ fiunt, quæ diuersis modis humanum corpus opprimunt. Tyrones medici, dum ineunt consilia pro ægrotantium salute, non insipientes has humorum perpetuas vicissitudines, & mixturas in hunc errorem prolabuntur; statuunt in morbi principio, humorem peccantem exempli causa esse bilem, creduntque eandem humoris speciem perseverare usque in finem, perinde ac bilis esset inalterabilis, & intransmutabilis: nec vident, humores ob morbi insultus multoties mutari, & permisceri. Nec vident in omni ægrotante esse quotidie obseruandas, & præcognoscendas varias humorum mutationes: bilis enim, quæ externo die erat flaua, hodie fieri potest æruginosa; cras deinde posset misceri cum pituita, & in porraceam degenerare. Ex qua posita humorum vicissitudine variæ oriuntur indicationes, & varia remedia quotidie proponantur oportet; quæ enim indicantur à bile flaua, non conueniunt æruginosæ, nec vice versa: similiter indicationes, quæ hauriuntur ab æruginosa facta in eadem massa erunt omnino diuersæ ab iis, quæ indicantur ab æruginosa aliunde missa.

*Quales sapo-  
res indicant  
humorum  
mixturas.*

Sapores indicantes humorum mixturas sunt salus, dulcis, acidus, & ponticus. Colores verò præcipui sunt albus, flauus, vitellinus, porraceus, & niger: ostendimus in 1. lib. saltum saporem salisam pituitam indicare; verum, quia salsedo in pituita fit, vel quia miscetur cum salso sero, vel quia ob putredinem, vel moram, vel ob aliam causam calidam falsa fit, ideo, quomodo hæc fiant, erit explicandum. Similiter, cum obseruetur ponticus sapor in pituita vitrea, expedit, ut exploremus an per se, vel per accidens talis sit, quod est, an à magno frigore, vel ab humore aliunde transmissio ponticum acquirat saporem: solet sæpenumero exigua melancholici ichoris portio, perinde ac oleum sulphuris, vitream pituitam ponticitate inficere. Idem sapor dulcis, qui in salua obseruatur, fit, vel quia cum pituita miscetur ichor sanguineus, quæ mixtura facta est ab humore aliunde veniente, vel quia pituita reddita est semisanguis: hæc vocatur mixtura intus facta. Postremo acidus sapor fit in pituita, ut dicit Auicennas lib. 1. cap. de humoribus, vel ob mixturam melancholiæ forinsecus missæ, vel ob causam, quæ est in pituita; etenim si dulcis sit, & contingat ut ebulliat, dicit Auicennas, acidam fieri.

*Quales colo-  
res indicant  
mixturas hu-  
morum.*

Similiter colores modo per se tales, modo per mixturam fiunt: si alba fuerint excrementa, protinus dicemus esse alba vel ob mixturam pituitæ, vel ob debilitatem ventriculi, vel hepatis. Nisi distinctè has affectuum ideas præcognoscamus, neque indicationes haurire, nec

manus



manus medicas miseris ægrotis porrigere poterimus. Flauus color modo, vt dicit Galen.lib. de atra bile, oritur à mistura tenuis humoris, modo 2. præfag. 47. flauus fit à pallido sero torrefacto. Vitellina bilis eandem difficultatem nobis adfert, quia Auicennas credidit factam esse à mistura flauæ bilis cum crasso phlegmate. Galenus verò negat in hac bile esse misturam, quia putat à calore igneo, tenue & aquosum flauæ absumi, & inde colorem intendi, & vitellinum fieri. Postremo est porracea bilis, de qua sunt qui dicunt, talem fieri ob misturam flauæ cum pituita; sunt quoque alij, qui dicunt vitellinam, & non flauam cum pituita, vt porracea fiat, permisceri. Denique sunt qui deffendunt porraceam esse misturam pituitæ cum æruginosa bile. Quocirca, cum omnia sint controuersa, sintque obscura, & difficultatibus obstructa, nō est mirum, si in omni re difficili omnes opiniones, quas fingere potest humanus intellectus, in medium afferantur. Idcirco nisi in tanta opinionum varietate distinguamus analyticis initiis, quæ sunt propria à communibus, nulla nobis relinquetur via, qua veritatem consequi possimus.

Præterea plurima sunt affectuum præter naturam exempla in quibus obseruantur humorum misturæ. Galenus lib. de tumoribus præter naturam cap. 10. dicit, causam erysipelatis externi esse bilem flauam mistam cum ichore sanguineo, valebit ergo, est erysipelas externum, ergo mistura bilis flauæ cum ichore sanguineo ægrum vexat. In Historia Vxoris Dealcis, quæ in delirio plorabat, & ridebat, Galenus collegit sanguini bilioso melancholiam esse commistam: lib. de comate cap. 3. & 1. prædict. com. 33. legimus, coma vigil à mistura bilis cum pituita pendere, vt perpetuo valeat consequentia, est coma vigil, ergo misturæ ex bile, & pituita accepta referenda causa est: tale quippiam in aurium tinnitu, qui aquæ currentium sonū imitatur, dicimus, esse pituitam aquosam cum flatu. In lethargo exquisito omnes consentiunt esse pituitam mistam cum sanguine: idem in alijs obseruatur affectibus, quia nullus est morbus, qui ab aliqua mistura non alatur, & foueatur: quinimmo, dum sanam vitam agimus, nullus est humor ita simplex, & syncerus, qui non sit ab aliquo contaminatus, & non sit factus impurus. Si elementa, quæ mundum hunc inferiorem complent, impura, & inuicem permista esse credimus, quanto magis erit credendum, in ægrotantibus humores à causis non naturalibus, & violentis esse permistos, & contaminatos. Quæ cum ita sint, valde conuenit, vt de saporibus, & coloribus indicantibus misturas humorum alius reperamus, vt tandem misturis cognitis, sciamus indicationes haurire, & morbis suppetias afferre.

*Exemplis ostenditur in agris, vel sanis non inueniri synceros humores.*

*Quomodo cognoscitur, quando falsedo in pituita fit per misturam  
intus factam, & quando per misturam humoris  
aliunde venientis.*

## CAPVT II.

*Galenus, &  
Auicenna  
sententia de  
causis falsi-  
dinis pituita.*

**C**VM falsus sapor præcipuè indicet humorum misturas, præstat prius perquirere, cur insipidi humores fiant falsi: variæ sunt opinionones, Galenus 2. de diff. feb. cap. 8. dicit, falsedinem pituitæ fieri aut propter putredinem, aut propter falsæ & serosæ humiditatis mistionem. Auicennas lib. 1. fen. 1. doct. 4. capite 1. dicit, pituitam fieri falsam vel ob mistionem bilis adustæ, vel ob putredinem, vel ob moram. Plurimi Galeni sectatores, cum videant Auicennam discedere à Galeni sententia, dum diceret, falsedinem fieri ob mistionem bilis adustæ, Galenus vero ob falsæ, & serosæ humiditatis miscellam, conantur sententiam Auicennæ experimentis reiicere: dicunt enim, nunquam esse visum, quod ex mistione amari cum insipido humore consurgat falsus sapor: verum quomodo res se habeat, & an sit inter Galenum, & Auicennam dissidium, inferius ostendemus.

*Cur falsi i-  
chores, putre-  
do, mora non  
sunt vera  
causa falsi-  
dinis.*

In primis se offert, vt videamus, an propositæ causæ falsedinis sint propriæ & adæquatæ, à sumpto hoc initio ab Aristotele, & à Galeno nō semel supposito, quod scilicet causa propria, & adæquata vnius effectus vnica sit, eaque non sit partialis, vel remota. Dum igitur dicunt, causam falsedinis esse putredinem, vel moram, videntur asserere causas partiales, & non adæquatam: dum vero dicunt, falsam, & serosam humiditatem causare falsedinem in pituita, petere videntur principium, quoniam quæritur, cur serosa humiditas falsa sit: inuenienda est igitur causa falsedinis, vt falsedo est, quæ vnica debet esse, & vnico debet adæquato conuenire subiecto, & non pluribus: qua inuenta illico quoque scietur, cur falsi fiant humores. Hæc doctrina est Aristotel. 2. priorum cap. 35. vbi ostendit exemplo fortitudinis Leonis, nos scire solum per conuertibilia, & adæquata: similiter 2. post. circa finem dicit, passionem quærendam cognosci, dum subiectum, cui primo conuenit, & eius passionis causa adæquata inuenitur: hinc philosophus, quem nos æmulari conamur, in tota sua philosophia prima subiecta passionum semper perquirat, vt demonstratiuas scientias constituat: hinc 4. metaph. attribuit enti in communi, vt primo subiecto, & adæquato communissimas proprietates, quæ constituunt diuinam philosophiam, easque deinde perquirat. Adeundem modum primo cæli acturus de motu locali quinque simplicium corporum, statim tex. 5. præcognoscit cui subiecto adæquatè conueniat localiter moueri, dicitque conuenire magnitudini naturali sumptæ in maxima latitudine: similiter in tota sua philosophia vult omnia pendere ab vnica causa, & vnius causæ, quatenus vna, vnicum esse effectum, & vnius effectus, quatenus vnus, vnicam esse causam, & vnicum subiectum. Quam altissimam



tissimam sapientiam sequens quoque Galenus admirabilem medendi methodum composuit, quæ consistit in hoc præcipuo fundamento, quod scilicet vnum, vt vnum, conueniat vni, pendeat ab vno, & indicetur ab vno.

Supposita itaque hac Aristotelis & Galeni philosophia dicimus putredinem, vel misionem falsi ichoris, vel moram non esse veras causas falsædinis, quia, cum sint plures, nulla erit adæquata, sed quælibet erit partialis: milles enim morantur, vel putrescunt humores, attamen non semper falsi fiunt: esset igitur illa inuenienda causa, qua putredo facit falsædinem in pituita, qua mora sine putredine, vel quælibet adusta sine putredine, & mora falsædinem efficit. Dicimus itaque cum Aristotele, & Galeno falsædinem fieri, quando in humoribus <sup>Qua sit causa falsædinis ex opin. Aristotelis.</sup> pars dulcis, & insipida virtute caloris separatur, & pars terrestris, quæ remanet, adurit, & permiscetur cum humoribus aquosis. Hæc opinio est Aristotelis, Galeni & ceterorum Antiquorum philosophorum. Aristot. 2. probl. tertio: 4. probl. decimotertio, & 5. trigesimo quinto, quia ibi dicit, falsædinem lachrymarum, vrinæ, & sudoris fieri, quia transit dulce, & concoctum in alimentum: pars vero terrea calefacta, perinde ac calx, & cinis, reddit humores falsos. Galeni, quia quinto simp. med. fac. 26. dicit, quod falsum est calidum terrestre: & 2. de facult. naturalibus cap. 8. habet hæc verba, quis non ignorat, eorū, quæ immodicè coquuntur, singula fieri primo quidem falsiora, postea vero amariora: ratio est, quia à calore absumitur pars dulcissima, quæ est magis ærea, quod vero falsum est, melius deinde sentitur: subdit postea fieri amariora; quia calor faciens amarum est magis adurens; amarum quidem, & falsum, ex Aristotele, & Galeno secundum magis & minus differunt: hinc quoque Galenus, aphor. 12. dicit, sicuti acida pituita sit à forti frigiditate, sic pituita falsa sit à caliditate replente caput. Causa igitur falsædinis ex sententia Galeni & Aristotelis est calor resoluens tenue & insipidum, & simul adurens portiones terrestres. Antiquorum, colligitur enim ex libello de historia philosophica Galeno adscripto, quod Anaximæder dicat, mare esse falsum; quia igne consumpta sit pars, quæ erat dulcis. Anaxagoras vero dicat esse falsum, quia pars pinguis in vapores sit resoluta: ibique refertur, Platonicos dixisse aquam dulcem esse factam ex aëre frigoris opera: ecce, quod omnes antiqui putarunt aquam fieri dulcem ob partes pingues, & æreas, falsam verò esse factam, quando à calore pars dulcis ærea, & pinguis in vapores abierit. Cæterum, quia falsædo non solum fit, dum resoluitur insipidum, verum etiam dum pars terrestris calefit, & aliquantulum adurit: ideo Empedocles, & Antipho, vt loco citato refertur, dixerunt falsam aquam esse sudorem corporum æstuantium: patet itaque ex omnium consensu falsædinem fieri à caliditate adurente terreum, & resoluente humidum dulce, pingue, & æreum, quod reuera insipidum est.

Verum, quia caliditas resoluens humidum insipidum, & adurens terreum non solum potest nasci à putredine, à bile adusta, & à mora

humorum, vt dictum est, sed vt placuit Galeno libro de causis morb. 2. à stipatione, alimento, à calidorum corporum adhæsu, à putredine, & à motu; vanum erit arbitrari falsedinem solum fieri à putredine, à mora, & à mistione adustæ bilis, erit igitur causa adæquata falsedinis calor quatenus talis est, vt possit resoluerè dulce, & adurere terreum, illudque permiscere cum aquoso humore: hæc colligitur ab Aristotele, Galeno, & antiquis philosophis: hæcque est causa vniuersalis, & conuertibilis, quoniam posita hac causa, quæ resoluat dulce in sipidū, & adurat terreum, necessario fiet sal, positoque sale, est necessarium eādem causam præcessisse. Præterea idem confirmatur à posteriori siue à proprietatibus falsi saporis traditis à Galeno 5. simp. med. fac. cap. 26. dicit enim falsi saporis proprietates sunt constringere, & constringendo seu condensando seruare, & desiccare; nisi in sale essent portiones terrestres, sal non constringeret, nisi esset resolutum dulce in sipidum, sal non conseruaret, sed corrumpeter; humidi enim dulcis, & insipidi proprium est excitare ebullitionem, & putredinem, nisi hoc dulce insipidum esset resolutum à calido, sal potius refrigeraret, quam calefaceret, quia terra sua natura est frigida, & sicca, nisi partes terrestres adustæ essent permistæ cum aquoso humore, sal nullam penetrandi facultatem haberet. Denique idem confirmatur lucidissimo aquæ maris exemplo; mare enim dulcissima aqua fluminū semper renouatur, nihilominus eadem falsedine ob solis radios exurentes perpetuo gaudet; nisi re vera sal de nouo fieret ab hoc æterno, & immutabili efficiente, vt sunt radij solares, qui dulciores partes aquæ resoluunt, & portiones terrestres adurant, hæcenus eius falsedo esset absumpta.

*Ostenditur à posteriori causam falsi saporis esse calorem resoluentem in sipidum, & adur. tem. terrenum.*

*Cur mare sit falsum & non lacus.*

Verum magna exurgit dubitatio, quia si radij suo calore falsedinem maris efficerent, sequeretur, quod etiam lacus radiis solis expositi essent falsi. Respondemus primo, quod lacus non ita apricantur, neque tot motibus in proprio alueo agitantur, & perfectè miscentur cum terra, vt mare; quamuis vero inueniantur lacus maximè expositi radiis solaribus, & maximè agitati, & turbidi; attamen quia agitatio non est perpetua, vt in mari, partes terrestres permistæ illico perunt fundum, & radij eas adurere, & per consequens falsas reddere pauco temporis cursu non possunt: motus, quibus perpetuo agitur mare, sex sunt omnino diuersi: in lacubus vero tot non sunt: primus aquæ maris motus est fluxus & refluxus: secundus est motus litoris; hi duo motus sunt perpetui, & solum conueniunt mari, & nequaquam cæteris aquis dulcibus: tertius est motus deorsum: quartus motus augmenti & decrementi: quintus est motus ventorum: sextus est motus alterationis, quæ fit à radiis solaribus; radij enim tantum possunt, vt nisi pluuiæ fontes, & flumina in mare continuo restagnarent, totam aquam maris paucorum dierum cursu absumerent.

*Quod mare habeat sex motus omnino diuersos.*

*Oliet.*

Ex superius dictis occurrit dubitatio, quia diximus superius causas falsedinis à Galeno, & Auicenna traditas esse partiales, & non veras, & adæquatas: primo respondemus Galenum, & Auicennam non attulisse



lisse causam adæquatam falsedinis, sed modos, quibus pituita falsa fit: *sol.*  
inspexerunt enim ad duos modos, quo pituita fieri potest falsa, quorū  
primus est, dum falsedo in pituita dulci ingeneratur ob calorem: hæc  
causa calida generans falsedinem potest esse putredo, mora, & qualibet  
causa, quæ potest inspidū resolvere, & adurere terreum, quod est  
in pituita: alias quoque plures causas falsedinis Galenus potuisset af-  
ferre, si omnis falsedinis particulares causas voluisset proponere. Se-  
cundus modus generationis falsedinis est, dum falsi, & serosi humores  
transmittuntur in caput, vel alias partes, & miscentur cū pituita dul-  
ci, quam falsam efficiunt; ecce, quod Galenus proposuit pro causa fal-  
sedinis pituitæ putredinem, & falsos ichores, vt duos modos gignēdi  
pituitam falsam declararet: adhuc enim relinquitur locus quærendi à  
qua causa serosi humores fiant falsi: quare quando Galenus de vera  
causa falsedinis loquitur, non dixit serosos, & falsos ichores, vel putre-  
dinem esse causas falsedinis; sed dixit calorem resoluentem inspidū,  
& adurentem partes terrestres esse veram falsedinis causam. Dū enim  
2. de fac. naturalibus cap. 8. quærit, cur quæ immodicè coquantur fiat  
falsa, non dixit putredinem, vel falsos ichores illam falsedinem effice-  
re; sed calorem igneum resoluentem inspidum, & adurentem terre-  
nas portiones; similiter Auicennas respiciens ad misturā intus factam  
dicit putredinem, & moram falsam pituitam efficere, quatenus resol-  
uunt inspidum pituitæ, & terreū adurunt, non tamen negaret falsam  
posse fieri à nimio insolatu, ab alimentis calidissimis, & similibus cau-  
sis calidis: respiciens vero ad pituitam falsam, quæ fit ab humore aliū-  
de misso, dicit bilem adustam mistam cum pituita efficere falsam pi-  
tuitam, non tamen negasset, pituitam posse fieri falsam à serosis, & fal-  
sis ichoribus, & ab aliis causis calefacientibus, & causam verā, & adæ-  
quaram esse calorem resoluentem dulce, & adurentem terreū. Quod  
cum ita sit, errant qui aduersus Auicennam inuehunt, dicentes ex ad-  
usta bile falsum fieri non posse, quia nunquam est visum ex mitione  
amari cum insipido falsum enasci, argumentum non sequitur, quia  
dum miscemus amarum cum insipido, non possumus naturam imita-  
ri, quia nostræ mitiones sunt iuxta positiones; natura sola per veram  
mitionem operatur; hinc natura miscendo, & transmutando ex eadē  
materia diuersos colores, & sapores illico componit: niger potus, &  
cibus, dum à natura conuertitur in chylum, fit albus, dum vero perue-  
nit ad hepar, fit ruber, missus in testes fit albus, in mamillas, fit lac: idē  
de saporibus, quoniam, dum cibus amarus, vel falsus conuertitur in  
chylum, fit dulcis; simili modo accidere potest ut ex mitione amari  
cum insipido fiat sapor. Aristoteles, & Galenus non videntur dissen-  
sire, Aristoteles enim lib. de sens. & sensib. dicit, falsum esse eiusdem  
speciei cum amaro: Galenus 1. simp. med. fac. cap. 36. dicit falsum, & a-  
marum differre solum secundum magis, & minus, vtriusque enim sapo-  
ris causa est calor resoluens inspidum, & vtriusque materia est terre-  
stris, amarus tamen sapor, vt placuit Galeno 2. prælag. 47. maiore indi-  
cat calorem, habet enim hæc verba: si torrefit serum, bilis amara fit; si

vero tantum adurit, fit falsedo: postremo Albertus Magnus de mineralibus cap. 1. dicit, quod omnia amara falsum quidpiam obtinent itaque patet, ex amaro cum insipido misto fieri posse, ut optimè dixit Auicennas, falsum saporem: patetque nullum esse inter Auicennam, & Galenum dissidium, sed pari artificio de causis falsedinis ambos locutos esse.

*Ostenditur  
ex Galeno &  
Arist. ama-  
rum, & sal-  
sum esse eius-  
dem speciei.*

Ex traditis non erit difficile, methodum colligere, quæ doceat, quando pituita sit falsa ab humore aliunde misso, & quando ab humore in eodem loco existente transmutato. Dicimus ergo, tunc catarrhum cognosci in capite fieri falsum ab humore ab aliis partibus misso, quando in corpore erit redundantia biliosorum succorum, vel salis, & serosa humiditatis; alij enim humores non possunt misceri cū pituita insipida, qui falsedinem possint efficere: cognoscetur deinde corpus biliosis, vel salis succis redū dare ex syndrome signorum communium indicantium hos humores tradita cap. 2. & 3. sexti libri. Amplius cognoscemus, falsum esse redditum catarrhum ob falsedinem in ipsa pituita ingeneratam, quando causæ valdè calefacientes caput præcesserint: & hæ sunt illæ quinque propositæ à Galeno lib. de causis morb. cap. 2. quarum prima est nimius motus: multos noui, ob vehementes corporis motiones esse catarrho falso correptos. Secunda est obstructio meatuum capitis à frigore facta: sæpenumero accidit, ut sub dio frigidissimo adeo externi meatus capitis claudantur, ut detentus calor transpirabilis resoluat insipidum pituitæ, adurat terrestres portiones; eaq; misceat, & catarrhum falsum promoueat. Tertia est vsus alimentorum calidorum. Quarta est adhæsus corporum calidorum, ut sūt hypocausta, vel nimius insolatus. Quinta est putredo; pituita enim, dum moratur in capite aliquando putrescit, & falsedinem acquirit: ad hæc quinque capita omnes causæ, quæ habent vim calefaciendi, & gignendi falsedinem reducuntur. Neque obiciant quod iis sit addendum ieiunium, ut Galen. 4. de simp. med. fac. cap. 16. his verbis docet, qui plusculum substinuerūt ieiunium, iis salua falsa redditur, qui vero plurimum, non falsa modo, sed & amara. Respondimus enim huic obiectioni in 6. lib. vbi ostendimus ieiunia, vigilias, mærores, & alia referti ad motum, & alias non dari causas calefacientes, & falsedinem inducentes, præter quinque illas propositas à Galeno libro de causis morb. cap. 2.

*Ut noscitur  
quando mi-  
stura falsa  
fiat à causis  
intrinsecis,  
vel extrinse-  
cis.*

His cognitis facilè erit indicationes, & auxilia pro ægrotantium salute inquirere; nam si bilis, vel serosa, & falsa humiditas redundauerit, prius causas generantes arcebimus, & deinde genitos succos lenientibus, vel catharticis euellemus; si caput redditum fuerit calidum ob nimium motum, ob vigilias, ob alimenta calida, ob adhæsum, vel ob ieiunium, tunc ad communem indicationem mentis aciem prius dirigemus, quæ est interna viscera ab iis calefacta refrigerare; deinde ad indicationes magis particulares confugiemus; per hypothesim, si ob meatuum constipationem pituita putrescat, & putredo falsedinem efficiat, tūc alius non dabitur curandi modus, nisi per remedia, quæ re-  
luantur



luctantur putredini. Quæ verò & quot sint deinde specifica remedia *Quod quatuor sunt ex Galeno remedia contraria putredini.* putredini aduersantia confugimus ad Galenū, qui 11. meth. cap. 13. hæc quatuor proponit, euacuare, semiputrida coquere, vtilare, & refrigerare. Simili modo ab aliis specificis causis faldedinis erunt specificæ indicationes colligendæ, de quibus egimus in aliis libris: quibus omnibus præcognitis, facillè inde erit, vt materiæ auxiliorum fœlicissimi successus ægrotantibus adiungantur.

*Qua via noscatur, quando humores sunt dulces ob misturam in tus factam, & quando ob misturam humoris dulcis aliunde venientis.*

C A P V T I I I

**A**CTVR I de sapore dulci: opus est prius declarare, quid sub nomine dulcis intelligatur. Sapor vel dicitur dulcis, dum omni qualitate caret, & est insipidus; vel dum habet manifestam dulcedinem: hic agi debet hoc dulci manifesto: quoniam insipidus in humorum misturis non per sentitur, neque est cognoscibilis: etenim, si misceatur cum falso, per sentitur falsus: si cum bile, amarus; si cū pituita acida, acidus; si cum pontica, ponticus; dulcis vero manifestus, quamuis sit aliis humoribus commistus, eodem modo se manifestat, quo cæteri saporis: sicut enim ponticus per sentitur in atra bile, & pituita vitrea; acetosus in melancholia, quæ est fæx sanguinis, & pituita acida: falsus in pituita falsa, in vrinis, & sudoribus; similiter dulcis manifestus, & naturalis, vt dicit Galenus 4. de simp. med. fac. cap. 16. in sanguine, & aliquando in pituita per sentitur. Auicennas quoque lib. 3. fen. 13. tract. 5. cap. 8. dicit in pituita inueniri dulcedinem, quia chylus antequam vertatur in sanguinem, fit pituita dulcis. Cum igitur dulcis, & moderatus sapor pluribus conueniat humoribus, nunc est videndum cui per se, & cui per participationem conueniat: dum enim duo diuersa eadem sunt prædita qualitate, est necessarium, vt qualitas vni per se, & alteri per accidens conueniat: hinc Auicennas lib. 1. fen. 1. doct. quarta cap. 1. dixit, humores dulcedine præditos modo esse tales per essentiã, & modo per rei extraneæ admistionem. Galenus de hoc dulci manifesto, & naturali loquens libr. de atra bile cap. 2. paucis, declarat, qui humores *Vt sanguis per se, pituita vero per acci-* sunt per essentiã, & qui per participationem dulces, dicit enim, quod *dens dulcis sit.* sanguis per se dulcis est, pituita vero interdum per participationem: quo pacto vero pituita reddatur dulcis per participationem, colligitur quoque à Galeno 2. de fac. naturalibus, vbi dicit pituitam fieri dulcem, quia cum ea miscetur ichor sanguineus, qui dulcis est.

Cæterum, quia sapor dulcis manifestus in humoribus est dum generum, alter suauis, qui est similis saporis lactis, butiri, vel pinguedinis, *Vt dum generum est manifesta dulcedo in humoribus.* qui habet virtutem oppillatiuam: alter nauseosus, qui est similis saporis glycirrhizæ, & saccharo, estque tam penetrantis dulcedinis, vt omnia

falsa & amara huic saporī associata dulcissima sentiantur: præstat, vt de hoc nauseoso dulci illico videamus, à quib. causis oriatur; Auicennas lib. 4. fen. 1. tract. 2. cap. 47. rectè dicit, hanc dulcedinem fieri aliquando à putredine phlegmaris. Nec Auicennæ obici potest, quod pituita à putredine reddatur falsa, vt, in capite superiori ostensum est, & non dulcis; quia pro Auicenna respondebitur, pituitam acidam, vel ponticam sua frigiditate adeo obtundere, & moderare quemlibet intensum calorem, vt à putredine, vel ab alia causa calefaciente fiat dulcis, & non falsa; omnia enim dulcia à calore moderato fiunt. Neque est mirandum, frigidiorē pituitam fieri dulcem ab intenso calore, quia Galenus 4. simp. med. fac. cap. 11. probat clarissimis experientis, quod omnia acerba, & quæ natura frigida sunt, vt poma, pira immatura, castanæ, & alia id genus si ignitis carbonibus iniiciantur, antequam comburantur dulcissima; combusta vero amara reddantur: acerbus sapor adeo distat ab amaro, & falso, vt à calore igneo prius fiat dulce; natura enim non transit ab extremo ad extremum, nisi per medium; mel quia est calidum, illico ab igne redditur amarum. Quocirca, si acerba, antequam ab igne reddantur amara, fiāt semper dulcia, sequetur necessario, quod omnis causa calida, quæ potest pituitam acidam reddere falsam, possit quoque eam prius dulcem facere; non erit igitur solum putredo, vt dicit Auicennas, causa immoderatæ dulcedinis, verum etiam omnes causæ calidæ potentes falsedinem efficere, de quib. in capite superiori actum est; quatenus enim insipidum resoluunt, & adurunt partes terrestres, falsedinem, quatenus immaturum coquunt, & ad medium, & mitem calorem transferunt, dulcedinem efficiunt. Galenus 4. de simp. med. fac. cap. 9. habet, quod omnia dulcia sunt miti calore prædita, subditque, quod sint sicuti aqua calida, cuius contactus voluptati est; antequam igitur aliquid aduratur, necessario (si frigidum sit) ad illum reporem, cuius contactus voluptati nobis est, veniat oportet. Calor, qui pariet dulcedinem moderatam, similem saccharo, & iusculo carniū, non oritur à putredine, vel ab aliqua causa extranea, & violenta, sed à calore miti, & simili calori nostro ingenito; qui vero pariet dulcedinem immoderatam similem glycyrrhizæ, & saccharo est adscititius, & violentus, vt in acerbis fructibus, qui ignea virtute dulces fiunt.

Ex iis colligimus, quod sapor dulcis varias humorum misturas indicare possit, quia à plurimis causis oritur; modo enim chylus (si de luavi, & moderata dulcedine loquimur) acquirit dulcedinem ob perfectam alterationem primæ coctionis, modo ob dulces ichores sanguineos à venis extramissos; si de immoderata, quæ in acida, & acerba pituita nascitur, dicimus modo hanc fieri, dum cum hac pituita miscētur humores putrescētes aliū dē veniētes, modò, dū ipsamet pituita putrescit, quæ est mixtura intus facta. Quod vero diximus de putredine, quatenus est causa calida non solū colliquans, sed adurens, de omni causa calefaciente dici debet: quoties igitur corpus abundauerit pituita acerba, vel acida, præcesseritque calor aliquis pendens à mo-

ru, putre-

Opinio Auicennæ de pituita dulci.

Quod omnes causæ calefacientes possint pituitam acidam reddere dulcem.

Quos modis ex humoribus fiat dulcedo.



tu, putredine, alimentis, vicinitate calidorum, vel à constipatione, ex sufficienti enumeratione harum causarum colligemus, vnde pendeat immoderata dulcedo. Signa differentiarum colligemus hoc modo, si aliquis in ore persenserit moderatam dulcedinem sine vllò superueniente symptomate, nullaq. existente polyæmia, causa erit chylus copiosus, & optimè coctus, quod in sanis hominib. aliquândo contingit: si vero in ore persenserit immoderatâ dulcedinē prætere polyæmia, tūc dicemus, pituitâ esse dulcē ob ichores sanguineos cōmixtos; quomodo vero cognosci poterit, quando in corpore sit polyæmia, tradidimus signa in calce superioris libri. Sanguis dū effundit ichorem dulcem nō peccat qualitate, sed quantitate; quia dum qualitate peccat; illico amittit naturalem suam dulcedinem; docet enim Galenus 2. de fac. naturalib. cap. 8. sanguinis dulcedinē ob calorem exuperantem in amarum succum, ob nimium frigus in acidum conuerti; similiter si de immoderata dulcedine loquimur, sunt enumerandæ omnes causæ calefacientes, quæ præcesserunt, & methodo tradita in 6. libro cap. 1. & 2. propria, & immediata causa tam nauseosæ dulcedinis est illico summa diligentia adinuenienda; quia adeo affligit, & vires alteratricum facultatum dissoluit, vt homines, nisi cito liberentur, ad atrophiam perducantur: memini, me semel vidisse hunc casum in percelebri medico Nicolutio de Nigris de Monte Bodio, qui tam immoderatâ dulcedinem perpetuo in ore sentiebat, vt nihil inueniretur adeo amarū, quod statim in ore ipsius non dulcesceret, & adeo cœpit eius robur læguescere, quod è viuis proculdubio decessisset, nisi summo suo ingenio sibi præsto fuisset; putauit enim à viscerum calore, & à putredine pituitæ, qua corpus erat refertum, tam nauseosam dulcedinem nasci, neque aliud inueniri, quod magis reluctaretur calori, & putredini, oleo calcantino, quo vsus in tanta consilij angustia summa cum admiratione omnium medicorum, qui non potuerunt ei aliquid opis afferre, paucorum dierum cursu sæuissima afflictione liberatus fuit.

*Signa differentiarum dulcium humorum.*

*Casus notabilis observatus in percelebri Medico.*

Ex superius dictis exoritur dubitatio, quia diximus dulcia oppillare, quæ sententia est quoque recepta ab omnibus: vsus enim dulcium inflat, & meatus claudit, attamen Galenus 5. simp. med. fac. cap. 26. dicit, quod dulcia rarefaciunt, & abstergunt. Auicennas tract. de syrupo acetoso cap. 2. dicit, quod natura dulcis non est oppillare, sed abstergere. Aliqui respondent, quod dulcia moderata, vt sunt pingua, oppillent, non tamen immoderata, vt saccharum, mel, & similia, quia hæc habent virtutem absterfitam: verum hæc responsio non facit ad rem, quoniam dubitatio est de manifesta, & immoderata dulcedine, quæ in fructibus, in melle, & similibus inuenitur. Respondet itaque Auicennas huic difficultati lib. 1. fen. 3. doct. 2. cap. 7. dulcia omnia oppillare, quia rapiuntur à natura ante concoctionem: quare quamvis abstergant, contingit, vt hæc quoque dulcia immoderata per accidens insient, & oppillent.

*Dub.*

*Sol.*

*Qua via noscatur, quando humores fiunt acidi per se, & quando ob missionem acidi humoris aliunde venientis.*

## CAPVT IV.

*Efficacissimū  
Gal. experi-  
mentum quo  
probatū ac-  
etum refrige-  
rare.*

**A**NTEQUAM proponatur modus, quo ex acido sapore promptè agnoscere possimus varias humorum misturas, præstat videre, an acida qualitas indicet frigidum, vel calidum temperamentum, & quomodo fiat. Galenus 1. de simp. med. fac. cap. 19. proponit tam facile & euidens experimentum, quod in aceto potentia refrigerandi prædominetur, vt nihilo eo facilius, clariusque proponi possit, illudque iis verbis explicat. Nos, vt experiremur aceti potentiam illiniuimus tibias multis in locis thapsia, vbi post quatuor, vel quinque horas inflā-  
 ” mari cœpissent, huic parti ego aceto, alij rosaceo iniunxerunt, alij alia,  
 ” atque alia, quæ aut acrimoniam hebetare, aut refrigerare creduntur,  
 ” applicarunt; eorum omnium comperimus acetum in refrigerando esse  
 ” efficacissimum: ex quibus verbis facilè colligitur, acetum habere eu-  
 ” dentissimam refrigerandi virtutem. Libro de marcore cap. 8. in febrili-  
 ” bus, & affectibus calidissimis laudat acetum cū lactuca admisto pau-  
 ” co aquæ, quod non laudaret, nisi refrigeraret. Libro quarto de simp.  
 ” med. fac. cap. 12. laudat opinionem Aristotelis dicētis, acetum esse fri-  
 ” gidum per se, ibique docet ad hypocondria ardentia succum ompha-  
 ” cij esse præstantiorem aceto, quia acetum habet violentiam frigidita-  
 ” tem; hæc sunt Galeni verba: etenim ad hypocondria ardentia præ-  
 ” stantior est succus omphacij, quam ipsum acetum, quod nec violentiā,  
 ” ac ferientem habeat frigiditatem, nec eam admistam mordaci calidi-  
 ” tati: ex quibus verbis tria obiter obseruantur; primum quod acetum  
 ” inflammatis partibus profuit: secundum, quod febrientibus possit con-  
 ” cedi cocta lactuca cum aceto admisto aquæ pauco: tertium quod in  
 ” ardoribus magis conueniat succus omphacij, quam acetum.

*Tria obser-  
uanda de a-  
ceto. & succo  
omphacij*

*Quomodo  
fiat acetosus  
sapor.*

Quomodo autem fiat acetosus sapor Galenus 4. simp. cap. 15. iis ferè verbis declarat; aciditas fit à calido mutante, & à frigido vincente, vt ructus acidi ostendunt, qui fiunt solū, vbi cibi semicocti sunt; itaque, vt fiat acidus sapor, requiritur vis calefaciendi, quæ moueat tantum, & vis refrigerandi, quæ vincat, & superet; hinc Galenus 2. de temp. cap. 6. dicit, acidus ructus indicare imbecillum calorem, & talem, vt moueat, sed non vincat; hinc quoque fit, quod 3. de symp. causis cap. 1. dicit, quod acidæ corruptelæ ex cibis frigidioribus fiant: & 1. de loc. aff. cap. 4. habet, si cibi in nidorem transeant, causa efficiens est calida, si acescant, frigidam esse necesse est. Præterea 4. de simp. med. cap. 12. dicit, si vinum refrigeretur acescit, refrigeratur à calore resolvente partem calidam sed non vincentem, quia fieret amarus: hinc, si vinum coquatur igne, non acescit, sed potius amarescit, quia ignis semper vincit; potest tamen vinum, si in tepido loco conferuetur, vt dicit Galenus lib. de antidotis cap. 3. promptè acescere, quia à tepore ambientis commouetur, sed non vincitur.

**Experien-**



Experientia quoque docet, aciditatem fieri à frigiditate vincente, & à caliditate tantum mouente, quia videmus dulcia, dum vincuntur à caliditate, semper amarescere, & dum vincuntur à frigiditate, acescere. Succī herbarum, qui conseruantur in officinis, nisi vasa oleo obturentur, primo à calore tepido ambientis commouentur, deinde ebulliunt, facta ebullitione eorum calor resoluitur, quo resolutō frigescat, & per consequens acescant oportet: causa vero cur succi ebulliant, & acescant, non est solum caliditas externa, verum etiam humiditates extraneæ, & frigida, quæ sunt in succis à viridibus herbis expressis; patet quoque, quia in officinis ab igne succi condensantur, vt resolutis externis humiditatibus conseruentur, ne acescant: tantum potest auxillum externæ humiditatis, vt dum rudis Pharmacopola non permittit serapia ebullire ad consumptionem succorum, acida fiant; quia saccharum suo calore promptè excitat succos ad ebullitionem: duo itaque requiruntur, vt aliquid acescat calidum mouens, & frigidum vincens: si frigiditas esset nimia, & nullus esset calor, nunquam fieret acidus sapor: hæc omnia colliguntur à Galen. 4. de simp. med. fac. cap. 18. ibi enim dicit, nisi calor mutet, non fit acidus sapor, hinc dicit hyeme ob frigus lac, pitisanam, & reliqua difficilius acescere, quam æstate; similiter crassa, & frigida nunquam fiunt amara, sed acetosa: quia frigiditas, & non caliditas in ipsis dominatur: quarto enim de simp. med. fac. c. 17. dicit, lac nunquā amarum efficitur, sed acetosum, quia caliditas exigua à frigore lactis facile vincitur.

An vero acidus sapor indicet humiditatem, vel siccitatem, an tenuitatem, vel crassitatem, standum est Galeno, qui de acido loquens sibi ante oculos proponit acetum, de quo 8. de simp. med. fac. cap. de aceto dicit, acetum est magis frigidum, quam calidum, estq; tenuium partium, & siccum in tertio gradu.

*Quæ sit aceti natura.*

Positis iis facile erit videre, quibus humoribus per se conueniat acidus sapor: acida enim est melancholia naturalis, pituita, & aliquando pituita vitrea, quod per se non conueniat pituitosis humoribus, patet; quoniam de ratione pituitæ est, vt per se humida sit: acida vero cū sint ex Galeno sicca, pituita per se acida esse non poterit; conueniet ergo per se melancholiæ naturali; quæ sua natura est frigida, & sicca, vt ostendimus in libro superiori cap. de melancholia. Verum occurrit dubitatio, quia non videtur, quod aciditas per se conueniat melancholiæ naturali, quoniam omnia acida (vt dicit Galenus locis citatis) sunt tenuium partium, melancholia vero est crassarum. Occurrit sol.

*Quibus humorib. conueniat per se acidus sapor.*

*Dub.*

melancholiam habere ichorem copiosissimum, qui est acidus, & acidum dici tenuissimarum partium, quia acidi siccitas, & crassa pars terrestris in copiosissimo ichore est sparsa, quæ si esset à sero separata, esset quoque crassissima: quod vero copiosissimum sit melancholiæ serum, colligitur ex Galeno, Aristotele, & Hippocrate. Ex Galeno lib. de plenitudine cap. 10. vbi dicit, melancholicos esse saluæ abundantes, & à potu abstinentes; copia enim serosi humoris melancholiæ naturalis sitim demulcet, & abundātem reddit saluam: sexto Epidemiorum

dicat, sanguinem melancholicorum esse ferofum. Ex Aristotele in problematibus de melancholia loquēte, qui dicit, humorem melancholicum delectari ferofitate: fecundo de par. anima. cap. 4. vult, quod timidi, & per confequens melancholici habeāt sanguinem dilutum. Ex Hipp. 4. de morbis, vbi dicit, lienem esse aquæ locum, vt omnes ferme contentiant melancholiam affluere ichorofis, & tenuiffimis humorib. qui sparfam & diffufam habent crassam, & terreftrem portionem.

Cum igitur probatum fit, aciditatem pituitofis humoribus per accidens conuenire, nunc est videndum, quomodo per accidens conueniat. Dicimus aciditatem conuenire poffe per accidens pituitæ tribus modis, primo quia pituita est dulcis, & fua natura frigida; talia verò omnia promptè acefcunt, quia dulcia habent caliditatem mouētem, & frigiditatem vincentem: fecundo acida fit, quando ichor fanguinis fua natura dulcis cum pituita mifcetur. Tertio acefcit, quando ichor acidus melancholiæ in ventriculum mittitur, & cū pituita mifcetur.

*Prima dub.*

Cæterum duæ occurrunt dubitationes: prima, non videtur quod aciditas, quæ est melancholiæ naturalis proprietas, poffit aliis humoribus per accidens conuenire: rerum proprietates, & definitiones aliis nec per fe, nec per accidens conueniunt: hinibilitas non cōueniet aliis speciebus per fe, neq; per accidēs. Huic dubitationi refpōdetur, quod aliquando rerum proprietates funt communicabiles, quia eorū fubiefta aliis communicantur, fic ichor melancholiæ, quia communicatur pituitæ, eam acidam reddet; equus non commifcetur aliis speciebus, & propterea eius proprietas, neque per fe, neque per accidens aliis cō-

*Secunda dub.*

ueniet. Secunda, admiſſo quod pituita per accidens fiat acida, fcilicet ob ichorem melancholiæ, & ichorem fanguineum, nihilominus videtur, quod pituita dulcis, quæ est femifanguis, quæq; fit acida per fimplicem ebullitionem, fit per fe talis, & non per accidens. Refpōdemus aciditatem factam poſt ebullitionem dulcis pituitæ pendere à terreo & ſecco humore, qui est melancholicus, quique ob leuē ebullitionem reſoluentem calidum & humidum in pituita generatur: hęcq; pituita participare melancholico ſucco, qui in ipſa poſt ebullitionem naſcitur. Hinc Galenus lib. de plenitudine cap. 10. loquens de pituita acida dixit, ab ipſa reddi homines famelicos: niſi enim eſſet ſicca, & frigida, & per confequens melācholica, quod in idem recidit, famem non excitaret. Hinc nunquā potui omnino Auicennam arguere, quando dixit, quod pituita poſſit cōuerſi in melancholiā, diſſentio tamē ab Auicenna, quia dixit, melancholiam ortam à pituita eſſe quartum genus: mihi vero cum Galeno tria genera ſuccorum melacholicorum videntur ſufficere, quia melancholia ſparſa in acida pituita eadem eſt cū fæcali, eadem quoque ſunt proprietates: hęc ſentētia auctoritate, & experientia roboratur, dicit enim Galenus 3. de loc. aff. cap. 7. experientia patere poſt pituitoſas febres fieri quartanos. Neque argumenta Ma-

*Vt ex pituita  
ſat melan-  
cholia.*

*Vt Manar-  
dus & Vale-  
ſius reſciunt.*

nardi lib. 2. epiſt 2. & Valeſij lib. cōtrouerſiarum, quod omnino ex pituita non poſſit fieri melancholia, aliquid robotis habent; afferantur aliquot: quæ extremē diſtant non poſſunt in ſeſe inuicem tranſire, niſi

per



per medias commutationes, at pituita est huiusmodi, ergo non potest conuerti in melancholiam. Occurrimus huic, pituitam, vt pituita, in melancholiam nō conuerti, sed in ipsa quatenus est mista ex quatuor elementis esse aliquas terreas portiones, quæ post ebullitionem, & euaporationem dulcis substantiæ manifestantur. Secundum argumētum contra Auicennam est huiusmodi: pituita non est vstioni apta, quia, si coniiciatur in ignem, non vritur, ergo non potest conuerti in melancholiam: quod argumentum mihi videtur esse vanissimum, quoniam neque bilis adusta vomitu reiecta si ignitis carbonibus iniiciatur est vstioni apta; omnes enim humores corporis viuentis ignē extinguerent.

Quænam igitur sit illa succorum substantia, qua abeunte, illico succi, vel vina acescunt; ex sufficienti enumeratione partiū componentium succos colligitur: omnes succi antequam acescant habent quatuor partes proportionē respondentes quatuor elementis, sic in massa sanguinea est melancholia, quæ terræ: pituita, quæ aquæ: sanguis, qui aëri: & bilis, quæ igni respondet: similiter vinum ex Galeno 2. de fac. na ruralibus cap. 9. & 4. de simp. med. habet quatuor partes quatuor elementis, & quatuor humoribus nostri corporis respondentes, quarum prima est fæx: secunda flos, qui supernatat: tertia est vini substantia: quarta est aqua vitæ. Iridem in succis herbarum est fæx, flos, substantia, & aqua vitæ, quemadmodum sciunt distillatores. Vt igitur perfectè sciamus, quomodo vinū, & cæteri succi acescant, videre oportet, quænam ex iis quatuor mutatur, aut resoluitur. Dicimus itaq; fæcem, & substantiam vini, vel succorum in iis, quæ acescunt inueniri, & nequaquam abire, quia hæ partes non possunt à miti ebullitionis calore in spiritū resolui, sequitur ergo, vt abeat flos, vel aqua vitæ; non flos, quia in aceto, & succis acidis inuenitur, relinquitur ergo, vt vinū, vel succi acescant; quia aqua vitæ in vaporosas auras ob ebullitionem resoluitur: præterea signum demonstratiuum, quod ostendit, omnes succos illico abeunte aqua vitæ acescere, est quia distillatores ab aceto, vel succis acidis nihil aquæ vitæ colligunt. Hac posita veritate colligimus acetum esse frigidum, quia exiuit aqua ardens, quæ igni respondebat: acetum habere aliquā acrimoniam, quia nihil acescit sine ebullitione à calore extraneo excitata: esse tenuium partium, & valde penetrare, quia vini lentor à calore ebullitionis dissecatur: astringere, quia est siccum: esse siccum, quia in iis, quæ acescunt, abire humiditas vitalis; duæ enim sunt humiditates in mistis perfectis, altera, quæ est vitalis, aqua vitæ similis, & quæ propriam temperaturam succorum cōseruat, qua abeunte acescunt, & exsiccantur; altera est oleaginosa, qua mistum est mistum, quæ igne, vel putredine, vt dicit Aristoteles, dissoluitur; vnde oritur vappa, quæ sæpè in vino, & aquis putridis obseruatur, videtur enim in iis tela quædam oleaginosa, & albescens supernatare.

Ex iis facile cognoscere poterimus, quando acidus sapor indicabit misturam intrinsecus factam, & quando misturam, quæ fiet ab humore extrinsecus adueniente: si pituita erit acida, quia in corpore redundet copiosus melancholiæ ichor, tunc euacuando melancholiam ē

*Ostenditur  
vnde dependet  
acidi saporis  
proprietas.*

*Modus curæ  
si nimiam  
humorū ac-  
cositasem.*

medio auferemus nimiam aciditatem pituitę; cognoscemus vero corpus affluere succis melancholicis ex signis melancholię traditis in lib. superiori: si erit acida, quia dulcis ichor sanguinis commisceatur pituitę, & inde ob ebullitionem acefcat, tunc sanguine ẽ subito extracto acetositas tollitur. Si demum ob errores in victu, vel ob nimium frigus calor ventris adeo reddatur imbecillus, vt non valeat in chylum perfectum cõuertere cibum, & inde à calore extraneo excitetur ebullitio, & acetositas; tunc, nisi vehemens frigus impresserit malum aliquod vestigium in viscera, acetositas optima cura adhibita in sex rebus non naturalibus tolli poterit.

*Quomodo cognoscitur, quando ponticus sapor indicat humorum  
misturam intrinsecus factam, & quando misturam ab  
humore aliunde veniente.*

## C A P. V.

*Qua sint au-  
stera siue pũ-  
tica & vt  
differant ab  
acerbis.*

PONTICI saporis nomine intelligi debet austerus sapor; quia Gale-  
nus 2. de loc. affectis ca. 8. dicit, austera esse grana mali punici, ma-  
la cotonea, vuas immaturas, & plura alia, esui apta quę pũtica sunt:  
similiter lib. de atten. vict. ratione vuas immaturas vocat ponticas. Cę-  
terum vnde fiat sapor austerus est videndum. Galenus 1. de simp. med.  
f. 37. dicit, austereum fieri ex acerbo, hosque sapores esse adstringentes,  
& non differre specie, sed solum secundum magis, & minus: acerbum  
enim magis, austereum minus adstringit, acerba sunt pira syluestria;  
myrta, & mespila immatura, quę inepta sunt esui, austera vero (vt di-  
ximus) apta.

*Vt fiat aus-  
terum ex acer-  
bo.*

Quomodo autem austereum siue ponticus sapor ex acerbo fiat: au-  
diamus Galenum, qui 4. de simp. med. fac. cap. 8. distinctẽ hoc docet:  
habetque ferẽ hæc verba: acerbum est terreum & frigidum, & triplici-  
ter exoluitur aut incalescens, aut humescens, aut vtrumque: si acerbũ  
solum incalescit, fit dulce, vt castaneę: si verò humescit, & non inca-  
lescit, idque sit crassarum partium, fit austereum: si tenuiũ, fit acidus sa-  
por: si vero incalescit, & humescit, qualitatem admodum dulcem ac-  
quirit: deinde Galenus refert, quę semper acerba, & quę semper au-  
stera seruantur, & quę dulcedinem acquirunt: dicit, quę semper ma-  
nent acerba sunt fructus ilicis, sagi, corni, arbuti: quę austera, sunt vi-  
tis amineę, tum fructus, tũ vinum: acerba, quę dulcia fiunt, sunt myrti  
fructus, pyri syluestris, ac roboris; hi enim fructus, & alij similes, dum  
incalescunt, & humescunt, dulces fiunt. Ex iis colligimus austera fieri,  
dum acerba humescunt; mala granata, ante quam maturefiant, dicun-  
tur acerba: dum humescunt, & aliquantulum incalescunt, austera seu  
pontica dicuntur. Itaque vt fiat austereum, necessarium est, vt acerbum  
humescat: hinc Galenus 1. de simp. med. cap. 37. dicit, de ratione auste-  
ritate vera est, vt adstringat; verum, quia maioris est humiditatis parti-  
ceps,

*Vt austereum  
magis adstrin-  
git acerbo.*



ceps, quam acerbum, austera magis in profundo, acerbam magis in superficie adstringent.

Supponatur, saporem ponticum siue austerum non solum inueniri in pituita vitrea, sicuti docet Auicennas, dum dicit, pituitam vitream ob ponticitatem magnos excitare cruciatus: verum etiam in fæce melancholica, vt ex Galen. colligi potest, dicit enim 4. simp. med. 8. ponticum esse terreum, & crassarum partium, quod præcipue melancholice conuenit; nunc par est vt videamus, an ponticus sapor conueniat per se pituitæ vitreae, vel melancholice; quod per se vitreae pituitæ conueniat non videtur, tum quia de ratione pituitæ est, vt sit humida & non terrea; tum, quia pituita vitrea modo est acida, & modo pontica, si propriè, & per se esset pontica, esset semper talis: similiter non videtur, quod sapor austerus conueniat per se fæci melancholicæ naturalis, quia hæc est (vt ostensum est superius) per se acida, vnum enim in quantum vnum vnicam solum habet proprietatem per se, & non plures. Præterea austerus sapor ex Galeno indicat mistum esse crassarum partium, & non tenuium; non semel ostendimus naturalem fæcem melancholicam auctoritate Galeni, Aristotelis & Hippocratis adeoque abundare ichoribus, adeoque dilutam esse, vt acida, & non austera sit. Neque conueniet atræ bili exedenti; quia hæc est siccißima, & ealidissima, de ratione austeri, vt colligitur à Galeno loco citato, duæ sunt præcipue proprietates, quarum altera est, vt sit terreum cum humiditate coniunctum; altera vt sit crassarum, & non tenuium partium: relinquatur ergo vt austerus siue ponticus sapor (vt tenet quoque Argenterius) prodeat per se à fæce melancholica naturali, quæ non sit diluta, sed aliquântulum reddita crassior, & terrestrior, habeatque solum tantum humiditatis, quæ eius siccitas, & vis adstrictoria possit in profundum penetrare: quo pacto vero accidit, vt melancholia naturalis minus diluta reddatur, & fiat acerbam, plurimæ possunt esse causæ; modo enim exsiccat ob vsum pharmacorum ichores purgantium, modo ob potus abstinentiam, modo ob nimium exercitium, ob balnea, vt de his hic non sit locus agendi. Occurrit tamen ex dictis dubitatio, quia non videtur, quod fæx melancholica non sit crassarum partium. Respondemus crassitiem melancholice naturalis adeo esse dilutam, sparsamque in copiosissima serositate, sicuti ostensum est, vt acida, & non austera sentiat.

Ex his quid indicet sapor ponticus facile cognoscemus: etenim, si in ore persenserimus saporem similem omphacio, statim inferemus id causari, vel à pituita vitrea, vel à fæce melancholica non admodum diluta, vel ab austeris cibis: has causas distinctè cognoscemus, virtute methodorum traditarum in 6. libro pro cognoscendis differentiis melancholicorum. & pituitosorum, succorum; si enim inuenierimus corpus melancholia redundare, non decipiemur, si ex pōtico sapore coniciamus fæcem melancholicam debito crassiorem redundare; si pituita, vitream dominari; si corpus neq. pituita, neq. melancholia affluet, iudicabimus causam acceptam austeri saporis referendam esse austeris

Quibus humoribus conueniat per se ponticus sapor.

cibis: verum, quia methodi cognoscendorum pituitosorum, & melancholicorum humorum traditæ sunt in lib. superiori, ex quibus faciliè cognoscere poterimus, quādo in corpore dominabitur pituita vitrea, vel sæx melancholica; quare hic de hac re merito finem faciemus.

*Ostenditur vitellinum colorem esse simplicem, & non mistum.*

CAPVT VI.

**Q**uemadmodum sapores sæpe indicāt varias humorum misturas, sic colorū plurimi. Hic in primis se offert considerandum, an vitellinus color misturam aliquam indicet: res enim est controuersa, & dissensionis plena; quoniam Auicennas liberè, & aperto Marte videtur in certamen Galenum vocare, dum dicit lib. 1. sen. 1. cap. de humorib. vitellinam bilem esse misturam ex flaua cholera, & crasso phlegmate. Galenus vero 2. de fac. naturalib. cap. vltimo, & lib. de atra bile aliter sentit, dicit enim, vitellinam fieri ex flaua à calore igneo crasse facta, hacque verborum serie vititur: sit flaua ob tenacem humorem, sed, si discussa fuerit, redditur vitellis ouorū crudorum similis. Auer. 3. coll. cap. 3. Galeni sententiam sequitur. Expediit hunc nodum pro viribus excutere, quia sententiarum varietas alterat, & mutat curationem, quoniam si vitellina bilis fieret ex flaua, & crasso phlegmate, vt placuit Auicennæ, sequeretur, quod flaua esset calidior vitellina, & quod vitellina indicaret esse incidendum, & detergendum, & aliquomodo ob pituitam mistam calefaciendum, quod reluctaretur experientiæ, & Galeno. Ne igitur de hac re tanti momenti ieiunè, & exiliter agatur, sunt argumenta pro opinione Auicennæ adducta, proponenda: quorum primum hoc est: si bilis vitellina esset crasse facta à calore præter naturam, non esset lutei coloris, sed potius vergentis ad nigredinem; calor enim, quo maior est, maiorem nigrorem inducit: quod argumentum nullius sit roboris, duo afferri possunt argumenta ab experimentis desumpta: alterum est, dum videmus ouorū vitella ab igne assari, & condensari luteo eorum colore non abeunte: alterum dū pharmacopæus præparat iulapium ignitis carbonibus, & nigrorem nullum acquirit: quare sic argumentari poterimus, si calor igneus oui lutea condensat nulla facta coloris mutatione, quanto magis calor naturalis igneo mitior poterit condensare flauam bilem resoluendo tenuiores partes sine mutatione coloris? Amplius ratio fauet Galeno, quoniam, si vitellina esset ex flaua bile, & crasso phlegmate mista, sequeretur quod flaua esset intensioris coloris vitellina, quod est omnino falsum.

In eundem scopulum prolabitur Auicennas dum dicit, flauam choleram esse misturam bilis cum aquosa pituita, quod est falsum, quia copiosa humiditas flauæ bilis non est pituita, sed proprium serum bilis, quod specie differt à pituita, & à sero aliorum humorum; est Galeni 6. epid. 2. tex. 38. in omnibus humoribus inueniri proprium serum specie,

*Opinio Auicennæ.*

*Opinio Galeni, & Auerrois.*

*Vitæra Auicennas dicit vitellinam esse misturam.*

*Sententia Auicennæ quod flaua bilis sit mistura, reicitur.*



cic, & natura diuersum ab aliis humoribus. Valeſius 1. lib. ſuarum controuerſiarum, & plurimi alij de hac re diffuſe egerunt, ideo nobis occaſionem plenius loquendi de hac re ſuſtulerunt.

*Quorum humorum miſturam indicet porraceus color.*

C A P V T VII.

**C**ompaginem bilis cum pituita viridem, & porraceum colorem <sup>Ex qua bile fiat porracea op. varia.</sup> Cad viuum aliquando imitari; videtur in ſcholis communiter eſſe receptum, vnica enim eſt omnium Medicorum vox, quod porracea, ſiue praſſina cholera miſturam ex bile & pituita portendat. Cæterum quænam ſit hæc ſpecies bilis, quæ miſta cum pituita porraceâ efficit, variè diſtrahuntur Auctores; aliqui enim dicunt porraceam fieri ex pituita & bile flaua; aliqui ex pituita, & vitellina; aliqui demum ex pituita & æruginofa bile. Qui dicunt ex albo, & flauo, aut vitellino viridem, & porraceam bilem enaſci, adeo cæcitiunt, vt me pudeat in re tã aperta eos reiicere. Philoſophorum nemo negabit, viridem colorem magis flauo, & vitellino accedere ad nigrum: omnesque medios colores fieri ex albo, & nigro: Ariſtoteles libello de colorib. (ſi Ariſtotelis eſt) cap. 2. & Auer. lib. de ſenſ. & ſenſib. tenent colorem album, & nigrum eſſe elementa mediorum; quare ſi porracea fiat ex omnium conſenſu ex pituita, quæ alba eſt, & ex bile; eſt neceſſarium, vt hæc ſpecies bilis ſit opacior, & obſcurior porracea bile: pituita enim, quæ alba eſt, colorem ſemper remittet: ſi miſceatur pituita cum flaua, pallida enaſci debet miſtura; ſi cum vitellina, flaua, quæ eſt remiſſioris coloris: ſi cū viridi colore pituita miſceatur, viridis quoque color remittetur: quare, ſi ex pituita, & bile ſit porracea, oportet, vt ſit bilis omnibus aliis obſcurior, hæcque eſt æruginofa, quæ eſt bilioſorum obſcuriſſima, quæq; ſi vltèrius torrefiat, dicit Galeſius 2. progn. 47. atram fieri exedentem quæ ad melancholicos ſuccos pertinet.

Cognito, porraceam eſſe compaginem factam ex bile æruginofa, & pituita: nunc oportet videre quomodo fiat hæc miſtura. Dicimus itaq. fieri porraceam, vel dum pituita miſceatur æruginofa bilis aliunde miſſa, vel dum bilis flaua miſta cum pituitoſo ſucco per vltèriorè aduſtionem adurit, & ſit æruginofa: afferatur exemplum: ſit caput pituita reſertum, illuc flaua obrepit, miſceaturque cum pituita; tunc ſi flaua bilis ſic miſta cœperit ab ingenti calore aduri, fiet æruginofa, vnde porracea, & hæc vocatur miſtura, intrinſecus facta; ſi vero miſceatur pituita non flaua, ſed æruginofa talis ab aliis partibus prodiens dicitur miſtura facta ab humore aliunde miſſo; hæcque ſæpè ſit, quia in calidis affectibus æruginofa facilè aggregatur, & quia ob inſignem eius acrimoniam omnes partes conantur eam propellere, ſit vt modo vnâ, modo alteram partem adoriatur, & vbi pituitam reperit, illius lentore amplexa ſumetur, & illico porracea fiat: maximi ſanè reſert ſcire, quo-

*Porraceam dupliciter fieri.*

modo porracea fiat; aliæ enim hauriuntur indicatione à flaua facta æruginosa, dum erat mista cum pituita, & aliæ ab æruginosa ab aliis partibus corporis missa.

*Varia op. vbi  
fiat porracea.*

Verum, cum de loco generationis porraceæ dubitetur: hocque maxime conferat huic cōtemplationi, aliquid de hac re dicatur. Quidam enim putant solum in ventriculo generari; alij vero in venis etiam: qui dicunt solum in ventriculo gigni; putant id à Galeno colligi posse libello de atra bile, vbi dicit, in ventriculo porraceam gigni: errare videntur isti, quia, quamuis in ventriculo gignatur, nihil tamen prohibet, quin gigni possit in aliis partibus; hinc Galenus 2. præfagiorum 39. dicit, porraceam aliquando in venis gigni posse: arbitror ego non solum in ventriculo, & in venis generare posse, verum etiam in omnibus corporis partibus, vbi colligi potest pituita, & æruginosa bilis: patet experientia, quia videmus aliquādo per os per nares viridem mucum transcolari; per pudenda, vt in iis, qui patiuntur gonorrhœā, quorum indusia porraceo colore inficiuntur: similiter in sanguine è secto cubito extracto ichor viridis sæpè obseruatur: proinde ratione, auctoritate, & experientia coacti dicimus, porraceam in ventriculo sæpè fieri, & aliquando in venis, & omnibus locis, vbi misceri potest pituita cum bile æruginosa.

*Qua sint e-  
xaminanda,  
ut eradice-  
tur porracea  
bilis.*

Posito, quod porracea fieri possit in plurimis partibus corporis, & quod modo fiat ab æruginosa ab aliis partibus missa, modo ab adusta bile flaua, redditaque æruginosa quando erat pituita commista, variz confurgunt indicationes; etenim si ab aliis partibus mittitur, debet pars mittens, & generans hunc malum succum methodis de locis affectis cognoscendis traditis non vno in loco superioribus libris inueniri & inuenta corrigi; debetque reuelli non à parte in qua residet, sed à partibus mittentibus: si vero porracea fiat à bile flaua, quæ non erat æruginosa ante misturam, sed solum post factam compaginem, aliæ ab illis longè faciliores hauriuntur indicationes, ex hac enim mistura intus facta non suboritur æuum onus, vel trucia symptomata excitantur, quæ vires deiciant, quæ viscera premant, & corpus feriāt, quia non supponit viscus aliquod tam prauæ esse affectum, vt mittat, & gignat hoc æruginosum virus. Quo pacto autem cognoscatur, quando viscus aliquod æruginosam bilem gignat, & mutat in alias partes, facile ex methodis traditis superius pernoscemus: ex primo enim lib. & tertio specifica idea affectus, quæ æruginem efficit, colligi poterit: hæc est calidissima visceris alicuius intemperies; ex secundo semper colligemus, vbi sit protopathia, & per consequens quæ sit pars mandans, & fouens; ex sexto sex locos colligemus indicantes specificam biliosorum succorum differentiam, vt nihil in hoc loco dici possit de hoc humore, de parte mittente & fouente, quod non sit in aliis libris pro nostro virili explicatum.

*Quod*



*Quod albus humorum color indicet modo calidos, modo frigidos, & mistos humores.*

CAPUT VIII.

**A**LBUM humorum colorem, quamvis plurimi putent pituitosum, & frigidum humorem tantummodo indicare, reperio tamen albedinem in humoribus indicare modo calidos, modo frigidos, modo mistos humores, & aliquando debilitatem viscerum. Quod albedo pituitam significet, Auicennas libro 1. fen. 2. dōct. 3. cap. 7. dicit superfluum albedinem significare pituitam. Galenus verò 2. de temperamentis cap. 5. dicit, sicuti pilus niger fit ex torrefacto humore, sic albus ex pituita nascitur; quod verò aliquando albedo significet adustos humores, est Auicennas, & experientia. Auicennas lib. 1. fen. 1. cap. de humoribus iis verbis utitur, superfluum color in humido corpore in primis nigredinem efficit, deinde denudat ipsum nigredinem & albedinem facit; subdit propterea ligna in carbonem, & deinde in cinerem verti, redditque rationem; calor in humido efficit nigredinem, in sicco albedinem; frigiditas in humido albedinem, & in sicco nigredinem operatur; experientia, sunt albæ aphthæ, quæ indicant adustos dominari humores, sunt quoque alia maligna ulcera calida. Quod vero ob viscerum debilitatem albi humores reddantur, patet in leucophlegmaticis, vel in hypofarca, vel simili cachexia correptis; quare, nisi certa aliqua methodo incedatur in cognoscendis humoribus, res confusa, & difficultatibus obstructa relinquetur.

*Ut albus color significat modo caliditatem modo frigiditatem.*

Sed quia in hoc loco per colores perquirimus misturas, cognitis modis, quibus albi fiant humores, propositum aggrediamur. Quantum attinet ad pallorem sanguinis à cachexia factum, dicimus, hunc colorem indicare misturam ex sanguine, & pituita aquosa quæ dici potest intrinsecus facta; quia chylus rudis ortus ab imbecillo ventriculo restagnans per mesenterij spiracula in hepar viribus ferè perditum non potest totus conuerteri in sanguinem, sed tantum aliqua pars, vnde ex hac sanguinis parte, & pituita aquosa fit hæc pallida mistura; causa palloris est aquosus humor, qui non potuit adeo à calore incrassari, ut in sanguinem perfectum conuerteretur: est philosophi 4. meteororū, optimam coctionem fieri incrassando, quod tenue est; simili modo dicimus in albo fluxu alui, in tenui sanie, in alba vrina, in liquido catarrho esse aliquas partes coctas, & aliquas crudas; habeat enim viuens, pro ut quis volet, fractum robur, aliquid cōcoquit; hinc sanguis ferolus hydropicorum non omnino inutilis est, quia in ipso oportet, ut sit aliquod coctum, vnde alantur, & viuant; hinc errant, qui incidunt in opinionem euacuandi totam aquam illorum per aluum, vel paracentesim: serum enim illud à maiori virtute facile conuerteretur in sanguinem; ideo non est malus per se, sed quatenus auctus suffocet vires est Galeni commento septimo de morb. vulgar. text. 12. esse euacuans.

*Quando albus color humorum indicet misturam intrinsecam.*

*Ut errant qui per paracentesim totam aquam hydropicorum euacuans.*

perforandum ventrem hydropicorum, dum ratione aucti tumoris vires consternuntur.

*Cur facies imitantur colorem luti.*

Præterea albus color turbidus indicabit misturam ortam ab humore aliunde veniente; sicuti contingit, dum alba pituita commiscetur humori melancholico: hic color in excrementis imitatur colorem luti, sæpèque observatur; quia natura perpetuò in ventriculum melancholiam euomit causa retinendi chylum, deindeque cum fecibus subducitur: si igitur niger humor commiscetur pituitæ, quæ sua natura candicans est, medius efficitur color, qui lutum imitatur; possunt denique alij humores commisceri pituitæ, qui eius albedinem remittunt; qui autem esse possint ex methodis cognoscendorum humorum traditis in sexto libro facile cognoscemus: iis positis, quisque indicationes sciet haurire, quia si albus turbidus color prodierit à mistura intus facta, vel erit virium debilitas, vel putredo, vt de pure, & catarrho liquido dictum est: tunc viscera debilia erunt corroboranda, & putredo arcenda auxiliis non semel propositis. Si prodierit ab humoribus aliunde missis, dictum est superius non semel, quomodo sit auxiliandum.

*Ostenditur ex peccantibus humoribus iam traditis fieri misturas possibiles 80084.*

#### C A P V T IX.

*Vt perquiratur omnes interna mistura.*

EX hac natura saporum, & colorum hætenus explicata illæ humorum misturæ, quæ sensibus sunt manifestæ, colligi possunt. Quomodo verò pernoscantur, quæ sint in penitissimis corporis partibus, in quas neque lingua, vel oculi penetrare possunt, traditæ sunt in 6. lib. methodi, quæ possunt docere omnes prædominantes humores, & per consequens quamlibet eorum miscellam. Nunquam enim prædominabitur pituitæ species aliqua, vel sola, vel aliis humoribus commista, quæ ex illorum signorum syndrome non cognoscatur. In postremo huius libri capite omnes misturas, quæ fieri possunt in qualibet corporis parte, colligemus, easque adnumerabimus: aliquæ constant duobus humoribus, quæ vocari possunt combinationes, veluti quando esset commista bilis flaua pituitæ; aliquæ tribus, sicuti dum bili & pituitæ adiungeretur melancholia; aliquæ demum quatuor, sicuti dum illis tribus adiungeretur ichor sanguinis, vel alterius humoris: misturæ verò, quæ ex quinque, & aliis componentibus fieri possunt, vt cognitioni nostræ minus aptæ, omitti possunt.

*Exemplo Aristotelis hic annumerantur omnia contenta, ut humorum misturarum scire possit.*

Has misturas nullo modo annumerare poterimus, nisi, quot sint simplicia componentia, quæ in contentis collocantur, prius dicamus. Imitabimur Aristotelem, qui volens colligere possibiles combinationes primarum qualitatum enumeravit omnes combinationes, quas intellectus humanus fingere poterat, & inde ex illis collegit possibiles; primo enim dixit qualitates primas esse quatuor, nempe caliditatem,



tem, frigiditatem, siccitatem, & humiditatem: deinde numeravit omnes combinationes, vel misturas, quæ ex iis fieri, & imaginari possunt; dixitque vel miseri calidum siccum, vel calidum humidum, vel calidum frigidum, vel frigidum siccum, vel frigidum humidum, vel humidum siccum; collegitque deinde philosophus ex iis omnibus quatuor possibiles, quæ quatuor elementis conueniunt, & duas reiecit impossibiles, quæ sunt calidum cum frigido, & humidum cum siccum; similiter, & nos si velimus perquirere omnes misturas, quæ in humoribus siue in contentis fieri possunt, prius simplicia componentia numerabimus; possibilisque colligemus, & impossibiles omittemus. Dicimus itaque ex Galeno libro de atra bile cap. 2. & alibi, septem esse species biliosorum succorum, scilicet pallidam, flauam, vitellinam, porraceam, rubram, cæruleam, & æruginosam: omitti hic posset porracea, quia non est simplex, sed mista ex bile æruginosa & pituita: verum, quia sic mista posset quoque aliis humoribus commisceri, in hoc numero contentorum præter naturam ea collocabimus; deinde ex Galeno, & communi medicorum consensu quatuor sunt famosæ pituitæ, acida, salsa, vitrea, & dulcis; hic non disputo, an sint veræ species per constitutivas differentias factæ, quia in hoc loco non est mihi in animo ab ipsis philosophiæ, & medicinæ primordiis hoc in discrimen reuocare, sed quæ à Galeno sunt proposita, & communiter accepta præaccipere, & inde vterius philosophari. Tres (vt ostendimus) sunt melancholiæ, fæx sanguinis naturalis, fæx adusta, & atra bilis. Denique est sanguis, qui copia, & variis modis peccare potest. Amplius ex Galeno, & Hippocrate 6. epid. 2. comm. 37. dicimus ichores esse æquales numero humoribus; dicit enim Galenus, quemlibet humorem habere ichorem proprium, qui naturam, & virtutem ab aliis ichoribus separatam sortitur; quod ita re vera sit patet, quia ex variis ichoribus varij quoque morbi fiunt: obseruamus enim portiginem factam ab ichore bilis esse omnino diuersam ab illa, quæ ab ichore melancholiæ, vel ab ichore sanguinis proficiscitur. Galenus libro de tum. præter naturam cap. 10. dicit, causam erysipelatis esse bilem flauam ichori sanguineo mistam, bilis enim sine ichore sanguinis non efficit erysipelas, sed aliud morbi genus, vt ostendimus in 6. lib. colligimus itaque quindecim esse humores, & totidem ichores, numerumque horum succorum quatenus possunt lædere nulla adhuc in ipsis concepta putredine, peruenire ad triginta. Quod vero bilis porracea, æruginosa, & atra biles officere possint sine putredine, patet experientia, videmus enim sæpissimè, æruginosa euomi, & atra biles per infernas partes aliquando excerni nulla existente febre; valet apud me consequentia, non est febris, ergo humor peccans non putrescit: si vero humores, & ichores citati adortiuntur corpora viuencia quatenus putridi, erunt quoque omnino diuersi.

Verum, quia putredines inter se natura, & specie differunt, humores quoque putridi pro diuersitate specierum, vel graduum putredinis erunt omnino diuersi: putredines enim quæ aperte humanum genus

Enumerantur quindecim humorum peccantium species.

Quatuor  
gradus pu-  
tredinis.

inuadunt, & quæ sub benigniori aspectu inimicum virus occultant, natura & gradibus inter se differunt. Hic recipimus communem sententiam, quod quatuor sint differentiæ, vel gradus putredinis, quorum primus obseruatur in apertis febribus continuis, vel intermittentibus. Secundus in malignis & dolosis mitioribus; tertius in malignis sæuissimis: in his febribus sub benignissima facie aliquorum dierum cursu scelestissima absconditur putredo, quæ necessario virum ruinam, & vt plurimum mortem adfert; quartus in pestilentibus. Ex his colligi possunt centum, & quinquaginta humores præter naturam; hocque modo ratio incunda est: in primis sunt 15. humores, & quindecim ichores considerati, dum nulla putredine polluti lædunt: totidem fiunt, dum illorum quilibet putrescit primo putredinis gradu, fiunt igitur omnes hæcenus sexaginta; addantur iis, dum quisque putrescere potest secundo, tertio, vel quarto gradu putredinis erunt omnes centum, & quinquaginta inter se reuera valde differentes: bilis putrida in primo gradu efficit febrem salutarem: in secundo malignam curabilem: in tertio malignam ferè incurabilem: in quarto pestilentem. Sequuntur septem species flatuum, quippe qui cuilibet humori peccanti commisceri possunt: quatuor, qui eleuantur à quatuor pituitosis succis, alius enim est flatus ortus à dulci pituita, alius ab acida, alius à salsa, & à vitrea alius, qui trucem colicam facere solet: duæ flatuum species à melancholia consurgunt, alter à melancholia, quæ est fæx sanguinis, & alter à fæce adusta: ab illa enim quæ exedit vt à causa materiali, de qua loquimur, non oritur flatus. Septima flatus species oritur à cibo, & potu. Neque obiciant, quod humores non commisceantur flatibus, quia facile occurrere possumus, plures enim morbi ex humoribus flatibus mistis fiunt: tinnitus, qui imitatur sonum aquæ currentis, indicat pituitam aquosam esse commistam flatibus: colica passio sæpè fit ex mistura porraceæ bilis & flatus, vel ex vitrea pituita & flatibus.

Quod sint 7.  
flatuum spe-  
cies.

Præterea in numero contentorum præter naturam sunt lumbrici, & eorum vapores, qui sæpè epilepsiam gignunt: sunt spermata præter naturam retenta, quorum spiritus præfocaciones vteri, cordis palpitationem, & alios affectus mouere possunt: est lues gallica, & eius vapor, qui, vt quotidie videmus, per vniuersas corporis partes suum dispensat virus, omnibusque humoribus potest commisceri. Demum est sanies, & eius vapor, à quibus febris, & innumerabiles affectus præter naturam fieri possunt: si igitur has quindecim causas præter naturam aliis propositis addas, causæ erunt centum & sexaginta quinque.

De modo col-  
ligendi mistu-  
ras ex quouis  
dato numero.

Ex quo numero contentorum præter naturam præcognito possumus quoque perfecte scire, quot misturæ ex duobus, quot ex tribus, & quot ex quatuor humoribus omnifariam mistis fieri possint: imitatur (vt dictum est) Aristotelem, quia sicuti ille ex quatuor qualitatibus sex combinationes collegit, scilicet quatuor possibiles, & duas impossibiles. Similiter nos ex 165. prius colligemus omnes misturas, & deinde impossibiles reiciemus. Modus facilis colligendi ex quolibet



bet dato numero omnes misturas sit per additionem omnium numerorum propositorum postremis exceptis: si enim numerauerimus misturas ex duobus, quas vocant combinationes, summouemus ab additione postremum numerum tantum, si misturas ex tribus, duos postremos numeros, si ex quatuor, tres. Exempli causa, si ex quatuor

velimus scire, quot fieri possint combinationes, demimus quartum, & fit additio reliquorum, vnde consurgunt sex combinationes hoc modo, ex iis numeris amoto postremo colliguntur sex:

1
2
3
4

similiter si ex octo velimus scire misturas, alter non datur modus faciliior, quam summouendo octauum: quo dempto illico sciemus ex octo humoribus omnifatiā mistis nasci 28.

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
28	28	28

hoc modo: si verò ex octo velimus scire, quot misturæ ex tribus consurgant, demitur non solū octauus, verum etiam septimus, & tunc erunt 21. si vero ex quatuor, demuntur tres postremi numeri scilicet octauus, septimus, & sextus, & tunc erunt 15. misturæ.

Simili modo, si velimus ex 165. efficientibus causis misturas ex duabus, ex tribus, & ex quatuor colligere, cogimur disponere omnes causas efficientes, vt in sequenti pagina, videmus, quia commodè à nobis omnium numerorum fieri potest additio.

Gal. libro de atra- bile capite 1. & 2- libi dicit septem esse species biliofo- rum succorum sci- licet	In hac colu- na idē humo- res, & ichores, ut putridi in primo gradu, locantur	In hac sunt putredines secūdi gradu- is, ut putridi in septēbiles pu- tredine ma- ligna affecte	Putredi- nes tertij gradus : septem biles	Putredi- nes quarti gradus qui in peste ob- servantur: septē biles	Quatuor status pitui- torum succorum
pallida 1	31	61	91	121	151
flava 2	32	62	92	122	152
vitellina 3	33	63	93	123	153
porracea 4	34	64	94	124	154
cærulea 5	35	65	95	125	
rubra 6	36	66	96	126	
æruginea 7	37	67	97	127	
Ex Galen. 1. de dif- fer. febr. 6. pituitæ sunt quatuor scili- cet	Quatuor pi- uitæ putridæ in primo gradu	Quatuor pi- uitæ	Quatuor pituitæ	Quatuor pituitæ	Quatuor status pitui- torum succorum
pituita dulcis 8	38	68	98	128	155
acida 9	39	69	99	129	156
vitrea 10	40	70	100	130	
falsa 11	41	71	101	131	
Ex Gal. libi. de atra- bile & alibi melan- choliæ sunt tres, sex sanguinis non adu- sta	Tres melan- choliæ	Tres melan- choliæ	Tres me- lancholiæ	Tres me- lancholiæ	Flatus esculentorum
12	42	72	102	132	157
13	43	73	103	133	lunbrici 158
14	44	74	104	134	eorum vapores 159
15	45	75	105	135	sperma 160
Ex Gal. 6. epīd. 1. tex. 37. dicente quēlibet humorē habere suū ichorem	Ichores pu- tridi in primo gradu	Ichores ma- li moris	Ichores pestilētes	Ichores pe- ste affecti	eius vapor 161
ichor sanguinis 16	46	76	106	136	sanies 162
ichor pallid. bilis 17	47	77	107	137	eius vapor 163
ichor flauæ 18	48	78	108	138	lues gallica 164
ichor vitellinæ 19	49	79	109	139	eius vapor 165
ichor rubræ 20	50	80	110	140	
ichor cæruleæ 21	51	81	111	141	
ichor porraceæ 22	52	82	112	142	
ichor æruginea 23	53	83	113	143	
ichor pit. dulcis 24	54	84	114	144	
acidæ 25	55	85	115	145	
falsæ 26	56	86	116	146	
vitreæ 27	57	87	117	147	
ichor mel. natur. 28	58	88	118	148	
fecis adustæ 29	59	89	119	149	
atræ bilis 30	60	90	120	150	

Si igitur ex iis cētum & sexaginta quinq. vis scire quot misturæ ex duob. fieri possint fac horū  
numerorum additionem, dempro postremo numero, videbis summam peruenire ad 13530

Si vis misturas ex tribus, demas duos postremos numeros id est 165. & 164. ex additio-  
ne aliquorum orietur 13366

Si ex quatuor demas tres postremos, erit summa 13033

Summa omnium misturarum est 40099  
Verum



Verum sicuti Aristoteles ex omnibus concubinationibus reiecit impossibiles, sic nos illius imitatione reiciemus omnes illas, quas proposuimus fieri ex ichore cum proprio humore, quia illæ re vera non possunt dici misturæ: hæ omnes quindecim sunt; verum quia ter additæ sunt, scilicet in misturis ex duobus, ex tribus & ex quatuor, erunt à summa remouendæ 45. præterea, vt impossibiles reiciamus misturas vaporum cum suis mineris, vt esset vapor saniei cum sanie, vapor luis gallicæ cum lue ipsa, vapor lumbricorum cum lumbricis, & spermatis cum spermate, quæ erunt quatuor, sed, cum ter positi sint, erunt 12. omnes itaque impossibiles erunt 57. quæ, si auferantur, possibiles erunt 40042.

Verum, quia misturæ possent in quolibet proposito efficiente fieri duum generum, scilicet intrinsecus, & extrinsecus, vt ostensum est, totidem numerabuntur.

Omnes igitur misturæ, quæ in animalibus fieri possunt; quæque methodis traditis in sexto libro perquiri possunt sunt num. 80084.

40022. intus

40042. foris

Ex traditis in hoc libello patet, quomodo virtute colorum, & sapo- *Epilogus.*  
rum peruenire possimus ad humorum peccantium misturas; patet quinetiam, quomodo misturæ in viscerum latebris existentes, quæ per colorem, & saporem non habentur, pernoscantur, & demum quot misturæ fieri possint in viuentibus ex duobus humoribus, ex tribus, & ex quatuor: vltcrius quoque virtute eiusdem methodi possemus penetrare; verum, quia id confusionem pareret, rationabiliter desistimus.

Finis Septimi Libri.



## S A N C T O R I I

## S A N C T O R I I

Iustinopolitani

## METHODI VITANDORVM

*errorum in reconditarum qualitatum,**primis initijs perquirendis,*

## LIBER OCTAVVS.

*Quid intelligant auctores per qualitates manifestas : & cur  
aliqui introduxerint qualitates occultas, seu  
substantias operantes.*

## C A P. I.



OSTOYAM actum est in præcedentibus de methodis, quib. vniuersæ peccantium humorū mixturæ possunt cogitosci: in tribus sequentibus libris agendum relinquitur de illo impetu, quo causæ istę præter naturam in nostra solent irruere corpora. Cæterum cum sit in scholis valdè receptum, quod causæ efficientes inuadere possint corpora viuētia solum his quatuor modis, tota substantia, quantitate, qualitate, vel motu; de iis, n̄ xi §. 409, agemus. Acturi in hoc libello de iis, quæ tota substantia operantur, in hoc vestibulo prius explicabimus quid intelligant Auctores per qualitates manifestas, & quid per occultas, & secundum totam substantiam operantes.

*Quæ sint  
qualitates  
manifestæ.*

Quo ad manifestas qualitates attinet, est communis opinio, quod harum primæ, ad quas cæteræ omnes, quæ sub orbe lunæ continentur, referuntur, & quarū merito omnes alæ operantur, sint hæ quatuor, caliditas, humiditas, frigiditas, & siccitas. Secundæ, quæ primas sequuntur, sint præsertim illę quindecim à Galen. i. de vsu. part. 9. & i. de fac. naturalibus cap. 6. enumeratæ, durities, mollities, lentor, friabilitas, raritas, densitas, asperitas, lenitas, grauitas, leuitas, crassitudo, tenuitas, odores,



odores, colores, & sapes: quælibet ex iis continet varias qualitarum secundarum species, & gradus: multi enim sunt gradus, seu species rati, & densi, asperi & lenis, & cæterorum: multæ sunt species saporum, colorum, & odorum: alio enim pacto sapor operatur ut acer, alio ut amarus, ut falsus, & ut acetosus; de quibus saporibus, & humorum coloribus in 5. & 7. lib. actum est. Tertiæ, quæ secundas immediatè sequuntur, sint detergere, incidere, aperire, astringere, laxare, & alia id genus quæ similiter referantur ad quatuor primas, tamquam ad prima initia cæterarum omnium qualitarum, quæ in hoc mundo elementalibus fiunt.

Qui verò admittunt qualitates totius substantiæ, quas alio nomine vocant occultas, inter quos est Fernelius, Argenterius, & alij plures Medici eas non putant referri posse ad primas, vel ad alias manifestas: quinimo, quamvis aliqua ex manifestis lateat, & non rectè ab humano intellecta cognoscatur, adhuc eam dummodo ad quatuor primas, vel secundas aliquo modo referri possit vocabunt manifestam, ratio vero cur ab illis qualitas, quæ à primis non pendet, vocetur occulta, est, quia putant, hanc esse substantiam operantem, quæ sua natura est occulta, & incognoscibilis, dicuntque substantiam non opificio calidi, frigidi, humidi, vel sicci, sed primo, per se, & immediate nullo interposito instrumento illam agendi, seu operandi potentiam sortiri, & has qualitates occultas dici totius, & solius substantiæ, totius: quia tota simul substantia, cum ex se sit simplicissima, operatur: solius, quia non merito aliarum qualitarum accidentalium, sed sola, & per se edit potentiam operandi: eâque in eadem cathegoria collocant, in qua est substantia: quia immediatè putant ab ipsa enasci: & potentias esse substantias operantes: eâque demum esse occultas, quia nullarum qualitarum auxilio, quæ sensibus sint subiectæ, manifestari possunt, ea enim ratione, qua substantia sensibus, & intellectui est occulta, eadem has qualitates occultas, & reconditas dici putant.

*Ve omnes  
qualitates  
occulte vo-  
cantur totius  
substantia.*

Morborum innovatores conantur probare experientia, quod dentur qualitates occultæ à substantia emanantes, quæque nullam communionem habeant cum calido, frigido, humido, & sicco, & aliis has primas insequentibus: & solent in primis afferre Herculeum lapidem, dicuntque, ferri attractionem non fieri à primis qualitatibus, quia nunquam experientia visum fuit, calida, vel frigida attrahere ferrum, non à secundis; quia nemo unquam vidit rarum, densum, grave, leve, tenue, crassum, durum, vel molle ferrum attrahere. Inferunt ergo non à manifestis magnetis qualitatibus, sed à propria lapidis substantia hæc operandi virtutem per se, & immediate prodire. Simili modo dicunt electrum qualitate occulta allicere palleam, marinum leporem pulmonem: cantharides vesicam, & non alias partes exulcerare: etenim, si manifestis exæderent qualitatibus, magis iecur, quod propinquius, & mollius est, abraderent: parvulum piscem Echenidem navim turgidis velis volantem firmare: torpedinem manus piscatoris tremore afficere. Rhabarbarum bilem: agaricum pituitam: elleborum melanco-

*Experimen-  
ta, quibus  
probant in-  
novatores  
dari quali-  
tates ocul-  
tas.*

De secunda  
substantia  
vitiis in hoc  
libro agendū.

liam, cæteraque cathartica determinatos succos subducere. Theriacam venenum euincere: guaiacum dirum, & immane gallicum superare: pestem posse hominem sanum, & potentissimæ virtutis illico, & ictu oculi opprimere: vix credunt inueniri posse homines adeo stupidos, qui putent admirandas has operationes fieri à caliditate, frigiditate, siccitate, vel humiditate, & à cæteris consequentibus qualitatibus: his experimentis, & pluribus aliis commoti putant, esse aliud principium, & aliam occultam causam non subiectam sensibus, vnde prodeant hæ operandi virtutes, creduntque hanc esse substantiam, quæ immediate hos pariat effectus. Nos autem acturi de initiis harum reconditarum qualitatum disputabimus primo an sint in genere substantiæ, ostendemusque non esse substantias, vt putant Fernelius, & Argenterius: deinde proponemus genus generalissimum, & subalternas differentias harum qualitatum.

Verum, quia hæc, quæ agunt tota substantia in arte medica, sub duplicem cadunt considerationem, vel recòditè sicuti dum napellus occidit, & cantharides vesicam exædunt: vel dicitur tota substantia aliquid peccare, dum talis sit recessus in iis, & quæ sunt secundum naturam, & præcipuè in humoribus, vt secundum totam substantiam transmutati illico post suarum formarum interitum naturam subeant puris, vel alterius putrilaginis, de utroque substantiæ vitiis agemus: conabimur tamen in primis de reconditis qualitatibus agere, easque, & opinionem Fernelij conuellere; deinde de genere, & differentiis ipsarum, vt de re magis controuersa, & postremo de iis quæ transmutantur secundam totam substantiam, examen faciemus.

---

*Qua via morborum innotatores possint conuinci.*

C A P. II.

**A** VCTORES sunt ferè innumerabiles, qui de qualitatibus occultis disputant: pauci tamen disputationis cardinem consequi videntur: aliqui enim solum perquirunt, an ex Galeni, vel Aristotelis sententia admitti debeant, & nil vltius quærunt: aliqui minus philosophorum auctoritatibus addicti liberè dicunt, non solum qualitates reconditas, quæ immediate prodeunt à substantia, dari posse; verum etiam in iis qualitatibus morbos formæ constitui, & quantum morborum genus nouiter fingi posse valdè distinctum ab intemperie, mala compositione, & soluta vnitare, inter quos est Fernelius, & Argenterius. Postremò peripateticorum plurimi alius erigentes spiritum; dum de animæ potentiis loquuntur, determinant potentias ad substantiam, & non ad qualitatem pertinere, putantque nō solum aliquas dari qualitates reconditas immediate à substantia venientes, vt ait Fernelius; verum contra Diuum Thomam subtilissimis argumentis conantur ostendere, omnem agendi potentiam, omnemque virtutem



tem seu qualitatem operatricem nullo alio interposito medio instrumento immediatè immediatione causæ à substantia, tamquam à causa efficiente perpetuo prodire.

¶ Fernelius itaque, & cæteri morborum innouatores, cum non desistant ab horum philosophorum vestigiis, altiore sanè sequuntur scholam, quam aliqui fortasse putant; proinde volentes nos in hoc libro præcipuè has reconditas qualitates, & per consequens morbos formæ demoliri, opuserit cum altioribus argumentis illico certare; quia illis solum euerfis atque elisis morborum innouatores commode conuinci poterunt; & qualitates, quas vocant occultas, in categoriam qualitatis, & non substantiæ, transferentur; alia re vera non est via, qua Fernelius, vel hoc nouum morbi genus nunquam à Galeno excogitatum expeditius reici possit, quam statis, & altioribus principis à philosophis desumptis probare, quod substantia non habeat hanc immediatam operationem agendi, quia hac adepta veritate, ruent qualitates occultæ, vel totius substantiæ cum formarum morbis. Et quamuis apud Theologos, & Philosophos subtilissimis argumentis acta sit quæstio, an potentia differant à fundamento, vel an tota virtus operatrix à substantia immediatè pendeat, vel quod in idem recidit, an dentur qualitates occultæ, quæ sint substantiæ operantes: non propterea de hac re hic agendo quis obicere poterit, in alienas messes nos posuisse falcem, quia nisi discutiamus propositum nodum, non possumus aduersus Fernelium vnum verbum mouere; ratio est, quia in hoc solo cardine rota de reconditis qualitatibus difficultas cõsistit, quippe est, an potentia operatrices debeant collocari in categoria substantiæ, vel qualitatis, quia si fuerint collocandæ in substantia, vno & eodem modo depromemus indicationes; si in qualitate alio longe diuerso; quia qualitas indicat contrarium, substantiæ verò cum nihil sit contrarium, nihil indicaret, & nihil ei aduersaretur: si lues gallica, quæ est recondita qualitas esset substantialis, vel immediatè à substantia dependens, ei non aduersaretur lignum: eadem ratione neque rabiei aquæ potio, nec venenis Theriaca, neque vllum contrarium aliorum prædicamentorum relictari posset occultis qualitatibus: duæ itaque rationes potissimæ colliguntur, quibus ostenditur, qualitates occultas non esse substantias operantes: altera est, quia contrarietas positiua vnius generis non potest aduersari contrarietati alterius: altera, quia substantia sua natura est impossibilis, caretque contrariis positiuis.

*Qui vult  
reicere mor-  
borum in-  
nouatores o-  
porset prin-  
cipium scire  
certare.*

*Dua rationes  
ostendentes  
qualitates  
occultas non  
esse substan-  
tias operan-  
tes.*

Sed, quoniam pro comparanda abditatum qualitatum cognitione non satis est reicere aliorum opiniones, & probare, quod à substantia immediatè non prodeant: & quod Galenus, & Aristoteles eas illo modo non admiserint, & demum concludere, quod sint potentia de genere qualitatis, nisi vltèrius animi aciem dirigamus inquirendo videlicet, quænam sint harum potentiarum occultarum differentia genericæ, & vnde habeant suum principium, & quæ sint differentia specificæ, & quodnam sit supremum genus, quod in aliud resolui nequit, ad quod omnes differentia abditatum qualitatum apertè referri pos-

sint. Quæ omnia, nisi summa industria declarentur, non video, quomodo infinita effectuum naturalium reconditorum phænomena saluari possint: quomodo præcauere possimus, quin sine hac distincta cognitione, vel sæpissimè in errores prolabamur: quomodo infinites nō decipiamur à Plinio, Alberto Magno, Dioscoride, & ab aliis, qui ita faciles fuerunt in conferendis virtutibus reconditis tantæ multitudi-  
ni rerum, quæ sæpè sunt illarum virtutum expertes; vt hinc Galenus loquens de istis, qui tam multa referunt ad qualitates occultas, dicat quod nihil sciant; quinimo apertè 3. de prælag. expuls. contra Erasistratum habet, qui nihil docent ad alterum de duobus confugiunt, ad qualitates occultas, vel ad nomina ignota.

*Potiora argumenta ab altiori scholadesumpta, quæ ostendere videntur quod omnes potentie agendi sint in substantia cathgoria.*

## CAPUT III.

**N**ON possumus morborum innouatores, nec qualitates totius substantiæ explodere, nisi altius à primis principiis repetamus illud tam à Theologicis, & Philosophis peripateticis quæsitum non vno in loco excussum, præcipuèque 2. de anima vbi disputant, vtrum animæ potentiæ essentialiter differant ab animæ substantia, quod in idem recidit, an potentiæ idem sint cum fundamento, & numquid in eodem collocentur prædicamento. Cum igitur hæc physica quæstio (vt ostendimus) adeo conferat medicinæ, vt sine eius decisione scire non possumus, quænam sint occultæ qualitates, exordiar à potioribus aduersariorum argumentis, quæ Latini veteres, & recentiores plurimi sequuntur, quibus nituntur ostendere, animæ potentias non differre ab eius substantia, cæterasque virtutes, seu potentias operatrices immediate à substantia prodire, & in substantiæ genere collocari, quorum Philosophorum argumenta non solum supponunt aliquas dari qualitates totius substantiæ, sed omnes potentias operandi esse reconditas & occultas, & ad substantiam pertinere; deinde expendam sententiam Diui Thomæ, quem sequuntur Egidius, Io. Gandauensis, & alij: Thomas enim fortissimis rationibus probat in prima parte summi quæst. 77. art. primo, & in 1. sent. distinct. 3. quæst. 4. art. 2. potentias operatrices non esse substantias, sed essentialiter differre à substantia, & in diuerso esse prædicamento, quod idem est, ac si dicerent qualitates, quæ à nobis vocantur reconditæ, non pertinere ad substantiam, sed ad prædicamentum qualitaris; quod est illud, quod probare intendimus.

*A quibus fontibus oria-  
sis quæstio de  
occulis qua-  
ditasibus.*

*Primum  
argumentum  
aduersario-  
rum.*

Primum igitur argumentum aduersariorū est desumptum ab Arist. 9. metaph. & sic ostendit, potentias esse formas substantiales, & non quali-



qualitates accidentales: dicit Philosophus, dum actiuam definit potentiam, actiuam potentiam esse principium transmutandi aliud, vt aliud: addunt, sed forma est principium transmutandi aliud vt aliud, ergo forma est potentia operandi, & non qualitas accidentalis; ex quo argumento innouatores morborum facile inferre potuerunt, ergo virtus operatrix esse potest ipsamet substantia, vel dari possunt reconditæ, & totius substantiæ qualitates, & harum qualitarum morbi nunquam à Galeno excogitari.

Secundum argumentum est, sicuti passiuæ potentia est essentia materiæ primæ, sic actiuæ erit essentia formæ, ergo eadem erit essentia potentia, & formæ, ergo tota virtus operandi erit in forma, ab ipsa fluet immediatè, & in eodem genere erit, quinimmo agendi potentia non poterit essentialiter à forma differre; nullum igitur dicunt fore inconueniens, si in qualitatibus substantialibus collocabitur nouum morborum genus, distinctumque ab illis tribus à Galeno propositis, qui ad qualitatem pertinent.

Tertium argumentum est ad impossibile, talèque est; si anima, vel forma quælibet facit operationem per medias potentias, & non immediate, audias quid sequitur, ergo necesse erit, vt forma agens prius agat in ipsas potentias per alias potentias, quia tu dicis, nullas operationes facere, nisi per medias potentias, ergo antequam agat in potentias, requirit alias potentias, & illas alias, & sic vsque ad infinitum.

Quartum argumentum, si potentia, vt aiunt aduersarij, per emanationem fluat à fundamento, vt umbra à corpore, sequitur, quod in aliquo genere causæ fluant: non formæ, cum forma non sit vnde motus: non materiæ, cum ipsa sit in potentia, & non in actu, nihil enim fluit ab eo, quod non est actu: non à fine, quia finis est quid posterius: ergo ab efficiente, ergo substantia, vt efficiens aliquid immediatè producere poterit: non erit igitur illa propositio vniuersaliter vera, quod substantia nil immediatè, & per se primo operetur; quinimmo inferunt, si semel potest, semper poterit, quia à nullo potest impediri, nullum enim posterius potest esse impedimento suo priori. Substantia ex Aristotele 7. meth. est prior ratione, tempore, & natura accidentibus.

Quintum argumentum desumitur ab Aristotele 2. de anima text. 9. quod est tale, si animal esset oculus, potentia visiva esset forma eius, ergo potentia est idem, quod anima, ergo potentia non differt à substantia: ex his colligimus, non solum esse aliquas qualitates occultas, quæ sint totius substantiæ, & sint in eodem genere cum substantia, & harum qualitarum morbos proprios dari, vt finxit Fernelius, verum etiā nullam esse operandi, vel patiendi facultatem, nullamque potentiam, vel virtutem, quæ non pendeat immediatè à forma, & quæ non sit forma ipsa, & quæ non sit in eodem, non modo genere generalissimo, sed in eadem specie specialissima prorsus eadem natura, forma, essentia, & quiditate. Hæc sunt potiora argumenta ab altiori schola desumpta, quæ Argenterij, & Fernelij sententiæ fauere possunt: alia ramen plura à Gregorio Ariminensi, & ab alijs possent deprobi, sed

quoniam cætera sunt infirmiora, non erit, ut ipsa in medium afferamus.

*Argumenta potissima, quibus ostendi potest, potentias omnes genere differre à substantia.*

### CAPUT IIII.

*Primum argumentum pro confirmatione veritatis.*

**A**NTEQUAM argumenta in contrarium allata solvantur, potiora, & firmitiora sunt proponenda, quibus probare possimus, omnes potentias agendi differre à substantia, vel ab earum fundamento natura, essentia, & prædicamento.

*Obiectio.*

*Sol.*

Primum argumentum pro nostra opinione desumitur ab Aristotele, ad quem, tamquam ad summum iudicem, omnes, qui de hac re disputant, debent iudicium, deferre, estque, quia potentia operandi collocantur ab Aristotele in prædicamento qualitatatis, quod genus differt natura, & essentia à substantia. Nec valet, dum obiciunt, Aristotelem loquentem de speciebus qualitatatis in 5. Meth. & 7. physicorum non enumerasse potentias, & impotentias, ideo magis esse adhibendam fidem iis, quæ traduntur in physica & Metaphysica, quam logica, ubi solum crassa minerua adolescentes admodum rudes docet: obiectio nulla est; quoniam doceat quis, prout vult ruditer, & crassissimo modo, nunquam debet falsa docere; potest esse diminutus, verum si, dum crassa minerua loquitur, esset superfluous, & simul falsa doceret, ille non in sapientum, sed in insanorum hominum cathalogo esset collocandus, quia adolescentes ab illo non discerent, sed dediscerent, & longè rudiores euaderent. Amplius respondemus, quod prædicamenta in logica longiori discursu, & maiori artificio sunt ab Aristotele explicata, quam in metaphysica, & ratio optima subnecti potest, quia in metaphysica declarantur solum quædam prædicamentorum nomina, & nil ulterius de illis; in prædicamentis vero de speciebus, & proprietatibus prædicamentorum exactius, & plenius agitur.

*Secundum.*

Secundum argumentum ab Aristotele desumptum ostendens, quod potentia differant à substantia, legitur 3. phy. text. 10. unde colligi potest, potentias non esse substantias, & per consequens non dari has qualitates reconditas immediatè à substantia prodeuntes: nec  
 „ quantum morborum genus à Fernelio excogitatum: verba Aristotelis  
 „ sunt: posse valere, & posse ægrotare alterum est, namque ægrotare qui-  
 „ dem, & valere idem esset: subiectum autem, & id quod valet, atque æ-  
 „ grotat siue humiditas, siue sanguis, vnum & idem est: quoniam autem  
 „ non est idem (quemadmodum neque color idem, & visibile) possibili-  
 „ lis, quatenus possibile, actus manifestum quod motus est, &c. Ex quibus  
 „ verbis clarissimè patet, potètiis differre essentialiter à fundamen-  
 „ to, quia posse valere, & posse ægrotare alterum est: homo enim potest  
 „ valere, & potest ægrotare, & hæ potentia cum differant inter se, differ-  
 „ runt



runt quoque essentialiter ab homine, nisi enim differrent, idem esset posse agrotare, & posse valere: satis vulgata est hæc propositio, quæ alicui tertio sunt eadem, inter se sunt eadem; si igitur substantia esset idē quod suæ potentia, ipsæ quoque potentia inter se essent eadem: similiter, si animæ facultates essent anima ipsa, potentia visiva esset idem cum motiva, olfactiva & reliquis omnibus; si quis amitteret vnicam, amitteret animam, & omnes alias, quod est apertissimè absurdum; cæcus nec ablatam, nec diminutam audiendi, vel generandi potentiam habet; quinimo sæpè accidit, vt destruatut potentia aliqua audien- di, vel videndi nulla facta læsione in ipsa substantia. Respondent ad- *Obiis.* uersarij huic argumento potentias istas videri varias atque diuerfas, non quod multæ sint potentia essentialiter distinctæ, sed quia eadem substantia varias relationes, & varios respectus habeat: quæ responsio à primis logicis initiis adeo desleclit, vt pudeat me eam reiiicere, quo- *Sol.* niam sciunt rudes adolescentes, de ratione relatiuorum requiri duo correlatiua actu simul esse, & altero destructo cessare relationem; patre enim destructo non dicitur amplius filius: quod cum ita sit, quæ relatio erit inter potentias & substantiam, si destructa potentia remaneat substantia? Nec dicant, illam esse relationem rationis, quia nos videmus has potentias inter se esse adeo distinctas, vt potetia audien- di, vel videndi habeat esse absolutum, distinctum instrumento, loco; & operatione: & vtramque sine altera consistere posse; quare poten- tia non in substantia, vel relationis, sed in qualitatibz prædicamento in secunda specie, vt nos docet Philosophus, collocabuntur. Quod probatum est de animæ potentiis, inferri potest de omnibus; quia ra- tiones, quibus probatur, potentias animæ essentialiter differre ab ani- ma, sunt vniuersales, & secundum quod ipsum, quæ non conuenient animæ tantum; sed cuilibet substantia respectu suarum potentia- rum, & cuilibet qualitati recondita, quæ aliquam operandi poten- tiam fortitur.

Tertium argumentum, quod non dentur qualitates totius substan- *Tertium.* tia, & quantum morborum genus in ipsis collocatum, est, quia sub- stantia, vt substantia ex Aristotele nullum est contrarium positium, & viceversa, substantia aliis non aduersatur; quo pacto itaque morbi formæ, vel reconditarum qualitarum collocati in prædicamento sub- stantia poterunt per contraria curari, & alterari? si substantia nihil sit contrarium? si substantia, vt substantia, nec substantia, nec qualitati- bus recludetur? quo pacto guaiacum lignum aduersabitur morbo gal- lico? allium magneti? venenum naturæ humanæ? Theriaca venenis? quo pacto cicuta necabit homines, & nutrient sturnos? doronici occi- dent canes, & hominibus auxiliuntur, & sic de aliis: si dicant per sub- stantiam inuicem aduersari? ferunt Aristotelem dicentem, substantia nihil posse aduersari, substantiamque æquè omnes substantias respi- cere: similiter, dum dicunt venenum vel pestem aduersari non solum substantia, verum etiam temperaturæ, multipliciter vacillant, primo quia vnum vni solum est contrarium: secundo contrarium vnius ge-

neris nunquam aduersabitur iis, quæ sunt sub alio genere: prædicamenta (ex Aristotelis sententia) cum eorum proprietatibus sunt impermiscibilia: nigrum opponitur albo, quod est in eodem genere, nunquam tamen magno, vel paruo aduersabitur, quia genere discrepant. Quare veneni substantia, pestis substantia, luis gallicæ substantia neque temperaturæ, neque substantiæ hominis poterunt reluctari: non temperaturæ, quia, quæ sunt in vnico prædicamento non reluctantur iis, quæ sunt in altero, quia sunt impermiscibilia; non substantiæ, quia substantiæ nihil est contrarium: quibus positis sequitur necessario, quod qualitates occultæ non sint substantiæ.

Quartum  
argumentum.

Postremum argumentum est ad impossibile, sequeretur enim quod vnum vt vnum duobus aduersaretur, quia lues gallica substantificæ ex illorum opinione reluctatur homini, & guaiaco: venenum homini, & Theriacæ, & sic de aliis, quod est absurdum, quia substantia est simplicissima, & vt substantia, vnicum habet esse: quod vero vnum contrarium non habeat plura contraria, ostendunt demonstrationes Arist. 1. de cælo propositæ, quæ hoc vnico principio suffultæ probant, cælestia corpora esse quintam essentiam: quare posito, quod substantiæ nihil sit contrarium, quod vnum contrarium vni tantum aduersetur, quod contrarium vnius prædicamenti non contrarietur contrario alterius, & quod prædicamenta sint impermiscibilia, sequetur quod nullo modo dentur hæ qualitates reconditæ, quæ tota substantia reluctantur aliis; neque dentur morbi formæ, qui similiter sua substantia opprimere possint humanum genus; neque demum dentur qualitates occultæ, quæ collocentur in prædicamento substantiæ, & sint substantiæ operantes. Quod cum ita rationes demonstratiuæ nobis persuadeant, dicimus quod qualitates, quæ in scholis vocantur occultæ, debeant collocari in prædicamento qualitatis sub secunda specie, & per consequens quartum morborum genus, ad quod Fernellius morbos formæ reduxit, esse chimericum, quia omnes latæ potentiæ ad tria genera commodè referantur, scilicet ad intemperiem, malam compositionem, & solutam vnitatem.

*Soluntur argumenta in contrarium adducta.*

#### C A P I T V L U M V.

**C**OGENITO genere proximo, in quo tamquam in propria sede abditæ qualitates collocari debent. Nunc antequam de differentiis earum agamus, prius aduersariorum argumenta conuellere conabimur, quæ ostendere videntur, omnes potentias, & omnes abditas virtutes in substantiæ genere esse reponendas. Erat primum argumentum ex 9. metaphysices desumptum, vbi definit potentiam esse principium transmutandi aliud vt aliud, quod non potest conuenire (vt aiunt) nisi formæ & substantiæ. Respondemus, Aristotelem per po-  
tentiam



tentiam transmutandi ibi intelligere agentem potentem transmutare *Responsio ad*  
in quo non solum est substantia, verum etiam cætera prædicamenta, *primum ar-*  
potentia enim non potest transmutare, nisi sit quanta, habeat relatio- *gumentum,*  
nem, nisi sit annexa substantiæ, nisi sit in loco, nisi agat, & agendo re-  
pariatur, & aliquando id efficiat: nos vero hic consideramus nõ agen-  
tem potentem transmutare, quod est concretum ex omnibus naturis  
genericis, sed quodnam sit genus proprium, in quo debeant collocari  
potentiæ & virtutes operatrices separatæ ab aliis generibus.

Ad secundum argumentum quod erat, sicuti potentia passiuæ est *Ad secundū.*  
essentia materiæ, sic actiuæ erit essentia formæ. Respondemus argu-  
mentum petere in principio, quia videtur supponere potentiam esse  
materiæ primæ essentiam, quod erat prius probandum; negari optimè  
potest, quod potentia sit materiæ primæ essentia; quia, si esset essentia,  
de materiæ prædicaretur in primo modo dicendi per se, quod aduer-  
satur logicis præcipuis fundamentis, quia in primo modo actus tan-  
tum ponuntur, quod quid est enim actus est, prædicata primi mo-  
di i. post. t. 9. in sunt subiectis *α τῷ τῷ ἐστὶ*, quare potentia non ha-  
bebit locum in primo modo, sed in secundo, in quo sunt potentiæ &  
aptitudines omnes subiectorum. Neque iterum obiciant, Aristote- *Obiectio.*  
lem in libris de anima, vocasse animam potentiam: quia iterum nega- *Sol.*  
mus, potentiam esse animæ essentiam; dum enim Aristoteles vocauit  
animam potentiam, eam considerauit vt principium operationis, cum  
hac scilicet aptitudine ad operandum, quæ potentia, vel aptitudo  
pertinet ad secundum modum dicendi per se: similiter philosophus in  
libris de cælo semel vocauit grauitatem, & leuitatem elementorum *Vt grauitas,*  
formas, quia ibi elementa considerauit cum relatione ad motum: ra- *& leuitas*  
tio sane specifica, cur elementa localiter moueantur est grauitas, & le- *sint elemen-*  
uitas; considerando igitur elementa vt apta moueri, grauitas & leuitas *torum for-*  
erunt elementorum formæ, quæ prædicantur in secundo modo dicen- *ma.*  
di per se: considerando animam cum relatione ad operationes dicitur  
potentia; his commoti rationibus dicimus potentiam respectu mate-  
riæ esse in secundo modo, & non in primo, & potentiam passiuam non  
esse essentiam materiæ, nec actiuam formæ, sed proprietates secundi  
modi dicendi per se.

Ad tertium argumentum dicimus, quod non nobis, sed Diuo Tho- *Ad tertium.*  
mæ aduersatur, qui dicebat, potentias esse causas medias; quod nega-  
ri potest; quoniam potentiæ naturales sunt subiecti aptitudines, à qui-  
bus immediatè fluunt vniuersæ operationes; aptitudines enim licet  
inhæreant substantiis, attamen de substantiis non prædicantur, nisi in  
secundo modo, vt diximus, & per consequens neque sunt substantiæ,  
neque immediatè prodeunt à substantia, prædicantur de substantia in  
primo modo, & sunt in cathetoria substantiæ, vt animal rationale præ-  
dicatur de homine, & est actus, & non aptitudo: risibile mediate, quia  
inter hominem & risibile mediat rationale; hinc est, quod aptitudi-  
nes, & potentiæ sunt in accidentium, actus in substantiæ prædicamen-  
to. Amplius infra cum Aristotele probabimus, potentias, vel aptitu-

dines immediatè pendere non à substantia, sed à quarta, & à tertia specie qualitatís, scilicet à figura, à passione; & passibili qualitate: & ratio est, quia posse agere requirit talem figuram, talem situm, & talem numerum, quæ conditiones non pertinent ad substantiam; nisi enim in horologio esset talis orbiculorum vel rotarum situs, numerus, & figura, quamvis substantia esset aurea, nihil ad vltum magis, quam alia substantia conferret: similiter si saltatoris pedes luxentur, muteturque situs, & figura, vel temperatura partium, quamvis substantiæ nil deficeret, haberetque animam ad saltandum natam, saltare non posset; ecce igitur, quod aptitudines non pendent à substantia, sed à numero, situ, & figura, & ab aliis accidentibus subiecti: quibus positis, patet argumentum, dum dicunt substantiam agere prius in potentias, esse nullius roboris, quia posse agere non à substantia venit, sed à similarium, & dissimilarium proportionem & harmoniam, quæ immediatè consistit in tertia, & quarta specie qualitatís, in temperatura scilicet, & figura partium, omnia enim attributa, quæ immediatè immediatione causæ proueniunt ab aliquo, sunt in eodè genere cum illo, à quo fluunt; sicuti risibilitas est in eodè genere cum aptitudine ad ridendum, potentia in eodè genere cum figura, & passibilibus qualitatibus. Hinc logici optimè dicunt secundam speciem qualitatís aliquando fieri à tertia, & aliquando à quarta qualitatís specie; patet igitur potentias immediatè constitui in partium harmoniam, & nequaquam in substantiam.

*Ad quartum.*

Quoad quartum argumentum respondemus, potentias non pendere immediatè à forma, vel à substantia, neque vt ab efficiente per transmutationem, neque ab efficiente per emanationem: non vt ab efficiente per transmutationem; quia quæ pendent ab hoc efficiente, pendent cum conatu, & resistantia; proprietas trahendi ferrum pendet à magnete sine conatu, & resistantia; neque potentiæ operandi pendent à forma, & substantia, vt ab efficiente per emanationem, vt Iacobus Zabarella defendit; quia saltem esset verum, quod semper eadem manente substantia, eadem quoque esset potentia, quod reluctatur experientiæ: possem hic plura exempla afferre, quæ ostenderet potentias non insequi substantiam, vel emanare per se à substantia, sed à proportionem & harmoniam partium, scilicet ab earum figura, situ, & meatibus: sed aliquot hic proponantur pro veritatis declaratione: inferius plura afferemus; primum quis diceret cristalli, vel adamantis perspicuum insequi eorum substantiam? quis non videt adamantem, vel cristallum in pollinem redactum amplius non splendescere, eadem prorsus manente substantia? quis non videt fractum cristallum in pollinemque redactum non esse perspicuum ob figuram, & situm minimarum partium mutatum? Secundum, cantores canendi potentiam non à substantia, sed ab optima constitutione pectoris, scutiformis, & tracheæ eam colligunt, signum, quod res ita sit, est, quia tollitur canendi potentia, si larynx obstruitur à dilabente catarrho, eadem semper manente substantia; similiter perfectè sanus dicitur ille, qui habet bonam constitutionem partium tam similarium, quam dissimilarium, quæ



quæ constitutio pertinet ad tertiam, & quartam speciem qualitatis: itidem dicimus de morbofis hominibus; habet enim hanc impotentiam: quia vel carent proportionem, & harmonia qualitatum: vel situs, numeri, meatus, & figuræ partium malè constitutæ sunt: patet ergo, potentias non pendere immediatè à substantia, neque ut ab efficiente per transmutationem, neque ut ab efficiente per emanationem.

Ad vltimum argumentum, si animal esset oculus, potentia visiva esset forma eius: Respondemus, quod Aristoteles cōsiderat animam, *Ad quintū* ut est principium operationum corporis animati; hinc definit animā, quod sit principiū, quo viuimus, sentimus, intelligimus, & mouemur, quare sicuti alia est natura hominis, ut homo est, alia ut patet, ut quantus, sic alia est natura animæ cōsideratæ in se, & sine relatione ad operationes, & alia cum relatione ad operationes, quarum illa est principium: eundem quoque stylum seruat philosophus in libris de cœlo, vbi dicit, grauitatem, leuitatem esse formas elementorum, & 2. de par. animal. ca. 1. dum dicit, grauitatem, & leuitatem esse qualitates elementorum; & ratio est, quia in libris de cœlo considerauit elementa, ut sunt principia recti motus, secundum quam considerationem grauitas, & leuitas dici possunt formæ elementorum: in 2. vero de par. animal. considerauit elementa, ut substantiæ, ideo vocauit grauitates, & leuitates, qualitates, & non substantias, vel formas: ob eandem rationem ab Alexandro Aphro. & ab Aristotele caliditas, frigiditas, siccitas, & humiditas vocantur aliquando formæ elementorum, quando scilicet considerantur elementa, ut principia generationis; generatio enim ab iis qualitatibus habet ortum: quando vero elementa nō cum relatione ad generationem, sed absolutè considerantur, ut in metaphysica, tunc quatuor citatæ qualitates dicuntur ab Aristotele accidentia: locus Aristotelis est 3. lib. Meth. text. 17. vbi dicit, caliditates, frigiditates, humiditates, & siccitates non substantias elementorum esse, sed qualitates: sic nos non recedentes à vestigiis philosophi dicimus, si oculus esset animal totum, potentia visiva esset anima, expendendo scilicet animam, non absolutè, sed prout est principium videnti: quænam vero sit natura animæ absolutè considerata, omnino later; quia remota consideratione animæ cum relatione ad operationes, & quatenus est principium operationum, est omnino nobis occulta, & incognoscibilis.

---

*Galeni auctoritatibus, rationibus, & experimentis ostenditur, qualitates occultas non à substantia, sed à multis manifestis prodire.*

C A P. VI

**P**LVRIIMI sunt, qui putant, Galenum arbitrari, qualitates, quas appellant occultas & reconditas, immediatè pendere à substantia, et-

seque in eodem prædicamento cum substantia, quoniam non vno loco vident à Galeno distingui qualitates occultas, & totius substantiæ à qualitatibus manifestis: quorum hominum opinio in Galeno nullo modo defendi potest: auctoritates, & rationes, quæ nos mouent seriatim sunt proponendæ. Prima hæc est, qualitates, quæ habent contrarium, non sunt substantiæ, at qualitates, quæ vocantur reconditæ à Galeno, habent contrarium, ergo qualitates reconditæ non erunt substantiæ; maior est Aristotelis dicentis, substantiæ non conuenire contrarium: minor vero, quod qualitates reconditæ habeant contrarium, Galeni auctoritate, & deinde experimentis comprobabitur; sententia est Galeni 12. methodi, & alibi, quod quædam contraria sint substantiis totis, quædam ipsis qualitatibus. Ecce igitur, quod recōditis qualitatibus conuenit contrarium; quare nisi dicamus, Galenum vsque adeo fuisse rudem, vt tunc oblitus fuerit, an substantiæ conueniat contrarietas, non poterimus vlllo modo ipsum defendere.

*Primum, & præcipuum argumentum quod probatur apud Galenum non dari qualitates occultas.*

*Secunda Galeni auctoritas probans non dari qualitates occultas.*

Secunda Galeni auctoritas est lib. de const. ar. med. cap. 8. & 4. de simp. med. c. 15. vbi dicit, fieri has qualitates reconditas siue occultas ex infinitis alterationibus elementorū: addamus nos, sed sic est, quod omnia quæ sunt ex alteratione elementorum non sunt substantiæ, sed temperamenta, & qualitates, ergo occultæ qualitates erunt illæ, quæ ex mixturis innumerabilium qualitatū fiunt.

*Tertia.*

Tertia est 2. de loc. affectis cap. 8. vbi declarat, vnde fiat proprietas ineffabilis, quæ est qualitas occulta, dicit, quod ab infinitis alterationibus facta est. Hinc habet hæc verba: vbi verò multæ qualitates circa vnā essentiam apparent, ibi & proprietatem fieri contingit: dicit, quod in gustu præcipuè obseruari possit, cum amaritudinem, & dulcorem, & austeritatem, & acrimoniam in vna essentia apparere contingerit: proprietas, quæ in gustu ex his oritur, si vnico nomine ipsam explicare tentaueris, ineffabilis est: de hac 1. ad Glauconem loquens Galenus dixit, quod si ad vnguem has occultas qualitates cognosceret, se parem Esculapio crederet.

*Quarta.*

Quarta, dicit quod ex hac occulta qualitate indicationes non colligantur, quia cum fiat ab innumerabilibus alterationibus, non est cognoscibilis, docet tamen nos inuenire per experientiam remedia contraria, quibus depellere possimus qualitates, quæ vocantur totius substantiæ: quinimmo à Gal. factum est caput de medicamentis per experientiam inuentis pro debellandis, quæ occultæ, & tota substantia agunt; proinde cum ex Galeno pateat qualitates reconditas habere contrarium illico patebit, omnes has qualitates occultas esse in prædicamento qualitatis, neque dari fictitium illud morborum formæ genus.

*Quinta.*

Quinta est 3. de temp. cap. 4. vbi declarat quid intelligat per vniuersam substantiam, his vtitur verbis: sanè naturam cum dico vniuersam substantiam, & temperiem, quæ ex primis elementis constitatur, significo calido, frigido, humido, & sicco: ecce ergo, quod per vniuersam substantiam intelligit temperaturam, sed non (vt quidam credunt) genericam,



genericam, sed specificam, & post multas alterationes redditam in-  
gnosibilem, & (vt dicit ille) ineffabilem.

Hinc Theriaca habet illam qualitatem aduersus venena acqui-  
sitam ob misturam, & varietatem qualitarum omnium simplicium, quę  
ingrediuntur antidotorum secundum aliquam determinatam dosim.  
Obersuatur quoque in plerisque aliis rebus, quod ex alteratione, &  
mista multarum qualitarum oriatur aliqua noua, quę occulta dici-  
tur. Tinctores & pictores ex colorum mistura nouos faciunt. Figuli,  
dum componunt viridem colorem similem smaragdo, si ad vnguem  
non seruant hanc proportionem, nunquam smaragdi colorem pos-  
sent imitari, sumunt plumbi librās quinquaginta, terrę, qua specula  
confricantur, libras sexdecim cum dimidia, & æris libras duas  
cum vncia; ex hac cōpositione in hac dosi, & proportionē ad vnguem  
obseruata oritur viridis ille color: noui Figulum scientem simplicia  
pro huius coloris compositione, sed non dosim, qui, licet millies ea  
permiscuerit, nunquam tamen potuit imitari, & diuinare ex qua pro-  
portionē exurgeret ille color, nisi postquā fuit ab alio dosim edoctus.  
Similiter de magnete, & de aliis occultis cum Galeno dicendum, quod  
ex centum aliis qualitatibus alteratis determinatus gradus fiat inco-  
gnosibilis, qui dicitur qualitas recondita: hæ igitur sunt qualitates  
occultę, quę ex aliorum multorum alteratione fiunt. Qui verò aliter  
sentiunt, certent cum Galeni locis superius citatis. Nos interim su-  
stinebimus, qualitates reconditas esse accidentia pertinentia ad præ-  
dicamentum qualitatis, easque tolli posse contrariis.

*Offenditur  
experientia  
quod ex mul-  
tis aliis ori-  
tur varia  
qualitates.*

*Quę sint reconditarum qualitarum differentia, & à quo sub-  
iecto communissimo prodeant.*

CAPVT VII.

**A**CTVRVS in hoc capite de genericis, & specificis reconditarum  
qualitarum differentiis, ad quas commodè, & rationabiliter  
omnes qualitates occultę, tãquam ad propriam sedem reuocari pos-  
sunt, præstat iterum altioribus initiis confirmare, quod qualitates oc-  
cultę nullo modo sint in cathēgoria substantiæ, vt Fernelius, & cæteri  
morborum innouatores credidere: hæcerat prima ratio; substantiæ  
nil aduersatur, sed sic est, quod quęlibet occulta qualitas habet con-  
trarium, ergo non est substantia. Secunda ratio, quę subiecti potest,  
hęc est: quod definitur per subiecta propria, non potest esse substantia,  
& qualitates occultę non possunt definiri, nisi per subiecta propria,  
quia sunt potentię, & aptitudines subiectorum ergo qualitates occultę  
non sunt substantiæ: minor pater, quia omnes potentię sunt in  
secundo modo dicendi per se, dicimus enim ritabilitatem esse poten-  
tiam, seu aptitudinem hominis ad ridendum, & potentiam trahendi  
ferrum esse magnetis aptitudinem, duosque modos dicendi per se

*Qua via do-  
ceat nos Ari-  
stoteles quod  
nulla poten-  
tia sit sub-  
stantia.*

esse omnino distinctos, separatos, & impermiscibiles, in primoque collocari formas & quidditates, quæ sunt actus, quæque sunt in eodem genere cum subiecto: in secundo aptitudines, & omnes potentias operatrices manifestas, vel occultas; sicuti igitur primus modus non est secundus, sed distinguitur ab illo genere, & natura sic aptitudines seu potentia operatrices non erunt formæ, vel substantiæ, sed natura, & genere à substantia distabunt: per hæc principia Aristoteles potuit nos eleuare ad hanc cognitionem, quod qualitates occultæ sint accidentia, & non substantiæ, sintque potentia de prædicamento qualitatis, habeant contrarium, suscipiant magis & minus, & similes, vel dissimiles dicantur. Supponatur ergo. potentias omnes occultas, siue manifestas esse in cathetoria qualitatis: & de potentiarum genere non amplius loquamur.

*Vnde potest  
da sit occultarum  
qualitatum  
cognitio.*

Posito, quod potentia sint aptitudines subiectorum; potentiarum cognitio aliundè hauriri non poterit, quàm à conditionibus propriorum subiectorum: auctor doctrinæ huius est Aristoteles, fundamentumque huiusmodi est adeo certum, vt si quis in ipso vacillaret, à peripatetica doctrina, & ab omni philosophia discederet, & ego cum illo medius fidius non disputarem. Propria subiecta potentiarum adinueniri non poterunt, nisi prius diuidamus communissimum subiectum, cui omnia accidentia inhaerent, in suas differentias, donec radicem omnium passionum, & potentiarum inueniamus. Subiectum communissimum est substantia vt corporea, quæ sola subsistit aliis, & est tamquam basis omnium accidentium, & ab eius differentiis omnia subiecta passionum oriuntur: à substantia igitur vt corporea erunt colligenda subiecta propria, quæ poterunt definire qualitates, si voluerimus ex primis fontibus cognitionem haurire. Nec mihi obiciat aliquis, quod incidam in sententiam Scoti dicentis, potentias definiti per substantias, quia quod dicitur de potentiis, intelligitur quoque de omnibus accidentibus, quod scilicet per subiecta declarentur, & non alio modo; iam ostēdimus superius, quod passiones declarate, vel de-

*Vnde ex  
Aristotele  
omnes  
passiones  
habeant  
originem.*

finite per propria subiecta distent genere à subiectis. Quo pacto vero substantia corporea diuidatur in differentias, quarum ratione nos scire possimus, quomodo passiones omnes à substantia corporea pendeant, adire debemus Aristotelem, qui 8. phys. text. 55. nos docet densitatem, & raritatem corporeæ substantiæ esse omnium passionum principia: hæc est verborum series; amplius omnium passionum principium est densitas, & raritas, etenim graue, leue, & durum, & calidum, & frigidum densitates videntur esse, & raritates quædam: ecce, quod qualitates omnes tam primæ, quam secundæ, scilicet calidum frigidum, humidum, & siccum, durum, molle, lentum, frigibile, asperum, lene, crassum, tenue & aliz innumerabiles eiusdem ordinis à substantia corporea pendent, eaque quatenus est magis, vel minus rara, vel densa, est subiectum, & principium materiale omnium passionum: quod Aristoteles loquatur ex propria, & non antiquorum sententia, vt plurimi putant, patet ex præcedentibus, & subsequētibz verbis: quo pacto

vero



vero apparens contradictio in Aristotele saluari possit, quod scilicet rarum, & densum sint principia calidi, & frigidi, & possint quoque esse secundæ qualitates, in sequenti capite erit sermo: interim accipiat ab Aristotele hoc fundamentum, quod rarum & densum sint principia omnium passionum, quod aliis quoque philosophi principiis consentire videtur: alio modo ex Aristotele motus diurnus sub orbe Lunæ non generat ignem, nisi prius rarefaciendo materiam: ecce, quod rarum calido prius est, quinimmo Scaliger, Zarabella, & plurimi peripatetici tenent sub polis igneam sphaeram non dari, quia ob motus tarditatem non potest rarefieri, & inde ignem gigni, tenentque propterea, elementum ignis non sphaericam, sed ouatam figuram habere.

*Cur elementum ignis ouatam habeat figuram.*

Amplius ex positione Aristotelis superius allata, quod à corporeæ substantiæ raritate, & densitate fiat calidum, & frigidum, durum, & molle, vterius subiectum communissimum omnium passionum diuidemus, quod scilicet alia sit substantia corporea similis, alia vero dissimilis. Hinc philosophus semper sibi consentiens in prædicamentis dixit, proprium omnium qualitarum esse, quod subiecta earum dicantur similia, vel dissimilia: voluit philosophus subiectum potentiarum naturalium non solum esse simile, verum etiam dissimilare, quod quoque aliis altioribus Aristotelis, & Galeni initiis comprobatur; Aristotelis, quia est famosa peripateticorum sententia, quod aliæ quæ potentia oriuntur à tertia specie qualitatibus, scilicet à passione, & passibili qualitate, aliquæ verò à quarta, scilicet à figura: tertia, quia omnes potentia similarium corporum pendere videntur à vario concentu, & symetria calidi, frigidi, humidi, & sicci, & à cæteris consequentibus passionibus, quæ in tertia specie qualitatibus collocantur; licet iis omnibus antecellant raritates, & densitates, quæ si Aristoteli credendum est, sunt principia omnium passionum; nam prout similes partes vario modo figurantur ob mutationem situs, & meatus partium, variæ consurgunt potentia refrigerandi, vel calefaciendi. A quarta, quia omnes potentia, vel impotentia dissimilatum à figura vario modo disposita pendunt: partium situs, meatus, numerus, & magnitudo ad figuram pertinent, & sub figura continentur omnes. Ex Galeno, quia sicuti pars similis ob temperaturam qualitarum primarum conservat potentias, & ob intemperaturam eam amittit, sic pars dissimilis conservat potentias ob rectam compositionem, quæ compositio dicitur de situ, numero, magnitudine, & meatu. Temperatura ergo, & figura erunt proximæ origines passionum, & potentiarum omnium: magis remotæ causæ erunt raritates, & densitates.

*Vnde sit quod subiectum omnium potentiarum sit simile, vel dissimile.*

Verum, quia temperatura, figura, raritates, & densitates sunt accidentia, & accidens ex Aristotele 4. meth. tex. 14. non est accidentis accidens, sed eius cui primo inhæret. Idcirco vterius est dirigenda animi acies, ut perquiramus communissimum subiectum, cui raritates, & densitates conveniunt; ab accidente enim ad accidens, vel ab effectu ad effectum nullus datur progressus scientificus, & demonstrativus;

*Vnde varium & densum procedens.*

quinimmo alia de causa ab Alex. Aphro. mathematica non vocatur philosophia, nisi quia demonstrat prædicata accidentalialia de subiectis accidentalibus: neque alia de causa in scholis reprehenditur Termistius, dum proposuit dari quandam demonstrationis speciem ab effectu ad effectum, nisi quia ab accidente ad accidens nullus vnquam dabitur processus demonstratiuus: ex primis enim subiectis omnis cognitio exacta debet procedere, & non ex mediatis, & accidentalibus passionibus. Itaque quamuis dicat Aristoteles, rarum & densum, esse principia omnium passionum, attramen cum raritas, & densitas inexistant aliis; earum primum subiectum, quod in aliud resolui nequit, perquiri potest.

*Rarum, &  
densum quid  
sit.*

Aristoteles in propriis locis scilicet in cathedra qualitatibus omnia profundius considerans dicit, rarum, & densum pertinere ad situm, definit enim rarum, & densum per ea quæ prædicamento situs conueniunt: hoc modo: rarum est cuius partes ab inuicem distant: densum, cuius partes sunt propinquæ: ecce igitur, quod situs partium faciet raritatem, & densitatem, passiones, & omnes potentias, quæ sequuntur: situsque erit genus generalissimum, quod in aliud resolui nequit. Verum, quia situs est quid ab alio dependens, & accidentale, vnde prodeat est videndum: Aristoteles 8. phy. considerans vniformitatem, & diffinitatem rerum, referre videtur primo vniformitatem, & conuenientiam omnium rerum natura constantium in causam vniformem, id est, in vnum & simplicissimum motorem, qui est actus purissimus; deinde diffinitatem, & varietatem eorum, quæ sub cælo, & in cælo continentur refert nō ad motorem: sed ad primum corpus, quod octo differentiis positionis scilicet intus, forinsecus, ante, retro, dextrorsum, & sinistrorsum, sursum, & deorsum tot ac tanta rerum discrimina facit: substantia igitur quatenus corporea, octo iis differentiis positionis faciet tam varium situm: à situ orietur raritas, & densitas; à raritate, & densitate calidum, & frigidum, durum, molle: ab iis tertia species qualitatis, quæ est passio, & passibilis qualitas, & quarta, quæ est figura: à tertia & quarta specie oriuntur potentia, vt à primo ad postremum corpus, vel trina dimensio, quæ est ipsamet materia, quæque causare potest omnes differentias positionis est prima omnium accidentium radix. Neque obiciat trinam dimensionem esse accidens; quia cum Philopono iustinebimus corpus, vel trinam dimensionem esse ipsamet materiam primam, quæ statim dum terminatur à forma differentias positionis efficit, vnde situs, vnde raritates, & densitates fiunt, vnde calidum, frigidum, humidum, & siccum, vnde durum, & molle, passiones, passibiles qualitates, figura, & demum potentia, quæ ab accidentium serie, perinde ac ab vna catena omnes tam manifestæ quam occultæ oriuntur: manifestæ fiunt ex paucis alterationibus præcedentibus: occultæ ab innumerabilibus prægressis, quas solus Esculapius posset explicare: alij inueniant in negotio hoc difficili principia facilliora; sed, quæ animum componant, quia non solum opinionem mutabimus, verum etiam eos laudibus ad sidera extollemus.

*Vnde oritur  
omnium ac-  
cidentium  
catena,  
Obiectio,  
Sol.*



*Responsio ad duas difficultates, quæ ex dictis exurgunt.*

CAPVT VIII.

EX iis, quæ dicta sunt in præcedenti capite, duæ exurgunt dubitationes, quæ videntur Aristoteli, & probis auctoribus comprimis reluctari: quarum prima est, quia ex Aristotele diximus, à raritate, & densitate passiones, vt calidum, & frigidum, humidum, & siccum, & cæteras, quæ sequuntur, prodire, nihilominus in libris de generatione ab Aristotele statutum est, primas qualitates esse calidum, frigidum, humidum, & siccum, & ab iis rarum & densum, & cæteras suum trahere exordium, quæ videtur contradictio manifestissima. Secunda dubitatio est, quia dum diximus, situs varios, variasque partium positiones, & inde raritatem, & densitatem esse originem passionum, & potentiarum, cogimur Aristoteli, & Galeno aduersari, & incidere in sententiâ Democrati, vel Theſali, qui ad laxum, & densum, tamquam ad affectuum principia confugiebant; quam sententiam Galenus, & Aristoteles totis viribus conati sunt euertere.

*Prima dubitatio.*

*Secunda dubitatio.*

Quo ad primam difficultatem attinet, respondemus nullum esse inconueniens, secundum varium considerandi modum rarum, & densum esse principia calidi, & frigidi, & calidum, & frigidum versa vice causare raritatem, & densitatem: hanc loquendi varietatem in Aristotele de elementis loquente non vno loco obseruare possumus; etenim in libris de cælo videtur vocare grauitatem, & leuitatem formas elementorum; secundo vero de par. animal. cap. i. vocat grauitatem, & leuitatem elementorum qualitates: hæc omnia secundum varium intelligendi modum vera esse possunt: in libris de cælo, vbi considerat elementa, quatenus sunt principia recti motus, grauitatem & leuitatem vocat elementorum formas, quia non alia ratione elementa localiter mouentur, nisi vt grauias, & leuias. In libro de par. animalium considerat grauitatem, & leuitatem, vt insequuntur elementorum formas, & vt sunt accidentia, & qualitates. Simili modo ab Alex. Aphro. caliditates, frigiditates, siccitates, & humiditates vocantur elementorum formas, quia elementa ibi considerat, quatenus transmutantur inuicem, agunt, & patiuntur, & sunt principia generationis, & corruptionis; elementa enim solum ob quatuor qualitates miscentur, & sunt principia generationis, vt secundum hanc rationem, vel considerandi modum quatuor qualitates sint formæ elementorum: alia debet esse forma ignis, vt est entis gradus, alia, vt elementum est, alia vt recto motu mouetur. Similiter alia est forma hominis, vt homo est, alia, vt pater, vt quantus, vt philosophus, vel medicus, & sic de aliis: Aristoteles 3. meth. tex. 17. vbi de qualibet re loquitur absolutè, & sine relatione; dum de quatuor qualitatibus verba facit, dicit, caliditatem, frigiditatem, siccitatem, & humiditatem nō esse elementorum substantias, sed

*Solutio prima.*

*Vt quatuor primæ qualitates, & grauitas, & leuitas dici possint elementorum formas.*

*Vi nescitur  
rarum esse  
prius calido.*

accidentia. Ad eundem modum nos dicimus, rarum, & densum causare passiones omnes, calidum scilicet frigidum, & cæteras; & vice versa, quod rarum fiat à caliditate, & densum à frigiditate: quod rarum possit esse causa caloris hac experientia cognoscitur; destruat rarum & calidum, supponaturque deinde fieri motum aliquem velocissimū; tunc à quo ex Aristorelis sententia pendet calor & raritas? cui dubium, quod materia ob motum prius fiet rara quam calida? prius enim rarefit materia, & deinde exurgit caliditas; accidit quoque, ut à genita caliditate rarefiat materia, & à frigiditate condensetur, & sic à calido rarum quoque fiat; varia igitur consideratione modo raritas, modo caliditas erit prior; quod caliditas sit quoque prior, exemplū est lotium turbidum, quod ab igne rarefaciente crassas partes, & mutante particularum minimarum situm reddi potest splendidum, & perspicuum: sed reuera, si consideraerimus prima initia caliditatis, semper raritas prius enasci videbitur, quàm caliditas; quia prius à motu rarefit materia, deinde incalescit; inter cætera exempla, quæ possent proponi, vnicum debet afferri ab Aristotele desumptum, quod est de motu diurno rapidissimo, qui alio modo non generat, & conseruat elementū ignis, nisi prius rarefaciendo materiam contentam sub orbe Lunæ, qua rarefacta, deinde ignescit: vbi vero motus diurnus est tardus, sicuti est sub polis, non rarefit materia, & per consequens non incalescit: vnde plurimi celeberrimi Peripatetici, inter quos est Iacobus Zabarella, & Scalliger de elemento ignis loquentes dixerunt, sub polis elementum ignis non dari: motus diurnus est adeo tardus, ut non possit rarefacere, & efficere igneam naturam: colligere ergo possumus, rarum, & densum causare omnes passiones, & qualitates, quæ vocantur primæ, & à primis quoque rarum, & densum oriri posse.

*Solutio secundæ  
dubitationis.*

*Octo sunt  
differentiæ  
esse dispositionis  
materiæ, unde  
forma fiunt.*

Quo ad secundam dubitationem, negamus, sententiam propositam fauere Democrito, quia nos cum Aristotele admittimus, sub quatuor raritate rara, & densa, & sub aliis sitis differentiis formas delitescere, quæ sunt substantiæ, quæque à materia emergunt dispositionum officio; dicimusque disponi materiam ab octo differentiis positionis, vnde raritates, & densitates variæ, vnde caliditates, & frigiditates, asperitates, & lenitates innumerabiles fiunt, vnde meatus varij; & pro infinita horum omnium varietate variæ, & infinitæ formæ enascuntur; quas Democritus non admittebat. Similiter de Thesalo dicimus, quia ille solum ad duo communia, ad rarum scilicet & densum confugiebat, non admittens ab iis specificas & particulares temperaturas, vel intemperaturas dari, quæ sint in facto esse, & quæ diuersimodè indicent. Nos verò cum Aristotele ad passiones, & ad figuram: cum Galeño ad intemperiem, malam compositionem, & solutam vnitatem morbos omnes referimus: Thesalus à Galeño in certamine victus atque explosus fuit, ut doctrinæ inutilis inuentor: quoniam in vniuersalibus solum versabatur, à quibus neque res pendent, neque remedia quiesq; haurire pro mala debellanda valetudine potest.

*Quomodo*



*Quomodo Galeni fundamenta faueant sententia nostra.*

C A P. IX.

**Q**UOD operatrices potentia tam occultæ, quam manifestæ oriuntur à varia corporeæ substantiæ figura, & à situs differentiis à Galeno sine controuersia colligitur, qui omnes potentias, & impotentias tamquam ad primas causas reduxit ad figuram, situm, numerum, magnitudinem, & temperaturas: hominem rectè sanum vocat, dum in iis optimè constitutus est: illum vocabit cursorem optimam, qui probè se habebit in partium corporis figura, numero, situ, & magnitudine: qui pedem altero longiorem sortitur, quamuis in cæteris conditionibus vnicè se gerat, eum non vocabit cursorem, neque dicet, illum habere currendi potentiam: ratio est, quia ex Galeno potentia dissimilariū consistunt in bona, & proportionata figura, magnitudine, numero, & positione: impotentia in mala, & improportionata: vocantur ab illo qualitates, vel potentia manifestæ, quando aliqua, & pauca, eaq; cognoscibiles in earum productionem conspirant: occultæ, dum innumerabiles: si alicuius pes intorqueatur, & vacillet, oritur impotentia, quæ dicitur manifesta; etenim externus situs omnibus conspicuus vitiatur. Si verò figuræ internæ, numeri, & positiones multarum particularum ita variantur, vt causæ ignorentur, dicitur tunc occulta, quæ tamen ex Galeni sententia non prodit à substantia; sed à qualitatibus totius substantiæ.

Ad eundem modum potentia similariū corporum possunt fieri occultæ, tum quia ab harmonia quatuor qualitarum possunt enasci gradus adeo particulares, vt nobis sint incognoscibiles; tum quia similariū potentia ex infinitis alterationibus elementorum, & non ex paucis fit: tota hæc doctrina est Galeni lib. de const. ar. med. cap. 8. & 4. sim. cap. 15. dum dicit, occultas fieri ex infinitis alterationibus; magis enim & minus rarum, vel densum; agis & minus calidum, vel humidum; graue, aut leue innumerabiles, & incognoscibiles virtutes efficere possunt; omnes tamen quotquot sunt potentia reducuntur à Galeno ad hæc capita, ad temperaturas similariū, ad magnitudinem, numerum, situm, & figuram dissimilariū. Logici vero, qui res abiunctas à determinatis subiectis considerant, alio modo diuidunt; dicunt enim potentias alias pendere à tertia specie qualitaris, à passionibus nimirum, & alias à quarta, scilicet à figura: neque dixerunt, alias qualitates à figura, alias à situ, numero, & magnitudine; sed à figura tantum; quoniam omnia quatuor genera potentiarum dissimilariū ad vnicam figuram à logicis reduci possunt: magnitudo namque est figura, numerus partium est figura, situs, vt est luxatio, & alia id genus ad figuram vitiata, tamquam ad commune genus subalternum reducuntur, dicimus subalternum, quia figura, & passiones omnes sicuti

*Cur logici dicunt potentias solum à tertia, & quarta specie qualitaris oriri.*

caliditas, & frigiditas, grauitas, & leuitas, & quæ sequuntur ( si altioribus principiis, & Aristoteli 8. phy. text. 55. est credendum) pendent à raritate, & densitate; raritas, & densitas à situ, situs denique, tamquam à subiecto omnium communissimo, à trina dimensione, quæ est figurarum omnium origo; vnde omnes occultæ, & manifestæ qualitates dependent: occultæ à Galeno vocantur totius substantiæ, quia ille gradus vltimus non pendet ab vnica qualitate illius, sed ab omnibus, videlicet à tali situ, raritate, densitate partium, à tali numero, figura, & magnitudine, vel à tali calore, frigiditate, siccitate, & humiditate, vt nūc à determinata qualitas illius substantiæ sit, quæ non conspiret in huius occultæ potentiæ productionem: redditur quoque occulta, & abdita, quia quælibet qualitas, sit caliditas, frigiditas, raritas, & densitas potest esse actionis causa sexcentis modis, scilicet calida, vel rara, vt quatuor, vt octo, vt cētum, & vt mille; quilibet enim gradus harum qualitarum potest nouam potentiam incognoscibilem, si alij totius illius substantiæ qualitatibus misceatur, efficere. Hinc merito à Medicis est decisum, quod si à Theriaca oppij, vel trociscorum viperinorum; vel aliorum componentium minima portio dematur, eius potentia eadem seruari non possit; & quæ dicitur de antidoto de omnibus mistis ratio valebit.

*Caliditas,  
vel alia qua-  
litas sexcen-  
tis modis va-  
riat actionē*

*Experimentis confirmatur, quod dari possint potentia, seu virtutes operatrices, quæ non oriuntur à quatuor illis vocatis primis qualitatibus.*

#### C A P. X.

**H**ACTENVS videtur esse probatum ratione, auctoritate, & experimentis, quod qualitates occultæ non sint substantiæ operantes, sed accidentia pertinentia ad categoriam qualitatis. Nunc sequitur, vt pluribus experimentis ostendamus, quod non omnes qualitates reconditæ habeant originem à calido, frigido, humido, & sicco, sed ab aliis innumerabilibus: quas omnes tamen ad differentias superius relatas reducere possumus. Primum experimentum, quod est omnibus notissimum, est de magnete, etenim si magnes attraheret ferrum virtute illarum quatuor qualitarum, id potius fieret ratione caloris, quàm aliarum, quare sequeretur, quod aromata, & alia calidiora citius ferrum attraherent, quod reluctatur experientiæ. Præterea afferantur duo experimenta, ex quibus cognoscemus statim fieri nouas qualitates ex sola iuxta positione sine interuentu quatuor qualitarum: alterum hoc est: accipias vitrum rubrum, illudque iuxta ponas cæruleo vitro, protinus videbis ex vtrisque vnitis enasci colorem violaceum: alterū experimentum est, vnias vitrum cæruleum luteo, statim confurget viridis color: quis esset adeo stupidus, vt crederet has qualitates de repente factas fieri opificio calidi, frigidi, humidī, & sicci? patet ergo fieri posse

*Primum experimentum ostendens à quatuor qualitatibus non omnes occultas fieri.*



posse plures nouas qualitates sine alteratione illarum quatuor, quoniam primæ non possunt facere sequentes, nisi alterando, & alteratio non fit ictu oculi, sed aliquo temporis cursu. Præterea afferantur alia, si doronici virtute caloris, vel frigoris canes è viuīs eximerent, hominibus non afferrent suppetias: si salina suo calore scorpiones occideret, ocyus ineracum, quod calidius est, illos opprimeret: si putredo insignis suo calore vinceret homines, quomodo aleret lumbricos. Si oppij drachma ob frigus occidit, cur glaciæ vncia, quæ est frigidior, statim non exterminat natiuum robur? Præterea ex mistura variarum rerum persæpè sine alteratione quatuor qualitatum illico, & eodè momento temporis nouæ oriuntur qualitates, quæ indicabunt quoque ab aliis, & nullo modo à primis pendere: afferantur experimenta, accipiat aqua, in qua ebullierint gallæ, hanc claram, & perspicuam videbis; accipiat alia in qua ebullierit calcanthum, quæ clara quoque erit, vnam in alteram infundes, illico sine vlla quatuor qualitatum alteratione maxima cum admiratione videbis, vtramque nigerrimum atramenti colorem recipere: nemo viso hoc experimento audebit dicere ab alteratione quatuor qualitatum colorem prodire, cum aqua fiat nigerrima ferè in instanti: illud quod tale sit à calido, vel frigido non ictu oculi, sed temporis spacio succedit: addatur aliud experimentum, inuenias aquam rosaceam plumbeo alembico stillatam perspicuam & clarissimam, & huic commisceas aquam communem purissimam, videbis confestim in iis perspicuis aquis simul commistis enasci lacteum colorem, cuius experimenti vsu cognoscitur quoque an rosacea aqua sit plumbeo alembico stillata, lacteus enim color à cerusa, quæ à plumbo producit, ob misturam aquæ communis manifestatur nulla facta alteratione in quatuor qualitatribus: aliud est, dum similiter lacteus suboritur color ex mistura aceti, & tartari stillati: Vndecimum experimentum eundem lacteum colorem enasci videmus, dum miscetur aqua anisorum stillata, quæ perspicua est, aquæ fontis purissimæ: quis visis iis experimentis auderet dicere, has qualitates nouas fieri à calido, vel frigido? quod ex paucis his experimentis colligimus, ex sexcentis aliis colligemus. Verum ne prætermittam quandam qualitatem felis, quæ nullo modo ad illas quatuor primas reduci possit, audias quid de fele vidimus in Vngaria: erat Nobilis vir Italus, qui dum erat prope felem, licet eum non videret, statim in animi deliquium incidebat, & nisi aliquis ei præsto fuisset felem fugando suffocatus fuisset: nemo vnquam potuit causam huius antipathie referre in quatuor qualitates; sed potius, si vnicam nominare velimus, in densitatem, & angustiam; ille enim qui fele præsentem suffocari incipiebat, erat angusti pectoris, astmaticus erat propensus: in fele vero tria sunt deleteria quæ obnoxios dispneæ cum primis lædunt, cerebrum, exspiratio, & pilli; non erit itaque mirum, si ex iis noua qualitas densans gignatur, & per halitum felis alicui communicari possit. Idem crassus halitus est in virosi boletis, & oppio; quare propius ad veritatis apicem accedemus, si dixerimus cum Galeno lib. de const. ar. med. cap. 8.

Quartum.

Quintum.

Sextum.

Septimum.

Octauum.

Nonum.

Decimum.

Vndecimum.

Duodecimum.

Vi quidam potentia felis in liposibus incidat.

quod qualitates occultæ fiant ex infinita varietate, & alteratione aliarum, hac tamen serie, vt initia omnium passionum, vt dicit Aristoteles 8. phy. text. 55. sint raritas, & densitas; magis vel minus rarum, ostendimus superius, magis & minus disponere materiam ad generationem ignis, & ratum esse posse prius calido: vitrum rubrum iuxta positum cæruleo colorem facere violaceum densando: eademque ratione luteum vitrum vnitum cæruleo efficere viridem: oppium, & bolleti viridissimi homines ad necem perducunt non frigoris impetu, sed densando, immobilesque reddendo vitales spiritus: partes enim vitæ donatæ, cū egēant perenni motione, vt natua caliditas seruetur, densatæ ab iis, & motu destitutæ pereant, oportet. Demum halitus felis in aliqua spiritalium vasorum angustia tantum poterat densare, vt vir ille in suffocationem caderet: plurimæ ergo qualitates nouæ fieri possunt, exque quo ad determinatos gradus sæpissimè incognoscibiles. Quis posset diuinare specificam & propriam differentiam positionum internarum partium, vnde atramentum enascitur ob mitionem aquæ gallarum, & calcanthi seorsum clarissimæ, & splendidissimæ? possumus tamen hanc, & quamuis aliam occultam causam referre ad genera, de quibus superius egimus.

*Ostenditur  
horologij ex-  
plo quatuor  
qualitates nō  
esse omnium  
prædictas.*

Demum asserri potest exemplum omnium euidentissimum, estque potentia motrix horologij: nemo sanæ mentis dicet horologij potentiam à temperatura prodire, sed à numero, situ, & figura rotarum, orbiculorum, & spiræ chalibæ; impotentiam vero ab iis vitiatas; quare, si in artefactis dentur potentie motrices non pendentes à temperatura, cur plurimi sunt adeo audaces, vt ignorantie crimen illis inurant, qui à situ, & à cæteris differentiis positionū sine vlla alteratione quatuor qualitatibus putant plurimas virtutes prodire posse eademque de causa nimis audax fuit Fernelius, dum omnes motrices potentias animatorum retulit in substantiam: habet enim hæc verba lib. de abditis rerum causis: Stupidi hominis est credere animalis motum fieri à quatuor qualitatibus, cum re vera omnis potentia mouendi debeat referri ad substantiam. Quo pacto vir lepidissime ad substantiam vis referre, si humanus artifex varias dat virtutes motrices metallo mutando figuram, situm, & numerum rotarum: quanto facilius alma parens natura, quæ rotas, & (vt ita dicam) spiras viuentes diuini artiificio efficere potest, potètiâ motrices in iis collocabit; obiciat tibi ante oculos innumerabilia instrumenta, quibus perexigui alicuius animalis pes componitur, sicut culicis, vel formicæ, cognosces in perexiguo, & ferè inuisibili pede esse necessarium, vt vasa, quæ ferunt nutritionē, quæ vitam, quæ motum, & sensum sint varia, & omnino diuersa, quia diuersum habent usum, & cum per exigua particula moueatur secundum omnes differentias positionum, scilicet ante, retro, sursum, deorsum, dextrorsum, & sinistrorsum pro vsuum diuersitate totidem requiri debeant instrumenta ad omnes motiones obeundas; ab illo enim instrumento, à quo mouetur culicis pes ante, non mouebitur retro; quare, si natura tot instrumenta tam promptè parat in omnibus rebus, iisque

mini-



minimis; cur ad simplissimam substantiam audent omnes motrices potentias referre? Quid prohibet, quin nos quoque hac horologii similitudine dicamus, potentiam mouendi non esse substantiam simplicissimam? sed potentiam ortam à numero, situ, & figura corporeæ substantiæ; & in iis esse primum mobile, quod cætera moueat ad spiræ chalibæ similitudinem. Aristoteles per analogiam artefactorum inuenit primam materiam; cur nō eius imitatione in tanta consilij angustia non poterimus per eandem analogiam de potentiis abditis philosophari?

Audias quomodo Hieronymus Cardanus, qui occulta, & recondita in substantiam operantem referebat, semel hallucinatur: refert primo libro commentariorum quadripartiti, se lapillum vidisse, qui ob eius excellentiam aderat in potestate Pontificis Clementis Septimi, in cuius superficie erat neuus, vel macula, quæ in orbem tractu 24. horarum ad instar solis mouebatur; videns Cardanus hanc diuinam lapilli proprietatem referri non posse ad primas, vel secundas vocatas qualitates, eam statim in cathalogo reconditarum à substantia prodeuntium recensuit: vel maximè fuit deceptus, quia maculæ circularis motus (sicuti deinde auditum fuit) à situ, numero, & figuris internis prodierat; quoniam erat lapillus in orbem dispositus, & tali artificio accommodatus, vt pars maculata mobilis videretur continua, lapillusque poterat aperiri, & in eius cauitate erat spira chalibæ, cuius virtute macula siue neuus 24. horarum cursu moueretur: vt primum causa huius virtutis lapilli reddita est omnibus nota, nemo inde sustinebat illam motricem virtutem à substantia simplicissima, & occulta prodire. Cardanus itaque & Fernelius in hoc præcipuè sunt decepti, quia dum videbant, motrices potentias non posse referri ad quatuor vocatas primas, putabant ad aliud non posse referri quam ad substantiam: quamuis (vt ostendimus) commodè ad numerum, situm, figuram, & magnitudinem partium possint quoque reduci.

*vt hallucinatur Cardanus loquens de mirabili lapillo Papa Clementis Septimi.*

*Experimentis ostenditur, quod qui putant, qualitates occultas esse substantias operantes, faciles sint ad credendum vanissima.*

C A P. XI.

**Q**UO putant occultas potentias esse substantias operantes, sunt quoque faciles ad credendum infinitas alias vanitates; substantia enim cum non subiaceat sensibus nostris, sitque incognoscibilis; posito ab illis, quod operetur, malunt eam vocare opificem occultarum qualitarum, quam fareri, se abditarum rerum principia nescire; Albertus Magnus, Plinius, & plerique plures, qui de naturalibus virtutibus loquuntur, quique credere videntur potentias operatrices esse substantias, veris propterea sexcentas opiniones falsas immiscent.

Quod ita res se habeat, præstat aliquas istorum opiniones aperte falsas referre, quia exemplorum luce fabulosam opinionem libentius reiiciamus: referunt piscem echenidem qualitate substantifica posse impedire nauigij cursum; quod principiis philosophiæ, & experientiæ reluctatur; faciles sunt, ut in has ineptias incidant, quia cum substantiam nunquam viderint, vel alio modo cognouerint, posito ab ipsis, quod operetur, non solum ei videbitur à ratione alienum, quod pisciculi substantia posset nauigij cursum sistere, verum etiam planetas, & primum mobile: quis est ille, qui poterit virtutem incognoscibilem coarctare, & limitare? qui verò sustinebit, potentias operatrices esse qualitates accidentales, quamuis retusum haberet ingenium, nullo modo credere poterit, quod echenides pisciculus habeat illam potentiam. Etenim, si viderit, quod neque calefaciendo, vel rarefaciendo, vel densando, vel aliis enarratis potentiis id efficere possit; statim hac sensata philosophia lubens exploder hanc de echenide fabellam; res hoc modo ab aliis recipitur, ubi pisciculus degere solet, aqua in orbem obuoluitur, dum vero navis hanc aquæ vertiginem pertransit (licet secundis ventris teneat cursum) quiescere cogitur, & tunc ob aquam scaturientem ab imo pisciculus quoque supernè fertur; qui vident Echenidem, si de illis sunt, qui in substantiam referunt effectus naturales, qualibet philosophia seposita putant pisciculum substantifica sua virtute sistere navim; ecce, quomodo potentiarum innouatores sint sæpè in philosophando desides, & ociosi: quomodo omnia omnibus credant: quomodo in monstruosas incidant sententias; & quomodo historias falsas, & mendaces non possint non admittere.

*Cur nauigij  
cursum ab  
echenide im-  
pediatur.*

*Multa fabu-  
losa de lapi-  
dibus rogiun-  
tur.*

Sed aliqua de lapidibus afferantur, quæ omnino falsa, & impossibilia sunt: Albertus, & alij plurimi tenent Lapidem Aquilæ proprietate occulta conciliare amorem, augere diuitias, & partum (dum fertur) facilitare. Dicunt præterea Lapidem Calcedonium collo appensum tollere illusiones phantasticas à melancholia ortas. Lapidem verò Celidonium, qui in ventre hirundinis inuenitur, sub sinistra asella gestatum sanare epilepsiam. Albertus habet Lapidem Crisolatum stultitiam pellere, & sapientiam augere: quid stolidius, & ineptius de iis, quæ quotidie experiuntur, dici potest? quis inanitates has non reiiceret? O nos felices! si lapis, qui pelleret stultitiam, & sapientiam augeret, inueniretur. Qui verò arbitrantur operandi potentias à qualitatibus accidentatibus prodire, nunquam defenderet illas fabellas; quia conantur fateri, potentias operatrices non operari sine contactu, & sine resistantia passi, horum quisque illico negabit, Lapidem Aquilæ facilitare paruum, nisi ipsum deglutiatur, nisi virtutem habeat aperiendi, rarefaciendi, vel calefaciendi. Neque admitteret Celidonium Lapidem sub asella gestatum epilepsiam anreuertere; quoniam si epilepsia sit in meatibus cerebri, nisi eius virtus intimum cerebri petat, & aperiat obstructis vias, nihil opis adferet. Neque admitteret erratum illud vulgatilium, quod scilicet per Lapidem Iaspidem collo appensum hæmorrhagia tollatur; quia ante oculos sibi statim obiiiceret, fluxionis



xionis causas à Galeno traditas esse vel copiam, vel malam qualitatem irritantem, vel vasorum imbecillitates, diceretque primo lapidem nō tangentem vasa, vel sanguinem non posse eius copiam coërcere, vel irritantes qualitates demulcere, vel robur vllum adiungere venis; quia omnis actio fit per cōtractum, & si agens vicerit, id eueniet, quia habebit maiores vires, & non alio modo. Neque demum admitteret lāspidem cohibere posse omnes fluxiones sanguineas; hæmorrhagia orta ab imbecillitate vasorum indicat remedium astringens, à copia indicat aperiens: quo pacto lāspis contraria efficiet?

Amplius, quis admitteret lapidem Iudaicum in brachio gestatum expellere renalem calculum? admitti fortasse potest huius lapidis usus, quem Dioscorides approbat, quod videlicet puluerizatus subtilissimè haustusque è renibus calculos pellat, sed gestatus nequaquam: eodem modo non esset fortasse neganda lapidis lazuli virtus à Mesue relata, quod videlicet puluerizatus faciat, vt pilli, quando corroduntur ab acutis humoribus, in palpebris enascantur; quoniam pulvis inspersus deterget, & malam qualitatem palpebrarum auferre posset, vnde possent pilli sine difficultate nasci.

*Lapidem Iudaicum brachio appensum non prodeste nephriticis.*

Præterea dicunt, cristallum in subtilissimum pollinem redactum melle commistum posse replere vbera lacte: hoc videtur à principiis medicinæ, & philosophiæ alienum: nisi fortasse mel ex se id præstaret, quippe in sanguinem potest conuerti; ea enim, quæ toto genere differunt inter se, inuicem non agunt, & patiuntur: nihil potest conuerti in lac, quod in sanguinem prius non conuertatur.

Dioscorides refert plurimas herbarum proprietates occultas, sed fabulosas haustas è circulis vulgarium hominum, quæ experientiæ, & principiis philosophiæ reluctantur: lib. I. cap. de rhamo dicit, fama est, ramos huius valuis fenestrisve impositos beneficia depellere: nec tamen credere videtur Dioscorides, quod rami huius herbæ fenestris, vel foribus admodum depellant beneficia, cum apertè dicat, esse famam, quasi diceret, non esse opinionem sapientum, sed communem, id est, mulierum, vel rudiorum hominum, qui faciles sunt, vt omnia omnibus credant: eodem libro cap. de vitice habet hæc: virgam viticis, qui manu teneat, dum iter facit, negatur, intertriginem sentiri, quis fidem his nugis adhiberet, quod in itinere æquitando diuturno cursu herba manugestata non permetteret coxæ per confricationem lædi, & aliquando excoriari? qua ratione, quo contactu herba manugestata coxæ stuebitur?

*Aliqua fabulosa relata à Dioscoride notantur. De Rhamo.*

*De vitice.*

Amplius libr. 2. cap. 68. refert araneum vtrisque temporibus, aut fronti alligatum curare tertianam febrem: non desunt *αρεαίοι*, & ex-cordes homines, qui iis tritis credunt, illisque pro curandis febribus vtuntur: vtinam tertianæ febres, quæ aliquando phlebotomia, & medicinis non possunt curari, aranei applicatione curarentur; atque vtinam saltem alter araneus, qui candidam, tenuem, densamque telam orditur, alligatus in Loculo (vt dicit Dioscorides) lacertoque apensus quartanam tolleret: capite 69. eiusdem libri refert, quod lacertæ

*De capite lacerta.*

caput intritum aculeos, & omnia corpori infixā extrahit, & varos, & formicantes verucas, & pensiles, quas crochordonas vocant, tollit: vix igne tolli possunt verucæ ob altas earum radices, & tanto minus læcertæ caput id præstare poterit. Quorsum ergo Dioscorides hæc insulsißima occulta aliis innumerabilibus miris virtutibus prædictis immiscuerit, fateor me latere, nisi dicamus, hæc attulisse, quia forsitan erant Arii ingenio accommodata, vel, & melius, vt Ario illorum medicorum simplicitatem significaret.

*De vermiculis dipsaci.*

Lib. 3. de dipsaco loquens, dicit vermiculos, qui in dipsaco inveniuntur (hæc planta dicitur quoque labrum veneris: estque illa, in qua ros, vel imber asseruatur) si in folliculo alligentur, & collo aut brachio appendantur, habere proprietatem pellendi quartanam. Pari modo capite de spina alba dicit, quod eius semen gestatum serpentes abigat: capite vero 104. eiusdem libri de alyso, quod hæc herba foribus appensa sit salutaris, & hominibus, atque animalibus fascini amuletum, & quod purpureo linteo circumligata sua proprietate pecudum morbos abigat: quæ adeo vana sunt, vt vix credam inueniri mulieres simplices, & ~~capituli~~ *τεταται*, quæ hætenus has ineptias non animaduertunt.

*De attractilide.*

De attractilide loquens refert, quod isti à scorpionibus, quamdiu herba hæc manu teneant, nullum experiantur dolorem; herba tamen deposita dolorem recrudescere: quæ omnino falsa sunt, quia experientia non respondent; nisi illis pro sit, qui ita firmiter credunt, vt fides alio animum auerrat, & dolor inde sedetur, hoc quo est anodynum auertens animum; hocque modo circulatorum dentium dolores animu auertendo verbis, præstigiis, seu delusionibus mitigant, & aliquando accidit, vt ex toto cessent dolores; quod, si propterea fieret, non solum attractilis, sed omnis herba dolorem ictus scorpionis sedaret.

*De conyza.*

Super de proprietate conyzae parua capite 136. huius libri dicit, quod huius herbae substractu abigi possint culices, & pulices necari: vñ nobis, si æstate, quando hæc animalia vellicant, & sua multitudine nos perturbant, aliud non esset nobis remedio; hætenus culices, & pulices nos totos comedissent, adhæc potro capite 145. refert, quod si manu teneatur radix satyrii erichronij venerem exciter: dum manu tenet satyrium, noui hac virtute omnino carere: ego sanè huius radices satyrii proprietatem nescirem defendere, nisi sub nomine huius radices intelligeremus mentam, quippe radices imaginem imitari videretur.

*De satyrio erichronio.*

In 4. libro plures refert occultas proprietates omnino falsas; verum paucas proponemus, vt lectores videant à celeberrimis quoque Auctoribus sæpè ineptias referri, & vera falsis commisceri: de pentaphyllo dicit, quod dum incenditur, ad expiationem peccatorum, & ad castimonias iuuat: adhæc capite de phænice dicit, quod hæc herba adligata in puniceo vello sanguinem supprimat: & capite de herba sacra, quam sideritim vocant, dicit quod, si eius decoctione spargatur triclinium, lætiores conuietus fieri si addidisset, lætiores fieri conuiuias triclinio maluatico vino referto, sine controuersia omnes relationi Dioscoridis adhærescerent, capite 79. eiusdem libri dicit, quod radix man-

*De pentaphyllo*

*De phænice.*

*De herba sacra.*

*dra-*



dragoræ decocta emollire possit dentem Elephantis ad accipiendam quamcunque formam: hæc sunt verba, radix mandragoræ ebur emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit, & ad accipiendam quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat: quod est ridiculum, quia nec senis horis, nec senis annis ebur emolliret: nisi itaque Dioscorides ex aliorum sententia hæc proponeret, inter veteres scriptores illo ineptior, & solidior non inueniretur; ipse in epistola ad Arium fateatur, se militem egisse, eaque collegisse, quæ illis temporibus erant in opinionem hominum: ideo non est reprehensione dignus. Nos hac de causa has ineptias retulimus, ut Lector sibi ante oculos obiiciat, & videat, quomodo, qui facile credunt occultis, in vanissima sæpe incidat. Insuper capite 121. dicit, quod aster Atticus, seu inguinalis herba dolorem inguinum leuet, si aridus eius flos sinistra manu dolentis decerpatur, & inguinibus adligetur, quo nihil dici potest magis à philosophia alienum, decerpatur enim dextra, vel sinistra manu virtus floris semper eadem seruabitur. Capite vero 131. de phyreumate, & in sequenti capite de leontopodio dicit, quod hæc duæ herbæ conueniant ad amatoria: postremo de mercuriali herba omnibus nota dicit, si fœminæ à purgatione lunari trita folia mercurialis masculi genitalibus admo-  
ueantur, mares inde gigni, & fœminas, si mercurialis fuerit fœmina: esset sanè apud Reges, Principes, & Nobiles viros, qui masculos habendi desiderio flagrant remedium in re hac difficili cælitus missum: sed cum à Dioscoridis temporibus adhæc vsque tempora herba hæc pro hoc obeundo munere in nullo sit pretio, est sine alia experientia in fabularum catalogo collocanda. Idem dicit Dioscorides libro 3. cap. 142. de testiculo canis, habetque hæc, qui edent testiculum canis mares, mares generabit, qui fœminam, alterum sexum.

*De mandragoræ.*

*De inguinali herba.*

*De phyreumate, & leontopodio.*

*De mercuriali,*

*De testiculo canis.*

Denique in 5. libro de lapidibus plurima occulta refert, quæ omnino rationi, & experientiæ reluctantur: aliqua proponantur: de lapide selenite, quod adligatus arboribus reddat eos frugiferos: de Iaspide, quod femoribus appensus partum accelleret: de Ophite, quod collo appensus auxilietur lethargo; plures alias refert proprietates occultas lapidum ex opinione tamen (ut diximus) aliorum, quæ mouet risum, haud secus, quàm si eas ex ore ineptissimi circulatoris audiremus; alia quoque plura relata sunt à Dioscoride, quæ neque rationi, neque experientiæ respondent: attulimus hæc, ut lectoriis excitus videat illorum errata, qui putarunt potentias operatrices esse substantias.

*De lapide selenite.*

*De iaspide.*

*De ophite.*

Plurimi alij fuerunt, qui, ut admiranda de occultis herbarum proprietatibus dicerent, magis adhuc aliena à ratione dixerunt: afferamus solum eas, quæ ab Andrea Matthæolo in limine sui Dioscoridis proponuntur, dum loquitur de laudibus plantarum, refert inueniri herbam à Magis vocatam Balim, quæ mortuis animantibus vitam potest restituere; comprobatur auctoritate Xanthi antiquissimi Auctoris, qui 1. libro suarum historiarum affirmauerit, Draconem virtute huius herbæ resurrexisse: & Thiloni similiter à Dracone occiso eadem, quæ Balim dicitur, vitam restitutam fuisse: addit Matthæolus Iubam Mau-

*Fabulosa de herbis ab Andrea Matthæolo relata.*

ritania Regem scripſiſſe in Arabia cuiusdam herbæ auxilio vitæ mortuo homini datâ eſſe: quid ſtolidius, & magis philoſophiæ repugnans dici poteſt? Præterea ex Theophrasto, & Democrito refert Mattheolus Æthiopidem herbam clauſis foribus applicatam, eas ſtatim aperire; niſi bipenis vehementius fores aperiret Æthiopide, omnes deſpicerent eius vſum: refert quoque, Democritum dicere in India naſci Achemenidem herbam, quæ dum comeditur ab iis, qui tormentis lacerantur, omnia ſubito fateantur: ſimiliter Plinius refert Achemenidem aliam, quæ ſi in hoſtium acies traiciatur, fugentur. Hic eſt fructus illorum, qui putant ſubſtantiam operari. Qui vero ſciunt omnia agentia habere contrarium, ſuſcipere magis, & minus: agere, & pati per cōtactum, non poſſunt in tam monſtruoſas ſententias incidere.

*Qui ſint Empirici omniū ſtolidiſſimi.*

*Vt Marcus Cato cantionem luxationis curare.*

Postremo ex omnibus Empiricis ille eſt ineptior, & ſtolidior, qui putat poſſe verbis, breuiculisque, ſeu codicillis caraſteribus refertis, collo appenſis morbos curari. Quidam ſtupidi, & excordes Empirici putant in hunc modum quartanam, cryſipelas, epilepſiam, & plures alias ægri tudines depelli poſſe; ſed hoc eſt deterrimum, & miſerabile, quod licet quotidie has vanitates experiantur, non reſiſcant: mirandum præterea eſt, quod huius generis fabellæ legantur quoque apud veteres ſcriptores; etenim Q. Serenus pro curanda tertiana, vel quartana caracteres, & nomina ridicula proponit: ſimiliter Marcus Cato de re ruſtica pro curatione luxationis, & fractura particula 160. docet hanc cantionem: hæc ſunt eius verba, luxum ſi quod eſt, vt excantes,  
 ” hac cantione ſanum fiet: motas danata daries dardaries eſt araries;  
 ” docet deinde paulo inferius aliam cantionem pro curatione eiſdem  
 ” luxationis, hæc eſt: haut haut haut iſta piſta liſta damiano damauſtra: addit, vel hoc modo, haut, haut, haut iſtagis, turſis, ardānabon damaiſtra: puto, ſi quis caneret daries dardaries cum aliis ſequentibus verbis annis ſexcentis, quod ob cantum luxationes, vel fracturæ non curarentur: plura alia in auctoſibus, qui adhibent fidem occultis inueniuntur, quæ cum principiis philoſophiæ, medicinæ, & experienciæ aduerſentur, ſatius erit, vt de iſtis non amplius loquamur.

*Oſtenditur, venenatos non cognoſci ex veneni definitione, ſed ex ſyndrome ſignorum communium à ſex fontibus deſumpta.*

## CAPVT XII.

**D**IXIMVS in libri veſtibulo præter qualitates occultas tria alia nobis tota ſua ſubſtantia aduerſari, quæ ſunt venenum, putredo, & pus; ea ramen de cauſa eius ſubſtantia peccare dicitur, quoniam nihil eſt in iis, quod non ſit diſſimile, & contrarium partibus ſimilaribus, & diſſimilaribus corporis humani: eorum enim ſitus; numerus, figura, & temperatura ab humana conditione adeo diſtat, vt fiant cōtraria; contrarium enim eſt, quod in eodem genere maximè diſtat: hiſque rationibus



nibus dicemus, dironicos esse canis venenum; quia eis in situ. numero, magnitudine, figura, & temperatura sunt vel maximè dissimiles: hominibus vero, quia non sunt adeo dissimiles, erunt salubres: eadem ratione putredines vitam hominibus auferunt, vermes ea vescuntur, & ex ipsa efflorescunt; lumbricis aloes est deleterium, hominibus familiaris medicina; sturnis napellus est nutrimentum suauissimum. hominibus ditum, & truce venereum: nullum igitur erit venenum absolutè, sed solum in comparationem, & respectum, quatenus videlicet sit, vel non sit oppositum propositis qualitatibus: error illorum mihi videtur inexcusabilis, qui putant venenum esse quid absolutum, esseque substantiam aduersantem. O nos felices! si venenum, lues gallica, rabies, napellus, & alia id genus alio modo, quàm substantia sua nobis non officerent, quia cum substantia æquè omnia respiciat, & nunquam substantiæ, vel accidentibus contrarietur, non læderemur ab iis, & longè feliciori sorte frueremur.

Cognitis principiis quibus venena nobis aduersantur; modo duo sunt de venenis perquirenda, scilicet definitio veneni, & modus cognoscendi venenatos. Quo ad definitionem attinet; Hieronymus Capriaceus percelebris vir hanc tradit: venenum est qualitas confestim corruptiua cordis hominis; hæc definitio est adeo obscura, vt longè obscurior, & ignotior definito videatur; nulla enim est in hac definitione differentia, quæ nos doceat, quando corrumpitur cor à veneno; Aristoteles 4. phy. de definitionis beneficio loquens dicit, qui cognosceret quid de loco, cognosceret quoque consequentia; si igitur ea definitio nos non docuerit, quando aliquis veneno erit iugulatus, eam despiciemus. Insuper quot sunt, qui improviso expirant animam, & vitam finiunt ab aliis causis, quàm à veneno? quo pacto ergo cognita illa definitione distinguemus; an improvisa mors sit veneno, vel aliis causis secuta? Criton, & Phreneticus (vt refert Hippocrates) de repente mortè obeunt, quia postmodum ab incepto sæuissimo morbo pereunt, attamen neuter illorum veneno moritur. Præterea venena in minima quantitate subito non possunt corrumpere, vt in paullo maiori. Sublimatum arsenicum in scrupuli quantitate tractu 12. horarum ad exitium perducit; grana duo, vel tria spacio aliquando 40. dierum id efficient; non conueniet ergo veneno, vt venenum est hoc attributum, vt confestim cor corrumpat. Adhæc sæpè porriguntur virosa robustis hominibus, quorum cor non possunt corrumpere. Nec mihi occurrant, quod robusti hominis cor aliquando non confestim corrumpatur à veneno, quia virtus resistat, vel adsint impedimenta, cur non penetret ad cor, illudque corrumpat. Quia nos quoque illis sic obiciemus; nisi virtus resisteret, essentque impedimenta, humores quoque facientes febrem statim corrumpere cor, quare per qualiter confestim corruptiuam cordis non exprimimus veneni naturam. Denique cito occidere, & corrumpere cor conuenit aliis, vt pestilentiæ, apoplexiæ, & aliis; quare ex hoc signo cōmuni nihil colligemus. Quinimo incidemus semper in hunc vitiosum paralogismum; illud est vene-

*Relicitur  
veneni defi-  
nitio à Capri-  
aceo tradi-  
ta.*

num, quod cito corrumpit cor: hoc cito corrumpit cor, ergo est venenum; modus arguendi est in secunda figura ex duabus affirmatiuis vitiosus, & irreducibilis ad primam; quoniam maior non potest conuerteri, nisi fiat particularis; quod si fieret, in alium paralogismum incideremus, quia in prima figura ex maiori particulari nil sequitur, & est falsus syllogismus.

*Quod color  
liuidus vel  
niger non in-  
dices vene-  
natos.*

Sunt, qui putant nigrum, seu liuidum colorem esse signum proprium, & tamquam caracterem venenatorum; quorum sententia non videtur veritati respondere, quia aliquando ob ægitudines insignes aliquæ corporis partes fiunt nigrae, vel liuidæ: legamus historiam adulescentis decumbentis in foro mendacium, vbi Hippocrates dicit, in illo ægrotante extrema fuisse liuida. Galenus vero ibidem in commento dicit, extrema liuida ob duplicem causam fieri posse, vel ob visceris alicuius inflammationem; vel quia emoritur calidum nativum: quare cum calidum nativum ob innumerabiles causas emoueri possit; uor non indi cabit venenum.

*Cur commu-  
nis definitio  
veneni tradi  
non possit.*

Præstat igitur, ut signorum syndromem sufficientissimam perquiramus, quæ nos doceat cognoscere, quando aliquis veneno est ingulatus: etenim sicuti Aristoteles 2. post. dixit, nos non posse de æqui uoco genere vnicam habere definitionem, & demonstrationem, dat exemplum de longæuitate auium, & terrestrium animalium, dicit terrestria animalia esse longæua, quia carent bile; aues vero esse longæuas non ob hanc, sed ob alias causas: simili modo venena mineralia, & plantarum, & animalium occidunt ob varias, & diuersas causas, quare varix debent esse definitiones, & varia signa.

*Qua signorum  
syndrome co-  
gnoscantur  
venenati.*

Syndrome signorum communium indicantium venenatos colligitur à sex fontibus, quorum aliqui consistunt in iis, quæ necessario antecedunt, aliqui in iis, quæ necessario consequuntur. Primus fons illorum, quæ necessario antecedunt continet causas externas, sicuti si quis versaretur cum inimicis, vel cum veneficis, ex eius morte repentina cum liuore facile colligi posset illum fuisse venenatum. Secundus fons continet signa indicantia dispositiones patientis; Galenus 6. de loc. aff. c. 5. de hac appositè nos admonet & docet, cum homo sua natura probis humoribus abundans, ac sanorum more educatus derepente moritur, id veneno lethali esse secutum: diligenter sanè præteritos habitus, & dispositiones illorum, qui derepente moriuntur oportet expendere, quoniam si aliquis fuerit dispositus, & propensus apoplexiæ, & derepente moriatur, nulla suspicio veneni habenda erit, quâuis liuidus esset: similiter, si supra modum pinguis esset, subita mors ei causæ esset adscribenda: si haberet angustiam in pectore, ut de Antipatro Medico relatum est à Galeno, idem dici deberet; angustiam enim illam ex interciso pulsu multo ante prænouit Galenus, & multo ante præuidit exitium repentinum Antipatri: ecce, quod ex cognitione causarum externarum, & dispositionum patientis aliquando causam repentini exitij penetramus: dicimus aliquando, quia potest accidere, ut parte aliqua nostri corporis humores præui adeo occultè, sensimque accu-



accumulentur, vt nullum vnquam sensum sui exhibentes, hominem, qui videtur vnde quaque sanus in repentinum exitum trahant: quare non sat est patientem cum veneficis, & inimicis fuisse versatum; nullamque in ipso cognitam fuisse dispositionem minitantem subitam mortem; quia hæc omnia nos possent decipere; requiritur ergo, vt cōtemplemur tertium, & quartum fontem, qui continent morbos, & symptomata insequentia venenatos.

Morbi venenatorum sunt tumor corporis, oculi valdè tumentes, tumor ventris, & præcipuè, si venena mineralia fuerint. Non semel vidi Carlostadij Croatia ab illorum militum præfecto fuisse sublimati scrupulum clam exhibitum captiuis prædonibus, quibus omnibus excitabantur ventriculi inflammationes, obseruabatur tamen hoc discrimen, vt aliqui quadraginta dierum cursu adeo præmerentur, vt cum lienteria illorum vita terminaretur, alij vero fortiores continuo vomitu liberarentur.

Symptomata insequentia venenatos sunt stomachi anxietates, syncope, pulsus imbecillimi, pallor totius corporis, & subita mors: ex Galieno 6. de loc. aff. hæc colliguntur, habet hæc, si nigrum, & liuidum corpus reddatur, vel putredinem molestam oleat, signum est illud corpus veneno iugulatum esse: veritas roborabitur, si eadem ex aliis colligatur fontibus, vt scilicet sanus fuerit antea, vel versatus fuerit cum veneficis, vel habuerit inimicos; aut nullam habuerit dispositionem minitantem exitum, ex omnibus enim fontibus, si vnicum solum signum collegeris, certo affirmare poteris illum fuisse venenatum.

Sed quoniam diximus venenum esse æquiocum, quia vnicam nō potest habere definitionem, cum aliqua sint frigida spiritus densantia, & suffocantia, aliqua calida, & exedentia; ideo varia erunt signa indicantia venenorum naturam: coniciemus venenum frigidum, & suffocans, quale est opium; si stuporem, difficultatem anhelitus, & somnū profundum passi fuerint: memini me visitasse in finitimis locis Vngariæ militem quendam, qui septem opij pillulas, vice aliarum purgandi gratia exhibendarum, deglutierat; dum patientem vidi tanto cum impetu spiritum trahebat, vt paullo post deficeret, & è viuis, antequam possem, ei remedium dare, decederet: coniciemus venenum calidum, & exedens ex lotio sanguineo, ex vlceribus oris, ex dysenteria, & ex aliis; hæc diuersa venenorum natura est in causa, quod vnico non cognoscatur signo, sed syndrome signorum. Neque qui cadauera aperiunt sine signorum syndrome firmam, & vnde quaque perfectam cognitionem venenatorum comparare poterunt. Quis inueniet in cadauere scrupulum, vel drachmam sublimati in pollinem subtilissimum exhibitum, aliisque cibis commistis

A quinto fonte, id est, à iuuantibus, & lædentibus colligimus aliqua; scilicet Theriacam, & vomitum iuuare: à sexto fonte, scilicet à locis affectis, vt à vesica, corde ventriculo, & ore: ex quolibet igitur fonte, si vnicum saltem signum collegerimus, dicere poterimus illum veneno fuisse iugulatum.

*Qui sint morbi insequentia venenatos.*

*Qua sint symptomata venenatorum.*

*Cur venenum defini non possit.*

*Venenorum ex apertione cadaueris vix cognoscen.*

*Ostenditur contra communem, quod putredo febrium sit illa, quam philosophus vocat simpliciter, & non secundum partem, & quod omnia medicorum auxilia pro putredine auferenda sint præservatoria, & non curatoria.*

## CAPVT XIII.

*Varia opinionones quid intelligat philosophus per putredinem secundum partem.*

*Opinio communis, quod putridi humorosi efficientes febres putrescant secundum partem.*

**A**CTVRI in præsentia de illa putredine, quæ febres efficere solet, nisi à distinctione putredinis tradita ab Aristotele 4. meteororum exordiamur, non video quomodo profundè de illa aliquid dicere possimus: dicit igitur philosophus putredinem duplicem esse, alteram, quæ vocatur vniuersalis & simpliciter: alteram vero secundum partem. Quid Aristoteles per putredinem simpliciter, & vniuersalem intelligat, quæ vsque ad elementa resoluit, videtur esse in scholis ab omnibus receptum. Verum quid intelligat philosophus per putredinem secundum partem, est operæ pretium, vt præcognoscamus, si velimus scire, an putredo humorum sit illa, quæ vocatur ab Aristotele simpliciter, vel secundum partem. Albertus Magnus per putredinem secundum partem intelligit putredinem elementorum. Erasius intelligit formæ interitum, sed non vsque ad elementa; illam enim putredinem vocat vniuersalem, & simpliciter; Archangelus Mercenarius in suis repetitis quæstionibus de hac materia loquens inuehit in Erasium summa pertinacia dicens, quod putredo secundum partem non sit interitus formæ, sed sit solum alteratio qualitatium; Iacobus Zabarella, cuius ingenium re vera vsque in Græcorum comparisonem est euectum, tenet putredinem secundum partem, modo esse interitum formæ, veluti dum homo corrumpitur, & fit cadaver, vel dum vinum putrescit, & fit vappa; modo esse alterationem qualitatium, veluti dum vinum incipit putrescere, attamen practici possunt illud transponendo ex dolio in dolium reducere ad pristinam sanitatem, hanc putredinem Zabarella vocat quoque secundum partem, quamvis sit in solis qualitatibus; in quam sententiā, vt in mediam quandam viam video iis temporibus animos studiosorum flekti, hancque nos quoque recipimus: quo pacto vero aliorum sententiæ reiciantur, soluanturque argumenta aliorum in contrarium allata, quæstio tota legi potest in libris quæstionum naturalium Zabarellæ, qui diffusè de hac re egit: nostrum hic erat paucis declarare quid per putredinem secundum partem intelligendum esset.

Sequitur, vt modo quæramus, an humores in febribus putridis putrescant simpliciter, vel secundum partem: Mercenarius Zabarella, & plerique alij tenent putredinem humorum efficientium febrem esse secundum partem, & non simpliciter; tenet enim Mercenarius putredinem humorum esse alterationem, & non formæ interitum: Zabarella



Tella verò dicit, aliquando esse formæ interitum, aliquando solam alterationem qualitatum, datque exemplum, dum sanguis mutatur in bilem, vel in alium humorem toto genere præternaturam est cum interitu formæ sanguinis: dum vero ob putredinem humorum alterantur solam qualitates non corrumpuntur formæ humorum, dicitque tunc Medicum auferendo occasionem aperiendo scilicet, euacuando, refrigerando posse humores, qui incipiunt putrescere, ad optimam temperaturam transferre. Nemo, quod sciam, dixit, quod humores putridi sint simpliciter tales, sed omnes vna voce videntur decidere, putredinem humorum efficientium febrem esse secundum partem.

Arbitror tamen Galenum aliter sentire, quia putridi humores non solum alterantur, & putrescunt secundum partem cum interitu propriæ formæ; verum etiam putrescunt simpliciter, quia semper portio putrida resoluitur vsque ad elementa, & ad cinerem peruenit: tunc putredo est simpliciter quando peruenit ad cinerem: Aristot. enim 4. meteororum loquens de putredine simpliciter dicit, quod cinis est finis putredinis. Quod vero putridi humores resoluantur in cinerem est Galen. 2. de differentiis feb. & 3. prælag. 32. vbi habet, si natura illum veluti cinerem supra modum adustorum vacua e non anteuertit, ille rursus in corpore manens, & concalescens magnam quandam ad putredinem propensionem contrahit: quare si causâ, cur putredines excitentur, est cinis humorum ob putredinem adustorum, putredo febrium erit simpliciter, & vniuersalis, apparet hic cinis in vrinis in sine putridorum morborum: præ se fert specimen arenularum per exiguarum: differt ab arenulis, quia hæ in fundo matellæ colliguntur; cinis in nebuculis sparsus conseruatur.

Dum vero Zabarella dixit, putredinem in solis humorum qualitatibus existentem tolli per leuem medicinam, putredinem vero cum interitu formæ humorum nullo modo corrigi, vel reduci posse ad pristinum statum, eiuspace distinctio ad rem non facit; quia nulla putredo per leuem medicinam corrigitur. Hæc tria sunt natura distincta: putrescibile, putredo, & putrefactum: putrescibile medicamenti tollitur: putredo solum est in fieri, putredo igitur erunt fumi, & vapores putridi qui neque putrescibiles, neque putrefacti sunt, qui que nulla medicina coarctare possumus ad statum salubrem, sed in cinerem debent conuerti: cinis vero est res putrefacta: ab hoc principio ortæ est illa opinio nostra alibi, quoque proposita, quod scilicet omnia auxilia pro putredine pellenda sint præseruatoria, & non curatoria, diriganturque in euacuandos, seu alterandos humores non putridos, sed putredini obnoxios, vel putrefactos cineres, in obstructioneque aperiendas, in causas efficientes mediatas corrigendas, & nequaquam in auras seu vaporolos transpiratus euacuandos; quia alio modo halitus isti putridi non absumuntur, quam combustionem. Hinc sanguinis euacuatio, quomodo cunque consideretur, est solum auxilium præseruatorium putredinis: lenientia similiter non porriguntur pro curanda putredine, sed, vt primæ viæ sarcina liberentur. Serapia, vt refrigeren-

*Probatur  
quod putredo  
febrium sit  
simpliciter,  
& non secundum  
partem.*

*Reiicitur  
Zabarella dicit  
per medicinam  
putredinem  
corrigi posse.*

*Vnde fit,  
quod omnia  
auxilia pro  
tollenda putredine sint  
præseruatoria,  
& non  
curatoria.*

tur viscera, vel vt aperiantur meatus, & fluidi reddantur humores putrescibiles; liquatis enim succis, & viis per quas meare possunt patefactis, ocyus purgantur; dum vero sunt aperti meatus, viscera quasi flabello ventilantur, & natura inde alacrius certamen absoluerere potest, melius dirigendo putrescibiles, & melius euacuando putrefactos. Pharmaca demum duplici de causa dantur, vel vt cinis tollatur, ne noua accessio scintillet, vel vt putrescibiles humores vincantur. Concludimus ergo putredinem esse fumos, vel auras, esseque medicinis inuincibiles, quia solum combustionem absumuntur, eius enim finis, Aristotele iudice, est solum cinis: colligimus ergo ex iis, quod nullum auxilium medicum in putredine auferenda sit curatorium; & similitudinem Zabarellæ de vino non facere ad rem, quia sicuti dum redit, non est putridum, sic humores, dum redeunt, non erunt putridi neque secundum partem, neque simpliciter: humoresque putridos necessario in cinerem debere conuerti, & hanc putredinem esse simpliciter, & non secundum partem.

---

*Reiicitur argumentum nonnullorum ostendentium, putredinem insignem esse venenum.*

#### CAPVT XIII.

**M**AGNA est controuersia hodierno die, an putridi humores possint aliquando naturam, & formam veneni subire. Qui putant feuissimam humorum putredinem fieri venenum, id conantur probare Galeni auctoritate in epidemicis, vbi historia Critonis, & Phrenetici declaratur, refert ibi Galenus quod in illis collectus humor sit factus veneno lethali similis, & hinc derepente secuta sit mors. Inferunt, ergo humores aliquando in corporibus viuentibus poterunt esse adeo perniciosi, vt fiant venena. Verum argumentum istorum redigamus in formam, taleque esse debet: omne quod est simile veneno est venenum, putredo insignis est similis veneno, ergo est venenum: Argumentum est in quatuor terminis. Primus erit, dum dicunt, omne quod est simile veneno. Secundus est prædicatum huius propositionis, dum dicunt, est venenum: tertius est insignis putredo: quartus est quod putredo sit venenum: alius terminus est, quod sit venenum, & alius quod sit similis veneno. Insuper hoc argumentum in libris Elenchorum Aristotelis vocabitur Elenchus compositionis; veluti si quis diceret: qui sedet potest iacere, Socrates sedet, ergo Socrates iacet: vt argumentum non collocaretur in numero paralogismorum, oporteret hoc modo formare conclusionem, ergo Socrates potest iacere, & non inferre quod Socrates iaceat: similiter debebant inferre cum Galeno, ergo putredo insignis est similis veneno, & nequaquam quod sit venenum. Demum, vt argumenti vanitas noscat, ostendi potest, quod sit in quarta figura; quoniam subiectum minoris est latius & communius



nus prædicato, quia ex illorum sententia putredo insignis latius se habet, quàm venenum, quia ipsi fatentur dari putredines insignes, quæ sunt venena, & quæ non sunt: similiter subiectum maioris latius se habebit, quia ex illorum quoque sententia non solum venena debent dici venena, verum etiam illud, quod erit simile: quare si oporteret conuertere maiorem nil sequeretur, quia argumentum esset in secunda figura ex duabus affirmatiuis; erit igitur putredo diuersa specie, & genere à veneno. Nos rationibus logicis, quæ sunt vniuersales omnibus scientiis reieciimus propositum argumentum, vt iisdem rudiores possint plura similia argumenta, quæ in scholis vagantur explodere; sicuti illud quo vtuntur sæpè nostratum aliqui, dum probant calorem innatum esse cælestem ex eo, quod Aristoteles dixerit proportionem respondere elemento stellarum; hoc & alia similia argumenta in numero paralogsismorum reponi debent.

*A quibus humoribus, & causis fiat pus.*

C A P. X V.

**P**us demum reponitur inter ea, quæ peccant tota substantia; de eius causis igitur agendum. Plurimi putant, causam materialem puris solum esse massam sanguineam, cæteros vero humores extra venas existentes esse adeo rebelles, vt alteratrices partium non possint illos transmutare in pus, quin immo, nisi expellantur, in abscessus, in scyrrhos, vel in aliam malam, & virosam excrementorum sobolem cedant oportet: confirmant suam sententiam autoritate, & experientia. Primo afferunt Galeni locum 2. aph. 47. vbi habet hæc verba, pus fit à calore misto præter naturam, & à calore secundum naturam, ideo vitiosam habet transmutationem ex sanguine, inferunt ergo, si pus fit cum transmutatione sanguinis, vbi non erit sanguis, ibi non fiet pus: deinde probant experimentis, dicunt destillationem capitis pituitosam extra venas factam restagnare in pectus, vel in articulos, attamen non posse in pus conuertere: similiter œdema, scyrrhi, & aliæ durities ab humoribus sanguine priuatis factæ nunquam suppurantur. Inferunt ergo solum sanguineum humorem esse causam adæquatam puris.

*Rationes illorum, qui putant pus fieri solum ex sanguine.*

Antequam diluamus proposita argumenta, melius est, vt dicamus, quomodo res se habeat. Dicimus ex Galeno, non solum sanguineos humores in pus conuertere posse, verum etiam cætera recrementa corporis, quamuis maiori cum difficultate. Hinc Galenus 7. aph. 38. habet viginti diebus suppurari in Thorace, quod fluit à capite; addimus hanc minorem, at quod fluit à capite, & in pectus se colligit, est phlegma purum, ergo phlegma sine sanguine potest conuertere in pus. Præterea Hippocrates, & Galenus primo prædictionum text. 35. loquentes de tumoribus factis à frigidissimis humoribus dicunt humores fri-

*Fundamenta ostendentia ex quo humore frigido pus fieri possit.*

gidos tractu 60. dierum suppurari, si locus calidus sit; in pedibus enim, & brachiis ob distantiam à fonte caloris non possunt vilo tempore suppurari. Hinc in Thorace, vbi magnus calor est, 20. diebus humores pituitosi à capite delapsi suppurantur, in ventre 60. diebus, in pedibus nullo vnquam tempore; Galenus; præfag. 29. docet, quando expectanda sit conuulsio humorum in pus; ibi hæc leguntur, si vires robustæ sunt, & humores calidi per excretionem fit iudicium, si frigidi. & vires robustæ; per abscessum: vel calidi, & vires debiles, & sic per abscessum quoque iudicantur; qui verò vires debiles, & humores frigidos habent, vel moriuntur, vel vix longo temporis interuallo humores concoquunt. Ex his colligere possumus, quando fieri possit pus, & quando non: primo enim, si fuerint humores calidi, & vires robustæ non fiet pus; & ratio est, quia humores calidi transpirant, & vires fortes expellunt per vias fallentes sensus nostros. Hic notatur Empyricorum quorundam error, qui tumoribus biliosis robusta existente virtute adiungunt suppurantia ex lacte, farinis, & similibus, quibus occluduntur pori, detinenturque acres vapores, detentique adeo efficienes euadunt, vt partem læsam, vel exedere incipiant, vel destruant, eaque in cancrenam desinat; semel vidimus erysipelas genæ dextræ emplasticis suppurantibus tractatum in cancrenam ob relata causam terminasse: iterum vidi Chirurgum imperitum necasse hominem erysipelate podicis correptum iis emplasticis; causa est non solum, quia detinentur vapores acerrimi (vt diximus) verum etiam, quia genæ, mamillæ, nates ob molliem faciliè eius viuus natiuus calor resoluitur: vbi igitur vires fuerint robustæ, & humores calidi; non conuenient suppurantia, sed digerentia: si verò fuerint frigidi humores, & virtus robusta, per abscessum expectanda erit crisis. Errant, qui in frigidis tumoribus, vel fluxionibus, quamuis robusta virtus sit, vtuntur digerentibus. Ex his quoque colligimus ex frigidis humoribus fieri pus: hic quoque obseruatur illorum error, qui in vlceribus vetustis pedum statim vtuntur lotionibus digerentibus, tenue enim resoluit, & crassum in scyrrhosam dispositionem conuertunt: tunc si sanitatem consequi desiderant, suppurantibus vti debent, quæ sola in pus conuertendo crassos, & frigidos humores partis circumstantis sanare possunt: si vero virtus sit debilis, & humores frigidi; vel moriuntur ægri; vel longo temporis spatio concoquunt ratio colligitur ab Aristotele 2. sect. prob. 8. vbi dicit, lentum, & tenacem humorem tarde concoqui, quia difficilè diuiditur, & ad minima digeritur: si igitur virtus robusta difficilè potest crassum phlegma digerere, & ad minima diuidere; quanto maior erit difficultas, si calor fuerit debilis? erigitur ferme impossibile, vt calore existente imbecillo crassi & frigidi humores digerantur, vel suppurentur.

*Errata Em  
pyricorum  
dum vtun-  
tur suppuran-  
tibus in tu-  
moribus bi-  
liosis.*

*Reiciuntur  
argumenta  
in contrariū  
allata.*

Erat primum argumentum, quod pus solum fieret ex sanguine: quod negatur, quia sanguinea massa non est sola, & ad æquata causa materialis puris; quinimmo ostendimus pituitam existentem in cauitate pectoris ex Galeni sententia posse suppurari. Quo ad secundum.



dum argumentum de humore pituitoso perueniente ad articulos, quod non suppuretur, dicimus, id euenire ob frigiditatem articulo- rum. dicimusque, quod si essent iidem humores pituitosi in ventre, vel in thorace, vbi calor vegetior est, in pus possent conuerti: Demum, si experientia credendum sit, fateor, me semel vidisse quendam iuue- nem alioquin robustissimum, arthride catenatum ob destillantem catarrhum capite pllum in genua, cui acciderit; vt pituita arthri- dem efficiens in pus conuerteretur: quod experimentum, licet raro accidar, cohæret tamen Galeni sententiæ 3. prælag. 29. dicentis in virtu- te valida frigidos humores per abscessum iudicari posse: nullum itaq; erit argumentum propositum, quod humores frigidi non possint in saniem conuerti.

Ex traditis in hoc libello patet, non dari substantias operantes, sed *Epilogus hu- mo libelli.* omnes potētiās occultas esse in cathēgoria qualitatis: patet quinetiam quæ esse possint genera, differentiæ & initia occultarum qualitatum: ostensumque est, plurimos, qui tenent substantiam operari, prolapsos esse in monstruosas opiniones. Demum de modo cognoscendi vene- na; de putredine humorum, & à quo humore, & à quibus causis fiat pus; hæc enim omnia visa sunt pertinere ad ea, quæ peccare possunt secundum totam substantiam.

Finis Octauī Libri.



# SANCTORII

## SANCTORII

Iustinopolitani

METHODI VITANDORVM

*errorum in quantitate peccantium humorum perquirenda.*

LIBER NONVS.

---

*Quomodo per syndremem signorum quantitas peccantium humorum colligi possit.*

C A P. I.



VPERIVS de initiis reconditarum qualitatum, & de iis, quæ substantia peccant, peregrimus: verum, quia quantitas immediatè substantiam sequitur, hic de quantitate peccantium humorum agemus. In pauca hanc speculationem conferemus, quia ex traditis in 6. libro, vbi cumulatissimè tractauimus de methodis cognoscendi humores, facile quoque copiam, seu quantitatem cuiuslibet humoris colligere poterimus. In præsentia iuuabit nos, si in exemplorum more illorum signorum concursus repetitionem fecerimus; excitabimus rudiorum animos, & promptos eos reddemus ad cognoscendam hanc peccantium humorum copiam.

*Ut quantitas  
bilioforum.  
succorum  
cognosci po-  
test.*

Experiamur in primis traditos fontes pro cognoscenda bile, an ex illis quoque copiam, seu quantitatem biliosi succi colligere possimus. Fontes erant sex, causæ procatarticae, dispositiones patientis, morbi, symptomata, loci affecti, iuuantia, & lædentia: causæ procatarticae gi- gnentes bilem ad tria capita relata sunt, scilicet ad vicinitatem calidorum, ad motum, & ad alimentum: sub vicinitate est aer calidus temporis anni, vel regionis, vel constitutionis, vel hypocausti; præterea sunt balnea,



balnea, vnguenta, & omnia calida, quæ tangendo nos calefacere possunt. Sub motu, qui est re vera caloris origo, est exercitium immoderatum, coitus, vigilia, animi passiones, quæ sunt mæror, timor, gaudium, & ira: alimentum, vel calefit per se, vt aromata, & similia, vel per accidens, vt cibaria frigida, sed obstruentia: hæc enim bilem aggregant: si patiens horum signorum omnium, seu plurimorum occasione fuerit excalesfactus, nullum erit ingenium adeo retusum, quod non v idea in illo, bilem copia peccare: sed veritas adhuc melius elucescet, si aliorum fontium signa non obstiterint. Quare de secundo fonte loquamur, qui continet dispositiones patientis; dispositiones igitur noscuntur, cum per antecedentia, tum per consequentia: signa antecedentia indicantia bilem sunt hæc patientem ex biliosis esse ortum, esse macilentum, esse iuuenem cum venis latis. Consequentia sunt actiones animales, vt esse vigilem, mutabilem in sententia, ingenio celeri, agilem in mora: vitales, esse iracundum, in venerem furere, pulsus habere veloces, & frontem rotundam: naturales, in stomacho cibum nunquam esse molestum, aures plus debito biliosis succis scaterere, & alia plura, quæ legi possunt in 6. lib. si igitur hæc signa antecedentia, & consequentia plurima in bilis productionem conspirare obseruauerimus, efficaciora argumenta depromemus, quod patiens ob copiam bilis laceretur; efficacissimum vero erit argumentum, si in 3. 4. 5. & 6. fontibus inuenerimus signa idem confirmantia; merebiturque vocari completa demonstratio, quia æquè docebit completa signorum communium syndrome, ac proprium, quod vni soli, & semper conuenit. In tertio fonte, si motus morbi fuerit velox, vt accidit in ardenti febre, in erysipellate, & phrenesi; si de tertio in tertium, idem colligemus similiter, si motus paroxysmorum fuerit celer, aliaque signa superius declarata quoque conspirent, alimenta que calefacientia, nimis coitus, aër æstiuus, & animi passiones præcesserint, hæc idem indicabunt: in quarto symptomata animalia, vt vigilia, sitis intensa, & ciborum inappetentia bilem esse copiosam significant: dixit enim Galenus, dum de casu Cleonaëtidis sermonem habuit, quod sitire, vigilare, & abhorreere à cibo constituent characterem biliolorum succorum. Quo ad naturalia symptomata bilem ostendentia, sunt expultrices deprauata suntque exeuntia flaua, præstina, vel æruginosa, & alia in capite proprio declarata. Quo ad qualitates mutatas est citrinus color oculorum, & cæterarum part. corporis; amarities in ore: si multa ex iis in vnum conspirare viderimus, non errabimus, si dixerimus bilem copiosam collectam esse. Ad eundem modum oculos dirigemus in partes corporis affectas: ex traditis enim in 6. lib. cognoscemus, membranas præcipuè læsas indicare bilem: quo affectus erit debito potentior, eo maior illius speciei bilis erit aceruus. Demum ex iuuantibus, & lædentibus idem confirmabitur, si inedia ægum læserit, quo magis lædetur, eo maior bilis copia indicabitur.

Quo ad pituitæ multitudinem attinet, si ex syndrome cognouerimus aliquam pituitæ speciem peccare, vbi plura, & intensiora erunt si-

*Ve pituitæ  
copia cognoscitur.*

gna indicantia pituitam, ibi maior copia, & multitudo illius pituitæ adest; quoniam in maiori quanto eiusdem speciei & cōditionis semper erit maior virtus: proponamus exemplum. Socrates potionibus, & obsoniis frigidis iam pridem altus est: à pituitosis parentibus oritur, vel senex est: is morbo chronico, qualis est intemperies frigida, & humida ventriculi corripitur: & demum dolore grauatiuo laceratur: hæc quatuor signa à quatuor primis fontibus pituitam ostendentibus desumpta, certo certius indicant Socratem pituitæ multitudine vexari. Si velò iis signis addiderimus locos affectos, & iuuantia seu lædencia, quæ indicant pituitam, certitudo erit omnibus numeris absoluta: loci affecti, qui pituitosis succis præcipuè premuntur sunt glandulæ, ventriculus, cerebrum & articuli: iuuantia sunt euacuationes pituitosorum succorum: lædencia sunt frigida, & humida: verum, quia in 6. lib. cumulatissimè de iis signis egimus; ideo paucis in hoc loco de iis dicendum.

*Ut copia melancholia adusta cognoscatur.*

Simili modo quantitas peccantis melancholiæ peruestigari potest: afferamus casum, ex cuius obseruatione copiosa melancholia colligi possit: sit patiens, qui indulxerit cibis calidis, & siccis, isque habeat dispositionem biliolam, quemadmodum si esset à biliosis parentibus ortus, vel quod esset aliud, de illis signis, quæ libro 6. cap. de dispositione biliola, scripta sunt. Idemque patiens postquam passus sit tertianam febrem, in quartanam fuerit prolapsus: iis positis nemo negabit, patientem hunc atrabile vexari: si vero in illo quarti, quinti, & sexti fontis signa ostendentia atram bilem inuenerimus, in opinione confirmabimur, illum atrabile, eaque copiosa lacerari: signa quarti fontis essent, si patiens scabie, leuce, vel simili corripereetur affectu: quinti, si crura, vel mamellæ essent varicosæ. Sexti, si frigida, & humida iuuarent: dummodo in quolibet fonte inuenias apertum testimonium atrabilis, non decipieris, si tunc copiosam atram bilem premere iudicaueris.

*Ut copia fecis melancholia naturalis cognoscatur.*

Eadem via quantitatem fecis naturalis melancholiæ penetrabimus. Exempli causa, si viderimus ex signis primi fontis hoc adesse, quod scilicet patiens fuerit esculentis frigidis, & siccis, caseo, lacte, vino nigro altus: ex signis secundi, quod venæ tumidæ apparent: ex signis tertij, quod splen tumidus eum vexet, ex quarti, & cæterorum ad sint aliquot ex illis in 6. lib. tradita; dicemus, illum fœce melancholica abundare, eoque abundantiorē esse, quo signa melius, & intensius appareant, humor non potest esse in pauca quantitate, & diu fuisse disposita visceribus ab efficacissimis procataceticis causis: neque affectus possunt esse debito truciore, & partes valde læsæ, & copia non sœuire humores peccantes. Quod diximus de copia fecis melancholiæ, eadem via est de adusta dicendum, an copia peccet. De sanguinis vbertate non est hic agendum, quia cap. de polyæmia proposuimus signa, quæ nos sanguinis copiam iudicare possunt.



*Alia Methodus, qua perquiri possit humorum peccantium quantitas.*

CAPVT II.

**P**OSSVMVS quoque à posteriori peccantium humorum multitudinem pernoſcere: affectus posteriores. qui indicant nimiam humorum quantitatem, sunt corporis grauitas cum contusione, lassitudo tensiua, tumor, diuities, ruptura vaſorum, & rigor sine caloris conſecutione. Quod ob excrementorum copiam partes ſentiantur graues, & quadam contusione oppreſſæ, eſt Galeni 14. method. cap. 2. qui dicit, quod partes viuientes patiantur ob multitudinem humorum, perinde ac ob extrinsecum pondus ingraueſcant, & contundantur. Inferre ergo poterimus ex ſenſu grauitatis in corpore eſſe humorum copiam: nec valere videretur verſa vice, quod videlicet, vbi ſit copia humorum, tibi neceſſario, & ſemper grauitas, & contuſio ſentiantur; copioſum enim alimentum in robuſtum ventrem ingeſtum nullum pondus, nullamque grauitatem facit; quia ab alteratrice vinci poteſt: quin obſeruamus tunc fortes homines potius ſenſum leuitatis perſentire: ſimiliter dum excrementa naturalia ſunt copioſa adferunt tamen corpori aliquas ſuppetias, nullum pondus, vel grauitatem efficiunt: meſenterium, quia à copioſiſſima pituita inteſtinaliſſimæ loricæ in m orem adhærente aliquid opis carpit non perſentit copioſi humoris pondus: omne enim ſecundum naturam leuitatis ſenſum efficere ſolet, à lotio copioſo veſica, donec frugem exhaurit, non ingraueſcit, ſed ſolū dum alendi virtute priuatur, vrina incipit grauitate, & mordeat hic obiter adagium huiusmodi vulgare ſcilicet ſi vis ſanus viuere meas ſepè, vt canis, reprehendi poteſt, quoniam ab vrina ſine morſu detenta veſica colligit magnum fruſtum: ſimiliter fœces inteſtinorum non grauitant, donec illis inteſtina paſcantur: valebimus ergo ex ſenſu grauitatis cum contusione colligere humorum copiam, ſed non vice verſa; Galenus in Hiſtoria Virginis Lariffæ, & Sileni ex grauitate colligebat copiam excrementorum. In virgine Lariffæ erant tria ſymptomata ex quibus multitudo humorum colligebatur, ſcilicet grauitas capitis, dolor oculorum, & inſolitus rubor faciei. In Sileno erat capitis grauitas, à qua ſimiliter Galenus multitudinem peccantium humorum colligebat, ſequitur ergo, vt nos quoque ex grauitatis ſenſu neceſſario colligere poſſimus nimiam humorum quantitatem.

*Sex ſigna  
oſtendens  
copiam hu-  
morum.*

*Proſtitum  
adagium,  
quod ſi me-  
rendum ſe-  
pè, vt canis,  
ſaluum.*

Præterea tenſio ſæpiſſimè inſequi ſolet humorum multitudinem, vt extenſione ſed non ſemper, quoniam fieri quoque poteſt à ſtatu extenſente, & copia humo- aliquando à ſiccitate partium, vt docet Galenus 12. method. cap. 7. rum colligi- dicens diſtenſionem fieri à copia, vel ſiccitate: cognoscemus tenſio- tur. nem arguere multitudinem humorum, ſi tenſio fuerit grauatiua; ſi fuerit ſine grauitate, & ſiccitate ſtatuum copiam, ſi ſine grauitate, &

*Vi ex tumore.*

copia flatuum, dicemus tensionem siccitatem indicare. Insuper ex tumore copiam humorum colligemus hoc præuiso, quod non fiat à flatu. Cognoscemus tensionem flatulentam ex sensu leuitatis, tensionem vero ex humorum copia factam ex sensu grauitatis.

*Vi ex duritie.*

Ex duritie aliquando humores multitudine exuperare cognoscemus, post scilicet factum examen caularum, quibus omnia corpora durefcunt; causæ enim quibus partes corporis durefcere solent ex Galeno s. simp. cap. s. tres sunt, quarum prima est siccitas, quæ in scyrthis obseruatur. Secunda est concretio, vt in glacie; tertia est humorum multitudo; quare si videris duritiem non esse ob scyrthum, vel ob concretionem, faciliè colligere poteris esse ob multitudinem humorum.

*Vi ex ruptura vasorum.*

Ex ruptura vasorum, quia, si humores erunt in aliquo vase copiosi, vas faciliè patietur dierehim. Hinc Galenus s. method. Inter ceteras causas dierehis posuit copiam, & multitudinem humorum, dum enim viderimus diuisionem vasorum non fuisse factam à saltu, vel ab alia causa externa, vel à causa interna erodente inferre certo poterimus ob multitudinem humorum fuisse secutam. Demum cum ratione diximus rigorem sine consecutione caloris arguere copiam humorum, quia Galenus dum loquitur de vxore Epicratis, dicit in illa muliere fuisse insignem copiam crudorum succorum, quia habuit rigorem sine caloris consecutione. dum enim à rigore non excitatur calor signum est adeo redundare frigidos humores, vt magis possit eorum frigiditas in refrigerando, quam putredinis caliditas in calefaciend.

*Vi ex rigore sine caloris successione.*


*Epilogus.*

Ex dictis patet, quomodo ex syndrome signorum multitudo humorum cognosci possit, patet quinetiam, quomodo sine syndrome ex aliquo saltem signo propositorum idem scire possit, scilicet ex grauitate, tensione, duritie, tumore; ruptura, vel rigore sine caloris successione.

Finis Noni Libri.

SAN-





# SANCTORII SANCTORII

Iustinopolitani

## METHODI VITANDORVM

*errorum in perquirendis ijs, qua perti-  
nent ad motum localem peccan-  
tium humorum.*

### LIBER DECIMVS.

---

*Ostenditur quod humores non moueantur ex se, & proprio  
impetu, sed ab alio.*

#### C A P. I.



CTVRI de iis, quæ spectant ad motum localem peccantium humorum, agendum in primis se offert, an humores in corpore suomet cieantur impetu, vel alieno: suo, vt faciunt elementa, quæ grauitate, vel leuitate ascendunt. & descendunt, tum mista ex iis, quæ, vt ait philosophus 1. cæli text. 12. à prædominante elemento mouentur alieno: vt omnia externa, quæ videntur moueri ab alio violento motore. Hæc res, quia apud Galenum est manifesta, clara, atque prænitens in eius auctoritate æquo animo conquiescimus: habet enim 2. ad Glaucon. cap. 7. hæc verba, humor non fluit à se, & proprio impetu, aliàs omnis fluxio ad inferiora fieret: sed vel à parte mittente propellitur, vel à recipiente recipitur. Clarius non potest hoc quæsitum decidere: primo dicit humores à se non moueri: deinde eos, qui aliter sentirent ducendo ad impossibile conuincit, dicit enim, si humores ex se mouerentur, cum sint omnes aquei, & per consequens graues, sequeretur quod omnis fluxio fieret ad inferiora, perpetuo sequeretur, quod hominum pedes essent tumidi, & caput sanguine, & cæteris recrementis priuatum,

*Humores ex  
Galeni non  
mouentur ex  
se, sed ab alio.*

quod adeo reluctatur veritati, & experientię, vt nec oppillationes lateat, caput semper sanguine esse refertum; æquè enim humores obrepunt superiores, ac inferiores corporis partes, quinimmo, vt plurimum videmus in caput sanguinem, & omnium generum excrementa facilius insilire, quàm in pedes.

*A quibus  
causis mo-  
ueantur ex-  
crementa.*

Accepto hoc fundamento à Galeno, quod scilicet humores suo non cieantur impetu, sed alieno: præstat hic, vt videamus, quomodo moueantur. Galenus 3. de symp. causis cap. 4. habet moueri humores in viuientibus, vel quia transmittuntur, vel quia attrahuntur: duo itaque colligi possunt modi, & non plures, quibus mouentur humores, alter per transmissionem; alter per attractionem. Verum, vltterius adhuc præstat, vt de hac re philosophemur, scilicet quot modis ab vna ad aliam partem humor transmitti possit: dicimus igitur primo aliquid transmitti, vel dum partes ab externo frigore densantur, & roborantur: etenim robustiores redditæ fortius expellunt humores excrementitios, quæ deinde in debiliores particulas transmittuntur. Secundò, vel dum humores à calore liquefiunt; liquefacti enim, & fluidi facilius in alium locum ab expultrice facultate transmittuntur. Tertiò dum ob imbecillitatem retentricis defluunt excrementa. Quirto humores transmittuntur, dum vix expultrix ob copiam, vel ob malam qualitatē, vel ob harum vtramque causam eos compellit. Quo ad partes attinet, in quas transmittuntur humores, vel quæ suscipiunt, hæc debent esse cæteris debiliores, alioquin aliarum partium excrementa non susciperent, sed pro viribus repellerent: debiliores verò partes, quæ suscipiunt, vel sunt tales, quia hac sorte conditæ sunt, vt nō possint non suscipere cæterarum partium excrementa, quales sunt glandulæ: vel debiles sunt ob intemperiem, malam compositionem, vel solutam vnitatem: si enim sua natura viribus non sint exutæ, necessario dum implentur malis succis, earum vires debent esse flaccidæ, & ferè perditæ ob malam valetudinem partium similarium, vel dissimilarium.

*Vt dolor at-  
trahit,*

Si verò humores non transmittantur, sed attrahantur, à partibus suscipientibus; tunc dicunt omnes, ob calorem, vel dolorem, vel vim vacui attrahi: sed si propriè loqui velimus, melius est, vt dicamus, quod partes re vera non attrahant excrementa aliarum partium, quæ noxia, & incommoda illis sint, sed solum ob imbecillitatem suscipiant, quod non deberēt suscipere. Hinc pars dolore correpta suscipit excrementa, non quia attrahat, sed quia ob dolorem reddita sit imbecillis, & inepta ad expellendum excrementa à sanis partibus propulsa: similiter pars aliqua corporis ob calorem præter naturam suscipit excrementa, non quia attrahit, sed quia ob calorem immoderatum redditur magis rara, idoneaque ad suscipienda aliarum partium excrementa: sicut enim frigidus est densare, ita calidus rarefacere. Neque obiciant, si calor attrahat, quia reddit partem raram fore, vt sequatur, quod dolor excitatus à causa frigida, quæ densat partem dolentē, non possit esse causa attractionis, vel receptionis excrementorum: quia respondemus, dolorem à causa

*Obiect.*

*Sol.*

causa.



causa frigida eatenus attrahere, quatenus in parte dolente excitat ca-  
lorem, est Galeni in methodo, quod dolor à causa frigida factus calo-  
rem quoque excitet: eadem ratione vacuum suscepit excrementa, & non  
attrahit, quia, quod nihil est, neque attrahit neque expellit. Colligimus  
ergo contra communem loquendi usum partes vi caloris, doloris, &  
vacui suscipere, & non attrahere excrementa: & has tres causas in unicā  
tantum conuenire imbecillitatem: vacuum non est causa, vt recipiens  
recipiat ob aliā causam, nisi, quia ibi nulla est resistentia: similiter pars  
dolore affecta recipit, quia dolore vexata adeo redditur imbecillis, vt  
non possit resistere, & expellere aliarum partium excrementa: pars vero  
affecta calore suscipit, quia calor debilitat, & rarefacit meatus, qui de-  
inde suscipiunt, & excrementis implentur: hinc pars imbecillis frigi-  
da intemperie laborans nisi sit omnino vniu. de structura, non suscipit, vel  
vt aiunt, attrahit aliorum excrementa, quia frigus magis potest in cō-  
densando, & muniendo partem, quam possit aliqua imbecillitas: hu-  
mida tamen intemperies, quia laxat, ideo causa est. vt partes corporis  
flaccidæ promptè aliarum partium excrementa suscipiant. Hinc in il-  
lam partē, vbi sunt tumores & lematosi, plurima excrementa cōfluūt,  
quoniam nulla ferè est resistentia: quare attractio non fiet solū ratione  
caloris, doloris, vel vi vacui, sed ratione humiditatis, & omnium morbo-  
rū, qui reddere poterunt partes debiles, & imbecilles; & quamuis in  
scholis ab omnib. recipiatur, attractionem fieri ex Galeno ratione ca-  
loris, doloris, & vi vacui, nos dicimus, has tres causas fuisse propo-  
sitas, vt principales, nūquam tamē negauit Galenus attractionem pos-  
se quoque fieri ratione humiditatis, & cuiusuis imbecillitatis.

*vt vacuum  
attrahat.*

Neque analyticis principiis est consentaneum, quod attractio fiat  
per se ratione caloris, doloris, & vi vacui tantum; quia quando in ean-  
dem operationem multa conspirāt, oportet, vt merito alicuius com-  
munioris, quod de omnibus prædicetur, id eueniat, & de illo solo per  
se dicatur: quamuis ex triangulis solum sit schalenus, isosceles, & æ-  
quilaterum, qui habeant tres angulos æquales duobus rectis, non ta-  
men possumus dicere, quod habere tres angulos de illis prædicetur  
per se; quia hoc attributum conuenit per se triangulo in communi, &  
deinde merito communioris ad species refertur: similiter nos dicimus  
dum partes recipiunt, vel attrahunt excrementa aliarum partium, id  
non pendere per se à calore, dolore, & vi vacui, sed ab alio cōmuniori  
à quo vis attrahendi, vel suscipiendi depēdet; & hæc est imbecillitas:  
dolor enim reddit partem imbecilem, calor imbecilem, & vacuū,  
cum non resistat, in illum, tanquam in locum omnium imbecillimum  
omnia excrementa confluunt; addas omnes morbos debilitantes, &  
roburaufereutes esse causas, cur attrahantur, vel (vt melius dicamus)  
recipiantur excrementa.

*Altioribus  
principijs o-  
stenditur do-  
lorem, calorem,  
& vacuum  
per se non at-  
trahere.*

Sola igitur pars mittens propriè habet vires mouendi humores, pars  
vero recipiens recipiendi, & nequaquam attrahendi: quam sententiā  
expressit Galenus 2. ad Glauco. cap. 7. dum dixit, humores ex se non ha-  
bere motum, sed à parte mittente propelli, vel à recipiente recipi, non

*Quod pars  
mittens solū  
habet vires  
mouendi hu-  
mores.*

dixit à parte recipiēte attrahi, sed recipi. Neque aduersatur nobis Aristoteles 7. phys. dum dicit, omnē motum violentum si eri tractu, pulsu, vel utroque, quia in exercitiis mechanicis omnes ij tres modi obseruantur. In viuētibz vero corporibus non tractu, sed potius pulsu dicimus moueri humores præter naturam; verum, quia in libro de reuulsione iterum agemus de hac re, hic finem facimus.

*Quod sex sint modi, & non plures, quibus pars mittens est fluxionis origo.*

### CAPVT II.

**I**N superiori capite ostendimus Empiricos de motu humorum loquentes bifariam à veris medicinæ fundamentis desistere; primò, dum putant humores ex se, & proprio impetu moueri, quod (vt ostensum est) Galeno, & veritati reluctatur. Secundò, dum credunt partes recipientes propriè, & per se attrahere humores præter naturam. Nūc sequitur, vt de parte mittente videamus, quomodo mittat humores: & an semper, dum mittit, læsa sit. Si qua contemplatio medica in curandis affectibus emolumentum præstet, hæc erit; namque, si in qualibet fluxione pars mittens esset læsa, medicus tractans morbum à fluxione factū duas semper deberet agnitudines curare: illam videlicet, quæ est partis recipientis, & illam, quæ est partis mittentis; sin verò nulla est necessitas, quod pars mittens semper sit læsa, non esset in fluxionibus curandis semper eodem modo laborandum.

Tres in primis à Galeno 3. de sympt. causis cap. 4. proponuntur causæ, quibus pars mittens cogitur transmittere humores in alias partes, quæ sunt humorum copia, qualitas mordax, & vtræque simul, scilicet copia cum qualitate mordaci vnita. Dum, ab humorum copia tantummodo grauat expultrix, cogitur transmittere in alias partes, vt sarcina humorum liberetur, & meliorem sanitatis gradum adipiscatur: tūc pars mittens, cum in sanitate confirmetur, nullo medico auxilio indiget. Cęcutiunt tamen, & vacillant Empirici, qui sæpè partes mittentes sanas in omni fluxione curanda importunè tractant præsidii chirurgicis, & pharmaceuticis. Semperque fluxiones astringentibus putant esse cohibendas, quod sæpè miseris patientibus difficultates, & aliquando exitium adfert: audias quam malè se gessit Empiricus in curanda hac fluxione sanguinea à copia sanguinis solū prodeuntis. Accidit semel cuidam athletæ, vt sanguis copia peccans ascēderet, & per venas capitis in pectus sensim deflueret, & per tussim eijceretur; Empiricus multifariam Athletam lacerabat, primo utebatur saccharo rosato, syrupo myrrino, & bolo armena, quorum astringentium vsus maximo erat impedimento naturæ tunc rectè operanti. Secundo eadem die dabat philonium, & diacodium, vt sisteret fluxionem, quando natura melius operari non poterat, quam copiosissimum sanguinem mi-

*Vt à copia  
expultrix  
molestata  
expellat.*

*Vt Empiricus  
athletam la-  
cerauit.*

nuere;



nuere; nullus error maior fieri poterat, quā, in sanguine copia peccante, nulla qualitate irritante, ut astringentibus, & refrigerantibus, quæ fluxum sanguinem in pectore cohibere possunt. Galenus, qui nos omnia docet prævidit commune hoc erratum Empiricorum; qui materia existente in pectore utuntur diacodio, & philonio 1. de alimentorum fac. cap. 31. dum loquitur de papauere, à quo diacodium, & philonium suas vires accipiunt, dicit, quod impedit, ne collecti humores è pectore egrediantur; hæc sunt verba; inhibet papauer præterea, quæ ex thorace, ac pulmone tussi expuuntur; maximè igitur mirari debemus Empiricorum nostri temporis inscitiam, quia ut plurimum, dū collectus est catarrhus in pectore, illico utantur diacodio, quod inhibet, ut dicit Galenus, quæ ex thorace tussi expuuntur: confert solum diaconum, ut ibidem docet, iis, qui catarrhis fluxu tenui defluentibus, & non fluxis in pectore infestantur, fluxis enim aperienda est via, ut repant, quod expediat iuxta Galenum 2. in 6. de morb. vulgar. tex. 28.

Quando vero humores propellantur, quia solum copia peccent, *Vnde colligitur ex libro nono, tum ex sufficienti partium enumeratione cognoscemus: hunc in modum fiet sufficiens enumeratio, non præcessit frigus densans, vel calor liquefaciens, neq; pars mittens fuit valde imbecillis, vel à mordaci qualitate molestata, quod cognoscemus ex methodis traditis in 5. & 6. libris, ergo pars mittens solum ab humorum copia coacta propellit. An vero pars mittens illos gignat humores, vel aliunde recipiat, cognoscemus ex iis, quæ dicta sunt de locis affectis in 1. & 6. libris. Demum quomodo cognoscatur, an in parte mittente sit læsio per cōsensum, vel per essentiam, & ubi collocetur idiopathia, vel protopathia, in 1. lib. cap. 3. proposuimus methodum, qua hæc omnia distingui possint.*

Secunda causa, qua pars mittens propellit, est qualitas mordax; quam cognoscemus, si viderimus humores æstuarè, & egrotantes feruere. *Quæ vero esse possit determinata qualitas irritans, & mordax, ex dictis in 6. lib. ubi egimus de signis indicantibus succos calidos, salios, & adustos cognoscemus.*

Tertia causa, qua humores à parte mittente propelluntur, est copia, & qualitas mordax vnita; hanc causam ex signis vtriusq. cognoscemus.

Quarta causa, qua pars mittens sana in alias partes aliquando transmittit humores, est dum ab aliquo externo frigore densatur, & densata exprimit humores; hic mittendi modus differt ab aliis; quia nec copia, nec qualitate peccant humores, dum solum capta occasione frigoris densantis partem optimis viribus munitam, promptè exprimuntur illa excrementa, quæ solum longiori temporis cursu expellerentur. Qui veller partem mittentem hoc modo dispositam medicinis tractare, posset patientem in malam valetudinem trahere. Nos vidimus aliquando optima valetudine præditos, ob aerem frigidum aliquorū dierum cursum de stillatione cerebri fuisse vexatos, qui intra breue deinde spacium absumpta materia, quæ non poterat contineri ob densatas particulas, ab externo frigore lanissimi conservarentur, quia pars mittens

*Vnde colligitur ex libro nono, tum ex sufficienti partium enumeratione cognoscemus: hunc in modum fiet sufficiens enumeratio, non præcessit frigus densans, vel calor liquefaciens, neq; pars mittens fuit valde imbecillis, vel à mordaci qualitate molestata, quod cognoscemus ex methodis traditis in 5. & 6. libris, ergo pars mittens solum ab humorum copia coacta propellit. An vero pars mittens illos gignat humores, vel aliunde recipiat, cognoscemus ex iis, quæ dicta sunt de locis affectis in 1. & 6. libris. Demum quomodo cognoscatur, an in parte mittente sit læsio per cōsensum, vel per essentiam, & ubi collocetur idiopathia, vel protopathia, in 1. lib. cap. 3. proposuimus methodum, qua hæc omnia distingui possint.*

*Quædo à mordaci qualitate molestatur, expulsi.*

*Vi pars mittens sana miris humores ob frigus externum.*

vnde quaque sana erat. Empirici, dum iis præscribunt lotiones, stillicidia, cucurbitulas, & alia id genus pro curanda parte mittente, quæ omnino sana est, in erratum manifestissimum prolabuntur.

*Ut pars mittens ob nimium calorem mittat.*

Quinto pars mittens transmittere posset, dū humores ob nimium calorem liquefiunt; in æstate enim dum ardore omnia deflagrant, liquefieri solent humores in alias partes imbecilliores: hic transmittendi modus contingere potest iis, qui habent caput optimis vitibus præditum: qui igitur adiungeret parti mittenti hoc modo constitutæ auxilia, posset potius inferre damnum parti, quam prodesse.

Sexto transmittet ob imbecillitatem, quia non potest detinere; imbecillitas vero ab intemperie, & ab aliis morbis potest prodire, de quibus non est hic locus loquendi omnes enim Morborum ideæ cognosci poterunt ex iis, quæ tradita sunt in 1. & 3. libris.

Sex igitur inveniuntur causæ, quibus pars mittens potest esse disposita: quatum tres sūt in causa, quod pars mittens propellat. Tres vero, quod non possit detinere: causæ expulsionis sunt, quæ proponuntur à Galeno 3. de symp. causis cap. 4. scilicet copia, qualitas, vtraque: causæ vero, quibus pars mittens transmittat, quia non possit detinere, est nimium frigus externum, quod densando causa est expressionis excrementorum, & nimius calor externus, qui liquefaciendo crassâ excrementâ causa est liquefactionis: & imbecillitas partis mittentis, quæ à morbis oriri solet.

{ Expelluntur } à copia  
à qualitate  
ab vtraque

{ A parte mittente  
fluunt humores,  
vel quia

{ à frigore densante, &  
exprimente

{ non possunt detineri. } à calido liquefaciente  
crassos humores.

{ ob imbecillitatem.

*Pro fluxionibus curandis in quos precipue errata incidunt Empirici.*

### CAPUT III.

**D**ECLARATIS modis quibus pars mittens potest esse fluxionis Dorigo, statim infiniti Empiricorum errores redduntur conspicui, &



& manifesti. Illeque erit manifestissimus, dum adiungunt auxilia parti mittenti sanitate præditæ. Sana pars mittens esse solet primo, quando molestata à copia humores transmittit. Secundo est sana, quando exprimit humores, quia à frigore externo condensetur. Tertio, dum transmittit, quia ob nimium calorem externum non possit detinere. Empirici, qui mittenti parti ijs tribus modis dispositæ adiungunt stillicidia, Cauteria, lotiones, & alia id genus, adeo laudunt, ut sæpè in morbum trahant partem mittentem alioquin optima sanitate donatam; nullum fortasse in arte medica est maius erratum, quam partem sanam medicinis tractare, quare, si pars mittens exprimit humores capta occasione ab externo frigore densante, & fluxionem aliquam efficit, quorsum topica, & alia maiora præsidia vis Empirice adiungere mittenti particulæ? si pars mittens, dum copia molestat, se exonerat, & fluxum efficit, quorsum eam vis medicari, si ob fluxionem longè robustior euadat; quorsum vteris astringentibus, quæ semper sunt impedimento mittenti parti, ne excrementorum multitudinem pellat? Præterea dum sanguis in pectus decumbit à capite missus, quorsum vteris diacodio, requie Nicolai, quæ impediunt, ne à pectore elidatur; quæ tollunt motum, & fluxionem humorum, cohibentque in pectore sanguinem, qui in putridum thrombum conuerteritur; post factam enim defluxionem nihil potest esse scelerius, nihilque magis naturæ inimicum, quam inter proprias viscera latebras putridos humores coercere.

Insuper errant Empirici, dum in fluxionibus curandis eadem die & hora plurima, & contraria præsidia administrant, iam secant cubitum, faciunt frictiones, & lotiones varias, deinceps eadem die dant philonium cum recenti theriaca: dant saccharum rosatum cum astringentibus varijs, & eadem hora dant lambitiua; similiter dant diacodium, quod cohibet materiam in pectore, eodemque tempore syrupum de liquiritia, penidia, iuiubas, quæ laxant, & contrarium efficiunt; In hæc sane errata non prolaberentur, si in fluxionibus expendere prius, quomodo sit disposita pars mittens; vbi sint humores collecti, & quomodo sint elidendi.

Egimus in sex præcedentibus libris de ijs, quæ pertinent ad humores. In quinto enim lib. ex saporibus, & periodis ostendimus, quomodo sæpè cognosci possint humores prædominantes; In sexto quomodo per syndromem signorum communium possimus omnes humores, & flatus absconditos in corporis latebris pernoscere. In septimo quomodo ex saporibus, & coloribus humorum mixturæ cognoscantur, & quomodo latentes penetrentur, & quot fieri possint. In octavo de humoribus, ut substantia peccant. In nono de quantitate. In hoc decimo de motu: etenim hæc fuerunt in prohemio proposita, hæcque videntur esse conferentia pro exacta cognitione peccantium humorum.

*Ut errant  
Empirici dū  
eadem hora  
contraria ad-  
ministrant  
præsidia.*

*Epilogus v-  
niuersalis.*



## S A N C T O R I I


## S A N C T O R I I

Iustinopolitani

## DE PRINCIPIIIS METHODI

*medendi à fonte analytico exhaustiendis**& confirmandis.*

## LIBER VNDECIMVS.

*Prohemium.*

CTVRI in quinque sequentibus libris de præstantissima illa Medicinæ parte, quæ pertinet ad solertiam pro inueniendis remedijs: erat necessarium, vt in hoc libello prius ostenderemus, quod à fonte analytico omnes proprietates, & conditiones indicationum, & omnia methodi principia, quorum virtute Galenus, & ante ipsum Hippocrates potuerunt artificiosissimam medendi methodum constituere, exhaustiantur; clara enim est opinio Galeni 2. method. cap. 6. vbi proponit, se in tota methodo solum de logica tractaturum: par igitur erat, vt semel videremus, vnde Galenus hanc logicam desumpserit, cuius virtute tam præclaram medendi methodum potuerit in lucem promere. Deinde ostendemus, quod omnes viæ ab Empiricis, vel Methodicis inuentæ pro auxilijs inueniendis vacillent, & in numero paralogismorum collocentur.

*De secta Empirica.*

Tres præcipuæ fuerunt medicorum sectæ, Empirica, Methodica, & Dogmatica: omnes tamē crediderunt, Hippocratem fuisse suæ sectæ auctorem. In Empirica floruit Acro, qui, vt dicit Galenus libro de subfiguratione Empirica cap. 1. fuit primus, qui de hac secta scripsit, deinde secuti sunt illum Rasis, Serapio, & alij plures: ij non quærebant causas, quia putabant, illas esse incognoscibiles, sed solum ex syndrome eligebant remedium ab alijs inuentum. Dum laborabant pro inueniendis remedijs, adhæc tria confugiebant, ad *ana lo-* scilicet inspectionem propriam, ad historiam, & ad analogismum: vtebantur



analogismo, id est argumento à simili in his tribus, in materiis auxili-  
liorum, in affectibus, & locis affectis.

In Methodica Themison, & Soranus fuerunt præcipui, tempore- *De Metho-*  
que Neronis floruit quoque Thesalus, qui teste Plinio tam grandem *dica.*  
pecuniam, & existimationem comparatus est, ut in via Appia in illius  
monumento de ipso legeretur, quod fuerit *id est*, victor Me-  
dicorum. Putabant sex mensium curriculo totam artem medicam  
posse addisci; etenim omnes morbos solum referebant ad commu-  
nissima, scilicet ad laxum, densum, & ex iis mistum: in iisque quies-  
cebant, neque ad specificas differentias morborum descendebant.

In Dogmatica, cuius sectæ auctor re vera est Hippocrates, quem *De Dogma-*  
Galenus, Avicennas, innumerabiles sequuntur, alio ingenii acumine, *tica,*  
alioque spiritu artem medicam construxit; Empirici enim analogismo  
fallaci, & deceptorio incedebant; Dogmatici demonstracionibus cum  
experientia iunctis philosophantur; Methodici in communissimis per-  
sistebant; Dogmatici non solum generalissimas indicationes expen-  
dunt; sed, ut dicit Galenus 2. method. 7. & 1. meth. 1. & alibi à genera-  
lissimis ad subalternas, & à subalternis ad specificas differentias co-  
gnoscendas procedunt, habentque artem præclare fundatam, & in  
perquirendis remediis seruant veras artis condiciones, exordiantur  
à fine, ordine scilicet resolutiuo, & nunquam desistunt, donec ad vl-  
timas perveniant differentias; quem procedendi modum esse perfectæ  
artis conditionem docet Aristoteles 7. meth. text. 23. & 3. de moribus  
cap. 1. ubi dicit, artis ordinem esse à fine, 6. de moribus cap. 5. & 7. cap.  
8. ubi dicit in actionibus finem esse principium, sicuti in mathemati-  
cis suppositiones; hoc resolutiuo ordine Galenus, & Auerroes in  
suo colligit totam artem medicam tradiderunt.

Dogmaticos igitur insequemur, qui virtute indicationum potue-  
runt hanc frugiferam methodum componere; ostendemusque, quod  
principia methodi, proprietates, & condiciones indicationis à fonte  
analytico sint exhaustæ, & quod aliæ viæ, quæ per analogismum Em-  
piricum, & experientiam sine demonstratione procedunt, sint ine-  
ptæ, eæque per falsos syllogismos, & petitiones principiorum ad  
communissima errata sectatores perducant, ad quos duos fallendi  
modos quælibet falsa methodus sit in medicina, sit in physica, & de-  
denique sit in Iurisprudencia, reducitur; & quælibet bona, & vera  
virtutis logices cognoscetur, quinimmo in nullum prolabemur erro-  
rem, qui non accadat ob logices imperitiam: illa enim ex Galeno  
loco superius citato est omnium methodorum prima radix.

*Ut ad duos  
errandi mo-  
dos omnia  
errata redu-  
cantur.*

*Ostenditur ex Aristotele, & Galeno in methodo per solam indicationem perquiri posse remedia; & nequaquam per experientiam, & analogismum.*

## CAPVT II.

**S**IN quàm logica facultas aliquid præstitit opis medicinæ, in præsentia summum debet asserere emolumentum, quia agendo de virtute methodi, ne verbum quidem moueri potest; nisi id prius ab analytico fonte desumatur, & secundum leges logicas decidatur: hæc sententia videtur esse Galeni 2. method. c. 6. vbi utitur iis verbis: de experimentalis inuentione alibi egimus, de logica in his cōmentariis dis-  
 22. lerere proposuimus: Quod vero in methodo solum per indicationem perquirantur remedia, & nequaquam per analogismum, & experientiam; nunc facile colligi potest ex Galeno 1. method. cap. 4. vbi dicit, institutum esse sermonem habere de remediis, quæ non Empiricæ, sed methodo, & per indicationem inueniuntur; quare methodo inuenire erit per solam indicationem auxilia deprehendere, excludit igitur experientiam, & analogismum, quibus Empirici in remediis perquirendis utebantur: deinde 12. method. §. habet, si alteratio in spiritu fiat, vel ab aliquo venefico, vel à quolibet alio veneno, esse negotium extra methodum medendi, & ratio est, quia non potest indicatione comparari, sed alio instrumento, experientia scilicet, & analogismo.

*Ex Aristotele & Galeno probatur, quod ad methodum pertinere solam indicationem, & non experientiam, vel analogismum.*

Cæterum, quia ab initio constituimus analyticis philosophari, quibus Galenus quoque potuit methodum, & alia immensa volumina in lucem promere, idcirco ab hoc fonte desumemus rationes, cur à methodo solum indicatio, & nequaquam experientia, & analogismus comprehendatur. Aristoteles 2. priorum cap. de inductione dicit, methodum habere formam syllogismi. Quo fit, ut merito colligere possimus methodum ab vniuersali procedere, nullus enim est syllogismus qui non sit fundatus in dicto de omni, vel de nullo: colligimusque, analogismum, & experientiam non pertinere posse ad methodum, quia ex particularibus solum procedunt. Insuper 1. priorum loquens de diuisione dicit, quod diuisio est parua particula methodi, quia diuisio est imbecillis syllogismus, ex quibus verbis rectè colligit in illo loco Alexander Aphrodisæus, quod Aristoteles per methodum intelligat perfectum syllogismum, quare non experientia, & analogismi, qui carent virtute illatrice, ut infra melius patebit, spectabunt ad methodum; sed indicatio, quæ non à particularibus, sed ab vniuersalibus procedit.

*Ex Galeno.*

Ex Galeno idem patebit, etenim 4. method. 4. declarans quid sit methodus, dicit, esse viam vniuersalem, prout cuilibet singulari possit applicari: methodus reuera non esset bona via, nisi ab vniuersali ad minus vniuersale cum illatione procederet: cæteræ enim omnes  
 via,



viæ, quæ à singularibus ad vniuersale procedunt, sicuti sunt exempla, inductiones imperfectæ, analogismi, & experimenta, sunt exploræ, & reiectæ ab optimo syllogismo, vt inconcludentes, & necessitate omnino carentes: methodus tamen, cum à fine ad ordinata in finem procedat, erit syllogismus à priori, & à causâ finali procedens, & in numero syllogismorum concludentium collocabitur. Galenus 3. method. 9. causam, impedimentum, & vrgens, quæ vere indicant, vocât fines; indicatio vero, cum ex materia cognita indicantis procedat, ostendit & insinuat remedia, quæ antea erant tenebris inuoluta; sola ergo, & vnica indicatio ad methodum medendi pertinebit.

Amplius illud sciendi instrumentum ad methodum medendi pertinebit, quod est ab vniuersali: ostendi potest exemplis, quod omnia remedia, quæ particularibus applicantur, si aliquid boni, vel mali efficiant, id virtute specifica fiat: si tertiana Socratis tollitur rhabarbari drachma, id fit tum ratione illius specificæ rhabarbari virtutis, tum ratione illius determinati gradus tertianæ Socratis, qui est quid specificum, quia prædicatur de infinitis indiuiduis; infinita enim indiuidua inueniuntur tertiana obfessa, quæ illa specifica virtute rhabarbari curari poterunt; omnia itaque remedia, quæ inueniuntur, & omnia inuenta, quæ accommodantur indiuiduis, aliqua virtute specifica operantur. Hinc sapientissimus Galenus, qui profundè omnia nouit libro de optima secta ad Trasib. capit. 48. de hac re loquens habet, quod à specifico affectu indicetur morborum expulsio; quare si indicatio pro remediis inueniendis desumitur ab esse specifico, & vniuersali, erit syllogismus, & sola pertinebit ad methodum medendi, si enim indicatio à singularibus, & non à specifica natura desumeretur pro morbis pellendis, careret illatione syllogistica, esset incognoscibilis, & omnino vana in remediis perquirendis. Sed, vt res omnibus pateat, experiamur exemplis, an res ita se habeat.

Si indicatio est syllogismus, requiruntur tres termini ita sibi coherentes, vt tertius ex duobus inferatur; exempli gratia primus terminus, vel maior extremitas erit remedium; secundus terminus, vel medius erit indicans, ex quo inferitur remedium; tertius erit minor extremitas, quæ omnibus subicitur, & est infimus omnium, quique non solum sub primò, verum etiam sub secundo locatur, eritque indiuiduum aliquod, quod aliquo specifico affectu sit correptum; erit igitur indicatio perfectus syllogismus. Hic ab illis discedimus, qui arbitrantur indicationem esse syllogismum imperfectum; quia in syllogismo imperfecto nulla esse potest bona illatio; valere debet hæc, bona est illatio ratione formæ in indicatione; ergo est perfectus syllogismus: est perfectus, quia ab vniuersali procedit per tres terminos naturales: est perfectus ratione materiæ, quia procedit ex veris, ex notioribus, & causis cognitionis remediorum: est perfectus; quoniam versatur in medio specifico non particulari; & corruptibili, sed æterno, de quo scientia habetur: est perfectus, quia procedit semper à continente ad contenta, perpetuoque habet maiorem vniuersalem:

*Quod omnia remedia, & omnes morbi naturâ specificam habent.*

*Ostenditur, quod indicatio sit syllogismus habensque tres terminos naturales.*

*Reijciuntur qui putant indicationem esse syllogismum imperfectum.*

nulla itaque inuenietur conditio perfecti syllogismi ab Aristotele tradita, quæ indicationi non conueniat: quo pacto vero exponi debeat Galenus libro de optima secta ad Tranlyb. & alibi, dum dicit, indicationem esse comprehensionem iuuantis sine ratiocinatione, antequam huic capiti coronidem imponam, explicabimus.

*Ostenditur,  
per experientiam  
nihil  
concludi pos-  
se.*

Posito, quod methodus seruet naturam perfecti syllogismi, & quod solum virtute indicationis inueniantur remedia, vt probatum est, sequitur, quod reliqua instrumenta experientia scilicet, & analogismus, quæ non seruant syllogisticam virtutem, sint extra methodum: patet de experientia, quia non procedit ab vniuersali: est auctoritas philosophi i. metap. in principio, quod experientia versetur tantum circa singularia. Præterea experientia, cum procedat ab eodem ad idem, à singulari scilicet ad singulare, nihil concludit, quia petit principium: nunquam valebit, rhabarbarum Socrati contulit, ergo & Platoni; nisi id inferatur merito alicuius specifici indicantis. Individua sunt infinita, & incomprehensibilia, & non operantur, nisi ratione alicuius specificæ differentiæ. Hinc Aristoteles probauit libris priorum ex puris particularibus nil sequi, ratio huius traditur ab Auerthoe in epitome illorum librorum, qui dicit, quod radix omnium syllogismorum concludentium sit dictum de omni, & de nullo. Præterea ab experientia particularium nil sequitur, quia cum particularia sint corruptibilia, corruptibilem facerent conclusionem, & per consequens scientiam, quæ est fructus conclusionis. Demum nihil ex particularibus inferitur, quia particularia sunt contenta, nec aliud continere possunt: omne enim quod inferitur, virtute continentis inferitur: verum alia plura dicentur in sequenti libro cap. de falsa experientia: satis est nobis, vt hic à methodo, ratione Galeni, & Aristotelis auctoritate experientiam excludamus.

*Ostenditur  
per analogis-  
mum nihil  
concludi pos-  
se.*

Sicuti experientia nihil concludit, estque extra methodum, quia est Inductio: similiter analogismus erit extra methodum, quia est exemplum; primo non concludit exemplum, quia ex Aristotele i. priorum reducitur ad tertiam figuram cum conclusione vniuersali, in qua minor nunquam conuertitur, quod est in analyticis monstruosum. Aristoteles quoque amouet exempla à syllogismis, quia ostendunt primum de medio per simile tertio, quod omnino à principiis analyticis abhorret: abhorret, quoniam, si medius terminus est similis, & non vniuocus, sit transitus de genere in genus. In methodo perquiruntur remedia per syllogismum à fine ad ordinata in finem in eodem genere, & merito, quia contrarium vnius generis non potest esse contrarium alterius: album contrariatur nigro, quia album & nigrum colorum genere conueniunt, non tamen album contrariatur dulci, cum genere di. creper; similitudines igitur differunt genere: quæ vero conueniunt, non possunt dici similia; quia eandem naturam, & idem quod quid est genericum habent; cum igitur analogismus sit argumentum à simili ad simile, nullo modo poterit aliquid concludere: accedit, quod Aristoteles i. post. tex. 19. dicit, si argumentum debet concludere, debet habere media, & extrema, quæ sunt eiuſdem generis.



neris. Huic veritati plurima, quæ dicuntur ab Aristotele in libris post consentiunt; dicit philosophus, conclusionem geometricam ex principio arithmetico inferri non posse, quamvis Arithmetica, & Geometria saltem genere generalissimo conveniant; quanto minus ex medio simili, & analogo aliquid concludi poterit? Sequitur ergo, quod experientia, & analogismus sint extra methodum, careantque virtute syllogistica, & nihil, quod sit ignotum certa illatione notificare possint.

Sed occurrit magna dubitatio, quia diximus, indicationem esse <sup>Dub.</sup> perfectum syllogismum, quod videtur Galeno libro de optima secta cap. II. & aliis in locis aduersari, ubi dicit, indicationem fieri sine experientia, & ratiocinatione. Respondetur, processum à cognitione indicantis ad cognitionem indicati fieri cum discursu; cum tamen <sup>Sol.</sup> sæpè esse adeo velocem, ut vix à nobis animaduertatur; & propterea dictum fuisse à Galeno esse sine ratiocinio: quod re vera, si omnino sine ratiocinio intelligeretur, à Galeno quoque non admitteretur: nihil enim quod percipitur, est nobis connatum ab ortu naturæ; anima enim nuda, & tamquam tabula rasa in hanc lucem venit; omnia igitur vel comparantur experientia, vel discursu, sed indicatio non comparatur experientia, ergo discursu, eo magis cum non detur alter modus sciendi occulta. Hinc Auerrhoes de communibus principiis, & dignitatibus loquens 2. post. in fine dixit, eorum cognitionem non esse nobis connatam, sed inductione cognosci, tempus tamen inductionis à nobis non animaduerti; quare, si ex Auerrhoe percipiemus per inductionem velocissimam principia notissima, qualia sunt, omne totum est maius sua parte, & similia, cur non poterimus dicere indicationem, quæ per experientiam, & inductionem non potest haberi, fieri quoque cum discursu? cogimur alterum duorum fateri, vel quod cognitio indicatorum sit nobis connata, quod est omnino falsum, vel per inductionem, & experientiam acquiratur, quod repugnat Galeno, qui semper distinxit experientiam ab indicatione, vel quod indicatio fiat cum discursu velocissimo, quod est illud, quod volumus: demum exemplum huius velocissimi discursus, qui fit ab indicante præcognito, ad perquirendum indicatum, observatur quoque in demonstratione propter quid, dum scilicet ab effectu notiori procedimus ad cognoscendam causam, & deinde ab illa regredimur post mentalem quandam considerationem ad effectum, sicuti Aristoteles à motu æterno Motorem æternum cognouit, & deinde regrediens à Motore æterno ad motum æternum demonstrationem propter quid formavit, quæ potest vocari verum cuiusque discursus exemplar.

*Referuntur attributa indicationis, & logica virtute detegitur errorum illorum, qui morbos in causas diuidunt.*

## CAPVT III.

**G**ALENI auctoritatibus, & rationibus ab altiori schola desumptis, ostensum est superius, quod methodo procedere non sit per experientiam, vel analogismum, sed per solam indicationem remedia inuenire. Sequitur itaque, vt ex animo in hoc libello declaremus conditiones, & proprietates huius frugiferae, & fructuosae indicationis, quando eius præcognitio tam admirabilem utilitatem nobis pollicetur. In perfacili cognitione sanè versaremur, si satis nobis esset referre, quæ à Galeno de indicatione sapientissimè traduntur.

*Quæ sint præcipua attributa indicationis.*

Audias quam paucis potissima fundamenta, quæ ad veram indicationem pernoscendam nos ducunt, possint ex Galeno huc transferri: 2. meth. 7. & plerisque in locis in optima perquirenda indicatione docet, non esse transeundum de genere in genus, sed esse diuidenda generalissima in subalterna eiusdem generis, & hæc in specifica, ex quibus solum colligi possunt præsidia: 9. method. 14. quod nunquam in facienda hac indicantium diuisione sit transeundum de genere morborum, in genus causatum, nec versa vice, de quo principio in hoc capite agemus: libro de optima secta ad Transyb. cap. 48. dicit, quod non à generalissima, vel subalterna indicatione, sed solum à specifica indicetur morborum expulsio: 1. meth. 5. dicit, de ratione indicantis esse, vt sit notius indicato: libro de optima secta cap. 40. & 2. method. cap. 13. quod vnum indicans indicet vnum contrarium, & non plura: 4. method. 3. quod debeat esse præses: 3. method. 1. quod sit illud quod curatur: 7. method. 12. quod omnia indicantia debeant referri ad tria scilicet ad vrgens, ad causam, & ad impedimentum. Demum 1. method. 9. quod symptomata sint accidentia morbi, & non indicent: libro verò 11. cap. 12. quod symptomata nullam habeant subsistentiam, & semper sint in fieri: & tandem 3. method. cap. 1. & alibi, quod bona indicatio sumatur ab essentia indicantis, & nequaquam ab eius accidentibus: per hæc præcipua fundamenta Galenus potuit methodum, vel artem perquirendorum remedium nos docere; potuitque inde tot ac tanta de arte medica in lucem promere.

Ego autem conuertens mentis aciem ad hæc methodi arcana, & videns, quod omnia, quibus nixus est de indicatione referre pendeant ab analytico fonte, vt ipsemet Galenus 2. method. cap. 6. testatur; optimo factu existimaui, si ostendero, quod omnes conditiones indicationis, quas iam recitauimus, à logica pendeant, & quod altiori veritatis robore possint confirmari. In primis se offert, vt explicemus, quibus principiis commotus voluerit, indicantium diuisionem fieri in eodem genere, nullo vnquam transitu de morbis in causas commiss-



so; sed à generalissimis ad subalternas, & ab iis ad específicas perueniendo indicationes. Hæc diuisionis indicantium conditio non vno loco à Galeno proposita multoties ab Aristotele confirmatur: 2. enim post. text. 19. docet, quod quid est inueniri non posse, nisi facta diuisione in eodem genere: si igitur naturam, & quod quid est indicantis pernoscere voluerimus, opus erit eandem philosophi præceptionem seruare: nunquam enim remedium inuenire poterimus, nisi quod quid est indicantis præcognoscamus. In eodem genere indicans, & indicatum, quod est eius contrarium inuenitur: & merito indicantis percipitur indicatum; quare, si fiet transitus de genere in genus, neque indicans, neque indicatum inuenietur: non indicans, quia, ut tale, non est, nisi in vnicogeneris: non indicatum; quia contrarium vnius generis nunquam potest esse contrarium alterius: quia ex Aristotele in prædicamentis genera, eorum differentia, & proprietates sunt omnino impermiscibiles; debet igitur diuisio fieri in eodem genere.

*Prima ratio à logica desumpta. qua ostendit non esse transeun- dum de genere in genus.*

Præterea idem quoque hac experientia confirmatur, nigrum non opponitur calido, nec album frigido: quia genera colorum, & primarum qualitatum inter se differunt tanto minus proprietates generalissimorum generum sibi inuicem aduersabuntur: magnum, vel paruum, Dominus, vel seruus, quæ pertinent ad oppositionem relationem, non opponuntur calido, vel frigido; quia genere differunt. His morbus Galenus 9. method. 4. dicit, quod nullo modo morbus debeat diuidi in causas, quia morbus, & causa genere differunt: docet iis verbis Galenus hoc analyticum arcanum: affectus verò haudquaquam in causas deduci est aptus, sed in differentias, nam aut in similaribus consistit partibus, aut in instrumentariis: in similaribus est temperies, &c. O quam sæpissimè rudiores nostrates in vitiosam hanc diuisionem incidunt: sunt enim qui diuidunt febres hoc modo, alia est biliosa, & alia est melancholica. Sunt præterea, qui diuidunt intemperies dicendo, quod alia sit cum materia, alia sine materia, quæ diuisiones sunt vitiosæ; quia fiunt cum transitu de genere in genus; intemperies enim est morbus, humor peccans est causa efficiens; quod erratum adeo Aristotelis & Galeni principiis repugnat, ut omnino sit inexcusabile.

*Secunda ratio.*

*Analyticum arcanum à Galeno confirmatum.*

Insuper 2. post. cap. 8. docet, nunquam diuisionem esse faciendam per differentias, inter quas cadit medium, quia erramus, vel supponendo aliquod falsum, vel superfluum adiungendo, vel aliquid adimendo; si igitur diuiserimus morbum in differentias alterius generis, dabitur medium in differentis, unde fiet error addendo superfluum, vel adimendo aliquod necessarium requisitum, & nunquam indicans, vel indicatum inuenietur. Idem colligimus ab exemplo Aristotelis proposito in eodem cap. ubi dicit, si animal diuideretur in has differentias, quod habeat penas scissas, vel integras, diuisio redderetur vitiosa; quia diuideretur per differentias accidentales. In qua diuisione duo essent errata, primum quia fieret transitus de genere in genus; animal enim est substantia, habere penas est accidens. Secundum, quia habere penas scissas, vel integras non sunt diffe-

*Tertia ratio.*

rentiæ animalis, sed auium, eaque accidentales; accedit, quod indicata non sunt accidentia illius generis, in quo indicans collocatur: sed sunt species, de quibus genus prædicatur in quid, & per se primo modo; æquè enim de colore prædicatur albedo, vt nigredo. Quid arcanum nos docet subtilissimus Auerthoes, qui loquens de numero prædicatorum primi modi dicendi per se, dicit hæc quinque in eo inueniri, genus proximum, differentiam proximam, differentiam remotam, genus remotum, & totam definitionem: exempla pro his quinque prædicatis declarandis essent, si de febre diceremus, quod esset morbus, quod esset morbus similarium, quod esset intemperies, intemperies calida, & quod esset intemperies calida, & sicca omnium partium corporis: omnia hæc prædicata, quamuis subalterna genera essent centum & ultra, dummodo sint eiusdem generis, & reduci possint ad aliquod ex quinque prædicatis, erunt primi modi; omnia enim vnicam naturam, & quidditatem declarant: similiter ita in primo modo est hæc propositio, homo est rationalis, vt hæc, homo est viuens, est sensitiuus, & est substantia. His primis motus principiis Galenus dixit, quod à generalissimis ad subalterna, & ab illis ad specifica sit descendendum, vt essentia indicantis inueniatur: optimè nouerat, quod omnia vniuoca prædicata in generibus proponuntur, vt specifici indicantis naturam melius declarent, & melius indicata seu remedia insinuent.

*Quarta ratio.*

Quæ vero dicuntur de morbis non possunt accommodari causis antecedentibus, quia causæ, & attributa, quamuis explicent, & insinuent morbi naturam, in eodem modo dicendi per se de morbo non prædicantur; bilis efficiens tertianam de febre tertiana prædicatur in quarto modo, id quo locantur causæ efficientes, quæ loco aliquando à causatis separantur; nunquam tamen inuenietur attributum essentiale explicans essentiam in primo modo dicendi per se, quod loco, vel definitione à proprio genere, vel subiecto separari possit. Cum igitur causæ efficientes, & attributa morbi essentialia genere differant, contrarium vnius non relictabitur alteri: hinc quod relictatur febri non est necessarium, vt relictetur bili, vel pituitæ, est tamen necessarium, vt relictetur febri, vt est intemperies, & vt est morbus: hinc contrarium, quod destruet hominem, destruet vt est animal, & substantia: omnia enim genera, & differentiarum remotæ, & proximæ vnitæ formam specificam constituunt; vltima enim differentia est epilogus omnium propriorum generum, & differentiarum existentium in eadem linea prædicamentali: alienæ verò differentiarum erunt accidentia, quia solum suis generibus, & speciebus per se conueniunt; nisi dicamus, quod proprietates generum sint permiscibiles, quod est omnino à philosophiæ principiis alienum. Quibus rationibus motus Galenus, qui omnia ab hac altissima philosophia desumpsit, dixit, quod non sit transeundum de genere in genus in specificis indicantibus, dixitque

*Definitio  
differentia  
vltima.*



dixitque 1. method. 1. quod nullo modo conueniat capere indicationes ab accidentalibus differentiis.

Præterea, vt in tanto negotio aliqua vtamur solertia, alia adiungamus, vt quæsitum aliis analyticis principiis roboretur: si non licet morbum diuidere in symptomata propria, quæ immediatè à morbo semper dependent, & in secundo modo dicendi per se de ipso prædicantur, quanto minus licebit diuidere morbum in causas efficientes, quæ minus adnexæ sunt morbis, cum loco aliquando separari possint à morbis; & in quarto modo de morbis prædicentur? Ille igitur, qui transibit de genere causæ in genus morbi, vel vice versa nunquam inueniet indicans, vel indicatum proprium, neque sciet leuissimum, & facillimæ curationis morbum certa, & infallibili methodo curare: quia indicans, & indicata sunt in proprio, & non alieno genere; ratio singularis, cur, si quis perquireret remedium in alieno genere centum annorum tractu, illud nunquam inueniret, est, quia vni contrario vnica sola est contrarietas, quæ genere conuenit; de quo tanto principio in hoc libello in proprio capite secundum easdem leges logicas tractabimus.

Ab iis rectè præcognitis facillè colligere poterimus quoties rudiores medici in perquirendis propriissimis indicationibus à recta philosophandi ratione deflectunt. Sed, vt aliquis famosus error ab imperitia logicæ dependens notetur, afferatur talis, qui satis communis est: quidam putant, magnitudinem morbi per se primo indicare pharmacum, & venæ sectionem: primo errare videntur, quia vni vnica est contrarietas; ipsi tamen putant venæ sectionem, & pharmacum æquè aduersari morbo magno. Secundò, quia transeunt de genere in genus, morbus magnus est vnum genus, venæ sectio, cum euacuet, primo respicit causam, & est aliud genus. Tertio, quia morbus magnus est differentia subalterna, in qua non est persistendum, vt paulo post in proprio capite ostendemus; affectus præter naturam vehemens, indicat remedium vehemens & magnum, remedium verò magnum, & vehemens est subalternum, quod diuiditur in pharmacum, & venæ sectionem, vel in alias auxiliorum species. Quarto, quia contrarium, quod reluctatur indicanti, inuenitur in specificis, & non subalternis differentiis, qualitas enim prædicatur vel de colore, vel de sapore, contrariū dulci nō potest reluctari colori albo, quia, in eodem genere, sub quo nō datur aliud subalternum, inueniuntur contraria specifica; sub coloris genere non est aliud genus, sed solum sunt colores, qui specie inter se differunt, & in quibus resident contrarietates illarum specierum. Quinto, si remedium magnum est indicatum, quod ab affectu præter naturam vehementi, & magno per se indicetur, ergo venæ sectio per accidens indicabitur à morbo magno; hæcenus enim non est inuentus tam rudis philosophus, qui rationem illam analyticam reiiiceret, quæ est, quod vni per se, alteri per accidens conueniat, quare ea posita, sequetur necessario, morbum magnum primo, & per se venæ sectionem non indicare, cum ab illo primo, & per se indicetur ma-

gnum remedium : quo pacto verò se res habeat, & quomodo defendi possit Galenus, dum dixit, magnitudinem morbi indicare venæ sectionem, in sequenti libro declarabimus.

Septima ratio.

Tandem, ut aliis analyticis rationibus confirmemus, quod transitus de genere morborum in causas non possit concedi, non omittemus illam Aristotelis præceptionem textus 20. primi libri post. quæ est, quod nunquam possit probari conclusio geometrica per principium arithmeticum: vult enim eo loci, quod media & extrema sint eiusdem generis; quare, si medius terminus, qui docet nos passionem propriam, est eiusdem generis, quanto magis in cognoscendis specificis indicantibus, quæ cum suis generibus in primo modo dicendi per se conveniunt, debemus procedere per ea, quæ sunt eiusdem generis?

Ostia ratio.

Præterea, si non licet ex philosopho in demonstrationibus uti principiis communibus pro cognitione passionis, sicuti ab illo ostenditur in famoso illo paralogismo Brissonis de quadratura circuli, quanto minus licebit transcendere, ut cognoscamus propriam indicans: sed melius, quanto minus licebit transcendere in cognoscenda non dicam passionem indicantis, sed naturam ipsius meri indicantis, quæ est medius terminus ducens nos ad cognitionem remediorum? Hæc itaque sunt principia, cur potuit Galenus firmiter sustinere, quod in divisione indicantium nunquam sit transcendendum de genere morborum in genera causarum.

*Vnde in logica desumatur, quod à generalissimo, vel subalterno genere affectus præter naturam non indicetur curatio.*

#### C A P. IV.

**G**ALENVS 1. ad Glauc. cap. 1. refert, quod tribus modis in perquirendis indicationibus rudes medici possint errare: primo, dum vitiosè diuidunt transcendendo de genere morborum in genus causarum, vel versa vice, de quo errandi modo egimus superius. Secundo, dum in generalissimis indicationibus persistunt. Tercio, dum in subalternis. Nunc sequitur, ut eadem virtute logica duo hæc sequentia errorum genera explodamus: pertinet quoque hoc ad analyticum fontem, quia, qui rerum naturas specificas perquirunt, & in genericis stant, in duos impingunt scopulos, scilicet in petitiones principiorum, & in falsos syllogismos.

Ut incident in principij petitionem, qui ad specificam non perveniunt.

Quod petant, patet, quia, quod convenit superiori supponunt inferiori adaptari posse: exemplum est, dum dicunt, tertianam indicare calcfaciendum, & exsiccandum, quod non convenit tertianæ, ut tertiana, sed ut est intemperies calida, & sicca, quod est genericum; tertiana enim est species intemperiei calidæ, & siccæ. Horum Medicorum erratum est unum de tribus erroribus circa universale, quod ab Aristotele 1.

post.



post. cap. 5. est reiectum. Sed ut res eluceat, exemplis tractetur: tertiana erit calida ut duo; hæc intemperies, si expelli debeat, non casu, & fortuito eligitur auxilium refrigerans, quia ex omnibus refrigerantibus, quæ sunt sub orbe Lunæ vnicum solum dabitur, quod erit huic tertianæ contrariū proportionatum & iuuas; est enim inter auxilium, & morbum illa proportio, quæ est inter causam efficientem, & effectum, quam proportionem Aristoteles ad quartum modum dicendi per se retulit; causa igitur non erit causæ illius effectus, vel auxilium non erit auxilium tertianæ, nisi fuerit proportionatum, & proprium, quod ei soli conueniat; qui igitur in genericis indicationibus stant, non inuenient auxilium, quia illud proprium, & proportionatum refrigerans à solo gradu caloris tertianæ colligitur, quod est quid specificum, & nequaquam genericum; nimium, vel exiguum frigus nunquam inducet sanitatem, quia nimium efficeret nouum morbum, exiguum tertianam non vinceret; quare, cum nulla sit proportio inter indicans specificum, & auxilia generica, auxilia generica nullam vim, nullamque necessitatem operandi habebunt: neque generica indicantia nobis insinuare poterunt auxilia proportionata, & vera.

Præterea auxilia (& hæc est potissima ratio) specifica, quæ sunt causæ sanitatis, in nullo modo dicendi per se de indicantibus genericis prædicantur; non in primo, quia auxilia, vel indicata respectu morbi sunt causæ efficientes; in primum enim solum internæ causæ ingrediuntur: non in secundo, quia indicata sunt causæ efficientes externæ: non in quarto, quia nulla est proportio (ut probauimus) inter causam specificam, & affectum genericum, ergo in nullo, ergo non inducent sanitatem, quia nullam cum affectibus habebunt proportionem.

*Ratio polyti-  
ca.*

Amplius, qui à genere desumit indicans specificum in parallogismum incidat oportet; colligitur ab Aristotele 2. post. 12. ubi aperte reiecit consequentiam à genere ad speciem; utitur Aristoteles hoc exemplo, si quis probaret glaciæ esse in aqua, quia in aqua est defectus caloris, incideret in parallogismum cū principij petitione, quia, qui dubitat de glaciæ, eodem prorsus modo dubitabit de defectu caloris, etenim medius terminus, quo aliquid inuenitur, non potest esse definitio maioris extremi, sed ratio quidamatiua subiecti, vel causa aliqua extrinseca: qui probaret in Luna esse eclipsem, quia in illa sit priuatio luminis, faceret demonstrationem ridiculam; quia esset per definitionem eclipsis; qui igitur colliget remedia, exempli causa, à pleuritide quatenus est inflammatio, & pleuritidi remedia generica applicabit, expressum transicum à genere ad speciem, qui nullo modo ab Aristotele admittitur, committet.

*Ut parallogi-  
zent qui ab  
affectibus ge-  
nericis reme-  
dia colligunt.  
Prima ratio.*

Præterea, si indicatum genericum esset accommodatum indicanti specifico, sequeretur quod indicans non vnum indicaret, sed plura; scilicet genericum, & specificum, quod relictatur Galeno Aristoteli, & rationi. Galenus libro de optima secta ad Traityb. cap. 40. & alibi, ubi dicit, vnum indicare vnum, & non plura. Aristoteles quoque de cælo

*Secunda ratio.*

virtute huius principij, quod vni vnum sit contrarium, inuenit celestia corpora non constare ex eminentiis elementorum, vt Plato censuit; sed esse quintam essentiam omnino distinctam ab elementis. Rationi, quia in omni genere vniuoco inuenitur, quod vni vnica sola est contrarietas. In colorum genere sola albedo aduersatur nigredini, & non alia coloris species. In saporum genere dulcedini sola amaritudo reluctatur. In aliis qualitarum generibus mollitiei durities, lentori friabilitas, grauitati leuitas, crassitie tenuitas, asperitati lenitas, & raritati densitas; neque in superioribus generibus inueniuntur alie differentie, vel species, quæ iis reluctantur. Verum, quod vnum indicet vnum, altioribus rationibus desumptis ab analyticis primordiis in proprio capite colloquemur.

*Tertia ratio.* Insuper, si omne calidum, quod est in nostro orbe, est tale, vel in primo, vel secundo, vel tertio, vel quarto gradu, ergo omnia erunt specifica, & non generica; probauimus superius, quod quilibet determinatus gradus prædicetur de pluribus numero differentibus; vt quid ergo volumus indicationes à genericis haurire?

*Quarta ratio logica.*

Quod verò, qui à genericis colligunt auxilia incidant in falsos syllogismos, patet, quia progressus à communibus indicatis pro specificis indicantibus tollendis est à causa remota: cadet igitur discursus in argumentum à positione consequentis ad positionem antecedentis: nunquam valebit hæc consequentia, est calidum, ergo est calidum vt duo; valet tamen à positione antecedentis ad positionem consequentis, scilicet est calidum vt duo, ergo est calidum.

---

*Vnde sit, quòd à singularibus non hauriantur indicationes, sed solum ab affectu specifico.*

#### C A P V T V.

**Q**UOD à specifico affectu indicationes solum desumantur, nos docet Galenus non vno loco, & præcipuè libro de optima secta ad Trasylb. cap. 48. vbi aperte dicit, morborum expulsionem à specifico affectu indicari, & optima cum ratione; quia, quæ methode traduntur, sunt vniuersalia, & nequaquam singularia. Galenus 4. method. 4. vocat methodum viam vniuersalem, nos quoque superius logica virtute probauimus, indicationem desumi ab vniuersalibus; ostendimus tamen, quod hæc vniuersalia, à quibus indicationes desumuntur, non possint esse generalissima, vel subalterna, sed solum specifica.

Hic par est, vt examinemus, an à singularibus possint desumi indicationes: occasio, quæ nos mouet ad hoc querendum, est, quia omnes morbi videntur prima facie esse indiuiduorum, & sola indiuidua omnibus videantur sanari, vel mortem obire, & non species. Quod igitur à singularibus nullo modo indicationes possint desumi, patebit in primis,



in primis quia de singularibus nec methodus, nec ars, nec scientia dari potest. Scientia enim ex Aristotele 1. post. est æternorum: deinde omne remedium, quod aliquem particularem hominem potest curare, & omnes morbi indiuiduorum quas iam sortiuntur naturas specificas æternas, quæ aliis infinitis indiuiduis contingere possunt: Exemplum, Socrates quartana decinetur, assarique, vel carthami usu liberatur, dicimus, quod hæc natura quartanæ Socratis, quæ hoc remedio tollitur, in sexcentis aliis eadem sit, eodemque remedio auferri possit; nullum enim indiuiduorum proprium est, nisi hic & nunc; reliqua omnia sunt specifica, & infinitis aliis communicabilia. Galenus altissimis rationibus in methodo probauit à loco, & tempore non sumi indicationes, sed à substantia; vultque quod indicans sit specificum, & sit illud, quod curatur; de qua re altiori philosophia paulo infra agemus.

Insuper si particularia curarentur, illorum indicationes nobis remedia non ostenderet; quia non datur progressus à particulari ad particulare; esset igitur ars medica omnino vana, & ridicula; etenim si inductio, quæ procedit à multis particularibus, & exempla, quæ ab vno ad vnum saltem procedunt, non valent, suntque ab Aristotele, quia non fundantur in dicto de omni, & de nullo, à recto concludendi modo reiecta; quanto magis, si curarentur particularia eorum indicationes particulares, quæ nullum supponerent processum, scilicet neque à multis, neque ab vno deberent explodi.

*Si particularia curarentur, ars medica esset vana.*

Hinc Galenus 9. meth. cap. 6. dicit, in vniuersalibus esse methodum medendi, in particularibus verò solum methodi exercitium; & ratio est quia in quolibet ægotante plurimi specifici affectus commiscentur. In Socrate quartana correpto erit specificum aliquod temperamentum omnino diuersum ab aliis, eritque ætas, conuetudo, robur, habitus corporis, anni tempus, constitutio, causæ, loci, symptomata, mores animi, humorum motus, & alix specificæ naturæ, & conditiones, quarum aliquæ in multis inueniuntur, raro tamen omnes, quo fit, vt ars medica multis reddatur difficultatibus obstructa: hæc est causa, cur Galenus 2. meth. 7. & 1. meth. cap. 1. dixit, quod in quolibet ægotante debeamus methodum exercere, & applicate non indiuiduis, sed naturis specificis in ipsis contentis: exercitium fiet distinguendo, & separando plurimas affectuum species simul in particularibus confusas; quibus cognitis fiet quoque expendendo, atque librando, quæ indicantia magis possint, quæ prohibeant, & quæ debeant conseruari: de quo indicantium æquilibrio in quintodecimo libro examen instituemus. In hoc loco satis nobis sit, vt colligamus, quod à specifico tantum affectu indicetur morborum, & causarum omnium expulsio, & quod ab indiuiduis nulla vnquam possit indicatio colligi.

*Cur ars medica difficilis sit.*

Vnde fit, quod indicans vnum indicet.

## CAPVT VI.

**S**ARTIS clara atque prænitens est Galeni sententia, quod vnum indicans, vel vnicus affectus præter naturam vnum tantum indicatum seu remedium, quod idem est, indicet, & vnum indicatum ab vnico indicante solum indicetur, 9. method. 12. habet, conferentis indicatum semper dati ex quaque re indicationem: & libro de optima secta ad Tralyb. vnum indicare, quia vni vnum tantum aduersatur. Rationes verò, quæ nos docent, & cogunt ad dicendum, quod vnicum tantum indicatum ab vnica essentia indicetur, ab altiori schola sunt desumenda; etenim huius cognitionis merito mille difficultates, quæ animos rudiorum perturbant enodari poterunt: proponitur itaque quæsitum, quod vnum indicet vnum, intelligendo quatenus vnum, quod est respectu vnus, & eiusdem, ad id idem, & secundum idem, eodem modo, & eodem tempore, quibus omnibus seruatis vnum indicat vnum, alioquin vnum posset indicare duo, tria, quatuor, & centum respectu scilicet diuersorum: tertiana febris, vt interperies calida, indicat refrigerandum, vt sicca, humectandum, vt biliosa, euacuandum; vt à tenui bile fit, in crassandum; vt à putrida, ventilandum; vt bilis mouetur in partem principem, reuellendum, & alia plura indicata ex vnico morbo respectu diuersorum colligi possent. Hinc à Galeno in methodo sæpè reperita est illa sententia quod tot debeant esse methodi, quot morborum ideæ, simplicemque ideam vnum indicatum indicare, plures plura.

Quomodo vnum indicet vnum

Cæterum videamus, quomodo ab Aristotelis philosophia hæc indicantis conditio, quod vnum indicet vnum, habeat exordium: indicans & indicatum inuicem sibi aduersantur, suntque contraria; at ex Aristotele 1. de generat. tex. 51. contraria sunt in eodem genere, & in vnico genere non possunt esse plura duobus, dulce aduersatur amaro, & in saporum genere non inuenietur aliud, quod contrarietur amaro, nisi dulce; vni ergo vnum aduersabitur, & non plura, indicans igitur, cum insinuet nobis, quòdnam sit contrarium, quo possit vinci, & superari, contrariumque vnicum tantum sit, vnicum indicabit, & non plura.

Sed vltius est quærendum, cur scilicet in vnico genere vnica tantum sit contrarietas: patebit hoc ex definitione contrarietatis, est enim Aristotelis 10. metaph. tex. 13. contrarietatem esse maximam differentiam eorum, quæ sunt sub eodem genere: similiter Themistius 1. phys. 47. dicit, quod contraria sunt, quæ eiusdem generis extremas margines obtinent: & D. Thomas in Meteorolog. dicit, quod contraria sunt duæ formæ maximè distantes in eodem genere, vt calidum, & frigidum in genere primarum qualitatum, album & nigrum in colorum genere; quare cum maximè differentia in vnico genere sint duo tan-

Vnde ab Aristotele Themistio & D. Thomas colligitur quod vnum indicet vnum.

tum



tum extrema, in quolibet genere duo tantum erunt opposita, & vnica erit contrarietas, quare vnum, si indicet contrarium, non potest nisi vnum indicare: media vero, quæ sunt inter hæc extrema, non relutantur extremis; nisi id fiat participatione extremorum: albo enim contrariatur cæruleus, & viridis, quatenus hi colores mediij nigro participant: Hinc Aristoteles 8. phy. 64. dicit, quod contraria se mutuo corrumunt, & impediunt, vt motus, qui est sursum destruit motum, qui est deorsum; motus tamen in latus non impedit motum, qui est sursum: hinc est, quod in vnico genere solum duæ extremæ margines sibi aduersantur, ea vero, quæ sunt aliorum generum, cum sint, (vt ita dicam) in latus, & non in longum, non erunt extrema, & per consequens sibi inuicem non aduersabuntur. His principiis philosophus nouit, quod vni vnum tantum sit contrarium. Iis i. de cælo deprehendit motum circularem non esse naturalem elemento ignis; sed aliunde pendere, quoniã, si esset naturalis, sequeretur primo, quod vni duo essent contraria, motui scilicet circulari ignis rectus deorsum, & sursum. Secundo, quod simplicis corporis duplex esset motus, scilicet rectus, & circularis, quod est omnino impossibile; ab vnica enim simplicissima natura duo prodire non possunt, per hæc principia philosophus alius eleuatus inuenit motum circularem cælo conuenire per se: & cum motus primo, & per se à natura pendeat, coactus fuit quoque dicere, cæli essentiam esse quintam, & nullo modo, vt censuit Plato, ex eminentiis elementorum constare. Hoc principio, quod vnum, vt vnum det vnum, & non plura, Aristoteles 2. post. in principio collegit definitionem dare tantum quid, probatque deinde quid neque per demonstrationem, neque per alia instrumenta posset haberi. Verum ex dictis oritur dubitatio, quia non videtur, quod in vnico genere vnica tantum sit contrarietas. In genere enim primarum qualitatum duæ sunt contrarietates, & per consequens quatuor contraria, altera enim cōtrarietas est in actiuis, altera in passiuis, vt calidum aduersatur frigido, & humidum sicco. Respondeo, quod in quolibet genere vno vnica est contrarietas, intelligendo de genere vniuoco, & proximo, infra quod non est aliud genus, sic dicimus in genere primarum duo esse genera, alterum actiuarum, quod in se vnicam contrarietatem conseruat: alterum passiuarum: vel dicimus in vno genere, vnicam esse contrarietatem respectu vnius, & eiusdem, ad idem & secundum idem.

His principiis non animaduersis non est mirum, si in scholis sæpe rudiores conterant tempus argumentis probabilibus: exemplum tanti erroris erit, si ob oculos ponamus cribratam illam difficultatem, an magnitudo morbi indicet venæ sectionem, & pharmacum: qui esset persuasus ab Aristotele, & Galeno, quod vnū non possit indicare plura, tempus non mitteret in legendis magnis voluminibus quomodo magnitudo morbi indicet sectionem venæ, & pharmacum. Sed illico decideret, magnitudinem morbi indicare magnum remedium:

& deinde non primo, & per se sectionem venæ, sed secundario, decideretque aliud esse indicans venæ sectionis, si vnum indicetur ab vno solo: verum, quia de hac re alibi verba fecimus, ostendimusque, quid dici possit de indicante venæ sectionis ideo non est, vt iterum actagamus.

*A quibus rationibus pendeat, quod indicans debeat esse notius indicato.*

## CAPVT VII.

*Ratio est ab auctoritate philosophorum.*

**S**I in medicis contemplationibus satis esset nobis summæ auctoritatis viris concedere, in hac re possemus in Galeni, & Aristotelis sententia conquescere. Galenus enim 1. method. 5. habet hæc verba, quoniam omnes morbi curationem inuenire propositum est, necessarium est prius morbi naturam scire: & 13. method. 6. a methodo excludit, quæ a tota substantia operantur, cum eorum essentia sint ignotæ, & sexcentis aliis in locis affirmat, naturam morbi prius esse cognoscendam, veluti 1. de artic. comm. 12. ante curationem duo esse cognoscenda affectum scilicet, & locum affectum. Indicans igitur, vel affectus præter naturam, si eius remedium perquirere voluerimus, debet præcognosci.

*Rationes analytica ostendentes, quod indicans debeat esse notius.*

Præterea ex iis, quæ superius ostendimus, indicans est medius terminus, quo indicatum seu auxilium morbi perquirimus, at de ratione medij termini ex Aristotele tres sunt conditiones: prima, vt sit notior: secunda, vt sit causa cognitionis illius, quod quærimus: tertia, vt sit adæquata. Verum, quia argumenta ab auctoritate, vt docet Aristoteles 1. topic. cap. 1. sunt probabilia, & non demonstratiua. proponenda erit ratio, quæ possit ostendere, cur indicans debeat esse notius indicato, & hæc est; nisi indicans erit notius, ergo erit, vel æquè ignotum, vel ignotius, alter non datur modus: si ignotius, aliud non poterit inferri, nisi illud, quod Aristoteles 1. post. cap. 3. contra sophistas probauit, scilicet si est hoc, est hoc: putabant sophistæ, quod omnia sciri possent per demonstrationem, scilicet inferendo ex principiis conclusionem, & ex conclusione principia, quorum procedendi modus erat cum petitione manifestissima præmissarum: non possumus cognoscere principia demonstrationis, quæ sunt notissima ex conclusione, quæ ignotior est. Aristoteles 2. post. efficacissimis rationib. illos reprehendit, qui ex principiis notioribus non procedunt, quinimo text. 3. videtur reprehendere Xenocratem, qui vrebatur syllogismo duplante, in quo vnica definitio probatur per aliam pro cognoscenda animæ natura; & definitio, quæ erat medius terminus, erat ignotior conclusioni; hæcque erat, numerus se ipsum mouens est principium vitæ; anima est numerus se ipsum mouens, ergo est principium vitæ; nullo modo igitur ex principio ignotiori aliquid concludere possumus: patet similiter alio exemplo, quod ex æquè

ignotius



ignotis nihil inferatur, veluti quando probaretur, quod anima esset immortalis, quia sit impassibilis: æque notum est nobis, quod sit immortalis, ac impassibilis: demum Aristoteles tenet non solum demonstrationem, verum etiam definitionem esse ex notioribus nobis; quare, si ex indicante inferimus remedium, est necessarium, si bona fuerit illatio, ut indicans prius sit nobis notum indicato.

*A quibus rationibus analyticis pendeat hæc indicantis conditio, quod indicans debeat esse præsens.*

C A P U T V I I I.

**Q**UOD indicans debeat esse præsens est Galeni 4. methodi 3. hæc sunt verba: à nullo eorum, quæ adhuc non permanent, sumitur indicatio remedij ex yfù: 3. methodi. 1. habet, quod illud, quod indicat sit illud, quod curatur; aliquid sanè non curatur, nisi sit præsens: præsentia igitur erit accidens inseparabile indicantis. Neque obiciant, quod Galenus dicat 4. methodi cap. 3. præsentis esse curationem, futuri verò præcautionem & providentiam, propterea que dari indicantia, quæ dici non possunt præsentia. Quia respondemus, quod nos præcauere possimus morbos futuros, curando malas dispositiones, quæ, licet minentur futurum morbum, sunt præsentis. Galenus de phrenetici dispositionibus libro de morb. vulg. verba faciens, hæc consignauit memoriæ: mirabile est, quod hi morbi subito inuadant sanos, subdit: sed mala hæc pedetentim crescunt in corpore, ut in mortis à cane rabido: deinde dicit, in hoc corpore fuit coaceruatus humor lethali veneno similis, & cum factus est malignus, repente apparuit lethale symptoma: qui phrenetici morbum huc futurum antevertere voluisset, fuisset operæpretium dispositiones præsentis remediis auferre, & non symptoma, vel phrenesim, quæ adhuc non aderat: ad eundem modum, si præcauere voluerimus colicum dolorem, qui ex vitrea pituita fieret, præcauebimus euacuando viscosam pituitam, quæ est præsens, quæque degenerare potest in vitream, ut indicans perpetuò debeat esse præsens: nunquam in morbos incidunt homines, nisi habeant antea viscera disposita. De Sileno hæc dicit Galenus, utique non incidisset in morbum grauissimum, nisi antea fuisset paratum corpus: dispositiones igitur sunt omnium morborum semina præsentia, & ab iis quatenus instant, & sunt præsentis sumuntur indicationes præcauendi futuros morbos.

Quomodo ex altioribus Aristotelis principiis deduci quoque possit, quod indicans non indicet, nisi sit præsens, patet, quia alio modo indicata seu remedia pernoscere non possumus, nisi per indicantia, quæ mediocriter terminorum vices subeunt, sed sic est, quod auctoritate Aristotelis 2. post text. 11. & 11. media, & extrema sunt congenita, & eiusdem temporis, & ubi non sunt congenita, consequentia non va-

*Quod indicans debeat apud potentias. quia Gal. auct. Obiect. sol.*

*Prima ratio analytica ostendens quod indicans sit præsens.*

*Secunda ratio analytica.*

lent; ideo si remedium præsens non colligeretur ab indicante præsentem, sed à futuro, vel præterito erit nullum, & nullas habebit vires in pellendis morbis; sed ut hac profunda Aristotelis doctrina omnia confirmemus, in exemplis conferamus præceptum Aristotelis traditum loco citato, ubi dicit, quod vana & ridicula esset illa demonstratio, quæ fieret ex medio præterito, & quæsito præsentem, exemplum est, si quis probaret esse eclypsim, quia fuerit interpositio terræ: similiter vana esset, si quis ex medio futuro quæsitum præsentem vellet colligere, sicuti si quis diceret, est eclypsis, quia erit interpositio terræ: ad eundem modum dicimus, cum indicans sit medius, unde indicatum seu remedium colligitur, sequi necessario, si bona illatio esse debeat, quod eo modo, quo remedia sunt præsentia, eo sint quoque indicantia. Insuper ex Aristotele 2. post loco citato, si causa temporis momento præcederet effectum, propositio fieret accidentalis, & nihil inde sequeretur: quod esset accidentalis patet, quia non esset de omni; exemplum, si animal rationale temporis momento prius esset risibile, hæc non esset vera, animal rationale est risibile, quia posset esse animal rationale, & non risibile; non esset de omni, quia duæ conditiones requiruntur in prædicatis de omni, altera, ut effectus semper prædicetur de illo subiecto, altera, ut prædicatum omnibus indiuiduis illius speciei competat. Hinc quoque fit, quod si aliqua differentia temporis esset inter indicans, & indicatum, quod vnum scilicet esset præsens, & aliud præteritum, vel futurum, vel vice versa, indicans non esset indicans illius indicati, & illud indicatum non posset inferri ab illo indicante, quoniam nihil infertur, nisi saltem fundatum sit in dicto de omni; expedit igitur, ut indicata, quæ vera, bona, & propria sunt, debeant esse simul tempore cum indicantibus, si ab illis inferri debeant. Neque aliquis obiiciat ex Aristotele 2. post. text. 11. quod aliquando sint demonstrationes, in quibus causa præcedit tempore effectum, ibi enim philosophus, ut hoc declararet, dat exemplum, & dicit: à Mediis infertur bellum Atheniensibus ob hanc causam, quia Athenienses bellum gesserunt aduersus Sardes: ecce, quod causa est præterita, & effectus præsens. Respondemus, Aristotelem proposuisse illud exemplum, ut causas externas explicasset; apud Aristotelem sæpissimè exempla falsa sunt, dummodo Aristoteles via exemplorum declararet quod proponit, sint falsa, aut vera exempla, nullæ vnquam ei curæ fuit: Aristoteles centies repetit in libris post. propositiones demonstrationis debere esse per se, vel saltem de omni: dum dicitur, Athenienses semper pati bellum à Mediis, dum ipsi irruunt in Sardes, hæc non est de omni; quoniam posset contingere, ut in Sardes irruerent, & nullum inde à Mediis bellum paterentur. Concludimus ergo, quod ex iis, quæ non sunt de omni, nihil inferri possit, quia non sunt congenita, & quod remedia, quæ ex indicantibus inferuntur, debeant inferri ab indicantibus præsentibus, & non futuris, vel præteritis, ut erat probandum.

*Obiectio.*

*Sol.*

Posita hac veritate, eaque confirmata analyticis principiis, facile apparebit



apparebit multorum medicorum vanitas, dum consulunt quid sit faciendum post tres, vel quatuor dies, cum sæpè post horam omnia variantur indicantia: per sæpè incidunt in illud erratum, dum à præteritis indicantibus hauriunt remedium: falluntur ægri, qui à Medico absente consilium petunt; interim autem quam consultationes scribantur, ex morbo morbi succrescunt, & aliquando contraria emergunt indicantia, unde Medici consilium ægrotanti redditur perniciosum.

*Errata illorum, qui à præteritis indicantibus non hauriunt remedia.*

*Ostenditur, quod indicans non sit externum, sed sit illud quod curatur.*

C A P. I X.

**Q**UOD indicans in methodo medendi sit illud, quod curatur aperte docet Galenus 3. method. i. iis verbis, absurdum est asserere, aliud esse quod indicat, & aliud quod curatur. Quo fit, ut 4. meth. 3. dicat, nullam extrinsecam causam, qualis est aer, locus, anni tempus, & alia id genus, indicare: ratio, cur externa non possint indicare, est quia indicantia debent inueniri in genere affectuum præter naturam, facta scilicet diuisione generalissimi in subalternas differentias, & harum in specificas, in quibus solum indicantia inueniuntur, sicuti ex Galeno libro de optima secta cap. 48. ostendimus. Qui igitur ab externis indicationem desumerent, transirent de genere in genus, quia externa in affectuum genere non continentur.

*Prima ratio analytica externa causa non indicant.*

Præterea omnia externa sunt singularia, & ut singularia ex Galeno non indicant; ratio analytica, quæ fallere non potest, ex eo pender, quia indicata inferuntur & colliguntur ab indicante, sed sic est, quod nullus datur inferendi modus à particulari ad particulare, ergo externa, quæ sunt particularia non indicabunt. In iis non datur inferendi modus, quia omnis illatio ex Aristotele fundari debet in dicto de omni, vel de nullo. Exemplum, erit indicans, quod insinuat remedium frigidum, ut duo, quod esse potest lactuca, hepatica, aer hyemalis, & infinita alia externa, hæc tamen non indicant, tum, quia sunt infinita, tum, quia illa debent appellari remedia, quæ primario indicantur à specifico aliquo affectu præter naturam, calidum ut duo erit specificum indicans post quod aliud non est in methodo cognoscibile: hoc indicat frigidum ut duo sunt inferiora, ut lactuca, & alia, de quibus in methodo agi non debet, sed in libris de simp. med. fac. & alibi; hæc igitur erit quoque causa, cur externa non indicent.

*Secunda ratio analytica.*

Præterea illa tantum ad methodum pertinent, quæ indicatione comparantur, sed externa non sunt huiusmodi, quia sunt singularia circa quæ non versatur indicatio, sed experientia, ergo ad methodum non pertinent.

*Tertia ratio.*

Amplius, si externa in methodo medendi essent indicata, sequeretur.

*Quarta ratio.*

tur, quod vnum indicans haberet duo indicata, quod est inconueniens, quia superius ostendimus, quod vnum indicans indicet vnum indicatum, & non plura: quod vero vnum indicans haberet duo indicata. patet, quia esset indicatum (specificum, & externam materiam remedij, quam putas tu esse remedium. Exempli causa, frigidum vt duo erit indicatum specificum: lactuca vero, aër, vel alia extrinseca causa erit aliud, quod destrueret non solum medendi methodum; verum etiam totam philosophiam, vt in capite proprio ostendimus.

*Quinta ratio.*

In super logicis firmissimis principiis hoc relinquitur, quia primo post. cap. de tribus erroribus circa vniuersale Aristoteles dicit, quod error est attribuere superiori, quod inferioris est: calidum vt duo indicat frigidum vt duo, & hæc paria sunt; dum vero putas ab indicante calido vt duo indicari lactucam, aberras, quia lactuca est quid inferius, & merito frigidi vt duo, quod est specificum, refrigerat, frigidum enim vt duo potest persistere sine lactuca, quia, vt alibi ostendimus, quodlibet inferius accedit suo superiori, & superius sine villo stare potest.

*Sexta ratio.*

Demum locus affectus, aër, quæ externa sunt per accidens prædicantur de morbo, vel causa. Exempli gratia, inflammatio accedit pleuritæ, nullus igitur est nexus inter locum, & morbum, vel causam; quare, qui pro curandis morbis colligerent curatiuas indicationes à loco affecto, inciderent in elenchum accidentis, perinde ac, si arguerent hoc modo: omnis albedo est color, homo est albus, ergo homo est color, quod est ridiculum, quoniam hæc sententia, scilicet quidquid prædicatur de prædicato prædicatur & de subiecto, in accidentalibus non habet locum: ad hanc paralogismi formam reducimus erratum illorum, qui indicationem à loco affecto desumunt, qui hoc modo posset formari: omnis morbus indicat; pars corporis est affecta morbo, ergo pars corporis indicat, nam sicuti albedo est accidens hominis; sic morbus est accidens partis corporis: & sicuti color est prædicatum per se morbi, quatenus est causa efficiens pellens morbum, vel causam, quæ in quarto modo dicendi per se habent locum: quod de loco affecto dictum est, de aëre, de ætate, & de cæteris est dicendum: quod scilicet solum ea indicent, quæ curantur, quæ sunt in facto esse, & quæ sunt in eodem genere præter naturam: ea vero sunt indicata, quæ sunt specifica, & quæ in aliis infinitis particularibus inueniri possunt: nisi omnes hæc conditiones indicantis, & indicati obseruentur: neque indicans, neque indicatum erunt vera indicantia, & vera indicata: occurrunt duæ dubitationes; altera, quia ex Galeno, causa non videtur indicare curationem, sed præseruationem, quo fit, vt non videtur verum, quod omne, quod indicat, curetur: altera, quia Galenus dicit, ab aëre sumi indicationem curatoriam: habet enim 9. method. 14. hæc verba, res sunt scopi curatorij hauriendi, à morbo scilicet, à temperatura, & ab aëre: quod est contra illud, quod diximus: tollitur prima dubitatio, quia omne quod indicat est causa; morbus enim indicat,

*Prima dub.  
Secunda.*

*Sol prima.*

quatenus



quatenus est causa symptomatum. Causa vero antecedens, quatenus est causa morbi: & quamvis Galenus dixerit, causam præseruationem, morbum curationem indicare; attamen 2. aph. comm. 22. vocat garrulos illos, qui disputant de iis nominibus: dicit enim ibi, quod causatum quoque abolitio dici potest curatio; vbique Galenus nominum micrologiam reprehendit; nos vero acturi de hac re in lib. 15. altioribus fundamentis nodum hunc enodabimus: tollitur secunda concedendo, quod aër indicet extra methodum medendi; quemadmodum temperatura indicat sui conseruationem, sic aër est contemperandus, & vt talis conseruandus; quæ consideratio potius pertinebit ad libros de tuenda sanitate; vel dicimus aërem indicare morbi naturam, & non indicatum, de quo loquimur.

*Sol. secunda.*

*Vt altioribus principijs probatur symptomata non indicare.*

C A P. X.

**Q**UOD symptomata non indicent, Galenus in methodo non vno loco docet: 1. method. cap. 4. habet indicationem præsidij nõ de sumi à symptomatibus, sed solum ab ipsa substantia, per substantiam intelligens morbum, à quo tamquam à proprio subiecto nascuntur symptomata: 3. method. 1. dicit, quod indicans sit illud, quod curatur, symptomata, cum non curentur, sed morborum ablatione auferantur, nullo modo indicare poterunt. Præterea illud quod curatur est permanens, & cum vocetur à Galeno substantia, est independens, & in facto esse; symptomata vero sunt accidentia in fieri. dependentia, in sequentia morbum, vt umbra insequitur corpus: quod sint accidentia, & insequentia, substantiam, est Galeni 1. method. 9. dum dicit, sanis quidem nobis accidentia, ægrotantibus symptomata nuncupantur: confirmatur quod accidentia semper pendeant, & sint in fieri ex nominis ætimologia, quia accidens Græce dicitur *συμπεπνυμενόν*; id est simul veniens, sicuti cum subiectis accidens simul venit, semper dependet, & semper fit; similiter symptomata simul veniunt cum morbis, semper ab illis dependent, sunt in fieri, & morbis ablatis, omnia cessant esse; nihil igitur symptomata, vt talia sunt, indicabunt.

*Ex Galeno probatur symptomata non indicare.*

Insuper alia sunt principia, eaque altiora, quæ nos omnino cogunt ad dicendum, quod symptomata non indicent: audite, omne quod indicat in arte medica indicat contrarium positium, & non priuatiuum, quæ enim opponuntur priuatiuè, non sibi inuicem destruunt; dum nos quaerimus remedium contrarium, illud non solum explicamus, quod indicanti, vel morbo potest aduersari; verum etiam, quod possit in certamine illud vincere; at sic est, quod omne, quod est in fieri, nullum habet esse positium, ergo nullum habebit contrarium positium, omnia en. in quæ sibi aduersantur, debent esse positiua & in facto esse, alioquin, cum non sint, non poterunt sibi contrariari.

*Cur symptomata, cum sint in fieri, non indicent.*

Sed clarius, omne quod est in fieri est in fluxu, at oppositio, quæ ob-  
servatur in iis, quæ sunt in fluxu, sunt duo termini, scilicet à quo, & ad  
quem, quorum alter cum sit præsens, alter cessat, vel corrumpitur, &  
per consequens sibi inuicem reluctari non possunt, quare nunquam da-  
bitur hoc contrarium, quod posset symptomata, quatenus sunt in fieri,  
& dependentia, depellere: vt quid igitur Empirici symptomata curant,  
si non dantur symptomatum remedia?

*Ratione legi-  
en ostenditur  
quod sympto-  
mata non in-  
dicant.*

Sed eadem soletia præstat, vt diligamus, an symptomata indicent, au-  
dite, illud, quod propriè & per se insinuat aliquid, non potest aliud ge-  
nere diuersum insinuare, sed sic est, quod symptomata propriè insinuant  
morbos, ergo non insinuabunt remedium, quod à morbo, vt ostendi-  
mus, genere differt. Præterea ab eo, quod est per accidens, non potest  
sumi indicatio, quia nulla scientia, & nulla infima ars ita rudis esse  
potest, vt aliquid colligat ex accidentalibus; oportet enim ex propriis,  
& ex iis, quæ sunt per se procedere, si aliquid inuenire, voluerimus,  
alioquin frustra tempus teremus: quod tanto magis in methodo me-  
dendi debet observari, quanto Galenus 2. methodi 7. dicat, indica-  
tionem esse organum inuentionis, cuius merito remedia debent perqui-  
ri. Indicatio sanè non posset esse organum inuentionis nisi esset syllo-  
gismus concludens aliquid, quod erat prius ignotum.

*Qui à sym-  
ptomatibus  
sumunt in-  
dicationes  
incidunt in  
elenchum nō  
causam pro  
causa.*

Porro, qui indicationem haurient à symptomatibus semper inci-  
dent in Elenchum, in quo sumitur non causa pro causa. Exemplum,  
alui fluxus est symptoma; qui à symptomatibus sumunt indicationem,  
dicent, fluxum semper indicare remedium astringens, & arte medica  
omnino ignari astringentium vsu aliquando arcebut commodam  
naturæ euacuationem, & aliquando interficient: causa fluxus est bilis, à  
qua debet sumi indicatio; quare cum à symptomate illam hauriant  
sumunt pro causa non causam.

Amplius, quod symptoma nullo modo indicet remedium, nec reme-  
dium indicetur à symptomate, patebit, quia vel considerabitur sympto-  
ma vt finis, in quem remedia dirigi debeant, vel vt effectus superabilis,  
& vincibilis à remedio, quod secundum hunc sensum est causa effi-  
ciens; dicimus, quod quocumq; modo consideretur est necessarium, vt  
indicans, & indicatum sibi inuicem respondeant in aliquo modo di-  
cendi per se: omnes enim causæ, quæ sunt veræ, quæ aliquid efficiunt,  
& quæ aliter se habere non possunt sub aliquo necessitatis gradu de-  
bent contineri: omnes conueniunt philosophi, quod causæ externæ, vt  
efficientes, & finales sint in quarto modo dicendi per se: videamus er-  
go, an symptoma possit dici causa finalis in quem remedia dirigi de-  
beant, & an remedium possit dici causa efficiens superans, & vincens  
symptomata: quod symptoma non possit esse propositus finis, est Galeni  
sententia 3. meth. 9. vbi dicit, quod in affectibus præter naturam triplex  
sit solum proponendus finis, causa scilicet, illud sine quo non, & vrgens,  
sub qua distinctione symptoma, vt symptoma nō collocatur. Præterea  
symptoma non potest esse finis, quia de ratione finis est, vt sit quid vlti-  
mum, independens, quo adepto quiescimus; at symptoma est accidens  
depen-



dependens à morbo, est quid posterius, & in fieri, ergo non erit finis in quē remedia dirigi debent. Insuper quādo remediū tollit morbū, accidit remedio vt symptoma quoq; tollatur; cōsideratū igitur remedium, vt dirigitur in finem, respectu symptomatis erit accidens, & non causa; quare si nullus erit progressus ab accidente ad accidens, nullus quoque erit à remediis ad symptomata. Auerthoes enim in famosa quadam digressionē contra Themistium redarguit demonstrationem ab accidente ad accidens vt vanam, & chimericam: fundamentum huius rationis est Aristotelis 4. Meta. text. 14. vbi dicit, quod nunquam accidens est accidentis accidens: nullum accidens, vel nullus effectus de effectu, vel alio accidente per se dicitur, erit igitur causa finalis petenda à subiecto, quod est indepēdens & vltimum, quōdque non sit in fieri: si demum dixerimus, quod symptoma sit effectus vincibilis à remedio, & hoc modo symptoma indicet contrarium, iam ostendimus superius, quod oppositio contraria versetur inter terminos positiuos, & non priuatiuos, quare cū symptoma sit in fieri, remedium, quod est positiuum, symptomati non reluctabitur: nulla sane est sub cōlo potentia, quæ, corporis eadem manente præsentiā, eius vmbra posset destruere.

Demum, si indicata agerent in symptomata, vt in contraria; sequeretur, quod symptomata agerent quoque in indicata: sunt Aristotelis hæc verba, faciunt autem & patiuntur contraria ab inuicem: sed sic est, quod symptomata sunt in fieri, ergo non agent; agentis enim proprium est, vt sit in facto esse, si agere debeat: patet ergo symptomata non indicare.

---

*Quibus logicis principiis probetur, locum affectum in methodo curatrice non indicare.*

C A P. XI.

**S**I satis mihi esset prostritas Galeni sententias consulere, hic acturus, san locus affectus in methodo medendi indicet, possem cum aliis, in verbis magistri conuiescere: clarissimum enim est apud Galenum, locum affectum indicare conseruationem, & nequaquam contrarium: causa, cur omnia ad examen logicum in hoc libello reuocamus, est Galenus, qui 2. methodi cap. 6. & alibi proponit in tota methodo agendum de logica, par igitur erat, vt semel videretur, quamnam esset hæc logica, cuius virtute Galenus tam præclaram methodum edere in lucem potuit.

Quod ex Galeno locus affectus non indicet, in primis patebit, quia *Prima ratio;* 3. meth. 1. dicit, quod solum, quod curatur, indicat contrarium; à medico enim solum causa, & morbus curantur, indicant contrarium, partem verò affectam simile, vt conseruetur.

Amplius morbi & causæ sunt accidentia separabilia locorum affe- *Secunda;*

etorum, ergo à loco affecto non indicabitur remedium morborum, & causarum; pleura enim sine pleuritide, & pulmo sine peripneumonia esse possunt: nec valet, pleura est affecta præter naturam, ergo est inflammata; pulmo est læsus, ergo peripneumonia: cum igitur accidat, vt pleura inflammetur, si à pleura affecta, vel ab alio loco affecto procedemus ad inueniendum remedium pleuritidis, vel alterius morbi, vel causæ, incidemus semper in enthimema ex signo solubili omnino explosum atque reiectum ab Aristotele.

*Tertia*

Insuper si locus affectus indicaret, sequeretur quod idem indicaret duo contraria; modo enim pars corporis redditur affecta ab intemperie calida, modo frigida; modo patitur adiapneustiam; modo ecphraxim, quam reclusionem Græci vocant; si igitur locus affectus indicaret in methodo curatrice, idem in affectibus contrariis indicaret opposita, quod esset inconueniens.

*Quarta.*

Amplius, si quis diceret, pleuritidem indicare phlebotomiam quia pleura sit affecta, idem est, ac si diceret, hominem esse risibilem, quia sit Italus: causa hic à loco desumpta est omnino extranea, & falsa. Aristoteles 2. Post. tex. 25. dicit, quod, qui referunt causam non adæquatam pro adæquata tripliciter errent, vel dum afferunt causam partialem pro totali, vel dum pro proxima afferunt causam remotam, vel extraneam, sicuti est locus respectu locati, hæcque postrema est aliis deterior.

*Quinta.*

Postremo indicata desumuntur vel ab essentia indicantis, vel à consequentibus essentiam; at locus affectus neque pertinet ad essentiam indicantis, neque ad ea, quæ consequuntur essentiam; ergo ab illo non debent desumi indicata: non ad essentiam; quia vnum indicat vnum; locus affectus indicat plura, quia pluribus; iisque contrariis affectibus premi potest; non ad ea, quæ consequuntur, quia quæ consequuntur quatuor sunt, & alia non dantur, suntque actio, passio, præsentia, & subsistentia non loci affecti, sed causæ peccantis.

*Vnde sit, quod quid agendum debeat necessario desumi ab essentia specifica indicantis.*

## CAPVT XII.

*Vrex Galeno  
probat,ur,  
quid agendū  
desumi ab  
essentia spe-  
cifica indi-  
cantis*

**Q**UOD desumatur ab essentia indicantis quid agendum, non vno loco à Galeno colligi potest: dicit enim libro de optima secta ad Trasib. c. 48. quod à specifico affectu indicetur morborum expulsio, at sic est, quod affectus specificus est eius essentia, ergo quid agendum ab essentia indicantis desumitur. Cæterū ad altiora methodi principia mentis aciem conuertamus: dicit 4. methodi 4. quod methodus, vt methodus, est via vniuersalis cuilibet particulari applicabilis: quare si methodo inquirere est per indicationem, & viam vniuersalem procedere, vt in limine huius libelli quoque probauimus, sequetur, quod reme-



remedium methodo inuentum sit vniuersale, & non particulare, & si vniuersale, sit quoque essentia; omnia enim, quæ supra particularia collocantur, sunt essentia, & naturæ vniuersales, vel quidditates rerum, non infinitæ, vt sunt particularia; sed finitæ; non corruptibiles, sed æternæ, & quæ solæ artibus, & scientiis subiiciuntur.

Præterea illud quod indicat contrarium est forma, ergo à forma, quæ est rei essentia quid agendum desumitur: patet ex Aristotele, D. Thoma & Themistio, qui dicunt; quod contraria sunt duæ formæ extremæ in eodem genere. Insuper cum ex Galeno probatum sit, à cognitione indicantis inuentionem remediorum pendere, sequetur, quod indicans sit medius terminus, quo peruenire possumus in notitiam remedij: remedium vero sit maior extremitas, & ægrotus minor; ab indicantis igitur natura, & essentia solum colligere poterimus remedium pro cura huius, vel illius ægrotantis. Amplius, patet, quod hæc essentia, à qua colligitur quid agendum, non sit supra specificam essentiam, neque infra, ex iis, quæ superius probata sunt; patet quoque quod quid agendum, vel remedium, quod indicatur ab essentia specifica indicantis, non debeat esse supra specificam naturam & essentiam; quia in eisdem errores incideremus, sicuti diximus de indicantibus genericis; incideremus enim in diminutam diuisionem, in petitionem principij, in secundam figuram ex duabus affirmatiuis, & applicaremus indicatum genericum specifico alicui morbo, quod esset à ratione alienum: exemplum huius erroris est, dum rudiores desumunt remedium interceptum à materia fluente, putantque inueniri interceptum genericum & commune, quod possit omnibus fluentibus humoribus satisfacere, quod interceptum genericum est quid superius, & hætenus neque à Galeno, neque vnquam ab alio inuenta est materia istius auxiliij interceptantis, nam si incrassando interceptare voluerimus, tunc indicabitur à materia tenui; si astringendo, ab angustante auxilio; quare non sat est, vt colligamus esse interceptum, nisi interceptum auxilium ( cuius materia est occulta ) diuidatur in crassæ faciès, & angustans, vt illud specificum inueniamus remedium, quod non ab essentia generica, sed specifica indicatur; generica enim respectu inferiorum lubeunt materiæ vicem, ipsæque non sunt, quæ rem complent, quæ rem constituunt; quia nunquam sunt conuertibilia, sola specifica sunt illa, quæ omnia constituunt, & ab illis effluunt operationes; quoniam per illa sunt, & conseruantur; ea igitur, vt naturalis, erit conseruanda, & vt præter naturam contrariis corrigenda.

*Rationes analytica probantes quid agendum ab essentia summi.*

*Materia interceptantis, ut est interceptans est occulta.*

*Et errant, qui plura tribus indicantia faciunt.*

#### CAPVT XIII.

IN nulla artis medicæ parte plures se offerunt difficultates excutendæ, quàm in hac contemplatione, quæ ad medendi methodum pertinet, quâuis Galenus omnia reddiderit clara, & prænitentia: causæ sunt, quia nostratum plurimi non in primis fontibus medendi me-

thodum addiscunt, sed vel ex librorum indice, vel ex parvis rudiorum hominum opusculis, vel ex eorum sermonibus colligunt aliqua perperam intellecta de indicatione. Ex Galeno 10. methodi 2. vbi de putridis febribus loquitur, dicit, tria tantum esse indicantia, scilicet morbum, causam, virtutem: quæ sententia infra quoque confirmabitur altissimis philosophiæ principiis: nihilominus non desunt qui putant suffulti verbis Galeni perperam intellectis; plura alia indicantia dari, quæ ad illa tria non referantur, sunt qui, sed importunè defensores, indicationem desumi in Therapeutica à loco affecto, ab ætate, ab aëre, à morbi magnitudine, à morbi temporibus, à consuetudine, & similibus; ut in nostratum medicorum cōcionibus audiuius, & in opusculis impressis legimus. In hæc errata non prolaberentur; si ad potiora methodi exordia, & fundamenta respicerent. Quis, vbi hoc principium pernosceret, quod omne, quod indicat in Therapeutica curetur, diceret locum affectum, ætatem, aërem, tempus anni indicare? Quis vbi comprehenderet hoc aliud, quod indicans vnum indicet, diceret, magnitudinem morbi propriè indicare, cum Galenus dicat 4. methodi 5. magnitudinem morbi indicare purgationem, & sanguinis detractionem, quæ duo sunt: si de propria indicatione esset locutus, non sibi constaret 9. methodi 12. vbi dicit vnum indicatum ab vno indicari, & non plura. Quis denique præuiso, quod infra remedium specificum nullum sit indicatum, sed tantum materiæ indicatorum, quæ non ad methodum medendi pertinent, sed ad alias medicinæ partes, diceret ab aëre, ab ætate, & similibus sumi indicationem? quæ omnia methodi fundamenta à Galeno sunt disertissimè (ut superius ostendimus) declarata, & pro virili nostro analyticis rationibus confirmata.

*Indicans sumitur dupliciter.*

Occasiones, quod plura tribus indicantia faciant, sunt nonnulla Galeni loca prauè intellecta. Galenus enim 13. method. 16. habet, coindicantia esse virtutem, ætatem, aërem, & consuetudinem, statim altiori Galeni philosophia sprete, plurimi rudiores colligunt ætatem, aërem, & consuetudinē indicare: similiter habet Galenus 3. meth. 3. in vlcere cauo sumi indicationem à loco affecto: similiter colligunt locum affectum indicare: videt 9. meth. 14. referri à Galeno, quod indicatio specifica sumatur ab ætate, consuetudine, & ab aëre, ideo statim colligunt, hæc omnia indicare, & per consequens indicantia esse plura tribus: Causa erroris istorum est, quia indicans sumitur dupliciter, vel pro affectu, cui primo reluctatur indicatum, & de hoc est in methodo loquendum, vel sumitur indicans pro signo indicante affectum præternaturam, quod indicans non indicat remedium, sed indicat naturæ affectuum, illòsque manifestat, & declarat; de quo indicante omnes scientiæ, & facultates agunt, & hoc non est illud, quod contrarium indicat, & ad methodum pertinet: ostendimus cum Galeno superius, quod de ratione veri indicantis sit quod curetur, & sit forma opposita remedio: ætas florens non indicat venæ sectionem; 4. de ratione vict. 19. dicit, secunda est vena, quando ætas est florens; quia ut plurimum

*in ætate.*



in ætate florente virtus est adeo robusta, vt faciliè ferre possit sanguinis euacuationem; accidere tamen potest, vt ætas florens sit viribus contracta, & non sit signum perpetuæ veritatis, ætas igitur erit, vt plurimum signum indicans, quod venæ sectio tuto fieri possit: similiter tempus nō per se indicat remedium; dicit enim Galenus 4. methodi 4. quod tempus non indicat per se; quinimmo cap. 5. eiusdem libri habet, in vlcere diuturno inueniri iuuans, vel remediū non ex diuturnitate vlcus, sed ex tali vitio succi, ecce quod succus, & non tempus indicat iuuans remedium, quamuis tempus diuturnum possit esse signum mali succi: eadem dicimus de aëre: dum quispiam patitur vlcus, & aër tūc sit humidissimus, aër est signum in vlcere intensiorem humiditatem fieri, quæ deinde humiditas indicat exicans remedium, quod sit validius. Cæterum quorsum hæc disputatio, cum doctrina Galeni sit aperta, & perspicua? ex Galeno (vt diximus) 10. methodi 2. tria tantum enumerantur indicantia, à causa videlicet, à morbo, & à virtute desumenda; ergo cætera, vel ad hæc reducentur, vel erunt signa significantia morbum, vel causam & non remedium.

Quod tria sint indicantia, potest analytica virtute sic confirmari: causa, cur termini ad conficiendam optimam demonstrationem, neque plures, neque pauciores tribus requiruntur, est, quia nihil fieri potest, nisi tria conspirent, scilicet causa quæ efficit, res effecta, & subiectum: analytica enim principia omnia ad vnguem declarant, vt esse possint extra animam: quod verò causa efficiens in medicina à re effecta distinguatur pater, quia à se inuicem sunt separabiles; febris putrida efficit hecticam, abit, & remanet hectica: seruabitur ergo inter causam, & morbum nexus quarti modi dicendi per se; exemplum erit ædificator, ædificium, & materia ædificij: morbus, causa, & subiectum viuens: iis tribus res constant, & quilibet discursus, nisi sit deceptorius, iis tribus formatur, si quis addiderit quartum in paralogismum cadet; si quis adimet tertium, ex duobus nihil fieri poterit. Medici igitur est, contrariis duos terminos, scilicet causam, & effectum dirimere, tertium, quod erit subiectum, conseruare. Cætera omnia præter tria proposita erunt vel antecedentia, vel signa consequentia, quæ de natura eorum non sunt: sicuti de edificio dicimus, tempus & magnitudinem non pertinere ad naturam ædificij; sed ad signa an facile, vel difficile erui possit, ædificium tēporis vetustate ferè absumptum indicabit facile, recens difficile erui posse: magnitudo ædificij indicabit difficultatem, quæ sunt signa ostendentia naturam ædificij; natura deinde ædificij, quatenus ex lignis, & maioreis lapidibus constat, varia indicantur; etenim, vt lignea igne, vtque maioreis ferro esse demollienda: ad eundem prorsus modum tria sunt indicantia causa, morbus, virtus; magnitudo morbi, vel tempus morbi indicant naturam morbi, sed non remedium, quo destrui possit morbus, quod est illud, quod querimus in methodo medendi.

*Ratione analytica ostenditur quod indicantia non sint plura tribus.*

Finis Vndecimi Libri.



# SANCTORII SANCTORII

Iustinopolitani

*METHODI VITANDORVM  
errorum in analogismis, & experimentis  
perquirendis,*

LIBER DVODECIMVS.

---

*Quid sit analogismus Empiricorum, & quomodo  
formetur.*

## CAPVT I.



**D**IXIMVS, quod à variis medicorum sectis tria fuerint obseruata instrumenta pro inueniendis morborum remedijs, scilicet indicatio, analogismus, & experientia. Ostensum est in libro superiori, quod indicatio erat instrumentum certissimum; quia omnes eius conditiones, & proprietates firmissimis analyticis principijs consentiebant. Modo, vt differant hæc instrumenta inter se, & quantum valeant, secundum easdem leges logicas examinabimus.

*Vi differt a-  
nalogismus  
ab indicatio-  
ne, & expo-  
sitione.*

Differt indicatio ab analogismo, & experientia; quia per indicationem colligitur remedium ab indicante præcognito; nisi enim indicans prius rectè cognoscatur, non possunt remedia per indicationem perquiri: hinc tota Galeni methodus, quæ solum per indicationem inuenit remedia, tradit quoque modos cognoscendi omnia indicantia præter naturam; quia solum illis præcognitis remedia cognoscuntur: remedia vero, quæ per experientiam inueniuntur, non à præcognitione indicantis; sed ab aliorum obseruatione colliguntur; verbi causa, si viderimus, quod aliquis vsu portulacæ stupore den-  
tium



tium fuerit liberatus, & deinde ceteros eodem stupore correptos iuuare videamus, tunc dicemus fuisse inuentum per experientiam, & non per analogismum, quod portulaca iuuat. Quæ demum per analogismum perquiruntur, non pendent ab obseruatione eiusdem affectus, sed à similitudine quadam; analogismus enim ex Galeno libro de opt. secta, & alibi, est comprehensio remedij per similitudinem.

Verum, quia duplex est analogismus, alter Empiricorum, & alter dogmaticorum; patet, ut in hoc capite prius declaremus ex Galeni sententia quid sit analogismus, & deinde in sequentibus distinguamus analogismum vtilem ab inutili. Galenus libro de optima secta ad Tratyb. cap. 10. & alibi de virtute analogismi habet hæc verba: tunc inueniuntur remedia virtute analogismi, quando causa, vel indicans ignoratur, & nulla sit facta obseruatio, sed affectus videatur symptomatibus aliis præcognitis esse quam simillimus. Ex iis vrbis colligimus duo requiri, ut formetur analogismus, alterum, ut indicans ignoretur; dum enim præcognoscitur, non indigemus analogismo; quia tunc per indicationem procedere possumus: alterum, ut in affectu, pro quo remedium quæritur, non sit facta aliqua obseruatio, vel experientia; sed solum à simili in remediorum inuentione procedatur; subdit Galenus, & tradit exemplum, ut clarius intelligatur modus procedendi per analogismum: hæc sunt verba: esto aliquis demorsus ab hæmorrho serpente, ac sanguis effluat, nos ignari, quæ causa affectum attulerit, neque vlla obseruatione instructi, ea adhibebimus remedia, quæ ad sanguinis eruptionem ortam ex diuisione sunt accommodata: ignota itaque causa, nullaque facta experientia, dabitur hic tertius modus inueniendi remedia per analogismum, qui est per similitudinem: quis enim posset causa ignota symptomatum per indicationem inuenire remedium? quis quoque posset pro affectu, de quo nulla facta est obseruatio, remedium per experientiam reperire? analogismus igitur, quando erunt inuenienda remedia per similitudinem habebit locum.

Similitudines verò, quibus vtuntur Empirici in analogismis faciendis, traduntur à Galeno libro de subfiguratione Empirica cap. 11. & alibi, ubi dicit, quod à locis affectis, ab affectibus, & à materiis auxiliorum depromuntur similitudines: à locis affectis, sicuti si in brachio aliquod appareret symptoma, idque aliquo auxilio sanaretur, Empiricus, qui vtitur similitudine locorum affectorum, quando viderit, quod simile symptoma accadat cruri, statim ob similitudinem harum partium extremarum, putabit eodem remedio posse cruris affectum tolli: ab affectibus colliguntur similitudines, exempli causa, si fluxus sanguinis è naribus bolo armena supprimatur, & eodem remedio putarent Empirici, alui sanguineum fluxum arceri posse: à materiis, veluti si cydonium præstiterit auxilium; à simili dicerent mellipillum idem emolumentum alaturum; quia ambo vires astringentes sortiuntur.

Duplex est analogismus Empiricus, & Dogmaticus.

Ut sit analogismus in Galen.

“  
“  
“

Similitudines analogismi vnde colliguntur.

*Analogismus  
Empiricorum  
reijctur.*

Cæterum, quam sæpè ob hanc malam philosophandi rationem in errores prolabantur, antequam initiis analyticis Empiricorum errata aperiamus: casus, & exempla medica, quibus conuinci possunt Empirici, afferantur: expendamus sputum sanguineum, cui dubium, quod modo profluat sanguis ob fracturam, modo ob erosionem venarum, modo ob diapidisim, & modo ob anostomasim: quis tam rudis crederet, quod vnicum remedium posset accommodari omnibus his diuersis, & contrariis causis? simili modo erit in aliquo ægrotante vrinæ suppressio, an ne hoc symptoma aliquando ob calculum, aliquando ob inflammationem, & aliquando ob distensionem vesicæ sit? symptoma est vnum, vel similemum, nihilominus remedium non potest esse vnum; etenim, si suppressio fuerit facta ob distensionem, tunc, si miserimus catheterem, statim iuuabimus; quia vrina è vestigio diffluet: si verò suppressio fuerit facta ab inflammatione, ex vsu catheteris nullum habebimus leuamen. Galenus libro de optima secta ad Trasylb. capit. 23. loquens de analogismo affert hoc exemplum; si suppressio fiat ob inflammationem, adiungendum esse cataplasma, si ob calculum, esse secandum, vt extrahatur: ecce igitur, quod in vnico affectu remedia diuersa, & aliquando contraria esse debent: ecce, quod ex similitudine symptomatum nullo modo colligere possumus remedium.

*Vt affectus  
dissimilis idem  
remedium  
inducit.*

Postremo tantū abest, vt affectuū similitudo indicet vnū remedium, vt sæpè possit accidere, quod affectus omnino dissimilis requirat idem remedium: exempla afferuntur à Galeno locis citatis, vbi dicit, in tetano, emprostotano, & opistotano, quæ sunt symptomata diuersa, vnicam esse affectuum naturam, vnicamque formalem causam, & hanc esse conuulsionem, dicitque eadem requiri remedia, licet symptomata videantur esse contraria. Demum poterit esse sanguinis eruptio, obstructio, inflammatio, qui affectus licet sint diuersi, possunt tamen ab vnica plenitudine pendere, quæ vnico quoque remedio tollitur, scilicet euacuante; quare nec vnicum symptoma, nec simile nos docebunt remedium; nec dissimile & contrarium dissimile, & contrarium remedium indicabunt.

*Ostenditur, quod analogismus ratione forma sit  
paralogismus.*

#### C A P. I I.

**N**VMOQVIO analogismus Empiricorum sit modus ineptus perquirendi remedia; necne, dicimus, quod non ad medicum, vel philosophum hæc conuictatio pertineat, sed ad syncerum logicum, cuius munus est decidere, an argumenta falsa, aut vera sint.



sint. In hoc capite igitur analogismi vitia ad arguendi formam pertinentia declarabimus: primum igitur analogismi vitium est, quia medius terminus quo utitur Empirici pro cognitione remedij, est communior passione curanda, & eius remedio, quod vitium pertinet ad secundam figuram ex duabus affirmatiuis, quæ ab Aristotele in libro priorum, & 2. elenchorum cap. 5. est reiecta; medius enim, quo utuntur in analogismo, est similitum symptomatum concursus, qui obseruatur in affectibus omnino diuersis, quales sunt vrinæ suppressio, sputum sanguineum, & alij plures, qui à diuersis fiunt causis; erit igitur symptomatis similitudo quid vniuersalius, & ex illa nihil inferri poterit: non valet, est lumen, ergo est sol, cum ignis, & plura purrida luceant. Nec dicant Empirici, quod multa requirantur, quibus distingui possit suppressio à calculo, ab illa, quæ sit à distensione, vel inflammatione vesicæ; quia, si res cõte distinguerent, coacti admitterent distinctam cognitionem causarum, quas putabant esse incognoscibiles: nunquam suppressionem vrinæ à calculo factam ab aliis distinguerent, nisi quod cognouerint, quod illius causa calculus sit: similiter dicendum de sputo sanguineo; Empyricus, exempli causa, semel sanauit sanguineum sputum saccharo rosato; quia sanguis qualitate peccabat; nunc supponatur, quod ob sanguinis copiam sputum sanguineum fiat, tunc quomodo ex concursu eiusdem symptomatis (nisi causam cognoscat) colligere poterit remedium? saccharum rosatum in copia sanguinis maxime læderet: similitudo igitur est medius terminus nimis vniuersalis, vt inde remedia pro auferendis causis colligere possimus: de ratione medij termini ex Aristotele est, vt contineat, & contineatur, si solum contineat, non est amplius medius, & ex eo nihil sequitur: quis admitteret hunc paralogismum factum ex medio termino, qui solum continet, & à maiori extremo non continetur? ignis est elementum, aqua est elementum, ergo aqua est ignis: elementum quod est medius terminus ab igne non continetur, hinc ex illo nihil inferri potest.

Præterea analogismus non solum est argumentum in secunda figura ex affirmatiuis; verum etiam est irreducibilis ad primam: audias, quomodo syllogizant, dum ex suppressione vrinæ colligunt remedium consistere in vlu catheteris: omnis affectus catheterere indiget, qui est alteri, cui profecerit quamsimilimus; sed hæc suppressio vrinæ est affectus ei, cui profecerit quamsimilimus, ergo hæc suppressio indiget catheterere. Hæc propositiones neque per conuersionem, neque per transpositionem possunt redigi ad primam figuram: non per conuersionem, quia maior propositio, in qua prædicatum est communius subiecto, fieret particularis, & per consequens esset vana; quia in prima figura ex maiori particulari nihil omnino inferri potest. Quod igitur affectus quamsimilimus latius se habeat, quam ille, qui eget catheterere, patet, quoniam similitudo istius affectus non solum est in calculosis; verum etiam in vesicæ distensione, & inflammatione: erit ergo necessarium, vt illa maior stet sicuti posuimus: posito verò, quod

*vt analogismus emp. procedis ex medio communiori maiori extremo.*

*Obiect.*

*Sol.*

*vt analogismus sit irreducibilis ad primam figuram.*

in maiori medius terminus prædicetur, illico est secunda figura, quia etiam in minori prædicabitur; nisi quis in alium peiorem errorem transiret dicendo, quod detur quarta figura, in qua propositiones sunt præter naturam, & in qua semper medius continetur, quod est monstruosum, veluti si diceremus, dolium esse in vino, vel arcam in nummis. Non per transpositionem, quia transponas maiorem, vel minorem, semper medius terminus prædicabitur, & erit secunda figura ex paris affirmatiuis.

*Ut analogismus sit falsum enthimema*

Præterea dum dicunt, illud remedium esse iuuaturum, quia profecit alteri huic quam similitimo, incidunt in enthimema ex signis communibus, quod non concludit: quis inferret, quod mulier pepererit ex eo, quod pallida sit, cum pallor ab innumerabilibus causis euenire possit? eo lem modo affectuum similitudo est communis iis, quibus supprimitur vrina ob calculum, ob inflammationem, & ob distensionem vesicæ.

*Ut analogismus est exemplum ex quo nil inferitur.*

Insuper, qui hoc analogismo, vel argumento à simili vtuntur, in remediis perquirendis arguendi modum ab exemplo desumunt, veluti Socratem correptum ipso sanguineo hæmatites, vel saccharum rosatum iuuat, ergo & alios ipso sanguineo correptos iuuabit: hæc exempli consequentia ab Aristotele 2. priorum cap. de exemplo reicitur, quia est à partes ad partem, quod non sequitur, vt ibi docet: ad hæc ab Aristotele exemplum vocatur inductio imperfecta, quæ cadit semper in tertiam figuram cum vniuersali conclusione, quæ non sequitur, quia ex particularibus neque vniuersale, neque particulare colligi potest; non vniuersale, quia ex Aristotele de ratione conclusionis est, vt semper deteriorem partem sequatur, si à præmissis debeat contineri: non particulare, quia non datur processus ab eodem ad idem.

*Figura 2.*

Scio, me plurimis nauseam fortasse inferre ob hanc toties repetitam logicam, verum, quia nullam aliam inuenire possumus viam, quæ reiici possit falsus analogismus, aliqua sumus excusatione digni, eo magis cum Aristotelem imitemur qui alio modo in naturali philosophia, & metaphysica non potuit veterum philosophorum paralogismos infringere, quàm logica, non semel, sed decies repetita; quare non erit abs re, si aliis quoque mediis logicis hūc Empiricorum analogismum reiecerimus: age, si analogismus aliquam haberet inuentionis vim, eam, cum ex similibus exemplis procedat, colligeret (vt diximus) virtute inductionis, at ab Aristotele 2. post. tex. 4. ostensum est, quod occultum per inductionem nunquam possit inueniri, ergo analogismus erit omnino inutilis: medici munus est remedia, quæ sunt occulta perquirere; etenim, si ex se nota essent, neque experientia, neque demonstratione indigeremus; ratio potissima, cur inductio non aperit occulta, est, quia semper procedit ex particularibus, à quibus nil sequitur, omne enim quod inferitur debet fundari in dicto de omni, vel de nullo, vt altissimis rationibus ab Aristotele in libris priorum probatum est.

*Ut analogismus est in induc-  
tione ex qua nil colligitur.*

Præterea,



Præterea, dum aliquid occultum per aliquam ostensionem manifestatur, solum id fieri potest ratione trium terminorum, qui sint inter se distincti. & tales, ut maior terminus differat à medio forma seu definitione, dum enim definitione formali conueniunt, non manifestantur quod quæritur, & argumentum redditur omnino ridiculum, quia semper supponet principij petitionem: hæc doctrina est Aristotelis 2. post. tex. 12. ubi probat, quod nunquam per definitionem seu formam maioris termini occulta manifestantur: exemplum Aristotelis est tale: si quis probaret glaciem esse in aqua ob defectum caloris, nihil probaret; quia defectus caloris formaliter non differt à glacie: & hæc est causa, cur neque genus, neque differentia maioris termini possint manifestare quæsitum. Quod igitur argumentum in quibus medius terminus est genus aliorum terminorum sit vanum, comprobetur aliquo famoso exemplo, hocque afferatur, omne quod est, substantia est: phoenix est substantia: ergo phoenix est: argumentum est nullum; quia substantiam esse est medius terminus, estque genus phœnicis, & in maiori propositione est manifestissima petitio; quia, qui negabit phœnicem esse, negabit quoque, phœnicem esse substantiam: eadem sequentur incommoda, si quis probaret per differentiam quæsitum, veluti, si quis probaret, hominem esse, hoc syllogismo; est animal rationale, ergo est homo. Cum igitur medius terminus forma seu definitione debeat differre ab eo, quod quæritur, quomodo transeundo à particularibus ad aliud particulare, quæ non forma seu definitione differunt, poterimus aliquod occultum remedium manifestare; particularia enim, si fuerint eiusdem speciei, non different forma, transitusque erit ab eodem ad idem: si diuersæ speciei, erit transitus omnino vitiosus; quia particularia, ut particularia solum per hic, & nunc distinguuntur: amplius si committatur petitio principij ob transitum, qui fit à genere ad speciem, quanto maior committeretur à particulari ad particulare? species, quamuis forma aliquo modo conueniat cum genere, est tamen maior differentia inter speciem, & genus, quam inter particulare, & particulare: maximus igitur erit error illorum, qui approbant remedia, quia alios iuuarunt; quandoquidem illorum petitio non est ob transitum à genere, vel differentia ad speciem, sed ob transitum à particularibus ad particulare, inter quæ nulla omnino cadit formæ distinctio.

Ad hæc supposito, quod Empiricorum analogismus sit inductio, vel transitus à particularibus sine causarum cognitione, in alia duo errata ad formam arguendi pertinentia Empirici videntur prolabi: quorum primum est, quia de ratione præmissarum est, ut contineant conclusionem; sed sic est, quod particularia nihil possunt continere, ergo ab illis nihil colligi, vel inferri poterit; si igitur vim inductiuam habebit analogismus, ut aliqui putant, erit in perquirendis remediis vanissimum argumentum. Secundum, qui arguunt ex particularibus necessario incidunt, vel in primam figuram, vel in secundam cum maiori particulari: maior particularis neque in prima, neque in secunda

*Ut analogismus sit ex duabus terminis quod est monstruosum.*

*Duo errata forma analogismi inextensibilia.*

*Cur maior propositio neque in prima neque in secunda figura possit esse particularis;*

figura accommodari potest: non in prima, quia medius terminus; si debeat manifestare, cur passio inhæreat subiecto, debet in maiori contineri, & in minori propositione continere. Non in secunda, quia in hac medius prædicatur in maiori de quæsito, seu de maiori extremitate, at sic est, quod de ratione maioris extremitatis est, ut semper contineat minorem; idcirco semper maior in secunda figura erit vniuersalis; nullus igitur relinquitur modus probandi, quod analogismus possit esse argumentum aptum ad perquirendum aliquid, quod sit occultum.

*Ostenditur, quod analogismus ratione materia sit paralogismus.*

### CAPUT III.

**Q**UOD analogismus Empiricorum peccet quoque in materia, facile ostendi potest: illud in primis se offert analogismi erratum, quod ab Aristotele reiiicitur 1. post. cap. 5. quod est, dum attribuitur inferiori, quod superioris est: obseruant, exempli causa, Empirici, quod aliquod remedium curet tetanum; statimque putant, quod illud non possit conuenire emprostotano, & opistotano; quia sunt affectus dissimiles; putant enim, quod remedia hauriantur ab affectibus quam-similibus: error illorum est, quia quod tetanum curat, non est tetani remedium, sed conuulsionis, quæ æquè prædicatur de tetano, & de aliis suis speciebus: eadem ratione, dum curant inflammationem factam à pleuritide virtute phlebotomiæ, credunt hoc auxilium conuenire inflammationi, & affectibus quam-similibus, & non aliis. Error hic apud Aristotelem apertè reiiicitur, dicit enim quod habere tres angulos non conuenit primo schaleno, sed triangulo: curatur inflammatio remedio, quod tollit plenitudinem, quod non conuenit primo inflammationi: à plenitudine enim obstructio, febris & sexcenta symptomata omnino dissimilia oriri possunt.

Prius multis modis ab admirandis Aristotelis præceptis traditis in lib. post. analogismus Empiricorum desceat: 2. post. tex. 25. agēs philosophus de adæquata causa, prout potest esse, medius terminus in optima demonstratione, dicit, quod in huius causæ inquisitione triplex error committi possit, quorum primus est, dum assertur causa communis loco adæquate. Secundus, dum assertur causa extranea: tertius, dum partialis: dicimus igitur, quod dum attribuunt tetano, quod est conuulsionis, accipiant partialem causam pro adæquata & totali, quod non licet in Medicina, in qua tractatur de hominis vita, vti synecdoche figura; sed Poetis est relinquenda: eodem modo dicimus, dum ab urinx. suppressione communiter sumpta colligunt esse utendum syringa, quod ex medio communi procedunt, qui est ineptus ad perquirendum remedium accommodatum pro tollenda suppressione facta

*Ut empirici  
attribuunt  
inferiori  
quod est su-  
perioris.*

*Ut medius  
terminus a-  
nalogismi  
Empiricorū  
modo sit cō-  
munis, modo  
partialis.*



ne facta ab inflammatione, vel calculo: est Galeni, locis superius citatis, quod syringa conueniat solum in distensione vesicæ, in inflammatione vero cataplasma externum, & in calculo sectio Lithotomi.

Amplius Aristoteles 2. post. circa finem, vbi agit de ritè proponendo problemate, dicit, quod in qualibet contemplatione, ne labamur in lyres, debeant proponi passionēs, quæ æquè dicantur de subiectis; si quis applicaret risibilitatem animali, vel hominibus Italis tantum, & non Turcis, vel Indiis, nihil de hac passione posset concludere: similiter, si daretur remedium, quod curaret tetanum, & Empiricus non crederet, illud quoque conuenire opistotano, & emprostotano, nec ritè problema proponeret, & de hac re loquens semper vacillaret; quia remedium curans tetanum est accommodatum conuulsioni, quæ æque deinde dicitur de propositis speciebus, dum verò vice versa speciei remedia applicant generi, vt diximus de syringa, quæ omnibus vrinæ suppressionibus ab illis applicatur, errant, quia, vt optimè dicit Auerroes, species non est de natura generis, sed genus de natura specierum: accidit enim species generi, & genus sine aliqua specie stare potest: nihil enim pateretur animalis natura, quamuis sub cælo non esset Leo, vel Homo, quia animal posset se conseruare sine homine, & sine leone; species igitur quælibet ex se non erit de essentia animalis.

*Vt errant dū remedia speciei applico generi.*

Præterea, qui vruntur analogismo transeunt ad similia, & inde colligunt remedia; at transitus ad similia non fit in genere vniuoco, sed analogo, ea enim quæ vniuocè conueniunt, non dicuntur similia; sed eadem; addimus, quod, qui vruntur analogia semper transeunt de genere in genus; quanti vero sit hoc vitium, Aristoteles 1. post. & Galenus 1. ad Glauconem, & alibi, demonstrauit ex medio alterius generis nihil concludi posse; media enim & extrema 1. post. tex. 20. ex eodem genere vniuoco sunt sumenda: ratio est, quia inter analogata nulla est naturæ conuenientia, nec dependentia; medulla, quæ est in animalibus, & quæ est in arboribus, quamuis analogicè conueniant, seruentque similitudinem, attamen eorum naturæ toto cælo inter se differunt: similiter sepium, & ossa natura differunt. Ad eundem modum dicimus, quod suppressio vrinæ à calculo facta, licet quamsimilima sit illi, quæ fit ab inflammatione, & analogicè cum illa conueniat, differt tamen ab illa toto cælo: nemoque est ita mente obæcatus, qui diceret, quod illæ suppressiones (quamuis sint quamsimilimæ) natura non differant.

*Vt Empirici in analogismo transeunt de genere in genus.*

Insuper cum Empirici ex symptomate diuerso colligan remediū diuersitatem, & ex simili simile, eodem modo in errorem incidunt, sicuti qui præuè, & per differentias accidentales diuidunt, quod ab Aristotele reuocatur 2. post. tex. 19. & 20. non potest diuidi substantia, quod alia sit calida, alia frigida, vel quod alia sit anterior, alia posterior: similiter conuulsio, quod alia sit tetanos, alia opistotanos; quia hæc sunt accidentia, & passionēs ægrorum, & non propriæ differentię conuulsionis, à quibus solum debent remedia desumi.

*Vt Empirici præuè diuidunt.*

*Medius terminus solum  
valet dum est  
vniuersalis,  
& prædicati-  
uus.*

*Obiect.  
Sol.*

*Per similitu-  
dines affectuum  
locorum affe-  
ctorum & ma-  
teriarum de-  
cipiant.*

*Quomodo  
suppressio v-  
rinæ  
Vt est aliqua  
suppressio non  
inducet cathete-  
rem.*

Ad hæc ex Aristotele loco citato habemus, quod inter membra di-  
uisa illarum differentiarum, quæ genere conueniunt, si proba fuerit  
diuisio, medium nullum cadere possit, at qui putant tetanon, empro-  
stotanon, & opistotanon esse tales differentias, vt inde remedium  
perquiratur, accipiunt illud à differentiis, inter quas datur medium,  
vel quæ sunt accidentales, à quibus per se nihil colligi potest: porro  
ex iis, quæ ostendimus, remedium solum infertur ab aliquo, quod sit  
vniuersale, & prædicatiuum, quia medius terminus ducens nos ad  
cognitionem cuiusque quæsitum, nunquam potest esse particularis, sed  
solum specificus, nisi admittamus quartam figuram, & alios mon-  
struosos errores, de quibus superius: sed tetanos, vt tetanos non est  
quid vniuersale, & prædicatiuum; sed tetanos, vt conuulsio, quæ di-  
citur etiam de aliis differentiis; ergo nihil erit in tetano, quod possit  
nobis significare remedium pro illius affectus cognitione. Nec mihi  
quis obiciat, quod Empirici nulla vtantur diuisione, quia arbitra-  
bantur causas esse imperceptibiles: namque antiqui, quæ vnum spe-  
cimen similitudinum habebant, coacti admittere debebant, dari cau-  
sas saltem innominatas, quas dicebant esse imperceptibiles; quarum  
similitudines diuersum indicabant remedium; diuersæ igitur simili-  
tudines diuersas morborum naturas ab illis incognitas significabant:  
erant igitur coacti similitudines diuidere, vt formarent varios analo-  
gismos; & varia colligerent remedia. Quod vero similitudines sym-  
ptomatum, quibus vtuntur, illos decipiant, patet; quia sæpe sub vni-  
co membro ponunt quæ toto genere differunt, veluti dum stat apud  
illos pro specifica differentia suppressio vrinæ; suppressio enim est  
quid æquiuocum, & sub hoc nomine significari potest calculus, vesi-  
cæ inflammatio, vel distensio: eundem errorem committunt in mate-  
riis auxiliorum, & in locis affectis. In materiis, quia licet cydonium  
astringat, & inde roboret ventriculum, errant dum dicunt, mespilum  
astringit, ergo roborat. Galenus enim libro de optima secta ad Tra-  
syb. dicit, absinthium roborat, quia astringit; marrubium, quamuis  
aliquomodo astringat, non tamen roborat ventriculum, quinimmo,  
eum reddit imbecillum, & flaccidum: in locis affectis quoque errant;  
quia oleum rosatum ex Galeni methodo in vulneribus capitis est con-  
coctorium, in aliis corporis partibus est percussio: quare qui per si-  
militudines affectuum, vel materialium, vel locorum affectuum pro-  
cedunt, in perquirendis remediis errabunt, & hoc fallaci modo ægros  
sæpius lædent, quàm proderint.

Denique, qui ex sola symptomatum similitudine remedia colligunt  
nulla præhabita cognitione causæ efficientis, & materialis, vel subie-  
ctiæ nec vniuersalem, nec particularem præceptionem habebunt,  
non vniuersalem, quia, si de vrinæ suppressione loquamur, falsa est hæc  
propositio, suppressio, vt suppressio requirit catheterem, quia valeret,  
ergo omnis, quod est falsum: non particularem, quia hæc quoque, si  
leuere philosophari velimus, non valet, aliqua suppressio requirit ca-  
theterem, quia non quatenus aliqua suppressio, sed quatenus hæc ali-  
qua



qua suppressio pender à distensione; de quo vero, & subtili philosophandi modo Auerroës loquens 1. post. tex. 21. proponit, an sit verum, dum dicimus, aliquod animal est risibile, dicitque, quod propositio est per accidens, & per consequens falsa, quia ut optimè dicit Auerroës, omne per accidens falsum est: homo non quatenus est aliquod animal, est risibilis; sed quatenus est homo; similiter non aliqua suppressio indiget catheteri, ut aliqua suppressio, sed quatenus ob distensam vesicam talis est; quoniam remota causa distensionis, remanet adhuc aliqua suppressio, sicuti remoto homine, remanet adhuc aliquod animal, quod non est homo, & quod non est risibile. Hinc Aristoteles, ne in similem incideremus errorem 2. post. valde laboravit, ut nos doceret, quomodo ritè debeat proponi problema, docuitque, quod passio quærenda debeat applicari illi subiecto, cui æquè conveniat, quodque non excedat passionem, neque ab illa excedatur: docuitque, quod, quando subiectum proprium passionis propriæ delitescit, coarctari debeat per concursum multarum passionum communium, donec innominatum subiectum fiat convertibile: quem modum procedendi Aristoteles 2. post. exemplo animalis habentis tres ventres declarat, dicitque, quod cognoscetur, quia habebit cornua, & carebit dentibus superioribus. Empirici ex similibus symptomatibus neque causas, neque propria subiecta poterant inquirere, quia logica omnino spoliati cæcorum more in scopulos in qualibet contemplatione medica illidebant. Præterea neque incognitas causas concursu similibus symptomatum coarctabant, ut vera remedia inuenirent, nec separabant vtilia ab inutilibus: omnia illorum signa erant inepta ad docendum; quia vel erant communia, vel supergredientia: quod communia non coarctata nihil doceant, sufficiat nobis, ut afferamus paralogismum Brissonis, qui per hoc commune principium, scilicet, *ut communia* quæ sunt eisdem maiora, & minora sint inter se æqualia, putabat colligi posse quadraturam circuli: neque videbat, quod principium erat *principia nihil doceant,* commune, & per consequens aliquando falsum: quatuor enim, & sex sunt simul maiora tribus, & minora octo, non tamen sunt æqualia. Quod denique supergredientia semper decipiant, patet, quia sunt alterius generis, & ex illis nihil infertur: nunquam igitur ex concursu similibus symptomatum remedia colligemus.

---

*Quid sit Analogismus Dogmaticorum, & quomodo formetur.*

CAPUT IV.

**S** affectus præter naturam ignoratur, non per indicationem, quæ à præcognita natura morbi dependet, remedium inueniet: sed per experientiam, vel analogismum; per experientiam, si illius morbi aliquam habuerit observationem; per analogismum, si occulta, & noua

fuerit ægritudo, quia illa, vt occulta, non præcognoscitur, & vt noua, non obseruatur per experientiam: exemplum est lues gallica, quæ, dum ab Indiis fuit ad nos delata, neque per indicationem, vel experientiam in eius curatione erat procedendum: sed solum per analogismum dogmaticum; statim enim ad nos non fuit guaiacum delatum.

*Qua sit differentia inter analogi-  
smum dogmaticum,  
& empiricum.*

Differentiam inter analogismum dogmaticum, & empiricum tradit Galenus libro de optima secta ad Trasylb. cap. 18. & 19. vbi dicit, quo Dogmaticus separat vtilia ab inutilibus: Empiricus confusè miscet, ac implicat vtilia inutilibus. declarans Galenus, quæ sint vtilia, & quæ inutilia, dicit, quod symptomata vtilia ad bonum analogismum pertinentia sunt quæ desumuntur à causis, locis affectis, & à virtute; inutilia vero, quæ desumuntur à symptomatibus patientis, quæ licet aliquando eadem videantur esse, vt dictum est de suppressione vrinæ, & de spuito sanguineo, omnino diuersa debent proponi auxilia. Dogmaticus, quamuis sibi proponat curandum morbum occultum, dummodo eius causam, virtutem permittentem, & locum affectum ex actionibus lætis cognoscat, adeo innominatam morbi naturam coarctat, & limitat, vt semper virtute analogismi accommodatum remedium perquirat; exemplum, supponatur occulti morbi causam esse bilem, an ne statim dicimus esse euacuandam? Sed quomodo, nescitur, nisi confugiamus ad locum affectum, & virtutem; loci affecti ex lætis officiis cognoscuntur, ex respiratione læsa dicimus Thoracem esse lætum, ex vomitu ventriculorum ex delirio cerebrum, & sic de aliis; si igitur æger in vomitum esset valdè pronus, dicemus ventriculorum esse læsum; cognito igitur causam esse bilem, locum affectum esse ventriculum, & vires permittere, statim virtute analogismi dogmatici colligemus quod vomitorium sit proportionatum remedium.

*Ut comparatur analogismus dogmaticus indicationi.*

Hic Dogmaticus analogismus est indicationi valdè similis; sicuti enim indicationes à causa desumptæ dicuntur præseruatiuæ, à morbo curatiuæ, à virtute vitales: sic in hoc analogismo obseruantur symptomata causarum, & locorum affectorum, qui limitant causam, & describunt innominatam morbi naturam: humores peccantes sunt communes causæ morborum; à locis affectis morbi fiunt specifici; ex Galeno; de sympt. causis cap. 2. habet, atram bilem, si in toto redundet facere elephantiasim, si in parte cancrum: bilem flauam, si in toto icterum, si in parte, ei yslpelas, si in ventriculo, vomitum, si in membranis cerebri, phrenesim, & sic de aliis partibus: patet igitur, quod loci affecti limitant quoque innominatam morbi naturam; Hippocrates, & Galenus, cum sæpè videant specifica indicantia esse nobis occulta, vtuntur in perquirendis remediis analogismo dogmatico, quippè qui post indicationem tenet primum locum: & præcipuè 4. de ratione vict. in ac. comm. 19. cum videant, quod indicans specificum phlebotomiæ sit occultum, & innominatum, illud per concursum signorum declarant, vt inde nos possimus scire, quando conueniat sanguinis



guinis misto: dicunt magnitudinem morbi, virtutem robustam, & floridam ætatem indicare sanguinis euacuationem; ac re vera, si vnum indicet vnum, & vnum indicetur ab vno; ex iis tribus non colligemus per indicationem, quando sit mittendus sanguis: patet primo, quia sola magnitudo morbi non sufficit, patet secundo, quia magnitudo remedij indicatur à causa, & à morbo: quam instantiam nunquam Alexander Massaria, neque cæteri, qui putarunt magnitudinem morbi esse proprium indicans phlebotomiz, soluere potuerunt; magnitudo igitur cum sit quid genericum, quod limitatur à virtute, & aliquando à loco affecto præstanti, non pertinebit ad indicationem; relinquitur ergo, vt pertineat ad analogismum dogmaticum; alij enim non dantur modi, quibus inueniri possint remedia, nisi tres proponiri, qui sunt indicatio, analogismus, & experientia.

Similiter dum Gallica lues ad nos fuit delata non statim potuerunt medici per experientiam, & indicationem præsidia inuenire: non per experientiam, quia antea talem morbum non viderunt: non per indicationem, quia specifica huius affectus differentia erat ignota; neque illicò cognitum fuit guaiacum; per analogismum igitur in curanda lue procedebant: videbant affectum fuisse quam similitimum iis, qui ex corruptione, & putredine fiunt; ideo poterant dicere morbum ratione propriæ essentiz esse magnum, & poterant dicere, robore virium permittente phlebotomiam fore illis frugiferam: amplius videbant, in confirmatis affectibus scabiosis hydrargirij inunctionem valere, videbantque à gallica lue scabies, & plurimos alios affectus cutaneos produci; ideo poterant virtute permittente concludere, similem inunctionem gallico morbo profuturam. In hoc exemplo de lue gallica est inuenta hæc inunctio per analogismum dogmaticum, primò quia obseruatur ex symptomatibus sæuissimis magnam esse causam, quæ magnum requirit remedium. Secundò obseruatur locum affectum fuisse præcipuè cutim; quare, remediis auferentibus cutaneos morbos sæuiiores, meritò concluditur esse procedendum. Tertiò obseruatur, virtus permittens, quæ scilicet sit fortis; quoniam remedia magna sine forti virtute non debent administrari.

Discrimen inter analogismum Empiricorum, & Dogmaticorum est, quia Empiricus in remediis inueniendis procedit per signa communia: Dogmaticus per conuertibilia. Empiricus à particulari ad vniuersale facit transitum, dicit enim, iuuat cydonium, ergo & mespillum, & alia similia astringentia, quod non valet. Dogmaticus ab vniuersali ad particulare procedit, ei non sat est scire, quod mespillum astringat, sed exquirat quo gradu id efficiat; à gradibus igitur procedens ad remedia inuenienda est transitus ab vniuersali, & nequaquam à particulari. Empiricus procedit per symptomata patientis, quæ sunt omnino inuutilia, vt ostendimus. Dogmaticus per symptomata causarum, locorum affectorum, & virtutis; exempli causa, dicerent Empirici, Socrates, qui non poterat incedere, lotionibus curatus est, ergo & Plato, si incedere non poterit, iisdem lotionibus curabitur; Dog-

*Magnitudo morbi & virium robur per analogismum do. es. esse phlebotomandum,*

*Vi per analogismum inuenta fuerint remedia pro curatione luis gallica.*

*De parallelo analogismi dogmatici cū empirico.*

maticus, quamuis nesciret, quo morbo Platonis incessus sit impeditus, procedens tamen per signa locorum affectorum, causarum, & virtutis remedium certum inueniret; quia quæreret, an læsio principaliter sit in musculis, & in quo; an in neruorum trunco, & stipite; atque cognita parte affecta: cognito, virtutem permittere, & causam esse humorem frigidum, quod faciliè cognitu erit, remedium promptissimè inueniet. Dogmaticus partes affectas ex læsis officiis propriis profundè perquirir, & deinde per analogismum, si occultus est morbus, remedium colligit. Empiricus non distinctè de locis affectis agit, sed solum de symptomatibus patientis, quæ ad rem non faciunt: tota enim medicæ artis difficultas stat in exacta locorum affectorum cognitione; quod cognouit Galenus, qui in methodo cap. 20. dicit, si quis adimat indicationem à parte desumptam, adiscet totam medicinam sex diebus. Dogmaticus, quamuis morbus delinascat, distinguit symptomata, & perquirir in qua actione læsa, in quo exeunte, & in qua mutata qualitate sint. Empiricus non considerat genera symptomatum pendentium à causis, & locis affectis; sed à patiente, quo fit vt ferè semper transeat de genere in genus; quia idem symptoma patientis potest sub diuerso symptomatum genere, & sub diuerso causarum genere contineri, quale est spurum sanguineum, quod modo fit à venarum erosione, modo ab apertione oculorum, & modo à sanguinis nimia tenuitate. Dogmaticus distinctè quærens quæ pars sit affecta, & quæ sit causa affectus, consultius in perquirendis remediis procedit: si aliquis haberet aluum adstrictam, & medicinam ab empirico peteret, ab illo alia non dabitur, nisi, quæ à symptomatibus patientis colligi possit; at symptoma patientis est alui constrictio, dabit ergo medicinam aluum mouentem, quam præ manibus habebit, quæque cæteris omnibus, qui adstrictam aluum habuerunt, porrexerit. Dogmaticus verò, quamuis nesciret ob quem morbū adstrictam aluum patiens haberet, inueniet per læsa officia in qua parte corporis occultus morbus sit; expendet virtutem totius, & partium, & ex symptomatum concursu remedium necessario colliget frugiferum: si viderit ventrem esse exsiccatum, non dabit aloem, scammonium, & alia soluentia id genus; sed potius tamarindos, & cassiam: namque hæc lenientia reddent corpus fluidum, & humectum, & omnem siccitatem, & ardorem compescunt: si viderit esse aluum adstrictam; quia iecur non gignat bilem, non dabit rhabarbarum: si viderit ob nimios flatūs esse adstrictam, videritque ventriculum esse læsum; quamuis nesciret, quo morbo laboret, colliget ex flatibus, & læsione ventriculi non esse dandam cassiam, sed potius hieram, dummodò tamen virtus totius & partis affectæ permitteret: diximus virtutem totius, & partis à Dogmatico considerari ad differentiam Empirici, qui cum sapè non consideret, an virtus partis permittat, in grauissimos incidit errores; plurimi enim sunt, qui in erysipellate mamillarum, & aliarum partium mollium, & flaccidarum vtuntur suppurantibus, quæ mirum in modum laxant, quo fit, vt pars debilis ob Empirici erratum in cancrenam sapè

Quomodo  
tractetur a-  
luus adstricta  
ab Empirico.  
& quomodo  
à Dogmatico.



sapè cedat: similiter, dum aliquis claudicat, Empiricus hoc solum symptoma considerat, & pro huius symptomatis curatione vult vnicum esse remedium; nihilominus pro varietate causarum, & locorum affectorum varia sunt; etenim si aliquis claudicet, quia humores ad pedes descendant, remedium non applicabitur pedibus, sed partibus supernis, vnde prodeunt: si propter ruptum os remedium toto genere differt ab illo: si propter luxationem similiter erit omnino diuersum. Hæc omnia Dogmaticus distinguit, & quamuis morbus esset occultus, dummodo cognoscat particulam affectam, causam, & virtutem totius, & partis remittere, colliget remedium iuuans, & non decipietur. Empirici nunquam remedium certum inueniunt, quia procedunt ex concursu symptomatum patientis, transeundo de genere in genus, & permiscendo symptomata, quæ sua natura sunt impermiscibilia.

---

*Vt colligitur à veris Medicinae fundamentis, quod experientia sit fallax.*

C A P V T V.

**O**STENDIMVS analogismum Empiricorum esse ineptum ad perquirenda remedia. Nunc, an per experientiam melius perquiri possint morborum auxilia, est videndum. Empirici nostrates sunt persuasi, quod experientia in tanto negotio vnica sit; etenim si bis, vel ter viderint correptum putrida febre, vel alio morbo, post exhibitum aliquod remedium sortitum esse bonum euentum, non amplius de remedio hæsitant, sed omnibus eodem genere morbi pollutis illud dant: vnde vexant non modo ægrotos, qui post eorum remedium exhibitionem pereunt, verum etiam, qui sanantur; natura viribus donata duplici vitur solertia, altera in pellendis morbis, & altera aliquando in corrigendis, & emendandis plagis ab insanis Medicis inflictis.

Hæc tamen diuina ars magis ab Empiricis nostratibus, quàm à Priscis est lacerata. Prisci constituebant tres fontes, vnde remedia colligebant, scilicet inspectionem propriam, historiam, & analogismum; deinde ad hæc tria capita omnia referebant remedia, ad fortuitum, consultum, & imitatorium, & demum ex signorum syndrome quid agendum colligebant. Nostrates sine analogismo, & experientia remedia obseruant: quinimmo, si legerimus Aristotelem, clarè videbitur, illos non percipere, quid significet experimentum. Aristoteles 2. post. cap. vlt. & 1. metaphysices, vbi docet, quomodo fiat experimentum, habet hæc verba, ex sensu fit memoria, ex multis memoriis fit experimentum, multæ namque memoriæ numero experientia vna est, ex qua deinde vniuersale in anima fit. Empirici, dum vident post ex-

*De parallelo inter Empiricos nostrates, & priscos.*

*Quomodo fiat experimentum.*

hibitum medicamentum ægrum subleuari, illicò putant de illo factum esse experimentum, quod ab experimenti definitione est omnino alienum; apertè nos docet philosophus, experimentum neque ab unica sensatione, neque à multis neque ab unica memoria, sed ex multis, & iteratis, memoriis fieri: quare tantum abest, ut medicamentum, post quod vident ægrum bis, vel ter subleuari, dicatur experimentum, ut neque memoria, neque sensatio bona de illico dici possit: & ratio est, quia ut plurimum Empirici decipiuntur circa sensationem, putant enim sanationem ab hausto medicamento pendere, quando à natura viribus optimis prædita prodir.

Prima causa, cur experimentum Empiricorum sit fallax, est, quia putant ex re semel visa colligi posse experimentum, quod Aristoteli, ut diximus, aduersatur: Secunda, quia circa res sensibiles decipiuntur, causa erroris est; quia in quolibet ægrotante variaz, & diuersæ sunt conditiones, naturæ, & affectuum idear, & quælibet potest variare medendi modum: hæcque varietates rerum, cum Empirici non consulant, nunquam ab experimentis sciunt remedia haurire. Quæ igitur causant varietates, sunt natura ægrotantis, ætas, tempus anni, regio, præsens constitutio, robur, habitus, consuetudo, solitum exercitium, morbus, causa, locus, symptomata, morbi similes, mos, motus, repletio, figuræ partium, pulsuum motus, animi mores iuuantia, & lædencia: sine distincto harum conditionum examine nunquam obseruabimus experimentum, illæ enim variam, & diuersam naturam agentis, & patientis patefaciunt.

*Vnde fiat  
quod Empirici  
semper decipiuntur.*

Quis diceret valere has consequentias? cassia profuit Socrati, ergo & Platoni proderit? dum erat iuuenis, ergo dum est senex? In hyeme, ergo etiam in æstate? dum erat in Germania, ergo dum est in Italia? Spirante austro, ergo & aquilone? profuit dum erat debilis, ergo dum est robustus? Nautæ, ergo & Nobili? assueto, ergo & insolito? ocioso, ergo exercitato? tertianæ, ergo & quartanæ? homini bilioso, ergo & pituitoso? In hepatis affectione, ergo & in stomachi? In remissis symptomatibus, ergo, & in vigenibus? Proprietates quoque morbi, & constitutionum sunt considerandæ: scribit Montanus Venetiis 1527. febres quasdam sæuisse, quæ solum illos interficiebant, qui vtebantur cassia: similiter non valet medicamentum, profuit in benigna febre, ergo & in maligna iuuabit. In augmento, ergo & in decremento. In repletionem, ergo & in inanitionem. In pulsu veloci, ergo & in tardo. In hilari, ergo & in tristi, & sic de aliis omnibus dici potest; omnes igitur conditiones sunt in quolibet ægrotante considerandæ, quia quælibet variare potest medendi modum.



<p>Particulares conditione agri ob quas varian- tur medicina.</p>	<p>A Galeno 2. ad Glaucnem cap. 2. &amp; Hippocrate 1. aph. 2.</p>	<p>Natura agrotan- ti etas tempus anni regio morbus præfens constitu- tio robur habitus consuetudo</p>
	<p>Ab Auicenna 4. 1. cap. 3. &amp; a' ibi ha &amp; alia colliguntur condiciones.</p>	<p>Ars solita causa locus symptomata similes morbi proprietas mor- bi mos motus repletio motus pulsus excrementa animi mores figura iuuantia ludentia</p>

Hic igitur non rectè ab Empiricis consideratis non est mirum, si in experimentis conficiendis infinities decipiantur: propositæ conditio- nes colliguntur ab Hippocrate, Galeno, & Auicenna: ab Hippocrate 1. aphorismorum 2. ubi habet, inspicere oportet regionem, anni tem- pus, ætatem, & morbum. A Galeno 2. ad Glauconem cap. 2. ubi pro- ponit ætatem, tempus anni, regionem, præsentem constitutionem, robur, habitum, consuetudinem, naturam ægrotantis: & cap. 1. addit mores, pulsum, motiones, calores, & colores: libro de arte medicinali præ cæteris proponit in quolibet curando affectu iuuantia. Ab Aui- cenna quarta primi capite tertio decem proponuntur, quæ sunt tribus carminibus expressa.

*Ars, ætas, regio, virtus, complexio, forma,*

*Mos, & symptoma, repletio, tempus, & usus,*

*Et, bene si numeros, figuram addere debes.*

Tria quoque carmina vagantur per scholas, quæ exprimunt, quæ sint in quolibet ægrotante considerata; hæcque sunt.

*Temperies, ætas, cæli status, ars solita, morbus  
Vsus, causa, locus, symptomata, innata facultas,  
Consimiles morbi, mors, motus, pharmaca, gestus.*

*Cur secreta  
medicorum  
sæpè legant.*

*Vs fallax sit  
experientia  
apud Gale-  
num.*

*Oratio inue-  
ctiva aduer-  
sus Empiri-  
cos.*

Ecce quàm varia sint præcognoscenda, antequam remedium experiamur, ecce quàm vana propterea sint rudiorum hominum secreta; illud enim quod semel iuuit mutata aliqua conditione ex propositis posset interficere: est igitur necessarium, vt conditiones agentis, & patientis exacte præsciamus, si velimus rectè mederi: Galenus 1. aphorismorum in principio dicit, subiectum circa quod Medicus versatur non ex corio, aut ligno factum est, in quo errata sine dolore possent emendari, sed ex carne, vt detrimentum nullum sine pœna possit refarciri, itaq; videntes experientiam esse periculosam, esseque argumentum à particularibus, dixerunt esse coniungendam cum ratione, ne nos decipiat. Hinc Galenus libro de sectis cap. 1. redarguit Empiricos dicentes experientiam sine ratione in remediis perquirendis sufficere. Similiter Galenus 3. aph. 11. docet, quàm fallax sit experientia, habet hæc verba, si quis expertus fuerit sex, vel septem homines aliqua medicina purgatos, dicere certo non poterit, quod omnes homines posthac ex necessitate purgabuntur: quod nostrates Empirici non obseruant; vbi enim vident medicinam semel iuuasse, eam non solum dant, sed statim exhibita, certam sanitatem in omni regione, in omni aëris constitutione, in qualibet natura, sit biliosa, vel pituitosa omnibus pollicentur. Similiter Galenus 7. de compositione med. per genera cap. 4. habet, si quis post me æquè studiosus, ac veritatis amator extiterit, ne temerè, ac subito vbi bis, teruè vsus, expertusque sit, ferat sententiam; frequenter enim ei ex longa experientia; quemadmodum & mihi vsu venit in secundo gradu dicta in tertium incipientem transponi debere videbantur. Si igitur sapientissimus Galenus post longam experientiam aliquando est deceptus, tanto magis, si ex illa aliquid colligemus, idem nobis contigerit; cum igitur nostratum Empiricorum plurimi neque ratione, neque experimentis vtantur; neque intelligant, sicuti ostensum est, quomodo fiat experimentum, eos reprehendimus non vt Medicos, sed vt carnifices, eosque non solum ab hac præclara arte, sed à bonorum hominum quoque congressibus explodemus. Plinius loquens libro 29. suæ Historiæ naturalis cap. 1. habet hæc verba: nulli magis, quàm se Medicum profitenti creditur, addit, negotiantur enim animas nostras, & experimenta per mortes agunt. Quid itaque scelestius est, quàm in Republica hosce admittere? quid in Ciuitate deterius, quàm consentire, quod ab iis occultis carnificibus homines innocentissimi sæpè occidantur; illi vt plurimum sunt scientiarum, & omnium bonarum artium ignari: si ab ipsis rationem medendi quaerimus, nobis referunt nomina ignota, & qualitates occultas: si percunctemur, vnde hauserint suarum opinionum fundamenta, citant Hippocratem, & Galenum, non tamen particularia loca, quasi quod sacris sit interdictum, Auctorum libellos, & capita propria referre,

*Ostenditur*



Ostenditur ex analyticis principiis, quod experientia sit fallax, & periculosa.

CAPVT VI.

**I**AM patet ex Hippocrate, & Galeno, quod omne experimentum sit fallax, & periculosum, nunc altioribus principiis ostendemus experimenti fallacias: prima est, quia omne experimentum acquiritur per inductionem, vel exemplum; at sic est, quod inductio, & exemplum reducuntur ad falsum syllogismum, ergo experimentum erit fallax: quod inductio, & exemplum reducuntur ad falsum syllogismum, patet, quia ambo concludunt in tertia figura cum conclusione vniuersali, qui arguendi modus est ab Aristotele reiectus; quia de ratione conclusionis non est, quod sequatur nobiliorem, sed ignobiliorem partem; ratio denique cur conclusio insequitur ignobiliorem partem est, quia si bona sit, semper continetur à præmissis, & contentum semper est ignobilius continente. Patet similiter, quod, qui procedunt per exemplum, & inductionem, supponant colligi posse vniuersale; quia non possent dicere, quod portulaca sit iuuatura Platonem; quia Socrati stupore dentium affecto aliquid opis præstitit, nisi virtute huius vniuersalis conclusionis, scilicet, quod omnibus hominibus eo stupore affectis possit accommodari; quare, cum hæc conclusio ab experientia desumpta sit vniuersalis, sitque in tertia figura non valebit, & erit vana. Aristoteles solum sex modos possibiles tertiæ figuræ proposuit, hunc vero cum conclusione vniuersali, vt inutilem reiecit.

*Prima ratio.*

*Ostenditur experimentum reduci ad tertiam figuram cum conclusione vniuersali.*

Patet similiter, quod experientia, exemplum, & inductio pertineant ad tertiam figuram, quia medius terminus, qui consistit in particularibus exemplis, necessario debet subici: quia prædicata in propositionibus naturalibus non possunt esse particularia.

Amplius, quando experimentum colligitur à particularibus, non concludet, quia ex puris particularibus nihil sequitur. Neque obliuiscas, quod experientia non ex duobus particularibus, sed à pluribus colligitur; quia respondemus, quod si ex mille eam colligeres, non posses vniuersalem conclusionem inferre; quinimmo si per millia millia induceres adhuc non posses conclusionem vniuersalem haurire; quoniam quælibet species vniuersalis sub se continet infinita particularia. Amplius cum conclusio non sequatur nisi ex prædicatis, quæ saltem de omni dicuntur, scilicet quod infinitis subiectis illius speciei & semper, dato adhuc quod per infinita particularia induceres, tibi adhuc esset videndum, an semper omnibus attributum conueniat: quod est omnino impossibile, vt mortalis homo per experientiam consequatur.

*Secunda.*

*Experientia esset paradoxum, quia ex infinitis part. colligitur.*

Præterea, experimentum cum fiat procedendo à singulari ad singulare, nihil concludere potest; quia ad colligendum aliquid requi-

*Tertias*

Nullus syllogismus bonus est, nisi tres termini formaliter differant.

runtur tres termini formaliter distincti: si medius terminus formaliter non differret à maiori termino, actum esset de demonstratione; qui enim ostenderet esse eclypsim, quia in luna est luminis priuatio, nihil doceret, & syllogismus ineptissimus faceret; quia eclypsis, quæ est maior terminus formaliter non differt à priuatione luminis: similiter errant qui probant portulacam esse iuuaturam Socratem, quia iuuat Platonem; & ratio est, quia Socrates, & Plato formaliter conueniunt: ratio analytica, cur ex iis, quæ forma conueniunt nulla sequitur conclusio, est, quia de ratione medij termini est, vt contineat minorem, & contineatur à maiori; dum verò formaliter ab aliis terminis non differt, nec contineret, nec contineretur.

Insuper, si portulaca curer Socratem, id efficit, vel quia conuenit propriè, & per se Socrati, vt est tale indiuiduum; vel per accidens: si per se, hic syllogismus iuuat Socratem, ergo omnes stupore dentium affectos iuuabit, erit nullus, quia quod vni per se, alteri per accidens conuenit: si per accidens, inde nullam conclusionem veram, & æternam inferre poterimus. Quod verò per accidens portulaca indicetur à stupore dentium Socratis patet, quia indicatur quoque à stupore aliorum indiuiduorum: patet quoque, quia portulaca posset stuporem dentium non solum in hominibus, verum etiam in aliis animantibus auferre: denique posset per accidens conuenire Socrati ratione regionis quatenus portulaca in Europa hanc virtutem habet, & non in aliis locis. Plantæ nonnullæ in diuersis Regionibus varias, & diuersas sortiuntur vires. Ferunt de Persico, quod in Persia sit virus, quamuis apud nos sit suauissimum alimentum. Postremò posset portulaca hūc stuporem tollere ratione habitus, ætatis, vel temperamenti: sunt Nautæ; & senes valido, & forti habitu præditi, qui vsu portulacæ stupore dentium non liberantur: ecce igitur quàm ineptum sit experimentum sine ratione ad colligendam vniuersalem conclusionem.

Quartaria.  
tio.

Ad hæc singularia, circa quæ versatur experientia, vt sunt singularia, nullas habent proprietates communes, sed solum vniuscuiusque proprias, quæ sunt hic, & nunc; Sed sic est, quod illud nunc, & illud hic, quippe conueniunt Socrati, vt Socrates est, neq; præteritis. neque futuris hominibus neque aliis præsentibus conuenient, ergo ab experimento nihil colligi poterit.

Quinta.

Amplius nullus est processus à particularibus ad cognitionem genericam, vel specificam, quia particularia accidunt generibus, & speciebus, potest enim humana species stare sine Socrate, & Platone, & animal sine homine, sed non Plato, vel Socrates sine homine, & sine animali, quo fit, vt in quolibet discursu possimus ab vniuersali ad particularia procedere, sed non versa vice.

Sexta.

Septima.  
Probatur authoritate,  
philosophorū,  
quod experientia non  
est vniuersalis.

Præterea autoritate Aristotelis, Alexandri, & multorum patet, quod experientia non dat vniuersale. Aristoteles 1. metaph. non longè à principio dicit, quod experimentum est circa singulare: ars vero circa communes conceptiones; additque: experimentum quo ad actionem,



actionem, & quo ad cognitionem esse singulare: 2. verò post. tex. 6. reprobat philosophus inductionem, vt insufficientem ad cognoscendum quid est, & vniuersale: & primo elenchorum dicit in omni inductione committi petitionem principij. Alexander Aphro. 1. top. cap. 1. definiens inductionem, quæ est experimenti idea, & quæ à singularibus procedit, dicit, inductio est oratio, ex qua quibusdam positis aliquid aliud, quàm quæ posita sunt accedit, sed non ex necessitate: ecce quod ab inductione nec vniuersale, nec particulare colligi potest; quia dicit, nihil ab inductione ex necessitate sequi: similiter cap. 10. primi top. Alexander dixit, inductionem esse progressum à singularibus ad vniuersalia, qui tamen non est possibilis: & cap. 11. eiusdem libri dicit, inductionem habere verisimile, sed non necessarium. Auerroes 2. priorum cap. 29. dicit inductionem nobis non conferre, quamuis completerentur omnia particularia. Diuus Thomas videns ab inductione particularium vniuersale ex necessitate non concludi in libris post. vbi de inductione loquitur, habet hæc verba, inductio non concludit nec demonstratiuè, nec syllogisticè ex necessitate: Io. Grammaticus dixit, inductionem esse inutilem ad cognoscendum vniuersale: merito itaque dicere poterimus, quod experimentum, quod ex omnium consensu inductione fit, sit fallax, & periculosum.

Sed magna exurgit dubitatio, quia est Aristotelis auctoritas, & ratio, quod experimentum det vniuersale. Aristoteles 2. post. cap. vltimo habet hæc verba: Cum vnum particulare in memoria steterit, tunc primum incipit in anima esse vniuersale: sed sic est, quod particularia virtute inductionis, vel experientiae conseruantur in memoria, ergo inductio, vel experientia pariet vniuersale. Præterea experimenta videntur parere cognitionem causarum, & demonstrationem quia; at sic est, quod causarum cognitio est vniuersalis, ergo experimenta indicabunt vniuersale; maior pluribus exemplis confirmatur; sed duo omnium vice afferri possunt; suntque, quia non videtur, alio modo addisci posse hæc vniuersalia, quod guaiacum sit causa curationis gallicæ luis, & rhabarbarum bilis, quam vsu experientiae, minor est manifesta, & non indiget probatione. Aristoteles 2. post. in principio non semel dicit, quid, quod est vera rei causa, esse vniuersale & prædicatum.

Primo respondemus auctoritati propositæ, quod propterea, dum Sol. particulare est in memoria, incipiat esse vniuersale; in anima, quia in quolibet particulari est inclusa tota natura vniuersalis; quare non ab experientia particularium, vt particularia sunt, sed quatenus in quolibet indiuiduo est totum vniuersale, scientias & artes, quæ vniuersalia tractant, acquirimus. Intellectus separat vniuersale à singularibus suo proprio lumine, & nequaquam inductione & experientia, quæ circa particularia tantum versantur; si in vniuerso orbe vnus esset particularis homo, ita tota & completa esset humana species in illo solo, ac in infinitis hominibus; Aristotel. 2. post. in fine libri dicit, Si in vniuerso vnus esset homo, adhuc completa esset humana species.

intellectum separare hominem à Callia homine; quia in Callia est inclusa tota humana species; vocat ibi vniuersalia *αμαρ* id est indiuisa, quia in quolibet particulari sunt tota simul; si vniuersale esset diuisum in multa particularia, & non esset totum in quolibet, esset interitui obnoxium, est Aristotelis 12. metaph. tex. 49. quod si plures essent primi Motores, materiam haberet, & per consequens essent corruptibiles: vniuersale igitur, cum totum in vnico solo indiuiduo stet, inductio, vel experientia, quæ sit transeundo à particulari ad particularia in hac re erit vana; quia non adferet nobis cognitionem vniuersalem, sed solum particularium. Amplius, si inductio fieret per infinita particularia eiusdem speciei, & interim intellectus suo lumine non separaret naturam vniuersalem à conditionibus indiuiduantibus, de notita vniuersali actum esset; hæc sententia videtur esse Auerrois, 2. priorum cap. 29. vbi hæc habet, inductionem nobis non conferre, per se, si etiam complerentur omnia particularia.

*Ab experientia, vel inductione non colligi vniuersales, sed solâ indefinitas propositiones.*

Ad exempla, quod scilicet experientia vsu hæc vniuersalia noscantur, quod guaiacum tollat gallicum, & rhabarbarum biliosum morbum, respondemus primo, quod ab experientia nemo vnquam colliget propositiones vniuersales, sed solum indefinitas; hæc propositio guaiacum curat gallicum est indefinita, & non vniuersalis: ab experientia nemo, colliget quod omne guaiacum curet gallicum morbum, nec vice versa scilicet, quod omnis affectus gallicus à guaiaco curetur; etenim non implicat contradictionem, si dixerimus, quod detur aliqua lues gallica, quæ guaiaco non curabitur, & aliquod guaiacum, quod nullam gallicam luem curare possit. Similiter non implicat, quod detur aliqua bilis, quæ non purgetur rhabbaro, & aliquod rhabarbarum, quod bilem non purget: omnia igitur, quæ experientia noscuntur, videntur esse indefinita, & nequaquam vniuersalia. Secundo, dum dicunt experientiam, quoniam procedit ab effectibus ad causas, esse demonstrationem à posteriori de ratione cuius est, vt patriat vniuersale. Respondemus, experientiam non procedere ab effectibus ad causas, sed ab effectibus ad subiecta particularia, & indefinita, per quem processum nec statim, nec per regressum causas cognoscere possumus: quinimmo Auerroes quæstione quintadecima logicalium quæstionum probat, quod nullum subiectum dare possit quid, & causam passionum: exempla sunt, si demonstrarem, quod homo respirat; quia sit animal, nihil demonstrarem, quia animal est subiectum, & non causa respirationis; causa vero est pulmo; dantur enim animalia, quæ non respirant. Aristoteles 2. post. tex. 25. vocat subiectum passionum causam remotam; quæ non potest dare propter quid; datque hoc exemplum: si probaremus, vitem pari defluxum foliorum per latifolium habens, problema esset accidentale; quia latifolium habens non est causa, sed subiectum, quod non per discursum, sed per experientiam cognoscitur: causa vera est congelatio humotis.

*Experientiam procedere ab effectibus ad subiecta: & non ad causas.*

Præterea per subiecta, quæ sunt causæ remotæ, non peruenimus ad vniuers-



ad vniuersale, quia ex subiectis solum colligimus conclusionem negatiuam in secunda figura in cameſtres: ratio analytica, quod res ita se habeat, est, quia si causa remota est medius terminus debet prædicari; quod enim est vniuersalius, semper prædicatur, & fiet secunda figura: si vero à causa remota bonam volumus colligere conclusionem, oportet, vt semper sit negatiua, & semper reducatur ad illum modum, qui dicitur cameſtres; quia ex putis affirmatiuis in secunda figura nihil colligitur. Dum verò dicunt, guaiacum sanasse Gallos, Indos, & Italos, dicimus, quod non afferunt causam, sed subiectum, in quo causa est inclusa. Hactenus nescitur, cur lignum curet gallicum virus. Sunt qui dicunt, causam esse reconditam, & pertinere ad substantificam ligni qualitatem; hinc Scaliger exercit. 80. dicit, in eundem vsu valere aquam ex theriaca destillatam, corticem Iuniperi, tormentillam, Cardum benedictum, Scordeum, & dictum: Amatus Lusitanus refert, se curasse gallicum morbum baxo: ecce, quod solum cognoscimus per experientiam, lignum curare gallicum; sed cur id efficiat, nescitur: causa est; quia experientia seu inductio transit à particulari ad particularia, & affert in medium subiecta, quæ solum componere possunt propositiones particulares, vel indefinitas, & nequaquam vniuersales: quodque de guaiaco dictum est, de rhabarbato, & de omnibus expertis dicendum arbitramur.

Ratio analytica cur à subiectis, vel causis remotis nō colligitur vniuersale.

Tres opiniones diuersæ cur guaiacū curet gallicū affertur.

Non tamen negamus inductionem, vel experientia conferre posse ad cognoscendum vniuersale: quia, vt dicit Boerius in prædicationis, experientia est exemplorum collectio, postquam collectionem intellectus à proprio lumine excitatur ad separandam naturam vniuersalem ab individuali; tota enim natura vniuersalis est in quolibet individuo, vt sæpè visis indiuiduis, sæpè quoque intellectui offeratur vniuersale. Auertoes 2. priorum 19. habet, inductionem inferuire cognitioni vniuersalis ex accidente, quatenus scilicet ob multorum exemplorum collectionem frequentius offertur intellectui obiectum vniuersale, quod in quolibet particulari est inclusum.

Vt inductio, vel experientia conferat ad cognoscendum vniuersale.

Intellectus verò primò proprio lumine à conditionibus indiuiduantibus naturam vniuersalem toties per inductionem oblatam discernit. Secundò logicis præceptionibus promptius eam exquirat: afferatur exemplum; scioper experientiam, quod vesicantia attrahunt, sed hæc propositio, quod vesicantia attrahant, est inde inita: etenim nescio adhuc, an omnia attrahant, confirmabor ramen, quod, omnia talia sint, si viderimus, quod causa attractionis vniuersalis sit quod scilicet attrahant, quia omnia calida, & dolorifica attrahant: confirmabor adhuc melius argumento à contrariis; quia contrariorum eadem est disciplina; dicendo, si omnium frigidorum proprium fuerit repellere, omnium calidorum erit attrahere; & inde omnia vesicantia attrahent. Denique, vt omnis scrupulus auferatur confugere possumus ad contradictionis principium, cuius virtute logicus, & Metaphysicus potest conuincere proteruos: exem-

Qua via intellectus vniuersale cognoscat.

pli causa, dicimus, aliquod calidum attrahit, hæc est vera & omnibus nota: ea igitur posita & concessa dicimus, quod eius contradictoria sit falsa, quæ est nullum calidum attrahit, quæ propositio, quamuis sit negatiua, est vniuersalis & virtute huius principij sine inductione cognoscitur; similiter dicimus, quod hæc propositio est falsa, aliquod vesicans non attrahit, dicimusque quod ex necessitate eius contradictoria debet esse vera, quæ est omne vesicans attrahit: ecce igitur quo pacto virtute logica, & metaphysica possimus vniuersales propositiones pernoscere.

## Finis Duodecimi Libri.

S A N-





# SANCTORII

## SANCTORII

Iustinopolitani

METHODI VITANDORVM  
errorum in administrandis  
remedijs.

LIBER DECIMVSTERTIVS.

*Ostenditur, quod omnia errata, quæ committuntur in ad-  
ministrandis remedijs, ad tria capita  
reducantur.*

C A P. I.



OGNITIS instrumentis, quibus remedia  
inueniri possunt; reliquum est, vt de errori-  
bus, qui fieri solent in administratione reme-  
diorum, agamus: recta remediorum admini-  
stratio ex Hippocrate, & Galeno 2. in 6. de  
morb. vulg. tex. 32. consistit in proportionato  
Quanto, Quando, Quomodo, & Vbi. Si ma-  
le administretur remedium in tria, & non  
plura errata incidere possumus: quorum pri-

*Administra-  
tionem reme-  
diorum circa  
sari.*

um erit, dum remedium administratum est superfluum & abun-  
dans. Secundum, dum est diminutum. Tertium, dum est transcen-  
dens, & omnino remotum à natura remedij. Quod ad hæc tria ca-  
pita omnia errata, quæ committuntur, reducantur, potest auctorita-  
te Aristotelis confirmari, qui 1. post text. 4. dicens, quod per viam  
diuisiuam non possit definitio perquiri, nos quoque docet, quod om-  
nia errata, quæ fieri possunt in formanda diuisione, & de definitione ad-  
tria tantum capita reducantur; quorum primum est, dum addimus  
aliquod superfluum. Secundum, dum auferimus aliquod requisitum  
necessarium. Tertium, dum transcendimus de genere in genus; nos

R R R iij.

igitur eadem præceptione philosophi admoniti ad eadem capita omnia errata, quæ possunt committi in administrandis remediis, reducemus. Si medicamentum non fuerit quantum oportet, necessariò vel erit plus, vel minus, vel transcendens & extraneum: nostrum igitur erit, ut in omni administratione remediorum præuideamus, ne in aliquod erratum ex illis incidamus: hoc enim præuiso rectè administrabimus præsidia.

*De erratis Empiricorum circa Q V A N T U M diminutum.*

CAPUT II.

**Q**UANTUM sit dandum medicamentum ab alio non desumitur, quàm ab actione indicantis, sed hac lege, ut à summa actione summa dosi, à mediocri mediocris, & à minima minima medicamenti quantitas debeat præscribi; ratio est, & quia vnum est contrarium; sic quædam certa dosi erit contraria indicanti, & non quælibet indiscriminatim, ut Empirici rudiores putant, qui præsidij quantitatem à communibus indicationibus, & non à specificis sumunt; unde ægrotantes vexant diminutis, modo superfluis, & modo extraneis medicinis. Sed aliquot incipiemus Empiricorum errata afferre, dum diminuta quantitate præsidiorum vtuntur.

*Ut errat, qui in affectibus pulmonis diminuta sacchari rosati dosi vtuntur.*

Plurimi in catarrho falso in pectus procumbente causa roborandi pulmonem, ne exulceretur, & fiat phthisis, dant quotidie solum drachmas duas sacchari rosati; quod præsidium est diminutum, & nihil efficere potest; quinimmo in itinere hæc quantitas sacchari rosati amittetur, antequam perueniat ad pulmonem. Si saccharum rosatum debeat roborare, & astringere pulmonem, expedit, ut eius virtus illum tangat, & alteret: est Aristotelis præceptum agentem non introducere effectum, nisi tangat, superet, & dominetur patienti. Galenus 2. ad Glaucl. cap. 2. docet, quot partes corporis pertrāseat medicamentum, antequam perueniat ad pulmonem dicit, primum quidem os, fauces, stomachum, ventriculum, & quædam ex tenuioribus intestinis pertransit, deinde eas, quæ sunt in mesenterio, venas: deinde eas, quæ in cauis partibus hepatis: ex quibus ad eas, quæ in gibbis sunt, hinc ad concauam peruenit venam, postquam ad cor, & deinceps ad pulmonem: neque negare possumus, quin in singulis iis partibus quibusdam admisceatur humoribus, ac quandam transmutationem, atque alterationem pro natura visceris capiat; quare, quod de eius virtute relinquitur, minus omnino est, atque imbecillius, quàm ut membrum affectum iuuare possit. Qua ratione igitur suffulti porrigunt in pulmonis affectu solum drachmas duas sacchari rosati? quando ad pulmonem hoc diminutum præsidium perueniet? Hinc Galenus loco hoc citato loquens de affectibus, qui in profundis corporis parti-

bus



bus fiunt, dicit, non præsens vis medicinæ est consideranda, sed qualem obtinebit, quando ad membrum peruenierit: subdit, quod enim per multorum corporum media ipsi patienti est occurrurum, omnino exoluitur, & viribus deficit, si ab initio fuerit imbecillum. Tantum aduentitij roboris adiungere oportet, quantum in transitu amittitur, ut quod relinquitur æquale remaneat ei, quod tactu iuuat. Idem Galenus libro de artic. med. cap. 95. vult à situ partium esse colligendas præcipuas intentiones: quare, cum pulmo sit roborandus, & astringendus, non duarum drachmarum virtus vnquam erit peruentura ad pulmonem, sed potius trium, vel quatuor vnciarum, quæ possent bis, terue dici spacio exhiberi: habet Galenus loco citato quod, quæ iuuare debent pulmonem, si per os assumantur, exasperent ventriculū oportet; ridicula ergo erit diminuta hæc sacchari rosati dosis in roborando pulmone.

Videntur quoque diminutè agere, dum pro somno conciliando inungunt tempora vnguento populeonis, & oleo violato; hæc enim sunt perexiguæ virtutis, & vix pueros reddunt ad somnum procliuēs: quin accidit, ut ægri ob sædos vnguentorum odores vigilem, & insomnem ducant totam noctem: errant, quia tempus in iis contemunt, & interim omittunt, quæ sunt præstantiora, & efficaciora ad somnum conciliandum, veluti est pedum lotio à cœna administrata, quæ fit ex capitibus papaueris, matre violarum, ex rosis siccis, & lactuca; hæc enim reuellendo vapores, qui excitant vigilias, somnum conciliant. Præterea, quæ mirabile afferunt emolumentum, dimittunt, ut est syrupus de papauere, eius extractum, & puluis capitem papaueris, quippe drachmæ pondere mistus ferculis nullum reddit saporem, & miras habet virtutes in conciliando somno.

*Ut errât, qui in vigiliis dâs somniferâ diminuta.*

Similiter, si quis magnis grauetur obstructionibus vtuntur vncia cum dimidia oxymellis: quæ diminuta dosis vix ad ventriculū peruenit; partim enim detinetur in paristhmis, partim in œsophago, & partim per sputum illicò ferè reicitur: quomodo ergo obstructiones mesenterij, splenis, & hepatis referabit? vix odor huius perexiguæ quantitatis oxymellis perueniet ad has altiores partes. Ego igitur manè tres vncias, & vespere eandem quantitatem repeterem, & si impenderet periculum, ne oxymel ventriculū vellicaret, cibus illud permiscerem: hoc enim modo quotidie oxymellis vnciæ sex, & octo possent illis præberi, qui pertinacissimo humorum infarctū detinentur.

*Quomodo diminuta oxymellis dosi vtuntur.*

Itidem, dum pro auferendis oculorum inflammationibus, & doloribus vtuntur aqua rosacea, vel aqua dulci tepida, non iuuant ægrotantem; quia hæc sunt diminutæ virtutis; quamuis aliquantulum sedetur dolor, paulo post tamen reddit. Præterea, si vtantur aqua rosacea plumbeo alembico stillata, lædunt patientes; quia cerusa, quæ in rosacea aqua hoc modo parata delitescit, reprimat, & transpiratum tollit, vnde truciore excitantur dolores: omittunt phlebotomiam, & cathartica medicamenta, quæ à supernis partibus reuellunt, & sum-

*Ut diminutè agunt dum in doloribus oculorū aqua dulci tepida, vel rosacea vtuntur.*

ma cum omnium admiratione sanant. Galenus in methodo fatetur, medicamenti exhibitione hominem oculorum inflammatione obfessum ad sanitatem perduxisse: omittuntque Hippocratis auxilia 6. aph. 3. 1. proposita, ubi dicit, meri portionem, balneum, fomentum, sanguinis missionem, & pharmacum soluere oculorum dolores: præstat tamen, ut profundè inquirantur causæ, ut sciamus eligere præsidium, quod tuto possit administrari. Omittunt in doloribus oculorum pertinacissimis vesicantia, quæ occipitio applicata diuinitus dolores, & inflammationes oculorum tollunt. Sciunt amici mei, quibus ingentissimam oculorum fluxionem vesicatorio occipitio adiuncto statim cohibui.

*Vi diminuta  
videntur feri  
dosi*

Insuper sunt, qui ardenti febre, vel diarrhœa biliosissima correptis feri lactis libram solum portignant; quibus, nisi aliquod euidentissimè prohiberet, essent quinque, & sex feri libræ præscribendæ. Est Hippocratis, & Galeni 4. de ratione vict. 29. quod vnica die dari possint duodecim libræ lactis asinæ, & ultra. Nos quoque illorum imitatione copiosissimo sero caprino in caloribus & siccitatibus corrigendis, uti poterimus.

*Vi diminuta  
enemata in  
colica vitan-  
tur.*

In eundem errorem labuntur rudiores, dum in colica prodeunte à materia vitrea proponunt enemata diminutæ virtutis, & improporcionata, veluti est illud quod fit chamæmello, anetho, & laurino oleo, quibus admista sit hiera, quippe in colicis leuioribus solum aliquid possunt, in contumacissimis causas auferre nō possunt; & quamuis frequenter hos clysteres iniciant, attramen non sunt tanti, ut hostilem humorem euincere possint: assidua repetitio clysteris non sumitur ab actione indicantis vehementis, sed à præsentia. Idcirco repetitio diminuta nunquam poterit insignem vim indicantium demoliri, quia vis, & præsentia genere differunt. Valentiora enemata in colica passione omnium contumacissima fient ex decocto carminatiuo, in quo drahma cum dimidia trociscorum alhandal, & centaureæ minoris manipulus ebullierint, & ex oleo amygdalino dulci, quod pharmacum contemperat.

*Vi diminuta  
agūt in lum-  
bricis aufe-  
rendis.*

Diminutum quoque erit auxilium, dum in pueris qui abundant lumbricis vtuntur enemate ex lacte, & saccharo, gratia alliciendi lumbricos sæpè antequam lac vnicum alliciat, pueri pereunt: efficax, & proportionatum erit aloë non lota, quæ promptè eos occidit, & propellit per anum. Cæterum, si pueri adeo ab insectis iis premerentur, ut instaret mortis periculum, ad sunt pillulæ, quæ cōficiuntur ex aloë, terebentina, & mercurio, quæ confestim occidunt, & pueros certissimè sanant; pillulæ fiant perexiguæ, ad quas tamquam ad lumbricorum proprios hostes confugimus.

*Vi diminuta,  
& extraneis  
videntur reme-  
dia in gonor-  
rhœa.*

Potro, ut pluribus exemplis explodamus diminutas medicinas, dum gonorrhœam tractant, putant cassiam, prissanam, infrigidans Galeni, laminas plumbeas tenibus applicatas satis esse, quæ sunt omnino remedia diminuta, ne dicam transcenduntia: causa erroris est, quia putant in gonorrhœa auferenda, esse solum renes refrigerandos: tam rectè



rectè dicunt, quod gonorrhæa sit affectus renalis, quantum si diceret, quod esset hepatis, vel intestinorum, quoniam locus affectus non sunt renes, sed glandulæ adstantes: hæ igitur essent detergenda terebentina, aqua Beatae Virginis, vel Villenli, vel Calderiana largè epota, in quibus ebullierit liquiritia, iis enim plurimos gonorrhæa correptos curauit.

In suppressis mensibus diminutè agunt, dum dant conseruam capillorum veneris, pulegium, iusculum ciceris, quæ omnia vt plurimum nihil operantur; quia maior est resistentia passi, quàm vigor istorum: proportionatum auxilium est sanguinem euacuare per lectum cubitum, & deinde per saphenam: qui tundunt saphenam non lecto cubito, minora vala circa matricem magis implent, & obstruunt; quo fit, vt sæpissimè pro mouendis mensibus lecta saphena non iuuat, nisi post lectum cubitum.

Non solum diminutis sæpè vtuntur medicinis, verum etiam extraneis; dum enim vident ægros magna siti ferè eneetos, non pudet, proponere plurima saccharo condita, vt sunt marinata, conseruæ ex acido citri, iumbæ, quæ licet sine saccharo fortasse possent sitim accere; attramen saccharo mista est omnino impossibili e. vt sitim auferant; mulieres vident, & sciunt pueri, quod saccharum contendant sitim: satius esset nihil sumere, quia lingua non polluta iis dulcibus aliquarum horarum spacio minori tentaretur sitim. Si aliquid esset concedendum est ptisana actu frigida, quæ os ablucendo eam sedat: deinde si sero lactis actu frigido sæpè os ablucetur, omnino mitigabitur: non solum igitur dulcia erant inepta in siti pellenda, verum etiam cum intendent, & meritò, quia faciliè bilescunt. Hinc mirandum est, quod medici, licet videant quotidie dulcibus non sedari sitim; videant ab ægrotantibus respui, non resipiscant, nec ab iis abstineant.

*vt in mensibus suppressis diminutè agunt.*

*Vt errat dum pro tollenda siti dulcia dant.*

Errata Empiricorum circa QVANDO.

CAPVT III.

QVANDO sit danda medicina, nos docet præsentia indicantis, & Absentia prohibentis: mirum igitur est, quod Empirici leuissima de causâ dant pharmaca: adest Galeni sententia 3. aphorismorum 14. quæ admonet, quod sæpè non sint corpora purganda: hæc sunt verba, neque tamen ea, quæ fit per purgantia pharmaca, superfluitatum euacuatio, idonea est, quia valdè indigentibus, & ex longis interuallis utilis est, nam euacuatio superfluitatum, quæ quotidie generantur in corpore, minor est, quàm exigua operatio purgantis pharmaci; si quis voluerit bis in mense, aut semel vt ea veritus ne aggregentur superfluitates, nocebit, & corpora trahet in malam consuetudinem, non sæpè accidit, vt in corpore tot sint excrementa congesta, vt solum phar-

*Dum vtuntur medicina quando non oportet.*

macis, & non viuendi norma, possint tolli; quor sunt, qui vexantur grauedinibus, & catarrho, qui nullo sumpto pharmaco recta viuendi ratione seruata, vel breui liberantur: quippe, qui si pharmacis tractarentur, nec citius, nec melius curarentur: præcipuèque sunt, qui destillatione tentantur ob imbecillitatem, vel ob frigiditatem externam densantem, & exprimentem cerebrum, vel ob caliditatem liquefacientem; iis nullo vnquam tempore conueniunt pharmaca.

*Vi errant, dum viuuntur inedia quando non oportet.*  
 Amplius superflue, & importune agunt in grauedinibus, & destillationibus capitis, dum nimiam inediam cholericis præcipiunt: dicit Hippocrates, & Galenus 2. de ratione vict. 44. biliosorum ventrem obieiunium repleti cruditatibus; à quibus deinde vapores eleuantur, caputque obrepunt, & tempora pulsant: de nimia inedia loco citato dicit, inediam intempestiuam crudum reddere morbum. Secundo verò de ratione vict. 30. reddere bilem amariorem. Secunda sectione aphor. comm. 22. inediam biliosis febrem asferre; aduersus Erasistrat. dicit, eliquare carnes, & mordicando stomachum efficere morsum cordis, quo in loco loquens de Diodoro Grammatico dicit, inediam intempestiuam motus epilepticos, & vertiginosos facere: & 8. methodi capite 2. habet picrocholos ob intempestiuam inediam in hecticam incidere.

*Vi errant, dum viuuntur terebratio, quando non oportet.*  
 Errant sæpè Empirici, dum intempestiuè vtuntur terebra in capitis vulneribus: intempestiuè ea vtuntur, quia, quando æger esset viribus destitutus, in opere ipso posset edere extremum spiritum: nullum magnum remedium est, dum virtus non permittit, administrandum; etenim si phlebotomia non possit administrari in virtute languida, quanto minus terebratio, quæ est vulnus ferè læthale, conueniet: intempestiuè quoque ea vtuntur, dum putant, à tenuissimis accidentibus colligi posse quod pus sit collectum licet non sint fracturæ, signa; intempestiuè dum nesciunt qua sub parte cranei sit pus; Causarum, cur terebratio aliquando mortem pariat, prima est, quia vehemens excitat dolorem in vtraque membrana; secunda quia aer tangens duram, & piam matrem efficit magnam læsionem, tertia in opere ita concutitur cerebrum, vt aliquando fiat attonitus affectus. Hinc Galenus 2. de loc. aff. 9. & 4. de loc. aff. 3. dicit inter perforandum craneum, si quis premendo nimium violauerit membranam, sopor accidet; quarta, terebrando sæpè sanguinis profluuium contingit, & inde mors; quinta, terebrando sæpè fit noua inflammatio, & inde mors; sexta, aliquando propter inflammationem accenditur febris, & deinde sequitur exitium: septima, in terebratione cranei requiritur summa inedia, quam si in tanto labore ferunt, vt plurimum pereunt: octaua squamma ossis fracti sæpè non percipitur, vbi sit, vt hinc reddatur opus inutile non sine mortis periculo. Dicimus igitur, quod in magna consilij angustia melius sit terebrationem dimittere: sagax enim natura sæpè parat sibi iter, & sine terebratione squammam latentem, & absconditam saniem expellit, vel resoluit, & intensius digerit:  
 exemplum



exemplum huius admirandæ operationis naturæ est pus in pleura inclusum, quod aliquando ad vasa urinæ fuit propulsum: posset itaque facilius propelli si erit inclusum sub craneo per foramina ossium cranei, etenim os cuneale habet decem & octo foramina, occipitium septem: in temporibus vtrinque sunt quatuor, quatuor quoque sunt communia occipitio, cuneali, & temporib. per quæ natura posset pus excernere: nos tamen non omnino negamus terebrationis usum, ut fecerunt Conciliator, & Cardanus, quorum opinio omnino reluctatur experientiæ; multi enim mortem obirent, nisi terebratio administraretur; quare supposito, quod virtus permittat; quod sciatur, ubi sit pus, vel squamma ossis, semper terebratio erit admittenda.

Empirici solent errare, dum vtuntur repellentibus, quando non oportet: nouem sunt casus, quando repellentia non conueniunt.

*Ut errant, dum vtuntur repellentibus, quando non oportet.*

Primus ex Galeno colligitur: 3. de med. lo. capite 2. ubi dicit, non esse vtendum repellentibus, quando humor fluit ad emunctoria auris, axillorum, & inguinis, &c. & ratio est, quia materia peteret partem principem; partes enim principes in glandulas expellunt excrementa, ut in cloacam, & inde innumeris liberantur malis.

Secundus casus, quando repellentia nocent, est, dum egreditur materia venenosa, vel dum fluit in partes ignobiliores à corde distantes.

Tertius in motu critico non vtimur repellentibus; quinimmo, si tumor criticè factus est, laxantibus est tractandus ut in maiorem molem eleuetur: hic obiter quinque conditiones bonæ crisis à Galeno traditæ 1 aphorismorum 20. afferuntur, quarum prima est, ut fiat per euacuationem, & non per abscessum: secunda, ut euacuentur humores peccantes: tertia, è directo: quarta, ut æger faciliè tolleretur: quinta, ut fiat die critico: quando igitur seruabuntur hæ conditiones crisis euacuatio non erit repellentibus impedienda.

*Quot sint conditiones bonæ crisis.*

Quartus casus in pletora, vel cacochimia repellentia nocent: est Galeni de arte medicinali capite 45. & alibi, quod in principio apostematum pletora existente, non sint adiungenda repellentia: hæc sunt verba Galeni, corpora pletorica non admittere humoris retrocessus, cum vndique plena sint.

“  
“

Quintus est, quando pars est adeo imbecilla, ut immineat periculum, ne calor partis extinguatur, hic casus colligitur à Galeno 6. de med. loc. cap. 7.

Sextus est, quando fluit materia ad partem vicinam parti principi, si in facie, esset erysipelas, ibi repellentia propellerent ad cerebrum excrementa, quod esset inconueniens, eadem ratione, qui in angina vtrentur repellentibus, errarent. A vdiō his temporibus Medicum rationalem parti externæ gutturis in angina apocrustica applicare, à quo medendi modo, nisi abstineat, verendum est, ne aliquem miserum iugulet.

*Error cuiusdam nostris medicis.*

Octauus, dum materia est fixa, hicque colligitur ex Galeno 13. metho. cap. 6. in principio enim fluxionis, quando humor videlicet est

in venis, & in itinere, vti possumus repellentibus, quando veto est inclusus in spatiis nullo modo: quia humor factus crassius amplius non potest regredi.

Nonus casus est, dum tumor factus est per congestionem, tunc enim vti debemus digerentibus, & non reprimentibus.

*Vi errat Guido proponens duos casus verantes repellentia non necessarios.*

Duo alij à Guidone ponuntur casus prohibentes repellentia: qui re vera possunt reuci, alter est, dum affectus sit solum à causa externa: alter, dum fluit materia crassa, horum primus est vanissimus, quia in vulnibus illicò vtiuntur repellentibus: secundus relictatur Galeno 14. methodi 17. vbi hæc leguntur: repellunt enim non solum quæ astringunt, verum etiam quæ sine adstrictione refrigerant: aliqua igitur repellentia sunt frigida & humida, & aliqua frigida & sicca, & hæc sunt fortiora, quia astringunt: dicimus, quod repellentia frigida & humida, qualia sunt lactuca, nymphaea, & alia id genus, sunt reprimentia accommodata humoribus biliosis; frigida vero & sicca pituitosis, & crassis: quod Galeni testimonio confirmatur 6. de med. loc. cap. vltimo vbi dicit, in capite, si sint acor & subflauæ vti repellentibus potius refrigerantibus, si acoræ sint ex pituita vti astringentibus: ecce igitur, quod Galenus vtiuntur repellentibus, dum fluit materia crassa, & pituitosa; tandem de materia fluxa loquens Galenus 13. methodi 6. dicit, tunc esse vtendum digerentibus, & non repellentibus.

*Cur interna viscera non tractantur repellentibus.*

Causa vero, cur in fluxione vti debemus repellentibus, duplex à Galeno affertur 11. methodi cap. 15. altera est, quia repellentia virtute sua adstrictoria afferunt robur partibus, ne recipiant excrementa; altera est, quia exprimunt humorem tenuissimum inclusum: hæc sunt Galeni verba, apocruistica auxilia sunt adhibenda, quando fluxio perit aliquam partem, tum quia dant robur partibus, & roboratis prohibetur fluxio; tum, quia astringentia tenuissimum succum exprimunt: ibi Galenus reprehendit illos, qui vtebantur laxantibus, quia laxando tollitur affectarum partium robur, & partes implentur excrementis: In hoc loco nostratum Empiricorum error notatur, dum ante totius purgationem in qualibet inflammatione vtiuntur laxantibus, vt est oleum amygd. & alia vnguenta emollientia: quod Galeno relictatur; dicit enim 2. ad Glauconem, vbi loquitur de inflammatione, quod duo errata ab Empiricis in curandis inflammationibus committuntur, primum est, dum localia applicant non purgato corpore. Secundum, dum vtiuntur laxantibus. 13. method. cap. 5. docet in omni inflammatione esse vtendum moderatis astringentibus gratia corroborandi partem affectam: quinimò refert ibi casum Theagenis Cynici philosophi, qui, cum haberet phlegmonem in iecore, ab Atalo Medico laxantium vsu, est occisus.

*Quæstio an repellentia glandulis la suadentur.*

Occurrunt dubitanda; quia sunt Empirici nonnulli, qui vtiuntur repellentibus in glandularum aggritudinibus, quod iis, quæ superius dicta sunt, relictatur: confirmant auctoritate Rasis, qui libro de apostematibus dicit, plantaginem conuenire strumis, ac plantago est auxilium



xillum reprimens: ergo. Præterea Galenus 2. ad Glauconem pro curandis strumis vititur plantagine. Intuper afferunt Galenum 14. methodi 1. dicentem: exiguum vitiosi humoris, etiam si quis ad viscera, & ad magnas venas retrudat, nullum malum committer; quare non videtur inconueniēs, si exiguus humor in glandulis sit, quod aliquando repelli possit ad partem principem. Demum Galenus 10. de comp. med. sec. loc. ubi agit de podagra, dicit, in fluxa materia, & in parte ignobiliori nos uti posse repellentibus, hæc sunt verba: administrata totius euacuatione, utimur repellentibus fluxionem in manibus, & pedibus; iuxta coxendicem verò minimè, ea cum in profundo sita sit iunctura, sanguis ex vicinis, & ambientibus vasis à musculis ad illam truditur; patet igitur, quod aliquando ex Galeno possint ignobilioribus partibus applicari repercuentia.

Ad primum argumentum respondemus, Rasim locutum fuisse de plantagine licca, & non viridi; licca enim abstergit, & discutit; viridis vero reprimat. Hinc Galenus 6 simp. med. cap. de plantagine dicit folia, & radices plantaginis exsiccatas valere ad obstructions iecoris, & renum aperiendas. Hinc innumerabiles notantur errores illorum, qui videntur hyeme herbis siccis loco recentium, quæ natura, & qualitate valdè differunt.

Ad secundum argumentum, quod Galenus 2. ad Glauconem doceat esse vitendum plantagine, quæ astringit. Respondemus, quod Galenus non dicit plantaginem adstringere, sed *αεστέλλει*, quod verbum significat sistere, & compescere, quare plantago, ut licca & detensoria ex Galeno compescet strumas, & non ut viridis, & repercuentiens. Galenus 14. methodi 11. dixit quod strumis illa conueniat curatio, quæ debetur scyrrhis, & tumoribus induratis; quibus nullo modo conueniunt astringentia.

Ad tertium, dato quod collectus humor in glandulis esset exiguus, dicimus illum esse adeo rebellem, ut vitendum sit, ne viscera illum euincere possint. Præterea dicimus, Galenum non intellexisse de humoribus existentibus in glandulis, sed in aliis partibus; nulla enim alia corporis pars recipit humores adeo coctioni contrarios, & rebelles, ut glandulæ.

Ad postremum dicimus, quod in podagra solum corpore purgato licet uti repellentibus, neque illico in partem principem posset retrudi, quia pedes valdè distant à visceribus principalibus. In glandulis vero aurium, & gutturis si uteremur repercuentibus, statim confluerent humores ad caput: tutius tamen semper est, uti repercuentibus corpore existente purgato: exemplum enim est à Galeno 14. methodi 17. traditum de Matriona Romana habente Heipetem in malleolo, quæ medicamento ex alga, quamuis corpus non erat purgatum, sanabatur, & paulo post iterum in aliis partibus rumpebatur: usque ad genu, tandem à Galeno sanatur uti feri lactis, cui admistum sit scamoneæ pauxillum.

*Vi errant, dñ  
alterās quā  
do nō oportet.*

Falluntur quoque plurimi dum porrigunt ægotantibus alterantia, & cibum, quando non oportet: præscribunt post duas horas ab incæpto paroxysmi calore, esse dandum serapium, & post serapium elapsis duabus, vel tribus horis ouum; & quod pessimum est, mulierum iudicio hoc summi momenti munus commendant: errant, quia sæpè incipiunt ægri exardere, & post incæptum calorem trium horarum spacio conseruant extrema frigida, quod significat accessiōem adhuc esse in augmento, quod cum ita sit, valdè lædunt, quia naturam rectè operantem à sedibus febrilis foci distrahunt: & morbum intendunt. Præterea dato quod in aliquibus, duabus horis ab incæpto calore incipiat declinatio, non tamen id omnibus febricitantibus accideret. Galenus 2. de differentiis feb. 3 & 11. dicit, longas, seu breues accessiones modò pendere à multitudine peccantis humoris, modò à qualitate, & modò ab imbecillitate, & demum ab angustia meatuum; quare, cum humoris quantitas, qualitas, imbecillitas, vel meatuum angustia modò sit maior, modò minor, eadem ratione accessiones erunt modò breuiiores, modò longiores, & in longioribus accessiōibus erunt longiora principia, & longiora augmenta, vt omninò sit ridiculum in ægotantibus omnib. accessiones in horas eodem modo semper diuidere: in aliquibus enim post duas horas ab incæpto calore erit adhuc principium, in aliis augmentum, & in aliis status; quare hæc norma alterandi, & nutriendi est periculosa. Falluntur quoque dum post tres horas à potione syrupi dant alimentum, tunc enim potest paroxysmus esse adhuc in augmento: quanti vero sit hoc erratum, colligitur ab Hippocrate 1. de morb. vulg. com. 2. tex. 26. vbi dicit, Filiam Philonis septima die mortuam esse, quia intempestius cœnauit: similiter Galenus dicit, Filiam Eurianactis mortem obisse, quia in paroxysmo comedit vix racemum: si itaque in augmento dabitur cibus, vel alterans serapium, in discrimen adducetur ægotus: medicus igitur iuuare non poterit, nisi prius cognouerit principium accessiōis, & declinationis; accessiōis, vt ante quinque horas possit proportionatum nutrimentum præscribere; declinationis, vt alterantia, & deinde cibus opportunè exhibeatur; sæpè aberrant, qui in hac re tanti ponderis stant relationi mulierum, quoniam mœrore confectæ sæpè referunt extranea, & minimè ad rem conferentia: illæ semper verentur, ne æger fame pereat: neque aliud cogitant, quam ventriculum cibis multæ nutritionis infarcire: si medici ab illis quærant accessiōis principium, omnia præposterè referunt; vocant enim vt plurimum paroxysmi principium, dum æger incipit anxietatibus premi, quod potius ad augmentum pertinet: demum vix ægotanti, si ab illo Medico tractetur, qui stat relationi mulierum, quia huius medici auxilia necessario sint importunè, & præposterè administrata oportet, ex quibus quantum detrimenti sequatur, cæteri iudicent. Similes medici sunt nostratum Empiricorum plurimi, qui in maligna febre, vel nullum principium insultus obseruant, vel de accessiōibus omnia concedunt mulieribus; & quod exitiosum est,

manè



manè audent præscribere, quæ vesperi, media nocte, & sequenti die sunt administranda, quasi quod non medici, sed vates essent: quod erratum est inexcusabile, quia quando agendum sumitur à præsentia indicantium, & indicantia tam facile mutari possunt, ut semper occasio operandi, ut dicit Hippocrates 1. aphorismorum, sit præceps.

Videntur, quod plurimi utantur purgantibus, & variis auxiliis in statu morbi, quando minus oportet: Empirici, dum dira, & trucia læviunt symptomata, præcipuè videntur confugere ad purgationes, ad sanguinis missiones, & ad vesicantia. Errare videntur, quia clarissimè Hippocrates 2. sect. aph. 29. oppositum docet his verbis: vigentibus morbis quiescere multò præstat: & Galenus in commento habet hæc verba: circa initia morborum, in quibus speramus ægrum conualiturum, tentandum est, maiora afferre remedia, ut venæ sectionem, & aliquando purgationem, quorum neutrum oportet adhibere morbo consistente, quia tunc actiones morborum quam maxime fiunt; & infra, cū fiunt actiones, superfluum est, euacuare. Prima ratio, cur in statu morbi magnis remediis non sunt tractandi ægotantes, est, quia tunc virtus est defatigata: est enim Galeni 2. aph. 25. quod humores nō sunt euacuandi, nisi virtus valida sit: secūda, quia natura non est distrahenda à concoctione, natura enim tunc agit singulare certamen, à quo si remouebitur facile succumbet: verum, quia aliquando turgent humores, vel magis possunt indicantia ad indicandum remedia, quam enarrata prohibentia ad prohibendum; ideo Dogmaticus in statu morbi aliquando etiam utetur magnis remediis, quod est faciendum non sine exacto indicantium æquilibrio; omnino tamen reprehenditur mos illorum, qui in omni morbi tempore, & qualibet die sanguinem ab aliqua parte mittunt, vel medicinis importunis vexant ægros, & nunquam permittunt ut æger quiescat.

Plurimi plus nutriunt in statu morbi, quam in principio; ij Galeno, Hippocrati, & præcipuis medicinae fundamentis reluctantur: Hippocrates 1. de ratione vict. in ac. 18. eos reprehendit, qui primis diebus absolutam inediam observant, dum verò ad statum morbi propius accedunt, iis, quæ maxime nutriunt, utuntur: hæc sunt verba, verum & medicos contra omnino, quam oportet facere non ignoro, quippè qui ab initio duos, aut tres dies, aut etiam plures ægros fame cruciant: deinde, & sorbitiones, & potus exhibent. Empirici hunc ordinem Hippocratis pervertunt, primis diebus præscribunt sebetentibus panem madefactum in iure pulli, & ouum recens: in statu, iis addunt contusa caponis; quod omnino aduersatur etiam Galeno 1. sect. aph. 8. ubi dicit, cum morbus est in vigore, vitimur victu tenuissimo, tum quia magna symptomata ægrum vexant; tum quia natura est occupata coctione humorum: præterea in statu morbi virtus est adeo languida, ut vix possit tenuissimum cibum assimilare. Galenus 1. aphor. 3. dicit, in euacuato corpore refecutiones non sunt securæ, cum natura sit facta debilis, & non possit coquere, neque distribue e alimentum, vel assimilare: primis diebus debilitantur ægri medicinis, & phle-

*Vi errant;  
dum euacuāt  
quando non  
oportet.*

*Vi errant,  
dum nutriūt  
quando non  
oportet.*

*Cur in inflā  
mationibus  
minus ciba  
dum quam  
in febribus.*

botomia: in statu cum sint debiles, refectiones, non sunt securæ. Præterea non sunt securæ, quia (vt diximus) distrahitur natura ab humorum coctione: nihilominus mulieres, circulatores, & Empirici aliam obseruant medicinam, putant virtutem languidam indicare, quæ valdè nutriunt, & fortem indicare in ediam. Galenus 1. sect. aph. com. 12. desumit rationem virtus ab iis tribus à viribus ægrotantis, à constitutione morbi, & à particularibus accessionibus. Quo ad vires ægrotantis attinet, Galenus 2. methodi 5. dicit quando virtus facilius morbum tollerat, tunc ægrum esse cibandum, addi potest, at sic est, quod in statu morbi maximè læduntur ægri, & minus tolerant, ergo minus cibandi. Quo ad constitutiones morbi, dicimus, in inflammationibus minus esse nutriendum, quia inflammatio semper habet annexam intemperiem, & solutam unitatem; præterea inflammatio est sepe vniformis, & non edit paroxysmum, in cuius declinatione natura possit quiescere: hinc dicimus inflammationem magis prohibere cibum, quam intemperiem sine inflammatione: demum dicit Galenus, quod paroxysmi prohibent cibum; quia natura tunc est maximè occupata, & non potest cibus, & morbi insultibus vacare. Hinc Galenus 1. ad Glauconem 10. dicit, in tertiana non exquisita solum alternis diebus esse cibandum, vt aufugeret periculum cibandi in accessionibus. Verum non negamus, quod aliquando non sint ægroti in statu quoque reficiendi & præcipue si aliquod vgens sit, quoniam modò est Galeni 1. aphor. 9. vbi dicit, quocirca aliquando in ipso vigore morbi nutrire cogimur, vbi casus interuenit robur nature dissoluens. Præterea sunt pierocholi, qui habent corpora disposita ad heceticas febres, de quibus Galenus in methodo dicit, quod nisi cibo in principis paroxysmorum refocilentur, in habitum heceticum cadant oportet; si igitur nullum fuerit vgens, quod cibum indicet, seruanda erit Galeni sententia tum 1. ad Glauconem 13. vbi dicit in acutis in principio vitæ solidiori, si vires non valent in statu tenuiori, tum 1. sect. aph. vbi dicit, in longis morbis oportet conseruare vires, vt, acceperimus; in acutis satis est, eas seruare debilitatas.

*Vt errant,  
dum aliunt  
d-bi os mel  
sum, & sæpè.*

Quoties verò sit dandus cibus, docet Galenus 2. de ratione vict. 36. iis verbis, imbecillitas indicat sæpè quidem, sed paulatim dandum alimentum: firmitas semel, & multum, quod plurimi Empirici non obseruant, quia dum vires sunt languidissimæ, dant quæ maximè nutriunt, & sæpè dum robustæ parum.

### De erratis circa Q V O M O D O.

#### C A P U T I V.

**Q** V O M O D O agendum à passione indicantis desumitur: indicans non patietur à remedio tribus modis, vel quia sit diminutum, vel abscondans, vel extraneum; ratio est, quia vni indicanti (vt diximus)



ximus) vnicum debet esse remedium, & non plura: omnia igitur, quæ non iuuabunt sub aliquo ex iis tribus continebuntur. Cæterum remedia malè administrata, quæ pertinent ad Quomodo, proponamus: exordiamur ab extraneis; hæc enim nullomodo conueniunt, quia, cum sint alterius, non aduersabuntur morbis, si vera est Aristotelis sententia proposita in prædicamento qualitatis, quod in illo genere, in quo est vnum contrarium, sit & alterum.

Quidam putant, quod calculus in Renibus, & Vesica existens frangi possit succo citri, electuario ex vitro, decocto saxifragiæ: verbenæ. Quidam valdè confidunt in cinere scorpionum, in Yrci sanguine: quæ materiæ nec diminutæ, nec abundanter possunt calculum frangere, vel comminuerè; vocabuntur igitur remedia extranea, & transcendentia. Si remedium esset istius virtutis, vt lapillum existentem in vesica, vel in renibus posset frangere, prius viscera exanimaret, intestina vellicaret, & ad vltimâ partes viuèntes qua trãsiret, laceraret, antequâ calculi extimâ superficiem cõminueret. Hic non possum omittere, quin erratû cuiusdâ nostratis reiiciam, qui in percelebri viro calculo vesicæ laborante multis diebus vltus est electuario ex vitro; dū enim putat calculum comminuerè, exedit intestina dysenteriam efficit, & immaturè tam præclarum virum iugulat: errauit, quia remedia, quæ haberent virtutem frangendi calculum, nihil efficerent, nisi super ipsum detinerentur: actio ex Aristotele 1. de gener. non fit nisi per contactum: sed demus, & non concedamus, quod hæc remedia, quæ per os assumuntur, sine læsione aliarum partium eant ad calculum, illum solum obuoluant, & tangant, quid tum postea frangerent ne illud? obuoluas calculum polline vitri, vel adamantis, quod fortius est, & anni spacio sic obuolutum conseruas, experientia videbis, calculum integrum, & nullo modo comminutum conseruari: quod cum ita sit, fatuum erit credere, quod assumpta per os possint calculum renum, vel vesicæ comminuerè.

*Vi errât qui putant, quod lapis renum, vel vesica frangi possit remedijs.*

Dum in Renū, & vesicæ inflammatione vtuntur diureticis, videntur errare; quoniam diuretica ad loca illa affecta alia plura excrementa secum rapiunt, & morbum intendunt: eadem ratione videntur errare, dum in colica passione exhibent pharmaca, hæc enim intestinum collum debilitatum recrementis implent, vnde truciore, & scelestiores succrescunt dolores. Similiter non licet in vteri passionibus menses mouentia porrigere, vt plurimi Empiricorum quotidie faciunt: quod manifestissimè errèt, est Galeni auctoritas 6. de morb. de vulg. com. 2. tex. 7. hæc sunt verba, vitata vesica, aut renibus, melius est per aluum deriuare, quàm per vrinam euacuare: & 13. methodi cap. 1. dicit, cum iecur incipiat phlegmone laborare, & aliquis tentet medicamenta exhibere, maximam excitabit inflammationem, æquè vt, si cum renes, aut vesica laborat, aut vterus. & menses deuocet: subdit ac vomitu, vti pudibundis laborantibus est auxilium reuellens: valebit ergo in Galeni doctrina hæc consequentia, vterus, renes morbo laborant, ergo neque diuretica, neque menses mouentia sunt porrigenda:

*Vt errant dñ per loca affecta euacuât.*

non tamē omnia durerica sunt interdicēda, sed solū calida, quæ secū ferunt alia excrementa; quia si partes illæ fuerint refrigerandæ, & contemperandæ, diuretica frigida, vt lac sem. mellonū, & alia id genus laudantur: præterea si esset aliquod vrgens, veluti in desperata vrinæ suppressione, tunc ad cantharides confugimus; nunc non loquimur de vrgentibus, sed solum de indicantibus; laudat Galenus vomitum, vt auxilium reuellens, qui pudibunda laborantia valdē iuuat; Ego in sæuissimo arenularum dolore hætenus non inueni præstantius remedium vomitu, statim mitigantur dolores, quod fortasse sit, quia loco ab impetu vomitus arenulæ dimouentur.

*Peccant qui  
in calculosi-  
tutur diu-  
rictis.*

Pæterea, qui vrūtur in calculosis diureticis calidis, errāt primò, quia diuretica secum ferunt excrementa, & aperiant meatus: secundò lapidem denudant, & inæqualem, & asperum reddunt: lapis, dum crescit, quia augetur iuxtapositione, conditio eorum, quæ crescunt per iuxtapositionem, non est, vt æqualiter, & secūdum omnes partes crescant, quia hæc est conditio animatorum, & hæc est ratio, cūr calculi, vt plurimum inæquales, & asperi sint: verum, quia renes, aut vesica asperitate læderetur, sagax & prudens natura eum mucosā, & lubricā pituita induit, ne partem viuētem vellicaret: diuretica magnū afferunt detrimentum, quia calculum circumuentū viscosa pituita denudant, qui ob asperitates adeo pungit, vt post breue deinde spatiū vlcus exitiosum efficit, vnde adeo trucia symptomata, vt nulla mors hac crudelior accidere possit. Audias quomodo famosus quidā Circulator hac scelestissima morte calculosum perempsit. Hic portexit misero valentissima diuretica, quæ mouerunt lotia sæculentissima, quia viscosam, & lubricam pituitam, quæ erat tamquam calculi puluinar, à calculo separauit: illicò melius habuit; putabatque iam esse liberatum, & Circulatorem, ac Æsculapium laudibus ad sydera extollebat. Verum post paucos dies calculus nudus, & asper cœpit paulatim exedere, & terebrare vesicæ parietes, & doloribus, quos ante nunquam fuit expertus, vexari; mox factò vlcere, eoque cancerioso (vt vidimus post sectum eius cadauer) tor penis lacerabatur, vt fatear, me ante nunquam vidisse mortem violentam, quæ esset hac trucior, atq; crudelior: miser potuisset, vel se permittere Lithotomo cum spe salutis, vel multo temporis tractu sine cruciatibus adhuc frui lucis vsura; voluit tamen circulatori, vel potius carnifici se committere: patet igitur non solum ratione, verum etiam experientia, quod calida diuretica in calculosis sint pernicioſa.

*Vi famosus  
circulator  
calculosum  
occidit.*

*Cur Bezoar  
ad nos dela-  
sum sit nul-  
lum virtutis.*

Inter extranea remedia pro malis qualitatib. veneficis de bellandis à nobis reponuntur margaritæ, bezoar, cornu cerui: bezoartica laudantur à Phamacopeis, quia iis citius, quam aliis medicinis, dutescunt: hæc aliquando Probus Medicus cogitur exhibere, quamuis sit manifestissima impostura; quoniam dum æger in deterius labitur, si antea bezoartica medicus non adhibuerit, omnes putant illi esse malorum acceptum referendum: ratio, cur Bezoar, quod defertur ad nos, despicere debet, est quia referunt sudorem excitare, quod (vt docet experientia)



tia) est falsum. Præterea in nostro Bezoar intrinsecus est nucleus, vel palea, quod ostendit esse artefactum. Insuper videtur fabulosa eius Historia; à Serapio libro agg. habetur, esse lachrimam ceruorum Orientis; quæ sic fiat, cerui comedunt serpentes, vt deponant senium, deinde intrant flumen & immerguntur vsque ad caput, & tamdiu morantur, donec sentiant veneni vires esse superatas, interea emittunt lachrimam, quæ oculorum angulis adhæret, donec exsiccat, inde cadit, & inuenitur. Alij dicunt, quod in ventre huius animalis bezoar inueniatur; quod si ita esset, mercatores, qui Venetias tot preciosos lapillos adferunt, semel seruum deferrent.

Eadem ratione reiiicimus, quod ferunt de virtute cornu rhinocerotis aduersus venena; quia experientiæ non respondet: vereor ne, quod refertur de rhinocerote, sit omnino falsum; etenim, si tam virtuosum quadrupes inueniretur, integrum apud Regem Hispaniarum, vel Turcarum fuisset visum, & expertum; sed apud neminem istorum virtutes cornu rhinocerotis celebrantur, ergo non est credendum, quod alibi inueniatur.

Præterea inter Bezoartica sunt Hyacinthi, coralli, & cæteri preciosi lapilli, quippe si experientiæ, & rationi standum est, neque occultis, nec manifestis qualitatibus iuuant maligna febre correptos: non occultis; quia hæc qualitates (vt ostensum est libro 8.) non dantur; non manifestis, dicunt enim exsiccando hæc Bezoartica aduersari putredini, at sic est, quod assumpta non possunt tangere putredinem insidentem venas proximas cordi, ergo non exsiccabunt; nulla actio manifesta sit sine contactu; exempli causa si adesset vlcus putridum in externa corporis parte, & Medicus exsiccat medicamentum non vlceri, sed aliis partibus adiungeret, nunquam vlcus exsiccaret, quinimò Astantes medicum valdè irriderent. Similiter quo pacto volueris putredinem existentem in venis proximis cordi bolis cordialibus exsiccare? Ego non semel bolos cordiales per secessum integros vidi excretos. Præterea dato, quod smaragdi, Hyacinthi, & saphiri possint malignam putredinem arcere: dicimus, quod ij lapilli, quos habemus, non sunt orientales, sed boreales, & vilissimo prætio emuntur; ad hæc dato, quod essent orientales, & quod mirificam haberent virtutem, nostrates illis abutuntur; quia aliqui cibis illos permiscunt, aliqui tribus horis ante cibum illos sumunt. Est Auenzoar 1. Thessir cap. 1. qui iis verbis docet tempus opportunum sumendi smaragdum: qui sumpserit Theriacam, vel smaragdum non recipiat cibum, nisi post septem horas, & non exhibeatur cibo in stomacho existente; arbitror primo bezoartica nullo modo iuuare, quia sic me docuit diutina experientia, secundo pulueres bezoarticos cibis commistos plura incommoda ægrotantibus afferre posse; quia sicuti ex quolibet puluere misto humidis rebus fit glutem; sic bezoarticus puluis cibo mistus glutem efficiet, quod venas capillares Hepatis summa cum ægrotantium iactura obstruere possit.

*Errant qui  
dant refrige-  
rantes Syru-  
pos actu cali-  
dos.*

Videntur errare, dum ægotantibus alterantia, quæ habent poten-  
tiam refrigerandi dant actu calida est Galeni 3. de temp. cap. 4. quod  
viscera ab illis refrigerari non possint, nisi caliditas actualis, & acqui-  
sititia prius pereat; hæc sunt verba, dum aliquid agendo patitur, in  
patientem si est aliquis effectus acquisititius ex accidente, perit celeri-  
ter; subdit Galenus, in applicandis iis, quæ natura sunt nobis frigida,  
& per accidens calida, si debeant refrigerare perit prius acquisititius  
calor; datque hoc exemplum Galenus, si papaveris succus exhibea-  
tur calefactus, paulo post in ventre euadit frigidus, & natura ad tol-  
lendum acquisititium calorem extrinsecus immissum magis affligi-  
tur; quod ita se res habeat, probat experientia dicens, quod priscana,  
lac, & far demissa in ventrem imbecillum aliquando euomi actu fri-  
gida; ventriculus enim antequam concoquat, prius acquisititium ca-  
lorem superat, quo superato aggreditur concoctionem, & solum il-  
lo concoquendi tempore alterantia frigida refrigerant, quando vero  
sunt cocta, & superata non refrigerant, sed augent calorem natura-  
lem: quodque ita sit, audite Galenum loco citato: lactuca afficit cor-  
pus nostrum, ut medicamentum toto concoquendi tempore, ubi  
iam est assimilata, & cocta, non amplius refrigerat, sed naturalem  
calorem augeat: alterantia igitur refrigerantia non debent esse actu ca-  
lida, nec calefacientia actu frigida, quia actio Sympliciorum non incipit,  
nisi reducantur ad pristinam naturam.

*Dub.*

Sed exurgit dubitatio, quia ex Galeno 13. methodi 12. habetur,  
quod alterantia extrinseca non debeant applicari actu frigida, quare  
tanto minus dabimus alterantia intrinseca actu frigida, hæc sunt Ga-  
leni verba, si hepar inflammatione laborare incipit, medicamentum  
actu frigidum non applicabitis; at si brachia, vel crura incipiant in-  
flammatione affligi, medicamentum poterit apponi actu frigidum:  
Respondemus, quod Galenus dum dicit, inunctionem actu frigi-  
dam non esse apponendam regioni Hepatis, quod non intelligit ra-  
tione indicantis calidi, de quo nos loquimur, sed ratione prohibentis:  
meatus externi circa regionem hepatis non debent frigiditate exter-  
na astringi, quia per illam partem maximè ventilatur iecur, alterantia  
igitur nec calida, nec frigida esse debent: non calida; quia actus alte-  
rantium omnium insequuntur energiacam potentiam: non frigida,  
quia magis potest prohibens relatum, quam indicans: in pedibus, vel  
cruribus inflammatis ubi magis potest indicans, quam prohibens, actu  
frigida alterantia apponuntur. Ex iis colligimus erratum illorum,  
qui in alterantibus glacie vruntur, sit enim indicans calidum ut lu-  
bet, nunquam alterans refrigerabit, nisi prius caliditas acquisititia, ut  
dicit Galenus loco citato, omnino destruat.

*Errant qui  
vruntur gla-  
cie in alto-  
rantibus Sy-  
rupis.*

Ladunt quoque febricitantes, dum eos collocant in aëre calido,  
& ocluso: permittuntque, ut æstius temporibus claudantur fores &  
fenestræ, perinde ac febris indicaret calefaciens, & non refrigerans: aër  
inclusus tam malis halitibus refertur, ut faciliè interna viscera ad ma-  
iorem putredinem disponat: audiamus Galenum 9. methodi 14. qui  
aerem



aerem calidum febrientibus omninò interdicat, si morbi species est calida, & sicca præparabis ambientem aerem cubiculorum frigidiorē, & humidiorē; subdit, in æstate, in morbo calido, & sicco subterraneas domus eligimus, & ad septentrionem versus; ac aspergas humore assiduè eorum pavimenta exornes germinibus, & floribus frigidis: malè igitur agunt, qui permittunt, vt claudantur fenestæ; aer non perflatur, euadit calidus & putridus, & febrienti nihil potest esse eo deterius, & perniciosius; hinc Galenus in morbis calidis subterraneas domus ad septentrionem versus locatas eligebat, vt aeris caliditas, & halitus putridi, qui eleuantur in cubiculo, noui, & puri aeris flabello ventillarentur, & mala qualitas caloris febrilis reprimeretur.

*Errat dum  
in calido cu-  
biculo tenent  
febrientes.*

Malè agunt quoque, dum permittunt, vt plurimi ingrediantur cubiculum; quia multorum halitus aerem corrumpunt, Galenus 10. methodi cap. 8. habet; turba amicorum calefacit cubiculum, quare prohibendum, ne ingrediantur: si turba amicorum, qui ægrotantium animos sedare, ac demulcere posset, est à Galeno interdicta, ne cubiculum calefiat; quanto magis erit prohibendum, ne claudantur fenestæ? non solum enim calefieret cubiculum, verum, fuligines putredinosæ cum puri aeris inspiratu non perflentur in deteriore conditionem laboretur æger. Nec obiciant, quod ab aere frigidiori cutis densetur, & obstruatur, & inde maius detrimentum nascatur. Galenus enim loco citato statim occurrit huic dubitationi, quod ex aeris frigidi inspiratione magis sit futurum commodum, quàm ex cute densanda incommodum. Verum quamuis condensatio cutis sit causa caloris, potest quoque vitari hoc incommodum, si æger cooperiatur, aer enim frigidus inspiratus interna viscera refrigerabit, & intensum calorem compescet; nihil enim promptius temperaturas humorum immutat, quam aer, vt dicit Galenus 3. de hum. com. 2. hæc sunt verba, si aeris nos ambientis temperies immutetur, etiam humores necessario immutabuntur: nihil itaque citius emendabit effrenem viscerum calorem, quàm aer frigidus: & nullus error in febribus malignis, & ardentibus maior fortasse erit, quam ægros in locis calidis occlusis, & hominum turba plenis tenere.

“  
“

*De Erratis circa vbi agendum.*

CAPVT V.

QUI actiones, & vsus omnium partium corporis non callent, nunquam (vt ait Galenus 1. de loc. aff.) internas ægritudines cognoscere, & curare poterunt; quia ex latis officiis vbi sit indicans, & vbi debeant remedia applicari, est colligendum. Galenus 13. methodi cap. 17. & 18. & alibi docet, quod à substantia indicantis vbi sit agendum desumitur. Nos in 3. libro tradidimus methodos cognoscendi

Specificas partium affectuum differentias: quarum contemplatio tanti est, ut Galenus 13. methodi cap. 20. dixerit; si quis adimeret indicationem sumptam à parte, istotam medicinam sex diebus adiceret: nostrum hic est, aliquot errata Empiricorum, qui internas subsistentias indicantium non perquirunt, afferre: quoniam de modo cognoscendi internas affectuum ideas in libris superioribus abundè egimus.

*Ut errât, dum  
putant omnes  
morbos tolli  
posse cathar-  
ticis.*

In primis illud se offert commune erratum rudiorum, dum in omni morbo putant, humores peccantes purgantibus medicinis tolli posse; est Galeni ad posthumum cap. 3. quod multæ sint viæ, quas natura aperit pro expellendis excrementis, per vomitum videlicet, per alui profluvium, per urinæ multitudinem, per sudorem, per sanguinis eruptionem, per hæmorrhoidas, &c. cur itaque plurimi in omni morbo putant catharticos esse utendum; perinde ac natura non posset per alias regiones corporis aggredi crîsim quam per aluum; ac vnica esset indicantis subsistentia, vnicum vbi agendum, vnicusque, & vniformis in omnibus medendi modus: dum natura est prona & proclivis, ut soluat morbum per sudorem, vel per urinam, si porrexeris pharmacum, impedies illicò crîsim; quia motum contrarium efficies; raptus humorum per aluum est omnino oppositus raptui per sudorem, per urinam, per vomitum, & per fluxionem sanguineam è naribus. Amplius Galenus 5. de loc. aff. 2. & alibi de morbis, qui fiunt in pectore dicit, non euacuari excrementa pectoris per aluum, nec per urinam: per celeberrimam quoque est Historia Pythionis ab Hippocrate proposita, in qua refert Galenus, affectionem pectoris, quæ erat in Pythione per sputa perfectè curari, vrina adhuc manente cruda; quia, ut subdit Galenus, affectus pectoris nec per urinam cognoscitur, neque expurgatur. Sæpèque thoracis morbi solvuntur, & superantur vrina cruda perseverante: qui igitur putant, catharticos morbos omnes curari posse, toto cælo aberrant, quia plurimæ sunt viæ, eæque inter se contrariæ, per quas solers natura morbos soluit.

Cæterum veritas melius percipietur, si ægros ab Hippocrate propositos expendimus, quia in illis, tanquam in speculo omnia potiora medicinæ fundamenta elucent. Horophons 17. die sudore iudicatur: ponamus, quod Empiricus dedisset Horophonti pharmacum 16. die, certè non sudasset, quia medicamentum trahens ad intima humores diuertisset naturæ inclinationem, vnde magis grauata natura facile poterat ad exitum peruenire.

Clonactides 80. die copioso sudore iudicatur; si hic eger fuisset tractatus ab Empiricis, qui solis pharmacis putant tolli posse morbos, sudorem anteuertissent, & natura per medicinas distracta ab hac optima crîsi in peiorem statum fortasse incidisset.

Mulier decumbens in litore trimestri fœtu grauida 14. die per vomitum, & sudorem ægritudine liberatur: cui dubium, quod si Empiricus ei pharmacum dedisset die 12. vel 13. quod crîsis hæc fuisset distracta, & decima quarta non fuisset liberata?



Cherionas vigesima liberatur multitudine biliosarum vinarum, si pharmacum sumpsisset, natura impedita fuisset, & crisis illa die non esset secuta.

Virgo in Abderis ardente febre vigesima septima per sudorem copiosissimum liberatur: eodem modo liberatur (vt dicit Hippocrates) Nicodemus: si rudis Medicus iis dedisset medicamentum paulo ante crisin, an ne malè egisset, profligando naturam, quæ non erat inclinata, vt per aluum moueret.

Mulier morosa tertia die liberatur; quia muliebria multa descenderunt, quomodo ergo hæc mulier potuisset liberari medicamento? pessimum igitur est arbitrari, quod medicinis soluentibus omnes ægrotantes sint tractandi.

Virgo in Larissa sexta die liberatur per fluxum sanguinis è naribus, & sudorem; erat ergo humoris peccantis subistentia supra gibbam iecoris; quia narium venæ à iugularibus nascuntur, & iugulares à caua prodeunt, quæ supra gibbam habet suam sedem. Quomodo igitur per aluum excrementa existentia in caua propensa, vt per sudorem, per nares, vel per vrinam excernantur, medicamentis auferri poterunt?

Meton quinta die morbo acutissimo liberatur per sanguinis euacuationem è naribus. Hippocrates sapientissimus, vt illicò Metonem ad pristinam sanitatem transferret, noluit mouere per aluum, sed paulo ante crisin ei parauit lotiones capitis; quia videbat harum auxilio naturam iunari ad perfectam crisin faciendam; quibus administratis, largè è naribus effluxit sanguis, & sine medicinis statim fuit liberatus: nostrates Empirici non solum caput lauissent, immò, si probus Medicus in simili casu lotiones proposuisset, increpassent, & ei vitio vertissent, tantus est medendi abusus. In simili casu mea sententia fuit semel iniuste reiecta: erat patiens in quo stilla sanguinis è naribus incœpere in die indicatoria. Ego imitatione Hippocratis lotiones capitis proposueram; cæteri medici summis ferè vocibus, medicinam, & hyruidines hæmorrhoidibus applicandas proposuerunt, & inde naturæ adeo fuerunt impedimento, vt amissa occasione floris sanguinei è naribus, facta fuerit viscerum inflammatio, & miser, qui omninò debebat ab hoc discrimine enatare, tandem importunis medicinis funeratus est. Quorsum post tres dies voluistis repetere medicamentum leniens, si paulo ante intestina fœcibus fuerint euacuata? Quorsum voluistis vt hyrudinibus in partibus infernis, si natura euacuationi per nares erat inclinata? opus erat, vt imitaremini Hippocratem, qui Metonem lotionibus, statim liberauit: variz enim subistentiæ indicantium omnino variant vbi sit agendum: si subsistat indicans in Thorace, non debemus vti medicinis, vt vidimus in Pythone; quia Thoracis affectus per tussim curantur; sic febris ardens per sudorem, vel per vrinam iudicatur, inflammatio iecoris præcipuè sanguinis profluio, tertianæ vomitu, & spleneticæ hæmorrhoidibus: verum antequam administrantur auxilia, opus est, signa omnia indicatoria ex-

*Error quorundam.*

*Vi errant dñ  
in hamorrha-  
gia è naribus  
narium pinis  
astringentia  
applicanti.*

pendere, quia hæc nos docebunt naturæ inclinationem.

Postquam de fluore sanguinis è naribus locuti sumus, se offert ridiculum remedium Empiricorum, qui dum arcere volunt fluxum sanguinem è naribus adiungunt astringentia narium pinis, credentes quod indicans subsistat in naribus, cum subsistat in venis cauis. Hinc tollitur hæc hæmorrhagia secundo cubito, quia seruantur quatuor requisita reuulsionis, quorum primum est, seruare rectitudinem, secundum per vasa communia euacuare, tertium trahere ad originem, quartum per distantissima.

*Vi errant  
Empirici in  
curandis  
lumbricis.*

Demum sæpè videmus, pueros lumbricis vexatos, ab Empiricis, qui nesciunt vbi subsistant, medicinis importunis tractari; quia, dum lumbrici sunt supra vmbilicum, vruntur clystere, dum infra, portionibus. Auicennas lib. 3. fen. 16. tract. 4. cap. 25. dicit, vermes si supra vmbilicum fuerint, administranda ea quæhibentur; & si fuerint apud vmbilicum, & sub eo, clysteria imponenda: qui igitur præbent medicamentum per os, lumbricis existentibus sub vmbilico, agunt frustra, quia ante quam descendat medicina, ita alterantur in supernis partibus, vt eius virtus retusa non valeat vermes occidere, nisi fortasse medicamentum sit natura insuperabile, sicuti est mercurium; quod mirificè illos occidit, vel quod à Galeno lib. de theriaca ad Pisonem proponitur, estque cantharis læuigata pota cum radice brionie, quæ medicamenta semper sunt lumbricis deleteria: similiter, si vruntur clysteribus lumbricis existentibus in partibus superioribus, tempus conterunt, & frustra vexant ob incognitam subsistentiam ægrotos.

*Vi errant, dum in lienis affectibus putant, quod vbi agendum sit  
vena saluatella.*

#### CAPVT VI.

*Fundamenta  
aduersariorū  
à Galeno de  
sumpta.*

**H**ODIERNO die, & olim ante Galenum in animis multorum vit error hic insignis, quod saluatella vena sit splenetica, lienosis solum cōferat, & quod falsissimum est à splene exordium trahat: quo fit, quod nullus sit quartanarius, nullusq. inflammatione splenis correptus, cui non seceretur hæc vena. Cæterum, quia error est valde communis, præcipua eius fundamenta proponam, eaque conuellam vt veritas melius elucescat: primum aduersariorum fundamentum, videtur, quod à Galeno colligi possit 3. de anatomicis admin. cap. 5. vbi habet hæc verba, lienem iuuari afferunt ex euacuatione venæ inter anularem, & minimum digitum: confirmant similiter suam sententiam Galeni auctoritate 1. de hum. comm. 13. vbi dicit, liene inflammationem patiente venam sinistræ manus internam secabis si iecur fuerit inflammatum, internam dextræ. Præterea lib. de cur. rat. per s. m. c. 14. & 16. & 2. ad Glauc. habet, liene inflammato, venam manus sinistræ



finistꝛę dicit esse aperiendam: idem confirmat 13. methodi 11. iis verbis, vbi iecur phlegmone est correptum, secatur vena in dextra manu, vbi lien in sinistra.

Insuper confirmant suam opinionem auctoritate Hippocratis *Ab Hipp.* libro de morbis particula 25. vbi habentur hæc verba, peripneumonia, & pleuricide laborantibus venam manus splenitidem appellatam esse aperiendam: addūt, Soranum Ephesium in sua introductione cap. *A Sorano.* 1. hæc afferre, in lienis inflammationibus venam secus minimum digitum existentem suo quoque tempore aperiiri consueuisse. Aui- *Ab Aui.* cennas lib. 3. fen. 22. tract. 2. cap. 25. dicit, in lienis, & iecinoris affectibus saluatellæ sectionem anteposuerunt sectioni Basilicæ; Præterea est Oribasius 7. collect. med. cap. 3. & alibi: est Aetius serm. 3. cap. 12. Paulus lib. 3. de re medica; Alexander lib. 8 cap. 12. Actuarius libro 3. methodi cap. 1. Rasis 9. ad Almanforem cap. 70. Halij 7. pract. cap. 40. Rabi Moyses particula 22. suorum aphorismorum; & demum Serapio tract. 6. sui breuiarij capite 15. qui conuenire videntur, quod in affectibus lienis, & vbi melancholia redundat, sit saluatella vena secanda.

Quo ad Galenum attinet, respondemus, quod 3. de anat. cap. 5. ex *Vt interpretatur Galenus.* sententia aliorum loquitur; verba Galeni hæc sunt, afferunt lienem iuari ex euacuatione saluatellæ, cum igitur dicat [afferunt] aliorum opinionem proponit. Dum verò afferunt loca 1. de hum. com. 13. in inflammatione videlicet lienis venam sinistꝛę manus internam esse secandam, & 1. de ratione vict. 10. & aliis citatis locis; respondemus Galenum per manum [nisi dicat summam manum] semper intelligere brachium; 3. sint enim de anatom. admi. declarans, quod in brachio sint duæ venæ, & vna arteria, habet hæc verba, vna sanè arteria, duæ autem venæ in tota manuum pereperant, quod nullomodo de summa manu potest intelligi: sed de brachio. Nec obiciant, quod Galenus 1. de hum. 3. clare dicat, esse secandam venam inter digitum minimum & anularem: quia ibi intentio est Galeni enumerare omnes venas, quæ aptę sunt, vt secantur: proponit saluatellam, quia ipsa quoque adferre potest magnum beneficium hepati, & lieni, dum virtus non fert euacuationem per vasa cubiti, quæ cum sint maiora, maiorem requirunt virtutem permittentem, vel dum venæ cubiti non apparent. Neque Galenus loco citato saluatellam vocat spleneticam, neque dicit, magis iuuare splenem, quam venæ cubiti, à quibus immediatè saluatella dependet.

Quo ad Hippocratem, quod dicat libro de morbis 25. saluatellam *Vt Hipp.* esse spleneticam. Respondemus libros de morbis esse ex omnium ferè opinione genuinos, & spurios.

Quo ad Soranum Ephesium attinet, dicimus nobis non reluctari; *Vt Soranus.* quia solum refert, quod suis tēporib. in lienosis saluatellam secarent: priscis enim & modernis temporibus fuerunt Empirici, qui corporis anatomem nunquam viderunt, qui quæ in communem de saluatella ab usum inciderunt, qui ad hæc vsque tempora, quasi per traditionem

in animos nostratum hoc erratum transtulerunt, meritò igitur Soranus reprehendit illorum opinionem, qui crediderunt, quod lienosis magis saluatella, quam vena cubiti prodesset.

*Vi Anic.*

Similiter Auicennas ex aliorum sententia est locutus, quia dixit, quod aliqui sectionem saluatellæ anteposuerunt basilicæ. Idem Orbasius loco citato apertè dicit, quod nonnulli in affectibus lienis eligunt saluatellam; eius verba adeo sunt clara, ut non indigeant explanatione.

*Vi interpre  
sensur Græci.*

Quod verò Paulus non fuerit illius sententiæ, quod saluatella sit splenetica; illum legamus lib. 3. c. 49. ubi dicit laborante liene anteponendâ esse cubiti venam, ei quæ summæ manus: si Paulus credidisset saluatellam esse spleneticam ei in affectibus lienis non anteposuisset sectionem venæ cubiti. Alexâder quoq; loco citato habet hæc verba, non apparentibus venis brachij, saluatellam esse substituendam; idem quoque dicit Actuarius; ut mirandum sit, quomodo, qui sequuntur Empiricorum abusum, audeant afferre auctoritates falsas. Tandem Serapio ubi dicit, ex sinistra manu in febre melancholica sanguinem esse extrahendum, per manum dicimus, illum intelligere brachium, nisi addat summam: nulla igitur auctoritate Græcorum vel Arabum Empirici poterunt defendere, quod saluatella sit splenetica; habeatque cum morborum splenis prærogatiuam, quam venæ cubiti non habeant maiorem. Veteres enim nominati auctores, qui omnium bonarum artium fuerunt auctores in tam manifestum errorem non poterant incidere.

*Ostenditur  
Arethei au-  
thoritatem.  
quod salua-  
tella non sit  
splenetica.*

Cæterum auctoritate, & experientia anatomix confirmemus, quod saluatella non sit splenetica. Legamus Aretheum antiquiorem Galeno lib. 2. de curat. acut. morb. ubi habet hanc verborum seriem, nonnulli medicorum dixerunt venam, quæ est inter minimum, & anularem digitum ad lienem usque pertingere; verum, & hæc ipsa est propago venarum cubiti, sed cur isti potius eam, quæ propè digitos est, quam quæ in cubito, cum vena cubiti amplior sit, & ad fluxum habilior eligunt; mirabatur Aretheus crassissimam medicorum suorum temporum ignorantiam; qui nesciebant, unde saluatella traheret suum principium: eadem ratione quoque nos mirari possumus nostratum Empiricorum inscitiam, qui de re medica, de Hippocrate, & Galeno, & de re anatomica semper loquuntur, quamvis nunquam Hippocratem, & Galenum legerint, vel anatomiam viderint.

*Ostenditur  
Galeni au-  
thoritatem  
quod salua-  
tella non sit  
splenetica.*

Insuper confirmatur Galeni auctoritate 3. de loc. aff. cap. 7. ubi dicit, dum sanguis melancholicus abundat, venam cubiti esse lecandam, nec verbum quidem de saluatella protulit: sed clarius adhuc Galenus libro de cur. ratione per s.m. ostendit, quod saluatella cum lienosis nullam habeat prærogatiuam, habet enim hæc verba: inuenire tamen nequeo, quam obrem medici in lienosis sanguinem detrahere neglexerint, si quidem ingentem utilitatem prouenire conspexi, si libbra dumtaxat detracta foret ex interna sinistra cubiti. Cui dubium, quod si saluatella lienosis magis conferret, quam vena cubiti, quod de



de saluatella eo loci, & non de vena cubiti esset locutus. Amplius Galenus loco citato habet hæc: affecto liene haud æquè adiuuerit circa anularem digitum sinistrae manus incisa vena, atque si internam cubiti secueris. Qui putant saluatellam esse splenicam dicunt, non reperiri in codice Græco particulam [haud] verum esto, quod non reperiatur, quid tum? sequitur ne propterea saluatellam magis conferre lienosis, quam cubiti venæ, cum dicat æquè, hanc & illam iuuare lienosos? Demum libro de ratione vict. in ac. cap. 10. habet, affecto liene maximè est secunda vena interior cubiti, quæ si non appareat, secetur ea, quæ ex cubitu obliquarum venarum sit; & hæc est mediana, quæ similiter, si non appareat, secari debet humeralis; & tandem, si omnes sint occultæ, secantur quæ in vna existunt, inter quas est saluatella: ecce, quod quælibet alia cubiti vena magis potest ex Galeni sententia in lienosis affectibus pellendis, quam saluatella.

Denique anatomiae experientia exactè docebit, saluatellam nihil cum splene habere, nisi communem consensum, quem habere potest quælibet vena cum vniuerso corpore, de quo communi consensu Galenus libro de venæ sect. aduersus Erasistratum cap. 4. & Hippocrates libro de alimento dicunt, omnium partium corporis esse vnum confluxum, & vnā conspirationem: omnes anatomici Prisci, & Moderni sciunt, venas manus, & brachiorum non esse portarum; quare, qui dicit saluatellam esse splenicam, quemadmodum elapsis menibus à Rudi Ænobarbo audiuius, in re clarissima, & apertissima cæcuerit. Hic vir reddens rationem, cur saluatella multum iuuet spleneticos, dicebat in anatome imposuisse specillum in cauum venæ saluatellæ, & sensim per communem cavitatem peruenisse ad lienem: ego aderam, sed admiratus eius audaciam, tacui; tum, quia ille erat ineptus ad discendum, tum, quia illum docendo essem magnum inimicum lucratus.

*Ex anatomia  
stenditur,  
saluatellam  
non esse sple-  
niscam.*

*Error Empi-  
rici Ænobar-  
bi.*

*Proponuntur octo sophistica argumenta, quibus nonnulli probant,  
quod semper ad cutim debeant attrahi humores maligni  
vesicantium auxilio.*

## CAPUT VII.

**Q**VI in omni maligna febre vtuntur vesicantibus, hoc fundamento videntur esse suffulti, quod temper sit proprium naturæ, vt turgentes humores ad cutim propellant: si igitur hoc fundamentum reiecerimus, inde statim patebit, quod malè agant, qui in omni maligna febre vtuntur vesicantibus. Cæterum antequam ex Galeni fundamentis veritatem declaremus, argumenta illorum, qui temper in maligna febre trahunt turgentes materias ad cutim, proponamus, ea-que pro viribus diluamus.

*Primum ad-  
uersariorum  
argumentū.*

Primum aduersariorum argumentum desumptum est à Galeno; de naturalibus facultat. 14. vndecimo methodi 20. & libro de cur. ratione per l. m. hocque est: excrementa ab vna in aliam partem, donec omnium imbecillimam inueniunt, transire: addunt, sed hæc pars imbecillima est cutis, ergo: confirmant argumentum; quia ex Galeno 2. de vsu par. cap. 5. quando cutis non sulcipit excrementa corporis, partes interiores magis afficiuntur, & eò magis, quò interiores partes redditæ sunt imbecilliores ab obstructione, intemperie, vel inflammatione. Ex iis inferunt semper humores malos esse trahendos ad cutim, & per consequens vesicantia turgente materia semper conuenire posse.

*Secundum.*

Secundum argumentum sumunt ex Thucydidis testimonio dicentis, in truci illa pestilentia fuisse seruatos illos, in quorum manus, vel pedes procumberent maligni humores, qui exedebant, & vlcerebant illas partes: ex hac Historia colligunt, naturam semper habere promptitudinem expellendi malos humores in extremas partes; colliguntque, partes extremas non sine maximo beneficio vesicantiis posse exulcerari, & naturam semper exercere hoc munus expellendi malignos humores ad cutim.

*Tertium*

Tertium colligunt à Galeno libro de cibis boni & mali succi, vbi habet: quibus nihil horum accidit, interierunt omnes, aut cum manifesto visceris vnus phlegmone, aut ob vehementem, & malignam febrem: qui verò seruati sunt, id fuit factum, vel ob eruptiones in cutim siue per sudorem, siue per erysipelata, vlcera, phlegmones, herpes, impetigines, pforas, & lepras; ex hac auctoritate, & experientia inferunt, malignos & turgidos affectus optimè curari posse transponendo humores peccantes ad cutim vesicantium auxilio.

*Quartum.*

Quartum argumentum à Galeno desumunt 5. methodi c. 22. ibi hæc verba leguntur, atque cum ita iam vacuati essent, qui euasuri erant, iis pustulæ, quas exanthemata vocant, nigræ toto corpore multæ confertim apparuerunt, vlcerosæ quidem plurimis, omnibus certè siccæ. Inde colligunt, quod sit conuenientissimum, vt in omni febre maligna ad cutim propellantur turgentes humores.

*Quintum.*

Quintum desumunt ex casu Horophontis 3. in primum epid. ab Hippocrate proposito. Huic ægroto morbo-existente crudo accidit abscessus in cruribus, & inde malignissimo affectu liberatur; inferunt ergo optimum foret, si in omni maligna febre, crudo quoque existente morbo ad crura virtute vesicantium traherentur humores: confirmant quoque, quod morbo existente crudo id fieri possit exemplo Sileni, & Critonis; de Sileno Galenus in commento dicit, non periisse Silenum nono die, vt erat rationi consonum: sed vndecimo; quia papulæ ad cutim octauo die transmissæ sunt, ergo & nos, vt naturam imitemur, morbo quoque existente crudo humores ad pedem, dicit Galenus, cum pes totum humorem peccantem capere non potuisset retrocessit: & quia malignus erat, excirauit furiosum delirium, & perit; ex hac Historia colligunt, vesicantia conuenire in febribus malignis;



gnis; quia humores dum essent attracti & conflui ad pedes non retrocederent, si continuò vesicantium beneficio expellerentur, & non humores illum attraherentur.

Sextum argumentum est à simili, dicunt enim, si in qualibet febre *Sextum.* crudo existente morbo utimur in principio cucurbitulis, frictionibus, & balneis, & in peste, carbunculis, & bubonibus apparentibus, utimur ferro, igne, & vesicantibus: cur in febre maligna materia existente cruda, & furiosa non conueniet vsus vesicantium ad cutim, & postremas partes humores trahentium? addunt, si in morsu canis rabidi statim urimus, scarificamus, vesicantia adiungimus, ut virus non petat altiores, & nobiliores partes, similiter erit procedendum vesicantibus, dum humores maligni repunt ad cor.

Septimum argumentum ex Hippocrate colligitur: 6. enim aphorismorum habet, erysipelas ab interioribus ad exteriora bonum. Galenus in commento dicit, omne quod ex profundis, & nobilioribus partibus ad cutim transfertur, bonum; contra vero, si ad interiora, malum: & Hippocrates paulo post dicit, ab angina habita, si tumor fiat in collo, bonum; Galenus in commento dicit, quod causa huius est; quia ex partibus inferioribus, & principalioribus transferre passionem ad cutim confert; similiter 3. aphorismorum. 20. & 4. de acutis 30. habet, quia transpositio ad exteriora, ad cutim, ad pedes, ad manus semper confert ad salutem, ideo in angina, si appareat tumor in collo est bonum, trahitur enim materia à centro ad circumferentiam.

Octauum argumentum desumunt ex 8. de comp. med. sec. loc. capite 4. ubi Galenus in stomachi distensione, & inflatione dicit esse applicandum spongiam aceto acerrimo imbutam pedibus, & brachiis gratia reuulsionis: eadem ratione dicunt, in omni maligna febre conuenire vesicantia; quæ exulcerando attrahant humores malignos petentes cor ad partes extremas: adduntque, quod nihil fortius attrahere possit vesicantibus, quia id efficiunt ratione caloris, doloris, vi vacui, & (ut aiunt nonnulli) similitudine totius substantiæ; putant enim quod deleteria vesicantium natura deleterios, & malignos humores attrahat, ut magnes ferrum. His, & similibus argumentis suffulti plurimi dicunt, turgidam materiam semper esse transponendam ad cutim, idque promptè fieri posse vesicantium auxilio. *Octauum.*

*Ostenditur, quod argumenta superius allata pro vesicantium defensione, sint paralogismi.*

#### CAPUT VIII.

**N**EGARE nunquam potui, quod humores prauis, & malignis aliquando non debeant transponi ad cutim, & ad extremas partes. vsu potentissimorum reuellentium, inter quæ tenent vesicantia primum locum: verum, qui ex propositis argumentis colligunt, quod

non aliquando tantum, sed semper prauī humores malignarum februm debeant iis potentissimis reuellentibus ad cutim transponi, in manifestissimum errorem incidunt; ideo eorum argumenta superius relatā reiciam, & potiora (nisi me fallit opinio) fundamenta hic, & in sequentibus capitulis pro vesicantium defensione proponam.

*Prīmū fundamētum quo reijciuntur qui in omni febre maligna vtiuntur vesicantibus.*

Primum fundamentum est, quod natura modò moueat per aluum, & modò per vrinam, modò per tussim, & modò per cutim; Galenus 1. aphorism. 21. habet, euacuantibus conferentia loca sunt intestina, venter, vesica, uterus, cutis, nares, &c. subdit Galenus ex ore Hippocratis dicens; medicum naturā inclinationem obseruare, & si idonea fuerit inclinatio, ei adiniculari, si verò noxia, illam reuellendo prohibere: est quoque Hippocratis sententia 2. in 6. de morib. vulg. 28. quæ his verbis exprimitur: reuellendum est, si non repunt, quo expediat; si verò quo expedit, eis aperienda via est, prout singuli repunt: quibus positis, si natura nullam inclinationem habuerit ad cutim, ut quid auxilio vesicantium vti volumus? quasi quod natura esset aliis viis destituta, & nunquam esset inclinata ad mouendum in partem contrariam cuti: quasi, quod nunquam crisis fiat per aluum, & per eruptionem sanguinis è naribus, quæ è diametro opponuntur crisi, quæ fit per eruptionem cutis, pedum, & brachiorum.

*Secundū fundamētum.*

Secundum fundamentum est, quod materia turgens, & maligna moueatur modò per cutim, modò per aluum, modò per vrinam, & modò per fluxionem sanguineam, & per alias partes: patet ex Hippocrate, quia in aphorismis dicit, si materia turgeat dandum medicamentum in principio, & id fiat cum præmeditatione, id est, dandum est medicamentum, quando materia habet raptum ad ventrem, in quo casu nullo modo sunt ad cutim transponendi humores, & ratio est, quia eodem tempore in viuētibz non licet vti moribus oppositis. Quod verò crisis non fiat semper per cutim, non desunt exempla Hippocratis. Meton enim sanguinis eruptione è naribus quinta die liberatur. Mulier morosa largè eiectis menstruis per uterum malignissimam febrem euacuat. Virgo in Larissa superat acutam febrem sexta die, quia copiosus è naribus effluxit sanguis: stupidi itaque & hebetis ingenij est, arbitrari, quod ad cutim semper maligni humores debeant vesicantium auxilio transponi.

*Tertiū fundamētum.*

Tertium fundamentum: si natura vergeret per nares, & medicus per aluum, vel per aliam regionem vellet euacuare, naturam rectè operantem impediret, eius vires frangeret, & valdè opprimeret, notissimus enim est Hippocratis aphorismus superius quoque citatus, quod natura vergit eo ducere oportet, &c. His iactis fundamentis omnia argumenta facillè solui possunt, quia omnia concludunt, quod semper sint transponendi humores maligni ad cutim, & ad partes postremas, quod propositis fundamentis ab Hippocrate & Galeno desumptis iustificatur.

*Reijciuntur primum argumentum.*

Primum argumentum erat tale; omnes humores sunt transponendi ad locum debiliorem, at cutis est locus debilior, ergo ad cutim sint trans-



transponendi: argumentum est in secunda figura ex duabus affirmatiuis, & ad primam figuram reduci non potest; maior propositio est falsa, quia humores sunt transponendi, quod natura vergit: dummodo locus sit conueniens, nihil refert, quamuis non esset cæteris omnibus debilior: minor verò non potest conuerti, quia non solum cutis est locus debilior; verum aliæ quoque partes aliquando esse possunt loci debiliores; si enim natura est inclinata euacuationi per aluum, tunc aluus erit locus debilior; si per nates, vel tussim; nares, & tracheæ erunt partes, quæ minus resistent, & quæ vocati poterunt cæteris omnibus debiliores.

Quod attinet ad secundum, tertium, quartum, & quintum argumentum dicimus, quod omnia vnica responsione dilui possunt: quia omnia colliguntur ab exemplis: ostensum est in fine superioris libri, quod exempla, experimenta, & inductiones nullomodo concludant; hæc enim instrumenta primò, procedunt ex meris particularibus, à quibus nil sequitur, secundò, exempla & experimenta cadunt in tertiam figuram cum conclusione vniuersali, quod est monstruosum, & ab Aristotele 2. priorum cap. de inductione reiectum. Nam, quamuis in illa pestilentia à Thucydide relata, omnes, quibus non acciderit aliqua in cutim humorum eruptio, penerint; non propterea sequitur, quod natura in omni pestilentia, & in omni maligna febre eodem modo disposita sit ad transponendos humores per cutim, aliquando enim peste affecti liberantur per narium hæmorrhagiam, aliquando per alui fluorem, vel per alias regiones sine vlla inclinatione, & eruptione in cutim: similiter dum dicunt, quod illi solum seruari sint, qui eruptiones in cutim habuerunt, & quod Hotophons, Selenus, & Chrito fuerunt ob transmissionem humorum in cutim subleuari; nihil concludunt; quinimmo miror, cum ab exemplis velint hoc vniuersale colligere, quod in omnibus maligna febre correptis sint transponendi humores ad cutim, non proponant mille alios nostri temporis aegrotantes, qui quotidie per transmissionem humorum ad cutim liberantur; sæpius enim videmus malignas febres curari per sudorem, erysipeilas, abscessus, vlcera, & per alias eruptiones in cutim: ego quoque eis proponerem mille alios agros maligna febre correptos, qui curati sunt per fluxum sanguineum è naribus, per alui fluorem, & per vrinam: vanissima itaque erunt argumenta proposita: reluctan. turque rationi, experientia, & auctoritatibus Hippocratis, & Galeni.

Ad sextum argumentum, quod erat, sicuti vrimur, crudo existente morbo, cucurbitulis, & in bubonibus pestiferis ferro, igne, & vesicantiis, cur non licebit in febribus malignis vti iisdem remediis, quæ ad cutim transponunt humores? Respondemus nullam esse similitudinem inter bubones, quippe qui iam cuti adhærent, in quos virosi humores confluunt, & humores malignos latentes in venis, qui nullam inclinationem, & propensionem ad cutim ostendunt: ostendimus libro de indicatione, quod non partes corporis sint illæ, quæ in-

*Vnica responsio diluuntur quatuor sequentia argumenta.*

*Ad sextum.*

dicant, sed natura propria ægritudinis, quæ dicitur de morbo, & de eius causa: morbi cutis, vel aliarum partium affectarum de læsis partibus per se non prædicantur, quia morbi & causæ sunt accidentia locorum affectorum. Præterea, propositum argumentum est analogismus Empiricus, quia procedit ex symptomatibus ægrotantis, & non ægritudinis; quia colligunt esse utendum vesicantiis non à natura malignæ febris, vel ab humorum inclinatione, & propensione, sed à symptomatibus Horopontis, Sileni, vel Chritonis, quæ non pertinent ad methodum curandorum morborum; accidentia enim sunt extra methodum: amplius experientiæ non responderet, quia modò humores maligni habent raptum per aluum, modo per vrinam, & per alias partes. Denique argumentum propositum videtur esse à simili, & dicitur enthimema ex signo solubili, quod rejicitur ab Aristotele in libris Priorum; etenim humorum transpositio ad cutim est signum solubile, & accidens separabile malignarum febrium; ostensum est superius per varias regiones moueri malignos humores. Addunt quoque nonnulli, quod sicuti in morsu canis rabidi vrimus, & vesicas excitamus, ne virus cor obrepat, eadem ratione in malignis febribus utemur vesicantibus. Respondemus, quod in morsu canis rabidi locus affectus est pars externa, in malignis febribus est cor, vel partes proximæ cordi, quæ possunt propellere vitosos humores per hæmorrhagiam narium, vel per alias regiones, tuncque Medicus trahens ad cutim impediret naturam rectè operantem.

*Ad septimū.* Ad septimum quod dum transferuntur à profundis partibus ad cutim humores mali, sit bonum: respondemus, quod bonum quoque est, ut transferantur ad intestina, & ad vasa vrinæ, quare argumentum non concludit, quod propterea vesicantia semper bona sint, suadet tantum, ut aliquando bona esse possint.

*Ad octauū.* Ad octauum, dum dicunt, sicuti in stomachi distensione à Galeno, & Archigene laudatur, ut spongia aceto acerrimo imbuta partibus extremis applicetur causa reuellendi humores; eadem ratione dicunt valere in maligna febre vesicantia: argumentum non sequitur; aperte enim dicit Aristoteles 2. Priorum cap. de exemplo, quod primum de medio nunquam concluditur per simile tertio, ratio est, quia similitudines sunt passionum generum, & non specierum; indicationes (ut ostendimus) solum desumuntur ab ideis specificis, & non à genericis, vel singularibus. Præterea aliis quoque modis posset hoc argumentum infringi: sed quia credimus, in malignis febribus vesicantia aliquando habere locum, hoc argumentum cum aliis propositis inter probabilia collocabimus.

*Rejiciuntur*



*Reyciuntur quoque argumenta illorum, qui nunquam admittunt, vesicantia malignis febribus habere locum.*

C A P. IX.

**S**VNT alij, qui tenent in maligna febre, nunquam esse humores transponendos ad cutim vesicantium auxilio: quorum opinio est omnino falsa, quia licet hoc vehemens auxilium febri, vt febris, in commodum sit, attamen illius maleficio aliquando summum beneficium in transponendis humoribus ad cutim compensatur.

Primum argumentum, quod nullomodo in febribus liceat vti vesicantibus, aduersarij desumunt ab auctoritate Hippocratis, & cæretorum græcorum, qui nunquam vli sunt vesicantibus. Argumentum est probabile, & per consequens nullius vigoris: quod sit probabile patet ex Aristotele 1. Topicorū; ibi enim dicit, quod omnia argumenta ab auctoritate desumpta sunt probabilia: quod topica & probabilia argumenta sint nullius vigoris patet, quia omnia sunt cum principij petitione; supponunt enim, quod est probandum, si nihil supponerent, non essent argumenta probabilia, sed demonstrationes. Præterea, qui colligunt esse spernendum vesicantium vltim ex eo quod Galenus, vel Hippocrates de illis non sunt locuti, adeo vanum faciūt argumentum, vt neque verè topicum, & probabile dici mereatur; locus enim topicus esset, si proponerent auctoritatem Galeni, quæ clare exprimeret vesicantia non esse admittenda in febribus malignis, quod non inuenient; apud Galenum enim, & Hippocratem neque reiciuntur, neque nominantur vesicantia, quare argumentum neque inter topica collocari meretur.

*Primum argumentum illorum qui omnino negant vesicantia in febribus. Solutio argumenti.*

Secundum argumentum; illud medicamentum ex Hippocrate, & Galeno in febribus solum est permittendum quod quietem parit, sed vesicantia quietem non pariunt, sed tenent in motu totum corpus, ergo non sunt in febribus admittenda: maiorem probant, quia concoctiones quiete fiunt. Primò respondemus concedendo, quod vesicantia nocent, attamen dicimus, adeo iuuare, & prodesse posse, vt illius maleficio agrotantes longè maiori beneficio compensentur. Secundò dicimus, quod argumentum propositum est vitiosum, quia est in prima figura cum minori negatiua, quod ab Aristotele est rectum, quia nō cōcludit, est enim à destructione antecedētis ad destructionē cōsequētis, veluti est hoc: si est aqua est elementum, sed non est aqua, ergo non est elementū, quod nō sequitur; similiter dicunt, si medicamentū quietē pariat, est admittendum, sed vesicantia nō pariunt quietem, ergo non sunt admittenda; reducitur ad primam figuram cum minori negatiua hoc modo, omne medicamentum quietem pariens est admittendum, vesicantia non pariunt quietem, ergo non sunt admittenda: quod nullam habet virtutem illatiuam.

*Secundum argumentū.*

*Eius solū.*

Tertium argumentum colligunt ab Hippocrate, qui habet, si in principio febrium acutarum materia turgēt, pharmacum est propi-

*Tertium argumentum.*

Eius soln.

nandum; inferunt, ergo non vesicantia. Respondemus, non semper in malignis febribus convenire vesicantia, sed solum quando humores possunt transponi ad cutim; etenim, si habeant raptum ad intestina, pharmacum dandum est: quando Hippocrates dicit, si materia turget, dandum est pharmacum, idque fiat cum præmeditatione, intellexit tunc esse consulendum, an humores turgentibus habeant aliquam inclinationem ad aluum, quia, si nulla esset humorum propensio in illam partem non pharmacum, sed aliis auxiliis transponentibus humores; id quod vergerent, videremus. Præterea accidit materiæ turgentis, ut possit per aluum euacuari; qui igitur ex hoc accidente voluerit concludere, quod in acutis, dum materia turget, solum pharmacum administrari possit, & non alia auxilia, incidet in elenchum accidentis, qui apud Aristotelem tenet primum locum elenchorum in re. Præterea Aristoteles 2. Post. 25. explodit duplex problema: à demonstratione æquiuocum, & accidentale, quis non videt, habere raptum per aluum prædicari per accidens de turgente materia? quis non videt, admodum rare accidere, quod in acutis, dum turget materia, dari debeat pharmacum?

Quartum argumentum.  
Eius soln.

Quartum argumentum, si papulæ efflorescunt, vesicantia impediunt hanc humorum, vel vaporum transmissionem ad cutim, quæ, ut in casu Sileni nos docuit Hippocrates, utilis est. Silenus enim non undecimo die, sed nono periisset, nisi octavo apparuissent papulæ: quod vero vesicantia impediunt, patet, quia non ad cutim, sed ad postremas partes attrahunt humores; argumentum est nullum, quia nos non tenemus vesicantia in omni febre maligna esse administranda. Præterea argumentum est vitiosum; quia est à partibus ad totum, quod est valde explosum in secundo priorum: non valet, in acutis febribus cum papulis vesicantia non conveniunt: non conveniunt in malignis febribus cum narium hæmorrhagia, vel cum alui fluore, ergo nunquam conveniunt; argumentum est omnino vanum.

Quintum argumentum.  
Eius soln.

Quintum argumentum: excretionem, dum crudi sunt humores, dicunt non iuvare: quod argumentum, nullum sit, patet, quia possem propterea dicere, non esse in principio morbi phlebotomandum, leniendum, vel pharmacum exhibendum, quod reluctatur Hippocrati dicenti, in principio, si aliquid videretur movendum moue, & si materia turgeat aliquando pharmacum in principio, crudis existentibus humoribus, esse exhibendum.

Sextum argumentum.  
Eius soln.

Sextum argumentum dicunt, quod vesicantia calefaciunt, & propterea febribus nullo modo convenire. Respondemus primo, quod omnia medicamenta quoque calefaciunt: disputationis cardinem non pereceperunt, quia omnes concedunt, quod vesicantia, & omnia medicamenta corpora viuentia lædant: agitur hic an maius afferant beneficium, quam maleficium; patet, quod vesicantia non calefaciant; quia si ex Galeno quinto methodi decimot. ratio catarrhus salis suffert Thapsiam, & caput non calefiat; tanto minus cor, & cætera viscera à vesicantibus, quæ extremis partibus, quæ valde à corde re-

Vesicantia non  
calefacere  
partes inter-  
nae.

motæ.



motæ sunt, patientur calorem. Hinc Galenus 1. de diff. rentiis febr. ultimo dicit, partes, quibus adhibentur sinapismi, & vesicantia calefieri, & non remotas. Demum, dato, quod vesicantia calefiant, & ægros perturbent, non sequetur, si maius ab illis oriretur beneficium, quam maleficium, quod non essent administranda, ex Galeno 14. methodi 13. colligitur quod, ut curetur morbus periculosus possumus facere alium minus periculosum. Hinc morbos incurabiles aliquando facimus, ut à mortis periculo liberentur ægri: sicuti, dum abscindimus arteriam, ut curetur aneurisma, carnemque abscindimus, ut tollatur cancro.

*Ostenditur, quod maligni & turgent humores possint aliquando vesicantium auxilio transponi ad cutim.*

C A P. X.

**T**AM furiosam malignitatem aliquando humores excipiunt, ut nisi externis partibus vehementissima reuulsoria, qualia sunt vesicantia, adiungantur, viscera illis impleantur, & inde pereant; ne igitur hoc accidat, prudens medicus, sprete febre, humorum cruditate, & ægrotantis quiete cogitur ad extremum hoc auxilium confugere. Quod verò in arte medica habeat locum, & à Galeni principiis, & fundamentis non abhorreat, potest plurimis auctoritatibus confirmari.

Primus locus est 1. de hum. com. 13. ubi habet hæc, si redundantia ad caput, aut ventrem feratur, medicamenta mordacia manibus, pedibusque admota reuellere contrariam in partem solent; valet ergo in Galeno hæc consequentia, redundantia fertur ad caput, ergo manibus & pedibus sunt apponenda mordacia; an verò mordacia sint ex cantharidibus, euphorbio, flamma iouis, vel ex aliis, nihil refert: quoniam materię remediorum ad methodum non pertinent: satis est, quod hoc auxilium reuellens materiam petentem caput fieri possit ex acri medicamento. Neque obstat, dum dicunt febrem impedire; quoniam in omni casu sunt indicantia, & prohibentia librandia, & trutinanda; quia semper ei, quod magis urget, est attendendum: etenim (ut dicemus in libro de indicantium æquilibrio) dum fit comparatio inter urgentia, & causas principales, causæ principales non sunt tanti, ut impediunt urgentia, quin ad se curationem trahant: similiter, dum fit comparatio inter causam, & morbum, prius attendimus causam, quam morbo; quin immò sæpenumero omninò spernimus morbum; in pituitosa enim febre utimur exsiccantibus, quæ reluctantur febri: si denique fit comparatio inter impedimenta, & morbum, morbum quoque despiciamus, veluti, si in capitis vulnere squammæ ossis detineantur; tunc tantum abest, ut vulnus trahat ad se curationem, ut potius dilatetur, & maius fiat, ut commodè ossium squammæ egrediantur. Empirici, quia de hoc indicantium æquilibrio nihil omnino sciunt, *Cut Empirici* incidunt quotidie in sexcenta errata: quia tota se vera medicandi pe- *semper errat.*

*Qua sint ve-  
media quorū  
maleficium  
compensatur  
maiori bene-  
ficio.*

ritia in hac indicantium comparatione consistit: quibus positis, ad ob-  
iectionem respondetur, quod licet vesicantia noceant febri, possint ta-  
men malignis humoribus, qui vrgentium vicem subeunt, tantum pro-  
desse, vt maleficium longè maiori beneficio compensetur. Hinc, licet  
maximè hominib. noceat, vt arteria abscindatur, attamè in aneurisma-  
te, vt maius malū euitetur, abscinditur; tūc magis potest vrgēs, quā cor-  
poris particula: similiter digitum mortuum à vipera, vel à cane rabido,  
vitæ gratia abscindimus. Hinc in cancrena igne, & ferro corporis par-  
ticulas auferimus; quia ei quod magis vrget, est vacandum. Hinc, vt  
hominis vita saluetur, terebramus cranium, & vulnus ferè exitiosum  
facimus; hinc terrificum vulnus inter anum, & testes fit, vt extraha-  
tur lapis. Quò fit, vt Cornelius Celsus libro 3. in fine noni capitis iure  
,, hæc dicat. Circumspecti hominis est, & nouare interdum, & angere  
,, morbum, & febres accendere, quia curationem, vbi id quod est non  
,, recipit, potest recipere id quod futurum est: quapropter, quamuis vesi-  
cantia febres accendant, vigilias inducant, continuò ægrum vexent, &  
aliquando intollerabiles meiendi difficultates pariant, non propterea  
semper, & in omni casu sunt despicienda: anne, si solummodo illorum  
auxilio posset diueri humorum turgentium furor, & impetus in cor,  
& cerebrum, illis vteremur? & omnia mala faceremus, dummodo æ-  
grotus mortem non obiret. Semper miratus sum, quod dentur Medi-  
ci, itique dogmatici, qui respuunt ea de causa vesicantia, quia calefa-  
ciunt, & quia augent febrem, quod, quamuis sic esset, ostendunt pri-  
ma artis medicæ initia non callere, quia tota ratio medicandi in æqui-  
librio indicatum, & indicatorum consistit: nullum enim medicum au-  
xilium inuenietur, quod non laceret, quod noxam animo, & corpori  
non inferat. Phlebotomia fiangit vires. Cassia ventrem perturbat,  
& cætera omnia auxilia aliquos languores ægrotantibus afferunt: illa  
tamen auxilia eligimus, à quibus maius beneficium, quàm malefi-  
cium colligitur: Cornelius Celsus vir sanè insignis indicantium æqui-  
librium considerans, peroptimè dixit, circumspecti hominis esse, gra-  
tia præcauendi futuram tempestatem, interdum augere morbum, &  
accendere febrem; quia ei, quod magis vrget, est attendendum.

*Secūda Gale-  
ni auctoritas  
pro vesicarijs.*

Secundus locus est 3. simp. 18. vnde colligere possumus, vesicantia  
doctrinæ Galeni maximè coherere, ibi habet hæc verba, omne delecte-  
rium venenum à foris impositis medicamentis euacuatur, nempe aut  
,, caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiæ similitudi-  
,, ne; quare, si ratione caloris venenum à profundis corporis partibus  
foris attrahi possit: quanto magis materia hæc putrida, & turgens at-  
trahetur à vesicantibus, quæ non solum virtute caloris, sed doloris, &  
vacui attractionem moliantur.

*Tertia.*

Tertius locus est 6. epid. sect. 3. tex. 41. vbi docet modòs, quibus mo-  
uentur humores ab vno in alium locum: dicit, loca aliorum locorum  
,, morbos excipiunt, prout succi commutant sedes aut ob dolore par-  
,, tis, aut ob grauitatem humorum, aut aliam causam; aut ob acre me-  
dicamentum irritans, aut frictionem, aut ob calorem extrinsecum: si



ex Galeno succus obrepens caput, vel cor potest virtute acris medicamenti à propria sede dimoueri, erit quoque possibile, vt putridus, & malignus humor à corde, à cerebro, & à cæteris visceribus vesicantium auxilio dimoueat, & inde transponatur ad extremas partes. Stupidi, vel in experti homines mihi videntur, qui hanc possibilitatem negant; etenim non solum vesicantia opportunè administrata possent malignos humores ad infernas partes transponere, & inde præseruare cor, & cætera viscera, ne pereant; verùm accidere potest iterum talis casus (sicuti vidimus) vt æger maligna febre oppressus curetur, quia ab hostis ense vulneretur; si igitur inflicto vulnus ab ense hostili potuit diuertere humores petentes cor, & ægrum ad salutis portum transferre, quanto magis possibile est, vt vesicantia rectè administrata aliquando id efficere possint? Similiter stupidissimi, & imprudentissimi mihi videntur illi, qui in omni febre maligna vtuntur vesicantibus; hancque opinionem reiecimus superius.

Insuper cognoscemus vesicantia summum beneficium aliquando afferre posse, si expendimus causas salutis, & mortis nonnullorum ægotantium Hippocratis; loquens igitur de Larissa Caluo, qui febre maligna erat detentus, dicit in femore dolorem perensisse, quod erat bonum signum, ar dum femur dolere desit, dicit Hippocrates, id euenisse, quia tunc ascenderunt in caput humores, qui eum deinde occiderunt: posita hac Historia, cui dubium, si humores in femore existentes non petissent caput, vel cor, quod Larissa euassisset? dum erant in femore non petissent caput, vel cor, quod Larissa euassisset? dum erant in femore non petissent caput, si potentissimo auxilio reuulsorio, quale est vesicans, fuissent ad femur perpetuo attracti, & per inflicta vlcera euacuati.

*Vsu vesicantis colligitur ex casu Larissæ.*

In Virgine, quæ in vestibulo templi habitabat, id ipsum obseruabatur; quia adueniente dolore pedum, statim cessauit delirium; ex Hippocratis igitur sententia, quia humores ad pedes confluunt, sedari potest delirium; si igitur sit, vel immineat delirium, possibile est, vt sedetur, & præseruetur vesicantium usu; potest enim contingere, vt aliquando natura aliquam habeat inclinationem ad mouendos humores ad postremas partes; attamen non sit tantæ virtutis, vt ex se sola, vel frictionum, balneorum, & cucurbitularum auxilio possit diuertere humores à corde; sed solum id efficiat adiuta à vehementissimo auxilio reuulsorio, quale est vesicans, quod à profundis partibus vnicè humores attrahere potest.

*Ex casu Virginitatis in Deo templi.*

Similiter est æger in Dealeis Horto, qui habuit stillas sanguinis à naribus nigras, cum vrinis nigris: hie liberatur, dicit Hippocrates, quia humores ad pedes confluxerunt: quare, si vesicantia poterunt ad pedes trahere humores, poterunt quoque in maligna febre, dum adsunt vrgentia, in bonorum auxiliorum catalogo collocari.

*Ex agro maritimo in Dealeis Horto.*

Demum est Chrito, qui habuit malignam febrem cum pustulis nigris, huic accidit dolor totius pedis; causa, cur perit, dicit Hip-

*Ex Crisone.*

pocrates, est, quia pes totum humorem capere non poterat, unde retrocessit, petiit caput, delirium effecit, & deinde vitam cum morte mutauit: dicant mihi quæso, si pes totum humorem recepisset, numquid periisset? minimè gentium; quia Hippocrates nullam causam delirij, & mortis reddidit, nisi, quia pes non poterat totum humorem capere: si igitur vesicantium auxilio in simili casu redderetur pes admodum debilis, an ne humores pes caperet, & contineret? quinimò cum per inflatum vlcus euacuari possint humores excrementitij tolletur omnino occasio retrocessus, & mortis.

*Obiectio.  
Sol.*

*Ostenditur  
quod agri a-  
liquando per  
motus sym-  
ptomati-  
cos subleuantur.*

Neque obiciant, quod motus symptomatatici non sint adiuuandi, quia plura sunt exempla apud Hippocratem, quod ab iis motibus ægri aliquando subleuantur. Primum exemplum obseruatur in Historia Metonis, qui habuit in quarta stillas sanguineas, in quinta iussu Hippocratis ei fuit lotum caput; sanguis largè subito effluxit, & deinde eadem die, crudo adhuc existente morbo, fuit liberatus. Secundum exemplum desumitur à Muliere trimestri fœtugrauida, quæ morbo existente crudo per sudorem iudicatur. Tertium exemplum colligitur ab Historia Periclis, qui in quarta per sudorem, & sanguinis fluxum similiter liberatur: quartum exemplum obseruatur in Sileno, qui vixit vsque ad vndecimum diem ob papulas exeuntes. Hic periisset ante duos dies, dicit Galenus, nisi motus symptomaticus papularum securus fuisset; quare quod motus symptomatici aliquando iuuare possint, non est amplius dubitandum.

Interim ex citatis ægrotantibus vesicantium vsus ex principiis artis medicæ colligemus: non tamen admitteremus hanc consequentiam; enarrati ægrotantes febre maligna correpti morbo existente crudo ob humorum transpositionem ad cutim subleuantur, ergo in omnibus maligna febre detenti sunt transponendi, ostensum est superius, hanc consequentiam esse vanissimam: valet tamen hæc, transmissio crudorum humorum a i infernas partes iuuat citatos ægrotantes maligna febre vexatos, ergo possibile est, vt eadem transmissio humorum ab arte excitata aliquos correptos malignis humoribus aliquando iuuet: confirmatur hæc consequentia virtute supremi illius principij metaphysici, scilicet de quolibet est affirmatio, vel negatio vera; nam ex duabus propositionibus contradictoriis quilibet Proterius cogitur affirmare, quod altera sit vera, altera falsa. Hæ duæ sunt contradictoriæ, altera est; omnes maligna febre læsos iuuant abscessus, vlceres, vel dolores pedum facti sponte, vel ab arte excitati gratia transponendi humores a supernis ad infernas partes: altera propositio est, aliquos non iuuat, veluti quando natura mouet per sanguinem è naribus, per aluum, & per alias regiones; hæc postrema propositio, cum sit verissima, altera, quæ est eius contradictoria, erit falsa, quæ est, quod vesicantia omnes maligna febre vexatos iuuet.

*Principio cō-  
tradictionis  
ostenditur,  
vesicantia nō  
iuuare sem-  
per in mali-  
gnis febribus*

*Obiectio.  
Sol.*

Occurrit dubitatio, non videtur, quod ex principiis artis Medicæ colligi possit, quod vesicantibus in febribus malignis vti debeamus; quia



quia Galenus de illis nihil dixit. Respondemus primò, quod fortasse Galenus, si diutius superuixisset, non solum de hoc præsidio pro transponendis virosis humoribus malignarum febrium scripisset; verum multa alia suo ingenio propemodùm diuino reperiisset, nobisq. reliquisset: scimus enim in arte medica ab ipso tradita, quod attractio sit vi caloris, & doloris: scimus, quod vesicantia calorē & dolorem excitant: scimus reuulsionem esse faciendam in cōtrarium, & pedes, quibus affigantur, secundum rectitudinem aduersari humoribus existentibus in venis proximis cordi: scimus nullum esse reuellens, quod vehementius reuellat vesicantibus: & tandem scimus impetum & furorem turgentium magis posse ad indicandum potentissimum reuellens, quale est phænigma, quàm quodlibet prohibens: quibus positis principiis, & fundamentis, coacti aliquando ad vesicantia pro transponendis malignis humoribus ad extremas partes confugimus.

Tempus verò opportunum, quando vesicantibus debeamus uti in maligna febre à variis signis delimitur, primum signum est, si viderimus, naturam habere aliquam propensionem mouendi humores ad partes extremas; & cætera attractoria, ut sunt frictiones, balnea, & ligaturæ, non sufficere in hoc obeundo munere, tunc utemur vesicantibus ut longe à corde transponamus malignos humores.

*Septem signa  
ostendentia  
vesicantium  
vfu.  
Primum.*

Præterea reuellemus hos humores vesicantium auxilio, si quatuor conditiones reuulsionis aderunt, quarum prima est, ut partes, quibus applicantur, secundum rectitudinem aduersentur locis ubi relident maligni humores. Secunda, ut vesicantibus trahi possint humores versus suam originem: tertia, per distantissimas; quarta per vasa communia: verbi gratia, si humores caput obrepant, & immineat periculum, ne humorum impetus omninò opprimat capitis vires, vesicantia partibus infernis adiunguntur.

*Secundum.*

Tertium, si humores à natura incipiunt propelli ad femora, ut in Laissa; vel ad pedem, ut in Chritone; in virgine vestibuli Templi; & in ægro, qui habitabat in Dealeis Horto, tunc autò maxima cum salutis spe pedibus adiungere poteris vesicantia.

*Tertium.*

Quartum, si dum turgent humores partes extremæ vlcusculis, pustulis, & similibus vexari incipiant, instetque ob morbi vehementiam aliquod læuum symptoma, statim illis partibus vesicantia erunt adiungenda.

*Quartum.*

Quintum, si coxis grauitas, vel tensio superuenit, signum est, quod natura conatur ad illas partes propellere: ideo est vesicantis, si virget affectus, utendum.

*Quintum.*

Sextum, si in febre maligna suspicio est de imminente læthargo illico, ut futuram tempestatem præueniamus, coxis, & brachijs phænigmata sunt adiungenda.

*Sextum.*

Postremum, si adeo trucis, & scelestæ est febris maligna, ut ferè de salute actum sit, tunc, si adhuc turgent humores, & non vergant per

*Septimum.*

alias regiones, ad vesicantia confugimus, vt Galeni præceptum ob-  
seruemus 10.method.10.vbi dicit, latius est nonnulla cum fiducia, &  
periculo aliquid facere, quam spe adempta certo perire; tanto pro-  
fectò latius est potentibus præidiis pagnare, quàm nihil agere. Ex  
iis cognoscemus, quando vesicantia debeant opportunè administra-  
ri, inde euitabimus eorum vsum superfluum, diminutum, & transcen-  
dentem.

Finis Decimitertij Libri.



SANCTORII  
SANCTORII  
Iustinopolitani

METHODI VITANDORVM  
errorum in natura Reuulsionis, & deri-  
uationis perquirenda.

LIBER DECIMVSQVARTVS.

---

*Ostenditur, quam varia sint opiniones auctorum in iis, que  
pertinent ad reuulsionem.*

CAPVT L

Quatuor cō-  
ditiones re-  
uulsionis.



ACTVR in præsentia de reuulsione, statim in medium  
eius proprietates, & conditiones afferemus, quia illis  
rectè perceptis cognoscemus, quando, & quomodo  
sit reuellendum. Quatuor conditiones reuulsionis  
vagantur per scholas, earque colliguntur à Galeno 13.  
methodi cap.11.& aliis in locis, quarum prima est, vt  
fiat secundum rectitudinem. Secunda, per distantissima: tertia,  
quam Curtius magnificat, trahantur humor s versus originem: quar-  
ta, per



ta, per vasa communia. Verum, quid intelligendum sit per reſtitutionem, quid per diſtantiſſima, & numquid illa conditio, quod trahantur humores verſus originem per ſe, & ſemper conueniat reuulſioni, & demum quid ſit per vasa communia intelligendum, tam variæ ſunt opinioniones, vt vix duo Auctores celebres inueniantur, qui in tota hac contemplatione ſint concordēs.

Per celebres Auctores, qui de hac re plenius egerunt, & qui inter ſe valdè diſentiunt ſunt Curtius, Manardus, Fernelius, Fuſcius, Achachias, Petrus Briſorus, Altimarus, Argenterius, Laurentius Ioubertus, & Horatius Augenius. Curtius vbi agit de pleuritide, & Petrus Briſorus in libro apologetico de pleuritide cum Fernelio vnanimēs tenent, Opinio Curtij & Briſorii, quod intelligi debeat per reſtitutionem.

quod per reſtitutionem debeat intelligi ea, quæ ſurſum, & deorſum eſt: negant enim quod ſeruetur reſtitutio à parte anteriori ad poſtერიоrеm, & ab interna ad externam. Fernelius verò apertius aliis defendit, Fernelij.

quod inter dextrum & ſiniſtrum non ſit illa reſtitutio, ſecundum quam fieri debet reuulſio, reddensque rationem dicit, quia fibræ rectæ, quarum beneficio (vt omnes c edunt) ſiunt humorum attractiones, non ſunt in latum, vel in profundum exporrectæ, ſed in longum; hocque eſt præcipuum fundamentum Fernelij, quo ſuffultus defendit veram reuulſionem fieri à ſuperna ad infernam partem, & non à dextra ad ſiniſtram, vel ab interna ad externam. Ex altera eſt Altimarus, qui omninò negat, reuulſionem fieri ſecundum reſtitutionem fibrarum; quia, dum poſt venam pertuſam ſit ſanguinis reuulſio, nō à fibris rectis expellitur; ſed tantum virtute vacui egreditur. Similiter Argenterius primò reiſcit Ferneliū, & negat ſanguinem euacuari poſt ſectam venam à rectis fibris; deinde opinionem, quam ſuſtinet Altimarus, quod ſcilicet virtute vacui ſanguis egrediatur, reprehendit, & demum propriam opinionem affert, quæ eſt, quod ſanguis à ſecta vena egrediatur, quia expulſrix irritatur à dolore vulneris, & à vinculis. Altimarij. Argenterij.

Ad eundè modum omnes diſſident, dū interpretantur, quid intelligat Galenus, dum dicit per diſtantiſſima eſſe faciendam reuulſionem. Opinio Curtij Fuſcij Achachias & Manardi quid per diſtantiſſima. Curtius, Fuſcius, Achachias, & Manardus dicunt, dum præſeruamus, reuulſionem eſſe faciendam per diſtantiſſima, dum curamus per propinqua: Laurentius Ioubertus dicit per propinqua, & nunquam per diſtantiſſima eſſe faciendam reuulſionem. Briſorus verò dicit, in principio eſſe reuellendum per proxima, in ſine per remota; vt hæc materia ſit difficultatibus plena. Laurentij Iouberti. Briſori.

Porò ſi tertiam conditionem reuulſionis expendamus, an ſcilicet verſus originem ſit ſemper reuellendus humor, quot ſunt capita, tot ſunt opinioniones. Curtius hanc conditionem defendit: plures tamen ſunt, qui tenent, quod nullomodo ſint reuellendi humores verſus originem & præcipuè, quando pars, à qua humores originem trahunt, eſt inflammatione obſeſſa, vel eſt debilis & infirma; nunquam enim conuenit, vt ad partes læſas tranſponantur humores. An in reuulſione trahantur humores verſus originem.

Poſtrema conditio, quid videlicet ſit intelligendum per vasa com-

munia, patitur quoque plurimas instantias; aliqui enim dicunt, reuulsionem fieri solum per vasa sensibilia: alij per vias quoque insensibiles, dicunt, totum corpus esse transpirabile: nihil igitur de reuulsione hactenus propositum est, quod non sit expolium, atque reiectum.

*Difficultates  
pertinentes  
ad deriuatio-  
nem.*

Simili modo de deriuatione altercantur, an scilicet fiat in eodem latere, an solum per proxima, & an humoribus solum confluentibus æquè, ac fluentibus comperat. Quæ, vt methodo aliqua tradam us de natura, & conditionibus reuulsionis præcipuè agemus; quia illis cognitis, faciliè omnia, quæ de deriuatione quærentur, aperta & prænitentia erunt.

---

*Reijcitur quadam definitio reuulsionis, & ostenditur, quod  
reuulsio non sit attractio.*

---

## C A P V T II.

**A**LIA non est via, quæ melius affectiones, & proprietates rerum explicet, quàm definitio. Aristoteles 1. de anima in principio dicit, quod animæ definitione præcognita, ceteræ affectiones faciliè cognoscantur. 1. de moribus cap. 7. in omni re esse auspicandum à definitione: & aliis in locis Aristoteles, & Plato testatum reliquerunt, quod definitio sit principium cognitionis proprietatum, & affectionum, quas quærimus. Nos quoque imitatione Aristotelis conabimur prius definitionem reuulsionis perquirere, vt inde faciliè innotescant reuulsionis attributa.

*Reijcitur de-  
finitio reuul-  
sionis, qua  
nunc in scholu  
recipitur.*

Valdè conuenit, vt prius definitionem ab aliis traditam examine-  
mus; quia si ex illa perceperimus eius naturam, & proprietates, aliam  
non quæremus: hæc per scholas hodierno die vagatur, & à plurimis  
recipitur: reuulsio est attractio humorum confluentium, vel conflu-  
xorum in partem omninò contrariam. Quod hæc sit imperfectissi-  
ma definitio primò patet, quia, cum sit accidentis definitio, deberet  
esse illa, quæ solo situ à demonstratione differt: at sic est, quod hæc  
non est talis, ergo est imperfecta, & recipi non debet: patet maior,  
quia omnes accidentium definitiones sine causa externa sunt nomi-  
nales, & cum principiipetitione; petimus enim, dum eclipsim defini-  
mus, quod sit priuatio luminis in luna, petitionemque aufugimus,  
dum addimus causam externam, quod scilicet lumine priuetur ob  
terræ interpositionem. Hinc Auerroës causam extrinsecam, quæ  
trahit propter quid insint accidentia subiectis, vocat differentiam vl-  
timam respectu accidentium; patet quoque, quia dum dicunt, esse  
attractionem in oppositas partes afferunt genus: dum verò addunt  
confluentium, & confluxorum afferunt subiectum; caret igitur cau-  
sa inhærentiæ, qua non expressa, nihil de reuulsione sciri potest; erit  
igitur hæc definitio non illa, quæ solo situ differt à demonstratione,  
nec quæ est principium demonstrationis, cum non exprimat causam,  
sed,



sed, quæ est conclusio, quippe est aliis ineptior ad docendum.

Præterea, dum dicunt, quod reuulsio sit attractio, errare videntur; *Ostenditur reuulsionem non esse attractionem.* quia attractio neque est genus proximum, neque remotum reuulsionis; patet, quia reuulsio modò sit attrahendo, modò expellendo: quod fiat expellendo, nos docet Galenus decimo tertio methodi cap. 3. vbi habet, causas fluxionum esse partem mittentem, & partem recipientem; humor enim non fluit à se, & proprio impetu, alias omnis fluxio ad inferiora fieret, sed vel à parte mittente propellitur, vel à recipiente trahitur; pellitur à mittente tùm, quia robusta, tùm quia irritata; quare, si fiet reuulsio, quia pars mittens medicamento irriteretur, tunc quomodo reuulsio dici poterit attractio? Similiter, dum laxantibus reddimus partem debilem, tunc quis dicet, quod pars laxa, & semiuiua attrahat, cum in illam, vt in cloacam expellantur excrementa? erit igitur hæc reuulsio ab expultrice, & non attractrice facta.

Amplius reuulsio, quæ fit per contrarium, non debet dici attractio, quia cauteria non recipiunt excrementa, quia attrahant, sed recipiunt quæ sunt expulsa ab aliis partibus. Nemo defendere poterit, quod reuulsio, quæ fit ratione vacui sit attractio: stupidi hominis esset credere, quod vacuum, quod reuera nihil est, habeat proprietates positivas. Omnis enim causa attrahens debet esse causa efficiens actu positina, & non priuatiua: dum igitur videmus, quod multa ratione vacui magno cum impetu mouentur, id accidit, quia in locum, vbi nulla est resistentia, omnia facillimè, & celerrimè expelluntur. Cauteria, sinus, caro fungosa, glandulæ, & partes imbecilles naturali virtute ferè destitutæ non attrahunt, vel expellunt; sed solum aliarum partium excrementa expulsa sine vlla resistentia recipiunt. Hinc, dum volumus humores petentes caput reuellere, possumus non solum attrahentibus medicinis id efficere: verum etiam iis, quæ laxant ventriculum, & intestina: sicuti est oleum amygdalinum dulce: quia hæc partes laxatæ, deinde recipiunt sine resistentia excrementa ab aliis partibus expulsa; quis hanc reuulsionem laxantibus factam vocabit attractionem? Præterea, si ventriculi excrementa caput petant, an-ne reuelli possunt medicamento aloes, quippe solum irritando expultricem facultatem ventris expellit? nemo negabit, quod hæc reuulsio non sit expulsio: ex altera parte obseruantur tum reuulsionem, quæ solum à virtute attrahente excitantur, sicuti sunt, quæ per hirudines fiunt, tùm quæ à virtute expellente, sicuti quæ fiunt per cathartica, quæ attrahunt electiuè, & irritant expultrices ad propellendos proportionatos succos, & quæ per vesicantia, frictiones, quæ similiter attrahendo, & partem debilem reddendo retrahunt, quare nullo modo reuulsionis generis sit attractio, cum reuulsio modo fiat attrahendo, modo expellendo, & demum attrahendo, & expellendo; melius igitur est, vt cum Galeno lib. de arte Medicinali cap. 99. & 5. methodi 3. dicamus quod auersio sit genus reuulsionis & deriuationis, quia reuulsionem ibi vocat antispasum, id est auersionem in contrarium, deriuationem vero Paroche-

*Cum vacuum & laxantia medicamenta non attrahant.*

*Quod genus reuulsionis sit auersio.*

teusim, id est auersionem ad proxima: concludi igitur potest, quod genus reuulsionis sit auersio, & non attractio.

*Ostenditur, quod reuulsio non solum conuenire possit humoribus fluentibus, verum etiam fluxis, & fluxuris.*

### C A P. I I I.

**C**OGNITO, quod reuulsio sit humorum auersio in contrarium, sequitur, ut inquiramus, an hæc auersio solum conueniat humoribus fluentibus: omnes ferè dicunt, reuulsionem indicari à materia, quæ est in motu, à fluxu verò, & à fluxura non indicari, quia utraque quiescit, quæ sententia non potest esse absolutè vera; quia fluxus, & fluxuri humores, quamuis actu non moueantur, dummodo apti sint, ut aliquo ingenio possint ab vno ad alium locum moueri, defendemus non esse impossibile, quod auersio in contrarium illis quoque conuenire possit.

*Vera ratio  
est fluxis &  
fluxuris possit  
conuenire re-  
uulsio.*

Insuper oportet ut reuulsio desumatur ab indicante, quod primò & per se indicet reuulsionem: at non fluere in contrarium, sed posse fluere est, quod indicat primò, & per se reuulsionem; ergo non solum fluentibus humoribus sed omnibus, qui sunt fluxus, & fluxuri, dummodo apti sint, ut possint cum ægotantium beneficio in contrarium moueri, reuulsio conueniet: etenim scientifici quærent quod possibile est, & quod est æternum, & non quod solum actu est: sic non dicimus, quod risus sit hominis proprietas, sed risibilitas; ridere enim est accidens, & in nullo modo dicendi per se de homine dicitur. His moti principiis dicimus, quod reuulsio per se non indicetur ab humoribus quatenus actu fluunt, sed quatenus possunt fluere, possuntque aliquo ingenio auerti in contrarium, & tales non solum sunt fluentes, sed aliquando possunt esse fluxuri, & fluxus: similiter Galenus lib. de morb. diff. cap. i. dicit, non ab actione, sed à potentia esse definiendam sanitatem; dormiens non videt, attamen non dicitur cæcus; quia licet actum videndi non habeat, dummodo potentiam habeat, videns dicitur; à potentiis igitur definitionem reuulsionis haurientes dicemus, esse auersionem, quæ conueniat humoribus, qui possunt retrahi in contrarium, & tales non solum esse fluentes, verum etiam esse posse fluxos, & fluxuros.

*Quod fluxuri  
possint re-  
uelli*

Præterea, quod reuulsio indicetur quoque ab humoribus quiescentibus, qui sunt fluxuri, & non solum actu fluentibus, colligitur ex Galeno 2. in 6. epid. text. 9. ubi dicit, quod reuulsio debet fieri in principiis morborum, ut plurimum quiescunt, ergo à quiescentibus, & fluxuris indicabitur reuulsio. Hinc Galenus 13. methodi 11. dicit, se sanasse inflammationem oculorum vnica die facta purgatione, & reuulsione humorum existentium in ventriculo, qui partim fluebant, & partim erant fluxuri: hæc sunt Galeni verba, vidisti vnica die sa-



natos purgatione per aluum, qui oculi phlegmone tentabantur? Insuper quis negaret, quod dum fiunt reuulsiones prima morbi die, non auertantur in contrarium humores non solum fluentes, verum etiam aliqui, qui in aduersum erant fluxuri?

Modo, cum probatum sit, humores confluxuros aliquando posse reuelli, sequitur, vt confirmemus ratione, & auctoritate, quod etiam fluxi possint aliquando in contrarium auerti: ratione, quia cum omnes humores fluxi possint deriuari, poterunt quoque moueri, si poterunt loco moueri. non erit impossibile, quod à facultatibus naturalibus, vel à medicamentis possint aliquando in contrarium auerti: auctoritate, quia Hippocrates 2. de ratione victus text. 10. loquens de pleuritide dicit, sanguinem esse euacuandum, donec liuidus exeat; quare, si tanta copia sanguinis fuerit euacuanda, donec liuidus apparuerit, euacuabimus humorem confluxum; liuidus enim est confluxus, & sic reuulsio conuenire poterit quoque fluxis humoribus. Videntes Curtius, & Manardus hunc locum interpretantur Hippocratem, quod per reuellere intelligat deriuare; quæ expositio non potest esse deterior: sic omnes dubitationes facile tolli possent, mutando scilicet, addendo, vel subtrahendo verba. Ad hæc Galenus 4. de ratione victus in acut. text. 30. habet hæc verba, medicamenta circumposita ceruici in angina reuellent humorem, qui in partem anteriorem fluxit: si fluxos medicamenta reuellent, ergo reuulsio conuenire poterit confluxis.

*Quod fluxi possint reuelli.*

*Vt male Curtius, & Manardus interpretantur Hippocratem.*

Porrò Galenus 12. methodi capite 11. & passim dicit, in iecore inflammato esse reuellendus sanguis secta cubiti vena, quæ societatem habet cum caua; quid verat, tunc expultrices hepatis post sanguinis missionem posse confluxum sanguinem expellere à capillaribus parenchymæ ad venam cauam, vel ad portam?

Insuper in capite erit catarrhus falsus, tunc Galenus 5. methodi capite 14. docet, esse supra commissuram coronalem applicandum ceratum ex thapsia reuulsione gratia: quis diceret, humorem illum non esse collocandum in numero illorum, qui dicuntur confluxi, vel confluxuri?

Amplius, an ne materia confluxa ad orificium ventriculi, quæ excitare solet angorem, vel alterius generis affectum, tolli potest medicamento reuulente, & auertere per aluum? vel acri enemate? quare non solum materia, quæ est in motu, verum etiam, quæ est confluxa, reuelli poterit.

Ad hæc, si possint reuelli humores impetum habentes in contrariam partem, quando magis poterunt confluxi quiescentes, qui tantum impetum non habent in læsas partes?

Postremò adest argumentum efficacissimum, quod reuulsio competere quoque possit fluxis humoribus, supposito nempe hoc principio in philosophia altioribus principiis probato, quod inter duos motus oppositos mediet quies, quoniam, qui dicunt, reuulsionem solum desumi ab humoribus actu fluentibus, coguntur quoque at-

*Argumentum efficacissimum quod etiam fluxis conueniat reuulsio.*

firmare à quiescentibus summi reuulsionem. Exempli causa, humores potentes partes supernas non possunt ad infernas reuulsoriis auxiliis trahi, nisi prius quiescant, quoniam inter motiones oppositas mediat quies, quare, qui negant reuulsionem cōuenire humoribus quiescentibus, negabunt quoque reuulsionem conuenire humoribus existentibus in motu, quia ij non possunt in contrarium auerti, nisi prius aliquantulum quiescant: melius itaque est, vt dicamus, quod reuulsio indicetur ab humoribus, qui possunt moueri in contrariam partem, quàm quod indicetur solum ab iis, qui actu mouentur: sic enim logicis in principiis, Aristoteli, rationi, & experientiæ melius consentiemus.

*Dub.*

*Sol.*

Occurrit dubitatio, quia Galenus 2. ad Glauc. capite 2. 4. methodi cap. 6. & sexcentis in locis habet, deriuationem, & non reuulsionem esse humoris in aliquam partem confluxi. Respondemus nullo modo negari posse, quod deriuatio præcipue sit confluxorum humorum, sed dicimus non esse impossibile, quod humores confluxi possint quoque per reuulsionem aliquando in contrarium auerti. Hæc sententia confirmatur auctoritate Galeni, & experientis; 4. enim methodi cap. 6. dicit, quod, si in aliqua particula confluxus, & quiescens humor steterit, melius sit tunc deriuare, quam reuellere; hæc sunt verba: at si iam fluxio resistit, atque in membro inhæsit, deriuare per vicina magis expedit: dicit (magis) non negando quin possit accidere, vt aliquando fluxi humores non possint quoque opportunè reuelli, particula (magis) id clarissimè docet; quoniam omnium comparatiuorum proprium est, vt positiuis participant: valet hæc, magis confert vt fluxi humores per deriuationem tollantur, quam per reuulsionem, ergo non est impossibile, vt per reuulsionem aliquando tolli possint.

*Ostenditur  
experientia  
quod fluxi  
possint quoque  
reuelli.*

Quod attinet ad experimenta, adest primum illud à Galeno propositum methodi 14. dum cerato ex thapsia appposito commissuræ coronali reuellit piritam salis in cerebro quiescentem, & in pettus confluxuram: similiter 3. de locis affect. cap. 7. refert, quod puer, qui patiebatur comitalem ob auram frigidam à tibia ortam sit liberatus medicamine ex thapsia, aut sinapi tibiæ applicato: refertque Galenus eodem capite quamplurima experimenta, quæ clarissimè docent, posse applicari partibus corporis, si in illis adsint venenatæ qualitates, potentissima reuulsoria, quæ humores seu venenatos spiritus confluxuros ad cor, seu cerebrum retrahant in contrarium. Nos igitur non arbitrabimur, differentiam constitutiuam deriuationis esse, vt confluxi humores tollantur, reuulsionis verò vt fluentes, quia deriuationis re vera est, vt sequatur inclinationem, & motum humoris euacuandi, reuulsionis verò renitentiam; sed quod fluentes & aliquando confluxi, & confluxuri possint reuelli.

*Qua*



*Qua sit causa efficiens reuulsionis.*

C A P. I V.

**H**ACTENVS patet quod reuulsio sit auersio in contrarium, & quod non solum fluentibus, verum etiam fluxis, & fluxu-  
 ris humoribus conuenire possit: restat, vt de causa efficiente reuulsio-  
 nis dicamus: causa vna esse non potest, & hac ratione reuulsio est  
 quid æquiuocum; alia enim est natura reuulsionis factæ vi vacui,  
 alia per sectam venam, & alia virtute hirudinum. Similiter Aristo-  
 teles dicit, causas efficientes adæquatas sæpissimè esse innominatas,  
 effectusque esse æquiuocos. Secundo posteriorum de iis causis lo-  
 quens dicit, non inueniri vnicam longæuitatis causam, longæuita-  
 temque esse quid æquiuocum, quia in animalibus gressibilibus di-  
 cit, causam longæuitatis esse carentiam bilis, in auibus verò, in  
 quibus est copiosissima, non esse bilem, sed siccitatem carnis; qui  
 igitur causam longæuitatis communiter sumptam velleret afferre, alio  
 modo dicere non posset, nisi, quod esset causata vel ob bilis caren-  
 tiam, vel ob carnem siccam, seu recrementis purgatam. Hac ratione  
 nos quoque dicimus, reuulsionis causam vnā non esse, sed modò  
 promotam ab expultrice, modo attractrice, & modo ab vtraque si-  
 mul, qui modi auertendi inter se distant natura, & definitione. Quod  
 verò humores in viuētibz moueantur, vel quia transmittantur, vel  
 attrahantur, est Galeni 3. de sympt. causis cap. 2. & 13. methodi cap. 3.  
 Reuulsio facta per cauterium, per sectam venam non est per attra-  
 ctionem, sed per transmissionem: natura enim ad locum vacuum, vbi  
 nulla est resistentia, faciliè transmittit excrementa: similiter reuulsio  
 facta per hirudines, balnea, & cucurbitulas est alterius generis: re-  
 uulsionis igitur causæ erunt vel facultates expellentes copia, vel  
 qualitate grauata, vel attrahentes externæ, quomodo autem dolor,  
 & calor attrahant lib. 10. declarauimus, vbi retulimus rationes ob  
 quas humores redundantes, vel mala qualitate affecti confluunt in  
 partem dolore, vel calore affectam, itaque colligere hæcenus pos-  
 sumus, hanc reuulsionis definitionem: reuulsio est illorum humo-  
 rum, qui possunt in contrarium auerti, à facultatibus expellentibus,  
 siue attrahentibus.

*Cur causa  
efficientesim-  
mediatè sapè  
ignorantur.*

*Definitio re-  
uulsionis  
qua.*

*Quomodo sanguis à secta vena egrediatur.*

C A P. V.

**V**ERVM quia sæpissimè sanguis mittitur reuulsionis gratia, par-  
 est, vt in exemplum ponamus celebrem hanc quæstionem:  
 quomodo sanguis à secta vena fluat: variè de hac re distrahuntur

*Opinio Fer-* Auctores: Fernelius asserit sanguinem egredi à seâta vena per vim  
*nely & Petri* fibrarum reâtarum, quæ in venis sunt protensæ; dicit harum esse offi-  
*Brisoti.* cium attrahendi sanguinem per partem post partem, donec ex vena  
 seâta exeat.

Fernelij sententiam secutus est Petrus Brisotus Parisiensis; dicit, hac de causâ veram reuulsionem fieri solum secundum reâtitudinem, quæ est sursum, & deorsum quia fibræ reâte solum secundum hanc longitudinem sunt extensæ, negatque propterea, quod dici possit reuulsiõ, quæ humores auertit à parte dextra ad sinistram, ab anteriori ad posteriorem, & ab interna ad externam, quasi quod reâtitudo, quâ Galenus dicit, esse seruandam in reuulsiõne, solum possit esse in longitudine, & non in latitudine, vel profunditate.

Reiicitur Brisoti & Fernelij sententia tum per instantiam, tum per fiduciariam reprobationem, per instantiam, quia negamus, fibras reâtas esse solum extensas per longitudinem sursum, & deorsum; plurimæ sunt venæ, quæ in dextram, & sinistram partem propagantur, & quæ fibris reâtis similiter sunt contextæ, ergo falsum est, quod fibræ reâte solum per longitudinem sursum, & deorsum extensæ sint. Porta vena spleni, qui est in sinistra parte, surculos porrigit, & Hepatis concavum circumuestit, quod est in dextra. Per fiduciariam reprobationem, quia quamuis fibræ reâte essent solum in longitudinem extensæ, quid tum? mouebitur ne sanguis à seâta vena velocissimo cursu ob vim reâtarum fibrarum? nullo modo; quoniam motus à fibris dependens est naturalis, & tardissimus, est enim motus per partem post partem, quatenus imbibitæ, & repletæ expriment roris in modum tenues succos, quod tardissimè fit.

*Opinio Ar-* Argenterius in commentariis artis Medicinalis quæstione propria  
*generij rej-* arbitratur, sanguinem à seâta vena defluere propter expulsio-  
*ciunt.* nem à dolore sectionis venarum, & à vinculis: hæc sententia non videtur rationi consona, quoniam egreditur aliquando sanguis nullo percepto dolore, & nullis vinculis administratis, sæpè enim vidimus homines lauciatos, qui non ex dolore, sed ex sanguinis visione se lauciatos cognouerunt, ecce quod sanguis sine dolore, & sine vinculis egreditur, quare alia erit causâ inquirenda.

*Opinio Ali-*  
*marj rejci-*  
*unt.*

Altimarus putat, sanguinem egredi ob vim vacui, dicit, pauca prius sanguinis portione egressâ aliam necessariò subire, ne locus vacuus in natura relinquatur: quæ sententia sustineri non potest; quia in vena caua, vnde sanguis versus sectionem mouetur, idem sequeretur inconueniens, scilicet ibi quoque locum relinqui vacuum; quin immò retorquere quis posset argumentum, quod scilicet sanguis, ne daretur vacuum in centro caua venæ, non posset egredi; in dolis occlusis, quamuis fiat foramen, nihil exit, nisi aër per aliud ingreditur. Verum neque Altimarus, neque qui retorqueret argumentum apposuere loqueretur; quia venæ minores, & maiores in sanguinis egressu subito confidunt, & nullum sequitur vacuum; prorsus itaque falsa est Altimari inuentio.

Recen-



Recentiores dicunt, sanguinem sponte egredi, quatenus grauis: quæ opinio cæteris fermè deterior mihi videtur; quoniam sequere-  
tur, quod in homine stante ab eius secto, & vulnerato pericraneo *Opinio recentiorum reijci-  
tur.* nulla posset fieri sanguinis euacuatio: sanguis non existit in venis eo modo, quo aqua in vase, in quibus nunquam effunditur per super-  
num orificium, quamuis sit reclusum; reclusis venis pericranei in ho-  
mine stante, sanguis extemplò egreditur, ergo non ut grauis: est Gale-  
ni sententia vbiq; locorum aperta, & prænitens, humores in viuen-  
tibus non fluere proprio imperu, quia omnis fluxio ad inferiora fieret,  
sed à parte mittente propelli, vel à recipiente attrahi.

Nos verò non absolute negamus, quod in sanguinis egressu ratio *Opinio pro-  
pria.* grauitatis, vis vacui, & fibræ rectæ non efficiant aliquid: sed negamus,  
quod hæ causæ sint præcipuæ, & adæquatæ. Dicimus primò, quod  
aër, & spiritus vitalis toto corpore inclusus, & perpetuò à corde in  
omnes partes infusus, inflet, & distendat cum violentia vasa, quæ si  
ferro, vel alio modo aperiantur, sanguis illicò foris cum impetu ex-  
primatur. Secundò dicimus, quod ob continuum motum arteriarum,  
quæ re vera subiectæ sunt vniuersis venis, eadem venæ compriman-  
tur, quibus compressis sanguis promptè foris exprimitur; quantò  
magis igitur arteriæ imbutæ erunt vitali spiritu, tanto magis erunt  
venæ compressæ, & inde promptius exprimetur sanguis ad vulnera-  
tam partem.

Hæc opinio pluribus experimentis confirmari potest: primum est, *Primum  
experimentum idem  
confirmans.* dum ob lypopsichiam, vel sincopem sanguinis effusio in secto cubi-  
to cessat; cessat, quia spiritus vitalis ita dissipatur, ut amplius non in-  
flet, vel distendat vasa, & per consequens non exprimat sanguinem  
extra venas. Secundum experimentum habetur in doliis musto re-  
fertis, quibus fumus & spiritus vitalis vini inclusus adeò abundat, ac  
feruet, ut per superna orificia mustum aliquando cogatur magno cum  
impetu exilire. Tertium experimentum hoc pacto potest observari; *Tertium;*  
recipiatur vas, quod vnicum, idque supernum habeat foramen, in  
quo sit tubus, qui ad imum ferè descendat; deinde per eundem tu-  
bum vas ferè totum aqua impleatur, tandem aër folli maxima cum  
violentia per eundem tubum immittatur, immissus enim cum petat  
partem supernam, & amplius (cum ab aqua impediatur) non possit  
exire, comprimit adeò aquam, ut si adaperiatur orificium, tota, licèt  
grauis sit, magno cum impetu dissulter: sic sanguis refertus spiritu vi-  
tali comprimente, & distendente venas, à qualibet superna parte vi-  
uentis corporis incisa, ut compressus, & expulsus egredietur.

*Ostenditur, quod euacuatio per distantissima non sit conditio reuulsionis propria, & per se, sed per accidens.*

## CAPVT VI.

**Q**UAMVIS sapissimè dicat Galenus reuulsionem esse faciendam per distantissima, videndum est, an hæc conditio conueniat per se, vel per accidens: præcipuum enim philosophandi munus est decidere, an attributa per se, vel per accidens rebus conueniant: si reuulsioni conueniet per se, vt per distantissima fiat, erit quoque semper, & in omni casu sic reuellendum; si verò per accidens, vt nos credimus, non erit necessarium, vt semper auertantur humores per distantissima, si enim ostenderimus auctoritate, vel ratione potissima, quod semel fieri possit reuulsio per proxima, conditio per distantissima non erit de natura reuulsionis.

*Primum fundamentum, quod distantissima non sit conditio per se reuulsionis.*

Pro huius rei decisione confugimus ad Galenum 2. de ratione vict. com. 10. vbi habet hæc verba: si in pleuritide extendatur dolor ad iugulum, vena in cubito secanda est, quæ sanguinem ab affecta parte, & magis velocius reuellere, & euacuare possit: nulla alia de causa Galenus vult reuellere per cubitum affectæ partis; nisi, vt velocius reuellat, ergo de ratione reuulsionis erit, vt citò, & non tardè fiat; ergo per proxima, & non per distantissima erit reuellendum: quæ verò de causa per distantissima vt plurimum reuulsio fiat, inferius declarabitur.

*Secundū fundamentum.*

Insuper 5. methodi capite 14. docet, commissuræ coronali ceratum ex thaplia esse applicandum, vt fiat reuulsio ab intima cerebri parte ad pericraneum, ne pituita salsa in pectus descendat: hæc reuulsio est per propinquissima, hæcque non potest vilo modo dici deriuatio; quoniam natura mouens in pectus catarrhum sua natura grauem dici non potest, quod sit prona ad mouendos humores ad pericraneum: Neque cum alijs dicere possumus, quod hæc reuulsio sit per distantissima ratione pectoris, quatenus scilicet curamus, vt pectus præseruetur; quia hæc est mera fuga; quoniam catarrhus, qui ad pericraneum reuellitur, nō à pectore originem trahit, sed ab internis cerebri partibus, estq. vera reuulsio; quia pituita salsa dilabens deorsum in pectus trahitur sinapismi virtute sursum, scilicet in locum contrarium, ergo per proxima reuellitur.

*Tertium fundamentum.*

Similiter digitus, à quo oritur aura frigida, quæ ex Galeno 3. de locis aff. 7. epilepsiam facit, exurit, & sinapismis tractatur, vt aura petens partes supernas regeratur in contrarium, scilicet ad infernas, vel foris expellatur; sicut enim deriuatio trahit humores, quæ sunt proni, atque propensi, sic reuulsio per contrariam semitam, quò non sunt inclinati, auertit.

*Quartū fundamentum.*

Amplius legamus Galenum & Hippocratem, & non mutantur (vt nonnulli faciunt) verba, 2. in 6. epid. tex. & com. 31. quia clarissimè apparet,



parebit, quod dentur reuulsiones per proxima: hæc sunt Hippoc. verba, in oculorum fluxu in fauces reuellere oportet: Galenus vero in com. habet hæc; hoc vnum est remediorum reuellentium genus, vt diuturnas oculorum fluxiones ad fauces reuellamus acerbis medicamentis; patet ergo quod apud Galenum, & Hippocratem aliquando reuulsio non fiat per distantissima: quare, si semper non fiet, nec per se, nec de omni conueniet reuulsioni vt per distantissima fiat.

Ad hæc, si materia sit in ventriculo, eaque obrepat orificium, & morbum insignem mineretur, an-ne statim auerti potest in contrarium medicamento deorsum trahente? ergo reuulsio aliquando fiet per proxima: omnes conueniunt, deriuationem per se insequi humorum inclinationem, & reuulsionum renitentiam. Similiter clysteres acres auertunt in contrarium humores habentes raptum ad supernas partes, quæ auersio est per proxima, & dicitur reuulsio. Iridem, si à capite retrahere velimus humores, eosque per cauterium euacuare, cauterium fiet in brachio: si per distantissima auertere esset proprietas insequens naturam reuulsionis, fieret in pedibus. Hinc Galenus 5. method. 6. & plerisque alijs locis docet, in fluxu sanguinis è naribus esse secandam venam cubiti directè respondentem, vel esse affigendam magnam cucurbitulam pæcordiis: si per distantissima fieret reuulsio, proposuisset sectionem venæ tali. Neque respondeant, id fieri ob antiquam corporis diuisionem inter iecur & renes, vt scilicet intelligatur per distantissima in vnica parte, sicuti iis verbis admonet Galen. 6. epid. parte prima com. 6. membra supra iecur venæ cubiti sectione indigere, infra verò crurum, in poplitibus venam secamus, vel venam iuxta maleolos; quoniam retorquere possumus argumentum, quod scilicet hæc corporis diuisio ob nullam aliam causam fuerit à Priscis proposita, nisi vt euacuationes, & reuulsiones per magis proxima, & non per distantissima fierent; etenim, si reuulsio per distantissima melior esset, diuisio corporis esset vanissima: & tanto magis, quanto inter partes quoque distantissimas, & remotissimas maximus seruatur consensus per venam cauam, & per alia quoque vasa, quæ supernis, & infernis partibus maximè respondent.

Causa verò, cur sæpissimè reuulsiones fieri debeant per distantissima, est prohibens, & non illud quod indicat reuellens: prohibens est redundantia excrementorum, qui ad locum affectum faciliè confluerent; quinimò, dum est læsa aliqua corporis pars, quæ aliorum recrementa faciliè suscipere potest, tunc reuulsio adeò per distantissima fieri debet, vt antiqua illa corporis diuisio nullomodo ab ipso Galeno obseruari possit; exempla sunt plura, 2. ad Glauconem 2. habet, si morbus est in genu sanguinem ex brachio mitte: dicitque in eodem cap. te retrahes à locis muliebribus, si eas, quæ in cubito sunt secueris venas, aut iuxta mammæ cucurbitulas apposueris: ecce, quod genus, & vterus sunt sub renibus, & reuulsio fit in parte superiori, in cubito scilicet.

Ratio, cur reuulsiones vt plurimum fieri debeant in eadem corpo-

ris partitione, & per proxima, nisi aliquid prohibeat, est, quia omnis curatio, & medicatio debet velocissimè fieri, vt ægroti quam citissimè ad sanitatem transferantur: quælibet medicorum secta amplectitur Asclepiadis consilium, quod scilicet citò, tutò, & iocundè sit medicandum, hi enim tres fines sunt de ratione omnium medicarum operationum, quare per se quoque conuenient reuulsioni; ergo erit semper quanto citius reuellendum, ergo nisi quid prohibeat, per proxima, & non per distantissima.

*Octauū fun-  
damentum.*

Similiter causa, cur in reuellendis humoribus seruari debet rectitudo, est, vt per proxima fiat, recta enim linea est omnium breuissima: nobis quoque fauet Galenus libro de ratione curandi per sanguinis missionem cap. 15. vbi dicit, seruandam esse rectitudinem, vt citissimè curentur ægroti: hæc sunt verba, si venas secaueris gratia reuulsio-  
nis indirectè oppositis partibus, citissimè vtilitatem afferes, & si contra feces, nihil profeceris; dicit citissimè ob proximam, & breuem viam; quia via recta est aliis breuior: idem dicit 2. de rat. vict. 10. velocem scilicet debere esse reuulsionem: colligere ergo possumus, quod de ratione illius quod indicat reuulsionem, sit vt per proxima, & non per distantissima fiat. Quantum verò ad illud quod Galenus 2. ad Glau. cap. 2. iubet, dum fluunt humores ad genu esse secandum cubitum; dicimus quod ibi proponitur uenem cum maxima sanguinis redundantia, quæ est illa quæ impedit, ne per proxima fiat reuulsio: si fiet igitur reuulsio per distantissima, non fiet ratione sui, sed ratione prohibentis.

Hinc causa, cur sæpissimè fiant reuulsiones per distantissima, est, quia ægrotorum corpora vt plurimum sunt humorum redundantia oppressa; ideo ratione huius prohibentis sæpissimè timendum est, ne auxilia reuulsoria adiuncta partibus, quæ parum distant à locis affectis, allicere possint humores magno cum detrimento vicinæ partis, quæ actu mala valetudine premitur. Eadem de causa topica præsidia vt plurimum in principis ægritudinum non administrantur; quia tunc corpora ferè semper sunt humorum multitudine repleta; non tollitur tamen, quominus inueniri possint corpora ægrotorum sine excrementorum plenitudine, quibus topica in morbi quoque principio possint applicari. Galenus declarans casum Larissæ Calui nos docet, quando in ægris adsit humorum redundantia, & quando vti possumus localibus non purgato corpore; hæc sunt verba, si ex antecedenti victus ratione nulla plenitudo in corpore appareat, statim nos vti posse remediis localibus: admoniti ergo Galeni præceptis dicemus, si non aderit corporis plenitudo, quod ex antecedenti victus ratione cognosceretur, nos non solum posse topica adiungere in principis morborum, verum etiam per proxima reuellere, quia tunc non aderit prohibens, id est plenitudo humorum, qui excurrere possint ad locos affectos.

*Reuulsio  
quando per  
proxima &  
quando per  
distantissima  
sui facienda.*

*Diluuntur*



*Diluuntur aduersariorum fundamenta, & apertius manifestatur, quod de ratione reuulsionis non sit, ut per distantissima fiat.*

CAPVT VII.

**R**ESTAT, ut aliorum opiniones melius expendamus, & fundamenta aduersariorum euertamus. Curtius libro de mittendo sanguine in pleuritide, Akachias de arte Medicinali, Leonardus Fuscus, Petrus Buisotus, & Manardus dicunt, reuulsionem modò fieri per proxima, & modò per distantissima: dicuntque humores esse in contrarium auertendos per distantissima, vel gratia præseruationis, vel quando affectus est leuis, & sine periculo, vel quando humores non petunt partes principes, vel in morbis longis: per proxima ubi morbus est periculosus, vel quando humores petunt partes principes, ut in morbis acutis. Quorum sententia veris philosophiæ fundamentis reluctatur; quia, si intelligant, quod de ratione reuulsionis sit, quod modo ad proxima, modo ad distantissima sint trahendi humores, faciunt naturam variabilem, & inconstantem, quod est apud primè inconueniens; quia ratione vnius naturæ, & vnius ideæ vnicus debet esse procedendi modus, & non plures: de qualibet re simplicissima debet fieri propositio vniuersalis, vniformis, atque æternæ veritatis: non decet rerum naturis, quæ sunt inuitabiles, & summa necessitate constitutæ, per miscere attributa contingentia, quæ aliter esse possunt; quare, si statis, & firmissimis principiis loqui velimus, cogimur dicere, quod vel sit de natura reuulsionis, ut semper per distantissima fiat, vel semper per proxima.

Qui rectè scient interpretati Galenum, ubi dicit, reuulsionem esse faciendam per distantissima, facilè omnes nodos enodabunt, idque facient duplici distinctione, prima, quod reuulsio vel consideretur ratione suæ propriæ naturæ, & sic dicere poterunt, quod semper sit facienda per proxima; sic enim citò fiet, & citò Medicus de medio tollet peccâtes succos: vel considerabitur reuulsio cū prohibentis comparisone: si enim redundât humores, reuulsio nō est faciēda per proxima, quia imminet periculū, ne ad locū proximum loco affecto confluant humores; in hoc casu dicimus, quod longissimè à parte affecta est reuellendum, quia magis potest prohibens, quàm indicans. Secunda distinctio est, dum dicit Galenus, esse reuellendum per distantissima, dicimus, quod distantia duplicem habere possit considerationem, scilicet, vel ut eam à parte læsa dimetiamur, vel ab humoribus redundantibus in læsamque partem irruentibus; dicimus, quod respectu læsæ partis, si aderit plenitudo, reuulsio semper per distantissima fieri debeat, & si non aderit, per proxima: si verò consideretur distantia non respectu læsæ partis, sed respectu plenitudinis, semper reuulsio

fiet per proxima. Exemplum, inflammatio est in crure; humores irruentes in crus sunt in vena caua; auxilium reuulsorium est phlebotomia cubiti; ecce quod cubitum à læsa parte valdè distat, respectu verò humorum in vena caua residentium est proximum, alia quoque plura sunt exempla, quæ superius citata sunt: itaque meritò harum distinctionum omnia dubia facile dilui poterunt.

*Argumenta  
adversariorum  
sumpta à Ga-  
leno.*

*Responsio.*

*Declaratur  
quando per  
proxima fiat  
reuulsio.*

Qui aliter sentiunt perperam interpretantur Galeni methodum, primò colligunt ex Galeno 13. methodi cap. 11. vbi dicit, in inflammationibus esse reuellendos humores longissimè à partibus, quæ inflammantur, dicitque in brachio inflammato esse secandam venam cruris eiusdem lateris: idèmq; dicit 2. ad Glauc. cap. 2. similiter 3. methodi cap. 3. habet, quod dum sanguis ad membra conuertitur proxima & vicina, sit deriuatio, dum ad contraria, & longinqua, reuulsio: idem dicit plerisque in locis. Facile illis respondemus, quod Galenus proponat reuulsionem esse faciendam per distantissima; non ratione indicantis, sed ratione prohibentis: nec obstat, quamuis, vt plurimum per longinqua fiat reuulsio; quia non tollitur, amoro prohibente. sc. plenitudine, vel magno humorum affluxu, quin possit quoq; fieri per proxima: præterea respondetur, quod in curanda inflammatione & qualibet humorum profluuie duo vniuersales, & præcipui se offerant Scopi explendi: alter, vt citò curetur: alter, vt tutò: dicimus, quod hic postremus magis potest, & idèò sæpè impedit, ne reuulsio per proxima fiat: quãdo verò Medicus certissimè sciret, in corpore nò esse plenitudinè, tunc nihil prohiberet, quin per proxima reuelleret. Duæ obseruari poterunt occasiones, quando per proxima humores erunt reuellendi: altera, quando nulla erit plenitudo prohibens, veluti accidit, dum humores mordaces in intestinis existentes, habentesque propensionem in caput clystere acri in contrarium auertuntur, altera, quando aderit prohibens, sed minus poterit, quàm indicans; præceptum enim est omnibus notum in arte Medica semper potentiori esse attendendum: hinc Galenus rubificantia ex thapsia applicat commissuræ coronali, vt auertat catarrhum salsum, ne labatur in pectus; quia magis indicat catarrhus, vt regeratur, ne fluat ad pulmones. quam falsedo prohibeant thapsiam, ne ab illa calefiat, & intendatur: similiter ex Galeno diximus in cap. superiori, quod oculorum fluxiones in fauces reuelli possint, quia magis potest indicans, quam prohibens: itidem, si aura venefica à digito pedis exorians petat caput, & comitalem efficiat, magis potest hoc indicans, quod est vt exuratur digitus, & immediatè per proxima retrahatur aura venefica, quam possit hoc prohibens, id est. timor ne ad digitum læsum confluant excrementa ex aliis corporis partibus transmissa: alia quoque plura possent afferri exempla, quæ ostenderent, quod per proxima liceat reuellere, quamuis adsit aliquod prohibens, quod tamen tale sit, vt minus possit in prohibendo, quam indicans in indicando; sed declarata sufficiant.

*Præterea*



Præterea reuulsio sæpè fit per longinqua, non solum ob prohibens, verum etiam, quia non sunt vasa propinqua, per quæ reuelli possint humores: si de reuulsione per venas loquamur, non inueniuntur in omni parte corporis venæ, quæ possint secari, sicuti dum secamus in brachij inflammatione venam cruris, si essent venæ prominentes in dorso, in regione hepatis brachio proximiores, quæ recto tramite respicerent locum læsum, vel essent immediatae propaggines caux venæ, tuncillas, & non venam cruris sæpè secaremus; si igitur essent venæ secabiles proximiores, nullumque adesset prohibens, vel adesset, sed minus posset, quam indicans, semper reuulsio per proxima fieret: si verò obstarat prohibens, tunc satius esset distantia maleficio, certo, & maiori beneficio pensari, quam cum detrimento per proxima citò euacuare.

*Alia causa  
cur per le-  
ginq. fiat  
reuulsio.*

*Obiect.*

*Sol.*

*Reuulsionem  
fieri per pro-  
xima ex ore  
aduersariorum  
codigi.*

*Obiect.*

*Sol.*

Insuper confirmant quoque sententiam ex Arte Medicinali, vbi Galenus dicit, communem indicationem esse ad quammaximè distantia loca reuellere; & 2. de natura humana, vbi refert, sectiones esse faciendas longissimè ab iis locis, qui dolore premuntur; Responderetur primo, quod Galenus in arte med. considerabat communem indicationem, & non specificam, ibi non distinguebat indicantis naturam à prohibente, quia ibi non erat locus illud distinguendi, sed in methodo medendi; dicebat igitur Galenus esse communem indicationem, id est, præceptum commune, quod ad loca quammaximè distantia sit reuellendum, respiciens semper ad prohibens, & ad impedimenta. Secundo dixit, esse faciendas sectiones longissimè ab iis locis, qui dolore premuntur, quia dolores attrahunt humores ad locum læsum. Præterea, ne inde maius nascatur detrimentum, longissimè iubet esse sectiones faciendas: respicit loco citato Galenus ad prohibens, & nequaquam ad indicans, quia tunc magis potest prohibens in prohibendo, quam indicans in indicando. Quod verò reuulsio fiat per distantissima ob prohibentia, & non indicantia, ipsi quoque aduersarij coguntur fateri: quia si ab illis quæres, cur reuulsio non fit per proxima, numquid vna voce responderent, ne humores ad locum læsum trahantur, quare non indicans reuellens indicabit per distantissima esse auertendum, sed prohibens, ergo per aliud, sed quod per aliud fit, per accidens fit, ergo auersio per distantissima conueniet reuulsioni per accidens, & non per se, quod erat probandum.

Præterea mouentur auctoritate Galeni 12. methodi cap. 11. vbi docens rationem curandi inflammationem habet hæc verba: sed ad partes quæ maximè longinquæ sunt semper facies reuulsionem, æstima- ta scilicet phlegmonis magnitudine, & corporis totius statu. Respondetur, quod locus iste ostendit reuulsionem fieri debere per distantissima ob prohibentia, quia Galenus dicit in inflammationibus fieri reuulsionem per distantissima ob magnitudinem inflammationis, & ob statum totius corporis: status enim corporis ferè semper talis est, vt quamplurimis abundet excrementis, quæ nisi auerantur

longissimè à læsis partib. maiorē faciunt inflammationē: similiter pars corporis magna inflammatione obfessa redditur excrementorum corporis capax. & propterea reuulsio non fit per proxima, quia ad partes vicinas confluerent excrementa: conuenit tamen, vt per proxima faciamus reuulsionem, quando maius succedit beneficium, quam maleficium, vt diximus ex Galeno de catarrho falso in pectus dilabente, & de frigida aura faciente comitrialem, etenim longè maius consequimur beneficium, dum digitus, vel caput impletur excrementis. Medici igitur est spernere quod minus potest, & attendere potentiori: magis potest aura frigida, seu catarrhus falsus officere, quam humores confluentes attractos à rubificantibus, seu cauteriis administratis in commissura coronali, vel in pedis digito.

*Reuulsio ut  
per proxima  
& ut per re-  
motissima  
fit.*

His præcognitis facillè patebit, cur reuulsio aliquando fiat per propinqua, aliquando per remota, & aliquando per remotissima: per propinqua, dum indicans est vicens, & maximè potest, & prohibens nullius est considerationis, vt dum applicatur commissuræ coronali ceratum ex thapsia, vt auertat catarrhum, ne in pectus labatur: per remota, dum prohibens magis potest, sic Galenus 13. methodi cap. 11. in Iecoris inflammatione dextrum cubitum secat, & non venam tali: per remotissima, dum prohibens quammaximè potest, vbi enim est quammaxima plenitudo in inflammatione pleuræ, Auicennas libro 3. fen. 10. vbi agit de pleuritide secat prius saphenam, & deinde cubitum, quia prohibens vehementissimum cogit Medicum, qui tutò debet procedere, vt per loca distantissima reuellat.

*Laurentij  
Iouberti ar-  
vatum.*

Hinc quoque meritò reici potest sententia Laurentij Iouberti prima deca. paradoxorum cap. 10. dicentis, in inflammatione manus, esse secandum idem cubitum, vt semper per proxima fit reuulsio facienda: errare videtur, quia maius ex hac proxima sectione nascitur maleficium, quam beneficium: ratio est, quia maior copia humorum à vena iugulari ad cubitum profueret, quam à carpo ad cubitum; quare quando prohibens magis potest, quam indicans, ei prius est attendendum.

*Obiect. à Ga-  
leno desum-  
pta.  
Sol.*

Postremò proponunt auctoritatem 2. in 6. de morb. vulgaribus 9. vbi Galenus dicit, quod reuellens locale sit retrahens ad locum proximum, commune ad remotos. Respondetur, quod hæc Galeni auctoritas potius fauet sententiæ nostræ; ea enim de causa in locali reuulsione humores possunt in contrarium retrahi per proxima, quia in locali reuulsione, cum fiat corpore prius purgato, non adest prohibens, quod magis possit, quam indicans: quod localia non adiungatur, nisi purgato corpore, passim Galenus docet: pater ergo, quod retractio per distantissima nō prædicetur de reuulsione peric, neq. de omni, sed fiat per partes longinquas, ne scil. excrementorum plenitudo inferat aliquod damnum partibus quæ proximè sunt loco affecto.

*Confirmatur  
quod per di-  
stantissima  
auertere non  
conueniat per  
se reuulsionem.*

Præterea, si retractio humorum ad distantissima conueniret per se reuulsioni, conueniret ei de omni, id est non solum reuulsioni communi, verum etiam locali, quia reuulsio æque prædicatur de communi, &

ni, &



ni, & locali: ambæ enim in contrarium auertunt humores; si verò dicerent reuulsionem esse ab vno, scilicet eam per prius dici de communi, & per posterius de locali; falsum dicerent, quia localis eò dicitur localis, quia per proxima fit: quomodo igitur hæc conditio per distantissima per posterius locali conueniet? Quod hic discurrendi modus efficacissimus sit, patet ex Aristotele 2. post. circa finem ubi docet quod in quolibet proportionali genere sit primum subiectum querendum, exemplum ibi tradit de habente os, spinam, & sæpeum: dicitque philosophus, quod proprietas istius subiecti proportionalis sit sustentari, quia conuenit spinæ, ossibus, & sæpio; quare, si de ratione reuulsionis esset per distantissima auertere, sicuti sustentari ossi, spinæ, & sæpio conuenit, similiter retractio per distantissima omni reuulsioni conueniret; cum igitur auersio per distantissima nō conueniat locali; sequitur, quod neque reuulsioni vt reuulsio per se conueniat; non erit igitur reuulsio genus ab vno: sed, si dicerent hanc auersionem per longinqua non conuenire reuulsioni in communi tantum, sed esse attributum specificum, & non genericum; hoc quoque defendi non potest, quia Galenus in fluxu e naribus vult, cubitum, & non talum esse secandum, nulla pars, per quam communi reuulsionem possint auerti humores e naribus, proximior est cubito; ceteræ enim partes proximiores, si secarentur gratia auertendi sanguinem in cōtrarium, id fieret per reuulsionem localem, & non communem: demum, dum dicunt, quod per proxima reuellere conueniat locali, non communi, petunt principium, ac si dicerent, quod reuulsio localis fiat per proxima, quia fit per proxima; colligere ergo possumus, quod de ratione reuulsionis non sit, vt fiat per distantissima; similiter quod non conueniat reuulsioni quatenus reuulsio, vt modo fiat per proxima, & modo per remota, quia attributa propria sunt vniformia, & demum, quod falsa sit Laurentij Iouberti sententia, dum dicit esse faciendam reuulsionem semper per proxima, nullo facto prius prohibentium, & indicantium examine.

*Exemplo Ischiadis declaratur, quando auxilia reuulsoria debeant applicari remotioribus, & quando proximioribus partibus.*

C A P. VIII.

**T**RIBVS diuersis modis obseruatur, Ischiadem affectionem auxiliis reuellentibus curari posse; primò, dum per distantissima fit reuulsio; sæpè enim cauterium in cubito eiusdem lateris reuellendo humores fluentes deorsum tollit sciaticam: hoc reuulsionis genus à Galeno proponitur 2. ad Glauc. cap. 2. & 13. methodi cap. 6. ubi dicit, vno cru re inflammato sanguinem mitte ex cubito eiusdem lateris; in qua reuulsionem seruantur omnes conditiones reuulsionis, reatu-

*vt sciatica tollitur jectō cubito.*

do scilicet, distantia, retractio humorum, versus originem & vasa communia.

*An tolli possit sciatica secto alio crure.* Secundò curatur aliquando, vt experientia docet, auxilio cauterij in alio crure appositi, quod hæc reuulsio à partibus dextris ad sinistras, & vice versa à Galen. concedatur, clarissimè patet ex iis, quæ leguntur 3. metho. cap. 3. vbi habet, quod reuulsio possit fieri secundum omnes oppositiones: hæc sunt verba, reuulsio vero in iis quæ supra sunt, omnibus, deorsum semper agitur; sursum in iis, quæ sunt infra. Præterea à dextris ad sinistra, sicut ab iis rursus ad illa; similiter ex iis quæ intrus habentur ad ea quæ foris sunt, contraque ab iis ad illa: ex his verbis non solum colligimus, posse reuelli humores à partibus supernis ad infernas, sed à dextris ad sinistras, & ab internis ad externas.

*Cur sciatica tolli possit phœnigmate.* Tercio patet, quod sciatica aliquando curari possit retrahendo humores internos iuncturæ infixos ad externam cutim vesicantibus, dum enim fit retractio humorum cum violentia ab interno ad externum locum, quamuis per proxima fiat, debet vocari ex Galeno reuulsio; caracter reuulsionis est, vt in contrarium regerantur humores, & nihil refert an per proxima, vel remota fiat: neque deriuationis est, vt per proxima perpetuò fiat, sed quod morum, seu inclinationem humorum insequatur: exempla, quod per longinqua aliquando fiat deriuatio, non vno loco traduntur à Galeno, & præcipuè 2. in 6. de morb. vulg. text. 7. vbi dicit, quod renibus vitiatissimum sit per aluum deriuare, ecce quod in Galeno datur quoque deriuatio per longinqua.

*Deriuatio datur per longinqua.*

Qui amethodum sectam colunt, quomodo poterunt intelligere, quando sciatica tolli debeat reuellendo ad brachium, quando ad aliud crus, & quando ad cutim externam, nisi Galeni auctoritates ad methodum redigantur? Dicimus ergo, quod si supra renes sit maxima humorum copia, quæ possit ad locum læsum summo cum detrimento procumbere, ratione huius prohibentis sit per loca distantissima à parte affecta reuellendum. Neque conueniret in magna humorum abundantia ad aliud crus retrahere, quia tanto cum impetu ad crura procumberet, vt maius oriretur detrimentum, quam emolumentum.

*Quando sciatica tolli debeat secto cubito.*

*Dubi*

Occurrit dubitatio, quia superius diximus, quod de ratione reuulsionis sit, vt per proxima fiat, & non per distantissima, quod reluctatur Galeno: præterea recepimus, & laudauimus illos tres fines ab Asclepiade inuentos, & à qualibet Medicorum secta receptos, quod citò, tutò, & iocundè mederi sint attributa essentialia cuiuslibet Medicæ operationis, quocunque modo enim mèdeamur, scilicet reuellendo, vel deriuando, vel concoquendo, quo citius ad sanitatem ægrum transferemus, eo magis laudabimur, ergo per proxima, & non per remota. Respondemus primò, quod semper per proxima fieret reuulsio, nisi aliqua plenitudo prohiberet. Secundò quod dum reuulsio fit per longinqua, distantia non consideretur respectu plenitudinis,

*Sol. Vi reuulsio semper per proxima fiat.*



itudinis, sed respectu læsæ partis: exempli causa, reuulsio per cubitum facta, licet sit respectu coxendicis per distantissima, attamen respectu plenitudinis est per proxima; reuellimus enim humores existentes in partibus supernis, ne descendant deorsum, idque facimus per brachium, quod est adeo proximum & vicinum maioribus vasibus, in quibus residet plenitudo, ut alter non detur locus aptus sectioni, qui proximior sit. Si verò viscera essent excrementorum sarcina liberata, eo quia transmiserint excrementa ad vasa, quæ sunt infra renes, scilicet in venæ cavæ partitionem, tunc melius esset per aliud crus reuellere, quam per cubitum; citius enim curaretur; quia tunc humores per proximiores partes retraherentur. Si demum fluxi iam sint humores ad coxendicem, & non amplius fluant, commodè reuelli possent ad cutim vesicantium auxilio: ostendimus superius, à Galeno 5. methodi capite 3. reuulsionem quoque vocari dum humores, qui intus habentur, foras trahuntur, differentiamque inter deriuationem, & reuulsionem esse, quia deriuatio insequitur eandem propensionem motus humorum, reuulsio vero contrarium: idem humor existens in interna parte coxendicis stabilis & infixus, si ad cutim externam cum violentia auertatur, dicitur reuulsio, si verò propensus sit, & facile, & sine violentia transponatur, diceretur deriuatio.

*Quando sciatica tolli debet seò alio crura.*

*Quando vesicantium.*

Postremo datur etiam locus curandi sciaticam per cauterium paratum in eodem pede sub genu, vel supra in eodem affectæ partis latere, quod perbellè succeder, quando viscera superiora erunt sanitate donata, & tota mala valetudo consistat in iunctura coxendicis, quod solet contingere, dum sciatica sit ob casum ab alto, vel ob externum frigus vel ob nimiam equitationem, & alias causas huius generis. Qui verò Ithiadem ab his causis externis prodeuntem curare voluerint, corpus exciementis exutum Medicinis purgantibus potius lædent iuncturas, & agros à malo hoc infortunio non vindicabunt; causa est, quia præcipua occasio, quod humores insident partem affectam, non est plenitudo, sed solum dolor ab aliqua externa causa excitatus; itaque vnicum & singulare in iis est remedium, ut à parte affecta auertamus stabiles, & infixos humores vesicantibus coxendici applicitis, vel cauterio administrato supra, vel infra genu eiusdem partis læsæ: audias casum similem, quem semel vidimus: fuit strenuus quidam miles in finitimis Vngariæ locis, qui ob externum frigus, & nimiam equitationem incidit in sciaticam sinistri lateris, quamuis Eucrati esset temperamentis: hic fuit à Medicis non semel pharmacis, decoctis, cauteriis in cubito scilicet, & sub genu dextri lateris reuulsionis gratia tractatus sine vlllo leuamine; tandem administrato cauterio supra genu in eodem latere, post duos menses ad perfectam sanitatem illum transtulimus.

*Quando sciatica cauterio læsæ partis tollitur.*

*V: quidam liberetur sciatica cauterio eiusdem lateris.*

Hæc tam mirabilis medicandi varietas ex ea cognitione pendet, unde pendet ut cognoscamus, quando læsio partis mittentis magis possit, quam partis recipientis: in quolibet morbo, qui fit ex humoribus aliunde missis, duo semper sunt affectus considerandi; alter, qui est in parte

*Vnde pendet varietas medicandi sciaticam.*

mittente, alter in recipiente, & semper potentiori est attendendum. Exempli causa, si cruris inflammatio esset fota à copia sanguinis existentis supra renes, tunc magis posset pars mittens, quàm pars recipiens ad indicandum, rudis & mente captus esset medicus, qui in simili casu non secaret cubitum: similiter, qui per saphenam alterius cruris copiam humorum in supernis partibus prædominantium reuelleret, malè ageret. Si verò pars mittens esset infra renes in partitione venæ cavæ vel circa illas partes, satius esset supernis visceribus prius bonè euacuatis in aliud crus auertere; quia citius, & expeditius auerteret: hæcque erit reuulsio, quæ à dextra ad sinistram partem seruatur: si demum partes mittentes, quæ sunt supra, vel infra renes nihil mitterent, quod ex signis læsionum viscerum cognosceretur, tunc tota cura esset in partem recipientem flectenda, quod fieret auxiliis reuellentibus, vel deriuantibus: reuellentia sunt, quæ stabilem & infixum humorem in altioribus partibus iuncturæ existentem ad externa cum violentia retrahunt, & hæc sunt vesicantia, vel sinapismi, quippe ex thapsia, & ex aliis similibus conficiuntur: deriuantia quæ retrahunt humorem inclinationem, & propensionem habentem, vel ad cutem, vel ad cauterium supra genu in eodem latere administratum.

*Quid per rectitudinem seruandam in reuulsione intelligi debeat.*

#### CAPUT IX.

**N**ULLA sanè opinio magis à physiologia Medica aliena visa est mihi, quam illa, quæ fuit Petri Brisori in libro apologetico de pleuritide, Curtij, Ioannis Fernelij 2. methodicæ cap. 5. dicentium, quod per rectitudinem in reuulsione seruandam sit tantum intelligenda longitudo respectu partium, quæ sursum, & deorsum sunt, negaruntque à dextris ad sinistras, ab anterioribus ad posteriores, & ab internis ad externas partes fieri reuulsionem.

*Opinio Brisori  
& Fernelij*

De causa tamen cur hoc fieri nequit, inter se valdè dissentiunt: Brisotus, & Fernelius dicunt, reuulsionem fieri tantum secundum longitudinem sursum, quia retrahuntur humores solum virtute restarum fibrarum, quæ in longum, & non in dextrum, & sinistrum, vel secundum alias oppositiones exporriguntur. Altimarus hoc commentum de fibris rectis respuit, dicitque, quod dum reuellitur, & euacuatur sanguis per sectum cubitum egreditur virtute vacui. Alij dixerunt humores vt graues sponte deorsum defluere: quas causas superius reieciimus; clarissimeque ostendimus, quod fibræ rectæ non sint, quæ à venis sectis sanguinem expellunt.

*Opinio Altimari.*

*Opinio non  
nullorum.*

*Reijciuntur  
Fernel. Brisori.*

Præterea, quod per hoc verbum *κατ' ἄλγιν*, id est secundum rectitudinem non possit solum intelligi longitudo partium, patet, quia à centro



centro sphaerae artificialis omnes lineae ductae ad circumferentiam vocantur rectae, tam scilicet quae sursum & deorsum, quam quae in dextrum, & sinistrum latus sunt extensae, ergo non omne rectum est longum: similiter Aristotel. libris de caelo tenet, quod in mundo sunt omnes differentiae positionis, sursum & deorsum, ante, retro, dextrum & sinistrum, & lineas omnes à centro ad circumferentiam consideratas vocat rectas, quare non solum longum, verum etiam latum, & profundum poterit vocari rectum. Insuper, quod per rectitudinem intelligatur longitudo, quae sursum, & deorsum est, pueri quoque rejicient, quia si viderint lineam in plano in rectum protentam, illico eam longam, & rectam vocabunt.

Insuper Galenus 3. de fracturis 10. interpretans ῥῆμα, id est rectitudinem, dicit, per rectitudinem esse intelligendum è regione: an-ne dextrum brachium respectu sinistri est è regione? & auris recta è regione alteram respicit; quare in Galeno admitti non potest, quod rectitudo conueniat tantum longitudini.

Amplius Galenus lib. de ratione curandi per venae sectionem capite 15. habet venae sectionem gratia reuulsiois in directe oppositis partibus citissime utilitatem afferre, & si contra seces nil profeceris: directa oppositio praedicatur de qualibet differentia oppositionis, ergo seruari poterit rectitudo inter partem dextram & sinistram, anteriorem, & posteriorem, & internam & externam partem: quod à parte dextra ad sinistram, ab interna ad externam, ab anteriori ad posteriorem fiat vera reuulsio, habuimus à Galeno 5. methodi cap. 3. praeterea 4. methodi 6. loquens Galenus de fluxu sanguinis è naribus dicit, quod pars anterior ita posteriori aduersatur, ut superiori inferiori; haec sunt verba, aduersatur ei, quod supra est, id quod infra, & ei quod post habetur, id quod ante: inter partes oppositas reuulsio fieri debet, quia reuulsiois caracter est trahere in contrarium: inter directe oppositas partes seruetur reuulsio, ut reuellantur humores quam citissime & per breuiorem viam, linea enim omnium breuissima est recta: recta potest dari tam in longitudine, quam in latitudine, & profunditate: denique Galenus cap. 99. Artis Medicinalis non dicit, quod reuulsio sit retractio solum à loco superiori ad inferiorem, sed dicit ex omni loco ad oppositas partes, vult igitur, ut possit fieri reuulsio secundum omnes oppositionum differentias, quae non sunt solum sursum & deorsum, sed ante, retro, intus, foris, dextrum, & sinistrum.

Praeter propositas rationes, & auctoritates est Auicennas, qui dum de psoriis, lepra, & elephantiasi verba facit, docet hos affectus tolli posse purgantibus: est vera reuulsio, quia humores obrepentes ad cutem auertuntur in contrarium, ad intestina videlicet, secundum rectitudinem, & per partes oppositas, quae sunt ab internis ad externas: mirandum tamen est, quod inueniantur adeo pertinaces, qui videntes hanc non esse localem reuulsionem, nec seruari longitudinem sursum & deorsum, dixerint non esse reuulsionem, sed deriuationem;

*Argentery  
opinio rai-  
sur.*

quamuis clarissimè Galenus 5. methodi capite 3. dixerit, quod ab iis quæ intus habentur, ad ea quæ foris sunt æquè seruetur reuulsio, ac à partibus supernis ad infernas. Argenterius putat perfectissimam reuulsionem esse inter partes quæ sursum & deorsum sunt, eam verò, quæ intus & extra est, esse minus perfectam, quia ut dicit ille non fit secundum perfectissimam rectitudinem, quæ conuenit præcipuè longitudini: quæ opinio nobis non probatur, superiusque est reiecta, ostensumque est, rectitudinem conuenire posse etiam deriuationi, seruaturque inter dextrum & sinistrum, & cæteras differentias positionis, & Galenum intelligere per rectitudinem è regione, ut per breuiorem viam semper fieri possit reuulsio.

*Diluuntur rationes aduersariorum, dum probant per rectitudinem esse intelligendam longitudinem sursum & deorsum.*

## CAPVT X.

**F**ACILE quoque diluuntur ratione, quæ à Petro Brisoto, & Fernelio locis citatis proponuntur, dum scilicet, quod non detur reuulsio inter dextram & sinistram, anteriorem & posteriorem, internam & externam partem; sed tantum inter partes sursum & deorsum sunt ob fibras rectas, quæ ex illorum sententia sunt causæ reuulsionis, quæque solum in longum, ut aiunt, & non in latum, vel profundum extenduntur.

*Ut errât Bri-  
sotus. & Fer-  
nelius quod  
fibræ rectæ  
solum in lon-  
gum sint ex-  
tensæ.*

Primo videntur errare, quia est falsum, quod fibræ rectæ sint solum extensæ secundum longitudinem; innumerabiles enim venæ, & eorum fibræ inueniuntur, quæ à dextro latere ad sinistrum, & ab anteriori ad posterius extenduntur: vena porta ab Hepate ad splenem mittit surculos quamplurimos, qui à dextra in sinistram partem pereptant: similiter caua vena, quæ est in corporis centro ad corporis circumferentiam propagines sexcentas mittit; non potest igitur negari, quod fibræ rectæ non extendantur in omnem corporis dimensionem. Secundò, dato quod rectæ fibræ non essent, nisi in longum protensæ, quid tum; probatum est superius, quod in præcipiti illa reuulsione, quæ fit dum sanguis mittitur, fibræ rectæ non possint esse causæ euacuationis sanguinis; quia à fibris tardissimè moueantur humores.

Dum verò confirmant, quod reuulsio solum sit secundum longitudinem partium; quia Galenus secundo de ratione victus tex. com. 10. & alibi dicat, sanguinem esse mittendum in pleuritide ex cubito eiusdem, lateris, ut rectitudo secundum longitudinem obseruetur, non reluctatur iis, quæ diximus, quia & nos fitemur, quando venæ sunt in longum extensæ, reuulsionem fieri debere secundum longitudinem valorum, quia sic fiet per vasa communia, & per proxima;

nulla



nulla enim linea breuior est ea, quæ longa, & recta est; quinimmo vt plurimum reuulsiones fiunt secundum longitudinem partium, quia maior pars venarum, quæ possunt secari, in longum exporriguntur: non tamen valebit, vt plurimum fit, ergo semper debet fieri: an-ne affigimus dorso cucurbitulas, quæ magna vi ad cutim trahunt humores, qui centrum corporis quoque adoriri incipiunt? quod hæc sit reuulsio, patet ex Galeno 5. methodi cap. 3. vbi dicit, reuulsionem fieri à partib. supernis ad infernas, ab internis ab externas, & à dextris ad sinistras. Omnes sciunt, quod hæc auersio humores ducti à centro ad ambitum corporis, non sit longitudo; quare reuulsio nō fiet solum secundum longitudinem. Eandem solutionē cæteræ Galeni auctori-  
Inductio im-  
perfecta est in  
tertia figura  
cum vniuer-  
sali conclusio-  
ne.

tates recipient, sicuti 13. methodi capite 6. & 2. ad Glau. cap. 2. de cura inflammationis, vbi habetur, in iecoris inflammatione dextrum, & non sinistram cubitum esse secandum: admittimus vt plurimum, sicuti dictum est, esse seruandam longitudinem partium, sed non semper, dum dicunt, quod fieri debeat semper, quia aliquando fit, est reductio imperfecta, & reducitur ad tertiam figuram cum conclusione vniuersali, qui arguendi modus ad Aristotele est reiectus.

Rationabilius est, vt dicamus, reuulsionem vt plurimum fieri secundum longitudinem, non tamen tollit, quin secundum latitudinē, & profunditatem partium aliquando fieri possit, quemadmodum clarissimè ex Galeno 5. methodi cap. 3. dum dicit reuulsionem fieri secundum omnes oppositiones, colligitur.

---

*Declaratur, quid intelligi debeat per vasa communia.*

C A P. XI.

**Q**UOD reuulsio fieri debeat per vasa communia ex Galeno 13. methodi cap. 11. & ex rei natura facilè patet: similiter omnes admittent, quod hæc conditio per vasa communia conueniat reuulsioni per se, quia nisi essent communia, nihil euacuaretur; propterea euacuantur humores; quia retrahuntur ad vasa, per quæ possunt fluere, & hæc sunt communia.

Cæterum, quid sit intelligendū per hanc vasorum communionem, Curiopinia. non omnes consentiunt: sunt, qui volunt, sicuti est Curtius lib. de venæ sectione, quod per vasa communia sint intelligendæ venæ; quia hæc sunt omnibus corporis partibus communes; in qualibet enim parte corporis est aliqua vena, quæ tandem habet societatem cum porta, vel caua, hæc ibi Hepate, vt à primo stipite & trunco procedunt. Dicuntque propterea non posse fieri reuulsionem ab vna ad aliam partem, nisi merito venarum, quia hæc solæ sunt vasa per quæ fiunt euacuationes à qualibet parte corporis, & hæc solæ summum consensum, & communionem cum toto habent: confirmantur in sententia, quia in Galeno passim obseruant, reuulsiones per venas factas re-

uellere à qualibet laesa corporis particula, afferunt locum 2. ad Glau-  
cap. 2. vbi à Galeno exprimitur hic communissimus venarum con-  
sensus; ibi habet, retrahes à locis muliebribus, si cubitum secueris,  
aut iuxta mamas cucurbitulas apposueris, & deinde deriuabis, si po-  
plitis, vel coxis applicaueris cucurbitulas: ex hoc quoque Galeni  
consilio colligitur, retrahi posse humores à qualibet corporis parte per  
venas: dicuntque præterea vbiq; in corpore reperiri venas, & vnica  
illarum secta ob communionem totum corpus cōsequi beneficium.

*Quos sint va-  
sa communia*

Quorum opinio non videtur vera, quia sapissimè malæ humo-  
rum diluies auertuntur in contrarium per alios canales, veluti per  
intestina, ventriculū, per vreretes, per arterias, per intercapedinem  
carnis, & cutis, carnis & nerui, carnis & periostij, per concauitatem  
musculorum, per extremam superficiem neruorum, per membra-  
nam carnosam, & per alios ductus; quare non per venas solum hu-  
mores in contrarium retrahuntur.

*Ut natura per  
vias latentes  
euectas.*

Præterea, habetur ex Galeno & Hippocrate, quod per vias nobis  
latentes & incognitas euacuentur humores crassi. Galenus enim ha-  
bet hæc verba 7. aphorismorum 54. Hippocrates opinatur naturam  
validam & fortem semper inuenire viam materiebus. licet sint quam-  
maximè crassæ, & debeant per angusta foramina permeare: refertque  
Galenus ex Hippocrate in ossibus quoque fieri abscessum, quod in-  
dicat, crassos humores penetrare per ossium foramina angustissima:  
similiter primo methodi cap. 3. videns, quod humores penetrant om-  
nes meatus nobis occultos, refert hæc verba, rectè Hippocrates affir-  
mat totum corpus esse (vt Græcè dicitur) *σύντονον & σπέρματον*, quasi  
conspirabile, & conflubile dicas: vanum igitur erit dicere, quod  
per vasa communia sint venæ tantum intelligendæ, cum plurimæ sint  
viæ omnibus occultæ, per quas auerti possunt crassi humores. Quis  
anatomicorum, dum vesica lotio referta clystere aliquantulum de-  
pletur, cognoscat meatus, per quos ductus lotium admodum sensi-  
bile virtute clysteris per aluum possit subduci; si dixerint per poros  
vesicæ, non poterunt prohibere, quod lotium non dilabatur in spa-  
tium, quod est inter vesicam & intestinum rectum; melius igitur est  
vt cum Hippocrate, & Galeno dicamus, in viuente esse plurimos mea-  
tus apertissimos, quos crassissimi quoque humores peruadunt, qui  
nullo modo ab anatomicis cognosci possint; quique in cadaueribus  
re vera non appareant.

*Primum  
exemplum.*

*Secundum  
exemplum.*

Quod cum ita reuera sit, non est mirum, si multi affectus remediis  
quibusdam auferantur, de quibus vix ratio, vel methodus inuenitur;  
quemadmodum, dum Ischias acri clystere curatur. Quis mihi dicet  
per quas vias ab Ischiade ad intestina virtute clysteris auertantur pi-  
tuitæ vitæ? dici non potest, quod solum hac de causa curetur hic  
affectus, quia per clysteres tollatur fomes; quoniam obseruatur, an-  
cham refertam crassissimis, & copiosissimis humoribus enematis  
virtute paruo temporis intervallo depleri: insuper, dicant mihi, dum  
aura dira, atque scelestæ, quæ à pedis digito ad caput conscendit, ef-  
ficique epilepsiam, quæ sit eius iter tam velox? non per partium po-  
ros.



ros, quoniam non sequeretur tam velox actio, ergo, vel per interca- <sup>T. rium</sup>  
 pedinem carnis & cutis, vel per aliam incognitam atque latentem <sup>exemplum.</sup>  
 viam, de qua nec ratio, nec methodus habetur: similiter dum quis hæ-  
 morrhagia natium angitur, aliquando supprimitur testiculis deuin-  
 ctis: non videtur quod hic consensus inter nares, & pudenda sit per  
 venas, quia sequeretur quod aliæ corporis particulæ maioribus ve- <sup>Quartum</sup>  
 nis contextæ, quando deuincerentur, citius supprimeretur hæmor- <sup>exemplum.</sup>  
 rhagia, quod non experimur; alia igitur debet esse sympathia, quæ  
 per vasa nobis incognita sit. Ad hæc sæpè in melan. cholici hoc mi- <sup>Quintum</sup>  
 rabile obseruatur, vt vaporosi spiritus celestis se ab vno ad a'te- <sup>exemplum.</sup>  
 rum locum mouentes feriant modo vnã, modo alteram corporis  
 particulam: omnes mirantur, dum hoc symptoma accidit, quomo-  
 do tot sint vasa inter se respondentia & communionem habentia,  
 quæ nobis occulta sint: tale quidpiam contingit aliquando, dum ali-  
 qua corporis pars tentatur pruritu, illam enim fricando & scalpendo <sup>Sextum</sup>  
 in alia longè diuersa corporis parte leues quædam puncturæ sentin- <sup>exemplum.</sup>  
 tur, & deinde omiſſa fricatione, illico desinunt, & iterum dum scalpi-  
 mus resurgunt; quis igitur posset vasa, per quæ seruat hęc sympa-  
 thia, pernoscere anatomica virtute?

Denique vt animaduertas, multas esse vias in viuientibus apertas, <sup>Casus de viis</sup>  
 quæ in cadauere non possunt inueniri, audias historiam pluribus quo- <sup>latentibus.</sup>  
 que notam. Contigit Venetiis puellæ acutè magnum deglutienti, vt  
 post aliquot menses acus in vesicam descenderet, vbi cum constitis-  
 set, calculus circa illum est adactus, & tandem à lithotomo fuit trās-  
 positus: quis ex cadaueris sectione inuenire posset locum in iecore,  
 qua magnus acus posset sine læsione transire vbi nec venæ capillares,  
 nec fibræ conspiciuntur; sed, solum vniforme & simile parenchy-  
 ma, nihilominus in viuīs alio modo res se habet: cum igitur multa sint  
 vasa occulta, & alia pleraque manifesta, sicuti est canale à recto inte-  
 stino ad œsophagum extensum, à renibus per vtereros ad vesicam: per  
 vasa differentia ad parastates, sit concauitas musculorum, spatium in-  
 ter carnem & cutem, inter ossa & periostia; sintque arteriæ & spinalis  
 medula, & alia plura, vanissima erit interpretatio, quod per vasa com-  
 munita debeant intelligi solum venæ.

*Ostenditur, quod retractio humorum ad fluxionis originem non  
 conueniat per se reuulsioni.*

C A P. XII.

**A**CVRTIO quattuor tradantur conditiones optimæ reuulsionis,  
 quarum prima est, vt fiat secundum rectitudinem: secunda per  
 vasa communia: tertia per distantissima: & quarta vt retrahantur hu-  
 mores ad originem fluxionis. Queritur an hæc postrema conditio  
 conueniat per se reuulsioni: prima facie videtur quod sic: quia à Gale-

*Adversariorū fundamenta.* no proponitur 1. ad Glauco. cap. 14. vbi habet hæc verba: in aduersum trahere oportet, aut ad communia membris patientibus, aut ad ea in quibus est fluxionis origo: experimentis à Galeno desumptis confirmant. Galenus enim, ne catarrhus falsus in pectus descendat, applicat commissuræ coronali ceratum ex thaplia, ecce quod retrahit humores fluentes in pectus ad caput, quod est illorum origo: similiter 2. ad Glauco. 2. & alibi dicit, in cruris inflammatione esse secundum cubitum eiusdem lateris, quæ retractio est ad originem: alia quoque similia exempla possent afferri.

*Reijciuntur fundamenta aduersariorū. Prima ratio.*

*Secunda.*

*Tertia.*

*Trahere ad originem non convenire reuulsioni communi.*

*Quarta.*

*Quinta.*

Cæterum illorum argumenta non concludunt, quia nos non negamus, quod reuulsio non fiat sæpissimè retrahendo humores ad originem fluxionis, quærimus, an sit necessarium requisitum, vel quod saltem semper competat reuulsioni, quod non videtur, si potioribus Galeni fundamentis sit credendum: dicit enim 5. methodi c. 3. quod reuulsio fieri possit secundum omnes oppositiones; & hæc non sunt solum in corpore sursum, & deorsum, sed ante, retro, dextrorsum, & sinistrorsum, intus, & foris: quod cum ita ex Galeno sit, non est necessarium, ut semper in reuulsione, retrahantur humores ad originem fluxionis; præterea, origo non potest esse nisi in vnico loco, dicit Hippocrat. 5. aphor. 68. quod secta vena frontis tollitur labor partis posterioris capitis: quis diceret quod frons esset origo fluxionis? similiter an-ne per cucurbitulas trahuntur humores à centro corporis ad cutim, vbi nulla est fluxionis origo? non conueniet ergo reuulsioni per se, quod retrahantur humores ad originem.

Neque occurrant, quod hæc conditio sit propria reuulsioni communi, & non locali, intelligendo per communem, quæ sit à partibus supernis ad infernas, vel ab his ad illas; quia ostendere possumus, quod neque huic reuulsioni, quæ dicitur communis, semper competat. Exempli causa, Hepar, quod est sanguinis origo, est inflammatum, tunc, ut præseruetur à maiori inflammatione, Galenus cubitum secat, Ecce quod non trahuntur humores ad originem fluxionis, cum potius in aduersum retrahantur, ne perant iecur inflammatum, factum ergo erit asserere, quod retractio humorum versus originem sit requisitum necessarium, & conueniat semper reuulsioni locali: præterea si fuerit aliquod viscus origo fluxionis, & illud sit flaccidum, & viribus destitutum, quis ad illud traheret humores? superius ostendimus ad partes infimas non esse trahendos humores: amplius, in reuellendis humoribus indigemus omnibus differentiis ob plurima prohibentia, quæ in morbis profligandis semper emergunt: hinc dum humores sunt in partibus supernis, & aliquid prohibet, ne possint ad infernas trahi, nobis curæ est, nisi aliquid prohibeat, ut trahantur ad dextram, vel ad sinistram, vel ad exteriorem partem, prout citius, & tutius fieri poterit, quamuis in illis partibus sit fluxionis origo. Ars Medica non est tam inops auxiliorum, ut si aliquid prohibeat, ne possint ad fluxionis originem auerti humores, Medicus non possit amplius ægrotantibus auxiliari.



*Vi errant, qui dicunt sursum & deorsum, dextrum & sinistrum  
reuulsioni: ante, retro, intus & foris deriuationi  
conuenire.*

CAPVT XIII.

**Q**VI putant, quod reuulsio tantum sit inter partes supernas & infernas, dextras & sinistras: deriuatio inter externas & internas, anteriores & posteriores, eò mouentur, quia vident Galenum passim asserere, quod reuulsio fiat per distantissima, & deriuatio per proxima; vidētque inter partes internas & externas, anteriores & posteriores non esse distantiam, sed solum inter superiores & inferiores, dextras & sinistras.

Horum opinio superius quoque est reiecta; dum declarauimus, quod retractio humorum non fit per distantissima ratione indicantis, sed prohibentis: dum humores à toto irruunt ad crura, docet Galenus, per cubitum esse reuellendos: hæc auersio, licet sit per distantissima respectu morbi cruris, attamen respectu humorum, qui sunt in caua vena supra iecur, quique sunt deorsum fluxuri, erit per proxima: quando verò nullum adest prohibens, reuulsio commodè fit per proxima: conditio cuiusuis operationis medicæ est, vt cito, nisi aliquid prohibeat, medicatio fiat, quare per proxima, & non per distantissima. Hinc in cruris inflammatione, si venæ superiores non sint sanguine repletæ, sed sanguis fluens sit in partitione venæ caue, antequam descendat ad crura, vel sit in venis coxis, tunc inflammatio cruris non curatur per sectum cubitum, sed per aliud crus. Galenus libello de curandi ratione per sanguinis missionem cap. 18. idem dicit, scilicet se curasse ischiadas, secta vena cruris, & non cubiti, habet; memini me curasse vno die ischiadas, facta euacuatione ex crure, vbi prouenisset ex sanguine redundante in venis, quæ circa coxam sunt: semper humor esset reuellendus per proxima, nisi quid prohiberet, dicimus reuulsionem per distantissima fieri, non ratione humoris euacuandi, sed ratione partis læsæ: non decet, dum corpus humoribus redundat, trahere humores ad læsam partem, nec ad partes vicinas, si verò non redundat, licet, dum vnicum est affectum crus, per aliud reuellere. Dicunt nonnulli, quod, dum secatur alterum crus, sit deriuatio, & non reuulsio: quorum sententia à Galeno 5. method. cap. 3. videtur esse reiecta, quia ibi vult, quod vera conditio reuulsionis sit, vt in aduersum retrahantur humores, vultque quod aduersæ partes non solum sint, quæ supra & infra sunt, verum etiam dextra & sinistra; anteriores & posteriores, internæ & externæ: nisi Galeni auctoritatem relinquant, non possunt negare, quin fiat reuulsio secundum omnes differentias oppositionis. Quod distinguit reuulsionem à deriuatione, est quod deriuatio insequitur, & imitatur

*Quando ex  
Galeno cure-  
tur sciatica  
secta vena  
cruris.*

*Vi dextrum  
& sinistrum  
contineat re-  
uulsioni.*

inclinationem, & promptitudinem humorum: reuulsio verò contrarium: æquè conuenire possunt deriuationi, vt reuulsioni omnes oppositionum differentia, modò enim fit deriuatio supernè, modo externè, modo dextrorsum, & modo retrorsum, prout citius possunt deriuari.

*Manardi, & Curtij opinio improbat, dum dicunt phlebotomiam non posse esse remedium mixtum reuulsorium scilicet, & deriuatorium.*

## CAPVT XIV.

**Q**Uod admittunt, quod per se conueniat reuulsioni, vt in contrarium humores auertantur, vt ex Galeno probatum est, admittuntque, deriuationem æmulati inclinationem, & flexum humorum; nescio, qua ratione mori audeant deinde negare, quod phlebotomia aliquando non possit esse auxilium mixtum, scilicet partim deriuatorium, & partim reuulsorium; quoniam nihil prohibet, quominus aliqui humores in euacuatione auertantur in aduersum, quò scilicet non erant inclinati, & aliqui ad eundem locum proni deriuentur; exempli causa in pleuritide, vel angina dum per cubitum euacuatur sanguis, si humorem fluentem, & fluxurum ad pleuram, vel guttur trahimus ad cubitum, dicitur reuulsio, quia illum in contrarium trahimus; si verò euacuatur sanguis, qui non resistit, neque habet inclinationem in aduersam partem, sed sequitur eundem motum, auertiturque à loco affecto, dicitur deriuatio; ecce, quod phlebotomia respectu diuersorum potest quoque esse remedium reuulsorium, & deriuatorium: quodque dicitur de phlebotomia, de pharmacis, de fonticulis, & de cæteris auxiliis reuulsoriis dici potest.

*Exemplo ostenditur phlebotomiam esse remedium mixtum.*

*Vt deriuatio est per longinqua.*

Ex traditis colligi potest in quibus reuulsio cum deriuatione conueniat, & discrepet: conuenit, quia vtraque est auersio, sed reuulsio est vt plurimum per distantissima, deriuatio per proxima; apud Galenum centum inueniemus exempla; quod deriuatio per longinqua aliquando fiat: secundo in sextum de morbis vulgaribus tex. 7. habet, quod tenibus vitiatis optimum sit per alium deriuare; magis distant renes ab alio, quàm dextrum cubitum ab hepate, inter quas partes est locus reuulsionis: sed melius, 2. ad Glauco: cap. 2. dicit, cucurbitam applicatam mammis ab vtero reuellere, & sectam venam tali ab vtero deriuare, cum igitur magis distat vena tali ab vtero, quàm mammillæ, sequitur, quod aliquando deriuatio fiat magis per longinqua, quam reuulsio: quod reuulsio sæpè fiat per longinqua non prouenit (vt ostendimus) à natura reuulsionis, sed à prohibente: ostendimus duplex esse prohibens, cur semper per proxima non fiat repulsio, & deriuatio, alterum, quando non est locus aptus sectioni, qui proximus sit, per quem possint humores auerti, veluti si vena tali in coxa, vel in

guine



guine appateret nos eam lecaremus & deriuatio ab vtero melior & *Reuulsio & citor fieret, alterum prohibens est, ne ad locum affectum, vel ad deriuatio ob partes vicinas excurrant redundantes humores, qui possent reddere prohibens per curam difficiliorem; quæ cum ita sint, dicere possumus, quod reuul- longinqua sit.* sioni, & deriuationi per se, nisi adsint impedimenta, conueniat vt per proxima fiant; etenim quanto citius Medicus operabitur, tanto magis eius operatio laudabitur. Discrepat, quia sicuti reuulsio conuenit magis fluentibus, quam fluxis, & fluxuris; sic deriuatio magis fluxis: discrepat quia deriuatio sequitur humorum motum & inclinationem; reuulsio contrarium. Amplius reuulsio vt plurimum retrahit humores ad originem fluxionis, deriuatio longius ab origine semper illos abducit; conuenit, quia causa efficiens reuulsionis æquæ ac deriuationis est æquiuoca, modo enim fit deriuatio attrahentibus, modo expellentibus, & modò vtrisque virtutibus, vt ostendimus; conuenit; quia vtraque fit per vasa communia, & secundum rectitudinem; quid autem intelligi debeat per vasa communia superius declarauimus; conuenit demum, quod non solum humores fluxi, fluentes, & fluxuri apti sunt, vt deriuentur, verum etiam reuellantur. Nos de proprietatibus loquuti eas expendimus secundum aptitudines, & non actus, qui se vera ingrediuntur modos dicendi per se, vt proprietates, quæ in 2. modo collocantur; quod verò apti sint fluxi, fluentes, & fluxuri vt deriuetur ex superius dictis, & ab experientia ipsa certissima ostendi potest; dum enim sunt suppressi menses, quia caua vena sit sanguine repleta; tunc si talus tundatur, statim menses, vt millies vidimus, defluunt. Ecce quod deriuatio potest quoque *vt deriuatio conuenire fluxuris potest conuenire.* conuenire fluxuris; similiter experientia patet, dum diminutè fluunt; quia tunc secta vena tali promptius deriuantur; colligamus igitur deriuationem quoque conuenire posse non solum fluxis, verum etiam fluentibus, & fluxuris.

## Finis Decimiquarti Libri.



# SANCTORII

## SANCTORII

Iustinopolitani

### DE INDICANTIVM

#### Æquilibrio.

#### LIBER DECIMVSQVINTVS.

*Ostenditur, quod medendi principium sit sumendum primo ab  
urgente, secundo loco à causa, tertio ab impedimentis,  
& quarto à morbis.*

#### CAPVT I.

*Præpostera  
medicina exi-  
tium adfert.*



**E**st agrotantium miseria, ut post initium vnus simplicissimi morbi, statim alius affinis, & post illum alij plures breui spatio insurgant; unde fit, ut in qualibet ægritudine plurimæ se offerant Medico hauriendæ indicationes curatoriar, plures præseruatoriar, & vitales: aliquando quindecim, & aliquando viginti, & ultra obseruabuntur affectus in agrotante, quem Empirici vnico, & simplicissimo detineri fortasse putabunt; itaque nisi esset præclara medendi methodus à Galeno tradita, quæ docet à primis fontibus indicationes haurire, quæque ad determinata capita miro ordine eas redigit, & clarissime ostendit, cui primo, cui secundo, cui tertio, & cui quarto sit attendendum. Ars medica non leuamen, sed laborem, & sæpè exitium ægris afferret.

Galenus itaque 3. methodi cap. 9. & alibi loquens de numero indicantium, quibus est necessarium, ut Medicus occurrat, antequam aggradiatur curationem morbi, dicit, quod hæc omnia reducuntur ad tria, ita ut primum sit vrgens, secundum causa principalis, tertium causa sine qua non, sub quo nomine intelliguntur impedimenta: tractet Medicus agrotantem, qui centum habeat affectus, non inueniet ante morbum



re morbum curandum plures indicationes tribus. Galenus 3. methodi cap. citato in exemplum afferens vlcus iunctum cum inflammatione, sorditie, & immodico sanguinis profluvio, statim in hoc affectuum concursu iuber, primo esse attendendum causæ principalis, & demum iis, quæ impediunt vlceris sanationem, habetque hæc verba: profluvium sanguinis, vnde primum, maximèque imminet homini periculum, primò curari debet, si verò nulla sit vrgentis indicatio, primò inflammatio, quæ est causâ principalis vlceris, secundò loco sordes, quæ impediunt, ne cavitatis impleatur, & tandem vlcus sanatur: imageris & tu centum alios affectus vlceri iunctos, vel separatos, omnes similiter reduci poterunt ad hæc capita, scilicet ad vrgens, ad causam, ad impedimenta, & ad morbum. Similiter, dum aliquod symptoma ad se trahit curationem, alio modo non indicat, nisi, vel quatenus subit vicem vrgentis, vel causæ principalis, vel causæ sine qua non, impedimenti scilicet; symptoma enim ex se nihil indicat, nec morbus esse potest, quia solum est in fieri, & semper illum insequitur, vt umbra corpus: similiter Galenus ad hanc trimembrem divisionem non solum loco citato, verum etiam 7. methodi cap. 12. omnia indicantia reduxit: si patiens conuulsione prematur, Medicus non primò de intemperie partis, de sorditie, de cavitatis vlceris debet cogitare, sed de conuulsione, quia hæc ad vrgens reducitur; potest tamen conuulsione repressa, & quolibet alio vrgente, illico aggredi curationem inflammationis, quia est causâ principalis vlceris: similiter superata inflammatione dirigenda est oculorum acies ad impedimenta, scilicet primò ad sordes, & deinde ad cavitatem tollendam, postremò vlcus, aliis superatis est remediis tractandum.

Ob præposteram Empiricorum medicationem innumera committuntur errata: nos aliquot tantum obseruabimus, vt exemplorum luce methodum citius addiscamus, est Galen. 2. methodi cap. 4. quod exemplorum multitudine stupidorum quoque animi à somno excitentur.

*vt exempla à  
somnia excitentur.*

*Declaratur distinctius, cur primo ab vrgentibus, secundo à causâ,  
tertio ab impedimentis, & quarto à morbis sumitur  
ordo curationis.*

C A P. II.

**A**CTVARI de ordine curandi omnes affectus præter naturam præstat, vt in hoc capite de vrgentibus causis, impedimentis, & morbis verba faciamus. Vrgentia varia, & multiplicia in ægrotantibus contingere possunt, Medicus nisi singillatim prænoscat omnia, non poterit diuinare, à quo sit sumendum medendi initium. Aristoteles 1. cæli text. 10. dicit, omne multiplex est prius distinguendum, quàm definiendum; distingui igitur poterunt in hunc modum. Vrgentia

Quot sint vr-  
gentia.

aliqua sunt, quæ exitium & vitæ extinctionem minantur, aliqua non vitam, sed melior multam auferunt: quæ exitium minantur patiuntur quoque diuisionem, vt scilicet aliqua sint, quæ vires actu prosternunt, & extinguunt; aliqua, quæ non actu vires tollunt, nisi tamen illico auferantur, certam virium perniciem, vel breui ægris pollicentur. Quæ verò non vitam, sed peiorem vitam promittunt, similiter sunt duum generum, aliqua maximam longitudinem affectus portendant, aliqua verò statum indecorum, & inhonestum ægro- tantis minantur, tale vigenſ obseruatur, dum in curanda lue venerea despici solet virulentia, ne depillentur patientes.

De prima vr-  
gentiâ class.

Quoad primum v gens, quod est dum vires sunt collapsæ, dicimus quod illi primo est vacandum, & dū adest, dicimus ob cætera vrgentia, causæ principales, impedimēta, & morbi sperni debeant; Galenus enim 9. methodi 13. dicit virtutem omnium primam esse custodiendam, quia a viribus pendet viuere, addit, vitam vel esse ipsas vires vel earum actione; si igitur virtus omnium prima est custodiēda, quando adhuc vigenſ, & nō est collapsa; quāto magis si fuit perdita erit præ cæteris recuperanda: quanto magis causæ, impedimenta, & morbi curandi omitti poterunt? Adhuc febris quantauis ardens, si superuenerit syncope, quippe vires & vitam tollit ei vt potentiori attendemus, spernimus febrem, confugimus ad vinum, & ad alia febrī aduersa. Quo ad secundam vrgentium classē, quæ continet illos affectus in quibus imminet periculum, ne vires vel breui extinguantur, sicuti accidit in profluuiio sanguinis, in truci & insigni dolore, in conuulsione, & aliis plurimis affectibus, dicimus, quod si hoc quoque vrgens aderit, omnia similiter primo excepto spernantur, quia Galenus 6. methodi capite 13. habet, quod primum indicatum desumi debeat à virtute, deinde ab affectu, quinimmo addit, si indicantia fuerint paria primo quoque à virtute; deinde ab affectu desumi indicata. Exempli causa, si aliquis affectus valdè perturbet, & virtus eo modò deficiat, vt Medicus æquè de virtute, ac de morbo iudicet esse consulendum, docet Gal. vt tutius agatur, primum à virtute, & deinde ab affectu esse auspicandā curationem Si verò vires constant, & nullum ex propositis vrgentibus adsit, audacter causis, & morbis, & non virtuti attendimus. Hinc 9. meth. 7. dicit, quod virtus robusta sit despicienda, mediocriter conseruanda: quemadmodum aberrant plures dum sprete virtute imbecilli medicamenta potentissima exhibent, sic nonnullorum pace dicimus, quod aberrant, dum statim in morbi huiusmodi virtute existente robusta plenè nutriunt, ouis scilicet, & pullis. Simili modo Galenus 10. methodi cap. 1. habet, si virtus est robusta febrem, & causam profligare oportet; Robustienim homines inedia & magnis remediis sanissimis, quales sunt febres malignæ, & alii similes, sunt tractandi; nili enim cito morbum magnum, & eius causam, dum virtus est valdè, profligare tentemus, potest accidere, vt deinde à causis, & morbis ad auctis virtus destruat, & deinde non sit amplius tempus vacandi affectib. præter naturam, sed vir-

Duo satis co-  
munia vrgen-  
tia.

tuti:



ruti: poteſt quoque accidere, vt interim non ſolum à cauſis, & mor-  
bis; verum etiam ab aliquo ſymptomate virtus elidatur; ſæpè enim  
contingere ſolet, vt ſymptomata vicem vrgentis ſubeant, quo caſu  
non primò cauſis principalibus, & morbis. ſed ſymptomati attendi-  
mus; propterea Galenus 12. methodi cap. 1. dicit, ſymptomata aliquan-  
do ex accidenti mutare curationem: ſymptomata ſi ſubeant vicem  
vrgentium quæ tenent: primum locum, ſicuti eſt ſyncope, audacter  
cætera omnia indicantia ſperni poſſunt: ſi ſecundum locum, ſicuti eſt  
magna hæmorrhagia primo attendimus ſymptomati, ſed non omni-  
no ſpernimus alia; Galenus 9. methodi 13. dicit, dum virtus eſt col-  
lapſa, tunc nullum remedium, quod affectum ſanet eſt exhibendum;  
hæc ſunt verba, tempus quo vires reficimus, eorum, quæ affectum  
ſanent, nihil planè ægrotanti exhibemus, vbi verò eo roboriſeas per-  
ueniſſe coniiicimus, vt nihil, aut parum ex vacuando ſint lædèdæ, tunc  
ad affectus curationem eſt accedendum; non deſunt tamen Empiri-  
ci importuni atque moleſti, qui eodem die, quo viribus eſt attenden-  
dum, remedia plura, quæ affectum aliis temporibus ſanare poſſent,  
exhibeant; de iis Galen. 2. ad Glauc. cap. 2. dicit, quod fallunt ſe ipſos  
incidentes in illum ſermonem, morbus quidem curatus eſt, homo  
autem obiit.

Vrgens in ordine tertium, eſt nimia affectus longitudo. Galenus *De tertia vr-*  
*gentiũ claſſe.*  
rim quarto methodi ſecundo habet hæc, ſunt nonnulli homines, qui  
dummodo citius ſanètur, ſunt parati quidvis ſubire: ſunt, qui malũ pa-  
ti, vt teſticulus tumidus euellatur, & præcidatur, quã toto vitæ curri-  
culo illud pòdus ſufferre: plurimi ſunt, qui habent vlcera in pedib. vbi  
nullum ſubest vitæ periculum, qui, vt citius curentur, ſpernunt lon-  
giorem, & diligentiorẽ curam, quæ vſu pharmacorum, & decocto-  
rum adminiſtratur, & vnionem expoſcunt; quamvis eis doctus chir-  
urgus prædicat, quod quamvis vlcera ad cicatricem illis violentiſſi-  
mis exſiccantibus redigantur, pedes tamen paulo poſt aliis maiori-  
bus ſcatebunt vlceribus: in his ægrotantibus coactus Medicus deſpi-  
cit cauſam, & impedimenta, & vacat breuitati curationi: ad eundem  
modum plurimi confugiunt, vt citius curentur, ad potentiſſima me-  
dicamenta, ſicuti eſt ſtybium.

Quartum & poſtremum vrgens, quod pertinet ad decorationem,  
veluti dum non patiuntur, vt cicatrix in facie appareat, tunc chirurgi  
prius huic vrgenti attendunt, quam cauſæ, & impedimentis; ſimili-  
ter, ne quis in alopeciam cadat, coactè vtimur aſtringentibus, quæ  
detinent pilos, quæ tamen occludunt, ne acer, & mordax humor  
exhaleat.

Cauſa principalis tunc ſolum primò, & maximè indicat, quando  
nullum adeſt vrgens ex propoſitis; quæuis. n. illorum quatuor cauſæ  
principalis præferri ſolent; amoto igitur quolibet vrgente Medicus  
totum ſpiritum dirigere debet in cauſæ amotionem, ſi morbos &  
ſymptomata curare voluerit, etenim: ſi tractu annorum centum auxi-  
lius medicis veller, non amota prius principali cauſa, morbos ſeu im-

*Errata in cu-  
randis ulceri-  
bus.*

pedimenta auferre, tempus prorsus contereret; hinc Empirici frustra in ulceribus vtuntur exsiccantibus, quæ sanant vlcera, frustra vtuntur lotionibus deterforiis, quæ sordes eluunt, frustra sarcoticis, quæ cauitatem implent, nisi prius demant intemperiem partis, vel humorum affluxum ab aliis partibus prodeuntem, quæ esse possunt causæ principales vlceris. Alius igitur non inuenietur ordo, vel alia medendi series, nisi vt primo loco vrgenti, secundo causæ principali, tertio impedimentis, & quarto morbo, qui tamen nec vicem vrgentis, vel causæ principalis, vel impedimenti subeat: si verò alij faciant affectus, qui morbum sequuntur, quique in proposita serie nullum habent locum, quales sunt affectus in fieri, despiciuntur, non curantur, illisque nunquam attendimus, quoniam alios sequuntur, vt vmbra corpus, & ad ablationem aliorum cessant, & desinunt esse.

*De causis sine  
quibus non  
quibus tertio  
loco est atten-  
dendum.*

De impedimentis quæ à Galeno 7. meth. 12. & alibi vocantur causæ sine quibus non, dicimus, quod ex harum amotione nunquam sanari possit patiens, nisi prius causæ principali occurratur: si in vulnere ensis frustum relictum sit, semper aufertur potest. Similiter, si ossis fragmenta, pili, sanies, sordes, sanguis in thrombum conuersus, & alia impedimenta sunt in vulnere, dicimus, quod possunt prima die à vulnere demmi, non tamen vulnus curari, nisi causa principalis, quæ potest esse

*Cur vulnera  
debent aperta  
seruari.*

se inflammatio, vel abscessus, prius superetur: hinc quamuis vulnus indicet vniionem, hæc vniendi intentio despicitur propter impedimenta proposita. Impedimenta, quamuis semper debeamus auferre, dum possumus non tamen ex amotione illorum vulnus vnitur, vel sanatur, vniio enim despicitur ob causam principalem, quæ tollitur vulnere manente aperto, quia per sensibile foramen non solum inflammatio partis vicinæ, verum etiam humorum affluxus exhalent. Despicitur vniio ob vrgens aliquod imminens, ne scilicet clauso vulnere dolor insignis succedat ad retentum affluxum, vel ne sequatur spasmus ob puncturam nerui; vel ob alias causas: casus à Galeno 6. methodi capite 2. proponitur de punctura nerui talis, quidam stillo passus est nerui puncturam in manu, quidam Thessalius imposuit emplastrum ex fatinis, quod claudens vulnus inter septimum diem hominem reddit conuulsum, eumque iugulauit; docet igitur Galenus, non esse vniendum vulnus, dum neruus punctus est, sed apertum, & inglutinatum esse custodiendum, non solum propter causam principalem, verum etiam propter vrgens imminens, id est conuulsionem: satis est igitur, vt colligamus, primò esse attendendum vrgentibus, secundo loco causæ principali, tertio impedimentis, & postremò tantummodo morbis.

*Declaratur  
quandomorbo  
est attenden-  
dum.*

Morbus vltimo loco sanari debet, nisi vicem subiret vrgentis, vel causæ principalis, vel impedimenti; ratio verò quod morbus non debet curari, nisi causa prius curetur, est, quia semper à causa fit, nec vnquam cessare potest, nisi causam illum facientem tollamus; hinc Galenus 4. methodi 4. & aliis in locis dicit, quod si fiat morbus, à causa auspicandam esse curationem, si non fiat, à morbo: hinc in morbis, qui



qui non fiunt quique simplices sunt, & sine causa fouente, vt hectica, & ephimera simplicem habent methodum; hectica enim tamquam vni & simplicissimo affectui attendimus: si verò cum hectica sit putrida febris, sintque obstructiones, tunc exordimur à putrida, & ab obstructionibus, non quia febris hectica, sed quia sunt impedimenta, ne hectica balneis, lacte, & similibus adimi possit.

*Vt vires totius corporis collapsæ possint recuperari.*

C A P V T I I.

CVM indicatio præcipui vrgentis hauriatur vel à viribus, dum sunt perditæ, & collapsæ, vel quatenus imminet, ne vel breui collabi incipiant; videndum est, quibus auxiliis sint reparandæ, & custodiendæ. Galenus nono method. cap. 13. docens, quomodo vires conseruentur habet; seruabuntur, si nec eius substantia inaniatur, & non alteretur, quod fit seruando temperaturam; quomodo verò sint recuperandæ, præcipuè agi debet, quia qui sciet eas recuperare, eodem auxilio promptius eas quoque custodiet: omnes sciunt, quod solum recto vsu alimenti vires & conseruare, & resarciri possint; sed qualis sit hic vsus, à vulgaribus hominibus non cognoscitur; ideò de illo agendum est. Dicimus, quod quatuor pertineant ad rectam nutritionis administrationem, scilicet quantum, quando, quomodo, & vbi, quantum videlicet nutrimenti sit dandum, quando, & qua hora, in quem modum sit parandum, & vbi: hæc sunt exactè expendenda, quia ex horum inscitia quotidie pereunt innumerabiles ægrotantes, qui sine medicamento possent quoque ad sanitatem peruenire: exempla inueniuntur apud Hippocratem in Epidemicis; dicit enim de Apollonio Recto, qui Ictericus, quod miserrimè periit, quia carnem bubulam, & lac coctum comederat, & aquam potauerat; similiter de Filia Eurianaetis habet, quod ob vix racemum in delirium inciderit, & obierit mortem. De Pario, Hippocrates, & Galenus dicunt, die centesima vigesima periisse ob malam viuendi rationem: verum hic non querimus modum reparandi seu custodiendi illorum vires, qui nec normam, nec vllam viuendi rationem seruare cupiunt, sed illorum qui medicis morem gerunt, & nihil prætermittunt, vt diutissimè viuant; in iis igitur, vt resarciantur, & conseruentur vires, in primis se offert considerandum, quantum cibi sit dandum, vel vnde sumi debeat nutrimenti quantitas; dicimus cum Galeno primo ad Glauconem cap. 10. cibi quantitatem esse, quam æger concoquere potest; si æger igitur ruto posset duos ouorum vitellos coquere, & vnicum tantum sumeret, haud dubiè ægri vires minueretur; quia calor naturalis tempore, quo maneret ociosus, humidum radicale absumeret, & maximè læderetur, quinimmo ex Hippocrate minus læduntur, qui pleniori victu vtuntur, quam illi qui tenuior; si verò tres sumeret, similiter

*Quatuor necessaria ad vires recuperandas.*

*Ægri citati ab Hypo qui ob errorem in victu perierunt.*

*Quantitas cibi vnde sumenda.*

laderetur, quia distraheretur natura à certamine cum morbo non sine magno detrimento, dum concoqueret redundans alimentum quare tantum debet dari alimenti, quantum poteit concoqui, quia indicatio de quantitate alimenti hauriri debet ab actione virtutis; comprobatur hoc à simili, quia sicut quantum agendum in methodo curatrice desumitur ab actione indicantis præter naturam, similiter in methodo de tuenda sanitate quantitas nutrimenti ab actione virali desumi poterit; itaque virtus fortis, dum à certamine cum morbo distracta est, requirit maiorem cibi quantitatem, virtus verò mediocris, cibo mediocri est tractanda: debilis & infirma, vel quod in idem recidit, fortis quæ semper sit occupata in certamine cum morbo, minimam cibi quantitatem requirit: quo pacto vero tuto possit reparari, & conseruari minima quantitate sine detrimento, & iactura virium, inuenta est medela à Galeno 2. de rat. vict. in acutis cap. 36. & alibi, quæ est, quod tales parum, & sæpè possint nutriri.

*De signis bona virtutis.*

*Vi regio mutat cibi quantitatem.*

*Vi ætas.*

*Vi morbi.*

*Contradictiones medicina sola methodus soluit.*

Quæ verò sint signa virtutis valentis, & probè concoquentis, & quæ sint signa cibum prohibentia, quæ variant quantitatem, ab Hippocrate prima sectione aphorismorum secundo colligi possunt, quæ sunt regio, ætas, consuetudo, & morbus. In Germania febrientes non læduntur ab usu carnis castrati, vel à vini portione: in Italia non læduntur ab ovis: in Creta, si ouum comederent, perirent: ætas quoque mutat quantitatem, sic pueris ob consuetudinem assiduam comedendi maior cibi quantitas, quam hominibus dari debet: si de morbis loquamur, similiter dicimus, quod in magnis vulneribus, & inflammationibus, vt in angina, & pleuritide oua non dantur; in febris tamen maligna conceduntur. Ecce, quod regio, ætas, consuetudo, & morbus indicant, an virtus in coctione valeat, & an adsit aliquod prohibens. Regio frigida indicabit validam esse concoctricem facultatem, quia ob frigus concentratur calor, & inde fortius agit: similiter ætas puerilis primò fortior est in coquendo, secundo est puerorum consuetudo, quæ in omni re reddit operationem facilem; dictum quoque est, quod morbi nonnulli sunt, qui indicant, ægros paucò cibo esse reficiendos; quia magis potest prohibens in illis, quam indicans, sicuti in angina, & pleuritide, dicimus, quod magis possit imminens suffocationis periculum, quam, vt refociletur robur, quod tenuissimo quoque cibo potest tam graues morbos vincere: semper est facienda comparatio inter indicantia, & prohibentia, & semper prius potentiori est attendendum; tamen si virtutis robur multam exposcat cibi quantitatem, nisi prius confugas ad indicantium examen, vbi videre possis an indicans, vel prohibens magis possit tutò non procedere: sola medendi methodus est, quæ apparentes contradictiones illieo diluit. Hippocrat. 1. aphorismorum ille dicit, in paroxysmis nihil cibi dandum esse, in methodo Galenus picrocholos, ne in hæticam cadant, in principio paroxysmorum nutrit, ratio est, quia imminens periculum hæticæ febris magis potest, quam morbi insultus; imminens enim periculum hæticæ est virens secundæ classis, in qua collocantur omnes affectus, qui minantur virium



prolapsum, insultus verò pertinet ad morbum, qui ultimo loco indicat, & non solum minus potest vrgentibus in indicando, verum etiam minus potest, quam causa principalis, & impedimenta: ecce, quod Hippocratis, & Galeni sententiæ, nisi methodi, vt ita dicam trutina ponderentur, & examinentur, neque intelligi, neque in bonum vsum reuocari possunt.

Quoad quando sit nutriendum maximè refert scire; quia innumera-  
*Cibus non oportune datus quos occidit.*  
 biles pereunt, qui in tempore non opportuno cibantur; exempla plura leguntur apud Hippocratem in Epidemicis; dixit de ægro in-  
 nominato, quod perit non ob morbum, sed quia cœnauit calefcens, & largius potauit, dum scilicet erat paroxismo detentus: idem ferè dicit de Filia Philonis, quæ ob similem errorem mortem obiuit.

Vt igitur rectè præsciatur, quando cibus sit dandus, duo sunt ob-  
*Quando cibandum vnde sumitur. Quæ coctioni impediunt.*  
 seruanda: alterum est indicantis præsentia: alterum verò est prohibentis absentia; indicantis præsentia est virtus potens alimentum assimilare, & coquere; absentia prohibentis dicitur esse, dum in ventre cibus inconcoctus non adsit; dum absunt paroxysmi, animi passiones insignes, & dum paulò ante cibum non præcesserit nimius coitus, vel exercitium immoderatum: diximus, dum absunt paroxysmi, quia natura non est cibo distrahenda à certamine; similiter debent adesse insignes animi passiones, quia si ira, vel insigni timore, vel gaudio æger corripitur, adeo eius spiritus distrahitur, vt nisi paululum moderetur passionibus animi, cibus à ventriculo non arctè apprehenditur, vnde clydones statim succedunt; neque illico post coitum immoderatum est nutriendum, quia spiritus defessus magis cibo vexatur; etenim non sine labore coquitur: post coitum igitur expedit, vt corpus se tradat quieti; Neque post exercitium statim est cibandum, quia virtus defessa non reficitur cibo, sed obruitur, nisi in minima sit quantitate: colligi itaque poterit, tempus dandi cibum à præsentia virtutis, & à propositorum prohibentium absentia, desumi, vel saltem quando prohibentia minus possunt, quam indicans vitale: in ægrotantibus dicit Galenus 2. method. §. esse cibandum, quando virtus facilius morbum tollerat, hæc sunt verba: tempus nutriendi in febribus vnâ accessionem habentibus est illud, quo facilius virtus morbum tollerat, subdit Galenus quo prius in sanitate erant assueti: data enim horarum paritate, vt scilicet prohibens non magis possit media nocte, quàm meridie, dicimus, quod tempore quo in sanitate erant assueti cibus pasci, cibus sit exhibendus, & nequaquam aliis horis insolitis: si verò certis horis morbus adortur, ea erit hora eligenda, qua natura facilius morbum tollerat, eritque longè ab accessione, vt natura in certamine non onusta ciborum sarcina possit vincere morbum.

Quoad modum exhibendi cibum, dicimus, quod exhibendi mo-  
*Quomodo sit dandus cibus vnde sumi debent.*  
 dus sumi debet à minori passione virtutis, vt scilicet eo modo exhibetur, quò minimum quid virtus in coquendo patiatur, quemadmodum quomodo sit medicandum indicatur à passione indicantis,

sic versa vice, quomodo sit cibus exhibendus indicabitur à minori virtutis passione: hinc liquida eligimus pro reficiendis viribus, quia virtus concoctrix, & cætera facultates naturales citius, & minori cum labore suum pensum absoluunt, quàm si dura comedantur: hinc panis non madefactus iusculo ineptus est ad coctionem, difficillimè digeritur, & tardissimè auget vires. Hinc fortasse Hippoc. 2. sect. aph. 11. dicit, quod facilius est potu refici, quàm cibo, natura enim à potu minus patitur.

*Quæque vi-  
scera vis sunt  
nutrienda.*

Quo ad vbi, dicimus, virtutem viscerum principalium esse conseruandam: si de ventriculo loquamur, quia semper est pituita refertus, dicimus, exposcere alimenta calida: si de corde, quæ spiritum gignunt, vt sunt vinorum varia genera: si de cerebro edulia quæ non fumant: si de Iecore, quæ habent vim roborandi, adstringendi scilicet, sicuti inter vina sunt subastringentia, inter carnes sunt perdices, fassiani, & siluestres gallinæ, quæ vesci solent variis corymbis adstringentibus: si de splene, dicimus exposcere, quæ mixtas habent vires, id est corroborandi, & aperiendi, sicuti est tamariscus, citrac, & alia id genus: hæc sunt ea quæ in collapsis viribus reficiendis possunt administrari,

*Quomodo vires partium collapsæ recuperari possint.*

### C A P. I I I.

**V**RGENS præcipuum colligitur non solum à virtute totius corporis collisa, verum etiam aliquando ab aliqua corporis parte viribus destituta; etenim interitus vnius partis in consortium trahere quoque potest totum animal. Declarauimus de virtute totius, vt possit alimentis conseruari, & recuperari: sequitur vt de partibus agatur, quomodo, dum sunt robore exolutæ, vel imminet periculum, ne exoluantur possint in vita conseruari, & collapsæ recuperari. Loquens igitur Galenus de iis, quæ roborant partes, dicit, esse adstringentia, habetque hæc verba 2. methodi 15. adstringentia esse illa, quæ corroborant affectam partem, ne excrementa suscipiat; ratio, cur moderatè adstringentia roborent, duplex est: altera, quia colligunt vires vniendo minimas particulas, quibus inde collectis alacrius natura suorum officiorum muneribus fungi potest; fortius enim expellit, concoquit, & promptius quod est bonum, & familiare attrahit, & conuertit: altera est, quia ope virtutis adstrictoriæ partes affectæ non suscipiunt aliena excrementa.

*Vt astringentia  
roborent.*

*Astringentia  
aut sanant  
spleneticos.*

Quod astringentia roborent, exemplo splenis cognoscitur: videmus enim aquas sabrorum, & calibeatas, quæ valdè astringunt sanare spleneticos; tamariscum, intimam corticem fraxini, citrac, quorum virtus astrictoria gustu manifestissimè percipitur, similiter lienosos curare; itidem Galenus 2. methodi 16. dicit in lienis affectibus esse admiscenda



miscenda astringentia, vt tollatur occasio fluxionis, tollitur, tum quia roborata parte astringentium vsu fluxa materia resoluitur; tum quia pars non suscipit nouam fluxionem.

Cum igitur auxilium astringens habeat virtutem seruandi robur partis, ne in affectus exitiales corruat, quales sunt gāgræ, & cachexiæ, par est, vt hic de recta administratione astringentium loquamur, scilicet quantum sit astringendum, quomodo, quando, & vbi: quo ad quantum dicimus, quod ab actione partium indicetur; si partes con- *Quantum sit astringenda* siderentur in habitu corporis denso, & plurimæ virtutis, licuti in rustico, vel naura inueniuntur, dicimus, quod tales partes indicant fortius astringens: & ratio est, quia durus & firmus habitus magis resistit, & reagit, & à maiori reactione maius quantum, quàm in habitu molli, in quo exigua sit resistentia debet indicari.

Quo ad quomodo, dicimus, quod à passione indicantis, id est partis debet desumi; sicuti enim dantur habitus, qui minus patiuntur, *Quomodo sit astringenda.* quales sunt duri, & qui magis, quales sunt molles, similiter astringentia, & quæuis alia indicata debet modo fortiora, modo debiliora applicari. Galenus 3. methodi 3. loquens de sarcoticis dicit, thus in humidis naturis est sarcoticum, in siccis verò nequaquam, quinimò in his non carnem, sed pus generat; quo loci colligit Galenus, non satis esse, vt medicamenta meditemur, vt medeamur, nisi quoque temperaturarum notas quoque sciamus: quod de sarcoticis dicit, idem de astringentibus, & cæteris omnibus medicinis est dicendum: hinc vinum, quod moderatè astringit, roborabit partes in habitu molli, si verò valdè astringit, habitum firmum, & durum corroborabit, & mollem, exprimendo humorem roridum lædet: quod verò debeat esse astringens, siue roborans cuiuslibet proportionato, coniectura assequi poterimus ex traditis in 11. libro, vbi de analogismo, & experientia, & in 3. vbi de specificis affectuum differentiis egimus, diximus coniectura, & non certa scientia inueniri, tum quia habitus duri, vel molles suscipiunt magis, & minus, tum quia proprium cuiusque ex Galeno 1. ad Glau. in principio, & alibi solus Æsculapius penetrare potest.

Quando verò partes viuientium sint corroborandæ, dicimus, cum debeat desumi quando à præsentia indicantis, & absentia prohibentis, quod semper pars debilis erit, nisi quid prohibeat, ad astringenda: si quis in curandis vulneribus vti veller astringentibus corroboraret partem vulneratam, sed si hoc faceret antequam tolleretur prohibentia, qualia sunt sordes, pili, ossium fragmenta, thrombus, & alia id genus, vel maximè vulneratum læderet: similiter, qui roborant ventriculum absinthio, miua, mastice, & similibus ante omnimodam excrementorum euacuationem lædunt perinde ac, qui in proprio domicilio hostem occultant; qui alia meliori occasione hostilibus armis truciùs ferit. Hic exurgit dubitatio, quia ex Galeno lib. de componendis medicinis, & passim in methodo habetur, quod astringentia gratia conseruandi natium calorem debeant omnibus medicinis permisceri. *Dub.* Respondemus, quod astringentia in compositionibus sunt per exi- *sol*

quæ virtutis, & talia vt non superent vires medicinæ, sed superentur à reliquis simplicibus, & talia astringentia non occultant hostilia excrementa.

*Vbi sit astringendum inde sumuntur.*

Quo ad vbi dicimus, quod sicuti in therapeutica vbi indicatur à subsistentia indicantis, similiter in prophylactica indicabitur. Dum ventriculū roborare volumus, non iniicimus astringentia per clysteres; sed per os.

*Roborantia pro qualibet parte unde colligantur.*

Quæ verò debeant esse roborantia accommodata pro omnibus partibus corporis, alias quoque diximus, quod ea sunt partis substantia, temperatura, compositio, meatus, situs, progressus, exordium, officium, figura, & numerus: ex iis itaque præcognitis faciliè conicere poterimus, quænam astringentia, quæ concoctoria, & quæ aperientia conuenire possint vni, vel alteri parti: exempli causa, si consideretur cerebri substantia, quæ sua natura mollis, & parum resistens est, dicimus indigere mitiori astringente, vt roboretur: similiter si consideretur eius temperatura, quæ frigida est, oleum rosatum (vt optimè nos docet Galenus) erit concoctorium, quamuis in aliis corporis partibus sit repercuiens: itidē de cōpositione est dicendū; astringentia enim, quæ firmanr dētes, vel iuuant, vt melius componātur, valdē differūt ab illis, quæ genibus, & coxendici conueniunt; ratio diuersitatis est, quia genua, & coxēdices sunt cōposita per diarthrosim, dētes per gomphosim: simili modo de situ est dicendum; etenim si pulmo est roborandus, cum à ventriculo magis distet, quam hepar, valentioribus astringentibus vti debemus si velimus, vt roboretur: tale quippiam est considerandum, si agatur de partium progressu, scilicet, vt rectē videamus, an per partem roborandam progrediatur neruus aliquis, qui prohiberet valentiora astringentia: idem de aliis; sed cum locupletissimè acta sit hæc materies in 3. lib. non est, vt de hac re protrahamus sermonem, tanto magis, cum Galenus passim in method. primo de loc. affectis in principio, & alibi dicat, quod partes affectæ variant curationem morborum; quinimmo 13. method. cap. 16. habet, quod nulla in arte medica maior sit difficultas, quā perfectè cognoscere indicationem à partibus affectis desumendam; additque si quis indicationem sumptam à parte adimit, medicinam sex diebus addiscere. Nō est igitur mirum, si his temporibus studiosi omisso exercitio anatomico, cuius beneficio has indicationes addiscimus, paucorū dierū cursu in medicos exeant, sed admodum rudes, quia non in cognitione partium affectarum, sed solum in genericis persistūt, ex quibus est omnino impossibile, vt proportionata remedia colligant. Hinc semper miratus sum nostratum non paucos, qui de qualibet ægritudine non vltius inquirunt, quam an sit intemperies, mala compositio, vel soluta vnitas, & an peccet bilis, vel pituita, neq; vllam specificam indicationem sumunt à partibus corpore expensam secundum decem propositiones conditiones, quorum erratum quanti sit, in lib. de indicatione, & de analogismo & experientia cumulatissimè ostendimus.

*Difficultas medicina unde oritur.*

*Erratum commune nostratum.*

*De ordine,*



*De ordine, & potestate indicantium.*

C A P. I V.

**I**NDICATIO vrgentis præcipue ex omnium sententia primum tenet locum; & in eius comparationem omnes indicationes à causis, impedimentis, morbis, & partibus desumptæ spernuntur: est Galeni 7. methodi cap. 12. quod prius vrgenti sit attendendum, & deinde causæ, quæ efficit morbum; similiter causæ prius, quam morbo est attendendum, dicit enim Galenus 8. methodi 1. quod si causa efficiat morbum ab ea sit auspicanda curatio; si non amplius fiat, sed factus est, à morbo, verum sit causa, sit morbus factus, sit denique pars quævis quocunque modo læsa vrgenti prius vacandum est: Galenus 14. methodi cap. 11. in comparatione vrgentis adeo despicit indicationem sumptam à parte, vt non solum quando affectus est læthalis, verum etiam dum solum est insanabilis, admonet corporis partem, quæ tamen non sit gratia vitæ, esse amputandam. Hinc, si cancer oblideat partem corporis, qua ablata vita manere potest superstes, eam amputamus: similiter, si canis rabidus digitum mordeat, vt imminens ille læthalis affectus præcaueatur, digitum abicindimus, vel saltem profundè inngimus: si aura frigida à digito exiliens cerebrum obrepat, & epilepsiam faciat, phænigmate, vel cauterio, vel igne confoditur; similiter, nisi in exitu sanguinis arteriosi, qui fit in aneurismate, transuersim totam arteriam scinderemus, actum esset de vita; patet itaque, quod facta comparatione inter vrgens & causas principales, morbos & impedimenta, quod prius vrgenti sit attendendum: inter vrgens præcipuum, & vrgens sumptum à parte vacandum, præcipuo: patet quoque, quod facta comparatione inter vrgens sumptum à parte, & causam, & morbum, quod aliquando magis causæ, & morbo sit attendendum; exempla sunt, dum testiculus tumidus euellitur, ne pars illa ingrauescens viuentem perturbet; dentem quoque perforatum eximimus; quia magis potest morbus partis, quam ipsa pars; erit igitur hic ordo seruandus, vt primo sit vrgenti præcipuo attendendum, & merito; quia agitur de virium lapsu, & de vitæ extinctione. Secundò causæ principali. Tertiò impedimentis, quarto morbo, qui tamen non subeat vicem vrgentium, causarum, vel impedimentorum aliorum affectuum, quinto loco attendere oportet corporis partibus, quæ non sint gratia vitæ.

*Vt partes am-  
putantur in  
comparatione  
vrgentis.*

Verum omnes indicantium naturæ semper sunt expendendæ, an subeant aliorum vicem, posset enim indicans, quod sumitur à parte, vicem vrgentis subire, causæ principalis, impedimenti, vel morbi. Similiter alia indicantia transire possunt de genere in genus, & mutari; quia morbus, cui vltimo loco est attendendum, aliquando adeo vrgens, vt primum acquirat locum; idem dici potest de causa principali, & impedimentis. Itaque nisi medicus omnes ægrotantis affectus

*Qua sint opri-  
mo medico  
necessaria.*

disponere, in ordinem redigere sciat, cui scilicet primo, cui secundo, cui tertio, & quarto loco sit vacandum, si totum Galenum memoria teneret, adhuc nihil sciret, quin immò satius esset, ut miseri ægrota ntes se ipsos fortunæ, quam similibus medicis committerent, à nullo enim errore æquè ut à confusa, & præpostera medicina æger colligit.

*Ostenditur, quod quindecim sint indicantium comparationes, & quodnam sit illud indicans quod in qualibet occasione magis possit.*

### C A P V T V.

*Primus indi-  
cantium gra-  
dus cui primo  
sit attenden-  
dum.*

**Q**UATVOR itaque sunt indicantiũ gradus: in primo collocantur vrgentia, quæ, cum minentur interitum, ante omnia medicum alliciunt: Galenus 3. method. cap. 9. dicit, si in curandis vlceribus phlegmonosis superueniat conuulsio, prius esse attendendum conuulsioni, quam phlegmoni, quãuis phlegmone sit præcipua causa vlceris. Septimo method. cap. 12. dicit prius esse dirigendam oculorum aciem lyncopi, quæ vires euertere potest, quam cæteris affectibus.

*Secundus.*

In secundo gradu ponuntur indicantia, quæ hauriuntur à causa principali, & fouente. Galenus 3. method. cap. 6. docet in vlcere phlegmonoso non esse exordiendam curationem ab vlcere; sed ab inflammatione, quæ est præcipua causa vlceris; 4. method. cap. 4. dum morbus adhuc sit, dicit, à causa esse exordiendum; octauo methodi cap. 1. habet, prius esse submouendam causam febris, & deinde febrem; habet tamen, quod si causa iam desierit, tunc immediate à febre esse auspicandam curationem.

*Tertius.*

In tertio gradu impedimenta collocantur, ut tollemus sordes, pilos, fragmenta, & thrombum, nisi quoque inflammationem, quæ potest esse causa vlceris, prius superemus: & ubi contingeret conuulsio, sanguinis profluuium, vel aliquod aliud vrgens, tunc omitemus ablationem causæ vlceris, impedimentorum, & illicò vrgenti attendemus: dicimus igitur, quod nisi hæc impedimenta auferantur, non possumus vllomodo vlcus sanare; idem dicimus de aliis affectuum generibus: non licet, ut obstructions tollantur, vel iecoris ardores mitigentur, nisi alui excrementa leniter subducantur.

*Quartus.*

In quarto gradu sunt morbi, qui ex Galeni sententia 7. meth. cap. 1. 2. & 3. meth. 6. post amotionem dictorum omnium, & non prius submoueri debent: quo tempore solum roborentur partes astringentibus, quod officium non ad methodum medendi, sed tuendæ valetudinis pertinet, non licet uti roborantibus, dum sæuiunt vrgentia, vel dum causam morbi profligamus; quia roborantia cum astringant, impedirent causæ amotionem; eadem de causa dum impedimenta auferimus non roboramus partes, quia non astringentibus, sed laxantibus, vel deterforiis ea euelluntur; relinquitur igitur, ut solum robo-

*Quando par-  
tes sint robo-  
danda.*

entur



rentur patres, dum morbus curatur; In hoc loco rudiorum errorum *Erratum in*  
notatur, dum prima die ante ablationem causæ, & impedimentorum *chirurgia*  
vtuntur roborantibus, quæ potius resistunt, ne inde causa, & impedi- *quodnam sit,*  
mento superentur.

Proposito hoc indicantium ordine sequitur, vt videamus quo- *Ostenditur*  
modo possint sibi inuicem comparari, & quod magis possit: dicimus *quindecim fieri*  
igitur, quod quindecim, non plures fieri possint indicantium com- *indicantium*  
parationes, & ab hoc solo examine rectum indicantium æquilibrium *comparatio-*  
cognosci: Prima comparatio debet fieri inter vrgentia, dum plura *nes, & non*  
superuenient, vt sciatur, cui prius sit vacandum. Secunda inter causas *plures.*  
principales, dum eger diuersis affectibus premitur. Tertia inter impe-  
dimenta. Quarta inter morbos. Quinta inter indicantia vitalia de-  
sumpta à partibus, quæ non sunt gratia vitæ, sed melioris vitæ. Sexta  
comparatio fieri debet inter vrgens, & causam. Septima inter vrgens,  
& morbum. Octaua inter vrgens, & impedimenta. Nona inter vr-  
gens, & indicationes vitales sumptas à partibus à natura institutis  
gratia melioris vitæ. Decima inter causam, & impedimenta. Vndeci-  
ma inter causam & morbos. Duodecima inter causam & partes ro-  
borandas. Decimatertia inter impedimenta, & morbos. Deci-  
maquarta inter impedimenta, & partes roborandas. Decimaquinta  
inter morbos, & partes; alias fingere comparationes indicantium ne-  
mo poterit; vel feret quis in omni affectuum varietate, & fingat ægro-  
tum, qui centum habeat ægritudines, nunquam poterit plures iis  
comparationes efficere.

Quo ad primam comparisonem, quæ debet fieri inter vrgentia, *Quatuor vr-*  
dicimus, quod statim videndum est, ad quam classem reducantur: *gentium clas-*  
vrgentium classes quatuor sunt: in primaque posuimus vrgentia, quæ *s. quæ sint.*  
vires statim dissoluunt, vt est syncope; in secunda, quæ minantur vi-  
rium prolapsum, vt sunt, profluvia: in tertia quæ pollicentur nimiam  
morbi longitudinem; sicuti dum sperata, & morbo euellitur testiculus  
tumidus, ne maximam longitudinem morbi experiatur patiens; in  
quarta, quæ ad decorationem pertinent; sicuti sunt, qui, ne depilen-  
tur, petunt à medicis astringentia, quæ gallicam luem non sanant,  
sed sæuiorem reddunt; dicimus, quod facta horum vrgentium compa-  
ratione, quod prius attendendum sit iis, quæ collocantur in prima  
classe, & deinde ordine proposito vrgentibus aliarum; Galenus non  
solum spernit causas & morbos, dum est vrgens, quod statim vires  
adimit; verum etiam ob vrgens, quod non statim, sed temporis spacio  
posset vires opprimere, etenim in alui fluore, quamuis vires actu  
robustæ sint, subeat tamen periculum, ne aliquo interuallo temporis  
cadere possint, nec phlebotomiam, nec pharmacum, vt colligitur i. ad  
Glaucanem cap. 4. Galenus admittit.

Cadit tamen in hoc loco considerandum, dum plura simul sunt *Dub. de vrg-*  
vrgentia primæ classis, quæ scilicet sunt de illis, quæ statim vires tol- *gentium com-*  
lunt, sicuti est syncope, & magnus fluor sanguineus, cui primo, cui *paratione.*  
secundo sit vacandum. Respondi potest, quod statim est videndum,

quodnam vrgens citius tollat, quo viso, dicimus, quod nisi eodem tempore vtrique occurrere possimus, quod affectui, qui citius vires opprimat, prius sit vacandum. Similiter dicimus, si adessent plura vrgentia secundæ classis ei prius esse attendendum, quod citius, potentius, & certius vitam, & vires lædit.

*De compara-  
tione vrgen-  
tium tertiæ  
classis.*

Vrgens tertiæ classis, quod conuult in longitudine affectus, spernitur non modò ob affectum, qui vires extinguit, verum ob illum, qui minatur virum lapsum: quod vero huic vrgenti prius, quam causis, & morbis, aliqui attendunt, Galenus 4. method. cap. 2. his verbis fateatur: sunt quidam, qui malunt quiduis subire, quam diutissimè pati. Hinc plures arbitrantur, quod stybii vltus possit inueteratum affectum vincere spernunt febrem, eius causam, & alios affectus, quippe stybio intendi possent.

*De compara-  
tione vrgen-  
tium quartæ  
classis.*

Quantum locum tenet vrgens, quod pertinet ad decorationem: nisi morbi subeant vicem vrgētium primæ, secundæ, vel tertiæ classis; possumus prius decorationi quàm cæteris morbis, & causis attendere; Medicus tamen debet turò mederi, quod respondet primis, & deinde secundis vrgentibus; deinde citò, quod respondet tertiis, & demum iocundè, quod respondet decorationi; iocunditas, ne turpis fiat cicatrix, tanti est, quanti, omnia plurimi patiuntur, vt non conspiciatur.

*De morborum  
principalium  
cōparatione.*

Secunda comparatio fit inter causas principales: vnius morbi vnica est causa principalis: attamen, cum plures in ægrotante possint esse morbi siue separati, plures quoque in illo possint esse causæ principales; Hippocrates in Epid. de Pythione habentes pectoris affectionem, & febrem, dicit in illo duas fuisse causas principales: altera erat catarrhus in pectore collectus, altera erant humores putridi: vnica die apparuerunt sputa subcocta, & vrina tenuis, sputa cocta ostendebant causam principalem affectionis pectoris esse à natura domitam, & superatam: vrina tenuis, humores febrem cientem esse adhuc crudos: in iis separatis causis erit semper expendendum, quæ ex illis magis possit: quod fiet hoc modo: debet videri, quænam ex illis magis reducibilis ad vrgentia primæ, vel secundæ classis, scilicet quæ citius, certius, & potentius vires opprimere possit; exempli causa in Pythione erat catarrhus tenuis in pectore collectus, & in venis putridi humores: dicimus, quod magis poterant putridi humores vires opprimere, quam catarrhus; quia in pectore nulla aderat inflammatio; magis igitur humores putridi erant reducibiles ad vrgentia, quoniam putredo viribus magis est inimica, quam tenuis catarrhus, ideo medicatio fuisset incipienda à putredine, non tamen spreto catarrho, si verd fuisset crassus, & talis, vt temporis spatio potuisset inflammacionem pectoris, vel suffocationem efficere, & putredo fuisset aperta, & careret malignitate, minus esset reducibilis ad vrgentia, & per consequens minus posset, & ei nò primo, sed secundo loco esset attendendum; catarrhus enim qui posset inflammacionem, vel suffocationem parere, esset reducibilis ad vrgens secundæ classis, putredo aperta ad vrgens tertiæ classis, in qua non vitæ periculum,



sed morborum longiitudines collocantur. Quod de iis diximus, de omnibus est intelligendum, quod scilicet medicatio sit incipienda ab illis causis, quæ sunt magis reducibiles ad vrgentia potentiora.

Tertia comparatio fieri debet inter impedimenta, quæ cum in quolibet morbo plura sint, aliquo ordine est procedendum: dicimus itaque, quod impedimenta, vel sunt reducibilia ad vrgentia, vel non: si sint reducibilia, videndum est ad quam classẽ, an scilicet ad primam, in qua collocabuntur illa impedimenta, quæ actu vires, & vitam tollunt, veluti quando est sub craneo pus retentum; vel ad secundam, in qua sunt impedimenta, quæ nisi auferantur, minantur virium dissolutionem, sicuti, dum in vulnere fragmenta ossis, vel ensis, vel sanguineus grumus detinentur: dicimus loquendo de impedimentis, quæ vrgent, quæque sunt in eadem classẽ, quod ei prius sit attendendum, quod citius, potentius, & certius vires, & vitam tollere possunt: si ex symptomatib. cognosceretur esse pus sub craneo, quod est impedimentum, ne sanetur essentque in vulnere sordes, si chirurgus inciperet à medicatione sordium, & post diem cogitaret de terebra, valdè deficeret in suo explendo munere; quia illo breui temporis spatio in maximum discrimen ægrum vocaret: statim igitur impedimento, quod potentius, certius, & citius lædere potest est attendendum; si verò impedimenta non sint reducibilia ad vrgentia, prius attendimus causã, & deinde impedimentis; si verò accideret, vt plura essent impedimenta istius generis, tunc prius attendimus ei, quod magis impedit, vel quod est causa, ne alterum auferatur impedimentum; sicuti sordes est impedimentum, ne cavitatis vlcus impleri possit, à sordibus est incipienda cura, quia cavitatis, quæ similiter est impedimentum, cur vlcus non sanatur, non potest impleri carne, nisi sordes auferatur.

Quarta comparatio fit inter morbos, intelligendo morbos, qui non subeunt vicem vrgentis, causæ, vel impedimenti; tunc dicimus, si plures in ægotante extiterint tales, quod illi magis poterunt, qui erunt magis propinqui vrgentibus; adest gonorrhæa, & perniones; hi sunt affectus separati; si quis quæreret à quo esset incipienda medicatio, responderem à gonorrhæa, quia nisi cureretur, posset temporis spatio impedire vrinam, vnde succederet non solum vrgens secundæ classis, dum scilicet subest periculum, ne succrescat symptoma, quod vires tollere posset; sed vrgens primæ dum scilicet ob retentum lotium aliquando mors sequitur; quod de pernionibus non potest dici; idem de aliis comparationibus est dicendum.

Quinta, & postrema comparatio fit inter partes læsas, quæ cum ad vitam non pertineant, sed ad meliorem vitam, non subeunt vrgentis vicem, vel causæ, & impedimenti, vel morbi; tunc si duæ partes fuerint læsæ, dicimus, quod curatio erit exordienda ab illa parte, quæ in temporis spatio vicem maioris, & vehementioris vrgentis, causæ, impedimenti, vel morbi posset subire.

Colligemus itaque, quod si fiet comparatio inter vrgentia, & cau-

*De specifica  
indicantium  
omnium com-  
paratione.*

las, ab vrgentibus sit incipiendum; inter vrgentia, & impedimenta similiter ab vrgentibus; inter vrgentia præsentia, & imminencia à præsentibus; inter eminentia, quæ vires possent vel breui opprimere, & vrgentia pertinentia ad longitudinem affectus vel decorationem, dicimus, quod medicatio erit incipienda ab iis vrgentibus, quæ minantur virium casum; inter vrgentia & morbos similiter ab vrgentibus; itidem inter causas, & impedimenta à causis; inter causas & morbos à causis, & non à morbis: inter causas, & partes corroborandas à causis; etenim non potest roborari pars vulnerata, vt exemplo chirurgico vtar, nisi dematur inflammatio partis circumstantis: inter impedimenta, & morbos ab impedimentis; quis vellet, nisi stolidus sit, prius siccare vlcus, & deinde tollere sordes? inter impedimenta & indicationes partium ab impedimentis; quis vellet partem prius roborare, & deinde sanguinem concretum auferre? Demum si fiet comparatio inter morbos, & partes, dicimus, quod simul tempore morbus potest curari, & pars roborari: per hæc igitur quindecim capita est faciendum examen indicantium, si voluerimus exactè scire, quid magis possit in indicando, vel cui primo, cui secundo, & tertio sit attendendum.

*Ostenditur, quod Chirurghi illi sint amethodi qui in omnibus vlc-  
ribus vtuntur exsiccantibus.*

#### C A P. VI.

*Vt methodi  
vniuersales  
sine exercitio  
non sufficiant.*

**D**ECLARATA methodo, quæ in complicatis affectibus docere potest, à quo sit exordienda cura, præstat, vt nunc eam exerceamus: est Galen. 9. methodi cap. 4. quod vniuersales methodi non satisfaciant ad exactam cognitionem, nisi in exemplis exercentur: & cap. 6. eiusdem libri, quod in comparanda omnium artium scientia non sufficiat methodus per vniuersalia theoremata acquisita, nisi addatur aliquod exercitium in particularibus exemplis. Vt igitur methodum superius declaratam exerceamus, incipeimus Galen. imitatione ab vlcetibus, ostendemusque Empiricos chirurgos ordinem curandi vlcera sæpè peruertere: quia quod primo loco est in vlcetibus sanandum omittunt; & quod postremò, curationem primò aggreduuntur.

Proponatur igitur vlcus sordidum, cauum, cum labris duris, cum partis intemperie cum materia, quæ adhuc ab humorum affluxu foueatur: in hoc vlcere curando, chirurgorum plurimi, iique rudiores statim prima die spreto indicantium examine, & æquilibrio vtuntur solum exsiccantibus, scilicet emplastro de minio, ceratode succo solarri, lenimento simplici, vnguento de pòmo citri, & vino, quo semper abluunt, perinde ac in vlcetibus non possint esse plures idæ, quam vnica, quæ indicet exsiccantia, & solum ille chirurgus omni-

*Exsiccantia  
quibus propo-  
stis vtuntur  
Empirici.*

bus



bus præstet, qui in curandis vlceribus sciat uti potentioribus exsic-  
cantibus.

Horum erratum videtur esse inexcusabile, quia si de affluxu lo-  
quamur, tantum abest, ut exsiccantibus de medio tollatur, ut potius  
impediant, ne fluxi humores perspirent; quod maximum detrimen-  
tum adfert vlceribus; impedita enim perspiratione, humores inde  
fiunt magis effrenes, unde vlcus sordidius, & magis cauum efficitur;  
quare, dum vlcus est cum affluxu, exsiccantibus externis nunquam  
sanabitur. Præterea, dato etiam quod vlcus non esset forum ab afflu-  
xu, sed solum ab humore imbibito in parte vlcerata, adhuc dicimus,  
quod nullo modo exsiccantia conuenire possint, & ratio est, quia par-  
tes vlceratæ humoribus imbibitæ cum sint omnes imbecilles, non  
possunt digerentibus, ut vino & similibus expurgari, sed suppuran-  
tibus; quam doctrinam nos docuit Galenus 3. prælag. 29. dum dixit,  
humores detentos in parte debili nunquam iudicari per excretio-  
nem insensibilem, sed per conuersionem in pus; quare non remedia  
sicca, sed potius humida, & suppurantia conuenient.

*Quot modis  
errent dum  
vltimè ex-  
siccantibus in  
vlceribus cu-  
randis  
Primum er-  
ratum.  
Secundum er-  
ratum.*

Insuper, dicimus, quod exsiccantia sordido vlcere non conueniēt,  
quia non poterunt sordes, & cauitatem sanare, nisi prius sanetur in-  
flammatiō, quæ iuncta est cum vlcere: clarissima est Galeni doctrina  
11. method. cap. 12. vbi habet, si vlcus cauum iunctum sit cum inflam-  
matione partis circumstantis, nisi inflammationem, seu tumorem, vel  
materiam imbibitam prius curaueris, vlcus efficies sordidius, & inde  
magis cauum; ratio est, quia exsiccantia, quibus uti solent, ut est vi-  
num, & similia, sunt deterforia, quæ partem vlceratam aliquantulum  
vellicant, & pungunt, unde sæpè confluxus maior, unde sordium in-  
crementum, unde sinus, & plura alia symptomata exurgere possunt.

*Tertium er-  
ratum exsic-  
cantium.*

Denique variis Galeni locis confirmari potest, quod in vlceribus,  
quæ egrè curantur non sit exordium ab exsiccantibus, 4. method.  
1. habet, quod difficultas sanationis vlcerum non pendet ab vlcere, ut  
vlcus est, sed ab eius causis, quæ alio ingenio, quam exsiccantibus ex-  
ternis tolluntur: hacque occasione omnes vlceris causas iis paucis  
verbis enumerat, vlcera egrè sanantur vel propter intemperiem car-  
nis vlceratæ in qualitate sola, vel ob intemperiem cum tumore, vel  
ob affluentes humores peccantes qualitate, vel quantitate: sequitur  
itaque, quod in sanandis vlceribus, nisi ad sit aliquid vigens, cura sit  
incipienda ab aliqua causa ex iis quatuor à Galeno relatis, scilicet vel  
ab intemperie carnis vlceratæ, quæ sola qualitate officiat, vel ab in-  
temperie cum aliqua magnitudine aucta, id est cum tumore seu apo-  
stematē; vel à fluxione humorum copia, vel qualitate peccantium,  
addas vel ab omnibus iis simul iunctis; vel dicas cum Galeno 1. de  
comp. med. per genera cap. 18. vlcera esse vel cachoethica, vel dysepu-  
lota: cachoethica sunt, quando pars vlcerata est adeo intemperata, ut  
influentem humorem, licet sit bonus, corrumpat: dysepulota, quan-  
do propter confluxum humorum copia, vel qualitate peccantium  
non sanatur, absque eo quod pars vlcerata habeat virtutem corrup-

*Quatuor  
causæ cur vlc-  
cera non sa-  
nuntur.*

pendi fluentes humores: dum igitur vlcus est cachœthicum, vel dysleptolorum, dicimus, quod ab iis causis sit incipienda cura, & in illis amouendis exsiccantia externa nullum habeant locum, quinimmo vlcæris sanationi potius sint impedimento.

*Ordo curationis  
vulcerum  
unde pendeat.*

Quo pacto verò sit procedendum in vlcæris curatione, dum tot sunt causæ difficilis sanationis: dicimus, quod aliquando ab affluxu auspicamur curationem, aliquando ab intemperie, & aliquando ab apostemate: ab affluxu incipiemus, quando apostema, & intemperies partis dependent ab humorum fluxione, ablata enim causa, cætera indicantia facillè superantur: ab intemperie partis, si esset mali moris, & vlcus esset cachœthicum: quia tunc magis posset malignitas ad indicandum, quam apostema, & affluxus: aliquando enim, quamuis sint affluxus, & apostema malignitas magis potest, quia tam mordaces succos in vlcere gignit, vt inde excitentur fluxiones, quæ deinde apostemari summum adferunt incrementum, quo casu curatio non ab affluxu, vel apostemate est exordienda: sed à malignitate vlcæris, quæ solum ferro, vel igne tolli potest.

*Vt Galenus  
in vlc. vt ali  
quando vi-  
sunt humidus*

Ab apostemate vero exorditur curatio; non semper ab affluxu, quando affluxus excitatur occasione doloris, caloris, & putredinis pendentis ab apostemate vlcæris; apostemate enim ablato, illicò cessat fluxio, & vlcus: quo pacto igitur rudiores poterunt exsiccantibus sanare vlcus cum apostemate iunctum, nisi prius tollant suppurantibus apostema? sapientissimus Galenus 3. de fract. 43. vritur in vlcere cum inflammatione cõiuncto non exsiccantibus, sed iis quæ leniunt, ne inflammatio incrementum suscipiat; tantum enim abest, vt ea quæ leniunt siccent, vt potius vlcus sordidius reddatur, habetque hæc verba. medicamenta, quæ inflammationem coercent. & leniunt, sunt, vt tetrapharmacum, quod tuetur partem affectam ab inflammatione, sed efficit vlcus sordidum; ecce igitur, quod si adsit inflammatio in vlcere, liceat applicare humida, quamuis vlcera ab illis reddantur sordidiora; magis enim potest phlegmon, quam vlcus, & cauitas. Hinc Galenus 4. method. 5. dicit, quod dum cupimus pus in vlcere, non est exsiccandum, cupimus pus, dum vlcus est cum apostemate; quia vlcus sanari non potest, nisi prius apostema sanetur. Vidimus in Vngaria Empiricum, qui ob huius methodi inscitiam miserimè vlcæratum hominem tractauit: hic erat miles vlcere sordidissimo cum phlegmone correptus, Empiricus vtebatur exsiccantibus, scilicet emplastro de minio, de succo solatri, vnguento de pomo citri, lenimento simplici, vng. de litarg. & similibus, his vlcus modo videbatur sanari, & modo sordidius, & magis cauum effici, nunquam tamen poterat ad sanitatem peruenire, tandem me in consilium vocauit; nouimus inflammationem magis posse, quam vlcus, & cauitas; eamque alio modo non tolli, quam suppurantibus, iussimus, vt farinæ, lactes, & pinguedines applicarentur, post quorum vsum, vel breui apparuit album pus, quod erat signum humores imbibitos esse concoctos & superatos, est Galeni 5. aphorismorum 22. pus in vlcere maximum esse securi-



securitatis signum; superata inflammatione breui spatio exsiccantibus, & epuloticis ad sanitatem eum transtulimus.

Demum, qui vtuntur topicis exsiccantibus pro sanatione vlceris, cui iuncta sit durities scyrrhosa, aberrant, & conterunt tempus, quia nisi scyrrhosam duritiem prius emollientibus tollant, vlcus nunquam sanabunt.

*Quartum ex-  
ratum illorū,  
qui videntur  
exsiccantibus  
in vlceribus.*

Causis vlcerum ablatis vniuersis non potest adhuc exsiccantibus vlcus sanari, quia prius sunt miro ordine remouenda impedimenta, quæ sunt sordes, cavitates, vel sinus, fragmenta ossium, Thrombus, labra indurata, & alia plura: si quis vellet cavitatem, vel sinus sanare, antequam sordes auferantur, inter imperitos esset ponendus; quoniam sordes causant cavitatem, & non cavitates sordes: similiter, si quis vellet prius sordes auferre, quam callum, vel duritiem labrorum, nunquam sanaret, etenim donec adesset durities labrorum seu callus, nunquam vlcus coalesceret, vel sanaretur.

*Quintum ex-  
ratum ob ex-  
siccantium v-  
sum.*

Sed ex dictis exurgit dubitatio; quia diximus ex Galeno 4. methodi cap. 1. quatuor esse causas vlcerum ægrè sanabilium, & non plures: hic tamen proposuimus sordes, cavitatem, thrombum, quæ non reducuntur ad quatuor propositas: augetur dubitatio, quia Galenus 6. aphorismorum 45. dicit, vlcera ægrè sanari, non solum propter affluxum humorum, aut propter dispositionem in membro longo tempore contractam ex humoribus influentibus, sed etiam ob aliquam passionem ossis corrupti, ecce, quod præter quatuor propositas causas, refert os corruptum impedire vlceris sanationem. Responsio facilis est, quia sordes, os corruptum, thrombus, siue sanguis concretus, & alia id genus non referuntur ad causas vlceris, sed ad impedimenta; in illis enim quatuor causis ægrè sanabilium vlcerum non continentur impedimenta, sed solum causæ: quæ verò impedire possunt sanationem vlcerum sunt infinita: hæc doctrina est Galeni 3. meth. 9. & 7. method. 12. vbi omnes affectus, qui sunt ante morbum curandi, refert ad tria capita, scilicet ad vrgens, causas, & impedimenta: nunquam curabitur morbus, nisi prius causæ, & deinde impedimenta, quæ natura distincta sunt, auferantur.

*Dub.*

*Responsio.*

Quibus sic positis mirandum est quo pacto Chirurghi Empirici audeant nullo facto indicantium examine videri oportere medicinam facere, dum scilicet prius vlceri topicis exsiccantibus vacant, quod vltimo loco esset curandum: errant, quia nisi causæ, & impedimenta vniuersa, quæ in vlceris productionem conspirant, auferantur, vlcus æterno tempore perseveraret, quinimodò nisi esset, positis causis citò fieret, & si aliqua vi supprimeretur, iterum rediret, illudque sordidius: & quamvis obiciant aliqui, quod sordida vlcera aliquando potentissimis exsiccantibus perueniant ad σιμψιστῶν, & coalescant. Respondemus, quod illa sanatio est fucata; quia causæ vlceris in fidam pacem faciunt, exsiccantia enim potentissima solum externam vlceris faciem velant, interimque humores occlusi fiunt magis audaces, & erumpunt in vlcera sordidiora, & maligniora.

*Vi præpostera  
medicina v-  
identur qui in  
vlcere videntur  
exsiccantibus.*

*Ut indicantia  
licet sint cen-  
tum ad qua-  
tuor solum  
reducuntur.*

*A quo ex pro-  
posito affecti-  
bus sit inci-  
pienda cura.*

Causa erroris Empiricorum est, quia Galeni methodus hactenus ad illorum aures non peruenit: methodus est breuissima, indicantia enim, quamuis in vnico ægrotante essent centum, redigi debent ad quatuor: sed hoc ordine, vt prima, quibus attendamus oportet, sint vrgentia: secunda causæ: tertia impedimenta: & postrema sint morbi: si proponeretur vlcus curandum, cui omnes isti affectus essent associati, syncope, hæmorrhagia insignis, affluxus humorum ad partem vlceratam, intemperies, tumor, dolor, imbecillitas, sordes, cauitas, labra vlcusis dura, sinus, caro fungosa, ossium fragmenta, caries ossis, pili, & alia, quæ tertij generis vocantur à Galeno, atque vlcus; dicimus, si adhuc essent mille alij affectus, quod omnes ex Galeno ad quatuor proposita indicantia debeant referri, hoc scilicet modo, vt syncope, & hæmorrhagia referantur ad vrgentia, affluxus humorum, intemperies, tumor, dolor ad causam, sordes, cauitas, labra dura, ossium fragmenta, os corruptum, & pili ad impedimenta; vlcus ad morbum, quod tunc solum curari poterit, quando omnes causæ, & impedimenta erunt ablata. A quo vero vrgente, à qua causa, & à quo impedimento dictorum cura sit incipienda, dicimus, quod à syncope non spretis aliis, quia syncope reducitur ad vrgentia primæ classis, dum scilicet vires statim exoluntur: syncope amota, hæmorrhagia magis potest, quia reducitur ad vrgens secundæ classis, in qua collocantur affectus, qui hactenus non destruxerunt vires, sed solum minantur virium ruinam: amotis vrgentibus statim attendimus causis; causæ erant affluxus, intemperies partis, & dolor: dolori primo attendemus, quia à dolore potest nasci affluxus, & ab affluxu intemperies: lenito dolore vacabimus affluxui, corrigendo viscera, & sanguinem, vbi enim sanguis fluens est imperfectus, vlcus difficile sanatur; hinc Galenus 3. aph. 31. habet, quod si vlcus adueniat senibus, difficile sanetur ob sanguinis defectum, præstat igitur, vt viscera, & sanguis corrigantur, ne amplius sint fluxionis origines: si verò transmitterentur ad vlceratam partem humores, non ob læsionem viscerum superiorum, sed ratione doloris, vel caloris excitati à putre sine vlceratæ partis, vel à medicamentis perperam à Chirurgo administratis, tunc prius dolores essent demulcendi, & statim doloris causæ propositæ, ne iterum excitentur nouæ fluxiones.

*Ut errant, qui in suppurandis apostematibus utuntur  
duris emplastris.*

#### C A P. VIII.

**E**X omnibus, qui in artis medicæ operâ insiliunt, nemo ægrotantes frequentius deludit, quam Empiricus Chirurgus, qui à circulatoribus, vel tonsoribus Medicinam adiscit. Hic simulat-  
que



que se esse Doctorem somniat, vult sermone, vestitu ab omnibus talis existimari: nuper in foro similem, quem multo ante noueram, vi, nobilique toga laruarum, miratus vestitus nouitatem, sciscitabar ab illo, an celebrauerit nuptias; en tandem refert causam, quam nemo vnquam diuinasset, quæerat medendi gratia. Væ illis, qui ab huiusmodi Empiricis tractantur. Hi, si velint medicari apostematibus, nec quot, nec qualia sint indicantia, nec cui primo, cui secundo, vel tertio sit attendendum, percipiunt: si velint suppurare, vtuntur emplastris duris, & tenacibus, sicuti est diachilon simplex, vel cum gummis, quæ emplastrorum genera solida, & dura cum tenacitate adhærescunt, nec vident quod emplastrorum durities, & tenacitates inflammationem augeant; quia impediunt, ne humores effundantur in spatia affectæ partis, dicimus in spatia, quia sanguis nunquam potest fieri pus, nisi postquam egressus est venis maioribus, & minoribus vniuersis; ratio verò, cur sanguis, dum manet in venis, nulla emplastica virtute potest conuerteri in pus, est, quia locus (vt habet Aristot. 4. physicorum) est conseruatiuus locati, hinc ab omnibus accepta est sententia, quod venæ non apostementur, cuius ratio est; quia sanguis in proprio vale in aliam naturam non est transmutabilis. Quod verò sanguis non in venis conuertatur in pus; sed postquam est ab omnibus expulsus, patet apud Galenum libro de tremore præter naturam cap. 3. vbi referens quomodo fiat inflammatio, dicit, inania spatia sanguine repleri ex valis per eorum tunicas resudante: idem 2. ad Glauco. & aliis in locis: nisi exsudat ex venis, non potest fieri pus, quia causa efficiens est concoctrix tunicarum, & membranarum, pus redditur album tunicis nimirum in colore simile, sicuti in mammillis sanguis, & in testibus semen: quæ cum ita sint, opus est, vt pus mouentia sint similia, augeantque caloris substantiam, sed non intendant qualitatem, vt dicit Galenus 5. simp. medic. facult. non conuenient ergo tenacia, & dura emplastra, quia sanguis liberè non conflueret ad spatia, & per consequens non fieret pus: denique est Galeni auctoritas 13. method. cap. 5. vbi clarissimè docet, cur ab emplastris duris in phlegmone sit abstinendum, habet à duris emplastris ob id in phlegmone est abstinendum, quia contrahunt reliquias phlegmonarum, & rursus phlegmonem in ægra parte excitant: dura emplastra debilitant partem, quia sua duritie eam lædunt; deinde excitant dolorem, dum euelluntur, quo excitato confluent humores, & rursus inflammatio in ægra parte promouetur: insuper dura emplastra contrahunt reliquias, quia prohibent, ne egrediarur sanguis è tunicis capillarum venarum, quo non egresso alio tempore promouetur, & inflammationem efficit.

Si igitur rudiores præscirent, quod pars affecta sit puris auctor, eam duris, & tenacibus emplastris non vexarent: si scirent, quod in apostematibus magis potest causa, quam morbus, prius attenderent anodinis, quam emplastris tenacibus: dolor enim subit vicem causæ magis principalis, cui semper prius est attendendum: iis igitur

moti rationibus dicimus, quod omnia emplastra pus mouentia debeant esse mollia, anodina, & non dura, qualia fiunt ex farina triticea, pinguedine, & lacte, sicuti optimè nos docet Galenus 5. simp. cap. 9.

*Ille errata reijciuntur, quæ fiunt dum rudiores prius causis, & morbis, quàm urgentibus attendunt.*

## CAP. VII.

*Errant qui  
lac hectici  
vitant.*

*Medicorum  
præcipuum  
munus quod  
sit.*

*Obiitio.*

*Sol.*

**F**ALLUNTUR aliquando rudiores, dum hectici primi, vel secundi gradus hypocondriorum minimis obstructionibus, vel leui putrida febris vexantur, lac omnino interdunt; nec vident, quod hectici interim lacte non exhibito saltem in pauca quantitate ad tertium gradum propèrant, vnde mors: dicimus, & nos cum Hippocrate 5. aphorismorum 64. quod lac habentibus obstructionem, & putridam febrem exhibere malum sit, sed, quod longè maius malum sit permittere, vt æger certo pereat; habemus enim ex Galeno 7. method. cap. 12. quod vrgenti magis sit attendendum, quam causæ: & 10. method. cap. 10. satius esse nonnulla fiducia, & cum periculo aliquid facere, quam spe adempta certò perire; quare, si viderimus hecticum a dies magis tabescere, cur non licebit humectandi gratia ad lac confugere, illud prius exhibendo in minima quantitate, & deinde, si beneficium maius foret maleficio in maiori? Medicorum enim est præcipuum munus expendere in alteram lancem beneficium, & in alteram maleficio pharmacorum, & quod magis perpendit eligere; nulla est tam perfecta medicina, quæ non lædat: cassia omnium saluberrima stomachum lædit, missio sanguinis vires minuit, animum perturbat: verumtamen, quia speramus, quod inde maius emolumentum, quam detrimentum nascatur, ideo patimur, vt æger lædatur; reuertentes igitur in orbem propositi nostri dicimus, quod milles vidimus, Medicos aliquos potius permisisti, vt hectici perirent, quam eis habentibus leuem obstructionem, vel leuem febrem putridam lac dedisse vidimus tamen hecticos aliquibus obstructionibus & febre putrida: detentos vsu lactis fuisse liberatos, ratio huius est, quia hectica potest esse vrgens, febris putrida, & obstructio impedimenta: semper enim magis potest vrgens in indicando, quàm impedimenta in prohibendo: neque obiiciant ex Hippocrate 5. aphorismorum 64. dicente, lac habentibus tenfa hypocondria, & febrem putridam non conuenire; quia respondemus, quod Hippocratis, Galeni, & omnium medicorum sententiæ considerari possint, vel nulla facta comparatione cum aliis indicantibus, vel cum comparatione; qua posita distinctione dicimus; quod si cum comparatione considerentur, varium quoque sensum habere possint: exempla: dicit Hippocrates, & Galenus 1. sectione aphorismorum 11. quod in paroxysmis æger non sit cibandus: hæc sententia considerata ex se vera est: attamen, si consideretur in

com-



comparatione aliorum indicantium, potest esse falsa: patet, quia Galenus 10. method. 30. picrocholos habentes diatriron nutrit in principio paroxysmi, ne in hecticam labantur, ecce quod facta comparatione beneficij cum maleficio, cibis datur quoque in principio paroxysmi, & ratio est, quia hectica est vrgens, & magis potest, quam diatriron: similiter aliquando magis potest hectica, quam putrida, quo tempore licebit lac exhibere; quamuis sit putrida; qui igitur non ponderat præcepta Hippocratis, & Galeni facta cum aliis comparatione, & expenso indicantium pondere, licet omnes eorum libros memoria tenerent, eorum scientia vt vana, & periculosa debet explodi; magis enim potest hæc sententia, quod primo vrgenti, secundo causæ, tercio impedimentis, & quarto morbis sit attendendum, quam omnes aliæ sententiæ arte propositæ.

Qui vesicantia omnino explodunt, quia ab illis dolores moueantur, vigilæ verò, & febres intendantur, in similem errorem labuntur, quoniam, si reuellerent in contrarium humores virosos petentes cerebrum, & præcauerent phrenesim, & mortem, essent administranda, quamuis alia præterea innumerabilia mala minoris momenti efficerent: itaque non illi cum ratione reiciunt in malignis febribus vesicantium vsum, qui dicunt, inde excitari vigilas, dolores, & dysurias; sed qui probabunt maius ex illis colligi beneficium, quàm maleficium: medicenim munus est perpendere detrimentum, & emolumentum, & deinde minus malum eligere, quod cum ita sit non solum errabunt, qui in omnibus febriëtibus reiciunt phænigmata; verum etiam, qui in omni maligna febre hoc genus remedij proponunt: rudis admodum esset ille medicus, qui posset turgentes, & furiosos humores caput incurstantes frictionibus, balneis, ligaturis, sanguinis missione reuellere, & veller vesicantibus id efficere: stupidus tamen esset quoque ille, qui cum hæc remedia nihil possent, essetque turgens humor, ab his inuincibilis desisteret, & dum certò videat agrotum perire, non conscendat ad potentissima reuulsoria; qualia sunt vesicantia.

*Vi errant qui  
semper in febribus reijciunt vesicantia.*

*Errant, qui  
vesicantia in omni maligna febre proponunt.*

Errare videntur, quia omnem conuulsionem factam à repletione cutant iis, quæ excitant febrem, vt est confectio anacardina, castoreum, lasafras, oleum de terebērina, nulla prius facta distinctione inter vrgens, & causam, quia sic spernunt vrgens, & causæ attendunt; vrgens est virtus neruorum imbecillis, quæ à calidis non custoditur, sed aliquando resoluitur, & enervatur: quod verò ita sit patet ex Galeno 5. sect. aphorismorum com. 20. qui dicit, calida reddere neruos imbecilles, quia dissolunt eorum substantiam: similiter 6. method. 2. dicens, quod neruea substantia est resolubilis, habet hæc, ablutio aquæ calidæ est inimica vulneratis neruis, quia conditi sunt ex frigida, & concreta humiditate; si igitur aquæ calidæ percussio neruis noceat, multo magis calidiora nocebunt. Secundo paralogizant, quia à particulari ad vniuersale procedunt: non valet, quamuis Hippocrates, & Galenus 4. aphorismorum 70. dicant febrem quartanam super-

*Vi errant, qui conuulsionem curant iis, quæ excitant febrem.*

*Conuulsio ex  
inanitione læ-  
thalis.*

*Ex inanitione  
non læthalis.*

*Erratum illo-  
rum, qui cu-  
rant conuul-  
sionem.*

*Ut noscatur,  
& curatur  
conuulsio ex  
repletione.*

*Aqua frigida  
quando inuat  
conuulsioni.*

uenientem conuulsis, eos sanare, ergo omnes conuulsos sanabit, quia par est prius, ut differentiarum conuulsionum in medium afferantur, & deinde ex specifica differentia affectus, & non generica remedia colligantur, dicimus igitur ex Galeno, quod alia conuulsio fit ex inanitione, & alia ex repletionem: quæ fit ex inanitione faciliè cognoscitur; quia fieri solet, post ingentissimum calorem vigilias, fluxum alui, vel aliarum partium, & hæc est læthalis, & solo prognostico relinquitur; quoniam absumpta est substantia neruea, quæ non amplius refarcitur; adest tamen alia conuulsio ex inanitione, quæ non est læthalis, quia non absumitur natiua neruorum substantia; sed solum ros, ut accidit in hæticis primi gradus, & hæc humiditas potest restitui; huiusmodi conuulsiones fieri solent à vaporibus malignis ortis ab æruginosis succis, vel à morfu venenati animalis: quod vapores expirati ab æruginosis succis aliquando conuulsiones efficiant, testis est Galenus 1. aphorismorum com. 5. 12. method. cap. 8 & 5. de loc. affectis cap. 9. vbi de quodam iuvene habet hæc verba, æruginè per vomitum euacuata, febris, & conuulsio illicò cessauit: in hoc loco erratum quorundam notatur, qui conuulsionem à vaporibus æruginosis factam, auxiliis uicinis tractasse vidimus, quæ miserum nisi natura æruginoso vomitu iuuasset, certò periisset. Quæ verò fit ex repletionem faciliè quoque cognoscitur, quia nullo præcedente morbo tales conuelluntur, quod quoque docet Galenus 2. aphorismorum 29. vbi dicit, sanus conuellitur, est ex repetitione: hæc verò conuulsio modo est cum febre, modo sine febre; si cum febre, potest esse illa, quæ ab apostemate fit; si sine febre, illa quæ refertur à Galeno 3. prælag. 39. vbi dicit, excitari conuulsionem sine febre à vehemente refrigeratione, & à copia crudorum, & crassorum humorum: quod postremum reuulsionis genus calore febrili expellitur, vel si habitus est carnosus, perfusione aquæ frigidæ curatur. Refert Galenus 5. aphorismorum 21. se iuuenem conuulsam curasse aquæ frigidæ perfusione; ratio curationis est, quia aquæ frigiditas reuocat ad internas partes calorem, qui deinde melius discutit frigidos humores in neruis insertos, quod remedium non solum fuit acceptum à Græcis, verum fuit maximè in vfu, & de illo Paulus vbi agit de spasmo nos docet aliqua pertinentia ad eius vsum, dicit enim aquam frigidam lædere conuulsam, vel quando non est opimi, & carnosus habitus, vel quando conuulsio pendet ab apostemate. Colligas ergo ex Galeno calida non confetre conuulsioni factæ ab apostemate, neque illi, quæ efficitur à duritie relicta in fine apostematis, quia calidorum vfu, crassi humores lapidescunt, neque illi conuulsioni, quæ ex aëre calida, vel ex morfu fit, quia redderetur affectum incurabilem: relinquitur, ut conueniant conuulsioni factæ à frigidis, & pituitosis humoribus alimentalibus, & non crudis, & concoctioni ineptis; pituitosi enim humores sunt in duplici differentia, alij alimentales, alij crudi, vitrei, & inepti, ut conuertantur in nutrimentum, quos calida, & febrem excitantia duriores efficiant, hanc sententiam ad verbum explicat Galenus 2. aphorismorum 29. his verbis, febrem curare conuul-



conuulsionem factam ab humoribus glutinosis, & frigidis quibus nutriuntur; tales enim virtute calidorum liquefcunt, & partim in sudorem, & vaporem abeunt, partim verò in substantiam nutritiæ, crudi vero & vitrei, calorificis in topfos, & scyrthos conuertuntur. Quod errent, qui videntur calidis in conuulsionibus factis à pituita non alimentali, ex dictis patet, parebit quoque, quod Empirici aliquando errent, dum in conuulsione facta à pituita alimentali videntur calidis, quia sperata, methodo non ponderant causam, & vrgens, sæpè enim euenit, vt in huiusmodi conuulsis virtus neruorum sit adedò imbecillis, vt magis possit in indicando sui custodiam, quam possit causa pituitosa sui ablationem: hinc calida, quæ sua natura possent pituitam alimentalem digerere, quia debile; neruos in deteriore conditionem reducerent, Galenus respicit, dicit enim 5. aphorismorum com. 20. huiusmodi calida resoluerè substantiam neruofam: sæpissimè experientia nos docuit conuulsos ex repletionè frigidorum humorum vfu calidorum morte fuisse peremptos.

Falluntur, qui purgant ventriculi cruditates, dum stomachus morsum patitur, antequam corroboretur: erratum est illius generis, dum pluri faciunt causam, quam vrgens: causa est cruditas, oris morsus, est vrgens, cui prius est attendendum. Galenus 1. ad Glau. cap. 14. habet hæc verba, si quis febricitet, & adsit ei plethorica dispositio, & ex recentibus cruditatibus sit, sentiatque morsum, & afflictum os ventriculi, vel etiam euomuerit humorem malum, & in transitu esset læsum os ventriculi, vt anxie, & grauiter se habeat, prius stomachum corroborare debemus, & deinde euacuare: addit, & aliquos perisse vidi, & in periculum fuisse perductos ob euacuationem non roborato prius ore ventriculi: sæpè rudiores in febrientibus existente plenitudine, nausea, stomachi cruditate, vomitu æruginosi mordentis os ventriculi confugiunt ad vomitoria, vel ad medicinas purgatorias, sperata vitali indicatione, quæ consistit, vt roboretur os ventriculi: ~~istis autem~~ medicinam faciunt magno cum ægrotantis discrimine: prius igitur intrinsecus, & deinde extrinsecus esset stomachus roborandus, intrinsecus id fiet mastiche, pane igne tosto vinoque austero madefacto, vel granatorum: extrinsecus emplastro à Galeno 1. ad Glau. cap. 14. proposito, quod factum est palmulis, vino, farina hordei, croco, aloë, mastiche, madefactumue sit oleo mastichino, nardino, enanthe, vino, & iis, quæ constant ex absinthio.

Similiter, qui in spleneticis incipiunt ab aperiētibus, & non astringentibus aberrant, quia pluri faciunt indicationem præseruatoriam, quam vitalem: quod nullomodo in partibus flaccidis, vt est lien, est faciendum: vtimur in iis aqua calibeara, tamarisco, scolopendrio, electuario ex calibe, quæ omnia virtutem astringentiam habent: hæc roborant lienem, & roboratus redditur valentior in expellendis excrementis; deinde eadem virtus astringentia defendit, ne fluentes humores à liene recipiantur: quam doctrinam apud Galenum legimus 2. method. cap. 16. vbi dicit, in lienis affectibus esse medicamentis ad-

*Errant, qui videntur calidis in conuulsionibus pituitosis.*

*Errant qui purgant stomachum dum morsum patitur.*

*Errant, qui in spleneticis incipiunt ab aperiētibus & non astringentibus.*

in scenda astringentia, ratio est, quia omnia aperientia destituta virtute astringentia inflant lienem: comprobatur experientia; saccharum, mel, & dulcia omnia, quæ aperientia sunt, tumidum ventrem, lienem, & quamlibet partem laxam lædere possunt: prima igitur indicatio in parte flaccida excrementis quoque imbuta est robur addere parti: secunda, est causam profligare; prima enim merito desumitur à vita, secunda à causa: miscentur igitur cum aperientibus roborantia, vel eligantur aperientia, quæ dissimilarem virtutem habent, ut tamariscus, citrach, & alia id genus.

*Vi errant qui  
apparentibus  
papulis sem-  
per respuunt  
sanguinis e-  
vacuationem  
à cubito.*

Aberrant, dum firmiter tenent apparentibus papulis in maligna febre nunquam esse mittendum sanguinem à cubito: quia quamvis materia putrida indicat esse eo, quo vergit educendum, attamen si adesset vrgens, quod indicaret per cubitum esse sanguinem extrahendum, ei prius attendere oporteret, & non materię putridę, quo vsu in maximum prolaberentur errorem, qui vterentur cucurbitulis; Quod verò in malignis febribus, in quibus sint papulę contingere possit hoc vrgens, patet; experientia enim sæpè vidimus, in ægrotante febres malignas, papulas, & anginam, quæ suffocationem minabatur, vniri, cui dubium, quod tunc angina est vrgens, cui prius attendamus oportet, & quod angina indicat, ut potius per cubitum sanguis copiosè extrahatur, & deinde per venam linguę: similiter, si febre malignę associetur pleuritis, vel iecoris inflammatio talis, quæ vicem vrgentis secundę classis subiret, cui dubium, quod magis indicaret inflammatio, quam materia seu vapor putridas procliuis ad cutim efficiens papulas? & quod potius cubitum secundum, quam cucurbitulę applicandę sint. Idem si magna exsurgeret phrenesis à copia sanguinis prodiens, copia, cum sit prima radix, cui dubium, quod melius, citiusque per cubitum, quam per cucurbitulas tolli posset? Denique posset contingere, ut tota massa sanguinea ob copiam sanguinis inciperet putrescere, quod malum non potest arceri, nisi phlebotomia, quo casu, licet totum dorsum esset exanthematibus respectum, cucurbitulas sperneremus, & cubitum aperiremus, & merito; quia nisi copia per venam cubiti minueretur, certo æger periret.

*Vi errat, qui  
congelatos pe-  
des putans  
esse calefa-  
ciendos.*

Errant, dum in iis, quorum pedes præ nimio frigore adedò torpidi, & congelati fiunt, ut sensum, & motum amittant, spernunt vrgens, id est indicationem vitalem, & attendunt causę, id est congelationi: tales enim, qui curant semiviuos pedes non cogitant vitale auxilium, quod prohibeat ne pedum vita extinguatur, sed solum auxilium calefaciens, scilicet hoc imperu incedentes in omni ægritudine, ut credant prius causis, quam vrgentibus vacandum: admittunt, ut illi igne calefiant; nec vident, quod calor externus statim dissolvit nativum robur, & deinde moritur pars congelata, eaque mortua, nisi abscindatur pes, totum trahitur in consensum, & animal cito pereat oportet. Duo hic committuntur errata, alterum dum nesciunt, quę sint vrgentia, alterum dum primò causis, quàm vrgentibus attendunt: non latet est Medico, ut indicationes omnes colligat, sed oportet, ut in ordi-  
nem

*Duo errata  
vidiorum.*



nem eas redigat, & perfectè sciat, cui primò, cui secūdò, cui tertio, & quartò sit attendendum, nullus enim est error magis insignis in arte medica, quàm *scire, quid sit* medicinam facere: vanissimi enim sunt, qui quotidie sine vllò indicatium æquilibrium dicunt intemperies frigida indicat calefaciendum, materia crassa incidendū, viscida detergendum, copiosa euacuandum petens partem principem auertendū, pars viribus perditā roborandum, non perfectè scientes cui primò, & cui secūdò loco sit vacandum: in præsentī casu pedes vt frigidi indicant esse calefaciendos, vt viribus destituti custodiendos iis, quæ possunt impedire, ne calor natiuus dissoluatur, cui dubium, quod in primis est attendendum vitæ parti, & deinde causæ, qui enim secus efficeret, incideret in illum sermonem à Galeno citatum 2. ad Glaucl. scilicet, morbus est sanatus, homo autem perit, qui igitur prius attendunt vrgenti, quique congelationem pedum sciunt sanare, curant, vt vita pedum conseruetur hoc modo, iubent, vt immergantur in aquā frigidā recenter à fonte haustā, detineanturq; horæ spacio, sic certò sanantur: quem curandi modum multoties in Vngaria vidimus, ratio sanationis est, quia aqua vnit calorem debilem, & ferè extinctum, & simul tollit siccitatem congelationis, qua amota promptè natiuus calor fouetur ab influente, & sic non extinguatur, sed potius augetur.

Sed occurrit quia, quæ congelantur à frigido, liquefiunt à calido, *Dub.* quare pedes vel aliæ partes à summo frigore congelatæ calidis, & non aqua frigida deberent sanari; antecedens auctoritate Aristot. & experientia videtur verum; glacies à frigido congelatur, & à calido dissoluitur; oleum incrassatur à frigido, & liquefit à calido, similiter pix, cera, metalla, & reliqua omnia, quæ à frigido densantur à calido liquefiunt: similiter dicunt, si pedes fuerint congelati à frigido, hæc congelatio debet à calido vinci, & superari.

Respondetur, dum dicunt, quæ congelantur à frigore à calido dissolui; at pedes congelantur à frigore, ergo à calido dissoluentur: argumentum esse verissimum, sed merè philosophicum, & non medicum, quia nullam habet relationem ad sanitatem, quia philosophi, dū pars congelata à frigore, dissoluitur à calido, nihili existimāt, an inde morbus, & mors partis, vel sanitas sequatur: pertinet tamen hæc cōsideratio ad medicum, qui pro virili sanitatē, & vitam cōseruat: si calor externus non destrueret partem, longè melius esset congelatos illicò calefacere, vt statim omnia liquefcerent, sed cum destruat hoc modo pars viuens, medici officium erit id respuere. Quæ ab Arist. in lib. merthe. habentur, dum dicit, crystallum, & adamantem ab ingenti calore dissolui: aurifices, qui volunt integros adamantes, & crystallos conseruare non recipiunt: similiter medici à philosophis sunt omnino diuersi, quoniam fines sunt quoque diuersi; philosophi veritatem, medici sanitatem quærunt.

Insuperauctoritas Arist. si eam rectè interpretabimur, non aduersabitur nobis: dicimus, quæ cōgelantur frigido & sicco, vel summè cō-

*Propositio:*  
quæ congelantur à frigido,

& sicco dissol-  
vuntur à ca-  
lido, ut in tel-  
gatur.

gelari, vel remissè, si summè, dicimus, quod dissoluuntur solum à ve-  
hementissimo calore, ut crystallus, & adamas; si remissè conge-  
lantur, dissoluuntur, tum à calido humido actu, tum ab humi-  
do frigido, sed hoc discrimine, ut calidum humidum actu dissol-  
uat, & consumet, humidum verò frigidum dissoluatur, & non con-  
sumet: hinc fit, quod quibus congelantur pedes, aqua calida, vel  
calido igneo pars congelata consumitur, & perit; si verò in aquam  
frigidam imponuntur, ob aquæ humiditatem frigiditas dissol-  
vitur, & non perit pars, & causa est, quia aqua frigida à fonte pro-  
fundo hausta non habet vim absumendi calidum nativum: patet ex-  
perientia, quia dum iniicitur glacies in aquam frigidam dissolvitur, &  
non absumitur, si verò in aqua calidam, vel in ignem, nō solum glacies  
dissolvitur, sed aliquatulum absumitur, quia in vaporem aliquæ par-  
tes abeunt: neq; obiciant, quod humidum non dissoluatur frigidum,  
quia non est eius contrarium; quia respōdemus, quod humidum dis-  
soluit frigidum congelatum, quatenus omnis congelatio sua siccitate  
lædit: torpor in partibus congelatis fit immediatè à sicco, & nō à fri-  
gido: hinc Galenus i. simpl. med. fac. dicit, quod congelari sit præ fri-  
gore durescere; at dura redduntur molliora sua contrario, humiditate  
scilicet redditaq; parte congelata molliori, robur nativum semivivæ par-  
tis ab influente potest refocillari, & nutriri, quod antea non poterat.

Obiect.

*Casus in quibus Empirici pluri faciunt morbum, quam  
impedimenta.*

C A P. I X.

Ut errant dū  
permittunt  
ut totum pus  
ex apostemate  
exeat.

**O**STENSUM est superius, quod post urgentia primo causis, deinde  
impedimentis, & tandem morbis attendendum: non desunt ta-  
men casus in quibus rudiores, spreto hoc mirabili medendi ordine,  
pluri faciunt morbum, quam impedimenta. Hoc erratum præcipuè  
obseruatur, dum apostema cum copioso pure, & duritie secatur, & per-  
mittunt, ut statim (nullo expenso indicantium æquilibrio) totū egre-  
diatur; pluri faciunt magnitudinem auctam, quam subiectam duri-  
tiem: deberent doloris demulcendi gratia permittere, ut solum puris  
aliqua portio egrederetur; pus enim coctum, dum relinquitur, deter-  
git, & secatur materiam, quæ efficit duritiem, & eam dissolvit, & liquat:  
nullum medicamentum locale tanti est in duritie inflammationis au-  
ferenda, quanti est pus: quinimmo, dum pus totum evacuat, mate-  
ria, quæ relinquitur pori duritiem subit, & aliquando redditur incu-  
rabilis: reluctantur Galeno 13. meth. cap. 5. ubi apertè iis verbis reiecit,  
qui incidunt apostema, & totū pus evacuant, si pus aliquod notabile  
in suppurante particula sit contentum, non expedit (quod non nulli  
faciunt) protinus incidere; sed digestionem molliori medicamenti ad-  
id valentibus, quippe cum phlegmones naturæ, si quicquam in mē-  
bro adhuc restat, acriter medicamenta magis irritant, quā digerant. Ga-  
leni quoq; tēpore aderat, qui totum pus egredi permittebant, adeoq;  
duros, & scyrrhosos tumores reddebāt, ut nec resoluētibus, nec mol-

licantibus



lientibus poterant superare, resoluentia non superant duritiem; quia tenue absument, & quod relinquitur lapidescit. Emollientia non possunt id efficere; quia humor durus debet secari, & attenuari ad minima, quod non ab emollientibus externis, sed à pure tangente rebellé humoré; pus enim est efficiens proximum, & eiusdem speciei, quod vnicé secare & attenuare potest. Insuper aduersantur methodo à Galeno propositæ 7. method. cap. 12. vbi post vrgentia primò causis; secundo impedimentis, & demum morbis vult esse vacandum: qui prius tollunt totum pus, quam duritiem, pluris faciunt morbum, quam causam sine qua non, seu impedimentum, quod in idem recidit: durities est causa sine qua non tollitur inflammatio, licet enim totum pus egrediatur, si durities aliqua relinquatur, iterum inflammabitur pars: magnitudo aucta ob puris copiam est morbus; non licet in methodo prius attendere magnitudini auctæ, quæ est morbus, quam duritiei, quæ esse potest causa.

Similiter, dum hæmorrhoidarum symptomata vrgentia ab humoreque sanguineo prouenientia curant applicando vnguenta, sanguifugas, & similia, spernunt causam, quæ est humor prodiens à supernis partibus; primò enim humori fluenti, & fluxuro est vacandum reuelentibus: accommodatissimum auxilium reuulsorium in arcenda passione hæmorrhoidum à fluxione humorum facta, est sanguinis euacuatio per saluatellam, si bis, terue tridui spacio tundatur.

*Vi errat dum symptomata hæmorrhoidæ hirudinibus tollunt.*

*Errata illorum, qui potius indicantibus, quam prohibentibus potentioribus attendunt.*

CAPUT X.

**Q**VI vtuntur diureticis in iis, qui abundant cruditatibus, vt plurimum ægros lædunt, quia sæpenumero magis potest cruditas in prohibendo, quam possit in indicando; dicimus sæpè, & non semper; quia dum vrina in supernis partibus detinetur, & omnino supprimitur; tunc licet cruditas magna sit; nihilominus ad potentissima diuretica, qualia sunt cantarides, confugimus; quod cruditas magis prohibeat diuretica, quam indicet, est Galeni 4. de tuenda sanitate, vbi habetur, quod diuretica non sint in habentibus cruditates exhibenda; quia sanguinem calefaciunt, & liquant; additque non conuenire humoribus, qui debet coqui, tantam vexationem, & meritò, quia concoctio ex Hipp. 4. de ratione vict. in acut. 44. quiete fit. Insuper diuretica secum ferunt cruditates ad intra venas, vnde obstructions, & putredines fiunt. Amplius diureticis secernuntur tenues, & relinquuntur crassiores humores. Gal. 5. de simp. med. fac. c. 12. interdicebat diuretica iis, qui expunt pus, quia secretis ichonibus pus crassius & tenacius redditur; addit loco citato, diuretica nobis aduersari, quia sunt calefactoria, exsiccatoria, secretoria, & constictoria; inde colligi potest in asthmaticis diuretica non habere locum: quinimmo, nec medicamentum.

*Errant, qui vtuntur diureticis in habentibus cruditates.*

*Coctio quiescit.*

quæ serofos humores euacuant, qualia sunt mana, elaterium, scammonium, & alia id genus.

*Errant, qui  
dant manam  
habentibus  
crudos succos  
in pectore.*

In hoc loco illorum opinio reiici potest, qui cum intellexerint, manam esse pectori amicam, eam porrigunt iis, qui pectus cruditatibus onustum habent; nec vident, crudos succos crassiores, & concoctioni magis rebelles fieri, dum secernitur ferrum: sapissimè experientia cognouimus, similes exhibitione manæ in deterrimum statum fuisse prolapsos: natura vult crassos succos reddere fluidos: qui verò exhibent manam, scammonium secernunt ichores, & reliquias humorum crassiores efficiunt, quod reluctatur Hippocrati, qui secunda sectione aph. 9. dicit, quod corpora purganda sunt facienda fluida: sicuti crudus humor non est medicamento euacuandus, quia solum cocti, seu si uidi humores apti sunt euacuationi, similiter crudus humor non erit diureticis mouendus; quoniam usu diureticorum secernuntur ichores, & inde crassiores, & tenaciores euadunt humores, sicuti medicamenta non conueniunt, quia siccant, & calfaciunt; similiter diuretica non conueniunt; sicuti medicamenta commotionem, & vexationem faciendo concoctioni sunt impedimento, idem de diureticis dici poterit.

*Errant, qui  
in principiis  
morborum  
dant lac se-  
minum mellonum.*

Hinc errant, qui in principiis morborum, quando corpora crudis succis abundant exhibent lac seminum mellonum, petroselinum, & alia id genus: similiter errant, dum in nephriticis, & artritide catenatis refertis cruditatibus. vtuntur terebintho cyprii: idem, qui vtuntur mouentibus menses, dum corpus est cruditatibus onustum, lædunt, nisi euacuatio totius præcedat, quin immò sæpè mouentur menses à lecta basilica, quia depleto venarum trunco, qui est tanquam omnium venarum fons, venulæ utri vnde quaque nimietate sanguinis crassioris, & tenacioris obstruuntur statim aperiuntur, & natura inde promptius suorum officiorum munera explet.

Si verò cruditas, non ut causa morbi, sed ut vrgens, indicaret, tunc prohibentia superius relata non haberent locum, quia semper magis posset vrgens, quam causa: sunt quibus vrina supprimitur, quod symptoma subit vicem vrgentis, tunc speritis prohibentibus vtuntur valentissimis diureticis: similiter dum crudi humores habent impetum ad cor, vel ad cerebrum, tunc reuulsionis gratia vtuntur catharticis, & diureticis; quia magis potest imminens periculum, ne scilicet virtus visceris principalis cadat, quam possit cruditas, & reliqui affectus, qui non pertinent ad vrgentia primæ, vel secundæ classis.

*Errant dum  
in principiis  
morborum  
vtuntur fric-  
tionibus, bal-  
neis & cucur-  
bitulis.*

Similiter spernunt Rudiores prohibentia potentiora, & accedunt indicantibus leuioribus, dum crudis existentibus humoribus vtuntur frictionibus, balneis, exercitio, cucurbitulis, & inunctionibus foras cruda trahentibus, quod erratum à Galeno quarto de tuenda sanitate capite sexto reprehenditur, ubi habet ferè hæc verba, cauendum est, ne crudi succi foras trahantur, & ne mordaces intro reuocentur, quæ verò foras trahere possunt crudos humores sunt exercitatio, & frictio, & balneum & fomenta calida, & vntio calefaciens: quot sunt Empirici, qui in principiis morborum vtuntur frictionibus, balneis, fomentis calidis,



calidis, & inunctionibus calidis spreta Galeni auctoritate, & ratione, quæ apertè suadet, ne cruda trahantur à maioribus ad minores venas ob insignes obstructions, quas cruda efficerent.

*Ostenditur exemplo localium, quòd qualibet sententia medicorum sit methodi censura moderanda.*

CAPVT XI.

**V**IDENTVR aberrare, qui seuerè sustinent, localia nunquam applicari posse sine totius purgatione; quod illos mouet est Galeni auctoritas, ratio, & experientia: quorum fundamenta cum sine methodo sint expensa, erunt reiicienda: afferunt Galeni locum secundo de locis affectis tertio, vbi legitur, quod topica semper sint adhibenda præmissa totius corporis euacuatione. Alius locus est secundo ad Glau. capite secundo, vbi dicit, quod duo comittuntur errata in inflammationibus, primum, dum non habetur prouidentia totius: secundum, dum laxantibus vtimur; addit Galenus, prius totum esse euacuandum; secundo esse repellendum; tertio detergendum, quarto robur esse parti affectæ addendum. Demum quarto Methodi quarto dicit, totum prius esse euacuandum à superuacuis, quod Empirici, Dogmatici, & omnes Philosophi admittunt præter Thesalum. Hoc loco animaduerti potest differentia inter priscos Empiricos, & nostrates; illi enim ante localium appositionem semper purgabant: ij verò nunquam cogitant totius euacuationem; quod est longè maius erratum. Ratio, qua vtuntur, cur ante appositionem localium semper sit corpus purgandum, est, quia si fiet morbus à causis internis purgando totum remouebimus morbum tollendo eius causas, si ab externis, purgando ab excrementis internis non fouebitur morbus. Experientia probatur, quia ocuis sanantur à Chirurgis, qui purgantur: colligunt itaque ante localium appositionem semper esse purgandum totum.

Nihilominus, dum medicus Dogmaticus animum conuertit ad indicantium potentiam, videbit quod aliquando quælibet auctoritas Galeni expensa extra methodum potest lectorem fallere, & decipere, quia qualibet causa, & quodlibet impedimentum, dum vrgens superuenit, spernitur. Exempla in medicina sunt innumerabilia. Hippocrates in principio Paroxysmorum dicit, nullum esse dandum cibum; at tamen, si methodo considerabitur sententia Hippocratis, inueniemus, quod aliquando non sit vera; sicuti in pichrocolis, & his, qui diarriton habent, de quibus loquens Galenus octauo Methodi secundo dicit, quod in principio accessionis, ne in marasimum cadant, sint nutriendi: ecce, quod medica præcepta, nisi methodo ponderentur, sæpè nos fallere possint. Quinimò quodlibet Galeni, & Hippocratis remedium vanum reddi potest non seruata sententia proposita 3. methodi 9. & 12. methodi 12. quæ est, primo vrgenti esse attendendum,

*Errant dum nunquā applicans localia absque purgatione.*

*Vt omnes sententia Hippocratis sint methodi censura subiectæ.*

secundo causæ principali, tertio causæ sine qua non, & quarto morbis: febris, ut febris non exposcit vinum, similiter bilis, quæ potest esse causa febris vino augetur, nihilominus, si cum febre esset syncopæ, vinum esset exhibendum propter urgentem: similiter in aneurismate abscindimus arterias; in morfu viperæ manus, quia urgentia sic præcipiunt: ad eundem modum dicimus, quod totum hac conditione ante localium appositionem est purgandum, scilicet nisi aliquod vrgens im-

*Cur in cædro  
licet vti re-  
pellentibus in  
principio.*

pediat. Hinc Galenus 14. meth. 9. dicit, in cancro tam in purgationis tempore, quam ante esse repellendum; si igitur topicis repellentibus vti possimus in cancro, licet corpus non sit purgatum, sequitur, quod hæc sententia, quod localia non apponantur nisi purgetur totum, non sit semper vera; ratio desumitur ab urgente indicante, quod magis potest, quam causa: vrgens est imminens periculum, ne locus affectus ob concursum humoris attri moriatur, causa est humor ater, hinc est, quod prima die vitimur repellentibus in cancro gratia conseruationis partis: neque obiciant, quod non conueniat repellere à parte ignobili-  
**Obiect.** *lioni ad nobiliorē, quia dum agitur de vita partis, agitur de urgente, dum, verò dicimus, quod non conueniat ab ignobiliore ad nobilio-  
**Sol.** rem partem repellere sine consideratione vitæ partis, agitur de indicante: præterea repulsus humor, & receptus à sanis partibus longè melius, & expeditius poterit sufferri. Hinc Galen. 14. method. 17. loquens de herpete dicit, aliquando humoris paucillum repelli ad interna sine damno, quia viscera interna, ut fortiora promptius superat, & resoluunt noxia excrementa, hæc sunt Galeni verba: etiam si modicum repellatur in corpus, & ad partes principes, id damnum non*

*Quando licet  
repellere ad  
partes princi-  
pes.*

infert, cum à visceribus resoluetur: dum igitur corpus non valde abundat biliosis succis, & herpes incipiat, pluri faciendum est, ne aliqua corporis particula exedatur, quam biliosi succi, qui tamē neque multi, neque valde mordaces sunt, quamuis impellantur ad viscera interna, quia ibi facilius superantur. Hinc, dum Phrænesis derepente adoritur ægrotantem, vitimur prima die repellentibus, videlicet oxyrodinis, & deinde statim incipimus corpus expurgare; & ratio est, quia quæ purgant totum respiciunt ad causam: quæ caput tutantur respiciunt ad vrgens, cui primo est attendendum. Hic quorundam error notatur, dum in phrænesi incipiente non audent prima die vti oxyrodinis; errant, quia interim, dum totum purgant, vacant primò causæ, & deinde vrgenti; quæ præpostera medicina mortis causa in plurimis esse potest, quoniam, dum humor in caput est confluxus, & extra venas est expulsus, non potest amplius repercutientibus propelli, quin immò ibi manente humore, plura exitiosa, & vrgentia symptomata exurgunt.

*Vi errant, qui  
prima die in  
phrænesi non  
audent vti o-  
xyrodino.*

*Ante purga-  
tionem totius  
digerentibus v-  
ti possumus.*

Insuper præter topica repellentia possunt aliquando administrari ante totius purgationē digerentia, quia ut plurimum pro sedandis doloribus vitimur omni tempore anodynīs digerentibus, calidis scilicet in primo gradu, & tenuium partium: causa verò, cur ante totius purgationē liceat vti anodynīs, est, quia dolor, si magnus sit, subit vicem vrgentis,



gētis, si mediocri quoq; sit, subit vicem causæ magis principalis, cui prius est vacandum, quam impedimentis, in quorum cathalogo collocantur totius excrementa. Galenus tertio de morbis vulgarib. com. 3. text. 76. docet, quando fomentis, iisque humidis vti possimus ante totius purgationem; habetque hæc verba, nisi ex antecedenti vietus ratione nulla plenitudo in corpore appareat, vti licebit remediis localibus ad dolorem mitigandum, vt fomentis, humidisq; medicamentis, & facultate calidis, & si per hæc non sedetur, totum corpus euacuandum: valebit ergo ex Gal. præcessit moderata viuendi ratio, ergo localia anodyna ante totius purgationem parti dolenti possunt applicari, quod nō dicimus de insigni dolore, quia subit vicem vrgentis, vehemens enim dolor, quāuis maxima sit corporis plenitudo prius trahit ad se curationem, quam corpus purgetur: quod Galenus, & Hippocrates vti sint localib. ante euacuationem totius, plurima sunt exempla: in Anaxione sexta die Hippocrates vsus est fomentationibus, vt dolorem auferret, & deinde octaua die secuit cubitum: similiter in Larissa caluo apposuit fomenta coxis ante totius purgationem, vt illuc excrementa confluerent. Præterea Gal. 13. meth. cap. 5. dicit, si corpus non sit plethoricum, vel prauo succoredunder, calida, & humida super phlegmonem apponemus, vt lana calente oleo imbuta, & calidum cataplasma vlceri ex farina triticea, hordeacea cū aqua, & oleo, idem quoq; cōuenit adenis, si inflammentur: at si corpus sit plethoricum, vel cachocimum, hæc laxantia excitant fluxionem ad locū affectum, ecce quod sententia, quod localia nō sint apponenda, nisi purgato corpore, non est perpetuæ veritatis: insuper primo de humorib. Com. 12. habentur hæc: si corpus non habeat plenitudinem, vel sit refertum malis humoribus in pleuritide statim confugimus ad localia, de qua re diximus etiam in casu Anaxionis.

*Casus dum Hippocr. vti-  
tur topicis  
ante purga-  
tionem.*

Ad fundamenta illorum, qui semper ante localium vsum euacuāt totum, facilis est responsio, quia nos admittimus, Galeni auctoritates propositas solum esse intelligendas remotis vrgētibus, dum enim topica indicantur ab vrgentib. spernuntur morbi, causæ; & impedimenta, & illis primò attendimus. Concludi igitur potest quod facta comparatione inter morbum, & causam, si topica applicentur morbo, absque causæ ablatione, vanum reddi topicorum vsum: topicaq; applicari posse ante euacuationem totius, dum dolor est insignis, quia est vrgens: similiter, dum corpus non indiget purgatione, quia sit excrementorum expers, vt de Larissa caluo dictū est. Insuper dicimus topica prima die applicari, quando dolor est præcipua causa fluxionis, vt de Anaxione dictum est.

*Aduersarios  
rum funda-  
menta de-  
struuntur.*

Hinc errant, qui in seuiſſimis doloribus articularibus statim, quāuis non sit totum euacuatum, non vtuntur anodynis, errant inquam, quia insignis dolor subit vicem vrgentis; secundo errant, quia est causa principalis fluxionis, cui secundo loco est attendendum: errant similiter nonnulli, qui eadem seueritate detestantur anodyna ante euacuationem totius in iis, qui dolore insigni cruciantur, æquē ac in iis, qui mediocri vexantur.

*Errant qui  
prima die in  
dolorib. arti-  
cularib. ano-  
dyna non ap-  
plicant.*

*An febribus cum alui fluxu conueniat pharmacum, vel phlebotomia.*

## CAP. XII.

**D**VM in ægro multæ ſcuiunt ægritudines, Medicus, niſi prænoſceret quæ ſint vrgentes, & inter illas, quæ magis vrgeat; quæ ſint cauſæ aliorum, & inter cauſas, quæ magis foueat, & inter impedimenta quod primò, & principaliter impedit, non Medici nomen, ſed circulatoris breui ſpacio ſibi compararet: hoc ſanè conuenit ſtudioſis, qui non expendunt, vel examinant methodi arcana, ſed ſolum colligunt Galeni, & Hippocratis ſententias, illiſque mouentur, nulla facta affectuum comparatione, ſeu indicantium examine, exemplum, qui diatricon excolebant, in paroxiſmis cibum non dabant, hocque conſentiebatur aphoriſmo Hippocratis dicentis, in paroxiſmis eſſe abſtinendū à cibo, attamen Galenus docet, eſſe nutriendos diatriceos in principio acceſſionis, quod non reſtatur Hippocrati, qui in aphoriſmo propoſito reſpicit ad cauſam præter naturam, quæ ſe vera non poteſt à natura vinci, dum eſt intèra, & occupata expulſioni putreſcentis humoris; Galenus verò nō ad cauſas, ſed ad vrgentia reſpexit, ne ſcilicet diatricei ſiant rabidi, & certò pereant, quod quam maximè vrget.

*Duplex medicorum ſeſta proponitur.*

Hac diſtinctione admoniti decidere poterimus illam noſtratum quæſtionem, quæ eſt, an in febrientibus cum alui fluore liceat vti medicinis, & phlebotomia: noſtrates enim ſunt bipartiti: aliqui tenent, quod in febrientibus cum alui fluore nunquam ſit ſanguis mittendus, vel pharmacum exhibendum; quamuis euacuatio non ſit præ multitudinis ratione. Aliqui, inter quos eſt Antonius ab Altomari, dicunt, quod ſi natura non integrè moueat, quamuis fluxus non ſit præ multitudinis ratione, poſſit pharmaco, & phlebotomia curari.

*Vtraque ſeſta reprehenditur.*

Vtraque tamen Medicorum ſeſta à præcipuis Galeni fundamentis deſſectere videtur; quia moueat natura integrè, vel non integrè, accidit, vt modo lenientia, & phlebotomia conueniant, modo verò aduerſentur, & ratio eſt, quia indicantia modo magis indicent; quæ prohibent, & modo prohibentia magis prohibeant, quam indicent: exemplum, ſit aliquis febre correptus cum alui fluore; cum periculo ne ob nimiam euacuationem robur cadat, & inde non vincatur febris, tunc haud dubiè prius erit attendendum viribus, quia in indicando ſui cuſtodiam magis poſſunt, quam febris ſui ablationem; quo caſu neque pharmacum, neque phlebotomia conuenient: ſi verò febris illa eſſet admodum maligna, & fluor non eſſet præ multitudinis ratione, tunc ſi immineret periculum, vt malignitas furioſè obreperet cor, ſeu cerebrum cum certo ferè mortis periculo, tunc haud dubiè magis vrgeret furioſa malignitas, quam timor, ne cadat virtus ob medicinam, vel phlebotomiam, quo caſu, ſi vera ſit ſententia, quod ei, cui magis vrget ſit attendendum, coacti medicinam, vel phlebotomiam laudabimus.

Exempla,



Exempla, quæ possunt confirmare hanc opinionem, plura habentur in medicina, sicuti est illud famosum, dum in febrientibus cum maximo sanguinis fluore utrimur phlebotomia; etenim in febrientibus cum maxima eruptione sanguinis è naribus nullum hætenus est inuentum remedium, quod magis iuuet, quam ex parte directe opposita sanguinem mittere: quod cum ita re vera fiat, cur non licebit in febriente cum diminuto alui fluore aliquam leuem medicinam exhibere? nemo est qui nesciat, fluorem sanguineum magis posse in frangendis viribus, quam alui fluor. Neque propterea dicimus, fluxum diminutum semper esse lenientibus tractandum, sed solum, dum magis potest indicans, quam prohibens, quod expensis indicantium comparationibus superius declaratis optimè cognosci poterit: sat est in hoc capite, ut propositis exemplis destruiamus hanc vniuersalem propositionem, in febriente cum alui fluore, quamuis fluor non sit præ multitudinis ratione, non esse euacuandum: destruitur virtute huius principij, scilicet virgentiori semper esse prius vacandum; potest enim, ut diximus, accidere, quod indicans magis virgeat, quam timor, ne vires ob fluxum pereant.

*Exemplis probatur febris cum alui fluxu conuenire phlebotomiam.*

Qui tenent pharmacum, & phlebotomiam habere locum in fluxu alui cum febre, colligunt ex Galeno 4. de rat. vict. in ac. 64. ubi dicit, quod si biliola deorsum repant dandum sit scammonium, quia biliola purgantur, in super 1. aphor. 20. dicit Hippocrates, quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, non esse medicamenti nec aliis irritamenti mouendum, quare argumento ex oppositis sumpto dicimus, quod diminutus fluxus supponat non integrè iudicari, & per consequens naturam exposcere medicamenta, vel irritamenta per locum, quod expedit: est Galeni 6. de morb. vulg. Com. 2. text. 28. reuellendum esse, si non repant humores, quod expediat, viamque esse aperiendam, si repant, quod expedit: ex his inferunt in fluxu, qui non sit præ multitudinis ratione, vias esse aperiendas medicamento, vel quouis alio ingenio.

*Argumenta illorum qui viuuntur medicinis. & phlebotomia in alui fluxu.*

Quæ fundamenta sunt omninò à principiis methodi aliena dum dicunt, dandum esse scammonium, dum bilis habet raptum deorsum: respondemus; quod raptus valde differt à fluxu, fluxus enim est symptoma in exeunte mutato, raptus verò non est motus symptomatizans, sed motus naturæ, de quo Galenus primo ad Glauc. cap. 14. dum de alui fluxu loquitur, non intelligit: similiter dum dicunt, quod natura, dum integrè non mouet in alui fluxu, sit medicamenti adiuvanda: occurrimus, quod Galeni auctoritas primo ad Glauc. loco citato sit de fluxu, qui est morbi motus, aphorismus verò de moru naturæ.

*Reijciuntur aduerbiorum argumenta.*

Altimarus libro de morbis cap. 73. interpretatur Galenum primo ad Glauc. cap. 14. quod loquatur de fluxu critico, & non symptoma-  
*Reijciuntur interpretatio Altimari.*  
tico, quæ interpretatio vera esse non potest, quia tempus euacuandi per phlebotomiam non est in declinatione, sed in principio, quo tempore motus critici nō sunt, quod verò in principio non fiant motus

critici, patet ex Galeno quarto aphorismorum 22. vbi dicit, si quid excernitur in principio morbi, nihil ratione naturæ excerni, sed omnia esse symptomatica; quinimodò subdit, ante motum criticum præire coctionem, subsequi discretionem, & postea euacuationē, quo tempore non est cogitandū de phlebotomia; locutus igitur est Galenus de motu symptomatico, & non de critico: præterea in criticis motionibus non est timendum, quod ægri ob medicinas pereant, quoniam in critica euacuatione statim vires subleuantur, quare de motu symptomatico, & non critico intellexit: insuper Galenus prohibet phlebotomiam, & medicinas in fluxu, ne viribus factis debilioribus patiens multorum dierum spatio ob fluxum continuum pereat; quis diceret, quod fluxus, qui multorum dierum intervallo perderet, vocetur criticus? Demum fluxus criticus non est verendus, quia omnis crisis fit in declinatione, & in declinatione nemo moritur, ergo Galenus locis citatis locutus est de fluxu symptomatico, & non critico.

*Errant qui  
tenent nū  
quā esse phle  
botomandum  
in febre cum  
alui fluxu.*

*Amethodi  
cur plures cō  
tradictiones  
inueniant.*

Similiter errant, qui sēverè sustinent, nunquam esse phlebotomandum, vel aluum mouendam, dum est fluor alui symptomaticus, & cum febre iunctus, quia si indicans pharmacum, vel phlebotomiam vrgeat, nos docet Galenus; methodi 9. cætera omnia indicantia, & præcepta sperni. Qui Galeni, & Hippocratis auctoritates adiscunt, easque deinde non examinant in methodo medendi, quamuis ad verbum omnes referrent, nihil de arte medica intelligerent; amethodi enim sæpenumerò putant Galeni sententias sibi esse parum coherentes, exempli causa quarto de rat. vict. in ac. legunt, quod corpora ægrorum quieti sint permittenda, prima sect. aphor. quod in principio, si materia turgat, corpora ægrorum pharmaco sint tractanda, similiter in principio Paroxysmorum quod nihil cibi sit dandum: 8. methodi in principio Paroxysmorum picrocolos esse nutriendos; nisi methodi trutina omnia componant, nunquam hos nodos tollent: methodi examen præcipuum est. vt sibiipfis ante oculos hoc proponant, vt semper sit attendendum prius vrgenti, quam causis, impedimentis, & morbis, & inter vrgentia prius vrgētiore: cui dubium, quod corpora ægrorum semper quieti sint permittenda gratia concoctionis: cui dubium, quod si turgat materia, quod sperni possit quies, vt prohibeamus ne turgida materiæ feriant cor, & vitam tollant: similiter nihil cibi dandum in accessione, attramen, si imminet hæctica, spernitur quod minoris est momenti: idem Galenus 2. Aphor. 24. dicit, quod si dysenteria incipiat ab atra bile, sit mortale; si verò quiescat atra bilis non nasci hæc mala: ecce quod quies modo habet locum, modo spernitur: habet locum, quia dum mouetur atra bilis potest intestina exadere, ideo hac ratione nō est medicamento mouenda spernitur aliquando, quia potest accidere, dum quiescit, vt paulò post magno cum impetu feriat cor, & mortem adferat: quis posset mederi, nisi perfectè expendere, quodnam ex istis minetur certiozem mortem: sic igitur expenditur, si cordis symptoma magis vigeat, quam intesti-  
norum; quod est dysenteria, pharmacū omnino dandum est, quamuis



uis intendatur dysenteria; quia symptoma cordis minus potest præcaueri, quam dysenteria, quæ loricantibus aliquomodo minuitur: semper prudens medicus potius dubiam salutem prosequi debet, quam certam mortem.

Postremò dicimus, quod Altimarus cum aliis perperam interpre- *M. I. us reici-*  
tatur Galeni sententiam primo ad Glauc. 14. dum dicit, si febris sit cum *tur Alima-*  
profluuiio ventris, alia non est opus euacuatione, quàmuis non sit præ-  
multitudinis ratione, quia ibi Galen. loquitur de læsione oris ventri-  
culi, in quo casu dicit, stomachum prius esse corroborandum, quam  
euacuandum, additque hæc verba: aliquos periisse vidi, & in pericu-  
lum perductos ob euacuationem non roborato prius ore ventriculi, *cc*  
subditque, sed neque si fuerit febris cum profluuiio ventris alia est o-  
pus euacuatione, quamuis non sit præ multitudinis ratione, nam si  
quis repletum hominem euacuabit per ventrem, vel ei sanguinem  
mitteret, in grauiora pericula duxerit; ecce quod Galen. ob aliam cau-  
sam loco citato non vult in fluxu euacuare, vel sanguinem mittere,  
nisi quia os ventriculi est læsum, ob quam læsionem immineret peri-  
culum, ne ob euacuationem in cardialgiā, vel alios deteriores affe-  
ctus ægri inciderent: quæ Galeni sententia methodo cum primis co-  
hæret, quia vrgenti prius, quam causæ attendit. Non negat Gal. flu-  
xum aliquando posse tolli euacuantibus, sed solum facta comparatio-  
ne inter vrgens, id est inter damnum dependens ab imminente car-  
dialgia, & beneficium euacuationis peccantis causæ, dicere videtur,  
quod magis sit vacandum imminente cardialgiæ, quam euacuationi,  
quia magis vrget: non negaret Galenus, quando quis esset robusto  
ventre, humoresque diminutè fluerent, materia esset maligna, & viru-  
lenta, instaret periculum ne aliquantulum retenta exederet intestina,  
caput peteret, & phrænesim excitarer, quod non posset tolli fluxus  
euacuantibus ventrem, vel phlebotomia, quæ ex omnium sententia  
calorem viscerum effienem, qui esse potest causa fluxionis, com-  
pescit.

Hinc Alexander Trallianus loquens de dysenteria, ne æger in gra- *Vi Alex. Tral.*  
uiora mala cadat, laudat modo purgationem, modo sanguinis eua- *phlebotomia*  
cuationem si vires dysenteria correptus habeat robustas: eodem spi- *laudat in fe-*  
ritu Auicennas 4. primi cap. 3. dixit, fluxum fluxu tolli; quare omnes *bris cum fluxu*  
sententiæ Galeni, & Hippocratis sunt moderandæ facta comparatio- *alui.*  
ne indicantium, hac scilicet lege, vt vrgentiori prius sit vacandum, se-  
cundo causæ magis principali, deinde impedimentis, & postremò  
morbis.

*Ostenditur, vanam, & Medico indignam esse Archigenis opinionem, quod semper à leuioribus auxiliis sit exordienda morborum cura.*

## C A P. XIII.

**Q**UÆRITVR tandem, an Archigenis sententia vera sit, quæ est, an in qualibet ægritudine curanda, auspicandum sit à leuioribus auxiliis. Archigeni reluctatur in primis Hippocrat. qui dicit in aph. quod extremis morbis extrema remedia sint adhibenda: Gal. quoque non semper à leuioribus exorditur, sed solum in morbis non periculosis; §. n. method. cap. 15. hac verborum serie exprimit suam sententiam: sicuti medicorum nonnulli censent à paruis incipiendum auxilium, & deinde ad maiora; in morbis enim vbi non impendit periculum, vera est opinio, vbi impendit, alienissimum est à ratione à minoribus auxiliis auspicari, ratio verò potissima, cur à leuioribus non sit inchoandum, hæc est, indicans præter naturam vnum indicat, quia vnum vni est contrarium; quare si indicans indicabit potentissimum remedium, leues quoque indicare non poterit; quia duo indicaret, quod reluctatur Galeno 9. meth. 12. & 2. method. 13. est necessarium, vt verum remedium sit vel leuius, vel potentius, ambo esse non possunt, quia de ratione remedij est, vt vincat, & superet ægritudinem, si igitur leue remedium sufficiat in victoria consequenda, magnum remedium partem affectam lædet, & nouam introducet ægritudinem: Dignum tamen est inquisitione, cur Galen. dixerit, in morbis vbi non imminet periculum mortis à leuioribus esse inchoandum, quia hoc videtur aduersari sibi ipsi, qui 14. meth. vlt. loquens de pterygio dixit, pterygij parui detegentibus magni chirurgicis auxiliis sunt tollendi, at sic est, quod pterygium magnum non minatur mortis periculum, ergo sententia Gal. dubia, & perplexa esse videtur: Gal. vindicari potest, quia 5. meth. vlt. non est locutus de remediis pertinentibus ad indicationem, sed ad experientiam, & analogisimum, quæ duo instrumenta versantur circa coniecturam, quasi quod diceret, si non immineret periculum, & indicationes specificæ sint occultæ; varia poteris experiri, sed hac conditione, vt rutò procedas scilicet incipiendo à leuioribus, ne æg. um potentioribus remediis lædas: at si morbus per indicationem cognoscitur, tunc certò scimus, quale debeat esse remedium, quod vnicum esse debet, & non plura, quia indicans vnum indicat: si indicans indicaret remedium validum, vanissimus esset ille Medicus, qui leue exporrigeret, quia illud leue nihil faceret, & frustra tempus Medicus tereret: si in pterygio magno vteremur detergentibus. centum annorum tractu, nihil omnino proficeremus, quia solum ferrum, vel ignis sunt proportionata indicata, vel materiæ indicatorum; itaque, quia in methodo medendi solum per indicationem remedia perquirimus, & quodlibet indicans vnum indicat, vnicum erit remedium:

*Dabitur.*

*soli.*



remedium: si verò non cognoscatur morbus per indicationem, & non immineat mortis periculum, antequam ascendamus ad potentiora remedia, à leuioribus exordimur.

Conferentes omnia, quæ dicta sunt in hoc libro in Epilogum, dicimus, quod in primo docuimus tres methodos pro cognoscendis affectuum ideis; prima quarum transferebat nos ad cognoscendam symptomatum omnium coordinationem: secunda per signa propria: tertia per syndromem signorum communium in cognitionem omnium formarum ægritudinum nos ducebat: hæcque exemplis adeo manifestis est illustrata, vt quilibet rudis inde animaduertet errata, quæ in hac contemplatione contingere poterunt: in secundo traduntur normæ quibus cognoscere possumus, quando affectuum ideæ sunt per essentiam, & quando per consensum: in tertio agitur, quomodo specificæ formæ affectuum cognoscantur: in quarto vt metiri possumus recessum morborum à statu naturali, egimusque de consuetudine, vt profundius hæc materies de morborum ideis noscetur. Peracta contemplatione pertinente ad ægritudinum formas, sequuntur sex libri de cognitione peccantium humorum: in quorum primo ostendimus, quæ sint signa propria peccantium humorum: in secundo, quæ sit artificiosa syndrome signorum communium pro cognoscendis absconditis humoribus in corporis latebris existentibus; in tertio de humorum misturis, & quot possint esse in viuentibus; in 4. de principiis reconditarum causarum: in 5. de quantitate, & in 6. de motu peccantium humorum. Peracta contemplatione causarum efficientium, sequuntur quinque libri in quibus egimus de solertia pro inueniendis ægritudinum remediis; in quorum primo agitur de principiis methodi medendi: in secundo quomodo remedia per analogismum, & experientiam perquirantur: in tertio qua arte administrare debeant remedia: in quarto de reuulsione, & deriuatione: & in postremo de indicantium æquilibrium, merito quorum librorum omnia errata, quæ ab Empiricis fieri poterunt quilibet studiosus facile detegere poterit.

*FINIS.*

G Ggg iij.

# INDEX RERVM NOTABILIVM.

**A**CERBVM, & austeram non differre specie, sed secundum magis, & minus. fol. 388

Acerba cur à potentissimo calore fiant dulcia. 382

Acerba in superficie magis, austera in profundo astringunt. 389

Acetum cur frigidum, cur acre, cur tenuium par. cur astringens. 387

Acetosus sapor unde prodeat. 267

Acetum inuat, ergo bilis redundat est Galeni. 29

Acetum cur nihil aque vita retineat. 387

Acetum ut fiat. 384

Acetum cur biliosis proffit. 325

Acetum refrigerare probatur à Galeno. euentissimo experimento. 384

Acetum ex Galeno est siccum in tertio gradu. 385

Acetum cur sit frigidum. 387

Acetum à Galeno laudatur in febribus. 384

Acetum esse frigidum ex Galeno, & Aristotele confirmatur. ibid.

Acetum habere frigiditatem violentam. ibid.

Acida qualitas ut per se conveniat melancholia, & non pituita. 385

Acidam qualitatem convenire per accidens pituita tribus modis. 386

Acida pituita ex Galeno à frigiditate fit. 377

Acidus sapor quomodo fiat ex Galeno. 384

Accidens ut non est accidentis accidens. 473

Accidentium cathena que sit. 416

Accidentia non pendere à substantia, opinio nona. 414

Accidens ex Aristotele non est accidentis accidens. 415

Actio lesa ut est radix omnium symptomatum. 11

Actio per se leditur solum à facultate lesa, vel ab obiecto. 24

Actio retentrix per se leditur ab intemperie humida. 24

Actio expultrix per se leditur ab intemperie calida, & sicca fibrarum transuersarum. 24

Actio diminuta semper indicat affectum frigidum. 25

Actio musculorum quanti sit in medicina. 214

Actio ab ijs, quæ toto genere differunt, non sequitur. 425

Adustionis gradus ex Galeno quot sunt. 269

Edema ut à statuofo tumore differt. 362

Egrotus quidam ut leditur primò à Dogmatico, & deinde ab Empirico. 147

Egroti dum sanantur, ad statum aduentitium, & non primigenium debent reduci. 216

Egroti citius ab Hippocrate, qui ob errorem in victu pereunt qui. 571

Enobarbus rudis de saluatella loquens ut vacillat. 522

Enobarbus obrectator, ut malè se gestit, dum ignorans situm oris ventriculi. 174

Aër ut indicat extra methodum mendi. 471

Affectus dum plures sunt, à quo cura est incipienda. 77

Affectus de loco affecto ut predicatur per se, & per accidens. 166

Affectus ex Aristot. 2. Ethicorum duum generum sunt. 238

Agens ex Aristotele non agit in contrarium, sed in eius subiectum. 39



# INDEX RERVM NOTAB.

- Albertus Magnus* cur pra ceteris laudat. septimum clima. 366
- Alexander Massaria* instantiam quandam, quod magnitudo morbi non indicet tene sectionem, nunquam diluere potuit. 412
- Alexander Aphro.* quomodo intelligit dum d. cu qualitates esse formas elementorum. 417
- Alexander Aphr.* cur negat mathematicam esse philosophiam. 416
- Alex. Tralliani* opinio an sit medicandum in alui fluxu. 603
- Alb. Zeurecti* dicit, quod colores sunt luminosa. 299
- Alimentum calidum* ut per se generat calidos, & per accidens frigidos humores. 315
- Alimentum non in omnibus* generat eundem succum. 367
- Allium comastum* cur non excedat ventriculum. 321
- Allium coctum* ex Galeno discutit flatus, & non mouet sitim. 360
- Aloe illota* ut necat. vermes. 301
- Alterantia interna, & externa* cur saepe mutanda. 253
- Alterantia refrigerantia* cur actu calida non sunt danda. 516
- Alius astricta* ut tractetur a dogmatico, & ut ab Empirico. 492
- Amara* quod participant. dulcibus experimentis alchymistarum probantur. 301
- Amara ex Alberto* falsum quidpiam obtrinent. 380
- Amarus sapor* indicat. maiorem calorem quam falsus. 380
- Amarum a falso* differt secundum magis, & minus. 380. & 377
- Amatus Lusitanus buxo* curabat. luem Gallicam. 499
- Amethe* cur plures contradictiones inueniant. 602
- Analogata* cur nullam habeant communem dependentiam. 485
- Analogismi dogmatici* perfectissimum exemplum. 490
- Analogismus dogmaticus* quis, & qualis sit. 488
- Analogismus dogmaticus*, ut differt ab Empirico. ibid.
- Analogismus dogmaticus* comparatur indicationi. 488
- Analogismus* ut ratione materia est paralogismus. 484
- Analogismi empirici* exemplum vsutum a recentioribus dum probant. vesicantia valere in febre maligna. 528
- Analogismus*, ut est inductio. 482
- Analogismi dogmatici, & Empirici* parallelus. 489
- Analogismus* cur non pertineat ad Methodum. 453
- Analogismus* cur sit falsus procedendi modus. 480
- Analogis.* ut differt ab indicatione, & experientia. 478
- Analogismus*, ut duplex est. ibid.
- Analogismus* quid sit exemplo declaratur. 479
- Analogismus* colligit a similitudine materierum, & locorum affectuum, & affectuum prater naturam. ibidem.
- Analogismus*, ut reijci debet. 480
- Analogismum* ratione forma esse paralogismum ostenditur. 480
- Analogismus* Empiricorum habet medium terminum communem passionem. 481
- Analogismus* est in secunda figura ex affirmatiuis, & irreducibilis ad primam. 481
- Analogismus*, ut est falsum enthimema. 482
- Anaximandri* opinio de falsedine maris 377
- Anaxagora* opinio de falsedine maris. ibid.
- Anaxagoras*, ut reprehenditur dum di-

# INDEX RERVM

<i>cit quodlibet fieri ex quolibet.</i>	372	<i>ratio.</i>	434
<i>An consuetudo conuertatur in naturam.</i>	237	<i>argumentum in quarta figura declaratur.</i>	ibid.
<i>Anglia habitatio cur bona.</i>	366	<i>argumenta ab auctoritate sunt probabilia.</i>	466. & 529
<i>Angustia nimia, quod suffocet, declaratur.</i>	326	<i>argumentum ab accidente ad accedens non facere demonstrationem.</i>	436
<i>Anima per se primo modo non est potentia.</i>	409	<i>argumentum à contrarijs vnius predicamenti ad contraria alterius est falsissimum.</i>	407
<i>animalia cur non generentur in mari mortuo.</i>	301	<i>argumentum à particularibus cur fallax.</i>	204
<i>anni tempora, ut quatuor humoribus respondent.</i>	364	<i>argumentum à destructione consequentis ad destructionem antecedentis cur non valeat.</i>	8
<i>anodyna non indicari à dolore, sed à parte dolente, &amp; cur.</i>	13	<i>argumentum ex sufficienti partium enumeratione sine alia demonstratione petit.</i>	16
<i>asthmas causas tres, acrimonia, copia, &amp; imbecillitas.</i>	24	<i>argumentum à partibus ad totum, &amp; à toto ad partes est paralogismus.</i>	184
<i>Antipatrum Medicum habuisse tuberculum in spiritalibus partibus, ut cognouit Galenus.</i>	335	<i>argumentum quod colligit negatiuum ex affirmatiuis nullum est.</i>	204
<i>Ant &amp; ex Aristotele quid.</i>	335	<i>argumentum à causis proximis ad an sit nullum est.</i>	64
<i>aphia maligna cur alba sunt.</i>	393	<i>Argumentum in prima figura cum minori negatiua exemplo ostenditur non valere.</i>	529
<i>apoplexia cause, ut inueniantur.</i>	335	<i>argumentum in prima figura ex minori particulari, ut est vanum.</i>	481
<i>apoplexia modo à pituita, modo à melancholia fit.</i>	332	<i>argumentum in secunda figura ex affirmatiuis ex medio communiori predicato cur est irreducibile ad primam figuram.</i>	ibid.
<i>apparatus morbofi, ut sunt in similibus, &amp; dissimilibus partibus.</i>	39	<i>argumenta in quarta figura cur monstruosa.</i>	482
<i>appetitus atmissio indicat crudam pituitam.</i>	335	<i>argumentum est vanissimum, dum melius est genus, vel differentia maioris extremi.</i>	483
<i>aqua Gallarum, &amp; Calcani, licet splendida sint, si uniantur efficiunt nigredinem.</i>	421	<i>argumentum à partibus ad totum est vitiosum.</i>	530
<i>aqua Rosacea si communi miscetur cur lactea fiat.</i>	ibid.	<i>Aristoteles, ut viciu veteres loquendo de principio materiali.</i>	40
<i>aqua Rosacea, ut cognoscitur esse facta plumbeo alembico.</i>	296	<i>Aristotelis falso attribuitur, quod non cognouerit in corde esse pinguedinem.</i>	213
<i>aquam Theriacalem stillatam ex Scaltigero curare Gallicam litem.</i>	499	<i>Aristotelis famosa opiniones.</i>	227
<i>aqua frigida quando sumit conuulsos.</i>	590	<i>Aristote-</i>	
<i>ardor stomachi unde fiat.</i>	253		
<i>Argenterius, ut errat dum negat vapores petentes caput conueri in pituitam.</i>	57		
<i>Argenterius, ut errat in perquirendis humoribus oculis.</i>	311 & 18		
<i>argumentum in quatuor terminis declaratur.</i>			



# NOTABILIVM.

<i>Aristotelis artificium in combinationibus quatuor qualitatum inueniendis.</i>		<i>citur.</i>	275
394		<i>Auerrhoes errare videtur dum dicit dari colores sine lumine.</i>	299
<i>ars medica quo ordine tradatur à Galeno, &amp; ab Auerrhoes.</i>	451	<i>Auerrhoes putat epilepsiam à spiritibus flatuosis fieri.</i>	359
<i>ars medica cur difficilis.</i>	463	<i>Auer. rectè reprehendit Themistium de demonstratione ab accidente ad accidens.</i>	473
<i>ars medica esset vana, si indinidna curaret.</i>	ibid.	<i>Auer. cur laudat. pra ceteris quintum clima.</i>	366
<i>artes omnes ut ordine resolutio ordinentur.</i>	451	<i>Auer. dicit propter quid accidentium esse causam extrinsecam.</i>	538
<i>arthritidis cur suppurantibus non potest vinci.</i>	436	<i>Auicennae cur pra ceteris laudat. quartum clima.</i>	366
<i>articuli lesi ostendunt pituitam dominari.</i>	338	<i>Auicenna opinio de pituita dulci.</i>	382
<i>artis medica difficultas unde pendet.</i>	576	<i>Auicen. ut defenditur de quarto genere melancholia.</i>	386
<i>Asclepiadis consilium ab omnibus medicis acceptum.</i>	548	<i>Auicen. dicit epilepsiam puerorum esse flatulentam.</i>	360
<i>assafoetida ferculis apud indos miscetur, ut suauius oleant.</i>	231	<i>Auicen. &amp; Auerrhois opinio quod vitellina bilis sit mistura ex flaua, &amp; crassa pituita.</i>	390
<i>assuetus omnibus externis rebus cur minus leditur à contrariis.</i>	249	<i>Auicenna opinio, ut sit medicandum in alui fluxu.</i>	393
<i>assuetus paucis, ut ab omnibus ferè leditur.</i>	250	<i>aures paruae, ut versutiam, &amp; melancholiam indicant.</i>	343
<i>asthmatici cur à fese ledantur.</i>	421	<i>austera, ut fiant dulcia, ut acerba, &amp; ut acida.</i>	388
<i>astringentia in alui fluore sape noxia, &amp; cur.</i>	14	<i>austum, ut magis astringit acerbis.</i>	388
<i>astringentia moderata cur in omni inflammatione sine danda.</i>	508	<i>austum magis in profundo: Acerbum magis in superficie adstringit.</i>	ibid.
<i>astringentia cur sanant spleneticos.</i>	574	<i>austerus sapor in pituita vitrea, &amp; melancholia fecali inuenitur.</i>	388
<i>aura bilis in toto elephanticum, in parte cancrum facit.</i>	163	<i>austerus sapor non conuenit per se pituita vitrea sed melancholia.</i>	389
<i>atractilis manu gestata, ut tollere possit dolorem causatum ab ictu scorpionis.</i>	426	<b>B</b> ALIM herbam vitam mortuis restituere, ut est fabulosum.	427
<i>atrophia, ut sape fit à mucosa pituita</i>	335	<i>Bezoar ad nos delatus cur sit nullius virtutis.</i>	514
<i>auctoribus addicti, ut errant.</i>	198	<i>Bezoar quid.</i>	ibid.
<i>auditus tria officula antiquis ignota.</i>	212	<i>Bezoartica reijciuntur.</i>	515
<i>Auempaces rectè dicit, colores esse luminaria vario modo refracta.</i>	299	<i>Bilis species ex Galeno sunt. septem palida flaua vitellina porracea aruginosa caerulea rubra.</i>	258
<i>Auerrhoes, ut errat. dum negat. sub primo climate esse locum habitabilem</i>	365	<i>Bilem copia peccare, ut noscitur.</i>	438
<i>Auerrhois opinio de periodicatione reii-</i>		<i>Bilem porraceam ostenditur non solum</i>	

# INDEX RERVM

<i>in ventriculo verum etiam intra ve-</i> <i>nas gigni.</i>	391	<i>crementis cognoscitur.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Bilis porracea, ut fiat duplici mistura-</i> <i>rum genere.</i>	391	<i>Bilis si morbi qui sint.</i>	320
<i>Bilem porraceam esse misturam ex bile</i> <i>aruginosa, &amp; pituita ostenditur.</i>	391	<i>Bilis aruginosa in febre maligna multa.</i> <i>ibid.</i>	
<i>Bilis porracea, ut prae cognoscatur ante</i> <i>quam è corpore exeat.</i>	334	<i>Bilis aruginosa quomodo fiat.</i>	314
<i>Bilis porracea pro varietate sitius, ut su-</i> <i>lubres, &amp; laetales morbos faciat.</i>	164	<i>Bilis cognoscitur ex velocitate morbi.</i> <i>ibid.</i>	
<i>Bilis species, ut differant secundum ma-</i> <i>gis, &amp; minus.</i>	313	<i>Bilis mouetur in meridie.</i>	320
<i>Bilem flauam non esse misturam contra</i> <i>Auscennam ostenditur.</i>	390	<i>Bilem peccare noscitur ex inflammatio-</i> <i>nibus membranarum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Bilem vitellinam ostenditur non esse mi-</i> <i>sturam ex flaua, &amp; pituita.</i>	390	<i>Bilis syncera, &amp; mista cum ichore san-</i> <i>guinato quomodo cognoscitur dum pec-</i> <i>cat.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Bilem dominari, ut à somnis prae cognos-</i> <i>citur.</i>	335	<i>Bilis syncera in partibus internis non e-</i> <i>rodit, sed in externis, &amp; cur.</i>	321
<i>Bilis quae externa die erat flaua hodie</i> <i>fieri potest aruginosa.</i>	374	<i>Bilis noscitur per octo loca desumpta à</i> <i>morbis.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Bilis efficiens erisipelas externum est</i> <i>mixta ichori sanguineo.</i>	374	<i>Bilis in phrenetico si est sine furore, &amp;</i> <i>fieri neque est adusta, ut aruginosa,</i> <i>neque putrida.</i>	322
<i>Biliofis cur acetum profuit.</i>	325	<i>Bilis noscitur dum agri nimium loquun-</i> <i>tur, vel magis quam antea.</i>	322
<i>Biliofi paucitate cibi adaugent sitim, &amp;</i> <i>lassitudinem.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Bilis colligitur ex vigilis, siti, &amp; inappe-</i> <i>tentia.</i>	322
<i>Bilis, ut ex inuantibus, &amp; ledentibus col-</i> <i>ligitur.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Bilis colligitur ex puncturis narium.</i> <i>323</i>	
<i>Biliofi sunt graciles, habent venas latas,</i> <i>&amp; frontem rotundam.</i>	319	<i>Bilis cur indicetur à pulsu duro.</i>	325
<i>Bilioforum succorum differentia à locis</i> <i>affectis colliguntur.</i>	324	<i>Bilis, ut colligitur ex facie solito colora-</i> <i>tiori.</i>	323
<i>Bilis rubra quomodo fiat.</i>	338	<i>Bilis pro varietate sitius salubrem, &amp; in-</i> <i>salubrem malum facit.</i>	162
<i>Bilis, ut fiat ab animi passionibus, &amp; vi-</i> <i>gilia.</i>	315	<i>Bilis in toto icterum in parte erisipelas</i> <i>facit.</i>	163
<i>Bilis, ut ab Australibus ventis genera-</i> <i>tur.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Bilis, ut ex coloribus, &amp; ex saporibus no-</i> <i>scitur.</i>	267
<i>Bilis, ut ab inedia augeatur.</i>	319	<i>Bilis à quibus causis non naturalibus o-</i> <i>riatur.</i>	332
<i>Bilis, ut noscitur quod peccet ex quin-</i> <i>que locis antecedentibus desumptis.</i>	319	<i>Bilis pallida quomodo fiat.</i>	313
<i>Bilis ob ieiunium caput implet.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Bilis flaua est calidior, &amp; crassior palli-</i> <i>da.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Biliofi sunt in venerem furiosi, sed post</i> <i>contumpeccantes.</i>	319	<i>Bilis flaua quomodo fiat.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Biliofis cur cibum nunquam molestus.</i> <i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Bilis Vitellina quomodo fiat.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Biliofum caput ex copiosis aurium ex-</i> <i>crementis cognoscitur.</i>		<i>Biliofi cur bouinam carnem citius dige-</i> <i>rant piscibus saxatilibus.</i>	252
		<i>Bilioforum succorum species cur modo</i> <i>quattuor, modo septem, &amp; ultra enu-</i> <i>metantur.</i>	



# NOTABILIVM.

<i>merantur à Galeno.</i>	312	<i>gnum.</i>	561
<i>Boleti, ut suffocantur. Sophiam Priolam,</i>		<i>Casus Matrona Romana habentis her-</i>	
<i>&amp; ut oleo citri liberetur.</i>	82	<i>petem.</i>	509
<i>Boleti cur occidant.</i>	421	<i>Casus cuiusdam qui perit medicorum.</i>	
<i>Bovina caro cur citius digeratur pisci-</i>		<i>infectia.</i>	519
<i>culis.</i>	235	<i>Casus notabilis de consuetudine.</i>	226
<i>Brisonis Paralogismus de quadratura</i>		<i>Casus venenatorum sublimato.</i>	431
<i>quis sit.</i>	487	<i>Casus venenati opio.</i>	ibid.
<b>C</b> <i>Alculi causa potest esse calor mode-</i>		<i>Casus amici facientis lapillum periodicè.</i>	
<i>ratissimus rerum.</i>	178	272	
<i>Calculus non comminus electuario de</i>		<i>Casus notabilis cuiusdam comitis per-</i>	
<i>vitro.</i>	513	<i>lebris.</i>	244
<i>Calculosi cur ledantur à diureticis.</i>	514	<i>Casus viri dicitissimi qui ob rectam viuen-</i>	
<i>Calidum est cor, &amp; iecur, ergo totum cor-</i>		<i>di normam insolitam moritur.</i>	251
<i>pus, consequentia est Galeni.</i>	87	<i>Casus de punctura nervi.</i>	570
<i>Calor à quibus causis fiat.</i>	38. 306. &	<i>Catarrhus ob varium situm quos morbos</i>	
314		<i>faciat.</i>	
<i>Calor est causa contingens magnitudi-</i>		<i>Catarrhi salsi causa quinque sunt, &amp;</i>	
<i>nem partium.</i>	224	<i>que.</i>	380
<i>Calor natiuus, est celestis quia proportio-</i>		<i>Catarrho vexatos citius sine medicinis</i>	
<i>ne respondet elemento stellarum, est</i>		<i>liberari.</i>	506
<i>paralogismus in quatuor terminis.</i>		<i>Cathochi qua sit immediata causa.</i>	360
435		<i>Cathochus à qua melancholia oriatur.</i>	358
<i>Calor quibus resoluentibus absumatur.</i>		<i>Cause principali, ut secundo loco atten-</i>	
326		<i>dendum.</i>	568
<i>Calor magnus quomodo prius faciat ni-</i>		<i>Cause externa cur non indicant.</i>	469
<i>gredinem &amp; deinde eam denudet, &amp;</i>		<i>Cause efficientes praternaturam in con-</i>	
<i>faciat albedinem.</i>	393	<i>scientis sunt, centum &amp; sexaginta quin-</i>	
<i>Calor, ut attrahit.</i>	444	<i>que.</i>	394
<i>Caput ob tres causas repleti.</i>	44	<i>Cause procatarctica que sint que per ac-</i>	
<i>Capitis foramina qua, &amp; quot sint.</i>		<i>cidens refrigerant.</i>	307
180		<i>Cause procatarctica semper examinan-</i>	
<i>Caput est pituita metropolis.</i>	337	<i>de sunt, an per se, vel per accidens o-</i>	
<i>Cardum Benedictum quos status expel-</i>		<i>perentur.</i>	ibid.
<i>lat.</i>	357	<i>Cause externa nihil efficiunt sine visce-</i>	
<i>Cartilago mucronata cur non possit</i>		<i>rum dispositione.</i>	38
<i>decidere.</i>	195	<i>Cause omnes externa ut ad quatuor, &amp;</i>	
<i>Carnis abundantia unde fiat.</i>	369	<i>non ad sex reducuntur.</i>	261
<i>Casus de gangrena.</i>	436	<i>causa procatarctica non possunt dici nec</i>	
<i>Casus notabilis de gangrena genarum</i>		<i>proxima nec remota.</i>	42. 163
<i>orta remediis Empirici.</i>		<i>Cause procatarctica cur dicitur</i>	263
<i>Casus de Atrihride quomodo suppura-</i>		<i>ti.</i>	263
<i>ntibus liberetur.</i>	436	<i>Cause efficiens immediata cur sape igno-</i>	
<i>Casus dum liberatur quidam sciatica</i>		<i>retur.</i>	543
<i>facto cauterio in eodem crure.</i>	555	<i>Cause precedens effectum temporis in-</i>	
<i>Casus puella deglutientis acum ma-</i>		<i>terualloni non est causa illius effectus.</i>	222

# INDEX RERVM

<i>Causa remota nunquam efficit argumentum affirmatiuum.</i>	280	<i>Coccyx in parturientibus mouetur.</i>	196
<i>Causa remota quam potentiam habeant.</i>	263	<i>Coccygis cartilago maior est in mulieribus quam in uiris.</i>	ibid.
<i>Causa remota cur argumenta in secunda figura efficiunt.</i>	498	<i>Coctiones in viuente tres &amp; sex excrementa.</i>	56. & 283
<i>Causa proxima non dant an sit, &amp; cur.</i>	164	<i>Cocta immodice cur salsa fiant.</i>	377
<i>Causa suffocantes qua sint.</i>	326	<i>Coctio ut quiete fit.</i>	595
<i>Cauteria non recipere excrementa quia attrahant.</i>	278	<i>Coctio ut ex Arist. fit incrassando.</i>	269
<i>Cerebellum dicentes esse durius cerebro in duo errata incidunt.</i>	187. 213	<i>Coctio à quibus impeditur.</i>	573
<i>Chilus cur albescat.</i>	84	<i>Cœlestia corpora ut inuenit Aristoteles non esse elementalia.</i>	461. 462
<i>Christoforus à Vega defendit febrem esse naturæ conatum.</i>	291	<i>Cognitio specifica affectuum unde hauriatur.</i>	4
<i>Cibi melancholici qui sint.</i>	340	<i>Cognitio progressu partium in medicina quanti sit.</i>	211
<i>Cibi quantitas unde sumenda.</i>	571	<i>Cognitio numeri partium in medicina quanti sit.</i>	ibid.
<i>Cibus intempestiuus ex Galeno quæ mala faciat.</i>	510	<i>Cognitio exacta cur ex primis subiectis debet esse.</i>	415
<i>Cibandi ægri ars.</i>	572	<i>Coitus causa perit maligna febre adulescens Melibeæ.</i>	314
<i>Cibum in ventre corrumpi ob tres causas.</i>	45	<i>Coitus abstinentia cur generatur melancholia fecalis.</i>	340
<i>Ciborum tenuium usus quod damnum afferat.</i>	252	<i>Coitus nimia abstinentia ut suffocet.</i>	326
<i>Cinis putredinis humorum, ut in lotio nescitur.</i>	433	<i>Coitus ut calfacit &amp; ut refrigerat.</i>	22. & 314
<i>Claudus, ut curatur ab Empirico, &amp; ut à dogmatico.</i>	490	<i>Coitus frequens efficit satyrum tabidum</i>	22
<i>Clima secundum quæ loca sub se continent.</i>	364	<i>Coitus abstinentia disponit ad sex mala ex Galeno.</i>	ibid.
<i>Climata omnia quas provincias sub se habeant.</i>	ibid.	<i>Colica passio fit inter spatia iunicarum intestinorum.</i>	361
<i>Clima temperatissimum quod sit.</i>	365	<i>Colica passio ut aliquando fit ob meatum felleum occlusum.</i>	183
<i>Clima primum est habitabile quod non cognouit Aristoteles.</i>	ibid.	<i>Colorum principia quæ sint.</i>	297
<i>Clima primum quas provincias habitatissimas, &amp; temperatissimas contineat.</i>	ibid.	<i>Color oculorum quid significet.</i>	268
<i>Clima quoduis, ut potest esse temperatissimum.</i>	365	<i>Color quos humores indicet.</i>	ibid.
<i>Climata propria cur laudantur.</i>	366	<i>Colorata simularia, &amp; dissimularia ut differant.</i>	296
<i>Clima pro quolibet temperamento quale esse debeat.</i>	367	<i>Color niger turbidus quem inducet humorem.</i>	269. & 270
<i>Clima quid sit.</i>	364	<i>Color niger splendidus quem humorem indicet.</i>	269
<i>Climata septem sunt.</i>	ibid.	<i>Color flauus &amp; vitellinus non indicat adustionem.</i>	267

Color



# NOTABILIVM.

color intensè ruber in facie cur melan-  
choliā indicet. 293  
color valde ruber quam melancholiā  
indicer. 294  
colores ut indicent temperaturas. ibid.  
color ut fiat. ibid.  
color niger ut est in calidis & frigidis re-  
bus & albus similiter in calidis &  
frigidis. 294  
colores non solum in mixtione sed in  
iuxtapositione mutantur. 296  
color niger ut illico fieri potest ex mistu-  
ra duarum albarum aquarum. ibid.  
color lacteus ut illico fiat ex mixtura  
duarum aquarum splendidarum. ib.  
color viridis ex vitro caruleo & ut eo  
statim oritur. 297  
colores cur non pendent à primis qua-  
litatibus. 297. & 299  
color limbus non est caracter venenato-  
rum. 430  
color caruleus lapidis lazuli, & iridis  
cælestis ab eadem causa prodeunt. 299  
colores qui indi-ēt humorū mixturas. 374  
colores medij ut fiant ex albo, & nigro. 391  
colores albi humorum ut ostendant modo  
calidos, & modo frigidos humores. 393  
color albus turbidus humorum indicat  
melancholiā esse mistā cū puuita. 394  
colores noui ut ex mixtura aliorū fiant. 413  
colorem viridem quomodo figuli compo-  
nant. ibid.  
coma viget à qua causa fiat. 375  
comparatur corpus animatum restūdi-  
ni & fidibus. 88.  
conciliatoris opinio de periodicatione re-  
pocitur. 275  
conclusio ut ignobiliorem partem semper  
sequitur. 495  
conclusio ex medio simili, & non uniuo-  
co cur vana. 455  
conclusio vniuersalis collecta ab exem-  
plis vel experimentis non sequitur sit-  
que argumentum in tertia figura cum  
conclusionē vniuersali. 527  
conclusio à medio simili tertio collecta,

est vana. 528  
congelata à frigido ut liquefiant, ab hu-  
mido. 593  
consequentia à de omni ad per se negati-  
ue ut valet. 8  
consequentia nulla est à partib. ad totum  
nec vice versa. 185  
consequentia ex membris diuisis illata  
cur nulla. 201  
consequentia à coniunctis ad diuisa cur  
nulla. 16  
consequentia à Genere ad species nulla,  
& cur. 468  
constitutio salubris duplex primigenia,  
& aduentitia. 216  
consuetudines male in senibus, & debi-  
libus cur non sunt mutata. 217. & 247  
consuetudinem sex rerū non naturalium  
efficere aduentitium statum. 225  
consuetudines diuersarū gentiū qua. 228  
consuetudines ex Aristot. impedire veri-  
tatem. 228  
consuetudines diuersa à Sexto Empirico  
relata. 229  
consuetudines decipere sensum gustus  
exemplis ostenditur. 229  
consuetudinem decipere sensum visus  
exemplis probatur. 230  
cōsuetudo ut decipiat sensū auditus. 231  
cōsuetudo ut decipiat sensum tactus. 232  
consuetudine ut virtus motina roborat-  
ur. ibid.  
consuetudine ut roboratur virtus vitalis.  
232  
consuetudine in naturā non conuerit. 237  
consuetudinis definitio perfecta que sit.  
241  
consuetudo respectu natura non est dispo-  
sicio ut dicit Valesius. ibid.  
consuetudines dantur, quæ minus mu-  
tantur quam natura. 242  
consuetudinis subiectum quid sit. ibid.  
consuetudinis causa efficiens. 242  
consuetudines cur fiant ab assiduo exer-  
cizio. 243  
consuetudinis causa finalis. 241

# INDEX RERVM

consuetudo inueterata dum tollitur, sta-  
tim duplex iactura suboritur. 249  
consuetudo noua antequam fiat, dua  
sunt conditiones seruanda. 252  
consuetudinem medicinarum non esse  
admittendam, experimentis probatur  
255  
contrarium non agit in contrarium. 39  
contrarium unius generis non aduersa-  
tur contrarijs aliorum 403. & 407  
contraria media ut reluctantur inter se.  
465  
contrarietas ut definitur. ibid.  
contrarium unius generis si haberet plu-  
ra contraria ut ruerent, rationes A-  
ristotelis primo cœli. 408. & 462  
contraria ut sunt, dua forma. 475  
convulsio ex inanitione duplex lethalis,  
& non lethalis. 589. 590  
convulsio ex repletionem ut nascitur, & ut  
curatur. 590  
copia humorum ut nascitur. 438. 439  
copiam mouere facultatem ut nascitur.  
447  
copiam humorum ex quibus symptomati-  
bus colligitur. 441  
cor est fons caloris, quamuis omnes eius  
partes frigida sint. 184  
cor habet duo temperamenta. 185  
cordis partes cur frigida facta sint. 574  
corroborantium rectus usus qui sit. 575  
Cornelij Celsi sententia de innouandis  
remedijs. 532  
corporis diuisio in duas partes cur fiat  
ab Hippocrate. 547  
corrupti accidentia communia, & pro-  
pria seruari non posse ingenito. 295  
corrupti accidentia si seruarentur in  
genito quid sequeretur. 295  
craneum humanum ridiculum reme-  
dium. 107  
cranei foramina præcipua, quæ sint. 245  
crisis bona quinque sunt, ex Gal. condi-  
tiones. 507  
crudis existentibus humoribus, ut est quo-  
que euacuandum. 530

cucurbita cum magna flamma ut tollit  
status ventris. 363  
cucurbitulis quando utimur crudo exi-  
stente morbo. 527  
cur errent, qui ex ratione vniuersali  
hauriunt specificam cognitionem. 3  
cur ex urina coniecturam colligimus in  
morbis. 284  
cutanei affectus à melancholia prodeun-  
tes quis sint. 348  
**D**efinitio accidentium sine causa  
inherentis est vana. 538  
A definitione in qualibet occasione est  
exordium. 538  
Definitio, quæ non dat cōsequentiā quid  
vana est. 429  
Definitiones per subiecta proxima non  
possunt esse substantiæ. 361  
Definitiones à potentis desumi, & non  
ab actu. 540  
Demonstratio ab effectu ad effectum cur  
non datur. 416  
Demonstratio ex medio termino præteri-  
to, vel futuro, & ex quesito præsentem  
est vanissima. 468  
Demonstratur, cubitum sinistrum secundum  
æquæ innare Hepar ac dextrum. 202  
Densum ut est causa frigoris. 418  
Densitas, & raritas ut sunt, principia  
omnium passionum. 414  
Densitas, & raritas cur ad situm perti-  
nent. 416  
Derivationis proprium est sequi inclina-  
tionem humorum. 542  
Derivatio ut sit etiam per longinqua o-  
stenditur. 554. & 565  
Destillatio ut excitetur à parte mitten-  
te, legem pars mittens.  
Desipientia cum risu ut indicant, san-  
guinem. 350  
Diacodium non dandum in pectoris ca-  
sarro. 444  
Diaphanum non pendet à raritate cor-  
poris ut dicit Zarabella. 297  
Diaphanum non fieri à raritate expe-  
riunt ostenditur. 298  
Diapha-



# NOTABILIVM.

<i>Diaphanum quid ex sententia perspecti- uorum.</i>	298	<i>melancholiam ut nescitur.</i>	342
<i>Diarrhoeis connexus quis sit.</i>	194	<i>Disputationes de nominibus ubi à Ga- leno vocentur garrula.</i>	471
<i>Diætamum curare Gallicam luem ex Sealigero.</i>	499	<i>Diuisio omnium affectuum præter nau- -ram proponitur.</i>	8
<i>Diæresis causa tres acrimonia, copia, &amp; externus ictus.</i>	24	<i>Diuisio sine demonstratione non aperit occulta.</i>	15
<i>Differentia specifica cur operantur, &amp; non individuales.</i>	453	<i>Diuisiois utilitas.</i>	15
<i>Differentia specifica est epilogus generum &amp; differentiarum.</i>	458	<i>Diuisio petis principium.</i>	ibid.
<i>Differentia partium, quæ pertinent ad primigenium, &amp; quæ ad aduentitium statum.</i>	221	<i>Diuisio omnis ex Boethio ad bimembrem reducitur.</i>	261
<i>Differentia specifica locorum affectuum sunt decem &amp; non plures, &amp; quæ sint.</i>	40. & 159	<i>Diuisio est facienda in eodem genere.</i>	457
<i>Differentia specifica affectuum unde su- mantur.</i>	158	<i>Diuisio non est facienda in differentias inter quas cadit medium.</i>	ibid.
<i>Digerentibus vii possumus aliquando ante totius purgationem.</i>	198	<i>Diuisio corporis in duas partes an sem- per seruanda sit.</i>	547
<i>Digni longi ut ostendunt iecoris calidi- tatem.</i>	344	<i>D. Thomas ut probat. potentias opera- trices non esse substantias.</i>	404
<i>Digni breues ut ostendunt iecoris frigi- ditatem.</i>	ibid.	<i>Dogmatica sectæ præcipua dogmata quæ sunt.</i>	451
<i>Dionysius Tyrannus præ lætitia moritur.</i>	368	<i>Dolor arenularum sauiissimus ut statim tollitur.</i>	514
<i>Dionysius grammaticus ut ob inediam in epilepsiam incidebat.</i>	506	<i>Dolor ut attrahat.</i>	444
<i>Dioscoridis fabulosa proponantur.</i>	425	<i>Dolor à causa frigida cur attrahat.</i>	ibid.
<i>Dioscorides defenditur.</i>	427	<i>Dolor sensus sine pondere fluxus indi- cat.</i>	361
<i>Dioscorides cur tot fabulosa protulerit.</i>	426	<i>Dolor colicus ut tollitur aqua frigida.</i>	358
<i>Dioscorides si redidisset quæ scripsit, ne- mo eo stolidior fuisset.</i>	427	<i>Dolor non indicat ut symptoma.</i>	13
<i>Dispositio corporis putris ut cognosci- tur.</i>	328	<i>Dolor cur in membrana fiat. pungitius.</i>	160
<i>Dispositio &amp; habitus cur non sint due speciès qualitatis.</i>	241	<i>Dolor cur in carne fiat. laceratiuus.</i>	161
<i>Dispositio visceris per quinque loca no- scitur.</i>	308. & 329	<i>Dolor in ossæ cur fiat. frangitiuus.</i>	ibid.
<i>Dispositio calida visceris à tribus causis potest introduci.</i>	314	<i>Dolor grauatiuus spina ut fit conuulsiuus.</i>	186
<i>Dispositio biliosa ex quibus antecedentibus signis cognoscatur.</i>	319	<i>Doloris colici causa quæ meth. inueniatur.</i>	333
<i>Dispositio viscerum ad congregandam</i>		<i>Dolor exasperatiuus stomachi à quo hu- more fiat.</i>	354
		<i>Dorones ut occidant canes.</i>	413. idem
			429
		<i>Dulcedo quot modis fiat. in humoribus.</i>	382
		<i>Dulcedo nauseosa ut tollitur oleo cal- chantino.</i>	383

# INDEX RERVM

<i>Dulcedo in sanguine &amp; pituita aliquando ex Galen. sentitur.</i>	381	<i>analogismum.</i>	491
<i>Dulcedo manifesta ut duorum generum esse possit.</i>	ibid.	<i>Empirica secta auctores &amp; dogmata.</i>	450
<i>Dulcedo manifesta alia suavis alia nauosca.</i>	ibid.	<i>Empiricus cur nescit curare catar- rhum.</i>	77
<i>Dulcedo nauoseosa in humoribus ex Auicenna ut à putredine fit.</i>	382	<i>Empirici errant dum semel in die topica adiungunt locis affectis.</i>	253
<i>Dulcia sunt qua corrumpuntur.</i>	378	<i>Empirici cur semper ferè decipiantur.</i>	492
<i>Dulcia vel sunt manifesta vel insipida.</i>	381	<i>Empiricorum commune erratum est, quod ubi est symptoma, ibi sit morbus</i>	93
<i>Dulcis humor insipidus est incognoscibilis.</i>	ibid.	<i>Empirici ut à Plinio reprehenduntur.</i>	494
<i>Dulcia omnia à calore moderato fiunt.</i>	382	<i>Empyema Syndrome signorum ut noscitur.</i>	31
<i>Dulcia à Galen. comparantur aqua calida repida.</i>	ibid.	<i>Empyema mirabili experimento Auicenna nescitur.</i>	32
<i>Dulcia qua absterguunt &amp; qua oppillant.</i>	383	<i>Empneumatosis ex Galen. quod, &amp; quomodo fiat.</i>	62
<i>Dulcia ex Auicenna oppillant quia rapiuntur ante coctionem.</i>	383	<i>Epiphora ut cognoscitur dum sit ab ichoribus melancholicis.</i>	336
<i>Dulcia cur aliquando acescant &amp; aliquando amarescant.</i>	385	<i>Epilepsia à qua causa immediata fiat.</i>	360
<i>Dulcia ut noceant melancholicis.</i>	385	<i>Epilepsia qua sit causa mediata &amp; immediata.</i>	361
<i>Durities ut à triplici causa fiat.</i>	442	<i>Epicurus ut errat dicens nullum usum venereorum esse salubrem.</i>	245
<i>Dysenteria ut distinguitur ab ulcere Hepatis.</i>	36	<i>Erasistrateri ut à Galeno reprehenduntur.</i>	191
<b>E</b> Cheneis non habet vim firmandi naui.	424	<i>Errata iria committuntur à quodam medico, dum petroselino vult sanare podagricum.</i>	241
<i>Elenchus dum sumitur non causa pro causa declaratur exemplo Medico.</i>	472	<i>Errata ob meatuum inscitiam qua.</i>	165
<i>Elenchus accidentis exemplo Medico declaratur.</i>	530	<i>Errata medicorum ob situm partium ignoratum.</i>	164
<i>Elenchus compositionis quis sit</i>	303	<i>Errata quæ in primo libro relictuntur.</i>	
<i>Elenchus accidentis alio exemplo declaratur.</i>	470	<i>Errata omnia qua committi possunt in perquirendis formis ad quatuor capita reducuntur.</i>	3
<i>Elenchus compositionis.</i>	240	<i>Erratorum genera cur quatuor tantum sint.</i>	6
<i>Elephantes cur in Italia non generantur.</i>	366	<i>Errare videntur, qui dicunt contrarium agere in contrarium.</i>	40
<i>Elephantici cur in Alexandria plures &amp; non in Germania.</i>	316		En are
<i>Elephantiasis ut curari possit.</i>	558		
<i>Emily Campilongy enchomium.</i>	338		
<i>Empirici prisci præstant nostratibus quia habebant historiam cum fide &amp;</i>			



# NOTABILIVM.

Errare videntur dum inferunt, incidunt  
in morbum ob maluaticis potum, ergo  
est refrigerandum. 41

Errant, dum omnem lationem ventri-  
culi vocant intemperiem. 43

Dum omnem imbecillitatem ventriculi  
calidis curant. 46

Dum Hypochondriacis dant calida.  
47

Dum inferunt sic: Sanguis per tussim  
eiectus est spumofus secundum om-  
nes partes, ergo vlcus est in pulmone.  
53

Errare videntur dum putant catar-  
rhum esse semper vitium capitis. 55

Dum remedia applicant capiti laeso per  
consensum. 56

Errare videntur dum tenent pituitam  
narium esse excrementum tertia co-  
ctionis. 57

Err. dum ex vomitibus & urinis præ-  
gnantem cognosci credunt. 59.60

Err. dum ex mensibus suppressis colli-  
gunt pregnantem. 61

Vi errant qui dicunt os vteri pregnan-  
tis claudi. 65

Errare videntur qui ex Hippocrate pu-  
tant semper conceptum cognosci si  
post coenam à potu hydromellis se-  
quantur tormina. 66

vi Err. qui sumunt, omnes aphorismos  
Hippocratis esse aterna veritatis. 67

vi Err. qui per suffitum aromatum præ-  
gnantem putant, prenoscere. 68

Errata quæ in secundo libro  
reiciuntur.

Errare videntur, qui tenent, uterum  
& mammillas per venas externas  
consentire. 81

Errata illorum qui ventriculi idiopa-  
thiam à sympathia non distinguunt.  
87

Errant, qui tensionem musculorum re-  
ktorum putant esse obstructionem me-

sententij. 91

Errare videntur, qui totis horis inun-  
gunt hypocondriacensia. 92

Errant, qui tensionem musculorum re-  
ktorum putant causare febrem. 93

Err. sæpè qui dicunt ubi dolor ibi mor-  
bus. ibid.

Vi errant Empirici dum in alui fluore  
viuntur astringentibus. 7

Vi errant quidam Empiricus, qui su-  
stinuit quendam abscessum mesente-  
rij fuisse vlcus intestini recti. 47

Vi errat Empiricus dum vult curare  
catarrhum. 77

Err. Empirici, quia ubi vident sympto-  
mata curant affectum. 85

Errata duo propria Empiricorum quæ  
sunt. 94

Errata duo alia precipua Empiricorum  
exponuntur. 107

Errant Empirici dum in hernia inun-  
gunt quoque costas, & in ascite lum-  
bos. 110

vi err. Empirici, dum inungunt pectus  
causa existente circa os sacrum. 113

vi Err. dum nesciunt sympathiam quæ  
est inter septimam thoracis verte-  
bram & cervicem. 116

Ob quam causam precipuam semper  
errent Empirici. 531

Erratum cuiusdam Empirici, dum laesis  
digitis applicabat remedium, & non  
humero ubi erat morbus. 124

vi Err. Empirici dum putant chylum  
sponte in pylorum descendere. 173

vi Err. quidam Empiricus, dum vidit os  
putridum emungi, credens cætera ossa  
capitis esse corrupta. 186

vi Err. Empirici, dum nesciunt, quod  
lactuca assimilata non refrigerat. 253

Errare videntur, qui in omni laesa actio-  
ne musculorum ad caput purgare con-  
fugiunt. 98. & 107. & 124

Err. Empirici dum inungunt maxillam

# INDEX RERVM

- inferiorem morbo existente circa stylo idem.* 102
- Errant dum inungunt brachia causa lationis existente in clunibus.* 105
- Err. videntur dum lasam cernicē morbo existente circa quintam vertebra thoracis inungunt.* 108
- Err. qui putant dilatarī thoracem, dum sursum efferuntur costę.* 111
- Err. dum tibiam lasam inungunt morbo existente in maiori trochantirio.* 141
- Err. dum inungunt femur, quod non potest extendi ob morbum existentem in osse coxendicis, vel pubis.* 145
- Errata quę in tertio libro reiciuntur.*
- Errant qui credunt os Œtriculi esse sub mucronata cartilagine.* 174
- Errat. Realduus Columbus dum dicit quod lithotomus incidat collum vesicę.* 174
- Errant, qui dicunt vulnus colli vesicę non esse lethale, ut vulnus vesicę.* 175
- Err. aliquando qui in lithiasi viuuntur refrigerantibus.* 178
- Errata illorum qui admittunt in renibus cribrum.* 180
- Err. dupliciter qui tenent glandulam cunealis recipere omnia excrementa cerebri.* *ibid.*
- Errare videntur qui dicunt trauclos ab intemperie frigida & humida fieri.* 181
- Errare videtur Delphicum oraculum respondens balbutienti.* 183
- Errant sepe qui colicum affectum pharmacis tractant.* *ibid.*
- Errare videtur Galen. si dicat secundum par neruorum cerebri non dare motum.* 188
- Errant qui latentem basilicam secant, & omittunt cephalicam vel medianam apertiore.* 190
- Errant qui putant esse consensum inter saluatellam & lienem.* 193
- Errant qui dicunt aliquando decidere mucronatam cartilagine.* 194
- Errant qui dicunt in parturientibus non dimoueri coccygem.* 196
- Err. mulieres dum putant in parturientibus dimoueri ossa pubis.* *ibid.*
- Errare videtur Galen. quod cephalica & basilica à diuersis truncis oriatur.* 197
- Errant Mundinus & Quinternius de ortu cephalica & basilica.* 200
- Errare videntur qui dicunt ob capillarem furculum cephalicam esse capitalem.* *ibid.*
- Errant rudiores de venulis manus.* 200
- Errare videntur qui negant cubitum sinistrum sectum non eque inuare hepar ac dextrum.* 201
- Errare videtur Fernellius dum reddit rationem cur euacuatio per dextrum cubitum inuaret hepar, per sinistrum lienem.* 205
- Errare videntur qui dicunt euacuatiorem per cubitum inuare hepar, quia insensibiliter euacuatur.* *ibid.*
- Errata in qua incidant qui pro hepate solum dextrum cubitum secant.* 206
- Errare videtur Vesalius dñi dicit pleuritidem fieri à sanguine veniente à vena sine pari.* 207
- Errata quę in quarto libro reiciuntur.*
- Errant qui in consultationibus de primigenio statu ab ortu scilicet natura tractant, illumque seruandum dicunt.* 217. 218
- Errant qui arguunt à signis aduentitijs status pro cognitione primigenij.* 219
- Errare videntur qui ex latitudine venarum colligunt iecoris caliditatem.* 221



# NOTABILIVM.

*Errare videntur qui dicunt magnitudinem partium indicare temperaturam.* 222  
*Errare videntur qui dicunt venas ab Hepate prodire.* *ibid.*  
*Errare videntur qui à proprio gustu colligunt quoddam unum sit proportionatum conualescentibus.* 230  
*Errant qui tenent affixa cerata donec sponte cadant.* 233  
*Vi errant qui faciunt naturam medicamentis consuetudinariam.* *ibid.*

## Errata Galeno adscripta.

*Error Galeno adscriptus de usu primi musculi tibia.* 134  
*Error Galen. adscriptus de quarto musculotibia.* 138  
*Err. dum dicit pylorum oriri à fundo ventriculi.*  
*Error adscriptus de cribro in renibus.* 179  
*Error adscriptus dum dicit in osse cuneali esse veluti cribrum.* 180  
*Dum dicit, septimum par nervorum à cerebello oriri.* 188  
*Dum dicit quod appendices ossium sint duriores ossibus.* 189.213  
*Dum dicit infernum orificium ventriculi habere glandulam.* 193  
*Dum dicit quod ren dexter sit altior sinistro.* 208  
*Dum dicit, quod Ventriculus sit magis in dextrolatere, quàm in sinistro.* 208  
*Dum negat. ossa digitorum esse concava.* 209  
*Dum dicit inter oculos, & nares esse meatum.* *ibid.*  
*Dum dicit processus vertebrarum colli integros esse.* 209  
*Dum dicit Hepar in Lobos esse divisum.* *ibid.*  
*Dum dicit quod in extrema parte spine sit nervus inconiungatus.* 209

*Dum dicit quod pulmo habeat quinque Lobos.* *ibid.*  
*Dum dicit musculum temporalem in medio esse tendinosum.* 210  
*Dum dicit os sacrum ex tribus tantum ossibus constare.* 211  
*Dum dicit decimam vertebrae esse medium dorso.* *ibid.*  
*Dum dicit scapulam moveri à septem musculis.* 212  
*Dum dicit duos esse musculos cuculares.* *ibid.*  
*Dum dicit à coccyge oriri nervorum conjugationes.* 212  
*Dum dicit cerebellum esse durius cerebro.* 213  
*Dum dicit aliquos nervos oriri à cerebello.* *ibid.*  
*Dum dicit spinalem medullam esse molliorem medulla ossium.* 213  
*Error Galeno & Aristoteli adscriptus, dum dicunt in corde non esse pinguedinem.* 213  
*Error Galeno ad scriptus dum dicere videtur, quod vertebra iungantur per tertiam tunicam spinalis medullae.* 214  
*Error adscriptus dum dicit caput infimum ulnae componi cum brachiali.* *ibid.*  
*Dum dicit, quod quartus musculus huiusmodi attollat. scapulam.* 214  
*Dum dicit substantiam penis exordiri à superiori parte penis.* *ibid.*  
*Errata alia Galeno adscripta cur non afferantur.* *ibid.*  
*Error Luthotomi, dum duos quoque musculos penis secant.* 137  
*Error illorum qui dimittunt sensum ob auctoritates qualis sit.* 198  
*Error cuiusdam peripatetici de pinguedine cordis credentis magis Aristoteli quam sensui.* 198  
*Error Anobarbi de Saluatella.* 201  
*Errata tria Valesii observantur dum loquitur de Vetula Atheniensis.* 235

# INDEX RERVM

- Erratum cuiusdam Empirici commissum ob loci affecti inscitiam.* 354
- Erratum cuiusdam dicentis ab intestino recto ad caput status non peruenire.* 358
- Errata omnia ut ad duos errandi modos reducantur.* 451
- Errata omnia committuntur ob logices inscitiam.* *ibid.*
- Errorum omnium fontes duos esse, & qui sint.* *ibid.*
- Errare videntur, qui dicunt consuetudinem in naturam conuertri.* 237
- Errare videtur Valesius dicens consuetudinem esse dispositionem, naturam esse habitum.* 241
- Errant, qui dicunt omnis repletio mala panis autem pessima, cum de carne sit intelligendum.* 243
- Err. qui malas consuetudines statim volunt amouere.* 244
- Err. qui solitis meraco consulunt, tenuissimum vinum.* 244
- errare quoque videntur, qui coitus antiquum usum subito, & omnino debilibus, & senibus interdiciunt.* 245. & 248
- errauit Epicurus quod usus venereorum sit insalubris.* 245
- errant qui consuetos cibos ex toto amouent.* 245
- err. qui consuetum aërem reprehendunt.* *ibid.*
- err. qui solitum, & antiquum meridianum somnum omnino reprehendunt.* 246. & 248
- err. qui consulant antiquum exercitium esse omittendum.* 246
- err. qui consulunt medicis vel aduocatis senibus ut disponant artis sue exercitium.* 247. 248
- err. qui consuetudinem inueteratam licet deterrima sit in senibus, & debilibus iubent esse amouendam.* 247
- err. etiam qui in robustis agris volunt malas inueteratas consuetudines demere.* 248
- errare videntur nonnulli, dum dant alterantia, eaque non mutant.* 252
- err. dupliciter qui iubent, cerata affixa teneri donec cadant.* 254
- errare videtur Valesius dum dicit, periodorum causam esse humorum copiam.* 277
- err. videtur Capiuaceus dum dicit, causam periodorum esse naturam humorum.* 276
- errare aliquando solent, qui vtuntur syrupo de lactuca, & cichorea.* 254
- errare videntur qui introducunt consuetudinem medicinarum soluentium, & alterantium.* 255
- Errata quæ reiciuntur in quinto libro.*
- Errare videtur Auer. dum dicit naturam seu calidum innatum esse causam periodicationis.* 275
- errare videtur Conciliator dum dicit periodicationem à motu Luna pendere.* *ibid.*
- errare videtur Fernelius dum dicit, causam periodorum esse idiosyncrasmiam.* 276
- errare videtur Gentilis cum Herculano dum dicit, periodicationem à causis oculis prodire.* 276
- errare quoque videtur Modernus dum dicit periodorum causam esse inquinamenta varia putredinis.* 277
- err. aliquando qui colligunt ex urina iudicium de humoribus pectoris.* 282
- err. qui perpetuo conditiones peccantium humorum ex urina colligunt.* 283
- err. qui dicunt pulsus per se indicare humorum coctiones, & cruditates.* 285. 288
- erratum cuiusdam medici dum ex pulsu serrati dicebat pleuritidem cognosci.* 286
- err.*



# NOTABILIVM.

err. qui ex antepositione, & postpositione  
paroxysmorum coctiones, & crudita-  
tes humorum colligunt. 290

err. Trallianus, & Christophorus à Vega  
dum dicunt quod febris sit solum na-  
tura conatur. 291

errare videntur, qui ex colore intensè  
rubro faciei colligunt sanguinis do-  
minium. 292

errare videntur Montanus, & Oriba-  
sius dum dicunt dolorem lumbrico-  
rum arguere dominium peccantium  
humorum. 294

errare videtur Albertus, & Zabarella  
de natura Diaphani. 298

err. videtur Auerr. dum dicit dari co-  
lores antequam adueniat lumen.  
299

errare videtur Mercurialis, dum dicit  
vermes non posse fieri à quolibet hu-  
more. 300

errant dum pro necandis lumbricis pu-  
tant theriacam temporibus applica-  
tam esse bonam. 301

erratum cuiusdam amici dicentis à fi-  
cubus, & à qualibet re dulci lumbrici-  
cos gigni. 302

errare videntur, qui ex glabra & nigra  
lingua semper colligunt dominari ca-  
lidos humores. ibid.

Errata quæ reiciuntur in sexto  
libro.

Errare videtur Argenterius de loco à  
proportionem in facienda syndrome si-  
gnorum pro cognoscendis humoribus  
peccantibus. 311

errare illos medicos dicit Galen. qui non  
distingunt calefacientia per se à ca-  
lefacientibus per accidens. 326

err. Cardanus dum dicit frigus esse quid  
primarium & non posterum. 327

errare videtur Fernelius, dum dicit po-  
dagram solum à putredine fieri. 338

errare videntur qui putant à solo ven-

triculi calore primam coctionem fie-  
ri. 345

err. qui in omnibus secant varices.  
347

errare videntur, qui tenent hypocon-  
driacam passionem, & picam ab atra  
bile feriosa oriri. 348

errare videntur, qui dicunt melancholia  
cum risu sanguinem indicare.  
350

errant rudiores dum non faciunt discrimen  
inter euacuationem nigrorum &  
atra bilis. 353

err. qui discutientibus sentant tollere  
flatum hypocondriacos. 354

Vi err. qui tenent causam generationis  
flatuum semper esse calorem diminutum.  
357

Vi errant quidam vecordes in Vnga-  
ria, dum ad tollendum colicum do-  
lorem hauriunt aquam gelidam.  
358. & 360

errare videtur Aristoteles, & Auerr.  
dum negant sub Aequatore esse lo-  
cum habitabilem. 365

errare videtur Auerr. dicens quintum  
clima esse omnium temperatissimum.  
ibid.

errare videtur Manardus dicens sex-  
tum clima esse omnium temperatissi-  
mum. ibid.

errare videtur Albertus Magnus di-  
cens septimum clima esse temperatissi-  
mum. ibid.

Errata quæ reiciuntur in septi-  
mo libro.

Vi errant Tyrones Medici dum i-  
niunt consilia pro curandis morbis.  
374

errare videtur qui dicunt putredinem  
& m. r. m. esse veras causas feb-  
dis. ibid.

Vi error est qui contra licent Avicenna  
dū dicit ex amaro fieri posse salisū. 379

# INDEX R E R V M

*Vi errant, qui dicunt Auicennam de causa falsedinis à Gal. dissentire. ibid.*

*Vi errant. Manardus & Valesius dum argumentis nullius roboris disputant contra Auicennam de quarto genere melancholia. 386*

*errare videntur Auerr. & Auicenn. dum putant vitellinam bilem esse misturam ex flaua & crassa pituita. 390*

*err. videtur Auicenn. dum dicit bilem flauam esse mixturam ex bile & aquea pituita. ibid.*

*errant qui tenent porraceam bilem esse mixturam ex flaua seu vitellina, & pituita. 391*

*errare videntur qui tenent porraceam bilem solum in ventriculo gigni. 392*

*Vi errant, qui per paracentesim totam aquam hydropicorum euacuant. 393*

Errata quæ reliciuntur in octauo libro.

*Vi errant morborum innouatores, sicuti est Fernelius, & Argenterius. 402*

*errare videntur, qui dicunt de predicamentis non agi diligentius in Logica, quam in Metaphysica. 406*

*Vi errant qui tenent, potentias varias esse solum fundamenti relationes. 407*

*Vi errant qui ex eo, quod potentia est principium transmutandi aliud, tenent quoque potentias non pertinere ad qualitatem, sed ad substantiam. 408*

*Vi errant qui dicunt, potentias operatrices esse substantiam, quia actiua potentia est essentia forma. 409*

*errare videtur Zabarella dum dicit, quod potentia à forma ut ab efficiente per emanationem emanant. 410*

*Vi errant, qui attribunt Galeno, quod qualitates occultæ substantiæ sint. 411*

*Vi errat Themistius dum dat demonstrationem ab effectu ad effectum. 416*

*Vi err. qui tenent omnes potentias operatrices à quatuor qualitativis ut ab origine pendere. 422*

*Vi errat Fernelius, dum refert omnes animarum potentias in substantiam. ibid.*

*Vi errauerit Cardanus loquens de mirabili lapillo Papa Clementis septimi. 423*

*Ut err. qui putant, quod echeneis uinum firmer. 424*

*Vi err. Albertus Magnus, dum dicit, quod Lapis aquila conciliet amorem, & partum facilem reddat. 424*

*err. qui dicunt lapidem calcedonium collo appesum tollere illusiones phantasticas. ibid.*

*err. qui dicunt Calidonium, qui inuenitur in ventre hirundinum, sub sinistra ascella gestatum sanare epilepsiam. ibid.*

*err. Albertus, dum dicit, quod lapis chrisolatus pellat stultitiam. ibid.*

*Vi err. qui lapidem iaspidem collo appesum putant suppressere hamorrhagiam. 424*

*Vi err. qui lapidem Iudaicum gestatum in brachio putant calculum renalem expellere. 425*

*Vi err. qui tenent, cristallum puluerisatum augere lac. ibid.*

Fabulosa à Dioscoride relata.

*Err. dum refert, surculum Rhami impostum fenestris veneficia depellere. 425*

*Dum refert virgam viticis intertriginem si manu teneatur non sentiri. ibid.*



# NOTABILIVM.

- Dum refert araneum fronti alligatum tertianam curare.* ibid.
- Dum refert araneum albam tellam facientem lacerto appensam curare quartanam.* ibid.
- Dum refert caput lacerta intritum aculeos infixos corpori extrahere, & varos, & fornicantes verucas tollere.* ibid.
- Dum refert vermiculos qui in dissaco inveniuntur appensos collo pelleret quartanam.* 426
- Dum refert semina spine albe gestata serpentes abigere.* ibid.
- Dum refert alysum foribus appensum esse fascium amuleum, & morbos pecudum abigere.* ibid.
- Dum refert atraclilidem manu gestatam dolores ab ictu scorpionis tollere.* ibid.
- Dum refert substractu conyla abigi culices, & pulices.* ibid.
- Dum refert venerem excitari, si manu teneatur radix satyri Erithrony.* ibid.
- Dum refert penthapilum dum ineenditur valere ad castimonias, & expiationem peccatorum.* 426
- Dum refert phoenicem herbam adligatam in puniceo, vello sanguinem suppressere.* ibid.
- Dum refert sideritis decoctionem sparsam in triclino conuinat reddere latiores.* ibid.
- Dum dicit quod radicis mandragora decoctum possit emollire dentem elephantis.* 427
- Dum dicit, quod asfer atticus, si manu teneatur dolorem inguinum sedare possit.* ibid.
- Dum dicit Leontapodium conuenire ad amatoria.* 427
- Dum putat, quod folia mercurialis masculi trita a purgatione menstruum ad mata genitalibus masculinum gignat.* ibid.
- Dum dicit lapidem selenitem adligatum arboribus reddere eos frugiferos.* ibid.
- Dum dicit, quod iaspis appositus femoribus parum acceleret.* ibid.
- Dum refert ophitem lapidem collo appensum auxiliari lethargo.* ibid.
- Vi errarunt qui dixerunt herbam Balm vocatam posse excitare a mortuis animantia.* 427
- Vi err. Democritus, & Theophrastus dicentes ethiopidem herbam foribus clausis applicatam eas aperire.* 428
- Vi errat. Democritus dicens achemenidem herbam datam iis qui lace- rantur tormentis cogere, ut omnia faciantur.* ibid.
- Dum putant aliam achemenidem traieciam in Hostium aciem eos fugere.* ibid.
- Vi erravit Quintus Serenus, & alij, qui putant morbos curari breuiculis caracteribus refertis.* 428
- Vi errat. Marcus Caro dum putat luxatos curari quodam cantu.* ibidem.
- Vi errat qui putant, venenum esse quid absolutum.* 429
- Vi errat. Capinaceus tradens veneni definitionem.* ibid.
- Vi err. qui putant linidum colorem indicare venenatos.* 430
- Vi err. qui unicam dari definitionis veneni putant.* ibid.
- Vi err. qui ex apertione cadaveris venenatum cognosci putant.* 431
- errare videtur Mercenarius, & Zabarella cum aliis dicentibus humores putridos febriles putrescere secundum partem, & non simpliciter.* 432
- Vi errat. Zabarella dum dicit, putredinem in humoribus tolli posse per leuem medicinam.* 433
- Vi errant qui tenent putredinem insignem esse venenum.* 434

# INDEX RERVM

*Vt errant qui dicunt calorem nasium  
esse celestem.* 435  
*Vt errant qui putant solum massam  
sanguineam, & non alios humores  
conuertere posse in pus.* 435  
*Vt err. Empirici, dum utuntur supp-  
rantes in humoribus calidis, cum  
virtute robusta.* 436  
*Vt err. Empiricus tractans erisipelas ge-  
narum suppurantibus.* *ibid.*  
*Vt err. tractans erisipelas pedicis laxan-  
tibus.* 436  
*Vt err. qui in frigidis humoribus vnu-  
tur digerentibus.* *ibid.*  
*Vt err. qui in ulceribus vetustis pedum  
utuntur lorionibus digerentibus.*  
436  
  
*Errata quæ reiciuntur in nono  
& decimo libro.*  
  
*Vt err. qui dicunt, meias sapè ut canis si  
vis viuere sanus.* 441  
*errare videntur, qui dicunt vacuum  
attrahere.* 445  
*err. qui in omni fluxione tractant me-  
dicinis partes mittentes.* 446  
*Vt err. qui fluxiones tractant astringen-  
tibus.* *ibid.*  
*Vt err. Empiricus dum hemorrhagiam  
athlete supprimit.* 446  
*Vt err. dum utuntur eadem hora con-  
trarijs auxilijs.* 447  
*Vt err. Empirici, dum parti mittenti  
exsiccata à frigore externo curant stil-  
licidijs, cauterijs, & alijs auxilijs.*  
447  
*err. qui parti mittenti in qualique sunt  
humores à calido adiungunt auxi-  
lia.* 448  
*err. dum volunt sanare partem mitten-  
tem à copia molestam.* *ibid.*  
*Vt err. qui pro sanguine à capite pro-  
deunte & in pectus collecto utuntur  
diacodio.* 449  
*Vt err. dum eadem hora in morbis pe-*

*etoris contraria remedia admini-  
strant.* *ibid.*

*Errata quæ reiciuntur in vnde-  
cimo libro.*

*Vt err. qui putant indicationem esse Syl-  
logismum imperfectum.* 451  
*Vt err. qui diuidunt morbos in causas.*  
456  
*Vt err. qui diuidunt affectus per diffe-  
rentias inter quas cadit medium.*  
457  
*Vt err. qui non rectè diuidunt indican-  
tia.* 459  
*Vt err. qui putant magnitudinem mor-  
bi per se primò indicare pharmacum,  
& vena sectionem.* 459  
*Vt err. qui utuntur principijs commu-  
nibus in perquirendis remedijs.* 460  
*errata tria à Galeno animaduersa quæ  
committi solent in perquirendis in-  
dicationibus.* *ibid.*  
*err. qui ad specifica non perueniunt, quia  
petunt principium.* 461  
*error illorum, qui à communibus proce-  
dunt est paralogismus à positione  
consequentis ad positionem antecè-  
dentis.* 462  
*Vt errant iterum qui dicunt magnitu-  
dinem morbi indicare vena sectionem,  
& pharmacum.* 465  
*Vt errant Xenocrates utens Syllogismo  
duplante.* 466  
*Vt errant qui consulunt quid sic facien-  
dum post tres dies.* 469  
*Vt errant qui petunt Consilium à Me-  
dico absente.* *ibid.*  
*Vt errant qui ab externis causis indi-  
cata colligunt.* 469-470  
*Errant qui à locis affectis indicationes  
curatiuos colligunt, quia incidunt in  
elenchum accidentis.* 470  
*Vt errant qui curant symptomata.* 471  
*errant qui sumunt indicationem à Sym-  
ptomate, quia incidunt in elenchum  
in quo*



*in quo sumitur non causa pro causa.*

472

*err. rudiores incidentes in enthimema ex signo solubili dum à loco affecto colligunt remedium.*

474

*In tria errata incidunt qui colligunt remedia ab essentia generica, scilicet in diminutam diuisionem principij, & in secundam figuram ex duabus affirmatiuis.*

475

*errata studiosorum à tribus causis oriri solent.*

476

*Vt errant qui tenent magnitudinem morbi indicare phlebotomiam.*

ibid.

*Vt err. qui faciunt indicantia plura tribus.*

476

*Errata quæ reiciuntur in duodecimo libro.*

*Vt err. Empirici dum vtuntur in perquirendis remedijs analogismo.*

480

*Vt err. qui proponunt remedia, quia alios inuariant.*

483

*err. qui vtuntur analogismo, quia præmissa non continent conclusionem.*

ibid.

*err. secundo, quia in analogismo maior est particularis.*

ibid.

*Vt err. Empirici dum remedium, quod est superioris affectus, attribunt inferiori.*

484

*errare possunt tripliciter, qui ad equatam causam non afferunt.*

ibid.

*Vt err. Empirici dum vtuntur syringa in qualibet urina suppressione.*

ibid.

*Vt err. dum remedia species applicant generi.*

485

*err. qui vtuntur analogismo Empiricorum, quia transeunt de genere in genus.*

ibid.

*err. Empirici, quia semper præuè diiudicant.*

ibid.

*errarum Empiricorum commune est, quia putabant causas esse imperceptibiles.*

486

*errabant Empirici in suis similitudinibus.*

ibid.

*Vt err. Empirici dum dicunt, Cidonium roborat ventriculum, quia astringit, ergo & mespillum.*

ibid.

*errabant Empirici, quia propria subiecta quæstionum non poterant inquirere.*

487

*Vt errabat. Briso vtens principio communi in perquirenda quadratura circuli.*

ibid.

*error Massaria de indicante sanguinis missionem.*

489

*Vt err. Empirici dum in erisipelate par. Flaccidarum vtuntur suppurantib.*

490

*Vt err. Empirici, dum claudum remedijs tractant.*

ibid.

*Vt err. qui experientia sola in medicina incedunt.*

491. idem 494

*Vt err. Empirici dum putant ex re semel visa fieri experientiam.*

491.

idem 494

*Vt err. Empirici dum ab hausto medicamento putant fieri sensationem.*

492

*Vt err. qui vtuntur secretis.*

494

*Vt err. qui dicunt experientiam procedere ab effectib. ad causas, cum procedat ab effectibus ad subiecta.*

498

*Vt err. qui à subiectis, vel à causis remotis putant vniuersale colligi.*

499

*Errata quæ reiciuntur in decimotertio libro.*

*Errata tria & non plura posse committi in administrandis remedijs.*

501

*Vt err. Empirici, dum quantitatem remedium, à communibus indicantibus sumunt.*

502

*Vt err. dum in affectibus pulmonis dant solum duas drachmas pro vice sacchari res.*

ibid.

*Vt errant qui in magnis obstructionibus solum vnciam cum dimidia oxymellis exhibent.*

503

*Vt err. dum in oculorum doloribus & in-*

KKkk

# INDEX RERVM

- flammationibus solum aqua tepida*  
*utuntur.* 503
- err. qui utuntur in sedandis doloribus*  
*aqua rosacea plumbeo alembico stil-*  
*lata.* *ibid.*
- Vt errunt, qui utuntur diminuta seri*  
*lactis dosi in ardenti febre.* 504
- Dum utuntur in colica passione anema-*  
*te diminuta virtutis.* *ibid.*
- Dum in lumbricis auferendis nugis v-*  
*tuntur.* *ibid.*
- Dum diminutis & extraneis remediis*  
*putant gonorrhœam sanari.* *ibid.*
- Dum tentant mouere menses fabulosis*  
*presidiis.* 505
- Dum siti enectis dant saccharo condita.*  
506
- Vt err. Empirici dum leuissima de cau-*  
*sa dant pharmaca.* *ibid.*
- Dum nimiam inediam precipiunt cho-*  
*lericis detentis capitis destillationi-*  
*buis.* 506
- Vt err. dum terebra utuntur, quando*  
*non oportet.* *ibid.*
- err. videntur Conciliator & Cardanus*  
*dum sustinent nunquam terebratio-*  
*nem conuenire.* 507
- err. videntur dum utuntur repellenti-*  
*buis quando non oportet.* *ibid.*
- erratum proponitur cuiusdam medici*  
*nostri temporis dum applicat in an-*  
*gina parti externa gutturis repellen-*  
*tia.* 507
- errata duo Guidonis reijciuntur, dum*  
*negat. vsum repellentium in affecti-*  
*buis à materia crassa.* 508
- Vt err. qui in principio inflammationis*  
*non purgato corpore utuntur laxan-*  
*tibus, ut est oleum amigdalorum,*  
*dulcium.* 508
- Vt errat Atalus Medicus dum laxan-*  
*tibus occidit Cynicum Philosophum.*  
*ibid.*
- Vt errant qui repellentia applicant stru-*  
*mis.* 509
- Vt errant qui utuntur hyeme Herbis*  
*siccis.* *ibid.*
- Vt errarunt qui curarunt Matronam*  
*Romanam medicamento ex alga non*  
*purgato corpore.* 509
- Vt err. dum omnibus dant Syrupum post*  
*duas horas ab incepto calore pare-*  
*xifini.* 510
- Vt err. dum omnibus dant post tres ho-*  
*ras à syrupo cibum.* *ibid.*
- Vt err. dum referunt mulierum iudicio*  
*de cibandis agris & de aliis.* *ibid.*
- Vt err. Medici dum in acutis horas ci-*  
*bandi pro die sequuti prescribunt ac*  
*si essent vates.* 510
- Vt err. dum in statu morbi precipue*  
*purgant sanguinem mittunt, & alia*  
*efficiunt.* 511
- Vt err. dum plus nutriunt in statu mor-*  
*bi, quam in principio.* *ibid.*
- Vt err. Empirici dum obseruant, virtu-*  
*tem languidam indicare que val-*  
*de nutriunt, & fortem indicare me-*  
*diam.* *ibid.*
- Vt err. dum alunt debiles multum, &*  
*sapè.* 512
- errata tria que committi solent circa*  
*quomodo agendum.* 512
- Vt errant qui putant, quod lapis re-*  
*num, & vesica possit remediis frangi.*  
513
- Vt errauit Medicus quidam utens pro*  
*calculo minuendo in praeclarissimo*  
*viro Electuario de vitro.* *ibid.*
- Vt err. dum per loca affecta euacuant.*  
*ibid.*
- err. dum exhibent pharmacum in colica*  
*passione.* *ibid.*
- err. dum in uteri inflammatione mo-*  
*uent menses.* *ibid.*
- err. dum in renum inflammatione dant*  
*diuretica.* *ibid.*
- Vt err. qui in calculosis dant diuretica.*  
514
- Vt famosus circulator morte perempsit*  
*calculosum.* *ibid.*
- Vt err. qui adhibens fidem alicorno.* 515
- Vt err.*



# NOTABILIVM.

- Ut err. qui credunt lapillos preciosos malignitati aduersari.* 515
- Ut err. qui dant refrigerantes Symplos actu calidos.* 516
- Dum localia actu frigida applicant partibus externis.* ibid.
- err. qui uiuuntur glacie in alterantibus Sympsis.* 516
- Ut err. dum tenent febrientes in calido cubiculo.* 517
- err. dum permittunt ut plurimi ingrediantur cubiculum.* ibid.
- Errata circa ubi agendum notantur.* 317
- Ut err. rudiores dum in omni morbo procedunt cathartici.* 518
- Ut err. dum occidunt agrum, qui lotionibus capitis euasisset.* 519
- Ut err. dum in sanguineo fluxu narium applicant pinis narium astringentia.* 520
- Ut err. in curandis lumbricis.* ibid.
- Ut err. qui putant saluatellam in affe-ctibus lienis esse accommodatam.* 520
- Ut errauit Anobarbus loquens de saluatella.* 523
- Ut err. qui in omni maligna febre uiuuntur vesicantibus.* 525
- Dum dicunt, quod propterea humores in egrotantibus sint transponendi ad cutem, quia est debilius argumentum est in secunda figura ex affirmatiuis.* 526
- Ut err. qui in febris malignis probantes vesicantia uiuuntur analogismo Empirico.* 528
- Ut err. qui pro comprobatione vesicantium uiuuntur enthimemate ex signo solubili.* ibid.
- Ut err. dum exemplo canis rabidi paralogizant de vesicantibus.* ibid.
- Ut err. qui primum de medio concludunt per simile tertio.* 528
- err. quoque qui in maligna febre nunquam admittunt vesicantia.* 529
- err. qui dicunt vesicantia nocent, ergo non habent locum.* ibid.
- err. qui negant vesicantium usum in febris quia incidunt in primam figuram cum minori negatiua. ibidem.*
- Ut err. qui in principio februm dum erget materia dant semper phar-macum.* 530
- Ut err. quidam arguentes à partibus ad totum.* 530
- Ut err. qui dicunt, nunquam crudis existentibus humoribus esse vacuandum.* ibid.
- errata duo committunt, dum dicunt vesicantia non esse admittenda in febris quia calefaciunt.* ibid.
- Errata quæ reiciuntur in decimo quarto libro.*
- Ut err. qui dicunt reuulsionem esse attractionem.* 538
- Ut err. qui dicunt, reuulsionem indicari solum à materia, quæ est in motu.* 540
- Ut err. Curtius & Manardus dum interpretantur Hippocratem loquentem de reuulsione.* 541
- Ut err. Fernellius, & Petrus Brisotus dicentes sanguinem egredi à secta vena, quia est expulsus à fibris re-ctis.* 544
- Ut err. Fernellius dicens fieri reuulsionem inter partem supernam & infernam, & nequaquam inter partem dextram & sinistram.* ibidem, & 556
- Ut err. Argentarius dum dicit, sanguinem egredi à secta vena ob dolorem sectionis, & vinculorum.* 544
- Ut err. Altimarius, dum dicit sanguinem egredi ob vim vacui.* ibid.
- Ut err. recentiores dicentes sanguinem à secta vena defluere ut grauis.* 545
- Ut err. qui dicunt. Cauterium commiss-*

# INDEX RERVM

- sur coronalis reuellere per distantissimam, cum sit per proxima.* 546
- Vt Err. Laurentius Ioubertus dicens in inflammatione manus esse per idem cubitum reuellendum.* 552
- Vt err. Argenterius negans non esse perfectam rectitudinem inter partem dextram & sinistram.* 558
- Vt err. Brissonius & Fernelius dicentes quod fibra recta solum sint in longum extensa.* ibid.
- Vt errat. Curtius intelligens per vasa communia in reuulsione seruanda venas.* 559
- Vt err. Curtius, dum videtur tenere quod conueniat per se reuulsioni trahere humores ad originem fluxionis* 562
- Vt err. Manardus & Curtius dicentes phlebotomiam non posse esse remedium mistum reuulsorium scilicet, & deriuatorium.* 564
- Errata quæ reiciuntur in quinto-decimo libro.
- Error Empiricorum dum putant, agrotantem semper unico affectu præter naturam detineri.* 566
- Vt err. qui existente virtute imbecillidant. medicamenta potentissima.* 568
- Errant. dum in morbi limine virtute existente robusta plenè nutriunt.* ibidem.
- Errant. Empirici, dum eadem die qua virtus est attendendum, alia qua affectum respiciunt, qua aliis dieb. possent dari, exhibent.* 569
- Vt Err. qui viuuntur exsiccantibus in ulceribus ante amotionem intemperiei partes circumstantis.* 570
- Vt err. qui viuuntur Sarcoticis & deterforis in ulceribus ante amotionem intemperiei partis circumstantis.* 570
- vt errauit Medicus Thesalius & nostrates aliqui in curatione puncturae nervi.* 570
- vt Err. nostrates dum omittunt indicationes quæ debent sumi à partibus.* 576
- vt Err. nonnulli chirurgi, dum primis diebus roborant. partes debiles.* 579
- Errata chirurgorum, dum in omni ulcere viuuntur exsiccantibus.* 582
- Primum est dum vlcus est cum fluxu.*
- Secundum dum pars circumstans est imbibita.*
- Tertium dum pars circumstans est inflammata.*
- Quartum dum in vlcere est durities scyrrhosa.* 585
- Quintum erratum, dum viuuntur exsiccantibus ablationem impedimento- rum.* ibid.
- Vt err. qui in suppurandis apostematibus viuuntur duris emplastris.* 586
- Errata rudiorum chirurgorum vnde pendeant.* 587
- vt Errant qui semper vetant. lac hectici ob leuem obstructionem.* 588
- vt Err. qui in febribus semper reijciunt vesicantia.* 589
- vt Err. qui in omni maligna febre vesicantia proponunt.* ibid.
- Quando errant. qui conuulsionem curant. ijs quæ excitant. febrem.* ibid.
- Erratum quorundam notatur qui calidis curant. conuulsionem factam ab aruginosis succis.* 590
- vt Err. quoque qui viuuntur calidis in conuulsione ex pituitosis succis.* 591
- Vt err. qui purgant stomachum dum morsum patitur.* ibid.
- Vt err. qui in splenetis incipiunt ab aperientibus & non astringentibus.* 591
- Vt err. qui apparentibus papulis semper respuunt. anguinis euacuationem à embrio.* 592
- Vt err.*



# NOTABILIVM.

*ut Err. qui congelatos pedes putant esse calefaciendos.* ibid.  
*Errata duo Rudiorum de ordine medicandi.* 592  
*ut Err. dum permittunt. totum pus ab apostemate egredi.* 594  
*ut Err. dum symptomata hemorrhoidum hirudinibus tractant.* 595  
*ut Errant. qui veniunt diureticis in habentibus cruditates.* ibid.  
*ut Err. qui dant manam habentibus crudos succos in pectore.* 595  
*ut Err. qui in principiis morborum dant sem. mellonum.* 596  
*ut Errant Archigenes, dum dicebat semper a lenioribus esse exordiam curam.* 604  
*ut Err. dum in principiis morborum vniuntur frictionibus, balneis & cucurbitulis.* 596  
*ut Err. dum nunquam applicant localia absque purgatione.* 597  
*ut Err. qui prima die in phrenesi non audent vti oxyrodinis.* 598  
*ut Err. qui prima die in doloribus articulis anodyna non applicant.* 599  
*errant non solum qui prohibent medicinas, & phlebotomiam in alui fluore, verum etiam qui semper in fluxu vniuntur medicinis.* 601  
*Euacuatio nunquam facienda per loca affecta.* 513  
*Eustachius Rudius defenditur, & laudatur.* 279  
*Exempla cur non concludant.* 454  
*Exemplo pulcherrimo ostenditur naturam differre a consuetudine.* 239  
*Exempla apud Arist. saepe falsa pro veris proponuntur.* 468  
*Exempla ex Galeno ut a somno extitent.* 567  
*Experientia nihil concludere ostenditur.* 454  
*Experientia cur fallax.* 204.494  
*Experientia cur non pertineat ad Me-*

*thodum.* 452  
*Experientia est paralogismus, licet ex infinitis particularibus colligeretur.* 496  
*Experientia cur ex particularibus sola non docet.*  
*Experientia ex Aristotele non dat. vniuersale.* ibid.  
*Experientiam non dare propositiones vniuersales, sed indefinitas.* 498  
*Experimentum ut definitur ab Arist.* 491  
*Experimentum non ab unica memoria, sed a multis fieri.* 492  
*Experimentum perfectum quomodo fiat ut non decipiat.* ibid.  
*Experimentum ut est falsus syllogismus.* 495  
**F**acies coloratio agrotantium quos morbos portendat. 325  
*Facultates omnes, & praecipue sensitiuas ob consuetudinem amitti.* 236  
*Faeces nigrae quam melancholiam indicent.* 346  
*Faeces melancholicae aut austera, & ut acida fiat.* 389  
*Faeces liuosa quid significant.* 394  
*Falopij opinio de ortu Cephalica & basilica.* 199  
*Famelici ostendunt pituita acida redundantiā.* 335  
*Febris diu durat ob tres causas ex Galeno, scilicet ob partem laesam, ob crassitiem humorum, & ob erratum commissum.* 338  
*Febris maligna a quibus externis causis excitari solet.* 317  
*Febris ardens a quibus externis causis fiat.* ibid.  
*Febri tertiana detenti solum alternis diebus ex Galeno debent cibari.* 512  
*Febrientibus aer frigidus maius commodum, quam incommodum affert.* 517  
*Felis tria venena.* 421  
*Fernelius de morborum formis agens.*

# INDEX RERVM

- quibus principis suffultus.* 403  
*Fernely opinio, quod causa periodorum sit idiosinchronia, est falsa.* 276  
*Fernely commentum, cur euacuatio brachij dextri conueniat Hepati, sinistri lieni.* 205  
*Fides ut mitigat dolores.* 426  
*Finis in affectibus praefer naturam curandis triplex est.* 472  
*Figura tertia habet sex modos possibiles & non plures.* 495  
*Filisei morbum ut Galenus cognouerit fore breuem.* 320  
*Flauus varios morbos pro varietate locorum facere.* 164  
*Flatibus ut qualibet pars corporis vexetur.* 356  
*Flatus aliquando ossa frangere.* *ibid.*  
*Flatus definitio ex Galeno qua sit.* *ibid.*  
*Flatus causa efficiens non potest esse calor omnino diminutus.* *ibid.*  
*Flatus ut generentur.* 356  
*Flatus ex Galeno comparatur aëri austrino.* *ibid.*  
*Flatuum causa alia est generationis, alia expulsionis.* 357  
*Flatus à quatuor causis externis fieri possunt.* *ibid.*  
*Flatus ut capitis dolores efficiant.* 358  
*Flatus ut oriantur à diminuta altera- trice, & ab irritata expultrice.* 359  
*Flatus ut ex urina cognoscantur.* *ibid.*  
*Flatus indicatur à tensione sine ponde- re.* 360  
*Flatus ex Auicenna indicatur à tribus fontibus.*  
     *à motu scilicet membrorum*  
     *à sono*  
     *à tactu.* 361  
*Flatibus qua corporis partes subiecte sint.* 362  
*Flatus ut cognoscitur ex sono esse in variis intestinis.* *ibid.*  
*Flatus ex Galeno mirabiliter discen- tiuntur alio cocto, ruta, cimini, ni-*  
     *gella, & an: so.* 363  
*Fluxus vel à mittente, vel à recipiente causa sit.* 444  
*Fluxionum causa qua sint.* 425. 443  
*Fatum attrahere puriorem sangui- nem, & deteriozem ex Galeno relin- quere.* 352  
*Formarum morbos dari, ut quinque argumentis probant aduersarij.* 404  
*Formarum morbos non dari quinque efficacissimis argumentis probatur.* 406  
*Frigida intemperies in cerebro obliuio- nem, in Hepate hydropisim facit.* 163  
*Frigiditas ut in humido operatur albe- dinem, & in sicco nigredinem.* 393  
*Frigoris cause sex sunt ex Galeno.* 307  
*Frigus ut differt à rigore, & horrore.* 323  
*Frigide cause qua per se refrigerant qua sint.* 327  
*Frigide cause, qua per accidens refrige- rant, quæ.* *ibid.*  
*Frigus est quid positum, & non pri- uatum contra Cardanum.* 327  
*Frigus quod sit quid positum duplici experimento ostenditur.* *ibid.*  
**G**alenus defenditur dum ei ad- scribitur, quod apendices ossium sint duriores ossibus. 189  
*Galenus solum duo humana cadauera, eaque imperfecta dicit se uidisse.* 198  
*Galenum cur non semper sequimur.* 199  
*Galenus reprehendit usum medicina- rum.* 256  
*Galenus ut prænoui morbi breuitatem Filisei.* 274  
*Galenus ut prænoui lōgitudinem pleu- ruidis Anaxionis.* *ibid.*  
*Galenus praeipue docet esse distinguen- dum*



# NOTABILIVM.

- dum id quod calefacit per se ab illo quod per accidens.* 313
- Galenus cur praeter ceteris laudet quartum clima.* 366
- Galeno quomodo consentis hoc principium, quod omnes passiones à raro & denso fiant.* 415
- Gallicalues in principio ut virtute analogismi inuentum fuerit remedium.* 488
- Genus unum cur unicam habeat contrarietatem.* 464
- Giulius Scaliger refert gallicam luem, tolli vel aqua ex theriaca destillata, cortice iuniperi, tormentilla, Carduo benedicto, scordeo, & dictamo.* 499
- Glandula, quae assimilatur pina, & quae dicitur conarium, quae sit.* 337
- Glandula ossis cunealis usus qualis.* *ibid.*
- Glandula mesenterij cur melancholiam quoque suscipiant.* *ibid.*
- Glandula pancreas ubi sint.* 337
- Glandulam natura fecit ubicumque venas, vel arteria bipartitur.* *ibid.*
- Gonorrhoea quibus remediis tolli possit.* 504
- Graciles ut possunt habere multum sanguinem.* 343
- Gracilitas ut fit aliquando ex sanguinis repletionem.* 343
- Gravitas & leuitas ut ex Aristot. sunt formae elementorum.* 409
- Gravitas indicat copiam excrementorum, sed non versa vice.* 441
- Guaiacum lignum cur curet gallicum, tres opiniones.* 499
- Guaiaci qualitas si esset substantifica non curaret gallicum, probatur.* 408
- H** *Aberet res angulos non conuenit primo Scaleno.* 382
- Habitus & dispositio non sunt duae species qualitatis, & cur.* 241
- Hemorrhoidalis sanguis quam melancholiam indicet.* 346
- Hectica febres cur periodicis careant.* 273
- Hepar aliquando inuentum in parte sinistra, licet in dextra.* 200
- Hepar peruenit ad mucronatam cartilaginem.* 174
- Hepar ut afficitur per consensum vicinarum partium.* 75
- Hepatis figura imitatur semilunium.* 169
- Hepatis vlcus ut noscitur signorum syndrome.* 36
- Hepatis vlcus ut noscitur dum est in gibba, vel sima parte.* *ibid.*
- Hepatis incendium ut extinguit calorem ventriculi.* 82
- Hepar non esse principium venarum, ratione analytica probatur.* 223
- Herbarum succi cur oleo praeservantur ne acefiant.* 385
- Herbarum succi acefciunt ob duas causas.* *ibid.*
- Hernia quomodo fiant.* 110
- Hieronymus Cardanus errat, dum dicit frigus esse priuatiuum.* 327
- Hieronymus Cardanus hallucinatur, dum loquitur de admirabili lapillo Papa Clementis Septimi.* 423
- Hieronymus Capniaceum reijcitur, dum dicit periodorum causam esse naturam humorum.* 276
- Hippocratem omnes crediderunt fuisse suae sectae auctorem.* 450
- Hippocratis aphorismos non omnes esse perpetuae veritatis.* 70
- Hippocratis aphorismum de balbis non esse semper verum.* 183
- Hippocrates cur laudet praeter ceteris quartum clima.* 366
- Hippocratis sententiae omnes sunt methodi censura subiectae.* 598
- Historia Cardinalis Cibo de hemorrhagia.* 194
- Historia cuiusdam Comitissae per celeberrima.* 250
- Historia agrorum Hippocratis proponitur, ut cognoscatur per quas vias natura curet morbos.* 518

# INDEX RERVM

*Homines assuescere possunt. venenis ob duplicem rationem.* 235  
*Homo quatenus est aliquod animal est risibilis, est propositio falsa.* 487  
*Horror ut differt à rigore, & frigore.* 323  
*Humores si mouerentur ex se, omnes in pedes currerent.* 443  
*Humorum aliqui manè, aliqui vespèri, aliqui noctu, aliqui in meridie mouentur.* 272  
*Humores predominantes ut noscantur per physionomica.* 23  
*Humor acer ut in cerebro maniam, & in cute scabiem facit.* 163  
*Humorum species quindecim sunt.* 259  
*Humorum peccantium signa conuertibilia quæ.* 265  
*Humorum peccantium propria signa tria sunt.* *ibid.*  
*Humorum sapes quos sint & qui.* 266  
*Humores ad instar Prothei indui variis affectibus præter naturam.* 306  
*Humores synceri neque in agris, nec sanis inueniuntur.* 375  
*Humores dulces qui sint per se, qui per participationem.* 381  
*Humores ut à putredine fieri possint dulces.* 382  
*Humores albi ut indicent modo calidos, modo frigidos, & modo mistos humores.* 393  
*Humorum mistura quæ sint possibiles, & quæ impossibiles.* 399  
*Humores putridi ut non possint amplius redire.* 432  
*Humores frigidi ut conuertantur in pus.* 435  
*Humores calidi cum viribus robustis non conuertantur in pus.* 436  
*Humores in corpore à quo efficiente moueantur.* 443-444  
*Hyeme cur lac, & pissina difficilium acefcent.* 385

*Hypocondria crassa ob duplicem causam profunt ventriculo.* 84  
**I***acobus Syluius de concanitate offisium digitorum nescit Galenum defendere.* 209  
*Iacobus Syluius ut iurauerit in verba Galeni de offe sacro.* 211  
*Iacobus Syluius ut iniuste calumniatur Vesalius.* 215  
*Ichor sanguineus dum putriscit miscetur ex Galeno dulcis fit.* 381  
*Ichor in omnibus humoribus proprius ex Galeno inuenitur.* 383  
*Ictericia cur sapè ab humore melancholico fiat.* 354  
*Ictericia cur tollitur hemorrhoidibus apertis.* *ibid.*  
*Idiopathia duplex cum dependentia, & sine dependentia.* 76  
*Iecur calidum est, ergo vena lata, non valet.* 221  
*Iecur cur sanguinem benè coquat.* 371  
*Iecur lege Hepar.*  
*Ieiunium nocet, ergo bilis redundat, est Galeni.* 28  
*Ieiunio ut augeatur bilis.* 316  
*Ieiunium intestinum ut noscitur dum flatibus corripitur.* 362  
*Ieiunium quos mala in cholericis pariat.* 506  
*Ieiunium ut est causa salsedinis.* 380  
*Ignis sphaera cur sit ouata.* 415  
*Ignis motum circularem non esse naturalem, ut nouit philosophus.* 465  
*Ignis ut gignitur à motu diurno.* 415  
*Ignis cur sub polis non deit.* *ibid.*  
*Illatio ex particularibus cur nulla.* 454  
*Inappetentia à quo humore fiat.* 322  
*Incole regionis frigida cur diligentissimi.* 329  
*Incubus à qua causa fiat.* 360  
*Incontinentes natura cur facilius curantur, quam per consuetudinem.* 238  
*Indi assamsærida ferulis immiscet.* 231  
*Indi-*



# NOTABILIVM.

- Indicantia cur non possint esse plura tribus.* 477
- Indicantia tria in febrib. putridis.* 476
- Indicans, remedium, & egrotus Syllogismum perfectum faciunt.* 475
- Indicata unde sumantur.* 474
- Indicans dupliciter sumitur.* *ibid.*
- Indicationes curativas qua colligunt ab externis in quod erratum incidunt.* 470
- Indicans cur debet esse praesens.* 467
- Indicantia sunt medij termini quibus indicata perquiruntur.* 467
- Indicans cur debet esse id quod curatur.* 469
- Indicationem qui sumunt ab externis transeunt de genere in genus.* *ibid.*
- Indicans semper indicat, ut est causa.* 470
- Indicatio quid sit.* 472
- Indicantium divisio cur in eodem genere fieri debeat. septem afferuntur rationes.* 457
- Indicata non sunt accidentia generis indicantium, sed species, quae per se primo modo predicantur de genere.* 458
- Indicationes cur non desumantur à differentiis accidentalibus.* *ibid.*
- Indicans cur unum indicet & non plura.* 461
- Indicans genericum cur non indicet remedium specificum.* *ibid.*
- Indicans unum indicat, unum.* 464
- Indicans cur debet esse notus indicatis.* 466
- Indicans ut est medius terminus.* *ibid.*
- In indicationibus perquirendis qui nescit dividere, si centum annis quaereret remedium illud non inveniret.* 459
- Indicationis verae condiciones.* 456
- Indicationis condiciones ut omnes à logica pendent.* *ibid.*
- Indicantis inherentiam ostenditur esse quid a quoque.* 168
- Indicatio quomodo fiat, cum discursu.* 455
- Indicatio sola inuenit remedia.* 452
- Indicatio sola pertinet ad methodum, & non analogismum & experientia.* 452
- Indicationem habere tres terminos syllogisticos ostenditur.* 453
- Indicationes ante morbum curandum non esse plures tribus.* 567. 586
- Indicantium comparationes esse quindecim, & non plures.* 582
- Individua cur non curentur.* 463. 464
- Individuum unum ut complet speciem.* 497
- Inductione non possunt inueniri quae sunt ignota.* 482
- Inductio cur sit vanus inquirendi modus.* 483
- Inductio cur reducitur ad tertiam figuram cum conclusione uniuersali.* 495. & 559
- Inductio per milliona millia particularia facta adhuc non daret uniuersale.* 495
- Inductio ab Aristotele, & ab alijs reprobat ut insufficiens ad cognoscendum uniuersale.* 496
- Inductiones habere verisimile, & non necessarium.* 497
- Inductio quid sit, ex Alexandro, Auerroee, D. Thoma, & Io. Grama.* *ibid.*
- Inductionem non dare uniuersales propositiones, sed indefinitas.* 498
- Inductio nec statim, nec per regressum ex se potest dare uniuersalem cognitionem.* *ibid.*
- Inductio ut conferat ad cognoscendum uniuersale.* 499
- Inedia lege ieiunium.*
- Inflammatiō magis prohibet cibum, quam febris maligna.* 512
- Inflammatiō quomodo fiat.* 587
- Instrumentum aqua refectum à quo aqua diffultat, ut sanguis in venis.*

# INDEX RERVM

Intellectus & intelligibile, sensus & sensibile sunt relativa secundum dici. *ibid.* 83  
Intellectus ut cognoscit vniuersale. 499  
Intelligendi vis cur ocio contabescit, & exercitio augetur. 236  
Intemperantia ut sint. nonaginta sex. 8  
Intemperies humida cur per se ladit retentricem. 14  
Insentia medicorum quando non sit ferenda. 92  
Insentia progressus partium in medendo quanti sit. 211  
Intercipiens materia, ut est intercipiens, est occulta. 475  
Indices recti de rebus anatomicis qui sint. 190  
Iuniperi corticem curare Gallicum ex Scaligero. 411  
Iuuantia & ledentia ut doceant internos affectus. 28  
Iuuantia & ledentia ut breui doceant peccantes humores. 325  
Iuuantia & ledentia ut merito quinque locorum doceat. internos affectus. 338  
**L** Ac copiosum arguit polyemiam. 291  
Lacteus color ex quorum mixtura fieri possit. 421  
Lachryme ex Aristotele cur salse. 377  
Lacus cur salsi non sint. 378  
Letitia excessu qui mortui sint. 371  
Letitia ut parit meliorem coctionem. *ibid.*  
Letitia nimia dissoluit vires. *ibid.*  
Leuitas a qua causa fiat. 12  
Lapilli preciosi reijciuntur. 515  
Lapis Bezoar. lege. Bezoar.  
Lapis in vesica nunquam comminuitur electuario de vitro Montag. 513  
Lapides tersti cur diaphani. 298  
Lapis iudaicus puluerizatus, haustusque renalem calculum tollit. 425  
Lapis lazuli ut facit pilos palpebra-

rum augere. *ibid.*  
Latitudo venarum adest, ergo Iecur est calidum, consequentia est nulla. 221  
Latitudo venarum est signum temperamenti primigeni, & non aduentitij. 218  
Laxantibus ut occiditur Theagines Cynicus ab Atalo Medico. 508  
Lepra ut tolli possit. 558  
Lenientia medicamenta ut sunt auxilia preseruatoria, & non curatoria putredinis. 433  
Lethargi causa immediata qua. 375  
Lethargus signorum syndrome ut noscitur. 30  
Lethargo affecti cur pulsus tardum habeant. *ibid.*  
Lethargi locus affectus est substantia cerebri, & non membrana. 31  
Leuitas & grauitas ut ex Aristotele sunt elementorum forma. 409. & 411  
Lienis durities quam melancholia speciem indicet. 347  
Lieni cur prosunt cucurbitula natibus applicata. *ibid.*  
Lingua agrotantium non semper indicat. peccantes humores. 302  
Lingua est aspera & nigra, ergo peccant adusti humores, non sequitur. 303  
Lippitudines ex Galeno habent circuitus. 272  
Lithiasis causa immediata que sit. 176  
Lithotomi error dum secant. duos primos musculos penis. 137  
Lithotomus quando & cur interficit. 176  
Liuidus color non necessario indicat. venenatum esse. 430  
Locus affectus occultus ex Galeno ab exercitatis in anatomia cognoscitur. 324  
Loca quatuor communia qua ostendunt peccantes humores. 261  
*Localia.*



# NOTABILIVM.

*Localia. vide topica.*  
*Locus affectus occultus per quinque loca noscitur.* 309  
*Locus affectum non indicare, ostenditur.* 273  
*Locus à proportionem ab Argenterio propositus, ut est vitiosus.* 312  
*Locutio, & taciturnitas nimia quomodo melancholiam indicet.* 351  
*Logici ut optime dicunt secundam speciem qualitatis fieri à tertia & à quarta.* 419  
*Logici cur dicunt, quod potentia solum à tertia & à quarta specie qualitatis oriuntur.* ibid.  
*Lundinum Anglia cur sit temperatius aeris.* 366  
*Lumbrici à quibus vere gignantur.* 302  
*Lumbrici cur à qualibet re dulci non gignantur.* 302  
*Lumbrici cur in lactentibus non generentur.* 301  
*Lumbrici aloë illota, vel mercuri panxillo ceri necantur.* ibid.  
*Lumbricorum colores non indicant peccantes humores.* 295  
*Lumbrici ut fieri possint quoque ex bile & melancholia.* 300  
*Lumbrici ex Galeno ut fiant, magnus calor requiritur.* 301  
*Lumbrici quibus remediis superentur.* 504  
*Lumbricorum auxilia ubi sint administranda.* 530  
*Lumbricorum remedia potentissima sunt Mercurium, & cantharis lenigata, ut proponitur à Galeno.* ibid.  
*Lumen manus probatur non extinguere minus.* 83  
**M** *Acilenti ut aliquando ex sanguinis plenitudine fiant.* 443  
*Macerores cum audacia indicant melancholiam ex flaua superassata.* 349  
*Macerores ut corpus calefaciant.* 339  
*Macerores cur reddant homines me-*

*lancholicos.* 344  
*Magnes non potest ratione caloris ferrum trahere.* 407  
*Magnitudo partium corporis sequitur formatricem & multitudinem materie.* 223  
*Magnitudo morbi cur non indicat phlebotomiam.* 476. & 369  
*Magnitudo morbi cum virium robore per analogiam declarat phlebotomiam.* 489  
*Maior propositio cur non potest esse particularis in prima, neque in secunda figura.* 484  
*Maligna à humoribus putridis à quibus externis causis excutitur.* 317  
*Manardi argumentum in Auicenna de quarto genere melancholia nullius roboris.* 386  
*Manardus cur præ ceteris laudet sexuum clima.* 366  
*Manus nomine quid apud Gal. intelligi debeat.* 521  
*Marcus Cato quot vanissima referat.* 428  
*Mare habet sex motus specie diuersos* 378  
*Maris salsedo unde fiat, varie opinionones.* 377  
*Mare tandem cur non fiat dulce.* 378  
*Materia prima nullum accidens terminatum habere potest, & cur.* 295  
*Materia prima essentiam non esse potentiam probatur.* 409  
*Materia prima per se primo modo est corpus.* 416  
*Materia prima dispositiones sunt octo differentie positionis.* 418  
*Mathematica cur non est philosophia.* 416  
*Maxilla inferior si magna sit indicat habitum esse peruersum.* 529  
*Medica auxilia que efficiant in agris.* 433  
*Medici additi auctoritatibus ut à Galeno repræbentur.* 172

# INDEX RERVM

- Medicina pro loco affecto remoto qua virtute debeat esse.* 503
- Medicus sine anatomia ut homini insano comparatur.* 109
- Medicus ut curat specificas naturas, & non individua.* 463
- Medico necessaria que sint.* 578
- Medicorum precipuum munus quod sit.* 585
- Medicina prapostera ut mortem adferat.* 566
- Medius terminus solum valet, dum est vniuersalis, & predicatiuus.* 486
- Medius terminus non debet contineri.* 481
- Medius terminus cur non debet esse communior quesito.* *ibid.*
- Medij termini condiciones sunt tres, & que sint.* 466
- Medio termino praterito, vel futuro non concluditur quesitum presens.* 467
- Medius terminus cur non potest esse definitio maioris extremi.* 461
- Medius terminus vniuersalior predicato conclusionis semper vitiosus.* 3
- Medius terminus ex Arist. quot modis sit vitiosus.* 42
- Mel cur frigidus inuet.* 355
- Mel in calidis bilem, in frigidis sanguinem gignit.* 367
- Mel cur statim ab igne redditur amarum.* 382
- Melancholia cur redditur austera.* 389
- Melancholia mista cum sanguine si ad curam moneatur elephanticum facit.* 352
- Melancholia adusta ut per excrementa, & per sapores cognoscitur.* 353
- Melancholici cur ieiunium ferre non possunt.* 355
- Melancholia quartum genus Anicenne ut admittitur.* 386
- Melancholia cur aliquando sit austera, aliquando acida.* 389
- Melancholia diu est suppressa, ergo est adusta, valet.* 346
- Melancholiam copia peccare ut noscitur.* 440
- Melancholia reddit expultricem diminutam.* 345
- Melancholia feccalis cur ex Alberto terribiles imaginationes afferat.* 344
- Melancholia feccalis ut cognoscitur per actiones animales.* *ibid.*
- Melancholia omnes ut quatuor locis cognoscantur.* 340
- Melancholia omnes indicantur à risu, fletu & audacia.* 351
- Melancholia ex flaua adusta ut indicetur ex nimia locutione.* 351
- Melancholici cur sint, salua abundantes, & à potu abstinentes.* 345
- Melancholici cur cito digerant.* *ibid.*
- Melancholici cur famelici.* 344
- Melancholici cur auari.* 343
- Melancholici cur semper versentur cum medicis.* *ibid.*
- Melancholici semper firmanantur in vnicia infamia.* 345
- Melancholici cur pueri & iuuenes esse non possunt.* 342
- Melancholici ut sunt, ex Anic. vsu pharmacorum.* 341
- Melancholici ut omnes graciles esse debeant.* 343
- Melancholici sunt, taciturni, morosi, astuti, ingeniosi, & firmi in sententia.* 344
- Melancholici terrestres sunt, tumidi, sine siti, salua abundantes, famelici, & morosi.* 349
- Melancholicus sanguis cur sit serosus.* 348
- Melancholia cur deletatur serositate.* 385
- Melancholia adusta mista sanguini, si febrem faciunt, carbonem quoque molliunt.* 352
- Melancholici audaces magis morientur, quam*



# NOTABILIVM.

quam timent. 349  
*Melancholia ut fœx cur potius timorem, quam furorem excuset. 350*  
*Melancholici omnes in quo conveniant. 349*  
*Melancholici ut indicentur à typis, & ab horis determinatis insultus. ibid.*  
*Melancholia putrida ut differt à non putrida. 348*  
*Melancholia ut aliqua causantur à causa externa frigida, aliqua à calida. 339*  
*Melancholia qua est fœx sanguinis ex Galeno est frigida & sicca. 339. & 340*  
*Melancholia tres species sunt, & quæ sint. 259*  
*melancholici cur habeant respiracionem lasam. 113. 118*  
*melancholia in cerebro mœstitiam, in stomacho satiem facit. 164*  
*melancholia cur colligatur in porta, & non in caua. 194*  
*melancholia ut vesperti monetur. 65*  
*memoria deperdita non semper à pituita sit. 352*  
*memoria deperditur ob externum frigus. ibid.*  
*Memorie deperdita causa ut inueniantur. 332*  
*memoria cur exercitio augetur, & ocio contabescit. 236*  
*mensēs ob quas causas supprimantur. 196*  
*mensēs quibus remediis possint reuocari. 505*  
*mercurium mirabiliter necat vermes. 301*  
*Messagetes interficiebant parentes, eosque comedebant. 228*  
*mesenterij abscessus qua methodo sit noscendus. 47*  
*mesenterij abscessus cur raro in Italia fiat. 330*  
*methodus medendi sola contradictio-*

*nes medicina soluit. 572*  
*methodi medendi ut à logica pendent. 454*  
*methodica sectæ auctores, & dogmata. 450*  
*methodus cognoscendi protopathiam, idiopathiam, & sympathiam. 77*  
*methodus qua noscitur dum os non aperitur ob lesionem nervorum in origine. 103*  
*methodus qua noscitur causa, cur brachium non possit adduci ad pectus ob lesionem in origine nervorum. 105*  
*methodus qua noscitur cur brachium non potest trahi deorsum ob morbum existentem in origine nervorum. 107*  
*methodus cognoscendi lesionem cervicis ob lesam quintam vertebra thoracis. 114*  
*methodus cognoscendi protopathiam. ibid.*  
*methodus cognoscendi omnes causas paralysis primi paris musculorum dorsi. 115*  
*methodus qua noscitur, quando pars superior dorsi non extenditur ob lesionem nervorum in origine. 117*  
*methodus cognoscendi causas semiparalysis sexti paris musculorum dorsi 119*  
*methodus cognoscendi lesionem secundorum articularum digitorum ob morbum in cervice existentem. 123*  
*methodus cognoscendi lesionem tertij articuli quatuor digitorum ob lesionem in origine illorum nervorum. 125*  
*methodus cognoscendi cur quatuor digiti non possint extendi ob morbum in origine quartis paris nervorum. 127*  
*methodus qua noscitur, dum minimus digitus leditur ob morbum cervicis. 128*  
*methodus noscendi, dum index digitus*

# INDEX RERVM

- non extenditur ob morbum existentem in nervorum origine.* 129
- methodus qua nescitur, dum pollex non extenditur ob laesos nervos in rete, sub rete, vel collo.* 130
- methodus nescendi dum brachium laesum flectitur ob nervos laesos in rete, vel in collo.* 133
- methodus nescendi dum tibia sursum non potest trahi, ob morbum existentem in tertio pari nervorum lumborum.* 135
- methodus nescendi dum tibia non potest deferri supra tibiā ob morbum in exordio nervorum.* 136
- methodus nescendi dum tibia non potest introrsum inflecti ob nervos laesos in osse sacro.* 138
- methodus cognoscendi dum tibia non potest flecti in rectum ob morbum ossis sacri.* 140
- methodus cognoscendi dum tibia non potest extendi in rectum ob morbum existentem circa os sacrum.* 141
- methodus cognoscendi dum tibia non potest extendi ob morbum circa quartam vertebrae lumborum.* 142
- methodus cognoscendi dum symptomata tibiae prodeunt à lumbis.* ibid.
- methodus cognoscendi dum femur non potest extendi ob morbum primi paris nervorum ossis sacri.* 145
- methodus cognoscendi dum femoris symptomata oriuntur à morbo existente circa primam vertebrae lumborum.* 148
- methodus cognoscendi dum sextus musculi femoris per sympathiam laeditur.* 149
- methodus cognoscendi dum digiti pedis non extendantur ob morbum quarti paris nervorum pedis.* 153
- methodus inveniendi tralorum specificam causam.* 181
- methodi proponuntur, quae declarant an res sit.* 264
- methodus cognoscendi partes corporis flatibus correptas.* 362
- methodus cognoscendi quando pituita sit falsa ab humore aliunde misso, & quando ab humore existente in eodem loco.* 380
- methodus auferendi falsam pituitam.* 380
- methodus cognoscendi differentias specificas dulcedinum humorum.* 383
- methodus curandi nimiam humorum acetositatem.* 387
- methodus cognoscendi humorum austeritatem.* 389
- methodus cognoscendi quomodo facta sit porracea bilis.* 391
- methodus curandi affectus à porracea bile prodeuntes.* 392
- methodus cognoscendi humores copia peccare.* 438.441
- methodus medendi cur in particulis non sit.* 463
- methodus medendi est logica.* 473
- methodi nomine intelligitur perfectus Syllogismus.* 452
- methodus medendi ab analytico finit pendet.* 456
- methodi universales ex Galeno sine exercitio non satisfaciunt, ad exactam cognitionem.* 582
- micrologia nominum ubi reprehenditur à Galeno.* 375
- mista omnia à predominante moventur* 365
- misturarum aliqua sunt, intus facta, aliqua extra.* 470
- misti cur semper sint humores peccantes.* 373
- mista ut habent, duas humiditates vitalem scilicet & oleo generatam.* 387
- misturas humorum numero esse. 80084.* ostenditur, & non prius. 394
- misturarum combinationes ut colligantur.* 389
- mistura ex tribus & quatuor ut colligantur.*



# NOTABILIVM.

gantur. 390  
 mixture humorum que sint impossi-  
 biles. 399  
 mollia à qua melancholia fiat. 348  
 Mixtura quid ex Arist. 335  
 modi dicendi per se sunt inpermisci-  
 biles. 414  
 monachorum quorundam optimum de-  
 cretum. 245  
 morbos forme non dari, quatuor argu-  
 mentis efficacissimis ostenditur. 406  
 morbo an sit essenziale magnitudo &  
 mos. 8  
 morbi cur ut plurimum per plura signa  
 debent nosci. 20  
 morbos forme dari, probant aduersarij  
 quinque argumentis. 404  
 morbus cervicis ut per Sympathiam  
 apparuit in manu. 94  
 morbus cervicis ut per Sympathiam  
 appareat in diaphragmate. ibid.  
 morbus in clunibus ut per Sympathiam  
 appareat in brachijs. 95  
 morbus in vertebra ossis sacri per Sym-  
 pathiam apparet in pene. 96  
 morbus in temporibus per Sympathiam  
 apparet in oculo. ibid.  
 morbus potest esse in iugula eius appa-  
 rentia in labijs. 97  
 morbus in pleura eius Symptoma in iu-  
 gulo. ibid.  
 morbus existens ubi est bregma appa-  
 rentque in maxilla inferiori qua  
 methodo cognoscatur. 99  
 morbus existens in secundo vel quinto  
 pari nervorum, eius Symptoma in  
 maxilla inferiori qua methodo per-  
 quiritur. 100  
 morbus ut potest esse in ilibus & dolor  
 circa costas. 111  
 morbus ut potest esse in medio pubis, &  
 dolor circa sternon, & versa vice.  
 ibid.  
 morbus ut potest esse in cubito, causa  
 vero circa septimam vertebra cer-  
 vicis. 122

morbus ut potest esse sub axillis, eius  
 verò Symptoma in femore. 149  
 morbus ex Galeno tantus est, quantus  
 est recessus à salubritate. 216  
 morbi quot sint qui habent circuitus.  
 272  
 morborum tempora cur ab humoribus,  
 & non à morbis prodeant. 273  
 morbi naturam ex Galeno esse ante cu-  
 rationem cognoscendam. 466  
 mores animi sunt tales, ut acies mentis  
 bilem, prudentia melancholiam, &  
 stoliditas sanguinem indicent. 329  
 mors aliquando accedat, dum postpo-  
 nuntur paroxysmi. 292  
 mors repentina non arguit necessario  
 venenatum. 429  
 motores primi si auferrentur quomodo  
 Mundus ex Arist. & Auer. rueret.  
 263  
 motores primi si plures essent, ex Arist.  
 essent corruptibiles, & cur. 498  
 mulier lac habet, ergo concepit, non  
 valet. 62  
 mulier flatibus referta ut decipiantur  
 dum putant, vero gerere. 361  
 mucronata cartilago quo connexu sit  
 unita. 195  
 musculus non fungitur officio suo ob  
 tres causas. 97

**N**arium hemorrhagia non prone-  
 nit à venis frontis. 193  
 Natura quot vias sibi paret in pellen-  
 dis morbis. 518. & 526  
 natura est occupata in morbis pellendis,  
 & in corrigendis plagis ab insanis  
 medicis influctis. 491  
 natura cur medicinis non est facienda  
 consuetudinaria. 255  
 Natura cur conservat species aternas.  
 243  
 Natura non patitur saltus ab extremo  
 ad extremum. 245  
 Natura mirabile opus in culicis pede.  
 422

# INDEX RERVM

- Natura simplex non facit du. , sed unum.* 468
- Nauta cur incommoda equitationis sentiat oportet.* 247
- Nervi omnes dant motum opticiis exceptis.* 187
- Nervuorum rete ubi sit, & quomodo sit.* 192
- Nervuorum coniugationes à coccyge non prodire.* 212
- Nidorosi cibi à qua causa fiant.* 384
- Nigrorum euacuatio ut differat ab atra bilis euacuazione.* 353
- Nomina ignota & qualitates occultae, ut sunt refugium Empiricorum.* 404
- Nutriendi cur minus sint qui patiuntur inflammationem, quam qui febrem malignam.* 512
- O** *Basii qui sint, cum paucis sanguine.* 369
- Obstetricum impostura dum tangunt uterum.* 64
- Obstructio magna qua oxymellis quantitate tolli possit.* 503
- Obstructio nimia quod suffocet exemplo declaratur.* 326
- Occasio externa cur incidant homines in malignam febrem.* 317
- Ocium quod suffocet declaratur.* 326
- Oculi macri & concaui melancholiam indicant.* 344
- Oculi albi ex Auer. habitum pituitosum indicant.* 329
- Oculorum dolores, & inflammationes quibus remediis tollantur.* 503
- Occultas qualitates alius peripatetici declarant, quam medici.* 403
- Occultarum qualitatum genus scire, quantum conferat in medendo.* *ibid.*
- Officia par. corporis vivens esse immutabilia, alterabilia tamen.* 220
- Oleum rosatum cur in capite est concoctorum, in alijs partibus reperciens.* 486
- Oleum calchantisimum ut tollit mauscosam dulcedinem humorum.* 383
- Oleum de corticibus citri ut liberauit à morte percelebrem muliebrem.* 82
- Omphacium cur ex Galeno in ardenti hypocondriaca magis laudatur, quam acetum.* 384
- Opus unde fiat.* 298
- Opacum unde fiat.* *ibid.*
- Operationes omnes ut à subiectis fluunt.* 409
- Opinionis varia de pulchritudine oculorum.* 230
- Opium non occidit ut frigidum.* 421
- Opium cur occidit.* *ibid.*
- Oribasius & Montanus in hoc recte dicunt, quod vermes à quolibet humore gigni possit.* 300
- Os pectoris ex quot ossibus constet, quanti sit scire.* 211
- Ossis pectoris vulnus ex ossium notitia melius curatur.* *ibid.*
- Oraculi Delphici responsum.* 367
- Oratio innectina contra Empiricos.* 494
- Ordine resolutio ut omnes artes fiant* 451
- Ordo curandi omnes affectus praeter naturam quis sit.* 567
- Ordo indicantium omnium quis sit.* 577
- Ordo curationis ulcerum.* 584
- P** *Alpitatio ut nescitur dum à melancholia oritur.* 351
- Palpitatio ex Galen. immediate à flatu fit.* 361
- Panis triticeus albissimus gignit vermes.* 302
- Panis ut gignit multum sanguinem.* 367
- Papaver impedit ne catarrhus è pectore elidatur.* 447
- Paralogismus secunda figura ex affirmativis, & prima ex maiori particulari declaratur.* 430



# NOTABILIVM.

<i>Paralogismos trium generum committis quæ ex propriis non procedit.</i>		<i>Pericharia occasione moriuntur Dionys. Tyran. Sophocles, &amp; Romana mulier.</i>	
265			368
<i>Paralogismus proprius rudiorum.</i>		<i>Periodi cur inter propriissima signa humorum collocentur.</i>	
240			271
<i>Parelli opinio de periodis quæ.</i>	277	<i>Periodicatio non conuenit solum feb. putridis.</i>	272
<i>Parotides cur causent dolorem etiam in iugulo.</i>	103	<i>Periodicatio cur heclicis non conueniat.</i>	273
<i>Paroxysmus sit longus vel brevis ob quattuor causas.</i>	290. & 249	<i>Periodicationis opinio noua.</i>	278
<i>Paroxysmi incrementum non indicat morbi augmentum.</i>	291	<i>Periodi ut indicent, &amp; non indicent humores peccantes.</i>	280
<i>Paroxysmi in feb. putridis à qua causa excitentur.</i>	292	<i>Periodi cur à Medicis in multis morbis non obseruentur.</i>	296
<i>Passiones omnes ut pendens à raritate &amp; densitate.</i>	414	<i>Peripatetici cuiusdam erratum dum credit magis Aristoteli quam sensui.</i>	198
<i>Passiones probanda æquè de subiecto suo dici debent.</i>	485	<i>Peripneumonia syndrome ut noscitur.</i>	32
<i>Particularia differunt per hic, &amp; nunc, &amp; non forma.</i>	483	<i>Peripneumonia cur habeat difficiliorẽ respirationem pleuritide. ibid.</i>	
<i>Pars qualibet corporis per essentiam, &amp; per consensum affici potest.</i>	73	<i>Peripneumonia cur habeat maiorem pleuritide.</i>	ibid.
<i>Pars aliqua corporis dum est læsa, cur alia statim lædantur.</i>	74	<i>Peripneumonici cur faciem rubram habeant.</i>	32
<i>Pars corporis ut cognoscitur dum est per se læsa.</i>	89	<i>Per se conueniens uni per accidens omnibus aliis conuenit.</i>	284
<i>Pars mittens à frigore excitata ut plurimum sana est.</i>	447	<i>Peste affecti cur si semel curentur vix amplius lædantur.</i>	256
<i>Pars corporis suscipit excrementa ob duas causas.</i>	444	<i>Petisio principij &amp; falsus Syllogismus sunt origines omnium errorum.</i>	451
<i>Pars mittens solum habet vim mouendi excrementa.</i>	445	<i>Petitio principij fit dum medius terminus est genus vel differentia maioris extremi.</i>	483
<i>Pars mittens potest esse fluxionis origo sex modis.</i>	446	<i>Pharmaca cur dentur febrientibus.</i>	434
<i>Pars mittens ut cognoscitur dum irritatur à qualitate mordaci.</i>	447	<i>Pharmacorum usus quolibet mense solitus, ut trahis corpora in malam consuetudinem.</i>	505
<i>Partes corporis quæ amputantur, dum adest vrgens.</i>	577	<i>Phlebotomia ut est remedium missum reuulsorium. &amp; deriuatorium.</i>	564
<i>Partes quando roborande sint.</i>	578	<i>Phlebotomia ut semper est auxilium præseruatorium.</i>	433
<i>Paulus Aegineta dum dixit, vermes à calidis non fieri ut exponitur.</i>	301	<i>Phlebotomia à magnitudine morbi, &amp; virium robore per Analogismum.</i>	
<i>Penis in Vulua coeundo cur constringitur.</i>	68		
<i>Penis duo primi musculi ut amittant usum ob errorem Lithotomi.</i>	137		
<i>Penis substantia unde oritur.</i>	214		

# INDEX RERVM

colligitur. 489  
 Phrenesis ut fiat à bile sincera. 321  
 Phthisis syndrome signorum ut noscitur. 32  
 Physiologica signa polyamiam ostendunt. 369  
 Physiologica ostendunt melancoliam. 344  
 Physiologica ostendunt pituita dominium. 329  
 Physiologica ostendunt biliosorum succorum dominium. 319  
 Picca à qua melancolia fiat. 348  
 Picca à quo humore fiat. 353  
 Pili cani significant pituitam. 330  
 Pilula pro necandis vermibus quae sint. 301  
 Pinguedo cur à sanguine non fiat. 369  
 Pituita falsa. Lege falsam pituitam.  
 Pituitam peccare copia ut noscitur. 439  
 Pituita falsa ut à ieiunio efficitur. 380  
 Pituita falsa causa quinque. ibid.  
 Pituita falsa ut curetur. 380  
 Pituita solum per participationem esse potest dulcis. 381  
 Pituita frigida ut fiat dulcis à potenti calore. 382  
 Pituita acida cur reddat homines famelicos. 386  
 Pituita ut fieri potest melancolia. ib.  
 Pituita falsa ut noscitur dum sit ab humore aliunde misso, vel in eodem loco existente. 380  
 Pituita mucosa impedit nutritionem. 335  
 Pituita ut noctu mouetur. 331  
 Pituita ut à somnis praecognoscitur. 334  
 Pituita differentia specifica ut ex Galeo noscuntur. ibid.  
 Pituita acida ut irritet expultricem. 335  
 Pituita dulcis ut acida fit. 386  
 Pituitam pro varietate situs partium

corporis varios morbos efficere. 164  
 Pituita quatuor species. 259. & 325  
 Pituitosi tardè apprehendunt sed firmantur. 330  
 Pituitosi ad alia agrè transeunt. ibid.  
 Pituitosi paucitate cibi tollunt sitim, & lassitudinem. 324  
 Pituitosi sunt somniculosi, carent siti, & sunt ut plurimum inappetentes. 329  
 Pituitosi cur non fiant phrenetici. 324  
 Pituita acida excitat appetitum. 329  
 Pituitosorum succorum causa efficientes specifica quae. 326  
 Pituita causa externa per se quae sint. 327  
 Pituitosus cibus in stomacho cur molestus. 330  
 Plantago sicca contrariam naturam habet, quam viridis. 509  
 Plantaginem non astringere. ibid.  
 Platonis falsa opiniones. 227. & 273  
 Platonis opinio de falsedine maris. 377  
 pleuritis cur biliosi, & non pituitosi, & melancolici fiant. 160  
 pleuritis ut distinguitur ab inflammatione vinctulorum iecoris. 50  
 pleuritis signa quatuor tantum sunt. ibid.  
 pleuritis à quo sanguine fiat. 208  
 Plinius cur vires falsas immiscet. 423  
 Plutarchus quid referat de filiis parentum tabidorum. 329  
 Polyamia ut cognoscitur. 363  
 Polyemia in quo aëre fiat. 367  
 Polyemia somno fit. 368  
 Polyamia à balneis fit. ibid.  
 Polyamia ex lingua rubra noscitur. 371  
 Polyamia ut per excrementa cognoscitur. ibid.  
 Ponticum lege Auserum.  
 Pontica ut differant ab acerbis, & quae sint. 388  
 Pontica ut fiant. ibid.

porrigo



# NOTABILIVM.

porrigo furfuracea ut cognoscitur dum  
 à bile vel melancholia fit. 323  
 positionis differentie ut à primo mobili  
 prodeant. 408  
 potentia naturales sunt aptitudines  
 subiecti. 409  
 potentiam non esse materia essentiali  
 probatur. ibid.  
 potentia cur locentur in predicamento  
 accidentium. ibid.  
 potentia ut oriantur omnes à tertia &  
 quarta specie qualitatis. 409. &  
 415  
 potentia non pendent à forma, neque ab  
 efficiente per transmutationem, ne-  
 que ab efficiente per emanationem.  
 415  
 potentie operatrices omnes ut ex Gale-  
 no pendent ex figura & situ. 419  
 potentia operatrices, ut sexcentis modis  
 variant actionem. 420  
 predicatorum primi modi per se sunt  
 quinque gradus. 458  
 predicamenta in logica melius tra-  
 ctantur, quam in Metaphysica. 406  
 predicamentorum proprietates cur im-  
 permiscibiles sint. 457  
 predicatum accidentale semper est  
 falsum. 323  
 pregnans non cognoscitur hydromelle  
 vel suffitu aromatum ut dicit  
 Hipp. 58  
 pregnantibus qui dicunt ex urina nosci  
 sunt anatomici imperiti. 60  
 pregnans ut cognoscitur signorum syn-  
 drome, & mirabili mitrenchita.  
 ibid.  
 presagire breuitatem seu longitudinem  
 morbi ut colligitur ex primis diebus  
 273  
 principia communia ex Auerroe in-  
 ductione veloci noscuntur. 455  
 priuatio ex Aristotele ut est forma. 40  
 priuatio quomodo sit principium re-  
 rum naturalium. 372  
 problema utritè possit proponi. 486

proprietates cur alia conueniant per  
 accidens, alie nunquam. 386  
 protopathia que affectio sit. 76  
 protopathia inueniende exemplum.  
 126  
 Ptolomæus fuit post aduentum Christi  
 140. annis. 365  
 Ptolomæus sub primo climate prouin-  
 cias temperatissimas posuit. ibid.  
 pubis ossa per symphysim sunt conno-  
 xa, ideo in parturientibus non di-  
 mouentur. 196  
 puella veneno alta suo amplexu alios  
 venenabat. 255  
 puerperia ex quibus humoribus con-  
 stent. 352  
 pulchritudinis & turpitudinis opinio  
 unde habeat principium. 230  
 pulmonis medicina quas partes per-  
 curras antequam illuc veniat. 502  
 pulsilogij instrumentum ab auctore nu-  
 per inuentum. 289  
 pulsus duo sunt arcana, & ostenditur  
 ut consequi possimus. 425  
 pulsus difficultas unde oritur. 289  
 pulsus vermicularis quid indicet. 288  
 pulsus ostendens per se feb. putridam,  
 quis sit. 285  
 pulsus ostendens diariam quis sit. 286  
 pulsus prodicens per se ab inflammatio-  
 ne quis sit. ibid.  
 pulsus mollis latus & undosus quid per  
 se, & quid per accidens indicet. 286  
 pulsus durus & serratus quid per se,  
 & quid per accidens indicet. ibid.  
 pulsus serratus non est proprius pleuri-  
 tidis. 287  
 pulsus serratus ut conueniat omni in-  
 flammationi. ibid.  
 pulsus durus ab aque frigida potu sit.  
 ibid.  
 pulsus vibratus quid per se, & quid  
 per accidens indicet. 288  
 pulsus formicans quid per se, & quid  
 per accidens indicet. 288  
 pulsus duriores cur indicent bilem.

# INDEX R E R V M

peccare. 323  
 pulsus per se non indicat humores, &  
 eorum coctiones vel cruditates. 285  
 pus eiectum per vomitum quando in-  
 dicet vlcus ventriculi. 26  
 pus ut fiat, & à quo. 435-436  
 pus in urina ut indicat renes esse vl-  
 ceratos. 27  
 pus in urina ut indicat hepar esse vl-  
 ceratum. ibid.  
 pus cur albescat. 84  
 putredo si ut calida lederet nos, non  
 aleret lumbricos. 421  
 putredini ex Galeno quatuor sunt con-  
 traria. 380  
 putredinis remedia ut omnia sunt  
 praeservatoria, & non curatoria. 432  
 putredo ex Aristotele duplex, simplici-  
 ter, & secundum partem. ibid.  
 putredo secundum partem quae sit qua-  
 tuor opiniones proponuntur, & Za-  
 barella opinio laudatur. 432  
 putredo in venis cur non sit medica-  
 bilis. 433  
 putredo in venis ut pervenit ad cine-  
 rem. ibid.  
 putridi humores duas habent partes,  
 coctam, id est dulcem & spiritum a-  
 cres. 300  
 pyloron ostenditur non oriri à fundo  
 ventriculi. 171  
 pytion sanatur à morbo pectoris urina  
 manente cruda. 281

**Q**uestio sub quo climate aer sit  
 temperatissimus. 365

Questio an Vitellina bilis sit mistura.  
 390

Questio an bilis flava sit mistura ex  
 bile, & pituita aquosa. ibid.

Questio de vesicantibus. 525

Quest. ex qua bile sit porracea. 523

Questio ubi generetur porracea. 392

Questio de occultis qualitatibus unde  
 prodeant. 402

Questio de occultis qualitatibus ut est

Philosophica, & non medica. 405

Questio an experimentum dei uni-  
 versale. 497

Questio antrepellentia lesis glandulis  
 debeant applicari. 508

Questio de bezoarticis. 515

Questio an saluatella sit splenetica.

520

Questio an in febris cum alui fluore li-  
 ceat uti medicinis vel sanguinis  
 evacuatione. 600

Questio an à lenioribus sit exordien-  
 da morborum cura. 604

Qualitates occulta quae dicantur. 401

Qualitates secundae ex Galen. quindecim  
 sunt, & quae sint. 158. & 400

Qualitates prima manifestae quae di-  
 cantur. 400

Qualitates ut à substantia pendent.

414

Qualitates occultae ut fiant. 416

Qualitates manifestae cur fiant. ibid.

Qualitates occultas non fieri omnes ex  
 quatuor primis probatur duodecim  
 experimentis. 421

Qualitatum occultarum natura ut  
 per analogiam inveniatur. 423

Qualitatum occultarum sectatores cur  
 saepe vanissima credant. 425

Qualitas secunda ut rarum sub se mul-  
 ta species rari continentur. 400

Qualitates tertiae quae sint. ibid.

Qualitatem occultam vocant sub-  
 stantiam per se operantem. 401

Qualitates occultae cur dicantur ro-  
 tius, & solum substantia. ibid.

Qualitates substantificas dari, quibus  
 experimentis probent. Adversarij.  
 ibid.

Qualitates occultae si dantur, potentia  
 non essent in qualitate sed in sub-  
 stantia. 403

Qualitates occultas non esse substan-  
 tias operantes duabus rationibus  
 probatur. 403

Qualitates occultae & nomina ignota  
 sunt.



# NOTABILIVM.

*Sunt refugium rudiorum.* 404  
*Qualitates occultas non esse substantias ut efficaciter ostenditur.* 407  
*Qualitates occultas si essent substantia duobus aduersarentur quod est inconueniens.* 408  
*Qualitates occultae ex Galen. habent contrarium.* 412  
*Qualitates occultae ut fiant cum Galeno ex infinitis alterationibus elementorum.* 412  
*Qualitates occultae sunt incognoscibiles.* ibid.  
*Quando agendum unde sumatur.* 171  
*Quantum agendum ut indicetur à temperatura.* 170  
*Quantum agendum ut ab actione indicantis desumatur.* 502  
*Quantitas peccantium humorum quomodo cognoscatur.* 438. & 441  
*Quarta figura cur vanissima.* 482  
*Quartanary cur magnis fiteant sudoribus.* 345  
*Quartanary cur plurimum lotium ciant.* ibid.  
*Quartana febres cur aliquando fiant post putrescas.* 387  
*Quatuor prima qualitates ut ex Arist. dici possint elementorum forma* 411. & 417  
*Quatuor qualitates non esse omnium primas exemplo Hierologij ostenditur.* 422  
*Quid agendum ut sumitur ab essentia specifica indicantis.* 474  
*Quomodo agendum à quibus conditionibus colligatur.* 169  
**R** *Arefactio nimia ut refrigerat animal.* 327  
*Raritas & densitas ut sunt initia omnium passionum.* 414. & 417  
*Raritas ut pertinet ad situm.* 416  
*Rarum & densum unde pendeat.* 415  
*Rarum quomodo sit prius calido.* ibid.  
*Rarum quomodo sit causa caloris.* 418  
*Realdi Columbi error dum dicit Pithosorum incidere collū vesicae.* 175

*Realdi Colūbus ut errat dū dicit musculos frōtis nō habere fibras rectas.* 191  
*Recessus à statu naturali quomodo duplex sit.* 217  
*Rebēdo quid significet apud Galenum, & Hippocratem.* 559. & 560  
*Regio frigida remota à mari cur frigidior sit ea quae proxima est mari.* 366  
*Remedia non posse per analogismum sine experientia inquiri, sed solum per indicationem.* 452  
*Remedia in statu naturali nō dāda.* 511  
*Remedia non posse inueniri nisi quod quid est indicacis praenoscatur.* 457  
*Remedia specifica quomodo in nullo modo dicendi per se praedicentur de indicantibus genericis.* 461  
*Remedia omnia sunt specifica & non generica.* 462  
*Remedia tribus instrumentis perquiruntur.* 478  
*Renatus ut optimè reijciat Iacobum Syluum.* 214  
*Renes ut constituti sint.* 179  
*Renum ulcus ut syndrome signorum noscitur.* 34  
*Renum pus cur non foetet.* 35  
*Renum pus ut noscitur dum prodit à superficie vel ab interna parte.* 36  
*Repellentibus uti possumus in cancro ante purgationem totius.* 598  
*Repellere ad partes participes quando oportet.* ibid.  
*Repellentia in podagra quando applicentur.* 509  
*Repellentia quando non conueniant, sunt nouem casus.* 507  
*Repellentia ex Gal. ut sunt duum generum.* 508  
*Reuulsionem fieri modo à virtute mittente, modo attrahente.* 559  
*Reuulsionis genus esse auersionem, & non attractionem.* 540  
*Reuulso ut possit conuenire fluxis, & fluxuris.* 540  
*Reuulsionem fluxis conuenire probatur efficaci argumento.* 543

# INDEX RERVM

- Reuulsio* proprium est sequi remissionem humorum. 542
- Reuulsio* causa efficiens immediata est innominata. 543
- Reuulsio* definitio qua sit. *ibid.*
- Reuulsio* cur non sit attractio. 541
- Reuulsio* ut semper per proxima fiat. 554
- Reuulsio* conditiones quatuor. 204. 536
- Reuulsio* fieri per vasa communia per se conuenit. 559
- Reuulsio* quomodo fiat. secundum retentionem varia opiniones. 537. 560
- Reuulsio* quomodo fiat. per distantissimam. 537
- Reuulsio* non conuenire per se, ut humores trahantur ad originem. 561
- Reuulsio* quomodo fiat. trahendo versus originem. 537
- Reuulsio* non est solum sursum, & deorsum. 557. 563
- Reuulsio* non conuenire per se, ut per distantissima fiat, probatur multis rationibus. 546
- Reuulsio* in quibus differat à deriuatione. 565
- Reuulsio* cur sapè per distantissima fiat. 547. & 549
- Reuulsio* quomodo per proxima fiat. 550
- Reuulsio* ut per proxima, ut per remota, & ut per remotissima fiat. 552. 554
- Rhinocerotis* cornu est fabula. 515
- Ridiculum* est audire medicos prescribentes iria folia lactuca vis, qui solitè quotidie lactuca impleri. 254
- Rigor* sine successione caloris quid indicet. 442
- Rigor* ut differt ab horrore, & frigore. 323
- Rigor* à pituita, & bile quibus signis cognoscatur. *ibid.*
- Rigor* est sine consecutione caloris, ergo peccat pituita acida vultes. *ibid.*
- Rosacea* aqua ut noscitur dum facta est plumbeo alembico. 297
- Rubrum* intensum vult Gal. indicare melancholiam. 292
- Ryctus* ut indicent melancholiam. 346
- Ructum* acidum qui habent cur non fiant. pleuritici. 324
- Ructus* acidi quomodo fiant. 384
- Rustici* cur externo frigore minus ledantur. 236
- Rustici* cur sine pharmacis liberentur magnis morbis. 252
- S**abellini cur in Italia non generent 366
- Sabellini* in Africa cur non viuant. *ibid.*
- Sacris* videtur interdixtum quibusdam citare Galen. libros, vel capita 494
- Salina* ut occidat scorpiones. 342
- Sal* cur penetret. 378
- Sal* cur omnia conseruet. *ibid.*
- Salsedo* à quibus causis fiat. 374. & 376
- Salsa* pituita cause ex Galen. qua sint. 376
- Salsedinis* causa ex Auicenna qua. *ibid.*
- Salsedo* ex Arist. ut fiat. 377
- Salsedinis* vera causa qua sit. 377. 379
- Salsedinis* plurima immediata causa. 377
- Salsedinis* proprietates ex Galen. qua sint. 378
- Salsedinis* causas Galenum non attulisse, sed modos quibus fit salsedo. 378
- Salsedo* ut fiat. duo proponuntur modi *ibid.*
- Salsum* & amarum ut ex Aristot. & Gal. non differant specie. 379
- Salsedo* in pituita quando fiat. per mixturam intus factam, quando extra. 380
- Salse-*



# NOTABILIVM.

<i>Salsedinem ut causat ieiunium.</i> <i>ibid.</i>	<i>Sapor dulcis quem humorem indicet.</i> 266
<i>Salsa pisura cur sint.</i> <i>ex Galen. quinque cause.</i> <i>ibid.</i>	<i>Sapor acetosus quid significet in humoribus corporis.</i> 267
<i>Salus Italicè Gamfo à qua causa fiat.</i> 368	<i>Sapores indicantes mixturas humorum qui.</i> 374
<i>Salus quomodo curetur.</i> <i>ibid.</i>	<i>Sapor amarus indicat maiorem calorem quam falsus.</i> 379
<i>Saluatella vena nullo modo est splenetica.</i> 520	<i>Sciatica quando ex Galeno scēto alio crure tollitur.</i> 563
<i>Sanguinei cur hirsuti.</i> 369	<i>Sciatica ut tollitur scēto cubito, ut scēto alio crure, &amp; ut eodem.</i> 553
<i>Sanguinei frontem magnam, atque aures erectas habent.</i> <i>ibid.</i>	<i>Sciatica cur vario modo sanetur.</i> 555
<i>Sanguinei habent immobilitatem oculorum.</i> <i>ibid.</i>	<i>Scientia cur sit eternorum.</i> 462
<i>Sanguinei habent facultates animales retusas.</i> 369	<i>Scordeum curare Gallicam luem.</i> 499
<i>Sanguinei ex Gal. sunt stolidi.</i> <i>ibid.</i>	<i>Secreta medicorum cur sapē ledant.</i> 493
<i>Sanguines ut adrisum profusi.</i> <i>ibid.</i>	<i>Semen copiosum arguit polyemiam.</i> 370
<i>Sanguinei ut incontinentes.</i> <i>ibid.</i>	<i>Senes debiles assueti facilius omnia tolerant.</i> <i>inuembus robustis insolitis.</i> 247
<i>Sanguinei cur difficulter montes ascendunt.</i> 370	<i>Senum ulcera cur difficulter sanentur.</i> 586
<i>Sanguinei quem habeant, pulsū.</i> <i>ibid.</i>	<i>Serapia cur aliquando in officinis accescant.</i> 385
<i>Sanguis à scēta vena ut defluit.</i> 545	<i>Serum lege ichor.</i>
<i>Sanguinis abundantia quibus signis ex Galeno cognoscatur.</i> 371	<i>Serum lactis qua quantitate dari possit in ardenti febre.</i> 504
<i>Sanguis quomodo per se dulcis sit.</i> 381	<i>Sex res non naturales non esse causas remotas.</i> 263
<i>Sanguis ut conuertatur in alios humores.</i> 363	<i>Sex dieb. addisci potest medicina dempta indicatione desumenda à partibus.</i> 576
<i>Sanguis cur augetur in vere.</i> 364	<i>Signa communia dum sunt dubia, quomodo reldi possint certa.</i> 324
<i>Sanguis in quo aère augetur.</i> 367	<i>Signa dum plura sunt, quibus magis sit credendum.</i> 322
<i>Sanguis eycitur per tussim spumofus, ergo à pulmone, est ensthumema falsum.</i> 55	<i>Signa conuertibilia peccantium humorum qua.</i> 265
<i>Sanguis pulmonis cur non semper sit spumofus.</i> 54	<i>Signa propria morborum ex quib. fontibus colligantur.</i> 18
<i>Sanguis per tussim eiectus ut noscitur quando à capite, &amp; quando à pulmone prodit.</i> 54	<i>Signa humorum propria tria sunt.</i> 424
<i>Sanguis pallidus quid indicet.</i> 393	<i>Signa propria raro inueniuntur.</i> 214
<i>Sanguis in venis cur non fiat pus.</i> 587	<i>Signa omnia affectuum reducuntur ad quatuor fontes.</i> 152
<i>Sapor dulcis, lege dulce.</i>	
<i>Sapores indicantes omnes melancholicos humores, qui.</i> 353	
<i>Sapor ponticus quid indicet per se.</i> 281	
<i>Sapor unus, ut unus humorem unum, per se, &amp; non plures indices.</i> 266	

# INDEX RERVM

- Signa temperaturarum artis medica cum aliorum syndrome indicant.* 222
- signa communia qua scientiam pariunt à sex fontibus hauriuntur, & cur.* 20.305
- signorum communium primus fons* 21
- signorum communium secundus fons.* 23
- signum proprium semper unicum esse debet.* 223
- signa propria biliosorum humorum que.* 267.272
- signa que ostendunt naturam, & que existentiam, ut differant inter se.* 294
- silentium iuxta maius quam par sit melancholiam indicat.* 351
- singularia nullas habent conditiones seu naturas præter hic & nunc.* 496
- similitudines ut sunt generum, & non specierum.* 528
- situm non semper auferri potationibus.* 89
- sitis que sedari non potest que.* 322
- situm remouentia que sint.* 505
- solutio conuinus sensim facta sine dolore fit.* 96
- somnium que optime conciliant.* 503
- somnus ut concoquat, & vigilia digerat.* 368
- somnus ut crudinitatem tollat.* 367
- somnia indicantia peccantes humores que.* 334
- somnolenti ut indicant dulcem pituitam.* ibid.
- somnia aque pituitam signabilem ostendunt.* 322
- somnus nimius quod suffocet calorem ostenditur.* 326
- Sophia Priola ut suffocatione liberetur oleo citri.* 82
- Sortes virtuosus, & concludens declaratur.* 274
- Species cur à natura æterno tempore conseruentur.* 243
- species stant sine quolibet individuo, sed non è contra.* 498
- species non est de natura generis.* 485
- splenetici cur astringentibus curentur.* 574
- sputa rotunda quid significant.* 336
- status morbi cur non patitur remedia.* 511
- struma ut curentur.* 509
- stuporis causa efficientes ut inueniantur.* 353
- subiectum passionum ex Arist. semper est causa remota.* 498
- subiectum cur nunquam ex Auerroe dicitur quid passionum.* ibid.
- subiecta prima passionum cur semper querenda sint.* 376
- substantia locorum affectorum ignorata ignorantur quoque specificæ indicationes.* 188
- substantia Appendicum ossium cognitæ prodest curationi Appendicum.* 189
- substantia cur sit impassibilis.* 403
- substantiam non posse aduersari substantia, neque qualitatibus.* 407
- substantia quid significet apud Gal.* 412
- substantia ut sit omnium basis.* 414
- substantia corporea ut alia est similis, alia dissimilis.* 415
- substantia cur nihil indicet.* 403
- substantia tota peccare ut dupliciter intelligitur.* 402
- succi omnes ut acescant.* 387
- succi omnes habens quatuor partes quatuor elementis respondentes.* ibid.
- sudor ex Arist. cur falsus.* 377
- sudoris saporis ut ostendant varios prædominari humores.* 336
- suffocatio caloris à quinque causis fieri potest, & que sint.* 326
- suppressio ut suppressio urina nec aliqua suppressio ut aliqua est requirit*



# NOTABILIVM.

<i>rit catheterem.</i>	486	<i>Sympathia inter os sacrum, &amp; cervicem.</i>	118
<i>Syllogismus duplantis exemplum mendicum.</i>	17	<i>Sympathia inter cubitum, scapulam, &amp; collum.</i>	120
<i>Syllogismus falsus, &amp; principij petitio sunt origines omnium errorum.</i>		<i>Sympathia vicinitatis exemplo musculorum cubiti declaratur. ibid.</i>	
451		<i>Sympathia causa sunt impenetrabiles sine cogitatione situs, figura, &amp; originis partium.</i>	121
<i>Syllogismus ex particularibus cur nullus.</i>	454	<i>Sympathia inter secundos articulos digitorum manus, &amp; humerum.</i>	122
<i>Syllogismus non potest esse bonus, nisi tres termini formaliter differant.</i>		<i>Sympathia inter tertium articulum, quattuor digitorum, &amp; internum articulum cubiti.</i>	125
496		<i>Sympathia inter externum humeri tuberculum, &amp; quattuor digitos pollice exceptis.</i>	126
<i>Sympathia ex Galeno triplex est, scilicet generis, vicinitatis, &amp; operis familiaritatis.</i>	81.194	<i>Sympathia inter minimum digitum, &amp; humerum.</i>	128
<i>Sympathia inter lienem &amp; ventriculum per quae vasa seruetur.</i>	81	<i>Sympathia inter indicem, &amp; cubitum.</i>	ibid.
<i>Sympathia inter aethiopi, &amp; tracheam, stomachum, &amp; cor quae sit.</i>	82	<i>Sympathia inter tertium articulum pollicis, &amp; cubitum.</i>	129
<i>Sympathia nulla est inter mesenterium, &amp; musculos rectos.</i>	91	<i>Sympathia inter pollicem, &amp; cubitum.</i>	130
<i>Sympathia inter musculum temporalem, &amp; musculos oculorum, &amp; palpebrarum quae sit.</i>	101	<i>Sympathia inter brachiale, &amp; externum humeri tuberculum.</i>	131
<i>Sympathia quae sit inter musculum ortum à styloide, &amp; ingulum.</i>	103	<i>Sympathia inter brachiale, &amp; humerum.</i>	132
<i>Sympathia inter quartum musculum maxilla, &amp; linguam.</i>	ibid.	<i>Sympathia inter ilia &amp; tibia.</i>	133
<i>Sympathia inter brachium, &amp; pectus.</i>	104	<i>Sympathia inter lumbos, &amp; tibia.</i>	135
<i>Sympathia inter primum musculum brachij, &amp; os pubis.</i>	ibid.	<i>Sympathia inter tibia, &amp; femur.</i>	ibid.
<i>Sympathia inter nates, &amp; brachia.</i>	106	<i>Sympathia inter pubem, &amp; tibia.</i>	136
<i>Sympathia inter collum, &amp; quintam thoracis vertebra.</i>	108	<i>Sympathia inter ultimas vertebrae lumborum, &amp; primas ossis sacri, &amp; tibia.</i>	137
<i>Sympathia inter testiculos, &amp; musculos ventris.</i>	109	<i>Sympathia inter coxendicem, &amp; tibia.</i>	139
<i>Sympathia inter sternum &amp; pubem.</i>	111	<i>Sympathia inter mediam appendicem ilium, &amp; tibia.</i>	140
<i>Sympathia inter os sacrum, &amp; pectus.</i>	112	<i>Sympathia inter tertium stramen lumborum, &amp; tibia.</i>	141
<i>Sympathia inter os sacrum, &amp; manus.</i>	113		
<i>Sympathia inter cervicem, &amp; quintam vertebra thoracis.</i>	114		

# INDEX RERVM

- Sympathia inter manus trochantarium, & tibiam.* 142
- Sympathia inter partem posteriorem ilium, & tibiam.* ibid.
- Sympathia inter tibiam, & foramina ossis sacri.* 144
- Sympathia inter femur, & os sacrum.* ibid.
- Sympathia inter femur, lumbos, & os sacrum.* 145
- Sympathia inter femur & undecimam, & duodecimam vertebra thoracis.* 146
- Sympathia inter pectus, brachia, femur, ventrem, & primam vertebra lumborum.* 148
- Sympathia inter appendicem fibula, & calcanei.* 150
- Sympathia inter calcaneum, & quartam vertebra lumborum.* ibid.
- Sympathia inter calcem, & externum caput femoris, & os sacrum* 151
- Sympathia inter calcem, tibiam, & fibulam.* ibid.
- Sympathia inter digitos, & tibiam.* 152
- Sympathia inter fibulam, & digitum pollicem.* 153
- Sympathia inter mediam fibulam, & minimum digitum.* ibid.
- Sympathia inter tibiam & internodia tertia quatuor digitorum, & secundum pollicis.* ibid.
- Sympathia inter pollicem & tibiam, & os sacrum.* 155
- Symptomati quando prius attendendum.* 156
- Symptomaticos motus aliquando esse adiuvandos.* 154
- Symptomatum omnium resolutio in primas radices.* 11. & 14.
- Symptoma ut non possis facere aliud Symptoma.* 12
- Symptomata cur non indicent.* 12. & 471
- Symptomatum omnium inisia que sint.* 13
- Symptomata non tolluntur, nisi aliquid quod est in facto esse tollatur* 24
- Symptomata cum sint infieri cur non indicent.* 471
- Symptomata utilia ex Galen. desumuntur à causis, locis affectis & à virtute.* 462
- Symptomata inutilia desumuntur à patiente.* ibid.
- Symphisis connexus quis sit.* 195
- Synarthrosis connexus quis sit.* ibid.
- Synecdoche figura poetis, & non medicis conuenit.* 484
- Syndrome sufficientissima signorum communium scientiam parit.* 20
- Syndrome signorum communium ex quibus, & quot fontibus fiat.* 28
- Syndrome signorum cur tutius doceat* 30
- T** *Abulanos cur transparentior.* 346
- Tempus ex Galeno non indicat per se.* 477
- Temperatum quomodo intelligitur.* 366
- Temperatum Germanum cur equiparari possit temperato Abissino.* ibid.
- Temperamentum aequale ad pondus cur non detur.* 365
- Temperamentum aequale ad iustitiam in omni climato inueniri potest.* ibid.
- Temperatum dum dicitur, ut intelligi debet.* ibid.
- Temperamentum primigenium in agris*



# NOTABILIVM.

- agris non seruandum.* 218  
*Temperamentum primigenium non esse quarendum ostenditur exemplis.* ibid.  
*Temperaturarum signa tradita in arte medicinali quid arguant.* 219  
*Temperatissimus vir sub primo climate cur esset intemperatissimus sub septimo.* 366  
*Tensiones qua cito fiunt, semper indicant flatu.* 360  
*Tensio grauatina, & non grauatina quid significant.* 441  
*Terebram non conuenire in debili.* 506  
*Terebra quando mortem pariat.* ibid.  
*Terebra qua mala pariat.* ibid.  
*Theriaca odor non potest lumbricos occidere.* 301  
*Thessalus vocabatur iætrix.* 451  
*Thessalici putabant, sex mensibus addisci medicinam.* ibid.  
*Thessalus solus vititur topicis ante purgationem totius.* 597  
*Thorax est hysspidus, estque latitudo thoracis, ergo temperamentum est calidum, consequentia nulla est.* 219  
*Timor est sine causa & sine audacia, ergo peccat, fœx melancholica, valet.* 350  
*Timor sine causa unde oritur.* ibidem.  
*Tinea ut noscitur, dum fit à bile.* 323  
*Tinea ut noscitur dum fit à pituita.* 336  
*Tinnitus aurium à qua causa fiat.* 375  
*Tonfores ut errant dum transuersim incidunt, musculum temporalem.* 100  
*Tonfores ut errant dum transuersim incidunt, primum musculum brachij.* 104  
*Tonfores dorso, & lumborum apostemata transuersim non debent incidere.* 106  
*Tonfores ut errant, dum musculum internum manus transuersim secant.* 123  
*Tonfores ut errant, dum transuersim incidunt frontem.* 192  
*Tonfores errant, dum in longum incidunt, primum musculum brachij.* ibid.  
*Tonfores errant, dum secant in longum primum musculum tibiae.* ibid.  
*Tophi concrescunt à calore quoque moderato.* 178  
*Topica cur sapè ex Aristot. in agris mutari debent.* 253  
*Topica externa attu frigida cur non applicentur.* 516  
*Topicis vititur Hippocrates ante purgationem.* 598  
*Tormentillam ex Scaligero curare Gallicam luem.* 499  
*Tralianus putauit febrem esse natura conatum.* 291  
*Transcendunt de genere ingenui sic diuidunt: intemperiem aliam esse cum materia, aliam sine materia.* 7  
*Transitus de accidente in subiectum non datur in natura.* 242  
*Transitus de genere in genus cur fugiendus.* 457  
*Transiissionem humorum fieri ob quatuor causas.* 444  
*Tumor ventriculi à flatu ut syndrome noscitur.* 33  
*Tumor ventriculi ut noscitur dum est in parte interna, & externa.* ibid.  
*Tyrannica est illorum doctrina, qui*

# INDEX RERVM

auctoribus sunt add. & li. quod an-  
 thoritate Galeni confirmatur.  
 198

**V**acuum non attrahit sed susci-  
 pit. 445-540

Vacuum ut attrahit. 445

Valesius incidit in iri. errata dum  
 loquitur de vetula Atheniensi  
 eicuta alta. 235

Valesius errat. dicens naturam esse  
 habitum, consuetudinem disposi-  
 tionem. 241

Valesius non rectè tenet, copiam  
 humorum esse causam periodo-  
 rum. 277

Valesii argumenta in Auicennam  
 de quarto genere melancholie  
 nullius reboris. 386

Valuerde reprehendit Vesalium di-  
 centem, dextrum cubitum in  
 plenitudine semper esse secandum.  
 207

Vappa quomodo fiat. 388

Varices in quibus partibus corporis  
 fiant. 347

Varices quando possint tuto secari.  
 ibid.

Varices dum secantur aliquando  
 homines fiunt melancholici.  
 ibid.

Varices à quibus causis externis  
 fiant. 347

Varicose vena indicant melanco-  
 liam. 344

Vbi agendum unde colligatur. 167

Vbi dolor ibi morbus, propositio est  
 subalterna, & saepe falsa.  
 111

Vena dextri cubiti non deplet He-  
 par melius sinistri. 202

Vena cephalica ab. capitalem sur-  
 culum ut non possit esse capitalis.  
 201

Venarum cubiti ignorato exordia

qua mala sequantur. 397

Vena basilica sub se habet nervum,  
 unde dum secatur manus est pe-  
 riculum, quam cephalica, &  
 mediana. 190

Venam cephalicam vel medianam,  
 cur tutius sit ut secetur.  
 191

Vena basilica magis quam alia ve-  
 na, prodest marmillis. ibid.

Vena saluatella secta ut iuuat.  
 194

Vena saluatella à quo orietur.  
 200

Vena manus à quo truncho omnes  
 oriantur. ibid.

Vena non seruant semper eundem  
 situm, & exordium. 201

Venam portam esse sedem melan-  
 cholie. 353

Vena siue pari non mittit surculos  
 ad brachium. 207

Vena saphena non runditur, non se-  
 cto prius cubito. 507

Venarum latitudo non indicat tem-  
 peramentum calidum. 218

Venenis quomodo assuescere possi-  
 mus. 234

Venenis calidis cur assuescere non  
 possimus. 235

Venena in sefe qua sint. 421

Venena tota substantia aduersantia  
 tria. 429

Veneni calidi accidentia qua. 432

Venenum est quid equiuocum.  
 ibid.

Venenum absolutè tale non datur.  
 429

Venenatorum qua pars prima le-  
 datur. 430

Veneni definitio cur unica esse non  
 possit. 430

Venenatum qua arte nosci possit.  
 ibid.

Venenatorum morbi qui sint. 431

Venenasi



# NOTABILIVM.

<i>Venenari sublimato qua habeant accidentia.</i>	430	<i>Vesicula ut inuisti Iacobus Syluius morder.</i>	215
<i>Venenatorum symptomata. ibi- deat.</i>		<i>Vesica felica cur sepe ladataur.</i>	354
<i>Venenatus opio qua accidentia ha- buerit.</i>	432	<i>Vesica calculus vi syndrome signo- rum noscitur.</i>	36
<i>Veneri cur melancholico Hippocon- driaci.</i>	21	<i>Vesica felica lapilli à quo humore fiant.</i>	254
<i>Ventriculus ut assuescere possit cibis difficillime concoctionis.</i>	233	<i>Vesica quem fructum colligat ab u- rina.</i>	441
<i>Ventriculus est per se lassus, ergo pi- tuita redundat. valet.</i>	337	<i>Vesica inflammata quando non cu- ratur syringa.</i>	485
<i>Ventriculus cur subiectus affectibus melancholicis.</i>	353	<i>Vesicantia ex Galeno ostenditur non calefacere.</i>	530
<i>Ventriculi imbecillitas ut cognosci- tur à qua causafiat.</i>	88	<i>Vesicantium defensores pro mali- gna febre probabiliter arguunt.</i>	529
<i>Ventriculi imbecillitatem aliquan- do tolli aqua frigida.</i>		<i>Vesicantia occipitio applicita sta- tim oculorum fluxionem tollunt.</i>	504
<i>Ventriculi tunica non solum chylum efficere.</i>	87	<i>Vesicantia an conueniant. in febre maligna.</i>	525
<i>Ventriculus calidus ut refrigeretur à caliditate iecoris.</i>	84	<i>Vesicantium. introductores in fe- bribus videntur analogismo Em- pirico.</i>	528
<i>Ventriculus ut ladataur per consen- sum à splene, &amp; Hepate.</i>		<i>Vesicantia aliquando turgentes hu- mores ad cutem auocant.</i>	531
<i>Ventriculum ex Galeno tribus mo- dis affici.</i>	42	<i>Vesicantia quibus argumentis de- fendi possint.</i>	531
<i>Ventriculi vlcus ut noscitur dum est in externa, vel interna tunica</i>	34	<i>Vesicantia quomodo, quamuis no- ceant, sint applicanda.</i>	532
<i>Ventriculi vlcus ut signorum syn- drome noscitur.</i>	34	<i>Vesicantia ut colliguntur ex agro- rantibus Hippocratis.</i>	533
<i>Ventriculi vlcus cur sitim excuet. ibid.</i>		<i>Vesicantia non iuuare semper, pro- batur principio contradictionis.</i>	534
<i>Venus confert, si tres condiciones seruentur.</i>	245	<i>Vesicantia quando sint applican- da ex septem signis colliguntur.</i>	535
<i>Veritas sui &amp; obliqui index ex Aristot. 1. de Anima. tex.</i>	2	<i>Vetula ut citius assuescere possit.</i>	234
<i>Vesali opinio de ortu cephalica &amp; basilica.</i>	199	<i>Vetula alta cicuta si incidisset in fe- bre, cicuta fuisset ei amuleum.</i>	249
<i>Vesali opinio quod vene non ser- uent eundem situm, &amp; ordinem in omnibus.</i>	201	<i>Via duplex qua scire possimus cau- sam tarditatis paroxysmi.</i>	331
<i>Vesali error, dum secat. in omni pleuritis dextrum cubitum.</i>	467		

# INDEX RERVM

- Via, quas sibi parat natura, quot sint.* 526. 560
- Viarum nostri corporis latentium sex pulcherrima exempla.* 560
- Victus crassus, & aer feruidus ad aerem bilem disponunt.* 316
- Vina potentia cur refrigerent stomachum vacuum.* 327
- Vini multam potationem ex Gal. debilitare, ut coitus.* 22
- Vini Vappa quomodo fiat.* 267. 387
- Vinum quomodo fiat acetum.* 384
- Vinum quomodo fiat amarum.* *ibid.*
- Vinum ut habet quatuor naturas quatuor elementis respondent-tes.* 387
- Vinum fit acetum, dum abicit aqua vite.* *ibid.*
- Virtutis bona signa que sint.* 572
- Vires ut recuperentur quatuor sunt necessaria.* 571
- Virtus desumit rationem à tribus.* 512
- Viscera omnia triplici modo ladi possunt.* 43
- Viscera disposita ad flatum per quin-que loca noscuntur.* 358
- Vitrum rubrum iuxta positum ce-ruleo facit violaceum.* 342
- Vitrum ceruleo luteo unitum facit viridem.* *ibid.*
- Viuens non conseruaretur, si aliquis humor deficeret.* 266
- Vlceris sanatio est fucata, dum v-runtur exsiccantibus potentissimis* 585
- Vlcus quo ordine curatur.* 567
- Vlcus trachea ut cognoscitur.* 27
- Vlcera lata quam melancholia spe-ciem indicent.* 348
- Vlcera maligna cur alba fiant.* 393
- Vlcera non sanari ob plures causas quam quattuor.* 585
- Vlcus Cachoeticum quod sit.* 584
- Vlcus dyspuloticum quod sit.* *ibid.*
- Vlcera quo ordine curentur.* *ibi-dem.*
- Vlcus quando à Galeno humidis curetur.* *ibid.*
- Uniuersale quomodo percipiat ab intellectu.*
- Uniuersalia cur ab Arist. vocentur à μὴν.* *ibid.*
- Uniuersale si esset diuisum in parti-cularia esset corruptibile.* *ibid.*
- Uniuersale ut cognoscatur ab in-tellektu.* 499
- Vola manus respectu cuius dicatur temperatissima.* 365
- Urgentium sunt quatuor classes.* 567
- Urina suppressio desperata cur can-tharides postulet.* 514
- Urina alba cum multo sedimento ostendit piuitiam.* 336
- Urina que ostendat flatum domina-ri.* 359
- Urina ex Arist. cur salsa sit.* 377
- Urina cur cruda etiam sit post sa-natum morbum.* 284
- Urina ut est signum peccantium hu-morum probabile.* 283
- Urina ut non ostendat aliquando humores existentes in caua.* 282
- Urina ut fallit nos in cognoscendis peccantibus, & illorum coctionib.* *ibid.*
- Urina non potest esse signum pre-gnantis proprium, nec commune.* 61
- Urina splendida in febribus mali-gnis cur deterior subingali.* 270
- Urina cur non ostendat coctionem humorum pectoris.* 281
- Urina*



# NOTABILIVM.


- Vrina quid indicet.* *ibid.* *Vxores ubi ante maritum coeant,*  
*Vrina non indicat humores exi-* *primò cum sacerdotibus.* 228  
*stentes in vena porta.* 282 *Vxor Delcis quia magis loqueba-*  
*Vters orificium in vivente ut nesci-* *tur, quam antea, bilem colligebat*  
*tur.* 68 *Galenus, & quia tacebat, me-*  
*Vulnus penetrans ad processum in-* *luncholiam misceri putabat.*  
*ternum scapula cur periculosum.* 322  
 192 *Vxor Epieratis habuit rigorem sine*  
*Vulnus mucronata cartilaginis cur* *consecutione caloris unde Gale-*  
*lathale sit.* 174 *nus colligebat, pituitam acidam*  
*Vulnus Lithotomi carere periculo.* *peccare.* 323 & 442  
 175  
*Vulnera cur aperta servantur.* **X** *Enocratis erratum de Syllogis-*  
 570 *mo duplante.* 466

FINIS.



1. 1. 1.





SANCTORII  
 SANCTORII  
 OLIM IN PATAVINO GYM-  
 NASIO MEDICINÆ THEORI-  
 cam ordinariam primo loco  
 profitentis,  
 DE  
 REMEDIORVM INVENTIONE  
 LIBER.

CAPVT PRIMVM.

*Vnde fit quòd Medici rarò inueniant verum & pro-  
 prium remedium.*



VI A diximus, Hippocratem egisse in aphorismo  
 21. de inuentione medicamenti sumpta indicatio-  
 ne à locis conferentibus, & ab humorum inclina-  
 tione. Plurimi in hac re tanti momenti rogarunt  
 me, vt fusius, & distinctius agerem de remediòrum  
 inuentione: quia reuera in arte medica nihil vide-  
 tur esse magis expetendum: sumpta igitur indica-  
 tione à specificis affectuum differentiis à quibus  
 solum remedia ex vsu artis desumi possunt, bre-  
 uem hunc tractatum aggredimur.

Causa, cur medici admodum rarò verum & proprium remedium inue-  
 niant, est artis medicæ, Philosophiæ, & Logicæ imperitia quod facilè osten-  
 di potest auctoritate, ratione, & experientia.

Galenus 1. ad Glauc. cap. 1. ostendit, medicos imperitos ob diuisionis pra-

uitatem in tria errata labi posse: vnde fit, vt nunquam perueniant ad specificas affectuum differentias, ex quibus solum vera, & propria colliguntur remedia: habet enim hæc verba “ Etenim quæ in aliis hæresib. contingunt errata, & quæ multi medici nunc in ægrotantium curatione delinquant, hanc primam atque præcipuam causam habent, diuisionis scilicet prauitatem.

Deinceps statim proponit primum erratum, quod est, dum nulla facta diuisione persistunt in primis, & supremis generibus, à quibus certè nullo remedium ex vsu artis desumi potest.

Secundum erratum ex Galeno loco citato est dum colligunt remedium à genere subalterno relinquentes specificas, & vltimas affectuum differentias: ex quibus solum remedia collecta iuuant.

Tertium erratum ibidem proponit Galenus, dum medici parum periti vitiosis vtuntur diuisionibus, vel transcendendo suprema genera, seu faciēdo transitum de genere in genus, vel de genere morborum in genus causarum.

Quo ad primum erratum, quod est dum persistunt in generalissimis remedijs, maximè hoc damnatur à Galeno nō solum loco citato, sed 3. meth. cap. 3. his verbis “ Existimare commune quamdam esse omnium hominum curationem, vt stupidissimi methodici putant, extremæ est dementia: sicuti extrema est dementia medicorum vulgarij, qui persistunt in communissimis morborum generibus: sicuti dum dicunt, est intemperies: ergo per contraria auferenda: est angustia præter naturam: ergo per aperientia est tollenda: est soluta vnitas: ergo per *anquæ*, id est coalitum sananda. Ex his supremis generibus omnia remedia, quæ colliguntur sunt omninò vana, & circulatorum propria: nisi diuidantur intemperies, angustia, & soluta vnitates in subalternas differentias: deinde in specificas, quæ vltèrius diuidi non possint.

Pari modo Galenus 1. meth. 3. damnat, qui nondiuidunt vsque ad specificas differentias, his ferè verbis “ si quis diuidet elementa vocis in vocales, & consonantes, & vltèrius diuidendo non progrediatur, omnia elementa non intelliget: sic de morborum numero non debemus in prima statim differentia subsistere, sed diuidendo procedere: donec ad aliquam infimarum specierum, & quæ amplius in aliam distrahi non possit, perueniamus: Ecce quàm clarè Galenus nobis cōmendat, vt in diuisione non quiescamus in genericis: quia ex illis certè nullum remedium colligi potest. Sed dum infra agemus de specificis differentiis rem claram & dilucidam magis ante oculos obiciemus.

Quod verò vnum indicet vnum patet ex Galeno 9. meth. 12. vbi inquit “ Conferentis indicatum semper esse vnum: Idem confirmatur 11. meth. 13. vbi habet vnā semper dari ex quaque re indicationem.

Pater quoque ex Aristotele qui 1. de Cælo suffultus hoc principio, quod vnum vni aduersetur, inuenit quintam essentiam: eius fundamentum erat: quia motus rectus sursum conuenit per se igni: circularis verò igni per accidens, alioqui motui recto deorsum duo motus ignis aduersarentur, videlicet rectus sursum, & motus circularis ipsius ignis: quare circularis per se



conueniet Cælo: ergo si motus indicat naturam: motus circularis indicabit. Cælum habere naturam diuersam ab elementis: esseque quintam essentiali: ac non constare ex eminentiis elementorum, vt putabat Plato.

Rationi verò, & philosophiæ aduersantur, qui desumunt remedium: ab ipsis generibus pro demoliendo affectu specifico: quia in omni genere vno est vna prima contrarietas: sic in coloris genere, albedo aduersatur nigredini: neque inueniuntur alij colores, qui essent contrarij albedini, nisi ipsa nigredo: quia vnum vni est contrarium, & non plura: Item dicendum est de omnibus alijs contrariis.

Præterea, si omne calidum, & omne frigidum lædit: quia est in 1. 2. vel 3. vel 4. gradu: ergo omnes intemperaturæ, quæ lædunt operationes, erunt specificæ: ergo remedia non erunt desumenda à generico, sed à specifico.

Insuper omnia quæ lædunt operationes, lædunt vt specifica, & non vt generica: ergo qui persistunt in remedijs genericis nunquam inuenient remedium, quod possit sanitatem restituere.

Demum qui à genericis desumunt remedium incidunt in errata ob logicæ inscitiam non ferendam quidem, nempe in paralogismum à positione consequentis ad positionem antecedentis: non enim valet consequentia, est calidum: ergo est calidum vt duo: valebit tamen vice versa, est calidum vt duo: ergo est calidum, quod est argumentum à positione antecedentis ad positionem consequentis.

Deinde, dum quiescunt in generica indicatione labuntur in erratum circa vniuersale: quia applicant inferiori, seu specifico, quod conuenit superiori. Exemplum, dum dicunt, tertianam indicare remedium refrigerans & humectans: hoc remedium certè non conueniet tertianæ, vt est tertiana, sed vt est intemperies calida & sicca valde generica: quia talis potest esse in latitudine neutralitatis, insalubritatis, & in latitudine ægitudinis: tertiana est species intemperiei calidæ & siccæ in latitudine ægitudinis: quæ intemperies adhuc subdiuidi potest, vt paulo infra ostendemus: ergo remedium pro tertiana debet esse refrigerans & humectans specificum, quod sub orbe lunæ est vnum solum, & non plura: quia vni vnum solum aduersatur.

Quo ad secundum erratum, quod indicans non possit esse subalternum, patet ex dictis: sed clarius, & in actu practico, & Galeni auctoritate patebit. In actu practico hoc modo: si quis desumeret à materia fluente remedium interceptiens, quod posset satisfacere omnibus fluentibus humoribus: certè esset illud interceptiens genericum, vel saltem subalternum, addimus: sed sic est, quod neque à Galeno, neque ab alio vnquam inuenta est materia istius auxilij interceptientis generici, quatenus scilicet est interceptiens, ergo si velint medici interceptere, prius debent illud genericum subdiuidere in interceptiens quod incrassando, & in illud quod astringendo sistit fluxionem. Primum indicatur à materia tenui. Secundum non à materia tenui, sed à meatibus reclusis: quare nisi diuidamus subalternum interceptiens, cuius materia generica occulta, nunquam remedium specificum inueniemus & per consequens nunquam sciemus an incrassantibus, vel astringentibus sit interceptiendum.

Pari modo si quis desumeret remedium à morbo in angustia vt est angu-

stia, illud certè sub Cælo non inueniet: quia angustia habet sex differentias específicas: illud enim remedium quod cōueniet angustię propter obstructionem interimet illum, qui habet angustiam ob compressionem. O quam ridiculi sunt illi medici (utinam nunc essent pauci) qui dum transitus ualorum uirinæ, uteri, vel aliarum partium est impeditus ob angustiam per compressionem, dant oxymel, iulapium acerosum, & similia: qui quantum ægros lacerent, & quantum hoc sit à Galeno vetitum, cap. de angustia paulo infra fusa oratione ostendimus.

Similiter si quis in affectu pleuritico non diuidet prius pleuritidem in suas differentias, ac velit venâ secare, posset errare, & maximè lædere ipsum pleuriticum: hoc patet ex Galeno 6. aphorif. comm. 5. vbi habetur ¶ si dolor in pleuritide neque ad clauiculam, neque ad hypocondrium perueniat, nec uenę sectionem, nec purgationem excogitabis: quia dolor ille erit in partibus carnosissimis, vbi nullum subest periculum: quia, sibi pleura membrana non est: pleura enim membrana uestit cor, & omnes partes internas thoracis, non externas: ideo inflammata ob sympathiam partium principum potest esse exitiosa: quod dici non potest de pleuritide, quæ in carne fit. Neque dicendum est, illam externam non esse vocandam pleuritidem: quia plura non significat propriè membranam, sed significat latus: sic latus etiam ipsius nauis vocatur pleura: pleuram in Aristotele Gaza vertit costas.

Demum ostendant esse in logica parum versati, qui ab indicante generico desumunt remedium specificum: Aristoteles enim 2. Post. 12. maximè damnat illos, qui inferunt consequentiam à genere ad speciem: sicut si quis diceret, iecur est calidum; ergo cichorea iuuabit: quia cichorea est refrigerans specificum, seu materia refrigerantis specifici: calor iecoris est quid genericum: quod sub se quamplurimas continet específicas differentias.

Insuper Galenus desumpsit hanc doctrinam de tribus erratis, in quæ labuntur medici imperiti in eligendis remediis ab altiori schola, quam aliqui fortasse putant, nempe à 1. Post. cap. 5. vbi Aristoteles animaduertit, tria remitti posse errata in cognitione ipsius quod quid est, & vniuersalis: nec non etiā à lib. priorum, sicuti nos ostendimus lib. 12. nostræ method. vitandorum errorum ex Aristotele, illam rationem seu medium terminum non esse admitterendum, si communior sit quæ sit: nec subiectum quod sit communius ratione. Ad quæ communissima errata tria Galeni, & tria Aristotelis reducuntur.

Itaque constituimus tamquam methodi principium, quod nullum remedium colligi possit, nisi à specificis indicantibus siue à specificis & vltimis differentiis morborum, & causarum, sicuti nos quoque docet Galenus 2. meth. 7. vbi vult in perquirendis remediis esse à generalissimis ad alias speciatim indicationes descendendum.

Similiter 1. ad Glauc. 1. asserit, quod ille solus qui sumit indicationes à specificis affectibus, quantum permittitur viribus medendo non erret. Ibidem extollit ad sydera Mnesitheum Atheniensem medicum percelebrem, quia à supremis generibus ad subalternas, & inde ad vltimas, & específicas indicationes & indicatorum differentias descendebat, atque in his quiescebat.

Quod verò omnes morbi, & omnes causæ antecedentes internæ, quæ curantur, & omnia remedia, quæ verè sanitatem restituant sunt specifica, patet ex Galeno,



Galenus, & exemplorum luce. Ex Galeno (præter alia loca citata) 3. meth. cap. 1. ubi dicitur *¶* absurdum est aliud esse quod indicat, & aliud quod curatur: ad dimissum sic est quod illud quod curatur est specificum & non genericum.

Exemplorum luce sic confirmatur: sit tertiana in Socrate: quæ tolli possit rhabarbari drachma: id fiet, tum ratione illius specificæ virtutis rhabarbari: tum ratione illius determinati granus tertianæ Socratis, qui gradus est quid specificum: quia sub se continere potest innumerabilia indiuidua quæ possent eadem tertianæ specie, vel gradu conflictari, ac eadem rhabarbari virtute sanari.

Quod verò specificus affectus in particularibus contenti, & non ipsa particularia curentur, ostendimus tum lib. 11. meth. nostræ vitandorum errorum, tum in hoc loco idem sic probamus: si particularia vt particularia curarentur, illorum indicationes non ostenderent ipsa remedia: ratio est: quia nō datur progressus à particulari ad particulare: sic humana ratiocinatio esset vanissima, quoniam nisi in ipsa fieret progressus à continente ad contentum, id est ab vniuersali ad particulare, nunquam concluderet.

Si inductio, quæ procedit à multis particularibus non valet: quia non est suffulta dicto de omni, quanto minus valebit si ab vno particulari ad aliud fiet progressus: ostensum est & receptum ab omnibus, indicationem habere vim illatam, quæ sine dicto de omni, vel de nullo dari non potest.

Quo ad tertium erratum, quod committitur à medicis, dum vitiolis vtuntur diuisionibus, Philosophi & medici omnes tenent sine recta diuisione, affectum, seu differentiam specificam dignosci non posse. Plato in Phædro ait, similem Deo, qui rectè diuidit: quia Deus est rerum omnium partitor: sic Aristoteles 2. Post. tex. 19. docet, quod quid est non posse inueniri, nisi facta diuisione in eodem genere vsque ad specificam differentiam. Galenus 1. meth. 5. habet hæc verba *¶* Fieri nequit, vt differentias vllius morbi inuenias, ipso quod diuiditur non planè explorato. Hinc 1. ad Glauc. citato illos solos medicos laudas, qui in diuisionum peritiæ sunt versati.

Diuisio perfecta facienda est in eodem genere: quia hæc sola ante oculos statim collocat quæ sunt pernoscenda: Ex se tamen diuisio, licet perfectissima sit, nihil sine virtute syllogistica concludit. In modo dum aliquid inferimus ex sola diuisione, turpiter labimur in paralogismos peccantes in forma & materiâ. In forma: quia dum sit transitus à genere ad membra diuisa sine probatione argumentum cadit in secundam figuram ex duabus affirmatiuis, vocaturque paralogismus à positione consequentis ad positionem antecedentis: quia medius terminus est communior quæsitio. Hinc Aristoteles 1. Priorum, & in fine secundi dicit ex diuisione consequentias esse prauas: secundo verò perihæron admonet à diuisis ad coniuncta ratione formæ nihil inferri posse. Hinc Aristoteles 2. Post. docet, per syllogismum diuisiui nihil concludi, nisi illud quod est in maiori propositione.

In materia peccat argumentum diuisiui: quia concludendo illud solum quod est in maiori propositione, ex necessitate labimur in principij petitionē. Ex his ergo apparet, quod sola diuisio nihil concludat: Ex his apparet quod qui non diuidunt vsque ad specifica sint sophistæ & non medici: quia magis à veritatis scopo recedunt, quam homines privati, qui secundum naturam lo-

quantur, de quibus Galenus 8. methodus 6. loquens habet, *quemlibet primarium*, qui secundum naturam loquitur, veriores opiniones habere quolibet sophista.

Vitiolam facinus diuisionem, vel dum fit transitus de genere morbi in genus alterius morbi, vel fit transitus de genere morbi in genus causarum, vel suprema genera transcendimus.

Quo ad transitum de genere morbi in genus alterius morbi, neque indicans, neque indicatum id est remedium vnquam inuenitur: non indicans, quia vt tale non est nisi in vnico genere: non indicatum: quia contrarium vnus generis non potest esse contrarium alterius: quoniam ex Aristotele prædicamenta, & eorum differentia, & proprietates sunt omnino impermiscibiles. Vt igitur inueniatur indicans, & indicantis remedium, debet fieri diuisio in eodem genere. Exempli causa nigrum non opponitur calido, nec album frigidum, sed nigrum: quia genera colorum, & primarum qualitarum inter se differunt: hac ratione Asclepiades reprehenditur à Galeno 6. de Viu P. 13. & alibi, quia dixit, febres, & omnes morbos in intemperie esse reducendos ad malam conformationem corpusculorum; nec videbat intemperiem esse vnum genus, malam conformationem esse aliud omnino diuersum.

Vitiola quoque est diuisio, dum fit transitus de genere morbi in genus causarum: quia morbus & causa genere differunt. Hinc Galenus 9. meth. 14. Idem proponit his verbis *Affectus* verò haudquaquam in causas deduci est aptus, sed in differentiis: nam aut in similaribus consistit partibus, aut in instrumentariis: in similaribus est temperies. O quam sapissimè rudiores in vitiolam hanc diuisionem incidunt: veluti dum diuidunt febres in biliosam, pituitosam, & melancholicam. Nec vident per hanc diuisionem fieri transitum de genere morbi in genus causarum: quia intemperies est morbus: humor peccans verò est causa efficiens: febris vt febris semper est intemperies calida: causa febris autem non semper est calida: quoniam pituita quæ efficit quotidianam est frigida. Quomodo igitur ex hac praua diuisione colligi poterit ipsam remedium? Cum igitur causæ efficientes, & morbi ipsi differant generes: cettè contrarium vnus non relictabitur alteri: quod verò relictatur febre non necessarîo relictabitur bili, vel pituitæ.

Ratio vera, cur si quis perquirat remedium in alieno genere centum annorum tractu, illud nunquam inueniat, est, quia vni contrario vnica sola est contrarietas, quæ genere conuenit. Hinc intemperies calida & remedium frigidum sunt duæ species in eodem genere primarum qualitarum.

Hinc maximè decipiuntur illi (vt error quidam famosus proponatur) qui putant, magnitudinem morbi indicare pharmacum & venæ sectionem: quia vnico affectui vnica debet esse contrarietas, & non plures: ipsi tantum putant venæ sectionem & pharmacum æquè aduersari morbo magno.

Præterea transeunt de genere in genus: quia morbus magnus est vnum genus, venæ sectio quæ respicit causam est aliud genus, vel materia alterius generis.

Insuper morbus magnus est differentia subalterna, in quibus non est quiescendum, vt iubet Galenus 1. ad Glau. 1. Affectus verò præter naturam vehemens indicat remedium vehemens & magnum: at remedium magnum & vehemens



hemens est subalternum, quod diuiditur in pharmacum & venæ sectionem, & in alias auxiliorum differentias.

Porrò contrarium, quod reluctatur indicanti inuenitur in specificis, & non subalternis differentiis.

Postremò si remedium magnum est indicatum, quod ab affectu præter naturam vehementi & magno per se indicatur: ergo venæ sectio per accidens indicabitur à morbo magno.

Hactenus non est inuentus Philosophus ita rudis, qui commune illud principium relinquit, quod vni per se, alteri per accidens conueniat: hoc igitur posito sequitur necessariò morbum magnum primo, & per se non indicare venæ sectionem: quia primo, & per se indicat remedium magnum. Quo pacto verò possit defendi Galenus, dum dixit, magnitudinem morbi indicare venæ sectionem. Nos satis superque detrahimus lib. 2. method. nostræ, & in arte parua in propria questione.

Insuper quod non possit admitti transitus de genere morborum in causas, colligi potest ex præcepto Aristotelis 1. Post. text. 20. vbi ostendit, conclusionem geometricam nullo pacto probari posse per principium arithmeticum: quia media & extrema debent esse eiusdem generis: quare si medius terminus, qui nos docet passionem propriam debet esse eiusdem generis, quantò magis in cognoscendis specificis indicantibus erit procedendum per ea, quæ sunt eiusdem generis?

Tandem, si non licet ex Aristotele in demonstrationibus uti principiis communibus pro cognitione passionis, sicuti ostensum est à Philosopho in famoso illo paralogismo Brissonis de quadratura circuli, quanto minus licebit transcendere, ut cognoscamus proprium indicans: sed melius, quantò minus licebit transcendere in cognoscenda non dicam passionem indicantis, sed naturam ipsius indicantis, quæ est medius terminus docens nos ad cognitionem remediorum: Hæc itaque sunt principia, quibus potuit Galenus locis citatis firmiter sustinere, quod in diuisione indicantium nunquam sit transcendendum de genere morborum in genus causarum.

Denique vitiosa est diuisione, dum imperiti transcendunt generalissima: tunc enim tantò minus proprium, & specificum indicans inuenient. Immo Hippocrates (ut refert Galenus) 1. prælag. comm. 4. nunquam morborum causas in Deum retulit: quia Deus est causa transcendens, & cæterarum causarum suprema.

Quo pacto verò cognoscantur specificæ morborum differentie: nos egimus lib. 3. meth. nostræ, ostendimusque específicos reddi affectus ab aliqua ex decem conditionibus partium affectarum. Ibidem exempla omnium morborum à capite vsque ad morbos extremarum partium speciatim proposuimus, ut quisque facile intelligat, quomodo fiant affectus specifici, qui reuera sunt illi, qui indicant remedium ex vfu artis.

Neque audiendi sunt Empirici, qui spretis rationibus, & auctoritatibus dicunt plus valere experientiam, quam Hippocratis & Galeni Philosophiam. Nos verò experientiam esse concedendam putamus, sed sine ratione, & Galeni seu Hippocratis consilio, credimus experientiæ non esse fidendum. Hinc prudentissimè Galenus 3. aphorismorum comm. 10. protulit hæc verba ¶ nō

est experientia: fidendum, quia quamvis idem sæpè vidimus, non possumus dicere, sic semper erit. Præterea 1. epid. 1. comm. 1. Galenus reprehendit Quintum medicum, quia dicebat hoc experientia scitur, & non quærebat ratione. Idem Galenus 7. de comp. med. per genera cap. 4. contra illos, qui solum adhibent fidem experientia:, & non ratione confirmant. Hac eadem ratione percitus Gal. 2. de officina medica 32. & 3. de officina medica 42. negat, medicinam vsu exempli docendam esse: requiritur enim cognitio physiologia:, sine qua nihil certè in medicina haberi potest. Itaque iure merito à Galeno 4. aphorismorum comm. 1. statutum est: experientiam in arte medica esse crus sinistrum: rationem vero crus dextrum.

## CAPVT II.

*De remedium inuentione desumpta à specificis differentijs affectuum omnium viscerum.*

**A**cturi de affectibus specificis prius considerabimus, quomodo membra lædantur: deinde de ipsis affectibus exempla agemus. Modi, quibus membra lædi possunt, sunt tres: primus est dum pars similis membrorum læditur: secundus dum pars instrumentalis: tertius dum vtraque pars.

Quo ad primum Galen. 3. de symp. causis cap. 4. sumens in exemplum ipsum cerebrum dicit, cerebrum, & per consequens quoduis aliud membrum lædi posse, vel vt simile, vel vt dissimile: vel vtroque modo.

Quo ad exempla: Galenus dat exemplum de catarrho, qui potest fieri non solum à qualibet similium intemperie, sed etiam à mala conformatione instrumentalis partis ipsius cerebri, quod non omnes admittunt: quamvis Galenus id clarissimè doceat 9. de Vsu P. cap. 1. vbi inquit, si cerebrum sit obstructum, excrementa in capite retinentur & retenta corrumpunt cerebri alimentum, vnde statim sine alia intemperie fit catarrhus. Præterea cerebrum potest esse læsum vtroque modo, id est ab intemperie, & mala compositione.

Hinc quoque remedia, quæ auferunt morbum partis similis cerebri, debent esse omnino diuersa à remediis, quæ tollunt morbum partis instrumentalis, vel vtriusque. Ex hac Theorica statim proximè accedimus ad remedium inuentionem procurando catarrho.

Id quod diximus de cerebro, quod modo lædatur vt simile: modo vt dissimile, atque interdum vtroque modo, dicere quoque possumus de corde, hepate, splene, ventriculo, renibus, & omnibus aliis membris compositis ex pluribus similibus.

His positis, quod omnia membra lædi possint vt instrumentalia (manentibus illæsis similibus) Galenus hepatis exemplo id docet 5. de loc. aff. 7. vbi inquit, hepar pati posse tumorem sine intemperie. Idem dici potest de quolibet alio membro: nempe de cerebro, corde, pulmone & aliis visceribus, quod scilicet possint habere tumores, & obstructions absque eo quod sint intemperata, & versa vice, quod videlicet possint esse intemperata sine obstructione, & aliis affectibus ad partem organicam pertinentibus.

Cæterum



Cæterum Galenus eandem doctrinam 7. method. cap. 12. applicat ipsi ventriculo, dicens tres affectus præter naturam vexare posse ventriculum: quorum primus est intemperies tunicarum ventriculi: secundus est materia viscosa adhærens tunicis: tertius est materia peccans in ipsius cauitate: subdit interdum hos tres affectus simul ægrum vexare: interdum duos solum, & interdum vnum solum.

Hæc exemplis declarantur: veluti si esset intemperies frigida ventriculi cū materia adhærente tunicis, ac materia peccans in eius cauo: potest etiam esse materia peccans in fundo ventriculi sine materia adhærente, & sine intemperie. A quolibet ex tribus his affectibus potest frustrari concoctio ventriculi, ita ut quilibet ex istis tribus affectibus frigidis possit efficere symptoma aliquod frigidum.

Pendamus exempli causa ructus acidus ex Galeno 6. aphorism. comm. 1. valet hæc consequentia. est intemperies frigida: ergo sunt ructus acidi: quamuis non valeat vice versa, sunt ructus acidi: ergo intemperies frigida: quia possent fieri acidi à coctione frustrata à materia peccante non ab intemperie.

Eandem doctrinam applicare possumus omnibus aliis membris, nempe hepati, cerebro, spleni, & omnibus aliis. Hepati, quia sæpè contingit in carne hepatis aliqua intemperies, quamuis humores non sint affixi, nec in cauitate aliqua stabulentur excrementa præter naturam. Præterea sæpè contingit, quod in hepate sint excrementa varia: quamuis adhuc non sit facta intemperies, quia intemperies ex sua natura non citò fit.

Cerebro eadem doctrina applicari potest: quia interdum est læsum ab intemperie, nulla existente mala affectione in parte instrumentali: interdum, vice versa, læsio nimirum esse potest in parte instrumentali, nulla adhuc facta intemperie.

Spleni pari modo tres affectus declarati conuenire possunt, vel separatim vel simul omnes tres.

Denique Galenus 5. aphorism. 62. applicat eandem doctrinam vterotibi enim inquit, sterilitatem, vel prouenire à frigida, & quauis alia intemperie, vel à pituita adhærente, vel à sanguine valde humido confluente, vel ab angustia venarum vteri: vt igitur actio non sit læsa in quouis organo, requiritur non solum bona temperatura, sed debita conformatio, secus actio explicari non potest.

Cæterum, vt perfectè dignoscamus illum affectum specificum, qui dumtaxat indicat remedium, non sufficit, vt solum intelligamus affectum consistere in intemperie calida & sicca, vel in materia peccante adhærente, vel in cauo existente: sed adhuc est necessarium, vt vltius progrediamur, subiudendo intemperiem calidam & siccam (quod non omnes intelligunt) in differentias, quæ specificis magis approximentur: quemadmodum Diuinus Galenus 8. de comp. med. per locos cap. 7. distinctè id facit, dicens *¶* Iecur habere quatuor facultates, & quatuor actiones, quæ à facultatibus dependent: subdit, sæpè cōtingit, vnam lædi, sæpè duas, & tres, & omnes quatuor simul.

Expedi igitur, vt videamus, an hepatis coctio, vel potius expulsio, vel attractio, vel retentio læsa sit. Addimus cum Galeno & Auicenna quod actio:

nes vario modo lædantur, prout variaz sunt intemperies; expultrix, quæ ex Galeno 3. de facul. nat. 13. consistit in fibris transuersis, non læditur ab illa intemperie, quæ lædit retentricem, & alias actiones attratrix iuuatur à calore & ob refrigerationem minus attrahit: Galenus enim 2. aphorismorum comm. 28. inquit, iecur minus attrahere ob refrigerationem. Retentrix verò per moderatam refrigerationem iuuatur: expultrix ex Galeno 3. de causis symp. cap. 2. & Auicennas doc. 6. iuuatur & fit à calore: quia motus est causa caloris, & viceuersa: retentrix verò à frigore: quia oppositorum eadem est doctrina. Retentrix læditur ab humida intemperie: hunc ex Galeno 3. de symp. causis 3. retentrix propter humiditatem in pueris redditur imbecillis, obliquis enim fibris iuuatur, vt docet Galenus 3. de facul. naturalibus 13.

Sed Auicennas doc. 6. declarat, quæ temperatura inferuiat omnibus his facultatibus: quare nisi præciamus specificam intemperiem à qua actio læditur: iacta est alea de inuentione remediorum. Exempli causa Galenus sexto aphorism. comm. 1. 6. de loc. aff. 2. & lib. de diff. symp. 4. dicit, in lienteria euacuari cibum non mutatum, non quod alteratrix seu chylicatrix sit inualida: sed quia retentrix pylori est imbecillis: ideo Galenus lib. vt de diff. symp. 4. dicit de ratione bonæ retentricis est, exequet coctioni, quare si cibus retineretur debito tempore, non fieret lienteria: igitur in lienteria aliquis dirigeret curam in iuuandam chylicationem, quæ non est læsa, & non in retentricem, nunquam sanaret.

Quo pacto verò cognosceatur, an sit læsa hepatis concoctio, quæ princeps est, vt docet Galenus 8. de comp. med. per locos cap. 7. nos ex tribus locis colligimus, quorum primus desumitur à necessariis consequentibus, nempe à calore. Secundus à ieiunio. Tertius à somno.

A colore: Galenus animaduertit (vt ipse refert 5. de loc. aff. 7.) Stesianum habuisse iecur illæsum. Omnes medici, qui visitabant Stesianum, dicebant, eius iecur pati abscessum: tamen Galenus vt primum ingressus est thalamum videns bonum & naturalem Stesiani colorem, dixit, iecur esse illæsum: abscessumque esse in musculis transuersalibus ascendentibus, & non in iecore: valet enim hæc naturalis color cōseruatur immutatus: ergo iecur est illæsum. Non tamen valet: iecur est illæsum, ergo est bonus color. In eodem cap. refert Galenus in Seruo Imperatoris demorfo à vipera factum fuisse faciem, & totum corpus viridis coloris: tamen iecur (ait) fuisse illæsum.

Secundus locus desumitur à ieiunio: quia Galenus 2. de ratione vic. 32. habet ꝑ sic ieiunium iuuat, affectum non esse calidum, sed vel temperatum, vel pituitosum: dum in massa sanguinea prædominatur caliditas præter naturam per ieiunium intenditur acrimonia. Similiter in 6. epid. 28. Galenus dicit, in sanguineis & pituitosis cibi paucitate, sitim & lassitudinem auferri: in biliosis cibi paucitate sitim & lassitudinem intendi.

Tertius locus desumitur à somno proponiturque à Galeno 4. in 6. epid. 23. vbi habentur hæc verba ꝑ somnum auferre sitim: quia per somnum sanguis humectat internas partes, quas petit; dum verò post somnum sitis intenditur, signum est in sanguine prædominari calorem, vel bilem: dum enim per somnum retrahitur sanguis biliosus ad imas partes, quas petit, exsiccat, & sitim facit: Ex his signis colligentes affectum esse intemperiem calidam, vel frigidam



gidam hepatis disponimur ad inuenienda remedia.

Cæterum adhuc non peruechimus ad specificam differentiam intemperierum: quia scire expedit, à qua intemperie, & ratione cuius concoctio læsa sit: Galenus 8. de plac. Hippocratis & Plat. cap. 7. ex ipso Hippocrate asserit, calidum innatum esse omnium naturalium operationum auctorem: ac 3. de causis pulsuum cap. 9. dicit, quod calor natiuus est qui concoquit cibos: ergo concoctio à calido natiuo fit: per calidum natiuum intelligimus temperamentū: quod sic probari potest: ex Galeno 2. de facul. nat. 9. temperatura est causa actionis: sed actiones fiunt à calido natiuo: ergo. Præterea illud est calidum natiuum per quod os est os, & caro est caro, & sic de aliis partibus: sed ex Galeno 1. de Vlu. P. 9. temperamentum est huiusmodi: ergo calidum natiuum est temperamentum. Videndum igitur est quoruplex sit hoc temperamentum, ut res melius pateat.

Temperamentum triplex est, Primum est insitum siue innatum ab ortu naturæ quod vocatur à Galeno 1. aphor. 5. vniuersa substantia, & initium omnium operationum.

Secundum est temperamentum influens à corde ( addimus nos ) & à cerebro, quia cor, & cerebrum transmittunt in totum corpus suas virtutes. Sciendum tamen quod hæc virtus influens non est tamquam forma partium, ut tenet Auerroes cum Aristotele 4. coll. cap. 2. sed est tamquam materia & pabulum calidi innati: de hac re disputauimus in aphorismo.

Tertium temperamentum est mixtum ex innato & influente: vnde resultat nouum esse, seu noua forma quæ dicitur forma torius partis viuētis: sic Aristoteles 7. metaphys. tex. 60. dicit quod syllaba est quid aliud præter B. & A. Similiter Aristoteles 4. Meteor. 2. in fine dicit ¶ pars maris quæ separatur à toto citius fæcet, quia priuatur natura seu forma torius maris, de ratione cuius formæ totius est conseruare totum, & partes ipsas. Pari modo hoc temperamentum mixtum immediatè, & completè edit omnes operationes: per hoc temperamentum ventriculus chylicificat: iecur sanguificat: oculi vident: & quælibet pars efficit proprias operationes.

Posita dicta distinctione temperamenti, nos faciliè remedia specifica adinuenimus: quia si per hypothesim ventriculus diminutè chylicificat, statim intelligimus, an id eueniat ob læsum temperamentum innatum, an ob læsum influens: influens præcipuè lædi solet vel ob nimium coitum, vel ob nimias cogitationes, & animi mœrores: quod si accidat ob istas causas, certè non est confugiendum ad stillicidia supra ventriculum, vel ad oleum mastichinum, & similia, quæ respiciunt innatum ipsius ventriculi, & non influens. Sed est confugiendum, si læsio pendeat à nimio coitu, ad cibos, qui faciliè augeant spiritus vitales, vel ad cordialia, sicuti ad diambra, ad diacinthum, & alia id genus.

Si verò læsio esset in ventriculo ratione spiritus animalis influentis consumpti ob nimia studia, seu ob nimias vigilas, confugiendum esset pro corroboratione ipsius ventriculi ad quietem animi, & corporis ad conciliandum somnum, qui ingignendis spiritibus vitalibus, & animalibus tenet primum locum.

Si verò ob potum frigidæ læsa esset chylicificatio, tunc non influens cali-

dum esset læsum, sed innatum, vel eius qualitas: quo casu iuuarent olea calida, & stillicidia. Ecce quod nisi medicus sciat distinguere, ratione cuius temperamenti actiones læsæ sint, de remedium inuentione iacta est alea.

Facto examine circa temperamentum, sequitur vt inueniamus locos indicantes excessus qualitaris temperamenti. Quod ex sex locis facile colligi poterit, nempe ex substantialiter inhærentibus: ex his, quæ accidunt: ex necessariò consequentibus: ex operationibus: ex excrementis, & ex iuuantibus, & lædentibus. Hi loci desumuntur à Galeno tum in arte parua: tum 1. de Viu P. 9.

Primo notandum est, substantialiter inhærentia esse illa quæ tactu ipso percipiuntur, sicuti si tactui nostro caput apparuerit calidum, iudicabimus esse calidæ temperaturæ, nisi alij loci obtiterint: idem dicimus de alijs partibus.

Secundus locus continet illa, quæ necessariò accidunt temperaturæ, quæ pertinent ad compositionem, videlicet ad magnitudinem, figuram, situm, & cavitatem: sicuti si venæ appareant magnæ in summis manibus, in oculis, & in alijs partibus, statim colligimus, iecur, & caput esse calidius temperato.

Tertius locus continet necessariò consequentia, quæ sunt secundæ qualitates, cuiusmodi sunt, asperum, lene, crassum, tenue, durum molle, graue leue, hyssidam glabrum, lentum friabile, ratum densum, colores, odores, & sapores, turbidum clarum, diaphanum & opacum: satis est, vt ex his colligamus aliquod signum pro confirmatione eiusdem temperaturæ. Per hypotheseos: si hypocondria sint hyssida, & ipsum pectus pariter tale sit, colligimus iecur, & cor esse iusto calidiora: indeque totum corpus esse calidæ temperaturæ: valet enim consequentia ex Galeno in arte parua, iecur & cor sunt calida, ergo totus corporis habitus est calidus. Pari modo ex coloribus, nisi alij loci obtiterint, temperaturam colligimus: sic Galenus 5. de loc. aff. 7. ex bono & naturali colore Sresiani cognouit iccoris temperaturam non esse læsam: sic in arte parua ex capillis nigris, multis, & duris colligit temperaturam calidam: dicimus multos & duros indicare temperaturam calidam, quia si pilli sint nigri, sed tenues & pauci indicat temperaturam frigidam, vt colligitur ex Hippocrate & Galeno 2. in 1. epid. 78. Similiter ex albis capillis, & ex glabritie frigidam dicunt colligi temperaturam.

Quartus locus continet operationes: Galenus in arte parua ex generatione multæ bilis, & multi sanguinis iecur esse temperaturæ calidæ ostendit: ex promptitudine verò propriæ actionis, non solum iccoris, sed cuiuslibet membri caliditatem dignoscit.

Quintus locus continet excreta & retenta plus iusto. Hinc biliosa excreta, vel retenta temperaturam calidiorem significant: pituita plus iusto excreta vel retenta temperaturam frigidior.

Sextus locus continet iuuantia & lædentia: etenim si iuuant calida, temperatura erit frigida, & sic de alijs.

Sed notandum est, quod iuuantia, & lædentia desumi possunt à quinque locis, quorum primus desumitur ab euacuatione: si enim euacuatio frigidorum iuuat, affectus est frigidus: si calidorum est calidus.

Secundus locus desumitur ab alteratione. Hinc si alterantia frigida iuuant, affectus



affectus est calidus: si calida iuuant, affectus est frigidus, & sic de aliis.

Tertius locus desumitur à ieiunio: estque Galeni 2. de ratione vic. in ac. 32. ubi inquit, si ieiunium iuuat, affectum esse frigidum: si noceat calidum. Similiter 3. in 6. epid. 28. ait, ieiunium si tollat sitim & lassitudinem, affectum esse frigidum, pituitosum, vel sanguineum.

Quartus desumuntur à somno: nam Galenus 4. in 6. epid. comm. 23. parimodo asserit, si somnus tollat sitim, affectum esse frigidum, si illam augeat, esse calidum: ratio est, quia per somnum sanguis refugit ad partes internas: quare si sanguis fuerit calidus, post somnum sitis intendetur: si verò fuerit temperatus, vel frigidus, post somnum sitis remittetur: quare valet consequentia, somnus mitigat sitim: ergo sanguis est temperatus, ex quo satis signo vt plurimum in morbis, qui videntur acutissimi, prænunciamus salutem.

Quintus locus desumptus à iuuantibus desumitur à febre: Galenus loquens de hoc loco 6. aphorism. comm. 44. habet hæc verba ¶ Nouimus febrem illis affectibus præter naturam conferre, qui ex frigidityte sunt sola, vel ex causis frigidis, vel ex flatuosis spiritibus. Hinc Hippocrates 4. aphorism. habet hunc aphorismum ¶ Qui à conuulsione, aut distentione neruorum tenentur: febre superueniente liberantur. Idem Plato confirmat in Timæo, dicendo, febrem auferre morbos frigidos.

Cæterum singuli supradicti loci seorsum considerati nos interdum fallere possunt: Exempli causa in 5. loco diximus, febrem superuenientem conuulsioni sanare conuulsionem: tamen hic locus interdum nos fallit: sicuti in Numeni filio apoplexia correpto, vt refert Hippocrates 1. epid. qui licet superuenerit febris pericula tamen: ideo cautius loquutus est Hippocrates 2. aphor. 26. ¶ melius est febrem conuulsioni; quam vice versa superuenire: dum dicit melius non tollit, quod interdum, licet superueniat febris non moriantur: idcirco contingentia signorum per syndromen aliorum tolli potest: qua ablata certò dignoscitur temperatura, & certò in eligendis remediis non fallimur.

Cognito temperamento, & eius excessu per sex locos propositos, videndum est in quo loco, seu in qua parte sit temperamenti excessus, seu mala temperatura, secus remedium non inueniatur. Si igitur agatur de hepatis intemperie, queritur an sit in parenchymate; vel in humoribus existentibus in capillaribus venarum, vel arteriarum, vel in illarum spatiis. Hinc distinctionem intemperaturarum proponit Galenus 8. de comp. med. per locos cap. 7. ubi inquit, dari duas intemperaturas: vnã in parenchymate, aliam in materia contenta in arteriis, venis, & spatiis ipsius: quam distinctionem non animaduertunt nostratum plurimi. Quod dixit Galenus de duplici intemperie hepatis, intelligendum est de omnibus visceribus, qua distinctione non percepta, affectio specifica non intelligitur, & per consequens remedia non inueniuntur.

Hinc Galenus 2. de temperamentis 2. considerans duas esse temperaturas: alteram in partibus solidis, alteram in humoribus viscerum, dicit ¶ senes quo ad solida esse siccos: quo ad excrementa esse humidos. Hinc Hydropici quo ad excrementa sunt humidis, quo ad carnes & alias solidas partes sunt sicci.

Idem etiam confirmatur Galeni auctoritate in arte parua cap. 56. ubi probat, habitum esse siccum, si caro pauca, & dura sit: pauca quidem in hydropi-

cis, & dura est caro: ergo solidarum partium temperatura in ipsis sicca, & non humida est.

Nec valet in hydropicis iecur, & cætera viscera infra septum in aqua nant: ergo viscera sunt humida, quia ex Galeno 5. aphorif. comm. 13. aqua, neque intus, neque foras humectat, madefacit tamen, sed aliud est madefacere, & aliud humectare.

Idem aliquando obseruatur de catarrho sua natura humido, dum prouenit ab intemperie sicca, vt docet Galenus 2. de temperamentis vltimo: quod Sebastianus Paparella non animaduertit, qui tenet catarrhum ab intemperie sicca fieri non posse, deceptus à Galeni auctoritate perperam intellecta in arte parua, vbi agens Galenus de sicco cerebro habet, siccum cerebrum carere excrementis: neque animaduertit Galeni propositum esse in illo cap. agere de intemperie sicca adhuc existente in latitudine sanitatis: dum verò 2. de temp. vlt. asserit ab intemperie sicca fieri posse catarrhum, intellexit de intemperie sicca existente in latitudine ægritudinis. Similiter ob excessum siccitatis ventriculi in locum chyli suggeritur pituitæ copia. Hinc Galenus 7. meth. cap. 4. loquens de ventriculo imbecilli, inquit, in similem errorem lapsos fuisse Pelopem præceptorem, & Quintum medicum, qui putabant, omnem ventriculi imbecillitatem à frigida intemperie prouenire, & per consequens ventriculum imbecillum indigere calidis adstringentibus, cuiusmodi sunt astringentia subamara, vinum austerum, coronea, & absinthium, in externa vero parte indigere calidis perfusionibus, & ceratis ex aromatis calidis: neque animaduertebant, imbecillitatem ventriculi fieri quoque posse ab intemperie calida, quod probat Galenus in illis verbis cap. citato ¶ Vidistin' me vnica die, vel potius hora leuasse ventriculi imbecillitatem frigida potione?

Similiter imbecillitas ventriculi potest prouenire ab intemperie sicca. Galenim loco citato ait, octo esse curationes in ventriculo, & in quauis parte, qui octo sunt intemperaturæ, nimirum quatuor simplices, & quatuor cõpositæ: potest igitur contingere, quod ventriculus sit refertus pituita proueniente ab imbecillitate facta à sicca intemperie: quate non valet consequentia: humores excrementitij sunt humidij: ergo intemperies tunicarum ventriculi est humida.

Præterea sæpè ventriculus non fungitur suo officio, licet sit ex se benè sanus ob humores in ipsum transmissos: ideo Galenus 1. de loc. aff. 4. ait posse contingere ructus acidos, vel nidorosos oriri ab humoribus in ventriculo accumulatis in cavitare, vel in tunicis, optima adhuc existente solidarum tunicarum ventriculi temperatura.

Hinc non valet: sunt ructus acidi, ergo ventriculus est frigida temperatura: valet tamen vice versa hoc modo, est frigida temperatura: ergo ex necessitate sunt ructus acidi.

Quare vt redeamus vnde digressi sumus, concludimus, duas esse temperaturas: alteram in solidis, & alteram in humoribus: quæ duæ temperaturæ sæpè non solum sunt diuersæ, sed etiã contrariæ: nisi igitur medici distinguant, & intelligant, vbi sit intemperies, an in humoribus contentis in spatiis, vel in solidis partibus, vel in vtrisque, nunquam inuenient remedium: quia remedium quod tollit intemperiem humorum, non tollit intemperiem solidarum partium.



partium. Immo vt plurimum mala ventriculi temperatura in excrementis, & non in solidis fit: quia illa, quæ fit in solidis partibus, exempli causa ipsius ventriculi, non ita facile fit: quia tunica resistunt valde, antequam fiant intemperata, habentque magnam vim, quod ex eo cognoscitur: quia conuertunt in chylum illa, quæ coctum sunt difficillima. Hinc Alexander Aphrodisæus 1. probole. 30. quærit cur sinapi, allium, & alia acria applicata cuti exulcerant, deuorata vero minimè. Responder quia in ventre tam robusta est eius virtus, vt antea concoquantur acria, quam agere incipiant.

Hoc præcognito, quod duplex sit temperatura, adhuc non peruenimus ad specificum indicans, quod indicat remedium ex vñ artis: quia adhuc sumus in subalternis indicantibus, quæ nihil indicant ex vñ, & sunt omninò vana. Quærendum igitur est vterius, an in humoribus peccantibus, vel in parte solida viscerum mala temperatura sit protopathia, vel idiopathia, vel sit solum per sympathiam. Hanc distinctionem facit Galenus 1. de loc. aff. cap. 3. dum loquitur de inquisitione affectus, an sit *idiôsis*, quæ est in facto esse, vel sit *sympthia* quod est in fieri: ea enim, quæ sunt in fieri nihil indicant: quia sequuntur morbum, vt vinbra corpus.

Eandem ferè distinctionem desumptam ab humoribus, & à parte solida facit Galenus 13. meth. cap. 8. loquens de apostematis, & Erysipelatis indicatione: vbi inquit ¶ Pars apostemate affecta recedit à statu naturali duplici ratione: primo vt repleta: secundò vt calidior facta: subdit ¶ Indicatio euacuationis vincit indicationem refrigerationis: è contra in erysipelate, in qua indicatio refrigerationis magis vrget, quam euacuationis. Ecce quod plenitudo, & non calor partis in ipso apostemate est protopathia: in erysipelate verò calor & non plenitudo. Idem sed clarius explicat Galenus 3. de temp. cap. 3. vbi ait ¶ Cum apostema factum sit ex calida fluxione, eius propria curatio euacuatio superuacui est: vacationi autem particulæ quæ per apostema excoacta est, omninò succedit spontanea refrigeratio. Ecce quod calor apostematis, cuiusque partis non reliquit intemperiem, quæ indicet remedium refrigerans, & quæ possit vocari *idiôsis*: immo est adeo in fieri, seu per sympathiam, vt nihil omninò indicet, quia tollitur ad ablationem causæ. In erysipelate non sic: quia protopathia est in calore: & hic calor primò indicat remedium refrigerans: secundariò verò euacuationem materiæ relictæ in parte erysipelate ob eisa. Idem dici potest de febribus putridis, quod euacuationis humoribus putridis (nisi calor insignis fiat) non sint viscera refrigeranda: quia refrigeratio post euacuationem sine alio refrigerante statim succedit.

An verò protopathia in apostemate semper sit in humoribus, vel in parte solida: si de legitimo apostemate loquamur non solum in parte solida est protopathia, seu idiopathia, sed est affectus merè schæticus, qui cū pura sympathia confunditur: quoniam parte solida depleta, sponte succedit (vt dictum est) refrigeratio. Si verò loquamur de apostemate erysipelatode: si magis participat de bile, quam de sanguine est explicatu difficile, sicuti fuit explicatu difficile Galeno loquenti 4. de loc. aff. 4. de Arthrit. Secundo, qui mouebat musculos intercostales sine intermissione ob septi imbecillitatem: an protopathia esset in sepro, vel in neruis cervicis, vel in vtrique parte: tamen si sanguinis signa essent efficaciora, quam bilis, maior esset affectio in sangui-

ne,quam in calore partis.

Si mala temperatura est in humoribus, & in parte solida solum sit in fieri, seu per consensum, ademptis humoribus statim sponte cessat affectus solidæ partis.

Similis affectus videtur esse epilepsia, sicuti animaduertit Galenus 2. de symp. causis cap. ult. & 3. de loc. aff. 7. vbi asserit: Epilepsia solutionem esse subitanæ: reddit rationem: quia fit à materia crassa & viscida replente ventriculos cerebri, sed cur solutio epilepsia est subitanea, cum facta sit à materia crassa, quæ ex se difficile discutitur? Respondemus materiam, licet crassa sit, quando nulla est mala temperatura ab expultrice facile expelli: dum vero est mala temperatura: sicuti mala temperatura non cito fit: sic non citò desinit: Epilepsia accessio non est facta ab intemperie, sed solum à materia crassa, ideo solutio subitanea est: nisi igitur hæc principia intelligamus, certè remedium inueniri minimè potest, quia aliud est remedium, quod tollit affectum ortum ab humoribus, & aliud quod dependet ab intemperie tamquam principali affectu.

Cæterum adhuc non peruenimus ad specificum affectum: non enim satis est, vt dignoscamus protopathiam, vel idiopathiam esse in humoribus, vel in parte solida, nisi intelligamus an affectus principalis agat altas radices, & sit cum multo recessu, vel pauco à statu naturali.

Præterea, si intemperies agat altas radices, videndum est, an intemperies sit hectica & æqualis, vel inæqualis: quia inæqualis non est ita mala, neque ita recedit à statu naturali, vt æqualis seu hectica. Exemplum æqualis est illud de phrenitide propositum à Galeno 1. in primum proræt. comm. 32. vbi loquens de intemperie æquali; & hectica cerebri habet ¶ Dum in vniuersa cerebri substantia est intemperies æqualis & hectica, egri non amplius delirant, sed manent quieti, quasi extincta ratiocinatione, quæ non amplius est deprauata, vnde moriuntur: nec vident medici plebei, hos phreneticos factos quietiores ob ratiocinatricem ablata mortem prænunciare.

Insuper, an morbus agat altas radices, cognoscitur ex diuturna viscerum dispositione per causas externas introducta.

Dispositio introducta modò est facilè, modo est difficilè mobilis: alioque remedio tollitur dispositio facilis, & alio dispositio difficilis mutationis.

Galenus 1. ad Glauc. cap. 2. & in historia Sileni ait, dum aliquis incidit in febrem ob erratum aliquod insigne in sex rebus non naturalibus, nisi antea sint viscera præparata ab aliis causis, illa febris est ephemera, vel alius breuissimus morbus.

Hinc Galenus in historia Sileni inquit ¶ Vtique Silenus non incidisset in morbum grauissimum, nisi antea fuissent præparata viscera: subdit, dum viscera non sunt præparata, ob errata in sex rebus non naturalibus in ephemeram incidunt. Idem dicunt Galenus 4. de ratione vic. in ac. comm. 115. Ideo medici, antequam præbeant remedium, debent præscire an illius corporis dispositio agat altas radices, necne: quia in dispositionibus diuturnis remedia efficaciora & validiora requiruntur.

Quod verò necessaria sit cognitio dispositionis viscerum, patet: quia remedia, dum introducunt sanitatem, non agunt in morbum, sed in subiectum morbi, quod



bi, quod non omnes animaduertunt. Hinc Aristoteles hoc principio suffultus composuit 1. lib. physicorum, & Galenus libros methodi: Aristoteles 1. physicorum text. 67. habet hoc principium *¶* Contrarium non agit in contrarium, sed in subiectum contrarii, nempe in materiam primam. Quo principio non intellecto medici cæco, & inconsiderato impetu, & non methodicè medicinam faciunt. Hæc est causa, cur Spagirici vt plurimum lædant, & sæpè interimant: quia eorum remedia agunt generosè in contrarium, nempe in morbum, & agendo destruunt partem viuentem morbo affectam. Quod reluctatur philosophiæ, & medicinæ: quia medici officium est introducere dispositiones salubres, disponendo partes affectas, illasque transferendo ad bonam temperaturam & bonam confirmationem moderando, & attemperando, & non vincendo, quia dum volunt vincere morbum, destruunt subiectum: si enim morbus est calidus vt duo: remedium debet esse frigidum vt duo, & non vt tria, quia sic vinceret, & introduceret contrarium morbum.

Quod verò post diuturnas dispositiones oriantur morbi, Hippocrates his verbis testatum reliquit 4. de morbis *¶* morbos diu conceptos *ἀπὸς ἐκλάμπτειν* id est statim erumpere: quare dum aliquis post erratum in sex rebus non naturalibus incidit in morbum: medici phlebei & mulieres illud trahunt in culpam ægritudinis, quod apud Hippocratem & Galenum est ridiculum: quia morbi diu concipiuntur per assiduas dispositiones: quibus introductis, morbi ex tempore se manifestant.

Hac de causa Galenus lib. de causis morborum cap. 2. dicit *¶* nec ignis combureret, nec gladius incideret, nisi subiectum esset dispositum.

Aristoteles pari modo 8. Physicorum ex 23. asserit, non fieri motum, nisi præcedant dispositiones: ibi disputat contra Heraclitum, qui dicebat, omnia semper moueri: inquit in augmentatione, & aliis motibus semper præcedere quietem, in qua fiunt dispositiones.

In eodem text. Aristoteles proponit quatuor exempla ad propositum nostrum maximè inseruiencia.

Primum est de guttis cadentibus, & excauantibus saxum: cadent. n. decem millia guttarum, quæ non excauant, vna tamen superueniens est illa, quæ dispositum saxum ab aliis præcedentibus guttis excauat.

Secundum exemplum est de arbore enascente ex aliquo lapide, quippè sensum crescens post multorum annorum spatium scindit lapidem. Ecce quantum valeat subiecti dispositio ad introducendas extemplo formas.

Tertium exemplum est de ægroto tendente ad sanitatem: vbi dicit Aristoteles, ægrum non semper sanari, sed prius disponi, & deinde sanari. Idem dicendum de corpore tendente ad ægritudinem: videlicet diu disponi à causis non naturalibus & præternaturam: tandem derepentè in ægritudinem prolabi non propter vltimum ægrum, sed propter innumerabilia annorum spatia commissa: quantò igitur causæ præternaturam corpus disponentes fuerunt diuturniores, & peioris conditionis, tantò morbus sæuior & tritior fiet.

Quartum exemplum Aristotelis loco citato est de glacie, quæ fit post præcedentem dispositionem.

Quo ad viscerum dispositiones, an in corpore sint, & quales sint, & an pos-

sint facile vel difficile amoueri omni studio præcognoscendum : secus quale & quantum debeat esse remedium in occulto iacebit.

Præcognoscuntur igitur dispositiones ad morbum per antecedentia & consequentia signa.

Signa antecedentia ostendentia corpus ad morbum esse dispositum à sex locis desumuntur. Quorum primus continet errata quæ committuntur in sex rebus non naturalibus: sicuti in nimio cibo & potu: sed hic locus, nisi per syndromen aliorum confirmetur, erit admodum contingens: quia sæpè accidit, ut potus & cibus sit valde calidus, tamen morbus frigidus fiat: ideo non valet, cibus & potus fuit valde calidus: ergo corpus disponitur ad morbum calidum: sæpè enim vinum meracum parit morbum frigidum. Id quoque obseruatur ab Aristotele 3. sec. probl. 1. ubi dicit vinosos non calere, licet vinum calidum sit: quia valde calida superant naturam suffocando calorem naturalem: ideo vinolenti morbis frigidis vexantur: quare in omni medica consideratione proponimus signorum syndromen, quæ tollat dubium: Ecce quod signa à cibo & potu non sufficiunt.

Præterea in erratis quæ fiunt in cibo & potu, prius videndum est, an error primæ concoctionis corrigatur à secunda: quia interdum corrigitur, si recur sit bene sanum.

Ideo abiiciendum est illud erratum, quod medici vulgares & plebei semper in ore tenent, quod error primæ concoctionis non corrigatur in secunda: Galenus. n. lib. de cibis boni, & mali sucet c. 3. his ferè verbis declarat quando error primæ concoctionis corrigitur in secunda. ¶ si facultas hepatis valida sit, error primæ coctionis corrigitur: si verò non sit valida, non corrigitur. Hinc Galenus loquens de errore primæ coctionis, qui non corrigitur à secunda tertio in 6. epid. comm. 1. dicit, errorem primæ coctionis non corrigi in secunda, supple quando facultas hepatis languida & debilis est. Tunc cognoscemus errorem primæ coctionis non corrigi in secunda, si post errorem maturinis horis viderimus urinam valde crudam, quæ si talis diu perseverauerit, corpus disponetur ad morbos ex obstructione. Radices verò istius morbi maiores, vel minores fient prout erratum magis vel minus perseverauerit: inde morbus curatu facilius, vel difficilior fiet, & remedia leuiora, vel efficaciora ad delendas introductas dispositiones excogitabimus.

Insuper Galenus 11. method. cap. 15. loquens de læsione primæ coctionis ob erratum in cibo & potu habet hanc sententiam. ¶ ex læsa prima coctione duo mala sequuntur: primum ex cibo assumpto nulla vilitas colligitur: secundum corrumpitur cibus, & ex corruptela cibi expellitur aliquid prioris cibi bene cocti. Si verò diu ex erratis ob cibi copiam sequatur corruptela, & ex corruptela debilitas, signum est corpus disponi ad morbum, & facto morbo eius cura est esse solum difficilem.

Secundus locus indicans confirmatam dispositionem desumitur à dispositione parentum: dispositiones enim hereditariæ non leui negotio auferri possunt: quia agunt altas radices, acquisitas videlicet in prima generatione: sic pater podagricus generat filium podagricum: quare nisi filius diu studeat in fluxione auferenda, & in corroborandis iuncturis, tandem cadet in affectum, quem præseruare, & auferre, neque gorgonei fontis defluvia sufficerent, neque chi-



que chironia manus.

Tertius locus desumitur à corporis habitu: sic obesi dispositi sunt ad frigidos morbos: macilenti ad calidos.

Quartus ab ætate: senes enim ad frigidos morbos: iuuenes verò ad calidos sunt procliuēs. Sed de ætatibus satis superque diximus in explicatione secundæ aphorismi.

Quintus desumitur à suppressa euacuatione, quæ fieri solet per aluum, vel per hemorrhoidas, vel per nares, per vterum, per vrinam, vel per vomitum.

Sextus desumitur à virium debilitate. Hinc debiles sunt dispositi ad morbos frigidos: robusti verò ad morbos calidos.

Quo ad locos consequentes, qui indicant malas compositiones. Hi loci septem sunt. Primum continet substantialiter inhærentia; quæ sunt illa, quæ tactu ipso comprehenduntur, an scilicet temperatura sit calida, vel frigida.

Secundus continet ea, quæ accedunt temperaturæ, & hæc pertinent ad compositionem, sicuti ad magnitudinem, situm, & numerum. Hinc ex Galeno in arte med. venæ latæ indicant caliditatem. Pari modo thorax latus, & digiti longiores caliditatem, signa opposita frigiditatem.

Tertius locus continet necessariò consequentia, quæ sunt qualitates secundæ, vt asperum lenes, glabrum hysspidum & cetera: glabrum frigiditatem, hysspidum caliditatem indicat.

Quartus continet operationes naturales, vitales, & animales.

Quintus immodicè retenta, & excreta: & præcipuè retenta cruda, de quibus Gal. lib. de cibis boni & mali succi his verbis nobis hoc diuinum præceptum reliquit *¶* nemo incidet vnquam in morbum si sedulo præuideat vt cruditate non laboret.

Sextus, iuuantia, & lædencia quæ desumuntur, vt superius ostendimus ab euacuatione, alteratione, à somno, à ieiunio & ab affectibus præternaturam: sic febris sanare solet conuulsos, & alios morbos frigidos.

Septimus est locus affectus, qui cognoscitur (vt docet Galenus 2. de loc. affect. 9.) per quinque locos, quorum primus est actio læsa, secundus sunt excrementa, tertius situs symptomatis, quartus doloris proprietas, quintus sunt propria accidentia.

Ex præcognito loco affectu colligere quoque possumus naturam morbi. Hinc si membranz sint læsæ, affectus vel est biliosus, vel flatulentus: quia membranz non penetrantur nisi à bile, vel flatu. Si glandulæ sunt læsæ, morbus est pituitosus: si lien melancholicus, & sic de aliis. Præterea pars affecta præter quinque proposita signa ab ipso Galeno adiungitur sextus locus & est debilitas alicuius partis, antequam incidat in morbum. Hic locus est Hippocratis 4. aphorif. 33. vbi habet hunc aphorismum *¶* si qua pars ante morbum laborauerit, ibi mali sedes, causa est, quia si adueniente morbo pars aliqua inueniatur debilis, quæ talis est ob aliquem morbum præcedentem, in illam tamquam in cloacam confluunt corporis excrementa: quibus confluis, sit mali firma sedes.

## CAPVT III.

*Deremediorum inuentione desumpta à protopathia, idiopathia, & à varia distinctione sympathia.*

**P**RO inuentione remediorum non satis est, vt intelligamus, quod intemperies primariò sit in parte solida, vel in humoribus. Neque satis est vt intelligamus à qua ex octo intemperiebus lædatur actio, nisi distinguamus, sicuti facit Galenus 1. de loc. aff. 3. & 3. de loc. aff. 5. affectum illum, qui est in facto esse, & in affectum in fieri: mox distinguamus affectus, qui sunt in facto esse, in protopathiam, & idiopathiam, & ipsum affectum in fieri, qui est per sympathiam, in omnes differentias: de his omnibus in hoc capite agemus.

Exemplum horum trium affectuum tale proponitur. Sit aliquis, qui incipiat laborare capitis intemperie frigida & humida: hæc generet catarrhum, qui descendens in ventriculum reddat illum intemperatum: ab hac frigida & humida ventriculi intemperie oriatur cæliaca passio vel colicus dolor. Hoc posito dicimus, quod si quis vellet auferre intemperiem frigidam & humidam ventriculi remediis calefacientibus, & exsiccantibus intus, & extra apponendis: ex alia parte perseveraret destillatio & capitis intemperies, certè frustra vexaret ipsum ventriculum, nisi prius & cerebri intemperiem, & ipsum catarrhum auferret. In hoc casu intemperies capitis est protopathia, id est affectio primaria: intemperies ventriculi est idiopathia, id est affectus proprius, non primarius: passio cæliaca, & dolores colici sunt affectus in fieri, qui dici possunt per sympathiam, siue per consensum, vel saltem in fieri: quia ablata ventriculi intemperie, inde cæliaca & dolores colici, nisi habeant aliquid in facto esse, cessare possunt. Ex his facillimè colligere possumus remedium. Notandum tamen est, quod interdum contingere potest, quod protopathia à medico, vel à natura superetur, & relinquatur idiopathia, quæ in hoc casu in protopathiam degenerat: sæpè enim contingit, vt capitis intemperies, & catarrhus cessent, intemperies verò ventriculi relinquatur.

Sed quia in ægrotantibus sæpè varij affectus obseruantur, nisi medicus in hac varietate distinguat affectum primarium ab affectu proprio, & ab illo qui est per sympathiam, certè nesciet mederi: quia nesciet cui primo, cui secundo, cui tertio loco sit attendendum: Galenus 1. meth. 4. dicit ꝑ methodo inquirere est inuenire quod primum quod secundum, quod tertium & quod quartum in disquisitione sit. Quod præceptum est tamquam methodi medendi principium: quo ignorato medici ægros vexant & non sanant: sicuti exemplo dysenteriae Galenus 4. de art. comm. 40. his verbis ostendit ꝑ Plerique medici neglecto iecore solum medentur vlceri intestinorum, & ægrotantes præcipient: quare in hoc casu primo iecori, in quo est affectus primarius, attendendum: secundo loco vlceri, tertio vero his affectibus, qui ab vlcere dependent. Ecce quod sine affectuum distinctione in protopathiam, idiopathiam & sympathiam nullum remedium ex vsu proponi potest.

Quo ad locos indicantes protopathiam dicimus cognosci per hos tres locos. Primus est, quod protopathia sit affectus qui ante alios incipiat: hic locus.



cus proponitur à Galeno 3. de loc. aff. 3. vbi habet, quod illa sit primigenia affectio, quæ aliis affectibus non superuenit. Secundus locus est, quod protopathia sit diuturnior aliis affectibus: quia ab illa cæteri affectus dependent. Tertius locus est, quod protopathia seu primarius affectus semper sit in facto esse: hos tres locos colligimus ex primo de loc. aff. 3. & 3. de loc. aff. 5.

Quo ad idiopathiam, id est propriam affectionem, quæ à primaria dependet, cognoscitur per tres locos. Primus, quod idiopathia partim sit facta & partim fiat. Secundus quod habeat dependentiam à protopathia. Tertius quod nullo modo auferri possit, nisi primaria affectio, à qua pender, auferatur.

Quo ad sympathiam: hæc est affectio per consensum, quæ semper est in fieri: ideo ex Galeno 1. de loc. aff. 3. non est *παθὸς* sed *παθήσ* vel *παθῶν* vel *παθήσας*, quæ solum sunt in fieri.

Hæc affectio per sympathiam duplex est, alia est per sympathiam partium, alia per sympathiam humorum, vel vaporum, qui trahunt in consensum alias partes alioqui sanas.

Quo ad sympathiam partium Galenus lib. aduersus Lycum asserit, triplicem esse: aliam esse sympathiam generis, aliam operis familiaritatis, aliam vicinitatis. Galenus arguit Lycum dicentem, tremorem manus provenire ab affectu oris ventriculi: quia si tremor manus fieret per sympathiam ab ore ventriculi, vel fieret per sympathiam generis, vel operis familiaritatis, vel vicinitatis: non per sympathiam generis: quia à ventriculo neque nervi, neque musculi, neque alia vasa eiusdem generis ad manus excurrunt: non per sympathiam vicinitatis: quia summa manus valde distat à ventriculo: neque per sympathiam operis familiaritatis: quia manus nihil habet cum ventriculi operatione: operis familiaritas observatur inter vterum & mammas: inter testes & vocis instrumenta, & inter alias partes, si quæ aliæ sint.

De sympathia generis, ut exemplorum luce procedamus, proponemus nonnulla præcipua exempla à Galeno observata, ex quibus præcognitis remedia specifica facile inueniri poterunt.

Primum exemplum dignum observatione est illud Pausaniæ propositum à Galeno 2. de loc. aff. cap. 6. in quo observavit sympathiam inter digitos, & ceruicem. Hic vir veniens Romam cecidit è vehiculo, & ex illo casu percussus circa ceruicem amisit sensum trium digitorum manus: affectio digitorum erat per consensum: ideo apposis remediiis ceruici, vnde nervi qui dant sensum digitis oriuntur, statim sensus digitis fuit restitutus: quia erant læsi propter sympathiam nervosi generis.

Secundum exemplum est illius, qui ambulavit sub vento & pluvia, de quo Galenus 4. de loc. aff. 4. ait, quod pallio illius circa ceruicem madefacto, sensus pericranei factus fuit stupidus per generis sympathiam: quia nervi pericranei proveniunt à ceruice: illis igitur refrigeratis à vento & pluvia, vix facultas animalis ad pericraneum excurrere poterat. Medici ignari conabantur reuocare sensum calefaciendo ipsum pericraneum, quod reuera non erat læsum per se: Galenus verò statim ceruicem, vnde nervi prodeunt, calefaci, quo peracto, statim ferè pericraneo sensum restituit.

Tertium exemplum observari potest in Athleta secundo, de quo mentio-

nem faciti Galenus 4. de loc. aff. 4. in hoc obseruatur sympathia generis inter ceruicem & septum. Hic vir sine intermissione mouebat musculos intercostales ob septi imbecillitatem: poterat esse protopathia, vel idiopathia in neruis ceruicis: quia neruus, qui dat motum septo, oritur à ceruice: poterat etiam esse affectus primarius, seu protopathia in septo: subdit Galenus hæc verba, an imbecillitas septi, ob quam mouentur musculi intercostales, sit in septo, vel in neruis ceruicis, vel in vtraque parte, est explicatu difficile: ecce quomodo non sit ita facile inuenire primarium affectum, & per consequens remedium specificum, quod vt inueniatur, requiritur examen faciendum per signorum syndromen, quam nos superius proposuimus.

Quartum exemplum de sympathia generis proponitur à Galeno 4. de loc. aff. cap. 4. citato, vbi hæc habet ¶ In quodam homine vtrunque crus erat paululum resolutum: adaptatis tamen remediis lumbis, vnde veniunt illi nerui, qui inseruiunt cruribus, statim sanatur.

Quintum exemplum eiusdem sympathiæ obseruatur inter brachium & femur ob neruos lumborum. Hinc sæpè contingit, vt brachium non possit sine difficultate deorsum extendi, & femur sursum trahi cæterorum musculorū illæsis officiis. Horum symptomatum protopathia sine anatomie studio, est omnino impenetrabilis: Ex anatomia enim quartus musculus brachij, cuius officium est brachium deorsum trahere, oritur à vertebra lumborum, & ossis sacri: ab iisdem vertebra oriuntur nerui, qui dant motum huic quarto musculo brachij, & sexto femoris musculo: quare si solum isti duo musculi lædantur, dicendum est, affectionem primariam esse in origine neruorum prodeuntium à vertebra lumborum.

Sextum exemplum sympathiæ generis obseruatur inter calcaneos, & quartam vertebam lumborum: quia sæpè contingit, vt calcaneus non possit attolli causa existente circa quartam vertebam lumborum. Officium attollendi calcaneum pertinet ad tertium musculum pedis, ad primum, ad secundum & quartum: isti enim tres musculi recipiunt virtutem motricem à surculis quarti paris neruorum pedum: quādo igitur obseruabimus, quod omnes musculi, qui suscipiunt virtutem motricem ab eodem trunco, deficiant in suis officiis, nēpè musculus primus, tertius, quartus, & quintus tibiæ: similiter quintus femoris, & illi musculi qui flectunt digitos dicere poterimus, protopathiā esse in musculis lumborum: ex hac sympathia cognoscimus, quam imperiti sint medici, qui in anatomia non sunt versati, quia nesciunt mente concipere, quod symptoma in calcaneo proueniat à morbo existente in lumbis, in quibus non sunt quærellæ, nec vllum ægritudinis signum: Dogmatici tamen, & in anatomia periti statim cognoscent morbum specificum, quo cognito, remedio ex vsu artis & specifico sanitatem restituent ægrotanti applicando illud lumbis.

De exacta partium corporis nostri proportionem, hoc anno in publico venetorum Theatro Ioan. Baptista Dolconius senatus decreto electus ab Almo medicorum collegio ad legendam anatomen tam accuratè, & tam particulatim egit, vt mea sententia longè aliis quide hac partium analogia publicis monumentis confignarunt, excelleret, vt merito in hac publica ostensione in tanta auditorum frequentia summos applausus meritus sit.



Septimum exemplum est de sympathia inter spatia intercostalia, cubitum & digitos manus. Galenus 4. de loc. aff. citato proponit casum cuiusdam laborantis peripneumonia vehementi. In hoc ægrotante (ait) cubitum, & digitos manus habuisse difficultatem in sensu, & interdum in motu: aitque, has læsiones prodire à læsis nervis, qui sunt inter primum & secundum intercostale spatium: illi enim nervi oriuntur à spina, sed prius irrigant spatia intercostalia: deinde ad cubitos, & digitos descendunt: quorum aliqui per cutim excurrentes dant sensum: aliqui verò irrigantes ipsum musculum desunt in tendinem, & præbent motum. Qui applicant topica remedia digitis & cubito, exiitente primaria dispositione in origine, vel in spatiis intercostalibus, nihil boni agunt, & frustra vexant ægrotum: si verò applicant remedia, ubi est dispositio primaria, seu peropathia, tunc statim iuvant & languentem ad sanitatem perducunt.

Alia plura observari possunt exempla de sympathia generis, sicuti inter penem & nervos prodeuntes ab osse sacro: inter cerebrum & omnia viscera per nervos sexti paris, qui dant sensum cordi, pulmone, stomacho, hepatis, renibus: heni, vesicæ, & utero.

Pari modo eadem generis sympathia observatur per arterias, per venas, & alias partes: per arterias observatur inter lienem, & renes: sicuti in casu Bionis observata est ab Hippocrate 2. in sextum epid. tex. 27. Bion enim habens lienem tumidum multum minxit & statim liberatur, quod factum est per arteriarum furculos, qui emulgentibus arteriis inseruntur.

Observatur quoque eadem sympathia per musculos inter laryngem, & sternum: quia a summo sterno oritur musculus, qui inferitur in latera scutiformis. Hinc Hippocrates in prognosticis, & coacis prænot. de angina dicit ꝑ si rubet sternum esse salutare: ratio est, quia descendit per eundem musculum aliqua pars istius humoris qui suffocabat patientem.

Similiter per consensum aliarum partium, cuiusmodi est ille, qui inter renes & collum intestinum: quia per peritoneum renes, & collum unà adnectuntur: ideo Galenus 1. in 6. epid. comm. 5. habet ꝑ collum, & renes per peritoneum committuntur.

Quo ad sympathiam vicinitatis: omnia membra, & omnes aliæ partes participant partis vicinæ offensam: sicuti inter renes & diaphragma observatur: dum enim renes valde sunt læsi, aliqua observatur difficilis respiratio: quo casu sunt irritandi, qui utuntur remediis pectoralibus, siue expectorantibus: quia tunc pectus, pulmo & diaphragma ex se sani sunt.

Similiter inter hepar, & renem dextrum, quæ partes se tangunt: si abscessus fiat in rene dextro, vel in ipso rene sit aliquis lapis, faciliæ læditur iecur, & ex iccore læso febres suboriuntur.

Pari modo inter concavum hepatis & intestinum ieiunum, quæ partes se tangunt: si aliqua læsio sit in hoc intestino, statim per sympathiam vicinitatis læditur ipsum iecur. Hinc Galenus 5. de loc. aff. 7. ait, iecur facile affici posse per consensum ieiunij: causa est, quia ieiunum intestinum non solum est hepatis valde vicinum, sed habet tunicam prætenuem: unde utriusque passionis faciliæ se mutuo excipiunt.

Alias quamplurimas sympathias partium declaravimus in commenta-

riis nostris artis med. quæst. 60. & lib. 2. meth. nostræ vitandorum errorū, quas legere quisque poterit. Ecce quomodo sit omninò impossibile medicinam facere, remediaque specifica inuenire, nisi nos perueniamus ad specificam differentiam affectuum, quæ certè non potest haberi, nisi ex Galeno, Hippocrate, Auicenna, & ex Anatomia.

Insuper præter consensus, qui obseruantur inter partes viuentes, quos declarauimus, dantur quatuor consensus pertinentes ad causas antecedentes.

Primus consensus fit per partes continuas.

Secundus fit per vapores.

Tertius fit per humorum transumptionem factam per meatus insensibiles.

Quartus per humores excurrentes per meatus sensibiles vasorum ab vna ad aliam partem.

Quo ad consensum, qui fit per partes continuas, non per vapores, vel humores, sed per simplicem qualitatem. Galenus loquens de qualitate calida, quæ variis partibus sine corpore communicatur 3. de loc. aff. 7. his verbis illam declarat ¶ neruosis partibus inflammatis promptius, quam reliquis delirium superuenire solet, idque ascendente ad caput interdum per continuas partes toto calore: interdum verò spiritu vaporoso, vel fumofo, aut fuliginoso.

Ecce quod præter consensum factum inter vnā & aliam partem per vapores ipsos, datur quoque consensus per calorem sine vllō vapore: qui diffunditur per continuas partes: sicuti, si nerui stomachi incalescerent, vel refrigerarentur, cerebrum quoque calefieret, vel refrigeraretur per continuas partes, qui nerui stomachi sunt surculi sextæ coniugationis cerebri, qui sunt continui cum ipso cerebro.

Exemplum istius consensus, vel sympathiæ factæ per qualitates, quæ sine corpore communicantur per continuas partes, habemus in casu illius Iuuenis grammaticæ, qui, (vt refert Galenus 1. de loc. aff. 6.) ob læsionem oris ventriculi incidebat in epilepsiam, vel dum vehementer cogitaret, vel dum irascere-  
tur, vel dum inediā sustineret. Protopathia in illo Iuene erat in iecore, quia erat picrocholus: Idioopathia in ore ventriculi imbecillo: sympathia in cerebro, quia vsu panis cum vino albo modicè adstringente illic, ne incideret, verabat. Hoc exemplum potest reduci ad consensum factum per continuas partes, vel ad consensum factum per vapores.

Aliud exemplum de consensu per vapores proponitur à Galeno primo in sextum epid. com. 1. vbi dicit ¶ Ex vtero, vapores ascendere per vteri arterias per collum ab vna parte infundibuli sursum recta ascendentes, & dolorem efficientes in syncipite. Ecce quomodo caput lædi potest per consensum ab vtero per vapores.

Demum consensus cum omnibus corporis partibus fieri potest non solū per continuas partes, & per vapores, sed per transumptionem humorum omnium generum per meatus insensibiles: quæ transumptio sæpius fit summa cum medicorum admiratione: vnde merito Galenus 1. de facul. nat. cap. 13. erupit in hanc sententiam ¶ In corporibus esse conspiratum vnum, confluxumque vnum, ac omnia inter se mutuo affici.

Hinc



Hinc Hippocrates considerans sympathiam, quæ est inter iuncturas, & collum intestinum quarto in sextum epid. comm. 3. ait ¶ Dolente collo intestino, superueniente attritide melius habent: quia hæ duæ inflammationes mutuo se excipiunt.

Similiter hic consensus frequenter obseruatur inter iuncturas, & renes, de quo Hippocrates 4. aphorismorum 74. habet hunc aphorismum ¶ Quibus ad articulos factus est abscessus, si vrina fiat multa & crassa liberantur. Certè ex collo intestino ad iuncturas, & à iuncturis ad vasa vrinæ humores non possunt transmitti, nisi per transumptionem, quæ fit per meatus insensibiles, nullus enim in dictis partibus obseruatur meatus sensibilis, per quem humores excurrere possint à iuncturis ad vasa vrinæ.

Medici plebei incapaces huius mirabilis operationis naturæ, quæ per transumptionem fit, sæpè frustra vexant ægrum, sicuti euenit elapsis mēsis cui-dam insigni viro apostemate affecto circa primum musculum femoris prope meatum vrinarium, quo compresso vrina suppressa est: contigit, quod post paucos dies pus egrederetur per vrinam ob transumptionem puris. Medici & chirurgi nostrates vnanimis dicebant, pus lacerasse, & fregisse meatum vrinarium, licet patiens nullum persenserit dolorem, immo ex puris exitu maximum leuamen: concordēs tamen dixerunt, vt apostema ferro aperiretur, eo fine, ne pus maiorem plagam in meatu vrinarium inferret: quo peracto miserum, qui interuallo quinque vel sex dierum sine vilo alio remedio fuisset sanitati restitutus, per quinque menses multis aliis incisionibus, & medicamentis lacerarunt: Ecce quot mala perpetrentur non cognita transumptione.

De transumptione Galenus multis in locis mentionem facit: sicuti 5. meth. cap. 8. dum dicit, pus & sanguinem contentum inter thoracem, & pulmonē per transumptionem penetrare membranam obuoluentem pulmonem, & per tussim reici: quod probat Galenus hoc experimento, dum quæritur chirurgi, an vulnera thoracis penetrent vsque ad cauitatem, infundunt mulsam in vulnus, obseruantque an mulsæ dulcedo ad os patientis perueniat: quod si accidat, signum est, vulnus ad cauitatem thoracis penetrasse: mulsam verò per transumptionem pulmonem, & eius membranam transisse.

Insuper Galenus 7. aphor. comm. 15. ait, per transumptionem in adipēs partium corporis à calore colliquatos paulatim ferri in renes, & ad vrinæ vasa: subdit hæc verba ¶ Adipēs verò circa renes colliquati, transumptio ad vrinas celerrima est.

Præterea comm. 54. eiusdem sect. habet hæc ferè verba ¶ Hippocrates opinatur, naturam validam per angusta foramina materias maximè crassas per transumptionem euacuare: abscessumque fieri quoque in ossibus, quæ fracta occalluerunt, quorum meatus insensibiles sunt angustiores omnibus aliis reliquarum partium corporis. De eadem transumptione verba facit Galenus 6. de loc. aff. 4.

Sed obseruatur hæc transumptio quotidie in praxi: sicuti in pleuritide, dū supputatur: tunc exudat pus: licet nulla fiat pleuræ soluta vnitas: deinde in cauitate thoracis colligitur: mox per aliam transumptionem penetrat membranam pulmonis, & per tussim reicitur.

Pari modo catarrhus, qui certè fit extra venas: tamen per transumptionem colligitur interdum in venis: inde excurrere potest per vniuersum corpus. Casus Clozomenij ab Hippocrate propositus est notatu dignus. In ipso erant duæ parotides, quæ retrocesserunt, & inde per vrinam euacuabatur illa eadem materia puris, quæ faciebat parotides & liberatur. Ecce quam mirabiles transumptiones natura inuenit per vias omnino nobis occultas, per quas nos quotidie fieri transumptionem obseruamus.

Quo ad sympathiam, & cõsensum humorum, qui per affluxum sensibilem fiunt, animaduertere oportet illud, quod adinodum Auicennas prima primi cap. de temperamentis, an videlicet affectus conueniat alicui membro per essentiam, vel per affluxum per quem affluxum obseruantur consensus & sympathiæ: In primis igitur videndum est, an affectus conueniat alicui membro per essentiam.

Cognoscemus, affectum præter naturam conuenire per essentiam alicui parti per quatuor locos. Quorum primus est temporis diuturnitas.

Secundus est imbecillitas membri ante morbum: hic locus est Hippocratis 4. aphorif. 33. vbi dicit *¶* si ante morbum aliqua pars laborauerit, ibi mali sedes. Similiter aphorism. 39. eiusdem sec. habet, qua parte corporis inest calor, aut frigus, ibi morbus, supple per essentiam. Itidem aphorif. 38. quartæ sectionis habet *¶* Ex parte, quæ faciliè sudorem patitur, adueniente morbo, illa fit mali sedes.

Tertius locus est, quod ante illum morbum non præcesserit alius morbus alterius partis: quia in parte, quæ prius passa est morbum, vt plurimum est protopathia, & affectus per essentiam.

Quartus locus, quo cognoscimus morbum per essentiam, est, quod membrum intemperatum non habeat consensum cum alio membro magis intemperato. Quando igitur isti quatuor loci deficiunt, tunc ideæ morbi erunt in illo membro per affluxum, non per essentiam.

Quo pacto verò cognoscantur morbi per affluxum, sex sunt loci: quorum primus est, quod affluxus fiat à copia grauante, quod cognoscitur ex corporis plenitudine.

Secundus, quod fiat à qualitate irricante ipsam expultricem: de his duobus locis mentionem facit Galenus 3. de symp. causis 2. & alibi.

Tertius locus fit à frigido condensante exprimente ipsa excrementa extra suum locum: de quo loco Galenus 3. aphorif. comm. 12. inquit *¶* Frigus externum exprimit cerebri excrementa eo modo, quo manus spongiam aqua imbutam exprimere solet.

Quartus locus fit à calido liquefaciente, quod accidere solet, dum fluunt humores, qui ob magnum calorem liquefcunt.

Quintus locus indicans affluxum est ab imbecillitate retentricis partis mandantis: dum enim retentrix est abolita, vel diminuta, sponte fluunt excrementa in partem debiliorem. Hinc lienteria, diabete, & catarrhus lientericus ob hanc causam fieri solent. De hac Galenus 4. aphorif. 2. ait, *¶* euacuatio spontanea fit vel à natura, vel ab irritamento, vel quia vasa continere non possunt ob retentricem debilem partis mandantis: lib. verò de symp. differentiis sexto dicit, vteri profluuium fieri vel ob durescem, vel ab irritata expultrice, vel quia



quia sanguis sit serolus, quem vasa continere non possunt.

Sextus locus indicans humorum affluxum desumitur ab imbecillitate expultricis partis recipientis, quæ non possit ob imbecillitatem expellere aliarum partium excrementa: habet enim Galenus 3. de facul. nat. 13. hanc sententiam ¶ Pars robustior expellit excrementa in partem imbecilliore, donec omnium imbecillimam inueniat.

Prædicti sex modi euacuationis possunt reduci ad tres à Galeno propositos eodem 4. aphorif. 2. vbi ait ¶ Euacuationem spontaneam fieri ab aliqua ex tribus causis, nempe, vel à natura, vel ab irritamento, vel quia vasa humores continere non possunt. Ad irritamentum reducitur euacuatio facta à copia, vel qualitate irritante. Ad vasa, quæ non possunt continere, reducuntur quatuor alij propositi loci: quorum primus est à frigido condensante. Secundus à calido liquefaciente. Tertius ab imbecillitate retentricis partis mandantis. Quartus ab imbecillitate expultricis partis recipientis.

Ex his colligi potest, quomodo sympathiæ seu consensus efficiant affectus específicos per continuas partes, seu per vapores, seu per transumptionem, quæ sit per meatus nobis occultos, & quomodo morbi fiant per essentiam, & per affluxum humorum excurrentium per meatus apertos, quæ omnia nisi distinctè præcognoscantur actam erit de remediorum inuentione.

## CAP V T I V.

*De inuentione remediorum auferentium illos morbos específicos, qui reddunt sanguinem impurum.*

**H**Actenus egimus de affectibus específicos ipsorum: viscerum deinde de protopathiis, idiopathiis, & sympathiis. Restat ut in hoc cap. antequam agamus de humoribus, ut hæc duo consideremus: primum quomodo affectus in facto esse cognoscantur per symptomata. Secundum, quomodo cognoscantur illi específicos affectus, qui reddunt sanguinem impurum. In sequentibus capitibus verò agemus de cognitione locorum affectionum: de morbis in cōformatione, & præcipuè in cavitatibus; & tandem de morborum more, magnitudine, & de motu.

Quo ad primum, quomodo videlicet morbi per symptomata cognoscantur. Sciendum quod per symptomata primi ordinis, quæ sunt actiones læsæ: immediatè cognoscuntur morbi: actiones verò læsæ cognoscuntur per symptomata secundi ordinis, quæ sunt exeuntia mutata, retenta immodicè, & qualitates mutata. Actiones tamen læsæ solæ, & immediatè indicant remedium ex vfu artis, exempli causa videmus exeuntia, quæ excernuntur per aluum, esse mutata à naturali suo statu: tunc statim dicimus hæc exeuntia esse symptomata secundi ordinis: dicimus esse secundi ordinis, quia procedunt ab aliqua actione læsa, quæ pertinet ad symptomata primi ordinis: dicuntur enim symptomata primi ordinis, quia indicant immediatè morbum: ideo morbus definitur per actionem læsam. Valent igitur hæc consequentiæ, sunt exeuntia mutata, ergo retentrix, vel est diminuta, vel ablata: quia si retentrix retine-

ret, non apparent hęc mutata exeuntia. Deinde videndum est, an retentrix sit læsa per se, vel per accidens: vel vt dicit Galenus 3. de symp. causis in principio, quod actio lædi possit vel ob læsam facultatem, vel ob errorem externum: sed facultas non læditur: quia si senex haberet oculum iuuenis, videret, vt iuuenis: sed læditur instrumentum facultatis, quod est constitutio: exempli gratia, si fieret diarrhœa ob læsam cōstitutionem, à qua pendet retentrix, hæc constitutio esset vel intemperies valde humida, vel esset aliqua lenitas, ob quam fibrę retentrici destinatæ suo officio fungi non possent, vel esset aliquod vlcus, quod retentricem per se læderet: Galenus enim 4. aphorismorum 12. vult, lienteriam ab aliqua ex tribus causis prouenire posse, nempe vel ab intemperie intestinorum, vel ab vlcere, vel à retentricem ablata. Cum igitur alui fluxus non proueniat ab istis causis, à quibus lienteria producitur, sequitur quod retentrix sit læsa ob errorem externum, nempe ob bilem velicantem expultricem.

Hoc cognito, pari modo videndum est, an expultrix sit læsa per se, id est ob læsam constitutionem, vel ob errorem externum siue obiectum externum. Cum igitur appareat bilis in excretis, dicendum est, non expultricem per se esse læsam, sed per accidens, nempe ratione bilis genitæ in hepate ob alteratricem deprauatam: vel ab intemperie calida & sicca hepatis, vel ab humoribus adhærentibus p̄enchymati, sicuti dictum est superius. Ex hac Theoria colligimus in diarrhœa conuenire serum lactis, cassiam, suc cum cichorææ, & alia id genus, quæ iecur, & humores feruentes moderantur.

Hæc quæ dicta sunt de alui fluxu applicari possunt gonorrhœæ, catarrho iisque per vomitum excernuntur, vrinæ profluuio, sudoribus, & cæteris exeuntibus.

Si actiones sunt abolitæ resultant morbi valde frigidi: hinc Galenus 1. de symp. causis cap. 1. habet ¶ si ventriculus ob imbecillitatem nihil concoquat, vel sit lienteria, vel tympanites: si iecur nihil vel parum concoquat ob imbecillitatem sit ascites: si tertia coctio est abolita sit anasarca.

Quanti momenti sit hæc actionum læsarum cognitio, Galenus in praxi passim ostendit, per actiones videlicet morbos ipsos distingui. Exempla à Galeno plurima desumuntur, secundo enim aphor. comm. 45. loquens de differentia inter apoplexiam, & epilepsiam dicit per ipsas læsas actiones distingui: hæc sunt verba ¶ Epilepsiæ, & apoplexiæ idem est locus affectus, & id in humor: differentia est, quia epilepsia est motus deprauatus, apoplexia est ablatas.

Debitatio occurrit: quia non videtur, quod omnes morbi distinguantur per actiones læsas, vt dictum est: quia Galenus 3. epid. 3. comm. 45. dicit phrenitidem non differre ab insania, nisi per febrem: quia phrenitis est cum febre, insania verò sine febre: ergo phrenitis non distinguitur ab insania per actionem læsam.

Respondemus distingui insaniam à phrenitide per actionem læsam: licet in vtroque affectu sit vitiatas discursus. Resolutio difficultatis accipienda est ab Aristotele 3. de anima tex. 57. vbi habet, quod duplex sit imaginatio: alia est sensitua, & alia deliberatiua, quæ est illa, quæ format conceptum boni vel mali prosequendi vel fugiendi: hæc deliberatiua imaginatio in Theophi-



lo erat vitia: imaginabatur enim in angulo cubiculi esse tibicines, qui non aderant: quando igitur læsa est hæc imaginatio deliberatiua ex necessitate aliqua ex parte læditur discursus: hac ratione nulla est phrenitis, quæ primario, vel secundo non habeat læsum discursum. Pari modo in infania, dum læditur imaginatio deliberatiua est quoque læsus discursus: quare omnes morbi distinguuntur per actiones læsas, quatenus istæ læsæ actiones vario modo læduntur.

Si verò esset symptoma immodicè retentum, id reduci potest ad expultricem diminutam, vel ablatam. Simili modo dicendo, illam lædi, vel ob læsam constitutionem, vel ob errorem externum. Hinc Galenus 6. de loc. aff. 6. inquit *¶* retentricem in ægris fieri ob debilitatem expultricis, & expultricem ob debilitatem retentricis, & ob aliam dispositionem, quæ habet vim mouendi.

Tria enim sunt symptomata in actione. Primum vel est actio abolita, vel actio diminuta, vel actio deprauata: ita ut nulla sit actio in corpore viuente, quæ non lædi possit aliqua ex his tribus læsionibus: & quamuis Galenus 6. de loc. aff. 4. & 3. de symp. causis 2. loquens de symptomatibus vrinæ dixerit, dari solum stranguariam, & ishuriam, & nihil dicat de dyiuria, nõ propterea est diminutus: quia dyiuria ex Galeno 7. aphorismorum 48. duo significat, videlicet ardorem, & difficultatem: quando significat ardorem reducitur ad stranguariam: quando verò significat difficultatem reducitur ad ishuriam, videlicet ad ablatam, vel suppressam meiendi facultatem integrè, vel imperfectè læsam: ita ut ablata actio meiendi, & diminuta reducatur ad ishuriam, deprauata verò ad stranguariam. Ex hac methodo desumpta à symptomatibus propositis quisque colligere poterit specifica indicantia, quæ sunt illa, quæ indicant remedia ex vñ.

Quo ad secundum, quomodo videlicet & propter quos morbos fiat sanguinis in puritas: sciendum, sanguinem ab ipso iecore statim genitum esse valde impurum: ideo à natura fabricata sunt tria organa iuxta iecur, quæ sanguinem expurgant, illumque reddunt puriorem. Hæc tria organa sunt vesica fellea, renes, & lien: sicuti Galenus lib. de atra bile cap. 8. animaduertit, ubi inquit *¶* Vesicam vtramque factam esse à natura, vt sanguinem expurget: altera quæ est vesica fellea expurgat sanguinem à biliolo humore: altera verò renum ministerio à seroso humore: deinde lien sanguinem expurgat à melancholia. Hinc Galenus 4. de Vñ Paj. dicit lienem esse instrumentum, quod purgat limosos, crassos, & melancholicos succos, qui sunt in sanguine.

Dum igitur sanguis relinquatur impurus, vel quia vesica fellea, vel renes, vel lien in suo officio obeundo deficiant, nunquam inueniemus remedium, nisi ante oculos obiciamus omnes affectus dictorum organorum, illòque eo vsque diuidamus, donec ad specificum descendamus: sicuti fecit Galenus 5. de loc. aff. 7. ubi docet, sanguinem relinqui impurum ob quatuor morbos vesicæ felleæ. Quorum primum dicit esse vesiculæ obstructionem. Secundum esse nimiam vesiculæ plenitudinem, ob quam expultrix nec bilem expellere, nec attrahere potest. Tertium aff. ctum esse dum vesicula ob imbecillitatem non attrahit. Quartum quia ob imbecillitatem bilem non expellat. Notan-

quoniam est per imbecillitatem Galenum intelligere omnem intemperiem. Ad-  
dimus iecur (ut dicit Auicenna doctrina quarta) demandare bilem, seu ex-  
pellere in vesiculam, ita ut possit contingere, quod fiat icteritia ob defectum  
expultricis iecoris, quia non sufficit ut attrahatur, nisi quoque demandetur.  
Hæc igitur indicantia specifica sunt illa, quæ indicant remedia expurgantia i-  
psum sanguinem, si ratione affectus ipsius vesiculæ factus sit impurus.

Intemperies ergo, ob quam vesicula fellea non attrahat, est in fibris rectis;  
quia attractio semper fit per fibras rectas. Hæc attractio augetur vi caloris. Du-  
igitur est diminuta, vel ablata attractrix, id fieri potest ob intemperiem frigi-  
dum. Hæc ratione Galenus 2. aphorism. comm. 20. dicit, hepar minus attrahere  
ob refrigerationem, sicuti enim retentrix per moderatam refrigerationem ro-  
boratur, sic attrahitrix, vel expultrix diminuitur.

Intemperies verò ob quam vesica fellea non expellat continetur in fibris  
transuersis, atque est frigida intemperies: expultrix enim fit ratione caloris ir-  
ritantis. Expultrix facultas ex Galeno 2. de symp. causis quarto & quinto cap.  
expulit particulis ipsis sese contrahentibus, ac cōstringentibus, fugientibus-  
que acrimoniam ad instar hirudinis, quæ sale perfusa se contrahit, & contra-  
hendo sanguinem euomit.

Similiter de splene dicendum est, quod ob quatuor affectus non fungatur  
suo officio, unde sanguinis impuritas fit. Primus est, dum splen non expellit:  
quia fit valde plenus. Secundus quia sit obstructus. Tertius quia ob frigidam  
intemperiem non attrahat melancholiam: quia non attracta transmittitur per  
vniuersum corpus: hinc splenis morbum cognoscimus: dicit Galenus 6. de loc.  
aff. 1. ex eo, quia cutis fiat nigrior. Quartus affectus splenis est, dum non expel-  
lit ob refrigerationem comparatam ab usu frigidorum: quo casu splen durus  
conseruatur.

Quod verò attrahitrix in splene diminueatur, & internum destruat ob fri-  
gidityatem, Galenus nos docet 2. aphorism. comm. 20. ubi inquit, iecur minus  
attrahere ob frigiditatem, idem dicere possumus de liene: qui videlicet ob fri-  
gidityatem minus adhuc attrahat: nulla sanè est potentior causa, quod lien æ-  
groter, quam usus rerum frigidarum, ob quem usum nec virtus expultricis, nec  
attrahitrix suum exercent officium, unde ab hac præcipua causa oritur sangui-  
nis impuritas.

Pari modo renes ob quatuor affectus non exercent suum officium attra-  
hendi ipsum serum. Primus est, quia renes sunt repleti arenulis, vel lapillis. Se-  
cundus, quia sunt obstructi. Tertius, quia sunt imbecilles, id est, facti frigidio-  
res. Quartus ob eandem frigiditatem in expellendo deficient.

Hinc Galenus 3. de causis symp. cap. 2. loquens de renum imbecillitate in-  
quit: dum renes sunt adeo imbecilles, ut non attrahant, de repente fit hydrops:  
ideo cautè incedendum est in refrigerandis renibus, quia renes ex Galeno &  
Auicenna prima primi sunt propè frigidorum seriem. Unde fit ut Galenus 13.  
meth. 16. dicat faciliè incidere in aliquam scirrholam dispositionem. Ecce  
quam incautè medici vulgares in his qui habeat renes sua natura frigidiores,  
& qui nephriticis passionibus corripiuntur, vrantur aquis frigidis sponte na-  
scentibus, vel destillatis, vel copioso sero lactis: dicimus, incautè: quia adeo



renes refrigerantur, vt deinde in lithiasim, & alios prauos affectus facillimè labantur.

## CAPVT V.

*De remediorum inuentione desumpta à locis affectis.*

**H**Actenus declarauimus, quomodo specificæ omnium partium intemperaturæ dignosci possint, & quomodo remedia specifica inde colligantur. Restat antequam agamus de magnitudine, more, & motu, & de morbis in mala conformatione, vt agamus de locis affectis: quia illis cognitis, & remedia, & ipsorum rectum vltum facilius dignoscemus.

Hæc duo in hoc cap. considerabimus. Primum proponemus locos indicantes partem aliquam esse læsam. Secundum quomodo sanitas partium corporis sit conseruanda.

Quo ad primum: Galenus 1. de loc. aff. 5. & 2. de loc. aff. 9. proponit quinque locos indicantes partem aliquam corporis esse læsam, quorum primum desumit ab actione læsa, secundum ab excrementis, tertium à situ læsionis: quantum à doloris proprietate: quintum à propriis accidentibus.

Insuper præter quinque locos iudicantes partes affectas, tres alios colligere possumus ex Hippocrate quorum primus proponitur aphorismo 33. quartæ sect. dum dicit *¶* Si qua ante morbum pars laborauerit, ibi mali sedes. Secundus proponitur aphorismo 38. eiusdem sect. dum dicit, *¶* qua corporis parte sudor, ibi morbus. Tertius locus desumitur ab aphorismo 39. eiusdem sect. qui est *¶* Et qua parte corporis inest calor, aut frigus, ibi morbus: ita vt loci indicantes partes læsas sint nouem, videlicet actio læsa, excrementa mutata, situs læsionis, proprietas doloris, propria accidentia, labor alicuius partis antequam morbus adueniat, sudor alicuius partis, calor & frigus insolitus alicuius partis.

Quo ad primum locum indicantem partem aliquam corporis esse læsam desumptum ab actione læsa: hoc vnum est considerandum, quod actio læsa indicet affectum præter naturam, vel esse in aliqua parte, vel in aliquo principio, vnde pendet virtus illius partis. Vel dicimus actionem læsam indicare affectum primarium illius partis, vel affectum primarium extra partem.

Galenus proponit duos casus, ex quibus colligere possumus, an actio læsa indicet affectum esse in vna parte, vel in principio extra partem.

Primus casus legitur 1. de loc. aff. 6. vbi Galenus inquit, ob aquam frigidam in piscatore ablatum esse officium musculi sphincteris ani, & velicæ, nulla existente alia læsione extra istum muscolum: in tali casu solum caloricis musculi affectio tollitur: dum verò læsus est musculus sphincter: quia non in ipso, sed extra ipsum sit primaria affectio, in spina videlicet: tunc ad spinam confugiendum est. Cognoscimus læsionem prouenire à spina, si multi musculi in suo obeundo officio deficient: quia à spina multi nervi oriuntur, qui dant sensum, & motum variis musculis: quare si viderimus quod plura officia musculorum deficient, dicemus à spina affectum prouenire: si verò videri-

mus solum officium musculi sphincteris deficere, dicemus, non à spina oriri affectum, sed solum à sphinctere refrigerato, vel alio modo læso.

Secundus casus proponitur à Galeno 4. de loc. aff. 2. de læsione linguæ, vbi inquit, si vna pars linguæ sit læsa, alia manente illæsa, primaria affectio est in neruo linguæ & non extra linguam: si verò vtraque linguæ pars sit læsa, tunc cerebrum, à quo pendent nerui, potest esse primariò affectum: quare pro cognoscenda parte affecta non sufficit, vt obiteruemus actionem læsam: sed videre oportet, an affectio primariò sit læsa in principio, à quo pendet virtus, quæ illi parti communicatur, vel solum sit in parte affecta.

Idem obseruauit Galenus 2. de loc. aff. 6. in casu Pausaniæ, in quo actio læsa apparebat in tribus digitis manus, qui sensum amiserant: tamen locus primariò affectus erat in ceruice, à qua pendent nerui, qui dant sensum digitis: ideo adhibitis remediis ceruici statim à Galeno fuit sanitas restituta.

Similiter Galeno 4. de loc. aff. 4. proponit duos casus, in quibus actio læsa apparebat in vna parte: moribus verò in alia longè diuersa. Primus est de homine ambulante sub pluuiâ, & vento impetuoso, qui amisit sensum perieraneæ ob refrigerationem introductam ceruici à pallio madefacto circa ceruicem. Medici parum versati in anatome calefacientibus frustra tractabant pericraneum, vt sensum reuocarent: Galenus verò, applicitis calefacientibus ceruici, à qua oriuntur nerui præbentes sensum pericraneco, statim restituit sensum pericraneco. Ecce quomodo labantur in errata medici, qui non intelligunt anatomen.

Secundus casus, quem proponit Galenus, est de quodam homine, in quo vtrumque crus erat resolutum: vidit Galenus primariam affectionem esse in lumbis, à quorum vertebris oriuntur nerui, qui dant motum ipsis cruribus: ideo adaptatis remediis lumbis, illum celeriter sanauit.

Præterea non solum in facultate animali pars primariò affecta sæpè distat à parte, cuius actio læsa est: sed etiam id euenire potest in facultate naturali: sufficiat illud exemplum de delirio, quod proponit Galenus 3. de loc. aff. 7. vbi inquit, delirium fieri: vel quia à ventriculo ad caput ascendat vapor vaporosus, vel fumosus: vel quia à ventriculo ad caput non per vapores, sed solum per continuitatem partium solus calor sine vlllo spiritu corporeo excurrat: dum igitur læsus est neruus oris ventriculi, qui pertinet ad sextum par neruorum cerebri: læsio illius nerui absque eo quod ascendat vapor propter nerui continuitatem interdum communicatur sexto pari, & ipsi cerebro, vnde delirium.

Insuper accidere potest, quod læso neruo oris ventriculi eadem læsio communicetur trunco sexti paris, & à trunco eadem communicetur omnibus suis propaginibus, quæ præbent sensum cordi, pulmoni, hepati, spleni, renibus, vtero, & vesicæ nullo existente in prædictis visceribus, morbo in facto esse, sed solum in fieri: Ecce quomodo ablata stomachi ægritudine auferri possit statim mala viscerum dispositio, dum solum est in fieri, pendetque ab alia, vt vmbra à corpore.

Neque est mirum, quod idem neruus, in variis partibus insertus edat varia & aliquando contraria officia: quia de ratione nerui est solum facultatem deferre, qua demandata, varia resultant officia, prout partes ad varia munera sunt destinatae:



destinata: dicimus neruum aliquando edere contraria officia: sicuti apparet in neruo colli vesicæ & neruo corporis vesicæ, qui nerui ab eadem propagine oriuntur, neruus colli vesicæ inseruit pro expellenda vrina: nerui vero corporis vesicæ pro ipsa retinenda. Hinc Galenus 6. de loc. aff. 4. habet hanc sententiam *¶* resolutis neruis muscoli colli vesicæ fit vrinæ incontinentia: resolutis neruis corporis vesicæ fit vrinæ suppressio.

Idem quod diximus de facultate animali dici potest de vitali: quæ pariter in instanti transmittitur per vniuersum corpus: itaut affectus possit esse primariò in corde, & actio læsa in parte longè diuersa.

Norandum tamen est, quod actio læsa potest primariò indicare humores peccantes, secundariò partes solidas: id colligitur ex Galeno 7. meth. 12. vbi loquens de ventriculo dicit tripliciter lædi, vel dum solida pars ventriculi intemperie laborat, vel dum mali succi ventriculo sunt affixi, vel dum in interno sinu mali humores continentur. Ecce quod non semper actio læsa primariò indicat solidas partes esse læsas. Hæc distinctio de ventriculo potest applicari omnibus partibus læsis, quod scilicet actio læsa proueniat vel ab intemperie solidarum partium, vel ab humoribus affixis, vel ab humoribus in cavitatibus existentibus.

Distinguiamus actionem læsam indicantem temperaturam solidæ partis ab actione læsa indicante humores peccantes per locos propositos in cap. superiori, quibus distinguiamus protopathiam, idiopathiam, & sympthiam.

Hinc sæpè contingit, quod in ventriculi cavitatibus confluant humores prauisano ventriculo existente, vel à liene, vel ab ipso hepate, vel à capite. Pari modo accidere solet, quod alimenta prauisucci non digerantur: atque sic indigesta lædant ventriculum sua natura sanum.

Similiter dicimus de ipso hepate, quod licet sanum sit, malè habeat propter errata primæ concoctionis.

Præterea dum aliqua pars apostemate est obsecssa, læsio non est in ipsa parte, sed in ipsis humoribus efficiantibus ipsum apostema: ideo Galenus 3. de temperamentis cap. 5. & 13. meth. cap. 8. habet, dum pars aliqua est inflammata, dum euacuatur, vel per pus, vel alio modo ipsa materia: tunc sine vlllo remedio statim succedit refrigeratio partis, quæ erat apostemate obsecssa: quare actio læsa partis apostemate affectæ nõ indicat partem solidam esse læsam, sed humores ipsos qui faciunt apostema. Valeant igitur medici Plebei qui in parte inflammata hauriunt indicationem refrigerandi partem læsam, cum dicat Galenus locis citatis, quod statim euacuata parte excrementis succedat partis refrigeratio, absque eo quod remedium refrigerans debeat applicari.

Denique colligimus ex Galeno aliis in locis, actionem lædi modò ab humoribus, modò à parte solida. Hinc 2. de temp. cap. 2. loquens de senum temperatura ait, senes quo ad solida esse siccos, quo ad excrementa humidos. Pari modo hydropici quo ad solida sunt sicci, quo ad excrementa sunt humidi. Hinc est quod Galenus 2. de temperamentis vlt. dicat catarrhum fieri quoque posse ab intemperie sicca solidæ partis ipsius cerebri, itaut actio modò lædatur ab intemperie excrementorum: modò ab intemperie solidæ partis: modò ab vtraque. Simili modo Galenus octauo de comp. med. per locos septimo loquens de hepate dicit dari duas intemperaturas: vnam in paren-

chymate, aliam in materia contenta in venis & arteriis, & spatiis: Hæc omnia possunt applicari omnibus partibus, quare dum ex actione læsa volumus colligere affectum & locum affectum, debent præcedere omnes supradictæ præmeditationes.

Accedit præter ea quæ dicta sunt de actione læsa, quod diligenter videndum sit an actio læsa indicet totum membrum esse læsum, vel solum aliquam partem: quia si totum membrum uniformiter & æqualiter sit læsum, actum est de curatione & de vita: ratio est, quia quilibet affectus præter naturam alicuius membri si debeat tolli, tollitur à parte magis sana illius membri: quia pars sana sola (non spreto medici auxilio) est opifex sanitatis. Id colligitur ex Galeno 4. meth. cap. 1. & in arte parua cap. 90. Præterea est D. Thomas Philosophus præstantissimus, qui secundo de anima comm. 58. inquit, quod sanitas redditur alicui parti à parte sana: quia sanitas est opifex sanitatis: neque satis est, quod cor sanum sit, nisi caro membri sana sit secundum aliquam partem: quia ex Galeno 4. de Vlu P. cap. 12. caro propria iecoris, cordis, vel aliorum viscerum est auctor actionis: idcirco credimus nos si de iecore loquamur, quod si totum iecur æqualiter sit intemperatum, actum sit de vita: quia deficit sanitatis, & actionis opifex, qui residet in propria carne. Hinc membra læsa, quæ sanari possunt, non sunt læsa secundum totum, seu secundum omnes partes, sed secundum aliquas tantum.

Hinc factum est quod Galenus 2. de loc. aff. 7. dicat *¶* sinam partem iecoris refrigerari per consensum ventriculi, intestinorum, & maximè causa ieiunij, & mesentericarum venarum: gibbam verò per consensum pulmonis, septi, aut renum: quare dum vna pars est læsa, altera, si debet sanari, debet esse illa læsa.

Quo pacto verò cognoscatur actio læsa gibbæ, vel causæ partis iecoris, Galenus in casu mulieris decumbentis apud Pantimidem docet hæc modo *¶* si vrina est viciata, affectus præter naturam est in gibba: si alui excrementa sint vitiosa, affectus est in sima, seu in causæ parte ipsius hepatis. Sic Galenus sibi consentiens 13. meth. 15. dicit concauam iecoris partem per aluum: gibbam verò per ea quæ modicæ mouent vrinæ, sanari.

Pari modo actio cerebri læsa modò ostendit cerebrum primariò esse læsum: modò per consensum, vt docet Galenus 2. de diff. feb. ultimo dum dicit, caput lædi, vel per se, vel sanguine viciato. Idem omnibus membris applicari potest, quod membrum quodlibet possit esse læsum vel per se, vel sanguine viciato, sed hæc omnia facile possunt dignosci per methodum superius traditam.

Demum obseruandum est, an actio læsa sit valde abolita: quia in quauis actione omninò abolita actio nullo remedio amplius restitui potest: ideo si illa pars læsa ad vitam sit necessaria, procul dubio ægri moriuntur: sicut obseruauit Hippocrates & ipse Galenus 9. epid. 8. tex. comm. ultimo in Phetusa & Nemisia, in quibus menses adeo erant suppressi, vt hæc vteri actio esset omninò abolita: ita vt Hippocrates tentando illos promouere, Phetusam & Nemisiam interfecerit.

Quo ad situm, per quem pars affecta dignoscitur: si pars affecta fuerit interna, certè sine cognitione anatomes non percipietur. Ipseque Galenus qui in  
brat. o-



brutorum anatome fuit versatissimus, non semel in præcognoscendis locis affectis internis deceptus est: causa fortasse est, quia ei non licuit secare humana cadauera, vnde fit, quod vbi interne partes humani corporis sunt situ seu positione diuersæ à brutorum partibus, aliquando fuerit hallucinatus: sicuti dum putabat, emulgentem dextram, & renem dextrum esse altiore sinistro, quod interdum in brutis conceditur, sed non in hominibus. Pari modo de situ ventriculi fallitur Galenus, dum dicit 4. de Vsu P. 7. ventriculum magis esse in dextro, quam in sinistro latere.

Ex situ seu positione partium internarum non percepta, multa mala ægris interuntur, præcipuè in topicorum vel vnguentorum applicatione, & in remediis per os assumptis: exempli causa sub mucronata cartilagine medici vulgares existimant statim esse os ventriculi, tamen ibi est iecoris lobus: Dū igitur volunt os ventriculi calefacientibus corroborare, ipsis non aduertentibus calefaciunt iecur, quod & febrem intendere & mortem inferre potest. Ecce quanti momenti est consideratio ipsius situs, quo ignorato medicamentum alioquin saluberrimum hominem interimere valet.

Præterea ex situ dignoscimus, quomodo corpora sint euacuanda: exempli causa, si materia peccans sit in parte caua iecoris, vel in intestinis, solum conueniunt euacuantia per aluum, non per vomitum: si in ventriculo, vomitoria, & lenientia. Hinc Galenus 7. meth. vlt. ait, ventriculus deiectione & vomitu, intestina verò & caua iecoris solum deiectione euacuantur. Similiter Galenus 4. aphor. 2. inquit materiam contentam in intestinis per vomitum non esse expurgandam. Valeant igitur illi, qui dum materia est in intestinis, vomitoriis tentant illam euacuare.

Accedit, quod Galenus & Hippocrates 4. aphorismorum 8. non admittunt obnoxios phthisi per vomitum esse expurgandos. Præterea digna consideratione est illa Hippocratis & Galeni animaduersio 4. acutorum 104. quod si in ipso ventriculo sit bilis arida non per vomitum esse euacuandam, sed per inferiora, ne os ventriculi ob bilis morsum incidat in syncopem.

Si verò excrementa sint in iecoris gibba, vel in renibus euacuanda sunt per vrinam, vt docet Galenus 2. ad Glauc. 2. sed hac distinctione proposita ab ipso Galeno 7. meth. cap. vlt. quod si renes multo vitioso succo abundant per cathartica purgandum: si mediocri per vrinam: quare si renes & gibba iecoris multo vitioso sacco abundant, nullo pacto per vrinam euacuandum: quia pulla materia in vasa per exigua renum, fieret ibi infarctus, qui esset causa lithiasis, & aliorum symptomatum: ideo tunc per cathartica est purgandum: deinde facta purgatione per aluum, & per vrinam est euacuandum.

Denum si affectus est in thorace, per sputa, & non per vrinam, vel per aluum iudicatur morbus, vt in Pythione, qui liberatur morbo thoracis per sputa cocta, licet tunc vrinæ in ipso essent tenues, & crudæ. Immo si affectibus thoracis superueniat alui fluxus, semper est malum signum, si credendum est Hippocrati 6. aphorismorum 16. vbi inquit *¶* Alui fluxus superueniens pleuritidi, malum.

Galenus in comm. reddit hanc rationem cur sit malum: quia ostendit iecur quoque esse læsum. Concedimus tamen, si corpus sit valde plenum, si mper prius esse euacuandum: quia nullus morbus particularis sanari potest, nisi ple-

nitudo diminuatur, qua diminuta, ad particularia remedia est confugiendum. Cauendum tamen est in euacuatione excrementorum, quæ stabulantur in thorace, quia hæc per pharmaca vel sanguinis missionem, vel per diuretica nõ possunt auferri: Galenus enim s. simpl. c. 13. loquens de phtisi maximè damnat diuretica: quia (vt ait) aduersantur expuitioni puris: aduersantur, quia per diuretica cogitur materia quæ solum per tussim potest excerni: ratio est, quia materia quæ est in thorace per diuretica destituitur parte ichorosa, quæ reddit materiam minus crassam: quare si diuretica non cõueniunt in affectibus thoracis, tanto minus conuenient purgantia, & illa præcipuè, quæ adimunt serositates: sic phlebotomia non existente plenitudine, quæ & serositates, & vires exhaurire solet, damnanda est. Sed quamplurima alia exempla præter hæc à nobis proposita, & ab ipso Galeno 2. ad Glauc. cap. 2. & in methodo medendi, vbi agit de euacuatione, colligenda ex partium situ inueniri possunt.

Ab excrementis mutatis, vel retentis locus affectus innotescet, præcipuè si actio læsa, & situs læsionis non obstiterint. Si loquamur de bile, quæ excernitur per aluum vel per vomitum, bilis indicat iecur esse læsum: si de melancholia lieni, si pituita plus iusto excernitur, ventriculus, vel cerebrum læditur. Si verò sanguis per aluum sit euacuatus, & fecibus permixtus, signum est intestina tenuia, vel iecur esse læsum: si sanguis non sit permixtus, indicatur intestinum rectum, vel hæmorrhoides pati hæmorrhagiam. Præterea sanguis si cum tussi excernatur, & neque concretus, neque spumofus sit, indicat caput esse læsum: indeque effluere in pectus. Si verò est concretus, & spumofus indicat læsionem pulmonis: Galenus s. meth. cap. 8. proponit signa sanguinis fluentis à capite, & à pulmone.

Quo ad pus, dicimus, si per vrinam euacuatur, & fœtidum sit, signum esse vesicam, seu partes vicinas esse læsas: si vero careat fœtore renes, vel alias partes superiores esse læsas.

Denique excrementa, quæ efficiunt morbum, indicant locum affectum: Hippocrates 6. aphorismorum 21. ait ¶ si hæmorrhoides insanix superueniãt sit insanix solutio. Galenus in comm. explicat aphorismum esse verum de insanix facta ab humore melancholico: quare si per hæmorrhoides nigra non deiciantur certi insanix non tolletur: quia indicant esse insanix superadditum alium morbum.

A doloris proprietate desumitur locus affectus: sic pungitiuus dolor indicat læsam esse membranam, eamque læsionem effici à bile vel flatu, ratio est quia sola bilis & flatus possunt penetrare membranas, & penetrando puncturas efficere. Hinc est quod dolores pungitiui fieri non possunt à sanguine, pituita, vel melancholia: quia membranæ sunt adeo densæ, vt solum à bile, vel flatu penetrari possint. Hinc Hippocrates 6. aphorismorum 33. proponit hunc aphorismum ¶ Qui acidum eructant raro fiunt pleuritici: quia qui acidum eructant sunt pituitosi, & pituita est crassa, & vt talis raro penetrat membranam: & per consequens non pungit.

Dixit raro fiunt pleuritici: quia cum pituita potest coniungi bilis, vel flatus, qui efficiant puncturas, & pleuritidem.

Similiter laceratiuus dolor propriè conuenit carni: quia caro habet fibras, & nervos subtiles non ita unitos, vt membranas: idèd facilè à causa soluente  
continuu m



continuum in carne lacerantur, vnde fit laceratiuus dolor.

Idem dolor conuulsiuus conuenit neruis, & tendinibus: quia in his filamenta neruea sunt adeo vnita, vt non lacerentur: sed contrahantur ad suum principium, quod loco dimouetur, vel extra situm pellitur: vnde si conuulsio perueniat ad cerebrum, sequitur mors, dicimus ad cerebrum, quia nerui oriuntur à cerebro, & non à corde, vt putat Aristoteles: Erasistratus enim referente Galeno 7. de plac. longo temporis cursu securus est in hac re Aristotelem, tamen senior factus mutauit opinionem, & à cerebro, & non à corde neruos exordiri asserbat.

Dolor verò pulsatiuus fit, vbi sunt arteriæ: vbi enim non sunt arteriæ dolor pulsatiuus fieri non potest. Hinc Galenus 2. de loc. aff. 3. admonet in pleuræ, & pulmonis inflammatione non fieri dolorem pulsatiuum: in pulmone non fieri dolorem, quia caret arteriis. Similiter in pleura non fit dolor pulsatiuus, quia caret arteriis.

Grauius dolor conuenit partibus sensu destitutis, cuiusmodi sunt caro cerebri, cordis, pulmonis, iecoris, splenis & renum: horum enim viscerum caro est omnino sensu priuata.

Dolor contusiuius præsentitur in ossibus ratione periostij, non ratione ossium: quia ossa non sentiunt.

Dolor perforatiuus aliquantulum differt à pungitiuo. Pungitiuus conuenit membranæ tenui: perforatiuus crassæ, cuiusmodi sunt membranæ colli intestini, in qua fiunt dolores vehementes, qui in tenuiori membrana neutiquam fieri possunt.

Ratio proponitur à Galeno 6. de loc. aff. 2. vbi dicit dolores vehementes non fieri in tenuibus intestinis, quia ob tenuitatem tunicæ causa doloris facile egreditur, & euanesceat. Idem reperit Galenus 2. de loc. aff. 5. ibi enim, inquit, in tenuibus intestinis non fieri dolores vehementes.

Eadem ratione motus Galenus ob tenuitatem tunicæ asperæ arteriæ, ait, inflammationem asperæ arteriæ strangulationem facere non posse, non solum quia meatus maximus est, sed ob tenuitatem tunicæ œsophagi, quæ secundum partem internam ocludit asperam arteriam.

A propriis accidentibus desumitur locus affectus: sic propria accidentia, quæ indicant vtrum esse læsum, ex Galeno sunt hysteriæ passionibus, quæ solum in mulieribus, & non in viris obseruantur. Sic Galenus 1. ad Glauc. cap. 14. inquit, vteri suffocationi præcedere lipothymiam: lipothymia igitur, quæ præcedere solet strangulationi inter propria accidentia connumeratur.

Sic dum circa oculos est aliquis dolor, si oleum, quod reuera est anodinū in omnibus aliis partibus, oculis noceat, non erit mirandum, quia oculorum dolor factus ab oleo inter propria oculorum accidentia numeratur: Galenus enim lib. de opt. sect. cap. 9. dicit oleum oculis nocere, aliis verò partibus inflammatis esse vtile, & sedans dolorem.

Sic quælibet corporis pars in variis indiuiduis varia fert accidentia. Alij enim sunt qui maxime læduntur ab odore rosarum, alij ab esu casei, alij à brasiis, alij ab aliis rebus.

Quare obseruandæ sunt, & partium & indiuiduorum proprietates, vt locus affectus dignoscatur. Sic propria accidentia neruorum vesicæ lætæ, &

neruorum colli vesicæ varia sunt. Galenus enim vt ostendat hanc differentiam 6. de loc. aff. 4. inquit, resolutis neruis corporis vesicæ sequi vrinæ suppressionem, resolutis verò neruis colli vesicæ sequi vrinæ incontinentiam, & non suppressionem, quæ accidentia non solum sunt diuersa, sed contraria.

Pari modo resolutis neruis abdominis fit alui suppressio. Resolutis verò neruis sphincteris fit fæcum incontinentia: sicuti Galenus 4. de loc. aff. 4. obseruauit in famoso illo casu piscatoris, qui ob morā in aqua frigida resolutis neruis vtriusque sphincteris, videlicet vesicæ, & ani, inde incontinentia, & fæcum, & vrinæ secuta est.

Similiter in pleuritide accidentia propria obseruantur, quæ sunt dolor, qui peruenit ad clauiculam, vel ad hypocondrium: quæ accidentia, nisi adsint, legitima pleuritis esse non potest: Galenus enim 6. aphorismorum comm. 5. reliquit nobis de pleuritide præceptum pulcherrimum, obseruandum in cognitione & curatione pleuritidis: his ferè verbis ¶ Si dolor in pleuritide, neque ad clauiculam, neque ad hypocondrium perueniat, nec purgationem, nec venæ sectionem excogitabis: reddit rationem: quia dolor ille erit in partibus carnosissimis, vbi nullum subest periculum. Valeant ergo qui in omni pleuritide sanguinem, vel medicamentum ægris præscribunt.

Pari modo si de neruis loquamur in eorum punctura obseruantur propria accidentia, veluti dum medicus aliquis Plebeus, quorum numerus his temporibus est maximus, vtatur emplastro ex farina, lacte, & similibus, tunc enim fiunt conuulsiones, quæ adeo nocent, vt interimant: Galenus enim 6. meth. cap. 2. refert quosdam medicos tractasse ægrum punctura nerui affectum cum emplastro ex farina, & similibus, & hoc remedio patientem in septem diebus iugulasse: punctura enim non est occludenda: ideo emplastica interimunt: proponit tamen in punctura Galenus terebenthinam, & casu quo habitus ægrotum sit densus & firmus terebenthinæ, pauxillum euphorbij permiscet, vt conseruetur punctura aperta.

Præcognita parte affecta ex actione læsa, ex situ, excrementis, ex doloris proprietate, & ex propriis accidentibus, statim se offert, vt quomodo pars affecta sit conseruanda, ac tuenda, quia ab alia causa affectus præter naturam non tollitur, quàm à salubritate partis affectæ. Ostensum est à Galeno naturam partis esse sanitatis opificem. Hinc 4. meth. cap. 1. ait ¶ nisi caro subiecta sana sit, nec vlcus, nec vulnus sanari potest. Idem confirmat in arte parua, cap. 90. Hinc Galenus 5. simp. 9. & 3. meth. 5. loquens de remediis, quæ conueniunt, parti affectæ, vt citò superetur eius affectus præter naturam, ait ¶ pus mouētia debere conuenire cum temperatura partis læsæ, quia remedium quod pus mouet in vna parte non mouet pus in alia: sic oleum relatum in carne læsa reprimat: in cerebro vero læso non reprimat, sed potius concoquit & suppurat.

Pars affecta tribus modis conseruari potest. Primò non trahendo excrementa ad ipsam partem, sed potius reuellēdo: hoc admonet Galenus 13. meth. cap. 11. vbi ait ad partem excrementa non esse trahenda: subdit si renes & vesica laborent, diuretica sunt fugienda: si (ait) si vterus laborat, menses non sunt mouendi: quia longe gissimè à parte affecta est reuellendum. O quoties in vtero inflammato medici vulgares interimunt mulieres iis quæ mouent menses, quia



quia maximè augendo inflammationem, ipsas occidunt.

Præterea valde lædunt, dum trahunt excrementa ad partem affectam vsu balnei. Hinc Galenus 12. meth. 3. de balneo habet hæc *¶* balneum calidum aquæ dulcis colliquat humores, illosque reddit procliues ad locum affectum.

Collige quantum errent, qui in propensis ad nimij sanguinis fluxionem per hæmorrhoidas, vtuntur pedum lotionibus. Nos quoque damnamus illos medicos qui immergunt in oleum voluulo affectos, laxant enim multo magis intestinum, & partes vicinas, vnde partes ob laxitatem multo magis inflammantur.

Damnamus quoque, qui vtuntur emplastro ex oleo & farina in parte dolente, in quam excrementa fluant. Aduersantur enim Galeno 2. ad Glauc. 2. vbi dicit *¶* si in partem dolentem fluat materia, nec oleum, nec farina triticea conueniunt. Addit Galenus conuenire rosaceum cum cera & passo, quæ leniunt, sed non laxant: prohibet enim omnia laxantia in parte dolente.

Secundus modus, quo pars affecta conseruetur & salubris reddi possit, est per remedia temperaturæ partis affectæ simillima: Sic Galenus 5. meth. cap. vlt. ait, vocatum fuisse pro sananda carie relictæ tamquam ineurabilis à Thesalico medico, Galenus remediis similibus temperaturæ penis illum hominem carie affectum restituit sanitati: similia sunt proposita à Galeno in eodem cap. suntque anerum vltum, aloë, litargirus, & cadmia: methodicus medicus humidis remediis procedebat. Videns Thesalicus hanc mirabilem, & celerrimam Galeni curam, erupit in hæc verba *¶* non tantum lætatus sum de salute hominis, quam tristatus, quod in mala secta fuerim educatus.

Hinc Galenus 3. meth. 3. vult, quod suppurantia sint similia & non contraria, proponit exemplum de thure, quod scilicet thus in pueris & habitibus mollioribus habeat vim exsiccandi; in nauta, & in habitu robusto vim suppurandi: sic thus in natura humida efficiet carnem, in sicca verò efficiet pus.

Demum Galenus 5. meth. 7. loquens de vulnere arteriarum & venarum concludit, non eadem medicamenta exsiccantia arteriis & venis conuenire: habet enim hæc verba *¶* tanto siccioribus medicamentis eget arteria, quam vena, quanto arteria est natura siccioris temperamenti quam vena.

Medici igitur, qui sine methodo incedunt in sanandis vlceribus, qui in omni homine & in omnibus corporis partibus vtuntur iisdem remediis, à Galeno his verbis reprehendunt 5. meth. cap. vltimo in fine *¶* nec horum quicquam nec per somnium norunt, qui sunt sectæ à methodo alienæ, cum omne vlcus in quacunque animantis parte eandem postulare curationem opinentur. Nostratum plurimi chirurgorum hanc sectam à Galeno damnatam colunt maxima cum ægrotantium iactura, & perniciæ.

Tertius modus, quo pars affecta conseruetur est, ipsam partem roborare, & humores confluentes repercutere. Quem modum obseruauit Galenus 3. de fract. comm. 21. vbi dicit se curasse vulnera panis madefactis vino albo austero, & cum spongia die nocteque vinum perfundens, quod vinum ait, est frigidum, & terrestre, nec mittit vapores in alias partes. Ecce quod hoc vinum habet vim refrigerandi, roborandi & repellendi, ne fluant humores, quod nostrates vix obseruant. Pari modo Galenus 2. ad Glauc. 2. laudat in parte dolente,

quæ recipit ipsam fluxionem, lanam succidam eodem vino austero madefactam. Proponit lanam, quia ut docet Galenus 1. de articulis 24. lana ut succida habet duas virtutes, vinam astringendi, aliam vero modicè calefaciendi, hancque applicat partibus inflammatis, eo quia sua virtute astrictoria humores repellit, sed si vino austero albo sit imbuta, tunc & repellit, & roborat.

Videmus tamen nostrorum nonnullos non admittere lanam succidam habere virtutem aliquam adstrictorianam: quia illa videntur ad emolliendas partes duras, qui omnino reluctantur Galeno & veritati. Quod vero ita sit, patet de Oesipo, de quo loquens Galenus 3. de art. 24. dicit Oesipum esse præditum contrariis qualitatibus, videlicet adstringente, & modicè calefaciente. Oesipum colligitur, ut omnes sciunt ex ipsis lanis succidis.

Hinc qui relinquunt lanam succidam quæ mollis & lenis est, & vtuntur ceratis, lædunt: quia sæpè numero partes lætæ ceratorum onere magis laborant: ideo Galenus 2. de officina medica 32. dat hoc præceptum quod his temporibus à chirurgis vix animaduertitur ¶ Fugendum est ne onere partes affectæ inflammentur. O quoties in vulneribus nostri chirurgi ponunt tot linamenta, ut pro nimio onere partes maximè inflammentur! Hinc Galenus 3. de officina medica 30. ait ¶ inflammationes nec modicum pressum ferre posse: ideo ut dura, & onerosa relinquenda.

Demum ne pars affecta recipiat excrementa, Galenus 2. ad Glauc. cap. 5. laudat alumen, & sal in edemate, habet hæc verba ¶ si multum aluminis in edemate adhibueris, nihil nocebis. Laudat quoque pro splene indurato vesicam plenam salis extrinsecus appositam, ut adstringatur pars, & fluxio ad illam prohibeatur.

Quod varia sint remedia, prout variæ sunt partium conditiones nos ostendimus 3. meth. nostræ vitandorum errorum, exemplis omnium morborum, ostendimus vanissimum esse illum medendi modum, dum putant, non solum vlcus, sed apostemata, erysipelata, & humores, sicuti sunt pituita, melancholia, bilis, & flatus eandem curationem postulare: quia hæc omnia variantur pro varietate partium.

Hinc erysipelas in pleura facit pleuritidem, in membranis cerebri phrenitidem: quorum affectuum curatio varia est. Idem dicendum est de causis antecedentibus.

Galenus 3. de symp. causis 2. dicit quod bilis atra dum peccat in toto facit elephantiasimodum in parte cancerum.

Catarrhus in cerebri ventriculis epilepsiam: idem catarrhus in trachea arteria tussim facit.

Succus mordax in cerebro maniam facit, in cute scabiem; melancholia in cerebro mæstiriam, in stomacho famem.

Denique flatus in corde palpitationem in ventriculo ructum: in recto intestino crepitum.

Galenus 13. meth. cap. 20. tanti facit indicationem à partibus corporis, ut his verbis illam declaret. In summa si quis eam quæ à partibus ipsis indicationē adimat, nihil obstat, quo minus medicinam non sex mensibus, sed sex diebus perdiscat: ratio, cur indicatio à partibus sit tanti momenti, est: quia remedia solum desumuntur à specificis indicantibus, & specifica indicantia solum à partibus



partibus ipsis colliguntur. Id declarat Galenus 5. meth. vlt. dum sanauit penis vlcus exliccantibus, quod vlcus Thessalici tractabant humectantibus, quem casum superius retulimus. Similiter Galenus 6. meth. 2. loquens de punctura nerui in quodam iuvene, quem quidam Thessalicus spatio septem dierum cataplasmate ex farina & lacte iugulauit, ostendit non omne vlcus eadem remedia indicare, remedium enim puncturæ carnis non conuenit etiam in punctura nerui: de quo casu superius diximus.

Galenus non vult quod suppurantia conueniant in omni vulnere, & præcipue in punctura tendinum, vel neruorum: immo animaduertit in vulnere, nisi pars vlcerata sit confusa, non conuenire suppurantia: habet enim, hæc verba 4. meth. 5. membrum cæsum, vel acuto telo diuisum medicamentum quod suppurat non conuenire, nisi pars sit confusa: collige contra chirurgos illos, qui in omni vulnere olea seu emplastra suppurantia applicant, quod quantum noceant iudiciosi chirurgi animaduerrant.

Præterea non solum partis temperatura, sed aliæ conditiones partium variant curationem: Galenus 6. aphorismorum 38. loquens de cancro, ait: si cancer sit in summitate cutis, curabilis est: quia radices possunt euelli: qui vero habent radices penitiores, vt in ano, palato, & mamillis, sunt incurabiles: quia radices sunt penitiores, & vt tales euelli non possunt, & tales citius moriuntur curati, quam non curati.

Pari modo ratione motus, & raritatis pulmonis, si in ipso fiat vlcus dicit Galenus 5. meth. 8. sanari non posse, nisi in principio auferatur fluxio: ibidem habet hæc verba ¶ nisi cito sanetur vlcus pulmonis actum est de sanatione: in curatione est auspicanda cura à fluxione, quæ (ait) si cesset sanari potest.

Insuper partes corporis habent etiam antipathiam cū nonnullis remediis, quæ ratione morbi sunt præstantissima: exempli causa in omnibus doloribus oleum est anodinum præstantissimum, tamen in doloribus oculorum oleum nullo modo iuuare potest: Hinc Galenus lib. de opt. sect. ad Trasylb. cap. 9. dicit, oleum esse oculis inimicum. Nos quoque expressè cognouimus oleum esse inimicum vesicæ, & (vt puto) omnibus membranis. Hinc fortasse nullum est venenum extrinsecus appositum magis felibus deleterium, quam, si oleo inficiantur: spatio enim 14. dierum moriuntur, tota enim eius cutis est adeo membranosa, vt non sit dissimilis ab oculorum membranis.

Pari modo omnia amara sunt inimica ventriculo: sententia est Galeni 6. simp. cap. 2. vbi ait: omne amarum stomacho inimicum: hac ratione Galenus 11. meth. 16. damnat absinthium commune pro vetriculi corroboracione: quia in ipso prædominatur amarities, non virtus adstringendi, & corroborandi, vt in pontico: hæc sunt verba, in communi absinthio non sentitur vis adstringendi, ideo vtere pontico: addit, fuge cætera absinthia. Commune absinthium, & cætera alia iuuant iecur: illa enim amarities, quæ est in illo absinthio interuit pro vehiculo deferente vim astringentiam ad iecur: ideo iuuat: loquens igitur Galenus 13. meth. 17. de absinthio habet hæc verba ¶ Quale medicamentum iecori est absinthium, tale lieni est cortex caparorum, quale iecori est eupatorium, tale lieni est scolopendrium, per absinthium (vt puto) intelligit commune.

Ecce quam necessaria est indicatio desumenda à proportionem partium: sed

innumera possunt afferri exempla, sed hoc non est omitendum, quod à Galeno proponitur 4. meth. 15. pro obesis, vbi laudat sal ex viperis combustis, ponit calum cuiusdam iuuenis, quem extenuarat.

Demum lib. de internis affectibus Hippocrates circa finem damnat in coxendico dolore vitiones per ferramenta in parte ossæ. Ecce quomodo & nos damnare debemus cauterium in commissura coronali per ferrum valde ignitum, vel per causticum, per quod facile potest fieri inflammatio, dicimus valde ignitum: quia si solum cuticula leniter aduratur, & deinde sensim fiat cauterium, non solum iuuat, sed inter ea, quæ amouent oculorum fluxionem videtur tenere primas.

Quod verò non solum in quolibet membro, sed in qualibet particula membri variæ & diuersæ debeant esse remediorum materiæ, Galeni exemplum cap. vlr. quinti lib. meth. de vlceribus penis, non est obliuioni tradendum: ibi clarissimè ostendit, quod in ipso pene eadem exsiccantia, quæ cicatricem inducunt, non conueniant in omnibus penis particulis: quia maiora exsiccantia requiruntur in vlceribus glandis, quam in vlceribus præputij, & adhuc minor in vlceribus cutis, quæ totum penem inuestit. Valeant nostrates chirurgi (loquor de plebeis) dum vlceribus omnium partium penis applicant præcipitatum, & alia id genus nulla facta partium differentia.

Demum requiritur pro locorum affectorum dignotione, vt perfectè intelligatur temperatura singularum partium, vt dictum est superius: quia solum illa cognita animaduertimus in omnibus affectibus, quæ remedia conueniât, & quæ partem lædunt: exempli causa, calor insignis per sentitur in regione renum, qui prouenit à magna arteria, & magna vena circa dorsum: medici vulgares attribuentes illum calorem renibus præbent potionem frigidæ, nec vident renes esse liene frigidiores, vt Auiennas & Galenus putant: inde ex frigidæ potione valde lædunt renes. Hanc doctrinam desumpsimus à Galeno 9. meth. 5. vbi dicit à frigidæ potione lædi renes: mitto abusum applicandi renibus frigida, vt rosatum, seu infrigidans Galeni, quæ nisi patiens sit calidissimæ temperaturæ & iuuenis, certè non sine aliquo damno applicantur.

Collige igitur ex dictis, quod solum ex specifica indicantium cognitione & ex distincta & exacta locorum affectorum theoria remedia inueniri possunt. An verò nostrates ad affectuum differentias específicas, & ad remedia deueniant specifica omnes animaduertent, si intellexerint huius mirabilis medicinæ principia à Galeno ipso desumpta.

## CAPVT VI.

### *De remediorum inuentione desumpta à morbi magnitudine, more, & motu.*

**C**ognitis locis affectis sequitur, ante quam agamus de morbis in mala cōformatione, vt de morbi magnitudine, de more, & de motu aliquid dicamus.

Quoad morbi magnitudinem Galenus 4. meth. 6. tres magnitudines proponit



ponit, quarum prima est magnitudo ratione propriæ essentia. Secunda ratione cacoethia. Tertia ratione partis præstantis. Quo ad magnitudinem ratione propriæ essentia exemplis facile declaratur: si igitur sit aliquod magnum apostema, quod neque sit malignum, quod dicitur cacoethe: neque sit magnum, quia sit in aliqua parte præstanti, dicitur magnum ratione propriæ essentia.

Magnitudo verò ratione partis præstantis est, si in iecore, vel corde sit aliquod apostema exiguum, vel aliqua parua pustula, quæ ratione sui nihil mali minari possit: ratione tamen partis præstantis leuiter vlcera mortem minetur. Sic dicimus nos, flatum existentem in ventriculo posse affectum nullius momenti efficere, cuiusmodi est ructus: si verò idem status esset inclusus in ventriculis cordis posset palpitationem exitiosam producere: ideo hic morbus dicitur magnus non ratione causæ, sed ratione partis præstantis.

Magnitudo verò morbi, quæ est ratione cacoethia, id est malignitatis, erit veluti aliqua febris maligna, licet parua esse videatur: vel aliquod vlcus cacoethe: vel vulnus ab armis venenatis, quod ex se sit exiguum, ratione tamen veneni maximum & lethale.

Magnitudo morbi ratione dignitatis differt à tribus propositis: de hac mentionem facit Galenus 6. de loc. aff. 5. vbi agit de passionibus hystericis: ibi enim asserit passiones hystericas, quæ dependent à semine corrupto esse maiores, quam sint, quæ à mensibus suppressis fiunt: morbus enim magnus ratione dignitatis prouenire solet ab humore magis amico: dum enim humor magis amicus corrumpitur, redditur longè magis hostilis, quam alij humores corrupti.

Similiter Galenus 3. de tuen. sani. cap. 9. loquens de magnitudine ratione dignitatis, illam exemplo apostematis partis contusæ declarat, his ferè verbis ¶ si pars contusa apostemetur fiunt duo affectus, primus est contusio: secundus est apostema: subdit Galenus ¶ si pari interuallo pars contusa & apostema recedant à statu naturali, curatio exordienda est ab apostemate, & non à contusione: quia apostema est affectus maior ratione dignitatis, quam ipsa contusio.

Præterea datur morbus magnus ratione imbecillitatis virtutis, licet ex se non sit magnus: de hac magnitudine loquitur Gal. lib. de totius morbi temporibus cap. 5.

Quo ad magnitudinem ratione cacoethia, id est malignitatis, hæc malignitas obseruatur in febribus, in vlceribus, & aliis affectibus.

Si de febre maligna loquamur, inuenio octo opiniones, & nostra est nona.

Prima est Montani Veronensis, qui putat malignitatem febrium prouenire ab humoribus putrefactis in corde.

Secunda est Fernelij, Saxoniz, & multorum dicentium à venenata qualitate occulta prodire.

Tertia est Capiuaccei: quod malignitas in febre proueniat ab humoribus alimetalibus putrefactis in corde.

Quarta est Fracastorij qui tenet oriri ex profunda, & sordida putredine.

Quinta est Horatij Eugenij mei præcessoris, qui putabat prouenire à putredine cum corruptione.

Sexta est Eustachij Rudij, qui asserit à vehementi putredine oriri, quæ vehemens putredo non differat a veneno.

Septima est Ioannis Iouberti Galli, qui putabat in malignis, & pestilenteribus febribus sanguinem putrescere: in omnibus aliis febribus putridis putabat sanguinem non putrescere, sed tantum accendi & inflammari.

Octava est nonnullorum, qui arbitrantur, malignas febres fieri ab aliqua gangræna interna. Nona est nostra opinio, quod à qualibet ex istis causis maligna febris interdum fiat: quod sic declaramus.

Prima opinio, quæ est Montani potest defendi: quia ipse Galenus tenet 1. de diff. feb. 4. quod febres pestilentes, & malignæ fiant ex humoribus putrefactis in corde: aliæ verò febres ex fuliginibus putridis extra cor, sed petentibus ipsum cor.

Secunda opinio, quæ est Fernelij potest defendi, ex Galeno enim tertio in tertium epid. in historia quarti ægroti, qui ita citò mortuus est phreneticus, ac si ipse sumpsisset mortiferum, seu venenatum medicamentum: ab eadem causa possunt fieri malignæ febres.

Accedit quod Hippocrates & Galenus 3. de ratione vic. 14. dum dicunt deiectiones biliolas, si non extinguant ardorem, esse signum malignæ febris, & præcipue, si calor vehementior reddatur, supponunt causam malignæ febris esse venenatam qualitatem, quia si esset qualitas aliqua manifesta, procul dubio quanto deiectio biliola esset maior, tanto calor mitior fieret. Præterea dicunt dari pestilentiam sine febre, ergo malignitas non semper oritur à putredine, quia conditio putredinis est quod quanto maior sit putredo, tanto intensior sit calor.

Tertia opinio, quæ est Capinacæ, quod scilicet ex putrefactis humoribus alimentalibus fiat maligna febris, potest defendi, quia per ipsam confertim cadunt vires, quod significat alimentum mutare formam: quæ mutatio per ipsam putredinem fieri solet.

Quarta, quinta, & sexta opinio quod scilicet fiat à putredine, vel sordida & profunda cum Fracastorio, vel à putredine cum corruptione cum Eugenio, vel à vehementi putredine cum Rudio, defendi possunt cum Galeno multis in locis, sed præcipue tertio in tertium epid. 23. & 1. de diff. feb. cap. 5. ubi dicit malignas febres fieri à putredine.

Septima, quæ fuit Iouberti, quod scilicet fiat à putredine sanguinis ad differentiam aliarum febrium, quæ omnes non à putredine, sed ab ardore, & sanguinis accensione: potest & hæc defendi, quia etiam sanguine putrefacto cadunt derepentè vires, ac sic est quod in malignis febribus hoc accidere potest: immo febris malignæ caracter, ut docet Galenus 3. de prælag. expul. 4. est virium casus.

Quod vero fieri possint febres ex humoribus accensis & non putrefactis colligi potest ex Galeno 10. meth. 6. ubi ait de picrocholo febricitante, non hæctica, non ephimera, sed ex humoribus sive phlegmone & sine putredine. Quare ex humoribus biliosis accensis potest fieri febris sine putredine, quæ neque hæctica, neque ephimera sit.

Octava, quæ est quod ab aliqua gangræna febris maligna fieri possit, nos non semel apertis cadaueribus à febre maligna interemptis, inuenimus in hepate



pate exiguam gangrænam omninò nigricantem. In his ægrotantibus obseruantur illa tria signa malignæ febris proposita à Galeno 3. de prælag. ex pul. 4. quorum primum est vt pulsus à naturali statu non videatur differre, sed pulsui sanorum sit similis. Secundum quod reddant urinam similem urinæ sanorum. Tercium quod ægroti dicant febrem nullam sentire: accidat tamen in his aliquod graue symptoma, non quotidie, sed in principio, vel propè obitum, sicuti animi deliquium, pulsus ad summum exiles celerrimi, & extremarum frigiditas: aliis tamen diebus quiescant, perinde ac febre carerent.

Præterea istæ febres malignæ ex gangræna non sunt vehementes per calorem: ideo non sunt tales per putredinem: quia omnes febres vehementes per putredinem sunt quoque vehementes per calorem: de his malignis febribus locutus est Galenus 9. de simp. med. cap. de terra Samia, ubi ait, febres pestilentes non esse vehementes per calorem: ergo non ob putredinem: quia magna putredo excitat magnum calorem: quare variæ sunt differentiæ malignarum febrium. Neque possumus determinare à qua causa fiant, nisi distinguamus differentias malignarum febrium: deinde sigillatim inquiramus remedia. Valeant igitur medici, qui conantur asserre vnam causam harum febrium, cum tot sint causæ quot sunt malignitatis differentiæ. Medicus igitur vt inueniat remedium, causas específicas prius debet inuenire, & ex illis specificum remedium.

Quo ad morbi motum, ex quo similiter remedia colliguntur: notandum est, quod alius est vniuersalis, & alius particularis: vniuersalis est præscire, an morbus sit in principio, augmento, statu, vel declinatione. Particularis est paroxysmi motus.

Quo ad motum vniuersalem, si de principio loquamur, ex Galeno morbi principium habet duas condiciones. Prima vt symptomata sint leuiora, quæ conditio est Hippocratis 2. aphorismorum 30. ¶ In principio & fine omnia leuiora. Secunda conditio est, vt in urinis nullum appareat signum coctionis.

Si de augmento morbi loquamur, augmentum habet duas condiciones. Prima vt symptomata incipiant notabiliter ægrum vexare. Secunda, vt in urinis appareat signum coctionis.

Cæterum de augmento duo sunt notatu digna, quorum primum est, quod si symptomata incipiant notabiliter vexare, & ex alia parte nullum appareat signum coctionis, vt plurimum mors succedat. Secundum notandum est, quod in augmento nec purgatio, nec venæ sectio conueniat, quod præceptum est Galeni 2. aphorismorum 29. dicentis: dum coquitur morbus, nec venæ sectio, nec purgatio conuenit: sed sic est quod dum coquitur morbus tunc est morbi augmentum. Valeant igitur nostrates illi qui spæra hac diuina Hippocratis & Galeni doctrina in augmento venam secant & purgant.

Si de morbi statu loquamur, status habet duas condiciones. Prima vt symptomata sint ad summum aucta. Secunda vt appareant signa perfectæ coctionis. Notandum tamen est, quod si non appareant signa perfectæ coctionis, quando symptomata ad summum aucta sunt, signum est, quod victoria ex parte morbi se teneat, & per consequens ægrum non amplius conualiturum.

Si de declinatione loquamur: hæc habet quoque duas conditiones. Prima vt symptomata sint facta mitiora. Secunda vt natura incipiat expellere: quod nisi accadat, impendet periculum recidiuz: quod signum nunquam nos decipit.

Quo ad tempora particularia morbi: ex Galeno lib. de morborum temporibus capit. 3. sex sunt, videlicet principium paroxysmi, inæqualitas, augmentum, status, declinatio, & interuallum, quod dicitur integritas, seu infebrecitatio. Principium paroxysmi est donec rigor, vel externarum partium frigus perdurat, quo tempore, vt docet Galenus 4. de ratione vic. 39. calor recurrit ad cor.

Inæqualitas paroxysmi est statim post rigorem, sed antequam augeatur caliditas, perseverat, quod est inter finem rigoris & principium accessionis.

Augmentum paroxysmi est dum calor effunditur ad partes extremas: quo tempore partes extremæ non sunt amplius frigida: tunc enim incipiunt incallescere.

Status est quando caliditas extremarum partium est æqualis caliditati thoracis.

Declinatio est dum calor incipit relinquere cor, vt admonet Galenus loco citato.

Interuallum seu integritas est omnimodo quies, seu infebrecitatio, quod tempus continuis febribus non conuenit.

Cæterum quatuor sunt de morbi motu scienda. Primum, quod motus morbi vniuersalis vel particularis non conueniat morbis, qui sunt immateriales, id est qui non fiunt ab humoribus, cuiusmodi sunt febres hecticæ, immo neque morbis materialibus, si ita facti sunt, vt non amplius fiant: quia catenus conueniunt tempora ipsis morbis, quatenus adhuc fiunt.

Secundò sciendū, motum morbi esse velocem, vel tardum, prout principium morbi est velox, vel tardum: Galenus enim in Philisco dicit *¶* Vbi tertius vel quartus dies habet graua symptomata iudicium breui expectandum: cur? quia principium velox est. Hinc in Anaxione principium fuit tardum, ideo morbus longus, & per consequens iudicium tardum.

Tertiò si morbus inuadat partem imbecillem, vel hominem imbecillum, morbus protrahitur: si partem robustam, & virum robustum, morbus & paroxysmus fit breuior: idque colligitur ex Galeno 2. de diff. feb. vlt. vbi proponit quinque causas longitudinis morborum, & paroxysmorum, videlicet copiam, viscositatem, crassitiem, angustiam meatuum, & imbecillitatem. Ab istis causis longitudinem, ab oppositis verò morbi breuitatem desumimus.

Quartò ex Galeno 11. meth. cap. vlt. notandum est ex somno profundo in principio paroxysmi excitatò, colligi, & paroxysmum & morbum fore longum. Sed exactius de hac re egimus in explicatione 12. aphor. 1. sectionis.

Ex hac Theorica de magnitudine, more & motu, quæ diuidit vsque ad specificas differentias, magnitudinem, mores & motum morbi facile colligemus remedia specifica, quæ sola sunt ex vsu.



## CAPVT VII.

*De inuentione remediorum desumpta à morbis in mala conformatione, & præcipue in cauitate.*

**A**cturi de remediorum inuentione post specificas intemperaturas, sequitur, vt diuidamus morbos in angustia vsque ad specificas differentias: omisis aliis morbis in conformatione tamquam omnibus notis & manifestis: in re enim clara tempus non est conterendum: considerabimus igitur morbos in angustia, quibus cognitis facile cognoscemus affectus in nimia apertione, oppositorum enim, eadem est disciplina.

Quo ad angustiam, alia est naturalis, alia verò est morbosa: angustia naturalis potest esse in causa multorum morborum. Vnicum naturalis angustiae exemplum sufficit, vt angustiae naturalis mala præcognoscantur: loquens igitur Galenus de hac angustia 3. de humoribus comm. 4. dicit ꝑ calculos gigni in renibus illorum, in quibus transitus, & viæ renum sunt angustæ, videlicet versus vesicam: hæc angustia est naturalis.

Quo ad morbosam angustiam, inuenio sex esse specificas angustiae differentias, quæ indicant remedia omninò diuersa, & interdum contraria. Quare illi certè sunt alogiatri, & in medicina non versati, qui putant dari aperientia communia, quæ omnibus morbis in angustia aduersentur, illa enim aperientia, quæ tollunt obstructionem, nullomodo tollunt angustiam factam per compressionem: neque tollunt illam, quæ facta est per coalescentiam, vel per constipationem, vel per occlusionem.

Paterea morbi in angustia maximè differunt à morbis in intemperie: quia morbi in angustia citò fieri possunt: in intemperie non citò. Exemplum pro declaratione huius differentiae est epilepsia, quæ proponitur à Galeno 3. de loc. aff. cap. 7. & 2. de symp. causis cap. vlt. vbi inquit epilepsiae solutionem esse subitanæ, quia fit à pituitosi succi multitudine replente ventriculos cerebri, sed cur est subitanea? non-ne materia pituitosa, & multa est solutu difficilis? Dixit esse subitanæ: quia affectus præter naturam licet fiant à pituita: nisi adlit aliqua intemperies, semper est subitanea: paroxysmus epilepticus, si mediata fieret ab intemperie non esset subitaneus: sed cum fiat à multa pituita, & non ab intemperie, illa in vno paroxysmo facile dimouetur, & discutitur.

Sex igitur sunt differentiae morborum in angustia. Prima est obstructio. Secunda compressio. Tertia constipatio. Quarta occlusio. Quinta subsidentia. Sexta est coalescentia.

Quo ad obstructionem, Galenus 8. meth. cap. 4. vult, obstructionem fieri à tribus causis: quarum prima fit ab humore viscoso, tenaci & lento. Secunda fit ab humore crasso. Tertia ab humore copia peccante.

Neque datur quarta causa obstructionis, quamuis Altimarus quartam proponat, dicens obstructionem fieri quoque posse à spiritu, seu flatu in aliqua parte concluso: subdit Altimarus, Galenum hæc quartam causam obstructio-

nis proposuisse §. de loc. aff. 7. in principio cap. dicentem, spiritum conclusum efficere obstructionem: nec vidit, dixisse spiritum conclusum efficere distensionem, & non obstructionem.

Præterea obstructio solum fieri potest (vt docet Galenus lib. de const. art. med. cap. cap. 17.) in vasis sensibilibus ad differentiam constipationis, quæ solum fit in meatibus insensibilibus, vt paulo infra declarabitur ex Galeno 2. in epid. 7. & aliis in locis.

Hinc vanissima est illorum disputatio proposita quoque à Mercuriali, an caro hepatis pati possit obstructionem: in qua probat in carne hepatis fieri posse obstructionem hoc argumento. Obstructio fieri potest in cute, quæ est durior, & densior carne hepatis: ergo tanto magis fiet in carne hepatis. Neque vidit Mercurialis in cute fieri solum constipationem, & non obstructionem, quia obstructio solum fit, ex Galeno loco citato, in meatibus sensibilibus, obstructio verò in meatibus insensibilibus, cutis non habet meatus sensibiles, Galenus 2. in 1. epid. ait §. Causæ frigida constipantes cutim prohibent, ne halitus humorum digerantur, & 11. meth. 4. ait, à vehementi aeris refrigeratione fieri constipationem: quare constipatio pertinet ad meatus insensibiles.

Præterea vagatur per scholas dictum quoddam commune reprehensione dignum, dum loquuntur de putredine, dicunt, ipsam fieri à prohibita perspiratione: hætenus rectè: sed inferunt: ergo ab obstructione: quasi quod obstructio esset quoddam genus prohibita perspirationis, & prohibita perspiratio esset species, quasi quod prohibita perspiratio non possit pendere à constipatione, compressione, coalescentia, subsidencia, vel occlusionem, etenim de omnibus istis differentiis prohibita perspiratio prædicari potest, quia à sex propositis angustis, fieri potest.

Quo ad compressionem, hæc à tumoribus præter naturam, à nimia pinguedine, & à quacumque alia causa comprimente meatus sensibiles, vel insensibiles fieri potest. Hanc compressionem tetigit Galenus 2. aphorif. comm. 42. dum dixit, apoplexiam fieri propter dispositionem similem inflammationi, quæ in cerebro sit constituta: hæc igitur inflammatio comprimit meatus, & facit apoplexiam.

Galenus quoque 7. aphorif. 17. tangit hanc compressionem dicens §. Iecur inflammatum comprimendo os ventriculi singultum efficere. Idem repetit Galenus lib. de pulsibus ad tyrones circa finem.

Angustia per compressionem fieri quoque potest ab osse luxato, quod comprimendo neruum, paralytim faciat. De hoc casu mentionem facit Galenus 4. de loc. aff. 3. dum dicit, paralytim fieri à vertebra luxata, quæ comprimendo neruum impedit transitum facultatis animalis.

Fernelius refert casum, in quo vidit ex incuruata costa comprimente os ventriculi secutum fuisse singultum: costa tamen eleuata statim cessasse.

Demum angustia quoque fit à parte percussa humoribus imbuta comprimente neruos, licet facta non sit luxatio, sicuti contigit Pausaniam, qui (vt refert Galenus 2. de loc. aff. 6.) veniens Romam à vehiculo cecidit, & percussus circa ceruicem amisit sensum trium digitorum summæ manus: Galenus applicatis remediis ceruici, statim digitis restituit sensum: ratio tamen curæ cu-

rationis



ratiōis fuit, quia nerui, qui præbent sensum digitis oriuntur à ceruice: in qua ob humores confluxos facta erat neruorum compressio. Valeant illi qui neruorum anatomia orbatī medicinam faciunt.

Demum Galenus 13. meth. 11. damnat aperientia, dum angustia fit ob cōpressionem: dat exemplum de renibus, vesica, & vtero: inquit, Cum renes, & vesica aliqua inflammatione tentari incipiunt, diuretica maiorem excitare inflammationem: sed cur maiorem? quia secum ferrent excrementa, quæ maiorem inflammationem, & angustiores meatus efficerent, subdit Galenus de vtero inflammato, quod aperientia, quæ solent menses mouere, maximè augeant vteri inflammationem quia menses moti maiorem faciunt compressionem.

Conueniunt tamen menses mouentia seu diuretica facta prius purgatione in obstructione, constipatione, & in subsidia, sed in compressione facta ab aliquo tumore, vel à nimia pinguedine, vel ab aliqua inflammatione, tantum abest, quod conueniant, vt per aperientia longe magis meatus occludantur: medici igitur qui non diuidunt vsque ad specifica, casu, & fortuitò incedunt: inde ægros vexant, & sæpè ad necem vsque deuerberant.

Pari modo Galenus 5. aphorismorum 46. dicit, si os vteri comprimatur à tumore, non sunt mouendi menses, quia aperientia augent tumorem.

Quo ad constipationem, quæ est angustia differentia, hæc certè non potest vocari obstructio: quia obstructio ex Galeno lib. de const. art. med. cap. 17. solum fit in meatibus sensibilibus: constipatio verò in meatibus insensibilibus, quod quidem confirmatur Galeni auctoritate: Galenus enim 2. in primū epid: comm. 7. dicit, causas frigidas externas constipare cutim, & vetare ne halitus humorum digerantur. lib. verò 11. meth. c. 4. dicit stipationem fieri ab extrinseca frigiditate densante fines vasorum exiguiorum, vel densante totam cutem. Hæc densatio certè non est obstructio, quia obstructio, non fit ab alia causa, quàm à materia crassa, vel viscida, vel copiosa, vt dictum est ex Galeno 8. meth. 4. Immo 11. meth. cap. 4. citato vult, quod constipatio sit densitas meatuum insensibilium: stipatio dicitur *σπνσις* quod significat densare. Itidem Galenus lib. 10. meth. cap. 2. loquens de constipatione, ait, fieri à frigore februm: ab aqua aluminosa, quæ claudit meatus insensibiles ipsius cutis: addit, vel ab aqua calcantina, vel ab vitione, quæ non minus constipat meatus insensibiles, quam aeris vehemens frigiditas.

Demum quod vehemens frigiditas tum aeris, tum aquæ ita constipet, vt interdū paralytim faciat Gal. 4. de loc. aff. 7. proponit duos casus pulcherrimos Alter est de illo, qui ambulabat sub pluuia, & vento, qui ob pallium madefactum, & refrigeratum circa ceruicem fuerunt constipati nerui ceruicis, qui præbent sensum pericraneo, vnde amisit sensum pericranci. Alij medici, vt sensum reuocarent calefaciebant, atque exulcerabant pericraneum: Galenus verò applicando ceruici calefacti illi hominem statim sanauit. Alter casus est de Piscatore qui ob moram in aqua frigida amisit retentricem sphincteris ani, & vesicæ, vnde fæces, & vrinā retinere nō poterat, nō propter obstructionē, sed propter constipationem ab aquæ frigiditate factam, facultas animalis ad musculos illos non excurrerat, quare maximè differt constipatio ab obstructione & compressione, quod vulgares medici, vel non animaduertunt,

vel nunquam facti sunt capaces differentiarum ipsius angustiae.

Quo ad occlusionem, quae similiter efficit angustiam omninò diuersam ab aliis differentiis, fit, dum meatus sensibiles occluduntur, nō ab humorum copia, à lentore, vel crassitie, quae tres causae efficiunt obstructions: sed fit occlusio à res solida: sicuti quando meatus vrinarius, vel vterus occluduntur à lapillo, vel à caruncula. Similiter in auribus, si caruncula, vel os ceratæorum, vel aliquid aliud solidum occludat aurium meatum, dicitur occlusio: quae certè non potest dici obstructio: quia obstructio non fit à re solida: neque debet dici constipatio: quia ex Galeno locis citatis constipatio nil aliud est, quam dēfitas meatuum insensibilium: neque debet dici compressio, quia hæc à tumore, vel ab alia parte comprimente ipsum meatum fit.

Quo ad subsidentiam, quae est angustiae species, de qua Hippocrates aphor. 3. 1. sect. loquens dicit, in habitu plethorico non esse euacuandum vsque ad subsidentiam: ratio est, quia propter subsidentiam impeditetur transitus alimenti ad cor: unde syncopes, & mortes repentinæ sequerentur. In expositione Leonicensi in dicto aphorismo hæc verba leguntur *¶* Neque compressiones ad extremum ducendæ, sed verba Græca hæc sunt *μὴ τὰς συμπτώσεις ἐς τὸ ἄσθεν.* i. neque subsidantias ad extremum ducendas, quia symptosia venit à verbo *συμπίπτω* i. quod significat deo, vel subsideo, & non comprimo: compressio enim valde differt à subsidentia.

Galenus 7. de symp. causis cap. 2. docet quomodo fiat subsidentia, dicens, fieri dum contrahuntur ora venarum: subdit deinde ora venarum ob tres causas contrahi, nempe, vel ob atrophiam, vel ob frigiditatem, vel ob mollitiem: addimus nos, vel ob maximam virium imbecillitatem. Dum fit in moribundis ægris stertor à nulla alia causa fit, quam propter subsidentiam vasorum pulmonis, per quae vasa aer inspiratus cum difficultate transiens efficit stertorem.

Hæc angustia per subsidentiam differt ab obstructione, stipatione, occlusionē, & compressionē, vt ex dictis quisque facillè intelligit, quare qui has differentias non intelligit, fieri non potest, vt inueniat remedia, quoniam quælibet angustiae species requirit propria, & specifica remedia.

Quo ad coalescentiam hæc fit à callis, qui post vulnera antiqua, vel post vlcera sanationem, vel ob alias causas facti, efficiunt angustiam. Hinc fistulae, quae non sanantur hoc sine secantur, vt facta cicatrice non amplius recipiant excrementa, quamuis sint callosae, illarum callus non sufficit, ad prohibendam fluxionem, nisi perfectionem introducat cicatrix. Hinc Galenus 13. meth. vlt. videns callos impedire humorum confluxum habet hæc verba: si cerebri fluxus fiat ob debilitatem venarum, vel arteriarum, illas excidimus: quia facta cicatrice & callo non amplius fluunt humores in ipsum cerebrum. Ecce quod calli seu cicatrices impediunt fluxiones, si fixi, duri, & firmi sint, quia tunc nullus relinquitur locus recipiendi excrementorum confluxum, quod chirurgi non omnes intelligunt.

Collige igitur ex dictis quod aperientia, cuiusmodi sunt diuretica, menses mouentia, & aperientia meatus mesenterij in meatibus angustis interdum iuuare, & interdum ita nocere, vt ægros interrimant, vt ostensum est.

Collige quoque, quod aperientia in ipsa obstructione sunt admodum diuersa,



uerſa, & varia: quam varietatem niſi uſque ad ſpecifica diſtinguamus actum erit de remediorum inuentione: quia ſi obſtructio fiat ab humore craſſo, certe non conuenient aperientia, quæ tollunt humorem viſcoſum, neque illa, quæ tollunt humorem copia peccantem: nihil enim magis auget obſtructionem factam à copia, quam aperientia, quæ auferunt craſſitiem, & viſcoſitatem: quia hæc obſtructio, quæ fit à copia indicat euacuancia, & nullo modo aperientia: inuino ſi quis uellet ante euacuationem uti aperientibus, incidentibus, vel detergentibus maximè læderet, quia magis impingeret. Hinc Galenus 8. meth. 4. habet hæc verba ¶ ſi prius tolleremus obſtructiones ante ſanguinis euacuationem magis impingeremus obſtructiones: hanc ſententiam repetit Galenus 11. meth. 4. & aliis in locis.

Compreſſio verò nullo modo aperientibus, ſed reuellentibus tolli poteſt, ut oſtendit Galenus 13. meth. 11.

Occluſio ſimiliter eſt omninò diuerſa, quia hæc fit à re ſolida, & non ab humoribus: ſicuti dum à lapillo occluduntur meatus vrinarij, vel vtereres, vel ab arenulis, ſeu lapillis occluduntur renum papillæ, ſicuti meatus aurium occluduntur à caruncula, vel ab alia re ſolida, & ſic de aliis meatibus qui à re ſolida claudì poſſunt. Qui igitur uellet in hac anguſtia indiſcriminatim uti aperientibus, sæpè læderet ægros & interdum interimeret.

Subſidentia tolli poteſt aperientibus, nutritiſque, & non euacuantibus: nutritientia ſunt, ut iuſcula parui pulli, & alia id genus, quæ ſimiliter in varias remediorum differentias diuiduntur, quia variæ ſunt ſubſidentia differentia: quare ſicuti ex Galeno 3. de ſymp. cauſis 2. ſubſidentia fit, vel ob atrophiam, vel ob frigiditatem vel ob mollitiem: ſic tria ſunt remedia diuerſa: pro atrophia remedium eſt alimentum, pro ſubſidentia à frigiditate, remedia ſunt calefacientia: pro ſubſidentia à mollitie ſunt roborantia. Qui igitur non diſtingunt ſubſidentiam in ſuas differentias, iacta eſt alca de remediorum inuentione: Ex ſpecificis igitur tantummodo præcognitis quiſque facile remedia ex uſu artis colligere poterit.

Coaleſcentia verò, neque aperientibus, neque euacuantibus tolli poteſt, ſed callos auferentibus. Videas ergo quantum a medendi ſcopo deſt. ſtant, qui ſic inſerunt: meatus ſunt clauſi: ergo aperientibus utendum, credentes dari vnum remedium aperiens, quod tollat omnem anguſtiam, quod quam ſic falſum non ſolum ex dictis facile apparet, ſed etiam ex ipſo medendi abuſu colligi poteſt.

Exemplum afferatur de tuſſi, cuius curatione medici plebei sæpè abutuntur: tuſſis nonne ex Galeno 2. de ſymp. cauſis 4. 2. ſimp. 17. & 4. de loc. aff. 8. eſt vehemens efflatio impellens inæqualitatem? nonne inæqualitas fit ab aliqua aſperæ arteriæ anguſtia? pro tollenda tuſſi, certè non dabitur vnum remedium aperiens: quia vnum aperiens iuuabit, & aliud nocebit: quare oportet prius diuidere anguſtiam, quæ facit inæqualitatem in ſuas differentias ſpecificas: & ex illis differentiis ſpecificis colligere remedia: quæ differentia prout variæ ſunt, varia quoque requiruntur remedia: non enim valet hæc conſequentia (ut medici plebei putant) eſt tuſſis, ergo ſaccharum candidum violatum iuuabit.

Dicimus igitur inæqualitatem aſperæ arteriæ fieri, vel ab obſtructione fa-

cta in bronchis pulmonis, vel facta à tumore comprimente, vel à constipatione, vel ab occlusionone, vel à subsidentia, vel à coalescentia: si fiet ab obstructione, remedia, quæ tollunt tumores, non iuuabunt: iuuabunt pro obstructione oxymel, saccharum candidum, iuiubæ, liquiritia, & alia id genus.

Si fiet tussis à tumore comprimente, hæc remedia, quæ sunt pro tollenda obstructione certè non iuuabunt, sed illa, quæ tumorem diminuunt, cuiusmodi sunt venæ sectio, purgatio, & aliqua reuulsio.

Si fiet tussis à constipatione facta à potione valde frigida, cuiusmodi est vinum niue refrigeratum, quo plurimi tempore æstiuo vtuntur, tunc solum iuuat iusculum parui pulli valde calidum, quod multoties fuimus experti. Si fiet tussis ab occlusionone, quæ sit à re solida, cuiusmodi est mica panis, vel quid simile ex ore in asperam arteriam excidens, tunc bechechia iuuabunt, si fiet inæqualitas & tussis à subsidentia, quæ in atrophia, vel in refrigeratis, vel relaxatis nimium, fieri solet, iuuabunt alimenta calida roborantia, & facilis concoctionis: expectorantia verò maximè nocebunt: quia magis laxant: si fiet inæqualitas & tussis à coalescentia orta à præcedenti vlcere, vel vulnere, nisi auferatur, vel diminuaturs callus, tussis erit insanabilis. Ecce quod nisi in omni re ad specifics differentias deueniamus, nec prælagire, nec remedia inuenire valeamus.

## CAPVT VIII.

### *De remediorum inuentione desumpta à causis specificis.*

**S**equitur tractatus de causis. Causarum igitur alix sunt externæ, alix internæ: internarum alix sunt contentiuæ, alix materiales, alix fouentes, & alix antecedentes, de quibus in sequenti cap.

Quo ad externas, quæ vocantur procatasticæ: hæc reuera vocantur occasiones, & non causæ: & merito: quia si essent causæ, vel essent proximæ, vel remotæ: non sunt proximæ, vt omnes concedunt: quia sunt externæ: non sunt remotæ: quia de ratione causarum remotarum est, vt dent ipsum quod (vt docet Aristoteles 1. Post.) Hinc demonstratio ex causa remota est demonstratio quia, & non propter quid: patet etiam exemplo: sol est causa remota hominis, quia necessariò concurrir ad generationem hominis: neque dat propter quid passionis ipsius hominis: causæ verò externæ non necessariò, & per se concurrunt ad effectuum productionem: exempli causa, vinum maluatium est occasio, cur aliquis incidat in febrem ardentem: nō tamen est causa remota: quia non prædicatur per se de effectu, vt sol prædicatur de hominis generatione: maluatium enim potest efficere non solum morbos calidos, sed etiam morbos frigidos, cuiusmodi est hydrops: est enim Aristotelis 3. sec. prob. 1. vbi dicit § Vinolentos non calere, licet vinum calidum sit: quia valde calida superant naturam, & superando suffocant calorem naturalem: inde infert Aristoteles, vinolentos morbis frigidis vexari. Hinc colligimus errata externa, siue occasiones externas non esse dicendas causas remotas, sed morborum occasiones: sicuti Hippocrates animaduertit. Quas occasiones si vis distinctè intelligere



telligere quæ sint, & quot, & quomodo sint morborum occasiones, videas mea commentaria in primam sen. in expositione tex. 6. doc. 2. cap. 1. vbi plurima de his diximus.

Quo ad causas contentiuas (omissis altercationibus) causa contentiua est illa, qua posita ponitur, & qua ablata aufertur: estque veluti rei forma, seu vt melius dicã, causa efficiens quæ ab Auerroc vocatur non vera. Sic dicimus interpositionem terræ inter Solem, & Lunam esse causam Eclypsis: de ratione enim causæ efficientis non veræ, est, vt sine motu efficiat effectum. Sic in medicina humores, qui efficiunt tumores sunt causæ contentiuæ tumorum.

Similiter humores tenaces, & crassi efficientes obstructionem sunt causæ contentiuæ obstructionum. Sanguis est causa efficiens contentiua apostematis, quia sanguine ablato illico cessat apostema: dicimus illicd quia Galenus 13. meth. cap. 8. & 3. de temp. cap. 5. loquens de apostemate correptam recedere à statu naturali, vt repletam, & vt calidam: addit vt repleta indicat euacuationem: vt calida verò nihil indicat: quia facta euacuatione spontè succedit refrigeratio: ideo sanguis dicitur causa contentiua apostematis, quia depleta parte cessat tumor, & omne malum. Quod diximus de apostemate, de aliis quoque tumoribus dici potest.

Plurima alia exempla causæ contentiuæ afferri possunt: quia nullus est morbus, qui non habeat propriam causam contentiuam: quamuis interdum non innoscat, & sit innominata. Sed non pigeat alia exempla afferre: sicuti causa contentiua melancholiæ, vt notat Galenus 3. de loc. aff. 7. est phantasma tenebricosum. Causa contentiua febris putridæ est humorum putredo. Causa contentiua conuulsionis, vt notat Galenus in meth. 8. & 3. de loc. aff. 7. est qualitas mordens, & irritans ipsos neruos: qua ablata causa cessat conuulsio, & sic de aliis morbis.

Quo ad causas materiales: hæ causæ sunt ipsi loci affecti, de quibus satis superque in proprio cap. diximus: præcognoscuntur loci affecti ex quinque locis propositis à Galeno 1. de loc. aff. 5. & 2. de loc. aff. 9. nempe, ex actione læsa, ex situ læsionis, ex recrementis, ex propriis accidentibus, & ex doloris proprietate: interdum vnus locus sufficit: sæpe ex syndrome duorum vel trium locorum reddimur certiores.

Quo ad causas fouentes: istarum aliquæ sunt fouentes per se, vt caliditas iecoris est causa fouens mania, vel phrenitidis. Vel causæ fouentes sunt accidentales, vt obstructiones, quæ ex accidenti fouent ipsas febres: quia esto quod obstructio à pituita frigidissima fiat, tamen ex accidenti valde calefacere potest, & calefaciendo fouet ipsam febrem: valde calefacere potest, quia prohibet perspirationem, illamque retinet: qua retenta humores putrescunt, & à putredine suscitatur calor.

Dum in ægris desunt causæ fouentes, facile sanari possunt. Multa afferemus exempla, in quibus versabimur, vt studiosi hanc rem perfectè intelligat: quia nullus error hoc tempore est magis communis, quam curare morbum, & relinquere causam fouentem.

Causa igitur fouens morbos, modò est in humoribus, modò in parte solida correpta intemperie, vel mala compositione, vel soluta vnitatem: modò in vtrisque, modò in abusu sex rerum non naturalium, & in remediis importunè

exhibitis. Si causa fouens est in contentis, siue in humoribus, sufficit humorum euacuatio: si est in parte solida, partis solidæ morbus est auferendus.

Præstat utramque causam fouentem exemplorum luce declarare.

Si de causa fouente, quæ est in contentis, loquamur, se offert consideranda plenitudo, in iis, qui patiuntur oculorum fluxionem: quæ nunquam tolli potest, nisi auferatur plenitudo, quæ est causa fouens. De hoc casu audiendi sunt Galenus, Aristoteles, & Plato: Galenus 13. meth. cap. 19. ubi ait *¶* cucurbita in occipitio ad oculorum fluxiones optima est, si totum corpus prius purgetur, secus totum caput magis implebitur. Hinc medici parum periti, dum in oculorum fluxione ad occipitium reuellunt quando causa fouens est in toto corpore maximè lædunt oculos: Galenus: ut omnino tolleretur oculorum fluxionem in quodam ophtalmico, (ut refert lib. de curandi ratione per san. mil. cap. 11.) detraxit sex libras sanguinis, & statim illum sanauit. Ecce quod prima indicatio est auferre causam fouentem, quæ est in toto, deinde illam, quæ est in parte.

Pari modo Galenus in oculorum inflammatione 13. meth. cap. 11. citato, prius causam fouentem totius abstulit, dum dixit *¶* vnica die substulisse oculorum inflammationem medicamento purgante efficacissimo, dummodo febris non adsit: deinde 14. meth. cap. 8. docet quodnam sit hoc medicamentum efficacissimum pro oculorum inflammatione, inquit esse medicamentum compositum ex aloë, scāmōnio, & coloquintide. Nos si non adsit febris, vel temperamentum præcalidum, utimur quotidie per sex dies pillula composita ex aloë, scāmōnio, & trociscis alhandal. ann. gr. iij. quod auferendo oculorum dolorem, & inflammationem est efficacissimum.

Hinc Galenus 4. meth. c. citat Platonem in carmide, & Aristotelem primo Ethicorum ultimo dicentes oculos non sanari, nisi corpus, in quo sit causa fouens, sanetur. Addit corpus non sanari, nisi animus sanetur: animo enim languente, corpus sanum esse non potest.

Plato in carmide clarius ait *¶* non posse mederi oculis, nisi capiti medeamur, nec capiti nisi totum corpus purgemus: neque totum sanabimus, nisi animi passiones deleamus: quia anima malè affecta corpus sanum esse non potest.

Præterea in oculorum affectibus, & in quibus morbo particulari non solum est auferenda causa fouens, quæ est in toto: sed etiam, quæ est in parte, quod nisi obseruetur, remedia valde nocent, sicuti si caput non esset purgatum, & oculi ad ægritudinem essent valde propensi: valde nocent præcipuè stillicidia in affectibus oculorum, quibus nostratum plurimi abutuntur, ut notat Galenus 13. meth. 22. his verbis *¶* stillicidia oculis nocent, his qui non sunt purgati, & iis qui habent oculos ad ægritudines propensos. Ecce quod causa fouens in toto est auferenda: deinde ea quæ est in parte, qua non ablata vanissima sunt remedia. Exemplum proposuimus de oculis: quia eadem doctrina infernere poterit affectibus omnium partium.

Si verò accidat, quod in toto nulla sit causa fouens morbum partis, tunc neque totum est purgandum, neque phlebotomandum: quod vulgares medici non intelligunt, quia nesciunt mederi sine medicinis, & sanguinis missione. Hoc erratum tangitur ab ipso Galeno 3. aphorismorum comm. 15. ubi  
agens



agens de angina habet hanc sententiam: si natura depoluerit totam superfluitatem in fauces, nec purgatio, nec venæ sec. conueniet: signum verò, quod tota sit deposita, est, si excrementa per urinam, & per aluum simillima sanis excernantur. Ecce quod deficiente causa fouente, morbi sine remediis celeriter sanantur. Dum verò in simili casu medici venam secant, vel purgant, maxime lædunt ægros.

Dum vero Hippocrates 6. aphorismorum 37. asserit ¶ ab angina si tumor fiat in collo est bonum signum: foras enim morbus deducitur. Hæc sententia indiget expositione, quia videtur interdum experientiæ, & ipsi Hippocrati reluctari: Hippocrates enim 2. epid. proponit casum cuiusdam mulieris anginosæ, quæ cum tumore, & rubore externo quarta die mortua est: dicendum est cum Galeno loco citato, & alibi, quod tumor in collo ex morbi permutatione sit salutis: si verò factus sit ille tumor ex morbi propagatione, nihil boni indicare potest, sicuti in dicta anginosa obseruatum est: in qua causa fouens non erat angina: sed viscerum maxima dyscrasia.

Causa fouens, si stabuletur in venis nullo existente morbo in visceribus, illa euacuata, illico cessat affectus: Exempli causam in Insania aperiuntur hæmorrhoides, sanguis egreditur floridus, tunc certè non tollitur causa fouens: si causa insanix sit humor melancholicus. Hinc dum Hippocrates 6. aphorismorum 21. dicit ¶ si hæmorrhoides insanix superueniant, sit insanix solutio: Galenus in comm. inquit aphorismum esse verum de insania facta ab humore melancholico, hac lege, vt sanguis euacuatus sit melancholicus, non biliosus, vel floridus.

Pari modo Galenus dum Hippocrates 6. aphorismorum 10. dicit ¶ hæmorrhoides superuenientes renum passionibus, bonum, in comm. dicit bonum esse, quia per hæmorrhoides euacuatur sanguis crassus, qui nephritim facit: quare si sanguis esset tenuis, & floridus, certè non esset causa fouens: ideo in nephritica passione, & in mania à melancholia orta si exiret ita floridus, statim esset supprimendus: quia crassus est causa fouens passionem nephriticam, & non tenuis, & floridus.

Si verò loquamur de causa fouente, quæ consistat in partis solidæ dyscrasia, nullus error in praxi est isto perniciosior: quia curando morbum, & relinquendo causam fouentem, ægrum præcipitamus: Galenus similem tangit errorem non vno in loco, sed præcipuè quarto de articulis comm. 40. vbi his verbis erratum hoc reprehendit ¶ Plerique medici medentur vlceri intestinorum neglecto iecore, & ægrum præcipitant: causa verò cur ægrum præcipitant, proponitur ab ipso Galeno 6. aphorismorum comm. 3. vbi habet ¶ Ab hepate ichores, qui habent naturam amaræ bilis fluunt ad intestina, & abradunt, & cibi fastidium faciunt. Collige obiter ichores biliosos, & non bilem ipsam, vt plurimum fluere ad intestina, & vlcus in ipsis efficere.

Similiter loquendo de vlcere pulmonis, cura incipienda est à fluxione, tantquam à causa fouente auferendo fluxionis causam, quæ vt plurimum consistit in capitis intemperie. Hinc Galen. 5. meth. 8. ait his ferè verbis: dum sit vlcus pulmonis à fluxione incipienda est cura à fluxione, secus actum esset de sanatione phthisis.

Si verò causa fouens consistat in humoribus, & nō in partis solidæ dyscra-

sia tunc facile vinci potest, sed quando est in parte solida, euacuatio per alui, vel per alias partes ad demendam fouentem causam est insufficiens, quod colligitur ex Hippocrate sexta, aphorif. 16. vbi habetur ¶ A pleuritide, vel peripneumonia alui profluuium malum: Galenus in comm. dicit esse malum: quia indicat etiam iecur esse inflammatum: in iecore est causa fouens, quæ fouet pleuritidem, & peripneumoniam: ideo in his affectibus cura dirigenda est præcipue in ipsum iecur, sanguinem euacuando & alterando, vt eius inflammatio diminuatur: quia vnica spes est in sanitate comparanda, vt causa, quæ fouet morbum, adimatur: illa enim relicta, remedia vanissima redduntur.

Si causa fouens est in iecoris tumore: non ablato tumore, alij affectus dependentes fiunt inuincibiles. Hinc Hippocrates 7. aphorif. 17. dicit ¶ si iecore inflammato sit singultus, malum: Galenus in comm. inquit, quia tumor inflammatorius hepatis premit os ventriculi, & facit singultum. Hic singultus nec tolli nec mitigari potest, nisi causa fouens diminuatur.

Fernelius loquens de singultu refert, vidisse ex incuruata costa compressum fuisse os, ventriculi, & inde singultum subortum esse, solumque cessasse post costam eleuatam. Ecce quam ridiculi sunt illi medici, qui putant auferri hunc singultum, causa fouente in ipso hepate relicta: quare nisi adimatur, vel diminuatur causa fouens, quæ est in hepate, vanissima & perniciofa erunt remedia, quæ respiciunt os ventriculi, sicuti sunt sternutatoria, oleum amygd. dul. narcotica ipsa, quia inflammationem iecoris magis adaugent.

Si causa fouens esset in vtrisque, id est in contentis, siue in humoribus, & in partis solidæ viscerum dyscrasia: vtraque ante morbum esset amouenda: si esset in contentis, humorum euacuatio sufficeret: si in parte solida euacuatio non sufficeret, sed indigeremus alteratione in contrarium, vt malæ temperaturæ possent auferri.

Galenus loquens de causis cancerum fouentibus 2. ad Glauc. cap. 10. dicit cancerum fieri vel quando lien ob imbecillitatem non attrahit melancholiā, vel fieri ob menses, vel hæmorrhoidas suppressas: si igitur causa fouens cancerum est lienis imbecillitas, id est intemperies, curatio est difficilior, quam si esset in excrementis: in excrementis enim amouendis sufficit euacuatio, quæ certè non sufficit si causa fouens sit in lienis frigida temperatura: dum enim lien non attrahit, intemperies eius frigida est, à calida enim intemperie attractio fit robustior.

Si denique causa, quæ fouet morbum, consistat in abusu sex rerum non naturalium, & præcipue ex errore facto in prima concoctione, facile auferri potest: illa tamen non ablata, morbus quotidie magis fouetur, & corpus quotidie in peius labitur. Ex errato facto in prima concoctione duo mala sequuntur, vt docet Galenus 11. meth. capite decimo quinto. Primum ex assumpto cibo nullavtilitas colligitur. Secundum corrumpitur cibus, & ex corruptela expellitur aliquid prioris cibi bene cocti. Hic detegitur erratum plurimorum medicorum, qui permittunt ægros plus iusto reple-ri, vnde ab hac causa fouente morbum sæpissime succedit mors. Quanti momenti sit hoc erratum, quod consistit in replendis ægris Galenus his verbis declarat 2. de ratione vic. comm. 40. ¶ Minus malum est euacuare illos, qui indigent repletione, quam replere illos, qui indigent euacuatione: malum certè



certè maximum est euacuare vacuatos, & exinanitos: sed longè maius malum est replere ægros, qui indigent euacuatione.

Præterea inter causas fouentes interdum est nimia inedia: interdum cibus improporcionatus morbis, quos curare intendimus.

Si de nimia inedia loquamur, Galenus lib. aduersus Erasistratum inquit: ieiunium indebitum ita caput replere, vt in brachijs ipsis efficiat tensionem. Ratio huius est, quia ob nimiam inediam venter repletur cruditatibus, & inde caput, vt docet Galenus 2. de ratione vic. 44. & præcipuè in biliosis hoc euenire solet. Similiter Galenus in eodem comm. inquit morbum crudescere ob intempestiuum ieiunium, habetque hæc verba ¶ Morbus manet crudus non solum ob intempestiuam cibi oblationem, sed etiam ob intempestiuam inediam. Ecce quomodo ipsum ieiunium in biliosis præcipuè, si caput sit læsum, possit esse causa fouens morborum ipsius capitis.

Si de cibo & potu improporcionato loquamur: pari modo ab hoc fouentur morbi, si de cibis: dignum animaduersione est, quod dixit Galenus 8. meth. 2. his ferè verbis ¶ nec panem, nec carnem, nec oua febribus conuenire: quia neque pars utilis horum ciborum, neque inutilis iuuare possunt febricitantes. Loco istorum ciborum laudat ptissanam, & pisces saxatiles: quia ptissana, & pisces isti quo ad partem nutrientem, & quo ad excrementosam iuuant: quia refrigerant, & humectant: ideo Galenus 1. de ratione vic. in ac. 18. proponit quatuor ptissanæ proprietates: quarum prima est, quod lenit, & leniendo tollit asperitatem, quæ à calore febrili fit. Secunda detergit. Tertia est facilis distributionis, quarta (ait) non subuertit stomachum, vt alica, & oua. Ecce quantum à Galeni & Hippocratis doctrina nostrates cum ouis, carnibus, & pane cocto desectunt, lædunt, & hac via miseros ægros ad necem sensim perducunt: nec vident causam fouentem ipsas febres præcipuam consistere in hoc cibandi abusu.

Hinc Galenus 1. de ratione vic. comm. 27. loquens de cibo proportionato acutarum febrium, dicit esse pisces saxatiles ex oleo, aqua, aceto, & porro paratos: si hæc est Galeni doctrina, qua ratione ducti salis pauxillum non admittunt in febricitantium obsonijs.

Similiter si de potu loquamur proportionato febribus putridis factis ab obstructione crassi humoris, aqua, ex Galeno 10. meth. 14. nec cocta, nec cruda conuenire potest, quia aqua est causa fociens ipsas obstructiones, & ipsas febres: si verò febris esset ardens sine obstructione, aquæ potus præcipuè tempore æstiuo est maxime proportionatus: immo Galenus 6. epid. 4. comm. 10. in his inquit, aquam coctam, vel niue, vel in puteo esse refrigerandam.

Si verò febris non est ardens, vinum oligosorum est proportionatum in omni alia febre: hæc enim sunt Galeni verba 3. de rat. vict. in ac. 8. ¶ vinum aquosum est maximè idoneum febricitantibus: quia hoc vinum neque habet aliquam insignem qualitatem: neque austeritatem vel dulcedinem, vel acrimoniam, neque est odorum, taleque est imbecillius Sabinum. Similia vina apud nos passim inueniuntur: quod verò hoc vinum descriptum ab Hippocrate & Galeno habeat vim refrigerandi febricitantes & dolorem capitis auferendi, Galenus id declarat lib. de cibis boni & mali succi cap. 11. vbi inquit, hoc vinum oligosorum absolute refrigerare, & dolorem capitis sedare, &

dolorem capitis sedare, immo tollere obstructiones, quæ est febrium causa fouens.

Denum Hippocrates & Galenus 3. de rat. vic. 41. nunquam prohibent vinum aquosum, neque in desipientia: neque in graui capitis dolore: immo Galenus & Hippocrates addunt in dicto comm. si vinum in desipientia, & grauib. capitis affectibus forte exhibeatur, ait, aquam esse superbibendam, vt vini potio retundatur. Subdit Galenus ob duas causas esse prohibendum vinum fortè in grauissimis capitis affectibus. Prima quia vinum propter caliditatem celeriter ad caput fertur. Secunda causa quia tale vinum est vehiculum ferens calidos, & seruantes humores ad caput. Collige quod vinum aquosum in nullo casu prohibendum sit, quod probatur hoc argumento à minori efficacissimo: si in desipientia, & grauib. capitis doloribus vinum aquosum non est prohibendum, tanto minus in aliis febribus.

Quo ad vinum forte, & generosum, Rasis illud laudat in podagra frigida, dicens esse tum pro curatione, tum pro podagræ præseruatione bonum: addit eligendum tamen (vt tutius procedamus) Hippocratis consilium 3. de rat. victus tex. 71. quod post vini generosi potum aqua sit superbibenda, vt vini potentia retundatur.

Si verò sint obstructiones (vt dictum est) aqua non est præbenda: quia detinetur in ventriculo, & redditur summè biliosa.

De aqua Hippocrates & Galenus 3. de rat. vic. 40. dicunt ¶ Aquam ingestam in vacuum ventriculum amarescere, & reddi summè biliosam, subdit ¶ non ducit alium, non mouet urinam, vires maximè prostermit, & noxia est, quia stercoris est expers. Hæc omnia mala ex aqua habentur, si adsint obstructiones, quæ eius transitum impendant: Addit, aquam quoque augere inflammationem iecoris, & lienis, vires prostertere, tum quia laxat: tum quia non nutrit: Addit intestina non corroborare, sed maximè laxare ob hanc rationem, quia stercoris est expers, nihil enim magis roborat intestina, quam coctæ faeces, in quarum finem à materia fabricata sunt.

Si de acre, somno, & vigilia, si de exercitio, & quiete, & animi passionibus loquamur, quomodo in his causa fouens morbum contineatur: nos satis superque declarauimus in commentariis nostris in primam primi cap. 2. in expositione tex. 6.

Balneum quoque redditur causa fouens morbos capitis, si statim à cibo fiat. Galenus 3. de ratione victus comir. 54. habet hæc verba ¶ nullus lauari debet nec sanus nec æger post cibum vel potum, quia repletur caput, & cibus attrahitur à toto corpore, antequam sit concoctus.

Pari modo 3. de rat. vic. 55. habet ¶ melius est edere, aut bibere balnei turbatione sedata, & ea quam affert exercitium: quia statim sumere cibum ab exercitio, & balneo caput repletur, ac interdum facit, quod sumpseris supernatet.

Balnei vero beneficia proponunt 3. de rat. vic. 57. Hippocrates & Galenus vbi hæc habentur ¶ Confert balneum magis pleuritidi, quam febrī ardenti, quia mitigat dolorem, sputum maturat, educit, & spiritum facilem reddit. Valeat medicus quidam non infimæ conditionis, qui irrisit dum in pleuritide gratia mitigandi dolorem pungitiuum à nobis propositum fuit balneum.

Ecce



Ecce igitur quomodo causa fouens ipsos morbos non solum esse potest in humoribus, & in partibus solidis, verum etiam in sex rebus non naturalibus, si ipsis abutamur.

Reliquum est, ut aliquid dicamus, dum causa fouens morbos est in medicorum imperitorum erratis: dicimus de hac re admodum parcè, quia aliquod magnum voluimen non esset capax errorum medicorum. Nos tamen egimus in methodis nostris vitandorum errorum de hac re. Hic verò solum exemplorum luce aliquid tetigimus, hoc fine, ut in tractatu isto de remediorum inuentione nullum caput omittatur.

Postremo causa fouens ipsos morbos sæpissimè deprehenditur in remediis importunè à medicis imperitis exhibitis: sciendum enim est, quod omnia remedia aliqua ex parte nos lædunt: dicimus omnia, quia & illa, quæ sanant comprehendimus: vtimur tamen illis, quando maius ex illis nascitur beneficium, quam maleficium, sed quod saluberrima quoque remedia lædant, testantur omnes Auctores. Galenus lib. de opt. secta ad Trasylb. circa finem inquit ¶ remedia impunè non posse administrari, cum omnia sint præter naturam. Immo 11. meth. cap. 11. dicens, remedia omnia officere: recitat detrimenta, quæ ab oxymellite inferuntur ægotantibus, quamuis oxymel sit omnium auxiliorum mitissimum, habet hæc verba ¶ Difficile est inuenire auxilium, quod citra noxam prosit. Oxymel licet pro obstructionibus optimum sit, & suaue, & mitissimum omnium: attamen dicit Galenus tussim excitare, radere intestina, & lædere partes nervosas.

Præterea 3. de rat. vic. 38. Galenus dicit: acetum melancholicis aduersari: exhibetur tamen, quia maius affert beneficium, quam maleficium: maleficium efficit exsiccando: beneficium efficit deobstruendo: sic Galenus 9. de comp. med. per locos cap. 2. laudat acetum ipsum in melancholicis ratione obstructionis.

Insuper sunt remedia importunè exhibita, tum interna, tum externa, quæ sunt causæ fouentes ipsos morbos, qui deinde sanantur à natura morbos superante, & errores medicorum corrigente. Hinc vix medicis, si natura eorum errores non corrigeret. Externa remedia sunt importunè exhibita, dum ignorant causam fouentem, à qua solum remedium verum desumitur: exempli causa, si in pectus, vel pulmonem confluant excrementa, quæ pendeant ab aliis corporis partibus, & non à capite, certè remedia capiti applicata, cuiusmodi sunt stillidia, synapismi, irrhina, & masticatoria, maximè lædunt ipsum caput, quod erratum vtinam non esset ita peruulgatum.

Quod verò fluxio excrementorum non semper à capite pendeat, ut communiter putant parum versati medici, docet Galenus primo in primum epid. comm. 17. vbi testatur, fluxionem in pulmonem non semper à cap. sed interdum ab aliis quoque corporis partibus, capite tunc existente illæso.

Si de aliis remediis internis loquamur tories errant medici Plebei, quoribus non inueniunt specificum affectum internum, qui consistit non solum in solidis, sed etiam in maiori, vel minori vitioso succi abundantia.

Exempli causa Galenus 7. meth. cap. vlt. determinat, quando in vitiatis renibus diuretica habeant locum his verbis ¶ Dum renes multo vitioso succo abundant per cathartica purgandum: si mediocri succo vitioso per urinam,

Ecce quomodo maior, vel minor quantitas vitiosi succi variant remedium.

Si de remedijs externis sermo fiat, medici sæpissimè ex horum abusu fouent morbum, sicuti dum parti dolenti applicant laxantia: quod erratum maximè damnatur à Galeno 2. ad Glauc. cap. 2. vbi habet hæc verba ¶ In partem dolentem, si fluat materia nec oleum, nec farina triticea conueniunt: sed solum cum passo, oleo rosaceo, & cera fit molle vnguentum, quod sedat dolorem, & non laxat. O quoties nostrates cum oleis laxantibus, & farina augent malum in partibus dolentibus! Dixit, nec oleum, nec farinam conuenire: quia hæc obstruendo perspirationem insensibilem prohibent, quæ dum retinetur, fit ita acris & mordax, vt dolores valde augeantur.

Quod oleum obstruat Galenus 7. meth. cap. 6. testatur: ibi enim loquens de hæcticis in primo gradu dicit post primam & secundam lotionem, & post frictionem oleo inungendum, vt pori cutis constipentur, ne humiditas attracta resoluatur. Ex hoc loco colligimus, quod multi medici decipiantur, qui vt aperiantur pori oleo inungunt, nec vident porros oleo constipari & non aperiri.

Pari modo magno cum ægrotantium detrimento applicantur fomenta in corpore non purgato: quia nisi auferatur causa fouens, quæ consistit in excrementis, affectus externus magis exacerbat: ideo Galenus 2. in sextum epid. comm. 29. loquens de Simone concludit fomenta in non purgato corpore plus attrahere, quam resolueret: carpitque communem medendi vsum dum sprete totius purgatione applicantur fomenta, quæ longè magis nocent, quam iuuant.

Hinc Galenus 11. meth. 15. videns localia sæpè, & notabiliter lædere patientes, habet hæc verba ¶ Perfusiones, & cataplasmata conuenire ijs, quibus nulum in ventre est excrementum: cæteris sunt pernicies. An verò hoc Galeni diuinum præceptum obseruetur ab omnibus medicis nostri temporis, cæteri iudicent, quia certè nullus error est in arte medica magis communis: omnes enim in ventris dolore, vel obstructione, maxima quoque existente plenitudine, statim confugunt ad perfusiones, & cataplasmata, quæ vocantur à Gal. ægri pernicies.

Itidem Galenus 12. meth. 8. loquens de colica habet hanc sententiam ¶ si frigidus humor est interclusus in spatio duarum tunicarum intestinorum, vt non debemus perfusionibus, & cataplasmatibus calidis: reddit rationem Galenus: quia crassi humores liquantur, & in flatu vertuntur: vnde dolores ita intenduntur, vt intestina inflammantur: quare oportet prius coquere medicamento moderatè calido, secus perfusiones erunt causæ fouentes propositos affectus.

Galenus eodem cap. refert quomodo quidam rusticus dolore colico correptus se liberauerit sine perfusionibus, & cataplasmatibus calidis, ait se cinxisse, & comedisse panem, & allium, non dimittens consuetum opus, neque tota die bibisse, sed solum vesperi meracius, & inde dormiuit tota nocte, & vt refert, liberatur. Subdit allium discutere flatum, & non excitare sitim. Quare dum nostrates in dolore colico ex flatu vtuntur perfusionibus seu mappulis calidissimis excitant flatum copiosissimos & augent quammaximè morbos, ita ut causa fouens doloris colici sint ipsa remedia importunè applicata.

Ecce



Ecce quod causa fouens morbos modò est in contentis, modò in partis solidæ affectu, modò in vtriusque, modò in abusu sex rerum non naturalium & in remedijs importunè administratis à medicis, qui Hippocratis & Galeni doctrinam nunquam perceperunt.

## CAPYT IX.

*De remediorum inuentione desumpta à specificis affectibus ipsius sanguinis.*

**H**Actenus explicauimus causas fouentes, & affectus específicos à quibus elumi possunt remedia. Restat, vt de causis antecedentibus id est, de humoribus agamus.

Causarum igitur antecedentium, vel sunt humores, vel ichores: Galenus 2. in 6. comm. 37. dicit tot esse ichores, quot humores. Addimus ex Galeno quod morbi, qui fiunt ab ichoribus differant ab ijs qui fiunt ab humoribus, vt paulo infra ex Galeno ostendemus.

Quo ad humores: sanguis tenet primum locum, illum igitur prius diuidemus vt illas específicas differentias intelligamus à quibus remedia desumi possunt. Itaque sanguis vel est naturalis: vel nonnaturalis. Naturalis solum quantitate peccare potest: peccatum verò in quantitate vel est ob quantitatem debito copiosiore, vel pauciore: sanguis copia peccans dicitur polyæmia, id est copiosus sanguis.

Sanguis verò nonnaturalis ex Auicenna prima primi doc. 4. fit non naturalis vel per alterationem, vel per admisionem alienæ substantiæ. Dum igitur sanguis factus est nonnaturalis, alio remedio corrigitur, dum factus est nonnaturalis per alterationem, & alio longè diuerso, dum factus est nonnaturalis per admisionem alienæ substantiæ: sed quomodo fiant in sanguine alterationes, & quomodo fiant admisiones, paulo infra.

Si de plenitudine loquamur potius considerabimus sanguinis plenitudinem quod ad vasa, quam illam, quæ dicitur quod ad vires: hæc distinctio est Galeni 2. de natura humana comm. 1. vbi diuidit plenitudinem in illam, quæ dicitur quod ad vasa, & in illam, quæ dicitur quod ad vires, quæ est quando humores corrumpuntur, dicitur quod ad vires, non quod sint multi, & copiosi humores, sed quia ob eorum corruptelam vires ita grauentur, vt ab ipsis sentiantur perinde ac sentitur magna humorum bonorum plenitudo.

Præterea alia est plenitudo totius, & alia partis: hanc distinctionem tangit Galenus lib. de cur. ro. per s. m. cap. 11. loquens de suppressis mensibus: quia dū supprimuntur menses ob plenitudinem totius, quæ in venis magnis sit: tunc secunda vena cubiti menses deinde mouentur: si verò supprimantur ob plenitudinem partis, id est venarum ad vterum pertinentium, tunc non secatur vena cubiti, sed ipsa saphena.

Quo ad polyæmiam id est quo ad sanguinem quantitate nimia peccantem: Ex hac fieri possunt praua & lethalia accidentia: Galen. enim 4. de ratione vict. comm. 23. 26. & 27. proponit quatuor mala exitiosa, in quæ cadere solent qui nimiam sanguinis quantitatem habent.

Quorum primum est vasorum interceptio: quia ob sanguinis multitudinē interdum adeo repletæ sunt venæ, vt impedito spiritus, & sanguinis transitu, derepente sequatur sanguinis corruptela, & mors.

Inde Galenus proponit secundum malum, nempe quod à sanguinis multitudine nimia oriatur calidi natiui suffocatio, & extinctio, vnde sequuntur (ait) epilepsiæ, apoplexiæ, syncopes cardiacæ, apnæ, aphoniæ, & mortes repentinæ.

Tertium malum ob nimietatem sanguinis colligitur ex 4. de ratione vic. com. 27. quod est totius massæ sanguineæ putrefactio: quia prohibita perspiratione ob sanguinis nimietatem, illicd suboritur putredo.

Quartum malum est venarum ruptura vt animaduertit Galenus loco citato & lib. de bono corporis habitu.

Si verò ob nimietatem sanguinis non oriantur quatuor mala exitiosa proposita, fiunt saltem melancholici: Galenus enim 3. epid. 3. comm. 71. ait ¶ Qui habent multum sanguinis fiunt melancholici: ratio est: quia vbi est multus sanguis, ibi est multa fæx: bonus consumitur, fæx verò relinquitur: vnde melancholia.

Quo pacto verò cognoscatur, quando sanguis copia peccat: id certè non ex vnico signo, sed ex multorum syndrome colligitur: syndrome desumitur à sex signorum fontibus, nempe à substantialiter inhærentibus, id est à quatuor primis qualitatibus, quæ tactu dignoscuntur. Ab his quæ necessariò accidunt. A necessariò consequentibus. A iuuantibus, & lædentibus, & ab ex-euntibus.

A substantialiter inhærentibus: sicuti Hippocrates 4. de ratione vic. 26. dicit, frigus partium extremarum indicare polyæmiam.

Ab his quæ necessariò accidunt: hæc signa, quæ vocantur necessariò accidentia pertinent ad compositionem, videlicet ad magnitudinem, situm, numerum, & figuram: si de magnitudine loquamur, Galenus 1. de humoribus comm. 1. & 3. in 6. epid. 29. dicit venas elatas, & eminentes inter alia signa indicare polyæmiam: subdit Galenus eodem comm. de muliere emaciata, quæ collegerat multum sanguinis ob menses multo ante suppressos, cui detraxit multum sanguinis, licet fuerit emaciata: venas tamen elatas habebat: eius extenuatio non ab inanitione, sed à repletionē facta fuit: Ecce quod etiam in corpore emaciato venæ latæ, & eminentes indicant sanguinis copiam.

Ab his quæ necessariò consequuntur Hippocrates & Galenus 4. de ratione vic. in ac. 26. idem colligunt: quia dicunt faciei rubores indicare sanguinis copiam. Similiter Galenus 2. de temperamentis 4. inquit, habitum carnosum, seu carnis abundantiam indicare sanguinis copiam. Præterea lib. aduersus Erasistratum ait: sanguinis copiam caput replere, & tensionem in brachiis efficere: ruboris, habitus carnosus, & tensio facta in brachiis à capitis repletionē sunt signa necessariò consequentia illam temperaturam, quæ polyæmiam facit.

Ab operationibus læsis cognoscitur polyæmia: ex Hippocrate & Galeno 4. de ratione vic. 26. oculorum immobilitas, & dentium stridor idem indicant. Præterea 1. de natura humana 39. & 2. de humoribus 30. dicit Galenus simplicitatem,



citatem, & stoliditatem oriri à sanguine & polyæmiā indicare, sicuti animi acies, & intelligentia indicant bilem, ac firmitas, & prudētia melancholiam. Denique esse ad risum profusos, incontinentes, & impudentes, colligimus ex Galeno indicare polyæmiā.

Ab exeuntibus, habemus lac, & semen copiosum, ex Galeno 15. de Vsu. P. cap. 10. indicare polyæmiā.

A iuuantibus & lædentibus quinque loci desumuntur idem indicantes quorum primus est ab euacuatione: veluti si è naribus summo cum beneficio multus sanguis effluat: vel ab hæmorrhoidibus, vel ab vtero, indicatur polyæmia. Secundus locus est ab alteratione: quia ea quæ exsiccant, & refrigerant diminuunt sanguinem: ea verò quæ moderatè calefaciunt, & humectant accumulānt. Tertius locus à ieiunio desumitur: nam ex Galeno 3. in 6. epid. 28. si ieiunium tollit sitim & lassitudinem, indicatur polyæmia. Quartus locus est à somno desumptus: quia si per somnum tollitur sitis & lassitudo: indicatur sanguinis copia: quia ex Galeno 3. in 6. epid. 23. somnus tollit sitim: quia sanguis humectat partes internas, quas petit. Quintus locus desumptus est à morbis, qui fiunt à copia sanguinis, de quibus Hippocrates & Galenus agunt. 4 de ratione vic. in ac. 26. qui sunt oculorum immobilitas: manuum porrectiones: spirituum interceptiones: asphixia.

Addimus nos maximas hæmorrhagias: venarum rupturas, suffocationem calidi innati, putrefactionem totius massæ sanguinis, & apostemata exquisita indicare sanguinis copiam.

Præterea quæ ab Hippocrate proponuntur tex. 27. eiusdem libri sunt accidentia ob sanguinis putrefactionem, vertigines, aphoniæ, conuulsionēs, epilepsiæ, & paræplexiæ, quæ est vnius partis non principalis parælysis: vnde ob interceptiones sanguis priuatur calore, & vt dicit Galenus tanquam in cadauere concreuit. Ex his morbis animaduertimus sanguinem in venis copia peccantem, quo animaduerso statim remedium specificum intelligimus esse phlebotomiam.

Præterea sanguis quoque peccat quantitate, quando est debito paucior, nēpe, vt vix sufficiat pro totius corporis nutritione. Superius proposuimus sex fontes signorum indicatium sanguinem copia peccantem. In hoc loco verò, cum oppositorum eadem sit disciplina, facile ex signis oppositis colligimus quando sanguis erit iusto paucior.

Cæterum non est omitendum signum indicans paucitatem sanguinis propositum ab Auicenna doc. 4. cap. 2. primæ fen. quod his verbis exprimitur ¶ Minorari sanguinis generationem, & aliorum bonorum humorum ob venarum mæseraicarum obstructionem. Per bonos humores Auicennas intelligit bilem, & melancholiam naturalem: si de bile naturali loquamur, hæc per obstructionem mæseraicarum fit mordacior, & facile putrescit. Si de melancholia naturali per obstructionem fit acidior, & acerbior.

Quo ad sanguinem nonnaturalem Auicennas docet. 4. cap. 2. in 1. fen. docet, quomodo fiat: inquit enim in generatione sanguinis resultare quinque excrementa, duo naturalia, & tria nonnaturalia. Duorum naturalium. Primum excrementum est bilis, quæ mittitur ad vesicam felleam.

Secundum est melancholia, quæ aliene attrahitur. Trium verò nonnaty-

ralium resultant dum sanguificatio redditur deprauata, vel diminuta: dum est deprauata, pars tenuior sanguinis vertitur in bilem flauam, sed viciosam: crassior verò in melancholiam viciosam, quæ fit ex sanguine crasso adusto. Si verò sanguificatio est diminuta, resultat tertium excrementum videlicet pituita ipsa.

Deinde Auicennas loco citato diuidit sanguinem nonnaturalem, in nonnaturalem factum per alterationem, & in nonnaturalem factum per admixtionem alienæ substantiæ: ita vt in hoc secundo nonnaturali per admixtionem sanguis ex se sit bonus, optimus, & naturalis: sed redditur malus per admixtionem mali humoris. Nonnaturalis per alterationem fit, quando redditur iusto calidior, vel frigidior, vel humidior, vel siccior.

Causas verò calefacientes ipsam sanguinem, vult Galenus, lib. de causis morborum cap. 2. esse has quinque, videlicet alimenta calida, adhæsum rei calidæ, motum, prohibitam perspirationem, & putredinem.

Causæ vero refrigerantes eodem lib. de causis morborum cap. 3. sunt sex, nempe nimius motus, qui resoluendo calorem refrigerat, nimia quies, alimentum frigidum, adhæsum rei frigidæ, nimia obstructio, & nimia rarefactio. Passiue vero qualitates reddere possunt sanguinem humidiorum, aut sicciorum, ob hepatis varia temperamenta: sanguis tamen non potest per alterationem conuerti in atram bilem excedentem: quod patet: quia Galenus sexto in sextum epid. 21. habet hæc verba ¶ sanguis est adeo naturæ amicus, vt nunquam ita putrescat, vt fiat atrabilis, intelligendo per atram bilem illam factam ex aduersione flauæ: quia certum est partem crassiorem sanguinis (vt dictum est) posse conuerti in melancholiam adustam. Dam vero Auicennas doctrina quarta loco citato dicit, partem tenuiorem sanguinis conuerti in bilem: addit, dupliciter posse conuerti, videlicet per putredinem, vel per aduersionem. Quod vero putredo conuertat partem tenuiorem sanguinis in bilem & partem crassiorem sanguinis in illam atram bilem, quæ carbunculos valde rubros rubros efficere possit, Galenus quoque confirmat 2. de crilibus cap. 12. Quod vero non solum putredo, sed etiam aduersione sine putredine conuertere possit partem tenuiorem sanguinis in bilem, & crassiorem in illam atram bilem, quæ possit efficere carbunculos propositos, docet Galenus 2. de diff. feb. cap. 9.

Præterea sanguis duobus modis putrescere potest, nempe vel sub aliena forma, vel sub propria: sub aliena, veluti quando pars tenuior per putredinem conuertitur in bilem: sub propria, veluti quando sanguis, vel in pus conuertitur, vel putrescit sine alia conuersione, cuius finis tunc non est bilis, vel atrabilis, sed cinis.

Ex hac Theorica colligimus dari duplicem febrem synocham, vnam esse periodicam, aliam continuam non periodicam. Periodica fit dum putrescit sub aliena forma: dum vero pars tenuior vertitur in bilem, fit synocha, quæ habet quandam periodum de tertio in tertium: dum pars crassior vertitur per putredinem in melancholiam, eius periodus est de quarto in quartum. Continua vero non periodica est alteratio sanguinis sine conuersione in alios humores: hæc tollitur solum per phlebotomiam, & vocatur ephemera re, & non nomine. Ecce quomodo ex specificis affectibus sanguinis colligi possint



possint specifica remedia.

Si vero sanguis reddatur iusto frigidior & humidior, corpus statim tendit ad cachexiam, vel hydropem, vel œdemate aliquo opprimitur in quavis parte, præterquam in iecore, quod colligitur ex ipso Galeno 4. de prælag. expul. cap. 4. ubi ait, iecur non esse œdematis capax, quod multi non animaduertunt.

Subdit Auicennas cap. citato de sanguine factio non naturali per admistionem alienæ substantiæ, quod commistio duplex sit, alia ex sanguine alioque bono, & ex humore prauo aliunde veniente: alia sit mixtio intus facta in massa sanguinea: velut si per adustionem, vel putredinem pars tenuior versa sit in bilem, sit mixtio ex sanguine, & bile intus facta, id est in ipsa massa sanguinea.

Ex hac Theorica practici hæc duo considerant. Primum an sanguis à prauis succis aliunde venientibus ipsi sanguini commixtis sit vitiat, vel sine vitio conseruetur: secundum, an prauis succi qui sunt in sanguine sint facti prauis in ipsa massa, vel ita prauis aliunde preuenerint ad ipsum sanguinem. Vtraque consideratio est necessaria, quia vtraque remedia specifica colliguntur.

Denique sanguis miscetur vel cum pituita, vel bile, vel melancholia. Dum miscetur cum bile solet efficere erysipelas, quia transit per venas exiles. Si cum pituita per venas maiores. Hinc Galenus 4. aphorismorum 34. loquens de angina dicit, sanguinem biliosum facilius efficere inflammationem laryngis, quam inflammationem faucium. Sanguinem vero pituitosum viceversa, facilius videlicet efficere inflammationem faucium, quam laryngis: ratio est, quia venæ laryngis sunt tenues, & exiles: venæ vero faucium sunt maiores. Valeant qui anatomiam non vident, quia neque intelligunt specificas differentias affectuum, ut ostendimus 3. meth. vitandorum errorum: neque remedia specifica inuenire vnquam possunt.

## C A P V T X.

### *De remediorum inuentione desumpta à specificis affectibus pituita.*

**A**ffectus specifici, qui obseruantur ob pituitam, sunt illi, qui nobis inferiunt pro inueniendis remedijs: sed tales specifici haberi non possunt, nisi pituitam diuidamus in specificas differentias, sicuti Auicennas cap. de humoribus in prima sen. ubi post sanguinem statim diuidit pituitam in naturalem, & nonnaturalem.

Naturalis pituita dicitur semisanguis: de hac loquens Galenus 2. de ratione vic. comm. 30. ait: pituita naturalis cum chylo couertitur in sanguinem. Idem confirmat lib. de atra bile cap. 8. Hæc pituita in quolibet sanissimo & robustissimo ex cibis generatur, quod patet experientia, quia in robustis, qui sponte vomunt, illa obseruatur. Hæc est æque utilis, ac chylus. Hæc æque citò conuertitur in sanguinem, ut chylus. Hæc pituita ex eodem Galeno 2. de ratione vic. 30. non solum ex cibis pituitosis, sed ex optimis, & saluberrimis

fieri potest.

De hac pituita naturali loquens Galenus lib. de plenit. cap. 11. ait ¶ si hæc pituita naturalis copia peccat, efficit homines somnolentos, & pigros: quemadmodum nimia sanguinis naturalis copia efficit lassitudinem sensuum, corporis pigritiam, & reddit homines similiter somnolentos. Alia vero signa indicantia copiam naturalis sanguinis proposuimus, tum in commentarijs nostris artis medicinalis, tum in Auicennæ commentarijs.

Quo ad pituitam nonnaturalem, ex Auicenna cap. de humoribus doctrina quarta octo sunt species: quatuor sunt ex parte substantiæ: quatuor vero ex parte saporum.

Ex parte substantiæ sunt pituita aquosa, mucosa, vitrea, & gypseæ.

Ex parte saporum sunt acida, salsa, pontica, & dulcis.

Quo ad pituitam aquosam notandum, quod nisi euacuetur, fit mucosa, & mucosa: deinde fit vitrea, & vitrea tandem degenerat in gypseam. Deinde notandum est, pituitam aquosam valde differre ab aqua hydropicorum: quia pituita aquosa est capax coctionis: aqua vero hydropicorum est omnino coctioni rebellis, quia aqua hydropicorum non est pituita, sed vocatur crudus succus.

Differentia inter pituitam & crudum succum maxima est: quia omnis pituita nonnaturalis est recessus à naturali, & omnis nonnaturalis pituita in sua origine fuit capax coctionis: crudus vero succus neque in sua origine, neque post fuit vnquam coctioni capax: sic aqua hydropicorum neque in sua origine, neque post fuit capax coctionis: ideo nullo modo dici potest pituita: pituita gypseæ in sua origine fuit capax coctionis: ideo dicitur pituita: illa enim facta est immediate ex vitrea, vitrea ex mucosa, mucosa, ex aquosa, quæ in sua origine conuerteri poterat in alimentum, quod de crudo succo dici non potest, sed quomodo fiat crudus succus, infra declarabimus.

Quo ad pituitam mucosam, inter cætera incommoda Galenus §. aphorismorum comm. 62. loquens de causis sterilitatis, inter illas proponit mucosam pituitam: ibi enim proponit has quatuor sterilitatis causas: quarum prima est venarum angustia: secunda, pituita mucosa adhærens: tertia est vteri frigiditas, quamuis addat Galenus loco citato, quamlibet vteri intemperiem sterilitatem efficere posse: quarta est sanguis valde humidus.

Pari modo Galenus in casu vxoris Oæcetæ in comm. proponit sex causas abortus, inter quas proponit pituitam mucosam sub nomine cruditatis, hoc modo. Prima est saltus. Secunda horrenda videns. Tertia dolores magni. Quarta medicamentum electiuum. Quinta fluxus sanguineus, & sexta pituita illa mucosa, de qua agimus.

Hæc mucosa pituita ex Galeno §. de simp. med. cap. 9. efficit quoque scirrhus: ibidem tradit tres scyrri differentias dicens, alios fieri ex melancholia, alios ex pituita mucosa, & alios ab utroque humore.

Præterea vbicumque reperitur pituita mucosa laxat, & diminuit valde re-  
tentricem facultatem: Hippocrates 6. aphorismorum 59. dicit ¶ quibuscumque à coxendici dolore excidit coxa, & rursus incidit in ijs mucosa pituita superuenit, Galenus in comm. habet hæc ferè verba ¶ Ab hac pituita mucosa ligamenta reddi laxiora: ideo à cavitare articulum faciliè excidi, quamuis rursus



tursus non cum difficultate incidat.

Insuper Galenus loquens de hac pituita quæ est illa, quæ solet efficere œdemata quarto de prælag. expul. cap. 4. dicit hanc non penetrare iecur, ideo iecur non esse œdematis capax: comprobat hanc suam opinionem: quia læso iecore nunquam fiunt pulsus molles: si penetraret iecoris substantiam, procul dubiò pulsus fierent molles: subdit Galenus: antequam hæc pituita mucosa penetret minutissimas venas meseraicas, ita alteratur, & superatur, vt in sanguinem conuertatur, hanc Galeni doctrinam video paucos animaduertere cum sæpius dicant plurimi, iecoris substantiam pituitosa, & mucosa materia esse infaretam, quod fieri non potest.

Quo ad pituitam vitream: hæc excitare solet dolores vehementissimos: Galenus 2. de causis febrium 6. habet hæc verba ¶ si pituita vitrea in loco calido mouetur excitat vehementissimos dolores: hinc dum in collo intestino moratur, dolores colici vehementissimi excitantur. Idem confirmat Galenus 2. de loc. aff. 5. vbi loquens de doloribus colicis vehementissimis inquit ¶ Iniecto per clysterem rutaceo oleo excreta fuit pituita vitrea, quæ est frigidissima, & talis sensu tactus percipitur. Pari modo Galenus 1. de symp. causis 7. in fine concludit pituitam vitream esse valde frigidam.

Auicennas doct. 4. cap. 1. loquens de pituita vitrea ait, vitream interdum esse acetosam, interdum inspidam. Si fiat comparatio inter inspidam pituitam, & acetosam. Insipida est frigidior acetosa: quia acetosum non fit sine ebullitione, ac ebullitio non fit sine aliquo externo calore.

Dolores colici, qui à pituita vitrea sunt supponunt aliquem calorem: quia illa vitrea, quæ facit illos sæuos dolores colicos, qui reuera non sunt pungitiui, vel extensiui, sed perforatiui, non est insipida, sed acida, ex qua in ipsa ebullitione ab aliquo calore eleuantur flatus, qui penetrant tunicas colli intestini: illasque tanto cum cruciatu diuellunt, vt interdum interimant patientes: Ecce quod nisi adsit aliquis calor, flatus non sunt: ideo Galenus 6. epid. 3. comm. 14. habet hæc ¶ Res valde frigida non generat flatus, sed solum illa, quæ est particeps caloris, flatus generare potest. Hinc ob vsum immoderatum vini glacie refrigerati cessant flatus, licet ad maiora mala illud frigus corpora disponat.

Non tamen laudantur illi, qui in doloribus à flatu prodeuntibus sunt adeo solliciti in calefaciendo intus, & extra: dolores enim ob calorem promptius excitantur: ratio proponitur ab ipso Galeno 12. meth. cap. 8. vbi inquit, calidas perfusiones liquare humores, atque illos conuertere in flatus.

Senes decrepiti abundant hac pituita vitrea: quia pituita alimentalis, quæ in alijs ætatibus conuertitur in alimentum, in senibus decrepitis conuertitur in pituitam vitream, quæ illos nutrire non potest. De his senibus Oribasius loquens inquit, dum febricitant ex necessitate debent in accessionibus cibari: quia illorum pituita est vitrea, quæ in ipsis non conuertitur in alimentum, ideo sæpe & importune tum ferè certo mortis periculo debent cibari, quod quam sit perniciosum docet etiam Hippocrates 11. aphorismo primæ sectionis.

Quo ad pituitam gypseam: hæc est veluti lapis, quæ in articulis colligitur, podagram incurabilem facit: si in renibus, & vesica facit calculos. Hæc solū

generatur ex vitrea, vbi cumque diu moratur. Galenus 1. de loc. aff. 5. refert, in collo intestino in lapidem conuerti posse nempe gypseum, ob pituitæ vitreæ moram. Parimodo in bronchijs pulmonis à viscosa pituita facta vitrea ob moram facessit in gypseam.

Dum igitur vitrea seu mucosa pituita est in iuncturis, iuncturæ nullo pacto sunt calefaciendæ, quia, vt optimè sentit Hugo Tenenlis, eadem viscosa pituita, resoluta parte eius tenuiori, in gypseam facessit: ideo maximè damnat balnea sulphurea in ijs, qui iuncturas omninò liberar non habent, quoniam etiam aquosa pituita in iuncturis per hæc balnea crascescit, & abire potest in gypseam & nodosam podagram, quam soluere est impossibile.

Ecce quomodo nostratum plurimi maximè lædunt patientes podagricos: tum quia calefaciunt iuncturas oleis, & alijs topicis calidis: tum quia mittunt ad balnea ista miseros patientes, qui horum medicorum incuria prope- rant ad nodosam podagram. Ecce quod remediorum inuentio dependet quoque ex distinctione humorum in specificas differentias.

Quo ad quatuor pituitas ex parte saporum ab Auicenna doc. 4. cap. 1. istæ proponuntur: salsa, acida, dulcis, & pontica.

Quo ad salfam pituitam: falsedo ex Aristotele 4. sec. problem. 13. fit à causa calida absumente partem dulcem: sic ludor fit salius, quia à calore excitante sudorem resoluitur in halitum insensibilem pars dulcis: Galenus loquens de sale 11 de simp. medicina dicit fieri ex parte terrestri adusta: quamuis Galenus 2. de facul. nat. 8. dicat, quod quæ immodicè coquantur prius fiant falsiora: deinde amariora. Idem confirmat Auicennas doc. 4. vbi agit de pituita salsa.

Dum vero Galenus, & Auicennas proponunt duas causas falsedinis, nempe putredinem, & ichorem salsum, dicimus considerasse falsedinem, vt medicos, non vt Philosophos: quia Philosophi semper dixerunt portionem terream adustam esse veram & immediatam causam falsadinis: dicimus vt medicos: quia medici pro scopo habent remedia, alia enim remedia conueniunt falsedini factæ à putredine, & alia à falsedine facta ab humore salso producto à re adusta, quæ sit vel cinis, fuligo, vel alia res adusta: quoniam res adusta est causa interna falsedinis: putredo vero est causa efficiens externa. Centum enim possunt esse causæ externæ falsedinis ipsius pituitæ, sicuti putredo, cibi falsi, mora pituitæ: quia per moram resoluitur tenue & interim terræ portio aduritur, quæ si permisceatur pituitæ aquosæ illicò salsa fit. Itidem vicinitas rei calidæ, motus nimius, obstructio, & quælibet alia angustię species, quæ prohibet perspirationem potest esse causa falsedinis, sed externæ: omnes enim istæ causæ sub vnica calefaciente & adurente terreas portiones continentur, quæ proxima & immediata est.

Dum Auicennas dixit pituitam salfam fieri, vel à putredine, vel à re adusta, voluit tangere duas misturas, vnā, quæ est intus facta, quæ fit à putredine in ipsa met pituita; & aliam, quæ dicitur extra facta, quæ fit à serosa humiditate salsa, quæ de foris aduenit, vt permisceatur pituitæ: hæc misturæ variant curationem: quia alio modo tollenda est falsedo in pituita, si facta sit à putredine: & alio longè diuerso, dum pituitæ permisceatur portio terrea adusta. Ecce quod remediorum inuentio solum colligitur ex distincta & specifica affectione,



atione, & non à generica

Hinc Auicennas doc. 4. cap. de humoribus dicit falsam pituitam fieri, vel per alterationem, vel per admistionem portionis rei adustæ. Per alterationem fit pituita falsa, vel dum putrescit, vel dum diu in aliqua corporis parte moratur, per quam moram resoluitur tenue, & dulce & relinquitur terreum ex-calfactum, quod constituit falsedinem. Hinc fit, quod si pituita in capite per moram, vel per putredinem, vel per alias causas (quæ centum esse possunt) fit falsa, & stillet in pulmonem, potest corrodingo efficere phthisim: si in venas maiores, febres ardentes, vel syncopem minutam, si in vniuersum corpus confluat, & ad cutim expellatur facit pruritus externis remedijs inexpugnabiles.

Quo ad pituitam acidam, hæc quoque fit vel per alterationem, idest per ebullitionem, vel per mistionem alienæ substantiæ acidæ: fit acida per ebullitionem, dum portiones terreæ ex-calfactæ miscentur aquosæ pituitæ. Hinc pituita dulcis, & omnes succi dulces in loco calido detenti, nisi in summitate vasorum ponatur olei paucillum, egreditur aqua vitæ, & statim ebulliunt, & mox aciescunt: hoc certè bene sciunt, qui à vino separant aquam vitæ: quia dum aliqua portio per destillationem separatur, vinum quod remanet statim acidum fit. Fit quoque acida pituita per admistionem ichoris melancholici: melancholia enim ex Galeno 3. de loc. aff. 7. in tota massa respondet tartaro, quod acidum est.

Præterea sciendum, tres esse differentias acetositatis: vnam ante maturationem, qualis est in agresta, in multis fructibus immaturis, & in ipso ventriculo, dum cibus manet crudus, & incoctus: alia acetositas fit per maturationem vel coctionem sicuti est acetositas limonum, & acetositas melancholiæ. Tertia acetositas fit post maturationem, vt est acetum vini, vel acetum succorum dulcium. Quod verò melancholia naturalis habeat acetositatem per coctionem, patet ex Galeno 3. de ratione vic. 38. & 5. de Vsu. P. 4. vbi vult esse acidam, & aliqua ex parte acerbam.

Similiter Auicennas cap. de humoribus vult, quod melancholia habeat saporem medium inter acidum, & acerbum: Ergo talem aciditatem habet per maturationem, quia illa aciditas, quæ est ante maturationem est verè acerbæ seu ponticæ, illa verò quæ est post maturationem est valde acida, & hæc aciditas est illa quæ pertinet ad melancholiam adustam, & assimillatur aceto acerrimo: de hac enim Galenus 3. de loc. aff. 7. loquens ait ¶ In terram coniectam excitare bullas, & esse similem aceto acerrimo.

Causæ acetositatis referendæ sunt in has duas, nempe in materialem, quæ est humor aquosus: vbi enim talis aquositas non est, non fit aciditas, vt in oliuis & corimbis lauri, & iuniperi: vel vbi aquositas igne, vel in solatu absumpta est, acetositas non fit. Causa verò efficiens acetositatis est calor imbecillis vel vel extrinsecus, qui talis est, dum spiritus exhalant.

Ex hac Theorica tres scopos ad prohibendam acetositatem colligimus, quorum primus est amouere illa, quæ reddunt ventriculum imbecillum, cuiusmodi sunt nimius coitus, & nimix vigilix: nihil enim magis conseruat calorem ventris, quam somnus moderatus. Præterea animi passionēs reddunt ventriculum imbecillum, tum quia distrahunt calorem vitalem influentem

adventriculum, tūm quia ipsum spiritum corrumpunt, qui cum innato ad faciendam concoctionem conspirat. Secundus scopus est conseruare calorem proprium, ne exhalet, applicando ventriculo omentum suile, vel castratitertius est euacuare aquosam pituitam, sine qua in ventriculo neque ebullitio, neque acetositas fieri potest, euacuatur pillula de nitro, vel salapa.

Cuius vero temperaturæ sit acetositas quatenus acetositas est in commentarijs nostris primæ sen. quæst. 73. satis superque declarauimus, & cui subiecto primò, & per se conueniat: quam quæstionem quisque legerè poterit. Ecce quomodo ex distincta causarum diuisione vsque ad specificas differentias remedia specifica colligi possint.

Demum colligendum est, quæ symptomata fiant à pituita acida: Galenus igitur 2. de diff. feb. cap. 6. loquens de acida pituita habet hanc sententiam, si feratur pituita acida per corporis partes sensu præditas, ait, pituitam acidam efficere rigores sine febre. Præterea iste rigor sine febre obseruatus est ab Hippocrate in Vxore Epicratis, de quo casu mentionem facit in Epidemicis, & Galenus in comm. ait, rigorem superuenientem vxori Epicratis sine successione caloris factum esse à pituita acida.

Accedit quod si pituita acida parum putrescat fit Epiala: si multo magis putrescat, fit febris syncopalis humorosa, & præcipue si acida, & vitrea simul mixta sint.

Si verò pituita fiat acida non per putredinem, sed per mixtionem ichoris melancholicæ adustæ, inde nascitur rigor cum febre: si per mixtionem ichoris melancholicæ naturalis quæ est frigida & sicca, fient rigores sine successione caloris: si verò putresceret, efficeret hemitriteum. Demum hæc acida pituita ex Galeno lib. de plenit. 11. est quoque illa quæ efficit homines famelicos

Quo ad pituitam dulcem: hæc similiter fit dulcis, vel per alterationem, vel per admixtionem alienæ substantiæ. Per alterationem fit à frigido immoderato, quod impedit ebullitionem, vnde fit dulcis insipida.

Fit dulcis per admixtionem alienæ substantiæ id est ichoris sanguinei, hæcque est pituita dulcis manifestæ dulcedinis: quia solus sanguis, & eius ichor efficiunt manifestam dulcedinem.

Sed notandum, manifestam dulcedinem, (quæ solum in ore reuera animaduertitur) duplicem esse, videlicet moderatā, vel immoderatam: moderata fit ab ichore sanguineo naturali: hæcque ex Galeno lib. de plenit. 11. facit homines somnolentos: immoderata verò dulcedo fit ab ichore sanguineo putrefacto, & hæc dulcedo immoderata est similis dulcedini liquiritiæ, quæ est adeo nauseabunda, vt patientes non nutriantur, sed in atrophiam tendant, nisi prestò præbeamus ter vel quater in die spiritum olei calcanthini in iusculo parui pulli, qui spiritus tollit putredinem, & inde statim mitescit insignis, & nauseabunda dulcedo.

Quo ad pituitam ponticam id est acerbam, hæc fit talis vel per alterationem, vel admixtionem melancholicæ fecalis.

Fit acerbata per alterationem, dum pituita naturalis ita frigeat, vt pars aquosa ipsius acquirat qualitatem terream.

Fit acerbata per admixtionem melancholicæ fecalis, quæ melancholia ex sua natura maximè est acerbata. Hæcque pituita pontica per admixtionem exci-



at vomitum tam acerbi saporis, vt dentibus stuporem inducat. Præterea ob eius frigiditatem: valde impedit coctionem: hocque colligitur ex Galeno 2. de humoribus comm. 30.

Notandum, acerbum duplex esse, vel intensum quod ex Galeno 4. simp. 7. est terreum frigidum: talis sapor obseruatur in pituita gypseâ, vel est acerbum remissum quod vocatur austerum.

Præterea Galenus loco citato ait, acerba interdum à calido efficiente reddi dulcia, vt in castaneis, quæ coctione, seu elixatione dulcescunt.

Interdum acerba ab humido subtili, & à calore concoquente redduntur acida, vt dum maturescunt limones, citri, mala punica, & mala medica, ideo acerbum esse frigidius austero, & austerum acido, credendum est.

## CAPVT XI.

*De remediorum inuentione desumpta à specificis crudorum humorum affectibus.*

**G**alenus 1. de alimentis. cap. 2. ponit differentiam inter pituitam, & succum crudum: habet hæc verba *¶* vrinæ sedimentum propriè vocatur crudus succus, qui est puri similis: sed neque est graueolens, neque lentum, vt pus. Primo verò prælag. vlt. dicit sedimentum esse corpus medium per negationem extremorum inter humorem & pus: ergo nulla pituita propriè dici potest crudus succus.

Præterea 2. de facul. nat. cap. vl. dicit mucum, qui à cerebro stillat, non esse propriè pituitam, sed crudum succum: illa enim dicitur pituita, quæ in sua origine fuit pituita naturalis: hac ratione gypseâ dicitur pituita, quia in origine fuit pituita naturalis & nutritioni apta, itaut crudus succus dicatur ille, qui in origine effugit primam concoctionem, quæ in ventriculo fit.

Hinc Galenus 4. de tuen. sanit. cap. 4. & 3. de alimentis 33. dicit, crudum succum propriè generari ex vsu piscium crustaceorum: causa est, quia tales pisces in ventriculo magna ex parte effugiunt primam concoctionem.

Galenus 1. de ratione vic. comm. 18. loquens de crudo succo dicit, humores aliquos admittere coctionem, alios, sicuti sunt crudi succi non admittere, qui vero non admittunt, dicit, esse euacuandos, quia eorum non est expectanda concoctio, sicuti est aqua hydropicorum, & similes.

Præterea notandum de generatione crudi succi, quod crudus succus fieri potest vel defectu, vel excessu caloris prohibentis concoctionem: sic ventriculus, iecur, & cerebrum generare possunt crudum succum defectu, vel excessu caloris.

Ventriculus defectu caloris generat crudum succum ex prauo alimento, quod magna ex parte neque in chylum, neque in pituitam naturalem conuer- ti potest, sicuti sunt pisces crustacei, qui ex Gal. 3. de alimētis 33. neque in chylum, neque in pituitam, & tanto minus in sanguinem conuertuntur, sed effugientes coctionem in vrinæ sedimentum cedunt, sicuti colligitur ex Galeno 1. prælag. si verò hæc cruditas in corpore retineatur, corpus disponi-

*Crudus succus  
generatur vel  
defectu vel  
excessu caloris*

tur ad cachexiam.

Ventriculus quoque caloris excessu efficit crudum succum: nimirum quando cibi præcalidi, vel putridi conuertuntur, & in liquidas deiectiones faciunt, antequam chylus fiat, vnde Galenus 11. meth. 15. ait: ex errore primæ coctionis duo mala oriri: quorum primum est, quod ex cibo nulla utilitas colligi possit secundum quod cibus corrumpatur, & cum corruptella expellatur aliquid prioris cibi bene cocti.

Iecur similiter defectu & excessu caloris efficit crudos succos. Defectu, veluti quando ex intemperie frigida iecoris fit fluxus hepaticus, vel aliqua hydropis species. Pati modo excessu caloris iecur efficit crudum succum, quando fiunt deiectiones biliosissimæ, quæ sunt cruda.

Cerebrum defectu caloris efficit crudum mucum, qui ex Galeno 2. de facul. nat. vlt. non propriè vocatur pituita. Excessu caloris efficit crudum succum ob intemperiem calidam cerebri, vt obseruauit Galenus in Matrona Romana 5. meth. 13. in qua catarrhus acris descendebat in pectus cum magno phthisis periculo.

Sed certè non omnes animaduertunt, quando catarrhus fit à crudo succo: & quando à pituita, quod pro remediorum inuentione est obseruandum, quia curatio varia quoque fit. Quare sciendum est, quod quinque causis fieri potest catarrhus.

Primo fit catarrhus, vt dicit Aristoteles 2. de part. animalium 7. eo modo quo fiunt imbres in magno mundo, nempe per vapores, qui in parte superiori condensantur, vt in pluuiam cedant. Dicimus catarrhum factum à vaporibus esse crudum succum, & non pituitam, quia omnis pituita in prima origine fit in ventriculo: sic Galenus lib. de atra bile 8. dicit pituitam fieri in ventriculo: alios tres humores in hepate.

Secundo loco fit catarrhus ex Galeno 2. de diff. feb. vlt. dum caput per se est læsum, quo casu licet sanguis excurrans ad ipsum cerebrum nutritionis gratia sit saluberrimus: tamen ratione intemperiei ipsius capitis ipse sanguis aliqua ex parte in crudum succum facessit.

Tertio modo fit catarrhus, dum sanguis est vitiatuſ, quo caſu poteſt contingere, quod caput ex ſe fit bene ſanum, nihilominuſ ſanguis ad nutritionem capitis deſtinatuſ fit ita vitiatuſ, vt in capite aliqua ex parte in nutrimentum, & aliqua in crudum ſuccum degeneret. Hinc Galenuſ loco proximè citato de diff. feb. vlt. ait catarrhum fieri vel capite læſo, vel ſanguine vitiatò, Quod verò ſanguis vitiatuſ non ſit excrementum pituitoſum patet, quia ſanguis non poteſt conuerti in pituitam: quoniam non datur hic retroceſſuſ, vt ſanguis ruruſ fiat pituita: hoc enim repugnat actioni caloriſ.

Quarto loco fit catarrhus dum per fibras œsophagi ascendunt excrementa ventriculi : quæ deinde colliguntur super os maxillæ superioris quod palatum componit, illisque vacuis repletis sensim excurrunt per latissima oculorum foramina ad ipsum cerebrum. Nos dicimus, quod si iste catarrhus fit à pituita, non sit crudus succus: si fit ex piscibus crustaceis, esse crudum succum omnino incapacem coctionis.

Quintò fit catarrhus ex Galeno 9. de usu. p. c. i. dum meatus cerebri sunt obstructi: unde detentum cerebri alimentum in catarrhum conuertatur, licet nulla



nulla intemperie cerebrum vexetur. Cognoscitur hic catarrhus, si nates sic impedit, & ore aperto dormiant.

Ex hac Theorica de catarrho colligimus specifica remedia, quia si fiat à crudo succo purgantia in principio sine vlla præparatione dari possunt: quia hic catarrhus, neque præparationis, neque coctionis est capax: si verò fiat catarrhus ex pituita, vtimur præparantibus, donec appareant signa coctionis. Dum Hippocrates aphorismo 22. primæ sec. dicit concocta medicari, non intellexit de crudo succo, cuiusmodi est serositas hydropicorum, vel catarrhus factus ex vaporibus, qui semper liquidus est, sed intellexit de humoribus qui possunt concoqui: sic dum in febribus biliosis vtimur ante pharmacum præparantibus, illis vtimur pro pituita obstruente ipsos meatus, quæ est capax coctionis, dum enim bilis est liquida, & nulla sit obstructio, possumus in principio quoque electiuè purgare, sicuti natura ipsa interdum sua sponte id efficere solet.

Multi scripserunt de crudo succo, sed inter cæteros Valerius Martinus in suo doctissimo libro de medicinæ præcticæ collectionibus, in lib. de cruditatibus, opus profectò lucubratum, & diuinis refertum præceptis à Thesauris Hippocratis & Galeni, quicquid de cruditatibus dici possit in diuitias suas congeffit, quem librum quisque adire poterit.

## CAPVT XII.

*De Remediorum inuentione desumpta à conditionibus  
specificis ipsius bilis*

**G**alenus lib. de atra bile cap. 2. dicit, dari septem biles, nempe pallidam, flauam, vitellinam, rubram, porraceam, æruginosam, & isatidem, quam cæruleam vocamus.

Pallida & flaua ex Galeno 2. in sextum epid. 8. in sanis & bene valentibus inueniuntur, absque eo, quod symptomata præter naturam efficiant. Deinde Galenus 2. de facul. nat. cap. vlt. dicit, vitellinam esse præter naturam, non flauam, & pallidam.

Præterea ex Galeno 1. de natura humana comm. 25. dicit, pallidam bilem esse humidiores, & serosiores flaua, & flauam serosiores vitellina. Similiter quinto in sextum epid. comm. 14. ait, vitellinam fieri ex flaua crascescere à calore, & dum flaua aqueam substantiam absument fieri pallidam. Ex his colligimus has biles non differre specie sed secundum magis & minus. Pari modo Galenus 2. prælag. comm. 47. loquens de bile flaua, & atra bile habet hæc verba ¶ Flauus color videlicet ipsius bilis fit humore seroso torrefacto, pallidus verò fit seroso commixto flauo color: æruginosus fit seroso valde torrefacto: niger verò eodem supra modum torrefacto: qui nunc atra bilis pessima, aut exedens efficitur. Ecce quod omnes istæ biles differunt secundum magis & minus, & quod in quolibet humore sit propria serositas, qua ablata humores fiant veluti cineres.

Quod vero in quolibet humore sit proprium serum docet Galenus 2. in sextum epid. 37. his verbis ¶ In omnibus humoribus serosam quandam, tenuemque humiditatem reperiri, differreque has serositates pro natura humorum, quorū esse serum dicentur: eiusque infestissimum esse atræ bilis serū mi-

nus infestum flauę: hocque minus pituitę: omnium mitissimum esse sanguinis serum. Ex his Galeni verbis colligimus, quod tot sint ichores seu serositates, quot humores.

Pręterea colligimus, serositates iunctas cum suis humoribus efficere morbos longę deuotos ab illis, qui fiunt ab humoribus, sine suis ichoribus seu serositatibus. Hinc Galenus lib. de tumoribus pręter naturam cap. 9. docet *g* bilem cum suo ichore efficere erisypelas, bilem verò ichore suo spoliatam efficere herpetem: quia sine ichore exulcerat: cum ichore suo est temperatior, & nullam habet exedendi vim.

Ecce quod remedia quoque debent esse varia: illa enim quę purgant bilem ichore suo imbutam debent esse purgantia humoris aquosi: illa verò quę purgant bilem spoliatam ichore debent purgare bilem crassam, & non serosam.

Neque Auicennas potest defendi, dum doct. 4. cap. de humoribus tenet, bilem flauam constare ex bile & pituita aquosa, vitellinam verò ex bile & pituita crassa: neque iniuria reprehenditur ab Auerroë 3. col. cap. 3. dicente, dari vitellinam, quę non sit mixta ex bile & crasso phlegmate, & rectę quidem, quia illa serositas, quę est in bile pallida, in flaua, aut vitellina non est pituita, sed est propria serositas: Immo Galenus lib. de atra bile cap. 2. asserit, bilem flauam admixtione serosę humiditatis fieri pallidam: 2. de facul. nat. cap. vlt. ait, vitellinam fieri diminutione ipsius serositatis: neque dixit pallidam flauam & vitellinam esse mixturas ex bile, & pituita: immò 5. in 6. epid. comm. 14. Galenus tenet de ratione pallidę esse plurimum serositatis.

Neque in praxi, dum volumus euacuare bilem pallidam vtimur medicamento euacuante ipsam pituitam: satis enim nobis inseruit rhabarbarum, vel aliquod simile medicamentum purgans ipsam bilem. Quod verò singuli humores habeant proprium ichorem, sine quo humores non essent humores, Galenus testatur 2. in 6. epid. 37.

Auicennas potest defendi, dum dixit bilem flauam, & vitellinam esse mixtam ex bile, & pituita, quia ex ipso quoque Galeno 2. de facul. nat. cap. vlt. colligitur duplicem esse bilem flauam, aliam simplicem, & aliam mixtam ex bile, & pituita, & duplicem vitellinam, aliam simplicem & aliam mixtam ex flaua & pituita crassa. Auicennas cap. de humoribus dixit dari duplicem vitellinā, vnā factam per alterationem sine alterius humoris mixtura, quę fit à calore absumente aliquam portionem serositatis flauę, aliam esse mixtam ex flaua, & pituita crassa. Sed de hac re fusę egimus quęst. 79. in commentarijs nostris supra Auicennam.

Quo ad bilem mixtam cum melancholia, hæc ex Auicenna cap. de humoribus duplex est: alia dicitur intus facta per alterationem, dum videlicet vna portio bilis in ipsamet bile aduritur, & fit melancholia: alia dicitur extra facta, id est ex bile, & melancholia aliunde venientibus, quę ex Auicenna lococitato est minus mala, quam sit mixtura ex bile & melancholia intus facta per alterationem in ipsa bile, quę fit, vt dictum est, dum vna bilis portio solum aduritur & conuertitur in cinerem, maior verò portio conseruetur illibata & intacta: hæc mixtura ex bile flaua & cinere dicitur mixtura intus facta. Hęc mixtura ex bile & melancholia intus facta in ipsa videlicet bile ex Galeno 14. meth. 17. est illa, quę efficit phagedenam: ibi enim dicit, humo-



humorem efficientem phagendenam esse medium inter humorem facientem herpetem, & canchrum: humor verò faciens herpetem est bilis sine ichore, humor verò faciens canchrum est quando tota bilis conuersa est in cinerem, id est quando tota bilis est adusta, nō illo modo, quō igne res aduruntur, quia in corporibus viuentibus non est calor qui adurat, vt ignis, sed vocantur adusti, dum calore resoluitur humiditas, & relinquitur veluti cinis siue humor proprio ichore destitutus.

Differt herpes à phagædena: quia herpes, vt docet Galenus 6. aphorif. 45. c. exedit solam cutim: phagædena verò & cutim & carnem, quod non animaduertit Fernelius, qui collocauit phagædenas inter morbos cutaneos.

Quo ad mixturam ex bile & melancholia aliunde venientibus, quæ est minus mala, hæc (vt dicit Auicennas) est rubri coloris turbulenti referentis adhuc aliquam sanguinis imaginem: quia hæc melancholia est fæx sanguinis aliquid exalefacti. Ex hac mixtura fieri solent quartanæ biliosæ. Cognoscimus in corpore hanc bilem mixtam cum melancholia fæcali per excūtia, quæ ad rubrum colorem accedunt. Multi decipiuntur, qui videntes fæces tendentes aliqua ex parte ad rubrum putant esse sanguinem fæcibus mixtum. Distinguitur hæc mixtura à sanguine, quia sanguis non est ita obscurus, sicuti est hæc rubedo huius mixturæ.

Quo ad bilem porraceam, & æruginosam, notandum quod alia sit in venis, vt docet Galenus 2. præfag. 9. & lib. de atta bile: alia sit ex olerum cruditate: De hac Galenus 3. de alimentis cap. de melle habet hæc verba. *¶* Nobis sanis existentibus contingit porraceam gigni, quare nisi distinctè dignoscamus específicas bilium differentias, actum est de remedij inuentione.

Præterea alia porracea fit ex corruptela: sicuti lac, dum corrumpitur in ventriculo infantium, virefcit: hæc porracea per corruptelam in omnibus corporis partibus fieri potest. Hinc gonorrhea interdum est viridis: quia illa materia corrumpitur: hinc sanguis è vena extractus sæpè viridis apparet: pari modo mucus, & fæces virides ob corruptelam fiunt.

Alia demum porracea, vel æruginosa fit per adustionem factam in venis: hæc est ita perniciofa, sicuti est venenum. De hac loquens Galenus 5. aphorif. comm. 1. & 12. meth. vltimo refert, quemdam iuuenem hanc per vomitum reicientem illicò factum fuisse conuulsum: addit nisi totam reiecisset eadem die à viuis decessisset.

Conciliator loquens de hac venefica porracea seu æruginosa differentia 91. proponit opinionem cuiusdam Isach, qui putabat hanc æruginosam, & porraceam per adustionem factam esse adeo perniciosam, vt neque excitet febrem: quia illicò, antequam febris excitetur, interrimat, nisi de repente eadem hora euacuetur. Galenus 3. in 3. epid. loquens de phrenetico dicit, illum ab hoc virulento humore tertio die interemptum fuisse.

Sed de bile hæc sunt adhuc consideranda. Primò an bilis quæ facit febrem ardentem sit semper putrida. Secundò de omnibus bilium differentijs. Tertio an color viridis porracæ, vel æruginosæ fiat, vt dicit Auicennas ex colore nigro, & citrino. Quartò à qua bile febres biliosæ continuæ, & intermittentes fiant. Quintò an litis febris ardentis fiat à bile, vel à bilis ichore. Sextò an febris biliosa fiat à bile aucta, & non à putrida, vt tenet Paulus Ægineta.

Septimò an tertiana febris intermittens fiat à bile existente in venis, vel extra venas. Octauò an à bile adusta non putrida possit fieri febris periodica.

Quo ad primum: an bilis, quæ facit febrem ardentem, sit semper putrida. Auerroes 3. coll. cap. 4. reprehendit Galenum dicentem omnem calorem extraneum agentem in ipsos humores, illos efficere putridos: quia Aristoteles 4. meteororum, asserit à calore extraneo interdum fieri putredinem, interdum affationem: Infert Auerroes, ergo potest contingere quod calor extraneus efficiat affationem in ipsis humoribus, & non putredinem: ergo, infert Auerroes poterit fieri febris ardens à bile adusta & affata non putrida.

Hæc Auerrois opinio non potest defendi, quia hæc affatio in humoribus fluidis & liquidis dari non potest: vel dicimus quod semper ante liquidorum affationem præcedat ipsa putredo.

Quo ad differentias bilium, illas quoque proposuimus in commentarijs nostris supra Auicennam, quarum prima est bilis pallida, quæ vocatur bilis ochrea, quæ indicat naturâ frigidiusculâ: primus enim gradus coloris pallidi vocatur à Platone in Timæo 68. de hac loquitur Galenus 2. prognost. 38.

Secunda species bilium est lubrifica, hæc est intensioris coloris, quam pallida, & remissioris quam rufa id est ignea.

Tertia est rufa, cuius color ex Galeno 2. de crisibus 12. est remissior flauo. Inde errant plurimi qui putant, colorem rufum significare rubrum.

Quarta est subflaua, quæ assimilatur cortici citri.

Quinta est flaua, quæ vt docet Galenus 4. aphorif. 49. si in venis ebullit cum sanguine facit ardentem, eadem bilis, si in totum corpus mouetur, facit tertianam.

Sexta sunt tres vitellinæ biles, prima est mixta ex pituita & flaua. Secunda est vitellina simplex. Tertia est vitellina, quæ assimilatur vitello oui vetusti, quæ talis est per maiorem resolutionem ichoris.

Deinde sunt quinque biles rubræ: quarum prima est, quam Galenus 5. in sextum epidemior. 14. vocat serositatem sanguineam.

Secunda prouenit ab efferuescentia sanguinis tenuis, quæ concrefcit ad differentiam serositatis sanguinæ: ex hac fiunt febres synocha & erysipelata, de hac Gal. 1. de natura humana comm. 4. loquitur. Similiter de hoc erysipelate, quod fit ab hac bile 1. de comp. med. per genera cap. 4. inquit, frigida actû, quæ applicantur erysipelati, sæpè esse immutanda; quia dum applicita incalescunt, nocent: subdit, dum ardor erysipelatis cessat, abstinendum esse à refrigerantibus actû, & potentia.

Tertia bilis rubra facta est ex bile & melencholia fæcali, quæ adhuc conseruat aliquem colorem sanguineum. De hac agit Auicennas doct. 4.

Quarta bilis rubra est illa quæ crocea dicitur: hæc facit morbos lethales, & fitim inexpugnabilem. De hac Rasis 2. continentis, & Actuarius lib. de iudicijs vrinarum mentionem faciunt.

Quinta est bilis alimentalis, quæ ex Auicenna est rubri coloris: nonnulli ponunt inter biles rubras etiam bilem rufam: sed reuera rufa inter pallidas collocatur.

Deinde sunt tres biles porraceæ & tres æruginosæ, de quibus superius egimus.



Tres quoque sunt ifatodes biles, quæ sunt similes glasto, quarum prima fit ex adustione, sed adhuc non est conuersa in atram bilem: de hac Galenus lib. de atra bile. cap. 2. mentionem facit.

Secunda ifatodes est, quæ generatur, ex olerum esu.

Tertia ex corruptella: de quibus Galenus agit lib. 10. de simp. medicina cap. de felle.

Præterea datur bilis cærulea, quæ est diuersa ab ifatode, de qua Galenus 10. de simp. med. cap. de felle.

Intuper datur bilis rubiginosa, quæ fit ex bile naturali, & atra bile adusta: de hac Auicennas mentionem facit doct. 4.

Postremo datur bilis cærulea facta per congelationem, de qua Auicennas loco citato; sed fusius de bilium numero egimus nos quæst. 82. in comment. nostris in Auicennam. Ecce quod nisi omnes istæ specificæ bilium differentia dignoscantur, eorum quoque remedia specificæ delitescunt, quia remediorum inuentio solum dependet à specificis affectuum differentijs, & non à genericis.

Quo ad tertium, quod considerandum proposuimus, an scilicet color viridis porraceæ & æruginosæ fiat ex colore nigro & citrino, ut putat Auicenna, nos satis superque probauimus in comm. nostris in ipsum Auicennam, experimentis certissimis, quod color viridis fiat ex cæruleo & citrino contra ipsum Auicennam per ipsa vitra.

Stat enim hoc experimentum, quod si vitro cæruleo iungatur vitrum flauum statim oriatur color viridis pulcherrimus, si verò iungatur vitro cæruleo vitrum nigrum, color viridis non fit. Pari modo ostendimus colorem violaceum fieri ex cæruleo & rubro: sic ex terra cærulea, & citrina pictores componunt viridem colorem, ex cærulea & rubra violaceum.

Ex hac Theorica in praxi dignoscimus causam, cur peticulæ violaceæ minentur mortem, & cur ex bile cærulea & flaua fiat porracea, quæ à medico, ut est medicus non cognoscuntur, sed solum ut in optica versatus: peticulæ violaceæ prænunciant mortem: quia indicant sanguinis à veni egressi corruptellam: quia omnis color violaceus fit à rubro & cæruleo, & in corpore solus sanguis efficere potest colorem rubrum: sic partes extremæ liuidæ seu violacei coloris indicant iccoris apostema & mortem.

Hinc Hippocrates in adolenscente decumbente in foro mendacij videns in ipso liuida extrema, mortem prænunciauit.

Similiter color viridis à quibus principijs proueniat medicus ut medicus non intelligit, sed ut opticus, qui cognoscit viridem fieri à flauo & cæruleo: deinde intelliget remedia: quia si virides humores reiciuntur, medicamentum euacuans bilem iuuabit: si violacei: remedium euacuans sanguinem erit proportionatum: Ecce quod remedia non possunt inueniri, nisi ex differentijs affectuum specificis præcognitis.

Quo ad quartum, quod erat à qua bile tertianæ intermittentes, & continuæ ardentes fiant: Galenus 2. de crisib. 3. & aliis in locis vult, febrem tertianam, & ardentem fieri à bile flaua putrescente, de alijs bilium differentijs nihil dicit.

Auerroes 3. coll. inquit, febres biliosas non fieri à bile, sed à sanguine.

in quo dominatur bilis : quia si fieret à bile nunquam reciperet digestionem : hæc quæ dicuntur ab Auerroe sunt vera de bile in putrefacto esse, non de bile putrescente id est in fieri.

Saxonia & plurimi alij tenent omnes febres biliosas fieri à bile flaua, & nō ab alijs bilibus. Mercatus tenet febrem tertianam & alias biliosas febres fieri posse ab omni bile. Nos tenemus febres istas biliosas fieri posse ab omni bile putrida præter quam ab æruginosa adusta, quæ ab Auicenna inter venena collocatur.

Excipimus quoque bilem existentem in vesica fellea, quæ cum ibi sit in proprio loco non putrescit. Quod verò non putrescat probatur, quia dum est obstructa, vt in ictericis, tunc ob prohibitam perspirationem maximè putresceret, sed sic est quod vt plurimum icterici sunt sine febre, quare fallitur Fernelius, qui putat febrem tertianam fieri quoque posse à bile putrescente in vesica fellea.

Quo ad quintum, an sitis in febre ardente fiat à bile, vel ab ichore bilis. Respondemus, si Hippocrati, & experientiæ est credendum, sitim & ardorem potius ab ichore, quam à bile proficisci: Hippocrates enim 4. de ratione vic. tex. 1. asserit sitim, & ardorem febris ardentis fieri ab ipso ichore. Præterea patet experientia de ipsa siti: quia in siti intensa lingua non est flauī coloris: si ex humore bilioso immediatè fieret esset certè aliqua flauicie infecta.

Quo ad sextum an tertiana febris, quæ sit ex omnium consensu à bile: quæritur an in tertiana intermittente bilis sit in venis, vel extra venas: Galeno 2. de crisib. 6. & 4. aphorif. 63. dicit humorem peccantem in tertiana intermittente esse in ambitu corporis.

Fernelius putat, bilem peccantem esse circa viscera.

Iulius Alexandrinus & Caprilus dicunt, bilem in tertiana intermittente semper esse extra venas.

Saxonia modo in venis paruis, modo extra venas.

Nos verò dicimus semper in venis paruis reperiri, quod sic probatur: Galenus 5. de loc. aff. 7. loquens de quodam iuvene, qui febre ardente liberatur, dicit fuisse liberatum, quia transmissa fuit materia ad cutim: ergo per ambitum non intelligit extra venas, quia quando est extra venas cessat febris.

Quo ad septimum, an scilicet febris biliosa fiat à bile aucta, & commota per corpus, & non à putrida, vt tenet Paulus Ægineta lib. 2. cap. 19.

Certè hæc opinio reluctatur Galeno 2. de diff. 5. vbi vult febres biliosas fieri à bile putrida. Accedit quod in ictericis bilis est aucta & commota per corpus, tamen vt icterici non febricitant. Præterea bilis putrida est illa quæ maximè excitat expultricem ad expellenda excrementa: quia hæc non ita firmatur, vt non putrida: modò enim petit caput, modò cor, modò inuadit vnam partem, modò aliam, quod à bile non putrida non fit.

Hinc rectè Alexander aphorismo lib. 2. probl. 22. loquens de bile putrida dicit, hanc bilem efficere febrem, & tollere ipsam febrem: quia (ait) foras propellit se, & alia excrementa.

Quo ad octauum, an detur bilis aliqua adusta non putrida quæ possit efficere febrem periodicam.

Nicolaus Florentinus, & Valesius 5. contro. 19. dicunt dari posse synochum  
non



non putridam ex bile adusta, quæ efficiat periodum de tertio in tertium: colligunt hanc suam opinionem ex Galeno 10. meth. 6. vbi facit mentionem de Picrocholo, qui febricitabat ob bilem adustam non putridam: ibi enim clarissimè inquit illam tertianam picrocholi neque esse cum phlegmone, neque esse cum putredine.

Auerroes similiter in coll. vbi loquitur de synochis, asserit dari hanc periodum de tertio in tertium factam à bile non putrida, quare parum tuta est sententia communis medicorum, quod non possit fieri febris periodica sine putredine: nos in hac re sequimur Nicolaum Florentinum, Valesium, & ipsum Auerroem.

## CAPVT XIII.

*De remediorum inuentione desumpta à specificis melancholicorum  
succorum differentijs.*

**M**elancholia naturalis, est fæx sanguinis, quam Galenus 6. aphorismor. 33. vocat melancholicum succum, & non atram bilem, sed non video esse differentiam inter melancholicum succum, & atram bilem quia melancholia significat atram bilem, siquidem melam apud græcos significat nigrum, & choli significat bilem: ergo melancholia est nigra, seu atra bilis. Laudo tamen quod fæx sanguinis sit humor niger (vt Galenus admonet loco citato) sed non atra bilis, vel melancholia, quæ duo verba in idem recidunt.

Quod fæx sanguinis naturalis non debeat vocari melancholia, vel atra bilis: patet: quia ex Galeno 2. de facul. nat. vlt. fæx sanguinis naturalis, quam vulgares vocant melancholiam, est (vt dicit Galenus) pars chyli crassa & terrea, quæ in hepate subterfugit coctionem, illamque attrahit lien in alium usum. Ecce quod melancholia ex Galeno non fit ab hepate, (quod non omnes animaduertunt,) quia subterfugit hepatis coctionem, separatur tamen in hepate ab alijs humoribus.

Hæc melancholia naturalis, quæ est fæx sanguinis, dum aduritur valde differt à melancholia facta ex adustione crassi sanguinis, quod negabat Cardanus: sed facile conuincitur: quia fæx omnium rerum differt ab ipsis rebus: sic amurca, quæ est fæx olei differt à crassitie olei: tartarum quod est fæx vini differt à crassitie vinis: fæx vrinæ siue sedimentum vrinæ differt à crassitie vrinæ, ac meris: quia crassities, & tenuitas pertinent ad substantiam, fæx verò ad contenta.

Hæc melancholia naturalis, quæ est fæx probi sanguinis, vt docet Auicennas doct. 4. primæ sen. si excurrat eum sanguine propter suam crassitiem, & vim adstrictoriam, quam possidet dat robur sanguini, & spiritibus animalibus, ne ita facile resoluantur: vnde phantasmata, quæ recipiuntur in ipsis spiritibus animalibus redduntur minus fugacia, quo fit, vt melancholici sint prudentes, & sapientes: quia nihil aliud est prudentia & sapientia, nisi dum curo, & ictu oculi plura offeruntur intellectui, quod euenit quando phantasmata conseruantur stabilia, & non fugacia.

Præterea Auicennas doct. 4. primæ fen. docet, hanc melancholiam naturalem transire ad lienem duplici de causa: prima vt massa sanguinea expurgeretur hac melancholica. Secunda vt ab ipso liene ad ventriculum demandetur, tum vt virtute huius facis cibus in ventriculo diu retineatur, & inde concoquatur, tum vt virtute sua adstringendi, & corrugandi os ventriculi exciter appetitum. Gal. 5. de Vsu. P. 4. tradit hunc vsum, vt virtute melancholiæ colligatur venter in seipsum gratia detinēdi ipsum cibum, & gratia excitandi appetitum: quia Galenus 4. aphorismorum 21. inquit, lienem eructare humorem melancholicum non longè ab ore ventriculi, gratia excitandi appetitum.

Hinc factum est, quoddum hæc melancholia naturalis ad ventriculum non transmittitur, inde facile oriatur cæliacus, vel lienteria: quia isti duo affectus fiunt ob læsam retentricem, & non ob læsam concoctricem, vt multis in locis animaduertit Galenus.

Hæc melancholia naturalis distinguitur ab alijs succis melancholicis per quinque locos, nempe per substantialiter inhærentia, per necessariò consequentia, per motum, & operationes, & per iuuantia & lædentia.

Per substantialiter inhærentia melancholia naturalis differt à succis melancholicis præter naturam: quia ex Galeno 2. prælag. 47. & 2. de temp. vltimo, melancholia naturalis est frigida & sicca, alia omnes melancholiæ sunt calidæ. Cardanus tenet melancholiam naturalem esse calidæ temperaturæ, & non frigidæ contra ipsum Galenum, sed satis superque quæst. 90. in comin. nostris primæ fen. Cardanum reiecimus.

Per necessariò consequentia distinguitur melancholia naturalis ab alijs succis melancholicis: quia hæc sex est crassa & turbida: habetque saporem medium inter dulcem & acerbum, vt animaduertit Auicennas: hic sapor medius est acidus, vt colligitur ex Galeno 5. de V. P. 4.

Galenus 3. de loc. aff. 7. dicit hanc melancholiam naturalem assimilari feci vini: sed sex est acida, quamuis 4. aphor. 21. dicat Galenus: esse acidam quidem, sed non valde acidam.

Per motum distinguitur sex melancholica naturalis ab alijs: quia hæc naturalis, dum in corpore prædominatur, mouetur vespertinis, & nocturnis horis, sed sine læsione: melancholiæ verò præter naturam iisdem horis cum læsione euidenti mouentur.

Per operationes distinguitur: quia Galenus lib. de plenitud. cap. 11. inquit hanc melancholiam naturalem efficere homines sine siti, salua abundantes, & famelicos, alia verò melancholiæ non naturales efficiunt homines siticulosos, & inappetentes.

Per iuuantia & lædentia distinguitur melancholia naturalis ab alijs: quia hæc iuuat ad sapientiam & prudentiam, redditque homines firmos in opinione: neque sunt ita facile mutabiles: idem docet Galenus 2. de natura humana 39. & Aristoteles sec. 30. probl. 1. aliæ verò melancholiæ non naturales efficiunt homines insipientes, & imprudentes.

Quo ad melancholias nonnaturales, Auicennas proponit quatuor species, quarum prima est atra bilis facta ex adustione flauæ, quæ similiter per quinque locos ab alijs succis melancholicis nonnaturalibus distinguitur, videlicet per substantialiter inhærentia, quia tactui nostro se ostendit calidissimam.



nam. Per necessario consequentia: quia ex Galeno 4. aphorif. 23. est splendida, & ita tenuis, vt nunquam concrefcatur, & est maximè aquofa. Galenus loquens de plendore huius atræ bilis lib. de atra bile cap. 3. & 3. de loc. aff. 7. dicit splendorem atræ bilis à tribus caufis prodire poffe, nempe vel à iccoris intemperie calidiffima, vel à putredine, vel ab hepatis inflammatione.

Per motum distinguitur ab alijs quia hæc inordinatè mouetur, potiusque meridie furit, quam vefperi insequens adhuc naturam bilis.

Per operationes distinguitur: quia hæc atra bilis furiofa eft, illaque reddit homines adeo mærentes, & audaces fimul, vt ab audacia occultetur timor, immo adeo furiofe euadunt, vt ex Galeno 3. de loc. aff. 7. fibi mortem confeifcant, vel fe in puteum proiicientes, vel fe strangulantes, vel aliquo alio modo fe interficientes.

Per iuuantia & lædentia distinguitur atra bilis furiofa ab alijs succis melancholicis: quia in principio fuæ generationis copioffimo fero afinino frangi potest. Per lædentia verò distinguitur: quia ex Hippocrate 4. aphorif. 22. fi per vomitum, vel per aluum moueatur facillimè interimit, quod ab alijs succis non fit. Sed fufius in commentariis noftris in Auicennâ de ifta egimus.

Secunda fpecies atræ bilis eft illa, quæ fit ex aduftione pituitæ, quod vero perfuadet dari hanc melancholiam, eft non folum ratio, fed etiam experientia: ratio eft quoque auctoritate fuffulta: quia Galenus 7. aphorifmorum com. 42. tenet pituitam putridam poffe conuerti in bilem: addimus nos, fed fic eft, quod bilis ex omnium confenfu potest conuerti in melancholia ex aduftione pituitæ: ficuti vult Auicennas. Præterea patet experientia: quia diuturnæ quotidianæ interdum degenerant in quartanam: fed fic eft quod non potest degenerare in quartanam, nifi prius pituita conuertatur in melancholiam.

Hæc melancholia ex pituita adufta distinguitur ab alijs differentijs melancholicorum fuccorum per tres locos, videlicet per necessariò antecedentia, per necessariò consequentia, & per iuuantia, & lædentia. Per necessariò antecedentia, id eft per habitum pituitofum antecedentem & per diuturnam quotidianam. Per necessariò consequentia: quia in habitu pituitoso succedere folet affectus hypochondriacus, vel quartana. Per iuuantia, veluti fi in pituitoso melancholico iuuaret remedium euacuans ipfam melancholiam: ficuti funt pillule de hermodactilis, quæ fimul tollunt pituitam, & melancholiam.

Tertia fpecies melancholiæ non naturalis eft facta ex aduftione craffi sanguinis: de hac Galenus videtur aliquam mentionem facere 3. aphorifmorum 22. & 2. de facul. nat. vlt.

Hæc melancholia ex aduftione craffi sanguinis per tres locos distinguitur ab alijs quorum primus defumitur à proprijs accidentibus: duo enim obferuantur accidentia, alterum, fi in melancholico affectu accidat rifus: illa melancholia eft ex aduftione craffi sanguinis: Galenus enim 6. aphorifmorum 53. dicit rifum in defipientia indicare sanguinem. Alterum accidens, quod obferuatur in hac melancholia, eft quod fi fanguis euacuatur, cum fanguine ipfo concrefcatur quoque hæc melancholia.

Secundus locus indicans melancholiam ex aduftione craffi sanguinis col-

ligitur ex præcedenti aliqua euacuatione suppressa, veluti ex suppressis mensibus, vel hæmorrhoidibus, vel ex suppressa narium hæmorrhagia. De suppressis mensibus habemus duos casus in Hippocrate famulos, quorum primus est mulieris Cicici, quæ ob suppressos menses incidit in delirium melancholicum factum à crasso sanguine adusto suppresso. Secundus est casus mulieris morantis apud frigidam aquam, quæ ob retenta puerperia post partum decessit è viuis. De suppressis hæmorrhoidibus est casus Lucij Martij, de quo Galenus 3. de humoribus comm. 26. habet ꝑ Lucium Martium melancholicum fuisse liberatum his tribus remedijs, videlicet apertione hæmorrhoidum, venæ sectione, & pharmaco melancholiam purgante.

Tertius locus indicans melancholiam ex adustione sanguinis desumitur à iuuantibus, & lædentibus, veluti si in melancholico maxime iuuaret euacuatio sanguinis antea suppressi.

Quarta species melancholiæ est sæx sanguinis adusta, distinguitur per tres locos: quorum primus desumitur à necessariò consequentibus, inter quæ crassities humoris, & acerbitas necessariò consequuntur hanc sæcem melancholicam adustam.

Secundus locus desumitur ab operationibus, quas proponit Galenus 3. de loc. aff. in persona cuiusdam, qui sæce melancholica adusta vexabatur: de hoc homine hæc verba habet ꝑ Ille timebat ne Athlas, qui mundum sustinet pòdere grauatus mundum à se excuteret, & ipse cum illo periret. Præterea hæc melancholia efficit homines adeo taciturnos, vt non loquantur: hanc melancholiam obseruauit Galenus in vxore Dealeis, quæ correpta delirio melancholico semper tacebat.

Tertius locus est à iuuantibus: remedia enim quæ auferunt hanc melancholiam sunt pillulæ de lapide lazuli, & decoctum Epitimi Mesues. Quæ verò sint illa, quæ nocent ichori seu parti subtili huius sæcalis melancholiæ est acetum, vt admonet Galenus 3. de ratione vic. in ac. comp. med. 5. locos cap. 2. dum in affectu hypocondriaco laudat acetum, quia tunc iuuat solum (vt ait Galenus) quatenus tollit obstructions.

Auicennas doct. 4. diuidit sæcem melancholicam adustam in partem crassam, & subtilem: deinde ait, partem subtilem habere tres proprietates, & alias tres partem crassam. De subtili loquens dicit eius cinerem esse acrem, sicuti est acetum accerrimum. Secunda proprietas est quod ob maximam aciditatem hæc serofitas in terram proiecta, illam radat, attollat, serueat, & ampullas faciat. Tertia habet odorem ita acrem, vt ab ipso muscæ effugiant. Hanc doctrinam desumpsit Auicennas à Galeno 3. de loc. aff. 7. 2. de facul. nat. vlt. & lib. de atra bile cap.

Deinde Auicennas loco citato proponit tres alias proprietates partis crassæ huius melancholiæ sæcalis adustæ: quarum prima est quod sit minus acris, quam eius serofitas. Secunda quod sit amara: omne enim adustum est amarum.

Pars crassa melancholiæ sæcalis adustæ (vt docet Galenus 14. meth. cap. 9.) facit cancerum. Si verò cum parte crassa iuncta sit ichorosa facit cancerum vlceraum. Hinc Galenus de tumoribus præter naturā cap. 7. dicit canceros sine vlcere



vlcere fieri à melancholia sine feruore, feruorem verò ab ichore melancholiae, & non à parte crassa.

Dum Galen. lid. de humorib. præter naturam 7. & 2. de crisib. 12. dicit cancrum fieri à bile nigra. Tagaultius per bilem nigram intelligit melancholiam naturalem: sed errat, quia à melancholia naturali fiunt scyrri, & non cancri. Præterea ab illa melancholia fit cancer à qua fit elephantiasis, sed elephantiasis fit à melancholia adusta, & non à naturali. Galenus enim 3. de sym. causis 2. ait si melancholia peccat in toto facit elephantiasum: si à parte cancrum.

Sed de causis melancholiae nonnaturalis hæc pauca subnectimus. Auicennas doc. 4. dicit dari quinque causas, quæ efficiunt melancholias nonnaturales, quarum prima est calor immoderatus hepatis.

Secunda causa melancholiae nonnaturalis est lienis imbecillitas: idem Galenus 6. de loc. aff. 1. his verbis idem docet: si facultas splenis attrahendi ipsam melancholiam est imbecillis: sanguis statim incipit fieri impurus. Facultas attrahendi redditur imbecillis ob intemperiem frigidam: Galenus enim 2. aphorif. comm. 20. dicit hepatis minus attrahere ob usum frigidæ, vel aliorum frigidorum sanguis facile redditur impurus: ratio est, quia splen refrigeratus non attrahit melancholiam, ut par est, unde morbi melancholici sequuntur.

Sciendum igitur, quod splen non attrahit melancholiam ob quatuor morbos: primus est ob refrigerationem. Secundus ob obstructionem. Tertius quia splen sit nimis plenus. Quartus quia melancholiam attractam non possit expellere, quæ deinde retenta per moram adurit, & facit morbos melancholicos.

Simili modo Gal. de loc. aff. 7. ait, ob quatuor morbos vesicæ felleæ oriri morbos biliosos. Primo quia vesicula non attrahat ob imbecillitatem, id est ob intemperiem frigidam. Secundus quia sit nimis plena. Tertius quia sit obstructa. Quartus quia non expellat: similiter ob intemperiem frigidam: lien enim & vesica fellea facta sunt gratia expurgandi sanguinem, lien attrahendo melancholiam naturalem, qua delectatur, & voluptuose nutritur, qua saturatus illam melius præparatam transmittit ad ventriculum gratia retinendi cibum, ut dicit Galenus 5. de Usu. P. 4. & excitandi appetitum, quare si lien in hoc obundo munere deficiat, homines ex necessitate fiunt melancholici, quia relicta melancholia in sanguine, adurit.

Pari modo cistis fellea à natura facta est, ut attrahat bilem gratia expurgandi sanguinem, atque ut illa bile voluptuose nutriatur: mox illam transmittat per vasa cholidocha ad pyloron ad irritandas expultrices pro fecum crassarum euacuatione.

Tertia causa cur fiant melancholiae nonnaturales ex Auicenna est frigus congelans, quæ causa tunc habet locum, quando frigus externum maxime prohibet perspirationem, qua vetita calor præter naturam consurgit & per accidens ita calefacit, ut fiant melancholiae præter naturam.

Quarta causa melancholiae ex Auicenna loco citato est assidua mesenterij obstructio.

Quinta sunt morbi diuturni, ob quos aduruntur humores, & fiunt melancholiae nonnaturales: istæ sunt quinque causæ melancholiae nonnaturalis pro-

posita ab ipso Auicenna loco citato. Ecce quod nisi in melancholicis intelligamus, quæ nam fuerit causa ex istis quinque de remediorum inuentione iacta est alea: quia causæ diuersæ, vt plurimum indicant diuersa remedia.

## CAPVT XIV.

*De remediorum inuentione desumpta ab humorum motu.*

**E** Vacuatio humorum peccantium copia, qualitate, vel motu est adeo necessaria, vt Galenus in tractandis ægris illam præferat nutritioni. Secundo enim de ratione vic. in ac. comm. 40. reliquit hoc præceptum ¶ Minus malum est euacuare illos, qui indigent repletionem, quam replere illos, qui indigent euacuatione: ita ut ex Galeni sententia, ipsa euacuatio videatur esse magis necessaria, quam ipsa nutritio.

Omnis euacuatio humoris peccantis iuuat, solum illa euacuatio, quæ est merè symptomatica non iuuat, sed nocet: quia non est humoris peccantis: ideo euacuatio symptomatica duplex est, vna est symptomatica ratione excensitis, quæ est dum in morbo bilioso euacuatur pituita, vel melancholia, hæc semper est mala: alia est euacuatio symptomatica ratione temporis, sicuti si in morbo bilioso euacuatur bilis in principio, quando bilis non est concocta hæc aliqua ex parte iuuat, & non nocet: sic in Metone Hippocrates lauit caput, vt sanguis egrediretur per nates, vrina existente cruda. Idem euenit Pericli, & mulieri trimestri fætu grauidæ, quippe morbo existente crudo per sudorem symptomaticum ratione temporis sanantur.

Hippocrates 4. aphoril. 62. de icteritia dicit: si ante septimum superueniat, malum, habet 4. de ratione vic. 81. in febre biliosa si ante septimum icteritia cum rigore superueniat morbum soluit, si sine rigore perniciem denunciat. Cur cum rigore est salutatis, & morbum soluit: quia rigor est quedam euacuatio bilis: omnis enim rigor à bile fit. Auerroes 4. coll. 43. iniussè quidem damnat Hippocratem dicentem icteritiam ante septimum, malum quia solum est malum, quando ante septimum sine rigore superuenit: omnis igitur euacuatio licet sit symptomatica solum ratione temporis nunquam nocet: quid multa? humore ipsi turgentibus qui sunt valde crudi, si euacuentur, ægri sanantur.

Humores qui mouentur, vel sunt turgentibus, vel non turgentibus: turgentibus habet duas conditiones, vna quod sint tenues valde calidi, & non crassi. Secunda quod à seipsis habeant principium motus, & non à natura, id nos probauimus in explicatione 22. aphorilimi 1. sec.

De turgentibus loquens Galenus 4. de ratione vic. 63. ait ¶ modò efficiebant in egrotantibus tumores circa pedes, modò ascendebant, & strangulabant, aliaque symptomata varia efficiebant: quia de ratione turgentis humoris est habere imperum in varias corporis partes.

Si verò humores non sint turgentibus ait Galenus 2. de diff. feb. ult. & 3. de facul. nat. 13. istos non fluere à se, & proprio impetu, sed vel expelli, vel attrahi, secus omnis fluxio ad inferiora fieret, quod raro, & ferè nunquam contingit.



git, quod massa sanguinea relinquat partes superiores, & inferiores repleat.

Quo pacto verò fluant humores per corpus mira breuitate docet Galenus 4. aphorif. 2. vbi habet, quod euacuatio spontanea fiat, vel à natura, vel ab irritamento, vel quia vasa non possint continere, & hic est primus modus euacuationis. Hæc diuisio nunc proposita est communis euacuationibus naturalibus, & ijs quæ sunt præter naturam: quia euacuatio secundum leges naturæ non fit ab irritamento: sed fit quando natura saturata amplius illis humoribus non indigeant, vel quia vasa habeant læsam retentricem.

Euacuationem verò, quæ solum est præter naturam, tangit Galenus lib. de differentijs symp. cap. 6. vbi loquens de vteri profluuiio, dicit fieri vel ob diarrheam, vel ob irritamentum, vel quia sanguis sit serosus: Ecce quod tangit solum duos modos præter naturam: quia diarrheis reducitur ad irritamentum, & serosus ad vasa quæ non possunt continere.

Secundus modus euacuationis proponitur à Gal. 13. meth. cap. 3. vbi ait humorum fluxum fieri vel à parte mittente, vel à parte læsa trahente: pars trahens læsa attrahit tribus modis, nempe vel ratione doloris, caloris, vel imbecillitatis, vt infra.

Tertius modus euacuationis humorum traditur à Galeno 3. aphorif. côm. 30. exemplo fluoris alui, quæ conuenit euacuationi morbosæ, dicens alui profluuium fieri vel coctione, vel distributione vitiatum, vel ob bilis acrimoniam. Medici igitur debent in tractandis ægris diuidere vsque ad specifica, quia solû à specificis colligi possunt remedia ex vsu: alio enim remedio tollimus euacuationem morbosam, si fiat à coctione vitiatum, atque alio longè diuerso, si fiat ab acrimonia, vel à distributione deprauata.

Quartus modus euacuationis colligi quoque potest ex Gal. 7. in 6. epid. côm. 1. dum considerat qua ratione trahantur excrementa modo in vnam, modo in aliam partem, dicens tractum humorum, seu excrementorum fieri tribus modis, nempe, vel dolore, vel calore, vel ob partium imbecillitatem: ob calorem & dolorem à causa frigida trahuntur excrementa ex accidenti, quatenus & calor, vel dolor rarefaciunt partem dolentem, vel calore affectam, mox in partem rarefactam expulluntur excrementa: quælibet enim pars expellit excrementa in partem vacuam, seu ratam: deinde pars imbecillis recipit excrementa, quia non habet vim resistendi, seu expellendi in alias partes.

Neque statuendum est, vt nonnulli putant, fluxiones semper fieri à supernis ad infernas partes: quia experientia patet, sæpè ab infernis ad supernas confluere excrementa, si pars superna debilis sit. Hinc Galenus 1. epid. 1. côm. 17. loquens de phthisi ait, non solum à fluxione capitis, sed interdum ab alijs partibus inferioribus confluere excrementa in pulmonem, quare non est ferenda illorum inscitia, qui putant excrementa quæ sunt in pulmone à capite tantummodo prodire: potest enim contingere, quod fiat phthisis ab humore transmissio in pulmonem ab alijs corporis partibus, cerebro alioqui sano: quo casu, an conueniant stillicidia in commissa coronali, vel sinapismi, irrhina, & masticatoria, alij iudicent.

Nos omnes euacuationis modos reducimus ad sex, quorum primus est: quod euacuatio fiat à copia grauante ipsam expultricem.

Secundus è qualitate irritante: de his duobus modis mentionem facit Galenus 3. de symp. causis cap. 4.

Tertius modus est à frigido condensante: de quo Galenus 3. aphorif. com. 12. dicit *¶* frigus externum condensando exprimere, & comprimere ipsum cerebrum, perinde ac manus externa comprimeret spongiam aqua imbutam. Neque in hoc loco omittendum est Langij erratum, dum irridet medicos nostri temporis, quod credant frigus externum posse cerebrum comprimere: neque animaduertit hoc esse Galeni præceptum colo citato.

Quartus modus euacuationis est à calido liquefaciente, qui obseruatur in causione, & in hecticis febribus dum liquefcunt pinguedines, & dum per nares liquidus catarrhus stillat.

Quintus modus est ab imbecillitate retentricis partis mandantis, qui obseruatur in henteria, in cæliaco, in catarrho henterico, in fistulis, & alijs affectibus.

Sextus modus est ab imbecillitate expultricis partis recipientis: de quo modo mentionem facit Galenus 3. de facul. nat. 13. vbi dicit *¶* quamlibet corporis partem transmittere excrementa in partem imbecilliolem, & illam in aliam imbecilliolem, donec omnium imbecillimam inueniat, imbecilliam esse veluti cloacas, si expultrix in suo obscuro munere deficiat.

Quæ autem humorum peccantium euacuatio nos iuuat, & quæ non: Galenus plurima præcepta nobis reliquit: sed præcipuum est, quod illa euacuatio iuuat, & sanitatem restituat, quæ est totius & solius humoris peccantis, sit facta à natura, vel à medico.

Præceptum traditur 2. aphorif. comm. 15. vbi angina exemplo docet, quod quando expellitur tota materia peccans in fauces, non solum sanetur anginosus, sed præcipit, quod tunc nec venæ sectio, nec purgatio conueniant: subdit, signum, quod tota materia peccans sit in fauces expulsa, est, si patiens sit sine febre & urinam bonam habeat.

Idem potest dici de quacumque alia totali transmissione humoris peccantis in alias corporis partes, quod tunc nec purgatio, nec venæ sectio conueniant, si febris deficiat, & urinæ bonæ sint. An verò nostrates obseruent dictum præceptum, alij iudicent. Ego certè video non obseruari: quia in anginoso sine febre cum bona urina vt plurimum sanguinem mittunt, purgant, & alijs remedijs superfluis illum lacerant.

Quod verò de ratione salubris euacuationis requirantur duæ conditiones vna quod euacuatio sit solius humoris peccantis. Secunda quod non sit alterius non peccantis sine alia probatione, quisque attestabitur. Galenus lib. de purgantium med. facul. loquens de euacuatione humoris non peccantis habet hanc sententiam *¶* medicamenta, quæ bilem euacuant in hydropicis, sunt importuna: quia bilis in hydropico desideratur. Auicennas similiter vbi agit de hydrope vult, quod medicamenta euacuancia bilem in hydropico sint venenosa, valeant medici qui rhabarbarum præbent hydropicis gratia euacuandi ipsam aquam.

Antequam fiat euacuatio seruandæ sunt tres conditiones Galeno propositæ 4. aphorif. 22. ibi loquitur de optima crisi.

Prima condicio est quod præcedat concoctio humoris peccantis.

Secun-



Secunda quod facta sit separatio humorum peccantium à non peccantibus.  
Tertia quod solum fiat euacuatio humorum peccantium.

Quod verò euacuatio debeat esse solius & totius humoris peccantis patet ex Hippocratis aphorismis. 12. secundæ sectionis, qui est ¶ quæ relinquuntur in morbis reciduias facere consueverunt.

Si verò cum humoribus malis euacuatur spiritus, vel euacuentur boni & saluberrimi humores, euacuatio redditur perniciofa: sicuti dum in hydropico euacuamus totam aquam: vel in magno abscessu totum pus, quod animaduertit Hippocrates 6. aphorismis. 27. his verbis ¶ quicūq; suppurati, aut hydropici vtuntur, aut secantur, si pus, aut aqua tota euacuetur, moriuntur. Plurimi non intelligunt quæ de causa ob euacuationem puris, & aquæ, quæ sunt toto genere præter naturam, succumbant ægri, & moriantur. Galenus tamen qui omnia docet in comm. reddit hanc rationem: quia in euacuatione puris, vel aquæ ora arteriarum aperiuntur, per quæ virtus vitalis exhalat, quæ abeunte moriuntur.

Tradit etiam aliam mortis hydropicorum causam, quæ est quod depleto ventre cadat iecur, quod sustentabatur à tumido ventre, & ob casum septum quoque iecori alligatum deorsum cadat, vnde suffocentur, & moriantur.

Similiter Galenus considerans quam periculosa sit euacuatio, si cum prauis misceantur optimi, & saluberrimi humores, loquens de hæmorrhoidibus 2. aphorismorum 25. habet hanc sententiam ¶ Formidat vtramque immoderationem, siue ex toto supprimantur euacuationes, siue multum euacuentur, cur formidat? quia cum malis humoribus boni & salubres euacuuntur.

Euacuatio humorum minimè peccantium, & euacuatio spirituum solent parere hydropem, apoplexiam, & innumeros alios affectus præter naturam. De hydropse habemus in Galeno 2. de facul. nat. vltimo, & in Hippocrate 4. in 6. epid. 11. vbi dicunt post fluxum diurnum sequi hydropem: cur? quia cum malis humoribus euacuuntur boni. De apoplexia habemus Galenum 9. meth. 10. vbi habet ¶ Ex nimia euacuatione interdum oriri apoplexiam, eo modo quo erit aqua inter cutem: cur? quia euacuuntur cum malis humoribus boni, & saluberrimi, qui debent conuerti in bonos spiritus, quibus deficientibus sequi potest apoplexia, vel epilepsia.

Extat illud pulcherrimum Galeni dictum 6. aphorismorum 28. de epilepsia ¶ in articulorum affectu requiritur debilitas articulorum, sicuti in comitiali debilitas cerebri: quare cum euacuatio bonorum humorum reddere possit caput debile, inde fit quod transitus in epilepsiam vel apoplexiam reddatur facilis.

Diximus euacuationem debere esse solius, & totius humoris peccantis: quia interdum, si à morbo aliqua pars mali, seu prauis humoris relinquatur, id quod relinquitur potest quoque interimere: sicuti obseruauit Galenus in casu vxoris Philini, quæ pepererat: fluxeruntque puerperia solum quatuordecim diebus, & non vltra, nihilominus ex sententia Hippocratis & Galeni mortua est ab puerperiorum suppressione. Ecce quam necessaria sit euacuatio continua puerperiorum, non solum per quatuordecim dies, sed per alios plures: Ecce quod relictis humoribus malis, secundum aliquam partem, illi mali, & prauis humores interimere possunt.

Galenus considerans causam cur excrementa non possint expurgari lib. 2. de humoribus comm. 27. illas refert ad tria capita, dicens, non expurgari posse, vel ob imbecillitatem partium expurgantium, vel ob viarum angustiam, vel ob vitium excrementi. Idem docet 2. prælag. comm. 60. ubi loquitur de purulenti.

Præterea loquens Galenus 2. de humoribus 15. de vitio excrementi, ob quod non sequitur purgatio, habet hæc verba ¶ Incocti humores sunt infixi, & admodum stabiles in corpore, ut à medicamento dimoueri non possint, nisi coquantur: quare licet natura esset robustissima, medicamentis efficacissimis non est fidendum: quia dum humores sunt crudi, & omnino incocti per medicamenta euacuantur humores salubres: deinde insalubres in corpore stabulantur. Sed quod peius est, dum cruda euacuantur, in euacuatione fiunt tormina, & obstruuntur meatus per quos euacuantur cruda. Audite Galen. 4. de tuenda sanitate §. ubi habet hanc sententiam ¶ deiectio crudorum facit tormina, & obstruunt angustas vias, quod in medendi officio nullum malum simile esse potest.

Si vero propositos modos euacuationis in stilum practicum contulerimus, illos inueniemus mirifice à Galeno explicatos. Loquens enim de vteri profluvio lib. de diff. sympt. cap. 6. ait, vteri profluvium fieri vel ob diarrhesim, vel ab irritamento, vel quia sanguis sit serosus.

Addit, ob tres causas sanguinem fieri serosum. Prima causa est, quia renes illud non attrahant, quod retentum in venis vteri, vel narium, vel hæmorrhoidum profluvium, vel ut ipse dicit 3. de symp. causis 2. subitanæm hydro-

pem facit.

Secunda causa, cur fiat sanguis serosus est diminuta sanguificatio.

Tertia, quia vasa sint densa, & ob densitatem non exudet: sed in sanguine relinquatur serum: Ecce quod isti modi fluxionis respondent superioribus, nempe ijs de quibus dixit 4. aph. 2. quod scilicet euacuatio spontanea fiat vel ab irritamento, vel quia vasa non possint continere.

Præterea Galenus fusius agit de vteri profluvio 3. de symp. causis 4. dicens, menses nimium fluere aut propter nimiam desidiam, aut propter victum liberaliorem, aut propter vteri rheumata, dum scilicet totum corpus per vterum expurgatur, & dicitur fluxus muliebris, aut propter morbos vteri.

Hanc doctrinam possumus applicare hæmorrhoidibus, vel patientibus gonorrhæam; & demum omnibus locis, per quæ expurgantur excrementa: sic dicimus hæmorrhoides nimium fluere, aut propter nimiam desidiam, aut propter victum liberaliorem, aut propter hæmorrhoidum rheumata, dum per ipsas totum corpus expurgatur: aut propter morbos hæmorrhoidum. Idem dicimus de alijs: profluvium verò sanguinis per hæmorrhoidas, ut dicit Hipp. & Gal. 4. aphorismorum 25. est remedium curatorium, & præservatorium melancholicæ, si nigra deiciantur, aliter non est assuefacienda natura huic euacuationi. Ecce quod profluvium sanguinis floridi coloris in melancholia, nec curatorium, nec præservatorium remedium esse potest: quia illa euacuatio sola est salutaris, quæ est solius humoris peccantis.

O quoties parum versati in medicina euacuant sanguinem per hæmorrhoidas verè floridum in ijs, qui succo melancholico vexantur: quæ euacua-



rio quam sit pernicioſa, quiſque ex propoſita Hippocratis & Galeni doctrina colligere poteſt.

Per hanc doctrinam propoſitam nos adinuenimus differentias ſpecificas affectuum, quæ differentiæ ſolum indicant remedium ex uſu artis: ſecus remedia inſalubria, & ſymptomatica vocari poſſunt.

Si verò de menſtruis ſuppreſſis loquamur: ſi oppoſitorum eadem eſt doctrina, à cauſis oppoſitis ſupprimuntur. Dictum eſt ex Galeno ob nimiam deſidiam, ob victum liberaliorem, ob vteri rheumata, & ob morbos vteri, fieri vteri profluuium, ergo ex oppoſitis cauſis ſupprimuntur menſes. Hinc Gal. eodem cap. 4. 3. lib. de ſymp. cauſis, dicit menſtrua occultari, vel ob nimium exercitium, quod abſumat ſuperfluum: vel ob victum tenuem, vel vt dicit Galenus 5. aph. 57. ob robur vteri, quod robur nō admittat illud quod inſluit: quippe opponitur vtero rheumatico: quia vterus rheumaticus eſt debilis, & excrementorum cloaca.

Demum dantur morbi vteri, qui reddunt venas illas apertas, quæ omnia excrementa admittunt, qui deinde lunares purgationes impediunt.

Hinc Galenus 5. aphoriſ. 57. ait, menſtrua fieri pauciora, aut quia venæ obſtruantur, aut quia comprimantur: dum enim comprimantur ab aliquo tumore, medici tunc menſtrua nullo modo debent promouere, ſicuti Galenus 5. aphoriſ. 46. affirmat: his ſerè verbis ¶ ſi os vteri comprimatur à tumore non ſunt mouendi menſes: ratio eſt, quia tumores increſcerent, & affectus fierent ſæuiores: ideo tunc neque ſanguis per venas inferiores eſt euacuandus, neque per os illa, quæ mouent menſes ſunt ſumenda. Diximus non eſſe mouendum ſanguinem per venas inferiores, quia dum Hippocrates 4. aphoriſ. 25. ait, ſi ſanguis per ſuperiores partes exeat, malum; Galenus in comm. excipit ſanguinem è naribus, & merito, quia Hippocrates 5. aphoriſ. 33. habet hunc aphoriſmum ¶ menſtruis deficientibus ſanguis ex naribus fluens, bonum. Propoſuimus hos aphoriſmos propter illos qui, dum, vel à tumore, vel à nimia pinguedine comprimuntur, vteri vaſa, ſecant ſaphenam: nec vident tumores increſcere: baſilica igitur eſt ſecanda: vel ſi natura per nates ſanguinem ſufficienter moueret, relinquenda eſſet phlebotomia.

Similiter ſi loquamur de alui profluuiio, variæ differentiæ ante oculos obſeruandæ ſunt, videlicet diarrhæa, dyſenteria, & lienteria: iſtæ ſunt tres differentiæ genericæ: ideo debent diuidi in affectus magis ſpecificos, ſi velimus remedium inuenire. Valeant igitur, qui in ſupremo genere profluuij perſiſtentes adſtringentibus proceſſunt.

Quo ad diarrhæam: hæc fit à qualitate mordaci irritante expultricem Galenus 3. de ſymp. cauſis cap. 2. tradit quatuor differentias mordacis qualitatis, his ſerè verbis ¶ Quæ mordent in teſtina quatuor ſunt, ſcilicet medicamentum, ciborum corruptella, excrementa mordacia, & humores geniti in vlcere cacoethe. Ecce quod præſidium, quod inſeruit fluxui factio per corruptelam, valde differt ab illo, quod auferre poteſt excrementa mordacia à iccore genita, & ab illo quod auferre poteſt humores mordaces in vlcere genitos. Ecce quam vana ſit illorum medicina, quæ potius damnum inſert, quam aliquod beneficium.

Quo ad dyſenteriam ab vlcere in teſtinarum factam: hæc ſub ſe habet ſuas

differentias: quia alia est dysenteria, cuius protopathia, est in iecore, alia, quæ non amplius à iecore fouetur: sine hac distinctione in auferenda dysenteria, medici cæco, & inconsiderato impetu incedunt: hac distinctione Galenus loquens de dysenteria 4. de articulis comm. 40. dysenteriam proponit, quæ ab intemperie iecoris fouetur: habetque hæc verba ¶ Plerique medici negligendo iecore solum medentur vlceri intestinorum, & ægrum tandem præcipitant. O quam inconsideratè nostratum plurimi procedunt, dum in omni dysenteria impetu communis opinionis abrepti eligunt clysteres loricantes, qui vix ad principium colli intestini ascendunt, vlcerus tamen, vel in tenuibus, vel in medio colli, vel in confinio cum cæco erit. Similiter spreto iecore vtuntur per superiora loricantibus, quæ efficiunt obstructions: vnde iecur magis incenditur.

Si de Lienteria loquamur Galenus 4. aphorif. 12. & alibi ait, lienteriam fieri vel ob debilitatem retentricis ventriculi, vel intestinorum, vel ab vlcere occupante summas intestinorum partes, sicuti sunt aphæ: quare non concoctrix in lienteria est læsa, sed retentrix: excernitur enim per aluum cibus non mutatus: quia non retinetur in ipso ventriculo, vt par est: de ratione bonæ retentricis ex Galeno lib. de symp. diff. 4. est vt exæquet concoctrici: in lienteria non exæquat. Quare quot sunt affectus, qui efficiunt lienteriam, tot sunt remedia: neque vnum pro omnibus sufficit: remedium enim retentricem ventriculi firmans, vel auferens causam læsionis retentricis, differt à remedio auferente intestinorum imbecillitatem, vel intestinorum aphtas.

*Humores ad articulos fluentes comprimunt, distrahunt, vel replent.*  
 Amplius obseruandi sunt humores confluentes ad articulos, qui constituunt varios affectus specificos, quod medici plebei non distinguunt. Humores igitur conflui tres affectus specie differentes efficere possunt: quarum primus est extendere ligamenta. Secundus est comprimere, vt fit in nodosa podagra. Tertius est replere. Galenus loquens de hac distinctione 6. aphorismorum 49. ait: ¶ Podagrici non laborant conuulsione: quia materia confluxa non replet tendines, vel ligamenta, sed illa extendit vel comprimit: sed sic est quod remedia, quæ auferunt humores comprimentes, diuersa sunt ab illis quæ tollunt humorem replentem, vel extendentem, seu laxantem: oportet igitur firmiter tenere in arte medica, quod medici non sint medici, sed circulatores, ne dicam carnifices, nisi à præcognito specifico affectu colligant remedia specifica, quæ solum sunt vtilia, ac sola sunt ex vsu artis.

## CAPVT XV.

### De Remediorum Inuentione desumpta à conditionibus indicationis.

**C**onditiones, quæ reddunt indicationem specificam, quæ est ex vsu artis, sunt tres: quarum prima est, vt remedium desumatur à præsentia indicantis: secunda vt in remediorum administratione indicantium ordo obseruetur: tertia vt in quolibet affectu perpendatur an magis possit indicans, vel prohibens:



prohibens: semper enim potentiori est attendendum.

Quo ad præsentiam indicantis, certum est, quod nisi sit præsens, nullum remedium inueniri possit: eatenus præcauemus futuros morbos, quatenus auferimus semina præsentia, quæ temporis cursu pariunt futura mala. Neq; ab affectibus præteritis vlla prorsus indicatio, vel remedium desumitur.

Medici igitur, qui in lithiasi vtuntur refrigerantibus, quia lapillus non est conglobatus in renibus, sine præcedenti calore, ferunt argumentum desumptum ab Aristotele, quod nõ facit ad propositum, dum dicunt. Aristoteles 4. meteororum inquit ¶ quæ indurantur à calido, resoluuntur à frigido: sed calculus induratus est à calido, ergo refrigerandi sunt renes: non sequitur: quia ille calor, qui exsiccauit, & conglobauit calculum, non est amplius præsens: neq; licet colligere conclusionem rei præsentis ex medio præterito, Aristoteles enim 2. Post. vult quod tres termini in bona ratiocinatione sint congeniti, ipse enim proponit exemplum tale, est eclypsis, ergo fuit interpositio terræ, non valet, quia præsens non colligitur ex præterito.

Præterea sæpè à rebus frigidis læduntur renes: deinde in valde senibus, qui patiuntur lithiasim renes sunt frigidi.

Demum obseruandum est præceptum Galeni 9. meth. 5. vbi inquit renes facile lædi ex frigida potione: temperatura enim illorū ad frigidum vergit.

Quo ad ordinem indicantium: in omnibus ægrotantibus prius incipiendum est ab indicante vigente. Secundo loco à causis. Tertio à morbo, & inter morbos à potentiori: hæc in quintodecimo lib. meth. nostræ, vbi de indicantium æquilibrio egimus, satis superque declarauimus.

Hinc dum vires labuntur, vel propter nimias euacuationes, vel propter seuos dolores, vel propter alia symptomata, tunc spernimus non solum morbum, & causam morbi: sed etiam partem aliquam viuentem, quæ ad vitam non sit simpliciter necessaria. Spernimus morbum, & causam morbi, sicuti in cardialgia, de qua Gal. 9. meth. 5. ait ¶ Aquam frigidam cardialgiam momèto temporis sanare intus, vel extra applicatam: certè, aqua frigida auget, & cardialgiam, & eius causam; sed quia vt frigida vnit calorem naturalem, & vnitus alacrius cardialgiæ, ac mordacibus humoribus aduersatur, merito spernitur morbus, & eius causa, vt affectus vires auferens superetur.

Pari modo Hippocrates & Galen. 5. aphorif. 25. volunt, quod in squissimis doloribus articulorum aqua largè effusa soluat dolorem: cui dubium, quod aqua lædit articulos, & impedit insensibilem resolutionem humorum confluxorum in iuncturas: alio enim modo non tollitur podagra, quam per resolutionem insensibilem: attamen magis iuuat aqua frigida tollendo dolorem, quam nocendo articulis, & humoribus confluxis: quia ablato dolore statim cessat fluxio, & sequitur somnus, & ex somno concoctio.

Demum spernimus propter vrgens partem aliquam viuentem; sicuti in morfu viperæ, refert Galenus de rustico, qui falce, vt à vitæ periculo se liberaret, digitū amputaret. Sic in parte affecta gangræna, ipsa pars confoditur, vel tota comburitur. In aneurismate abscindimus arteriam, vt mortis periculum effugiamus. Lithomi, vt extrahant vesicæ calculum, vulnus in perineo magnum faciunt non sine vitæ periculo dilatando vesicæ orificium

forcipe: vna ratio est, quia potentiori, & vrgentiori indicati, prius est attendendum.

Præterea, vbi quoque nullum est vrgens, seruatur ordo, sicuti inter impedimenta, causas, & morbos, prius amouebimus impedimenta, secundo loco causas: tertio ipsos morbos. Sic Hipp. & Galenus i. in sextum epid. comm. 5. loquentes de calculo renum iubent, hunc ordinem esse seruandum nempe, vt prius corpus moueatur: deinde quod cibi non repleatur: mox vt veratro purgetur facta prius humorum præparatione: deinde vt vena poplitica secetur, & demum, vt vasa vrinaria mudentur. Ecce quod prius est euacuandum, & purgandum corpus, deinde renes mundandi. Qui enim renes vellet ante sanguinis euacuationem, & veratri exhibitionem mundare, is pelleret excrementa ad renes, & nephriticam passionem sæuiorem efficeret.

Similiter ordo obseruatur in vfu sex rerum non naturalium, de quo ordine Hipp. in epid. loquens tradit hoc ordine hanc sententiam ¶ exercitium, cibis & potus, somnus, & venus, id est corpus prius exercitandum: deinde sedato calore, ab exercitio acquisito, cibandum: post somnum, venus. Prius est exercitium: quia facta concoctione cibi præcedentis, fit per exercitium bona alimentum attractio, & prompta excrementorum expulsio: Gal. 2. de tuen. sanit. cap. 2. proponit tria munia exercitij: quorum primum est quod ex musculorum attritu, musculi per motum fiant duriores, & aptiores ad mouendum. Secundum per motum augetur calor genuinus. Tertium quod spiritus fiant velociores. Qui igitur præposterè vterentur sex rebus non naturalibus, maxime læderentur: veluti si post exercitium exercerent venerem, vel post cibum exercitium, non leuem noxam sibi ipsis inferrent.

Cæterum præcipua condicio indicationis est, quod potentiori indicanti semper sit attendendum: & si magis posset prohibens, quam indicans, vel è contra: spernendum aliqua ex parte quod minus potest. Possumus exemplis desumptis à sex rebus non naturalibus id ostendere.

Quare si de aëre frigido loquamur, licet in putridis febribus fugiendus sit, ne aëris frigiditate fiat cutis constipatio, quia ex prohibita perspiratione augetur putredo: tamen Galenus 10. meth. 8. videns maius colligi beneficium ex acre frigido, quam maleficium, erupit in hanc sententiam ¶ In febribus putridis eligendus est aer frigidus: quia ex frigida inspiratione maius oritur commodum, quam ex cute densanda incommodum: sententia est pulcherrima, dummodo totum corpus sit bene coopertum. Valeant igitur illi medici, qui febricitantes in cubiculis calidis tempore æstiuo claudunt: quod certè non sine magna ægrotantium pernicie fit.

De acre quoque calido Gal. loquens 3. de humoribus comm. 33. ait non esse secādam venam in tempore valde calido, licet indicans venæ sectionis sit præsens, cui certè non est attendendum, si prohibens magis possit.

Loco enim hoc citato Gal. proponit tres casus in quibus non est secanda vena.

Primus est in tempore valde calido.

Secundus non est secanda vena in pluritudine; dum sanguis expuitur: quia per venæ sectionem impeditur euacuatio per rissim. Hic casus ab imperitis medicis non animaduertitur.



Tertius casus quod in homine bilioso, seu picrocholo non conueniat sanguinis missio. Præterea lib. 10. meth. cap. 14. prohibet quoque in ætate, & regione æstuosa sanguinem mittendum, ratio est, quia vires languidæ ita prohibent, vt magis possint ad prohibendum, quam febres ad illum indicandum.

Si de cibo & potu loquamur, inedia in febricitantibus solet maius afferre commodum, quam incommodum. Id ex Gal. 1. aphor. comm. 4. colligitur, vbi hæc verba habentur ¶ In morbis satis est, vt æger seruetur debilis vsque ad finem vigoris, quo tempore potest cibus refocillari, & eger amplius non potest periclitari. Galen. ibidem addit, si vellemus vires conseruare, quales accepi-  
mus in principio, fieret additio ad morbum. Ecce quod abstinencia à cibo, licet æger sit debilis, magis affert commodum, quam incommodum, quæ doctrina à medicis plebeis non obseruatur & à mulieribus percipi non potest.

Si de pane loquamur, qui adeo est in vsu in acutis febribus, à Gal. 1. de ratione victus 25. ponitur inter cibos perniciosos: inquit enim Galenus ¶ in acutis ex sententia Hippocratis panis non datur, nisi facto iudicio, sed vsque ad iudicium vult solam ptisanam conuenire: panis enim est cibus plenus, & vt talis diuertit naturam à certamine cum morbo, & inde maius sequitur incommodum, quam commodum.

Præterea nulla qualitas est in pane, quæ febricitantibus conferre possit: Galen. enim 1. de ratione victus in acutis comm. 27. de pane habet, quod neque humectat, neque secet: in acutis febribus verò cibus debet esse humidus, & habens vim detergendis, cuiusmodi est ptisana.

Insuper 8. meth. 2. loquens de pane inquit, ¶ neque pars utilis, neque pars excrementosa panis, oui, carnis, & alicæ febricitantes iuuat: non pars utilis, quia hæc valde nutrit, & naturam diuertit: non pars inutilis excrementosa, quia est fumosa, & calida: quare nescio, quomodo nostrates possint defendi, dum in acutis oua, & carnes præbent, cum ab Hippocrate & Galeno ita dam-  
ne ntur.

Nec valet dum dicunt, quod virium debilitas magis possit ad indicandum cibum plenum, quam possit cibus ad prohibendum, quia obseruanda est Hipp. & Galeni sententia 2. de ratione victus 48. de distinctione debiliū, his verbis prolata. ¶ Qui sunt debiles ob inanitionē vasorū egent alimento. Qui verò sunt debiles ob dolores prægressos & morbi vehementiam non egent alimento: sed potius euacuatione: quare in omni debili non conuenit cibus: quia debiles ob morbi vehementiam cibus interimit.

Eandem doctrinam proponit Galen. 1. aphorismorum comm. 17. his verbis ¶ si vires sint debiles ob morbum, non ob cibi defectum, parum, & raro cibandum: si ob alimenti defectum, parum, & sæpè. Ecce quod in debilibus ob morbum, cibus non conuenit. Ecce quod in debilibus ob cibi defectum, inedia similiter non conuenit.

Non minus nocet inedia, quando non oportet, quam cibus vbi non conuenit: quia virtus neque permittit cibum plenum, neque intempestiuam in-  
ediam. Ideo Galenus 2. de ratione victus 44. erupit in hanc sententiam, diuinam quidem ¶ morbus manet crudus, non solum ob intempestiuam cibi oblationem, sed etiam ob intempestiuam inediam: quare nisi omnes distin-  
ctiones perfectè proponamus, & vsque ad ipsa differentias diuidamus,

actum est de inuentione remediorum pertinentium tam ad modum diætandi, quam medendi.

Si vero compareretur inedia cum exercitio, licet inedia sanis, & ægris conferat, tamen exercitium magis potest in prohibendo inediam, quam corporis dispositio in indicando: hæc doctrina est Galeni 2. aphorismorum 16. vbi inquit *¶* sanis non est præcipienda inedia cum exercitio, neque ægris sanguinis missio, purgatio, vomitus, frictio, nec vlla corporis motio cum cibi abstinentia bona est, intelligendo de omnimoda abstinencia: immo dum multa remedia administrantur, non inconuenit eodem die paulò pleniori cibo vtendum esse.

Si de cibo cum exercitio fiat comparatio, dum post motum incalescit corpus, cibis affert maius damnum, quam iuuamentum: Galenim lib. de salubri diæta 14. loquens de anhelitu difficili dicit *¶* anhelantes cibum non sumant, inde enim maius damnum ex cibo, quam vtilitatem colligunt addimus; nisi valde paucum sit alimentum, Galenus 3. in sextum epid. 2. reddit rationem his verbis *¶* post exercitium non statim edendum, quia corpus per exercitium incalescit: ideo prius expectare oportet, vt corpus refrigeretur.

Si de cibo, & potu dulci in biliosis loquamur, modò maius commodum, modò maius incommodum ipsi recipiunt: maius incommodum, quia, vt docet Galenus 3. de ratione victus 9. loquens de mulla, vbi est bilis abundantia, dicit illam verti in bilem, & inde maius incommodum ex dulcibus, quam commodum. Si vero dulcia transeant per aluum, vel vrinam (ait) maxime iuuare, quia vnà excrementa biliola secum ferunt: Si vero adsint obstructions, vel tumores, dulcia non pertranseunt, sed vertuntur in bilem maximo cum maleficio. ex hac Galeni doctrina debent colligere medici, quando syrapi seu conferæ dulces non pertranseunt, & quando vertuntur in bilem.

Side somno loquamur, videndum est, an magis noceat, vel iuuet: Galenus in omni re sapientissimus 4. aphorismorum comm. 67. habet hanc sententiam *¶* somnus semper nocet, quia per somnum ad profundum, seu ad ipsa viscera confluunt humores & boni, & mali: addit: sed ratione concoctionis, quæ fit per somnum, maius resultat beneficium, quam maleficio.

Addimus tamen nos, quod si tempore somni humores excrementosi sint agitati, sicuti in principio, & augmento paroxysmi dicimus tunc maius resultat maleficio, quam beneficium, & præcipuè in ipso cerebro, ad quod vapores tendunt.

Vt igitur res distinctius intelligatur, sciendum est, vapores esse duum generum: quidam eleuantur ex materia cocta, & isti semper sunt pauci, & viles: quidam eleuantur ex materia cruda, qui semper sunt multi, & perniciosi: quod confirmatur à Gal. in eod. comm. vbi dicit *¶* in somno magis euaporare humores crudos, quam coctos.

Addimus tamen, quod si æger multas noctes in somno duxisset, somnus superueniens quoque in augmento accessionis esset admittendus: quia maius afferret beneficium, quam maleficio.

Ecce quod in facienda medicina, nisi medici quotidie perpédant commodum, & incommodum, tunc non possunt mederi: quia oportet firmiter susti-



nere cum Galeno lib. de optima secta, quod nullum remedium possit impunè administrari, illudque esse optimum affert maius beneficium, quam maleficium.

Si de balneo verba facimus, similiter & damnum, & beneficium afferre potest. Galenus 8. meth. cap. 3. ait: in cruda destillatione si corpus sit plenum crudis humoribus balneum multò magis nocere, quam iuuare: vbi verò corpus non est plenum, vt in muliere Romana, de qua 5. meth. 13. balneum pro reuulsione, quo vsus est Galenus ab initio magis iuuare, quam nocere. Ecce quod sine hac distinctione, sciri non potest, an balneum noceat, vel iuuet.

Valde nocet balneum, dum sunt fluxiones ad partes læsas: vt in Podagra. Ideo Galenus 12. meth. c. 2. reddit rationem, cur in humorum confluxu balnea noceant, dicendo, balnea aperire vias, liquare humores, & reddere vias fluxiles: hinc est, quod balnea in Podagra sint valde nociua.

Præterea balnea sulphurea in podagra nocent, quia resoluunt tenue, & crassius excrementum relinquitur: vnde podagra nodosa fit. O quoties vidi podagricos ad balnea sulphurea se conferentes, & per balnea in nodosam podagram in fanabilem fuisse prolapsos!

Cætera quoque remedia omnia, & nocent, & iuuant: quare nisi medicus sciat distinguere, nunquam inueniet remedium ex vsu artis. Sic dicimus, somnifera nocere, & iuuare: anodyna, & fomenta nocere, & iuuare: pari modo corroborantia, repellentia, emollientia, & reliqua omnia nocere & iuuare: quare nisi prudens medicus distinguat vsque ad specificas differentias, ex quibus solum vtile remedium colligi potest, de inueniendo remedio actum erit.

Quo ad somnifera. Hæc modò magis nocent, quam iuuant: modò è contra: magis nocent, vt docet Galenus 7. de comp. med. per locos cap. 6. in anhelitu difficili, vt in asthma, nihilominus in his si nimium vigilant. Galenus 12. metaph. cap. 1. paxillum opij concedit. Sed addit, in omnibus ne quid nimis. Nos in his concedimus mediam vnciam Syr. de papauere, sumendo aquæ vitæ cochlearium, quod longè maius affert iuuamentum, quam detrimentum: hæc magis iuuant in doloribus à causa calida.

Galenus enim 12. method. 8. dicit, opiata in dolore à causa calida conuenire; non tamen à causa frigida: reddit rationem, quia narcotica reddunt tunicas densiores, & humores frigidos ineptiores ad resolutionem. Attamen si dolores sint à causa frigida, seu à pituita vitrea, quales sunt colici vehementissimi, spernitur narcoticorum maleficium: quia magis potest vehementia doloris ad indicandum quam eorum maleficium ad prohibendum, seruat tamen præcepto Galeni superius proposito, in omnibus ne quid nimis. Quod verò opiata conueniant in colica, si dolores sint vehementissimi, docet Galenus 9. de comp. medicamentorum per locos cap. 4. vbi dicit in colica vehementi per os per clysteres, & extra conuenire.

Quo ad anodyna hæc modò magis nocent: modò iuuant: magis nocent, si applicentur emplastica laxantia parti dolenti, in quam confluant excre-

menta: hoc Galenus animaduertit 2. ad Glauc. cap. 2. his verbis ¶ in partem dolentem si fluat materia, nec oleum, nec farina triticea conueniunt: sed conuenit ceratum ex passo, oleo rosaceo & cera: hoc enim est aliqua ex parte repellens vtilissimum, quod non est omnino destitutum, virtute anodyna. Apposuius hoc exēplum, quia vt plurimum nostrates chirurgi in tumoribus cum fluxione vtuntur laxantibus, quæ longè magis nocent, quā iuuāt.

Præterea longè magis nocēt, dum in omni vulnere vtūtur oleis laxantibus & suppurantibus, quæ plurima excrementa alliciunt ad partem vulneratam, illamque maximè inflammant: inde ægrum in anceps periculum deducunt. Nec viderunt Galenum 4. meth. cap. 5. dicentem ¶ membrum cæsum, vel acuto tello diuisum non esse tractandum suppurantibus: nisi diuisio à contusione fiat. Pari modo vulnera lædunt, dum illa dilatant; dum oleis laxantibus illa reddunt excrementosa: sed quod pessimum est, vulnus plurimis implent linamentis, quorum onere inflammatur: mox arētē fasciis obligant. Nec viderunt Galenum 2. de officina medica 32. sic loquentem ¶ fugiendum ne onere partes vulneratæ inflammētur. Similiter 3. de officina 31. habet hæc verba ¶ Vulnera ne modicum quidem pressum ferre: ideo liquidis tractanda. Hæc Galeni præcepta adiunguem obseruantur à Petro Caphio physico, & omni doctrinarum genere exornato: quā in chirurgico munere, si doctrinam, si experientia, & scēlices curarum exitus spectemus, longè aliis chirurgis in sanandis vulneribus excellit, quia vulnera citò, tutò & iucundè sanar, non laxantibus, sed exsiccantibus: non iis, quæ inflammant, sed prohibentibus inflammationem, eodem prorsus modo, quemadmodum præcipit Galenus.

Si de fomentis, quibus vtimur pro sedandis doloribus, loquamur, interdum nocent, interdum iuuant. Certè remedia inueniri non possunt, nisi præsciamus quando plus iuuant, vel nocent. Galenus docet quando plus iuuant 11. meth. 15. vbi habet ¶ perfusiones & cataplasmata conuenire iis, quibus nullum in ventre est excrementum: cæteris aliis (ait) sunt pernicies: quare dum in doloribus ventris sunt excrementa, nocebunt: cur nocēt Galenus 12. meth. 8. declarat, vbi habet ¶ perfusiones calidas liquare humores, illosque vertere in flatu. Valeant ergo illi, qui in doloribus ventris, in iunctionibus calidis, mappulis valde calidis vtuntur, quibus dolores magis intenduntur. Nos in læuissimis doloribus, vel tepidis anodinis vtimur. vel valde frigidis, quæ repellunt ad intus calorem, & cessant flatu, est Galeni sententia 6. epid. 3. comm. 14. quod res valde frigida non generet flatu. Similiter Hippocrates 3. aphor. 25. dicit aquam frigidam auferre dolores podagricos.

Si de corroborantibus loquamur, Hæc iuuant, & nocent: nocent dum corroborant ante euacuationem humoris peccantis. Hinc Galenus 8. de comp. medic. per locos cap. 2. habet hanc sententiam ¶ si materia tunicis est imbibita, per auxilium astringentium maximum inferitur nocumentum. Hinc dum Medici corroborant ventriculum, non euacuata materia imbibita: vel dum in alui fluxu vtuntur astringentibus, quando fluit materia peccans, vel quando est imbibita, & affixa tunicis ventriculi intestinorum, maximè lædunt miseros patientes.

Notandum



Notandum tamen est; quod si in parte affecta materia peccans sit in aliqua exigua quantitate, tunc nullum est inconueniens, vt pars corroboretur: quia roborata parte, id exiguum quod relinquitur à natura facile resoluitur: quod diuinum præceptum colligitur ex ipso Galeno 14. meth. cap. 9. vbi inquit ¶ in principio cancri esse repellendum ad partes principes, excrementum, si modicum sit: quia nisi subito repellatur, humor melancholicus statim distendit venas, quibus extentis cancer redditur incurabilis.

Quod verò ita sit, patet ex Galeno 6. aphor. comm. 38. vbi inquit ¶ radices cancri esse venas, quæ distenduntur ab humore melancholico, quæ venæ, nisi auferantur, cancer curari non potest.

Parimodo Galenus 14. meth. 17. loquens de herpete ait, si modicum excrementi repellatur ad partes principes, hoc modicum non lædit: quia hoc à visceribus resoluitur. Ibi loquitur de herpete Matronæ Romanæ, quæ nunquam poterat sanari medicamento ex alga, nisi postquam Galenus claculum in serum lactis (camonium coniecerit: causa est, quia non erat modicum, quod ad partem læsam confluebat: ecce quod corroborantia, & repellentia seu astringentia ante excrementi euacuationem, nisi casu quo illud sit modicum, semper nocent.

Si de emollientibus loquamur. Hæc modò magis nocent, quam iuuant, & modò magis iuuant, quam nocent: Sed quando magis iuuant nemo intelliget, nisi ad specificam rerum durarum distinctionem à Galeno propositam 5. de simp. med. cap. 9. confugiar, vbi dicit, dari tria dura, videlicet dura sicca, vt calli, & scyrri, dura repleta, vt apostemata; & dura vngelata vt peruiones, dura sicca dicit Galen. tolli humectantibus, & nō calefacientibus.

Parum versati in specificis affectuum differentiis, in scyrrhis vtuntur calefacientibus: hos reprehendit Galenus 14. meth. cap. 4. his propemodum verbis ¶ isti in duritie sicca calefacientibus resoluunt tenue, & egregiè curatio procedere videtur, sed paulo post tumores duri conuertuntur in scyrrhos incurabiles, nec vident duritiem scyrrhosam magis indicare humidū, quam calidum: quia res dura, & compacta, nisi humectetur, redditur resolutioni ineptissima. Pari modo de duris frigidis dicendum est, quod scilicet emollientia debeant esse calida, & non humida. De duris repleta, emollientia sunt illa, quæ euacuant.

Præterea plurimi sunt affectus præter naturam, qui maius præstant beneficium quam maleficium, qui indicant vt conferuntur, & nullomodo sanentur, sicuti sunt hæmorrhoides, fistulæ, gonorrhea, hæmorrhagia narium, vomitus consuetus & si qui alij sint.

Si de hæmorrhoidibus, & fistulis, loquamur, Galenus 6. epid. 3. comm. 39. habet hæc verba ¶ sicuti humores per hæmorrhoidas expurgantur, sic per fistulas: subdit, sicuti non est adhibenda curatio hæmorrhoidum, vt fors fert, sic non est ita temerè fistulis adhibenda cura: ibidem subdit, fistulas nō esse tollendas, cum euacuent prauos humores. Distinguendæ tamen sunt fistulæ cum Galeno 2. ad Glauc. 8. vbi habetur, quod aliæ sint fistulæ callosæ, aliæ sine callo: istæ quæ sunt sine callo, sunt tales propter sorditiem: hæc facile sanantur in pueris; sed in adultis quorum corpora sciant excrementis non sunt sanandæ.

Non semel vidi fistulas propè oculos, & circa podicem sanatas, & inde pernicioſa ſymptomata, & mortem fuiſſe ſecutam: Vidi etiam exterius ſanatas: interius verò ſinum relictum, & præcipuè circa podicem, à quo ſinu ichores acres, per tranſumptionem peruenientes ad collum veficæ, illa exciſaſſe ſymptomata, quæ in veficæ calculo contingere ſolent.

De his fiſtulis loquitur Galenus lib. 2. de tum. præter naturam cap. 4. vbi dicit, curationem fiſtulæ eſſe palliatam, dum exterius ſanantur, ſinu in parte interna relictò: quo caſu accipiendum eſt Galeni conſilium, 2. in 6. epid. 29. vbi dicit ¶ fiſtulas aliquandiu aſſuetas, mox ex aliqua occaſione aperimus: aperiuntur ferro, vel cauſtico, quibus apertis ceſſat omne malum, vrinam hoc fuiſſet præuiſum in Illuſtriſſimo Antonio Grimano qui circa podicem habebat fiſtulam, quæ ſolum extrinſecus erat ſanata, relictò ſinu in parte interna, à quo ichores per tranſumptionem penetrabat ad collum veficæ, inde ſummo cum cruciatu deceſſit è viuis.

Si de gonorrhea loquamur, à quacunque cauſa fiat, non eſt ſupprimenda: Galenus enim 6. in 6. epid. comm. 18. loquens de gonorrhea habet hæc verba ¶ ſi gonorrhea ſupprimatur, ægrotabunt: quare ſi tempore galeni non erat gonorrhea gallica, quæ eſt longe ſæuior, illaque non ſupprimebatur: tanto minus gallica erit ſupprimenda: quia magis poteſt prohibens quàm indicans: dum enim prohibetur, eſt in cauſa multorum malorum. Idem de aliis aſſectibus dicendum eſt.

Demum ſciendum eſt, non omnes corporis partes remedia permittere, licet ex ſe bona ſint, quia interdum nocumentum à remedio illarum longe maius eſt, quam nocumentum: quod inferitur, morbo: multa ſunt exempla: ſed hoc vnum non eſt omittendum propoſitum à Galeno 2. de comp. medicamentorum per locos cap. 3. vbi dicit, quod occipitium neque ſit adurendum, neque refrigerandum ob principium ſpinalis medullæ, quod ibi eſt: Quo pacto verò poſſint defendi noſtrarum plurimi, qui ſunt tam faciles in adurendo occipitio gratia reuulſionis quod remedium à Galeno damnari videtur, alibi diximus ſolum cuticulam eſſe adurendam, deinde ſenſim ſine moleſtia efficere cauterium, quod reuera in fluxionibus oculorum mirificè iuuat.

## C A P. X V I.

### De Remediorum inuentione deſumpta à reuulſione, & derinatione.

**Q**uatuor ſunt conditiones reuulſionis deſumptæ à Galen. 13. cap. 11. & paſſim in aliis libris.

Prima eſt, vt fiat reſolutio ſecundum rectitudinem.

Secunda per diſtantiſſima.

Tertia, vt trahantur humores ad ſuam originem.

Quarta vt fiat per vaſa communia.

Sed quid intelligat Gal. per rectitudinem, per diſtantiſſima, & per vaſa com.



communia, & quæ ex his quatuor conditionibus conueniat per se, & quæ per accidens reuulsioni: & an reuulsio conueniat solum fluentibus, & non fluxis, & fluxuris, & nos satis superque egimus lib. 1. meth. nostræ vitandorum errorum: quibus omnibus non exactè perceptis: neque affectus specifi-  
fici, neque remedia specifica inueniri possunt. Similiter egimus de conditionibus deriuationis.

Sed quæ à Galeno obseruantur in actu practito de reuulsione, & deriuatione, nobis sunt consideranda. Galenus lib. de curandi ratione per s. m. cap. 14. diuidit corpus vbi sunt renes in partem supernam, & infernam, & declarat quæ sit reuulsio, & quæ deriuatio: habet hæc propemodum verba ¶ renes iuuantur secta vena superna gratia reuulsionis, inferna gratia deriuationis. Quæ verò supra renes sunt, venæ pedum secantur gratia reuulsionis: ideo Galenus 6. aphoris. 36. habet hanc sententiam ¶ Quæ supra hepar sunt, vt curentur ex manibus sanguis extrahitur (per manus intelligendo cubitum: dum enim Galenus nominat: quam nos manum, ille vocat summam manum) quæ infra ex vena tali, vel ex venis, quæ sunt in poplite.

Hinc lib. de curandi ratione per s. m. cap. 19. dicit in vertigine, & comitiali potius ex cruribus sanguis est mittendus gratia reuulsionis. Ecce quod in vertigine & in comitiali affectu secanda est vena tali, gratia videlicet reuulsionis, & non cubiti vena, quia reuulsio debet fieri per distantissima: quare illi Medici, qui in morbis capitis secant venam cubiti non obseruant Galeni præceptum, & per consequens non iuuant.

Hippocrates, qui fuit diuinus in arte medica, obseruauit in epidemicis, beneficium, & maleficium, quæ contingunt in humorum motione. In Historia virginis decumbentis in vestibulo templi, & in Ægro Dealicis obseruauit, humores peccantes confluisse ad pedes & propter hunc motum ad inferiora hos duos ægros febre maligna fuisse liberatos: humores peccantes in istis erant propè cor: quare medicus naturæ imitator non debet sanguinem mittere per cubitum, nisi insignis esset venæ causæ plenitudo: sed debet reuellere à parte superna ad infernam.

Idem obseruauit Hippocrates in Larissa, & in Critone laborantibus maligna febre, in quibus natura tentauit humores malignos ad pedes propellere: sed Hippocrates ibi subdit hæc verba ¶ cum pedes non possent totum malignum humorem capere, factus est humorum retrocessus ad cor, & morte obierunt.

Ex his duobus casibus colligimus, quam sit utilis reuulsio non solum à capite ad pedes, sed ab ipso corde, & iecore, quæ reuulsio à medico naturæ imitatore debet fieri per sectionem venarum pedum, vel per vesicantia ipsa.

Neque negamus, reuulsionem eandem fieri quoque per cubitum, & summam manum, sed certè tutior est, vt fiat per distantissima ad pedes ipsos. Hinc Galenus 1. de humoribus comm. 13. loquens de vtraque reuulsione habet hæc verba ¶ manibus, & pedibus mordacia medicamenta applicantur gratia reuulsionis à capite, & à ventre.

Neque nobis facessit negotium disputatio de metasyncriticis, id est ab alio trahentibus, cuiusmodi sunt sinapismi, thapsia, & alia id genus, quod

videlicet Galenus dicat, metasyneritica non conueniunt in morbis a causa calida, sicuti in febribus malignis: quia omnis ambiguitas de medio tollitur dicendo, quod dum magis potest indicans ad indicandum, quam prohibens ad prohibendum, attendendum esse indicanti, non spreto tamen prohibente. Dum Galenus 2. de comp. medicamentorum per locos c. 2. & 3. de tuend. sani. 9. & 13. meth. ultimo damnat opinionem antiquorum indifferenter vrentium metasyneriticos, id est ab alio trahentibus, sicuti sunt sinapismi & thapsia: tam in materia frigida, quam calida, dicimus quod sinapismi vel thapsia, licet calefaciant partem illam externam, illum calorem ad internas partes non penetrare, quod non intellexerunt, qui putarunt vesicantia in febribus malignis cum delirio non habere locum: non intellexerunt, quia ipse Gal. 2. de diff. feb. ultimo dicit, quod partes proximæ, quibus applicantur sinapismi calefiant quidem, sed non remotæ. Contra illos qui dicunt vesicantia calefacere interna viscera: Deinde dicimus quod magis possit indicans, quam prohibens, quamvis Gal. 5. meth. 14. laudet ceratum ex thapsia applicando capiti gratia reuulsionis catarrhi acris, & corroden- tis, tamen magis potest hoc indicans, ut reuellatur, ne cadat in pectus, quā possit caliditas thapsiæ. Qui igitur tenent contra Anticennam & Leonice- num, quod ibi Gal. loquatur de catarrho frigido, neque Galenum loco ci- tando neque propositam methodum considerant.

Quo ad derivationem, hæc ut plurimum fit per proxima, hæc conuenit potius humoribus fluxis, quam fluentibus: sed quæ ratio id sit intelli- gendum, legendus est liber noster 14. method. vitæ dorum cironum, in quo hæc distinctè tractauimus. Præterea inter cætera præcepta Galeni illud dig- num est obseruatione, quod proponitur de derivatione 6. epid. 2. comm. 9. ubi dicit, Viriata vesica, & renibus præstat per aluum derivare: viriatis intestinis per urinam. Similiter dum alui fluxus tollitur vsa balnei, tollitur per reuulsionem: Galenus enim 3. de ratione viæ 8. habet hæc verba si quibus plura per aluum subducuntur, balneum sistit, qui vero supra modum aluum astricta habent, balneandi non sunt, ratio est, quia balneum reuellit à corporis centro. Nos propterea, non semel antiquos fluxus sanauimus balneo, quos multi vrinæ abiles reliquerant.

non aliquantulum C A, B, XVII.

*De inuentione remediorum, quæ exercetur per phlebotomiam & per purgantia medicamenta.*

**N**OS in commentariis nostris artis parum quæstulz, fasè egimus, a quo indicetur Phlebotomia. Hic solum pro remediorum inuentione pro- ponimus præcepta, ut inde colligi possit, quibus phlebotomia, & purgantia medicamenta non conueniant, & quibus conueniant.

Quo ad phlebotomiam, quibus non conueniat, primò obseruandum est præceptum Galeni lib. de curandi ratione per sanguinis missionem c. 7. ubi

damnat:



damnat phlebotomiam in vinosis, & gulæ deditis: his verbis ¶ Vinosi, & gulæ dediti non iuuantur multū purgatione, & phlebotomia, quia colligūt crudos humores, qui nec purgatione nec venæ sec. auferuntur: noto dum dicit nō multum iuari, quod supponitaliqua ex parte saltem iuari: quomodo verò iuuet, Gal.c.12. eundem libri dicit in his venæ sectionem per e-picrasim iuuare posse, id est parum pro vice.

Insuper Gal.14. meth.13. non vult, quod in legitimo erysipelate conueniat missio sanguinis: secundo verò ad Gla. dicit, in erysipelate non esse mittendum sanguinem; sed purgandam bilem. Paulus, Celsus, & Aetius secant venam in erysipelate capitis, & ceruicis: quia nisi bilis euacuetur, strangulat.

Falopius dicit hos non posse conciliari cum Galeno.

Ego autem respondeo, Galenum non asserere absolutè in erysipelate non esse mittendum sanguinem, sed dixisse non esse necessarium mittere sanguinem in erysipelate. Præterea dicimus quod in erysipelate omninò puro & exquisito, quod vix dari potest, nullomodo sit mittendus sanguis, quia sanguis est frænum bilis: quo fræno euacuato bilis longè sæuior redditur.

Idem dicimus de tertiana exquisita, & de causone exquisita, qui affectus vix inueniri possunt; sanguinem non esse mittendum: in erysipelate verò non omninò exquisito, & in aliis affectibus biliosis non omni ex parte exquisitis, sanguinem, si vires permittant, mittendum esse. Dicimus si vires permittant: quia in affectibus biliosis omninò exquisitis vires certè permittere non possunt.

Insuper Galenus 3. de humoribus comm. 33. proponit tres casus, in quibus non est secanda vena.

Primus est in tempore valde calido: quia tunc vires non permittunt.

Secundus casus est in pleuritide, dum sanguis expuitur, quia dum expuitur, si mittatur sanguis, statim impeditur euacuatio humoris peccantis per tussim.

Tertius casus est, quod in homine omninò bilioso non conueniat sanguinis missio ob rationes superius allatas.

Præterea lib.11. meth. cap. 14. asserit Galenus, cruditatem ventris, incipiente morbo, prohibere venæ sectionem, subdit ¶ in iuvene 30. annorum si habitus laxus, & mollis sit, pinguis, albus, & gracilibus venis, huic certè sanguinem non mittes, aut parum detrahes: in regione æstuosa & in ætate omninò non mittas.

Ad hæc Galenus 2. aphor. 29. loquens de Anaxione dicit, in statu, & augmento non conuenire venæ sectionem: habet enim hanc sententiam ¶ dum coquitur morbus, nec venæ sectio, nec purgatio conuenit: Addimus nos, sed coquitur morbus in augmento, & statu: ergo in his temporibus non conuenient purgationes electiue, vel phlebotomia. Hippocrates in aphor. inquit ¶ inchoantibus morbis, si quid tibi videtur mouendum moue: dum viget, & consistit, melius est quiescere.

Denum dum ægri, propter timorem perhorrescunt sanguinis euacua-

tionem, illis non est mittendus sanguis. De his Galenus 4. de tuenda sani. 4. habet hæc verba ¶ si quis propter timorē non admittit sanguinis euacuationem, huic loco phlebotomiæ alius deiicienda largius est.

Quod ad illa quæ indicant phlebotomiam, præcipuū indicans desumitur ab ipso Hippocr. 4. de ratione vic. tex. 19. vbi habet hanc sententiam ¶ si morbus est vehemens, viresq; affuerint, & ætas permiserit sanguis est mittendus. Sed hæc sententiā indiget aliqua declaratione: quia tunc est vera, nisi alię cōditiones impediānt, sicuti si eibus in vētriculo est incoctus, licet vires sint robustæ, & morbus sit vehemens, & ætas florens, tamen non est secāda vena, quod probatur per ipsum Galen. qui 3. epid. loquēs de illo Pythione, qui liberatur die 40. ad differentiam alterius Pythionis, protulit hæc verba ¶ cum homo iste esset in periculo, Hippocr. debebat prima die sanguinem mittere, si nullus inconcoctus cibus in ventre esset, vel omnino secunda die.

Collige, cibum incoctum prohibere sanguinis missionem.

Collige quoque ex eodem Galeni cōm. vbi de Pythione loquitur, quod non sit necessarium prima die semper præbere leniens medicamentum, vt nostratum plurimi putant.

Similiter Gal. lib. de curandi ratione per s. m. c. 11. habet ¶ In quacunque hora clysteres, & venæ sectio administrari possunt: dūmodo cibus nō sit in ventriculo; Ecce quod præter condiciones allatas ab Hippoc. quæ sūt, morbus vehemens, vires, & ætas florens, pro missione sanguinis requiritur etiā, vt cibus sit concoctus, & à venis mēlataicis attractus.

Dum verò vires sunt admodum debiles, & impendet periculum de ipsarum casu sicuti in fluxu alui, cum stomachi morfu, si Galen. credendū est 1. ad Glauc. 14. non est mittendus sanguis, neq; est purgandū: Præterea neq; dū adest periculū futurę syncopes, neq; in cachexia, in hydrope, neq; in cardialgia, in vomitu cōtinuo, neq; in legitimo erysipelate est phlebotomandum.

Quare inspiciendæ sunt vires, non solū præsentēs, sed etiam futuræ, Gal. enim 9. meth. 5. docens an certo aliquo die sit phlebotomandum, dat nobis hoc præceptum ¶ non numerū dierū inspicere oportet, sed vnum robur virium, sit sextus, septimus, octauus, vel aliquo ex sequentib. dieb. in missione sanguinis: quate in quacunque die vires sint validæ permittunt largam sanguinis euacuationem; si non sint ita validæ minorem perferunt euacuationem: Gal. lib. de curandi ratione per s. m. cap. 13 ait ¶ Quidam 70. annorum perferunt venæ sectionem, quamuis in minori quantitate, quam iuvenes: Ecce quod solum attendere oportet vni virium robori: quia viribus permittentibus, larga quoque sanguinis missio fieri potest.

Hinc si venæ in gracili corpore appareant valde repletæ, & aliquid non prohibeat, & vires permittant, venæ deplendæ sunt: hanc sententiā desumpsimus à Gal. 6. aph. 30. vbi ait, quod venæ repletæ in gracili ostendant sanguinem corruptum abundē esse in venis, qui certē non est euacuandus nisi vires permittant, & cruditates adēptæ sint: quia ipsæ obstructiones, quib. tales abundant per phlebotomiā tolli non possunt. Hanc doctrinam desumpsimus à Gal. 11. meth. 14. ibi habet hanc sententiā ¶ Per phlebotomiam nō tollimus obstructionem, vel putredinem, supple immediatē: mediātē tamen quatenus natura leuata sarcina alacrius aggreditur ad superandam



cruditatem, per phlebotomiam tolluntur.

Demum non est mirandum, si in gracili adesse possit sanguinis multitudo: quia Gal. lib. 6. epid. 3. comm. 29. asserit, quod interdum gracilitas, & inania possit à repletionem prouenire: ibidem referri casum mulieris emaciatæ, cui prima die sanguinis sexquidram detraxit, postmodum iterum librâ, tertio die semilibram circiter, quo facto, maxima cum aliorum medicorum admiratione illam sanitati restituit: quare concludit Galenus hoc eod. com. aliquos graciles habere multum sanguinis, aliquos crassos paucum: ita ut non valeat consequentia, corpus est emaciatum, ergo paucum sanguinem habet, neque valet est crassum, ergo multum habet.

Si verò sanguis sit ita copiosus, ut obstructions efficiat, vel factæ sint obstructions ab aliis causis, dummodo corpus non abundet cruditatibus, tunc nullomodo sunt tollendæ obstructions: nisi prius sanguis euacuetur. Quod præceptum nobis reliquit Galen. 8. meth. 4. & 11. meth. 4. his verbis, si prius tolleremus obstructions, ante sanguinis euacuationem, magis impingeremus obstructions: ratio huius dicti est, quia apriendo meatus in ipsos, pars crassior sanguinis transmitteretur, & sic obstructions fierent maiores: Euacuato verò sanguine, venisque aliquantulum depletis, id accidere non potest: quia nulla est ratio, cur transmittatur pars crassior extra suum locum, cum venæ ipsæ post euacuationem factæ sint capaciores.

Quo ad locum per quem in variis morbis sit facienda sanguinis euacuatione, si consideremus ipsam plenitudinem, quæ nobis inseruit in omnibus aliis inflammationibus. Auerroes 7. coll. 29. & Rhasis voluit, prius secare venam lateris oppositi: deinde venam eiusdem lateris: quæ sententia, ubi adest maxima sanguinis plenitudo, habet locum. Vesalius vult in omni pleuritide venam dextri brachij esse secandam: quia pleura ipsa nutritur sanguine prodeunte à vena sine pari, quæ vena à dextra parte oritur.

Amatus Lusitanus reiecit opinionem Vesalij, quia dicit venam sine pari habere ostiola, quæ admittunt sanguinem ingredi, & non egredi. Quæ instantia certè est inuincibilis. Gale. verò lib. de ratione curandi per sang. m. capit. 16. dicit venam sectam eiusdem lateris esse præsentaneum remedium in ipsa pleuritide, in opposito verò latere, aut nullum, aut paruum esse remedium. Nos tamen in maxima sanguinis plenitudine laudamus latus oppositum & illico secamus venas eiusdem lateris.

Demum sanguis euacuatur, per hirudines, & per cucurbitulas: inter Græcos solus Actuarius fecit mentionem de hirudinibus, applicandis venis scdalis. bus lib. 3. cap. 3. Græci autem secabant illas venas ferro.

Quod euacuationem faciendâ per cucurbitulas, si de euacuatione sanguinis euacuandi per cucurbitulas affigendas dorso loquamur, habemus præceptum Auicennæ 4. 1. cap. de ventosis, ubi improbat cucurbitulas esse dorso affigendas: quia auget palpitationem attrahendo sanguinem ad thoracem.

Eadem ratione in febribus ipsis sunt dandæ cucurbitulæ: quod præceptum certè vulgares medici non animaduertunt: si verò loquamur de euacuatione facta per venas pedum vel crurum: Galenus lib. de curandi ratione per s. m. cap. 11. habet hæc verba ¶ Plenitudines à suppressis mensibus ortas per crura euacuabis; ex hoc loco colligimus duas esse posse plenitudi-

*circumscripta thoracem*  
*affigenda ad*  
*palpitationem ad*  
*thoracem faciem*  
*habere in*

nes, quæ suppressere possunt ipsos menses, vna plenitudo est totius corporis, & hæc per basilicam tollitur: alia verò est plenitudo vteri, quæ fit à suppressis mensibus, & hæc per saphenam.

Collige ecòtra illos, qui putât in mensiù suppressione se per esse secandâ saphenâ, vt Massaria, quod nō admittimus, quia sepiissimè suppressuntur menses ab plenitudine totius: quo casu prius secatur basilica, deinde saphena: si verò saphena non inspicitur affigendæ sunt cucurbitulæ, sicuti admonet Galenus locis citatis de curandi ratione per sang. m.

Quo ad medicamenta, dicimus cum Galeno non solum purgantia, sed lenientia, præparantia, & alterantia omnia nocumentum nobis certum afferre: iuuamentum verò incertum, & dubium: illis tamen vtimur, dum speramus ex illorum vsu maius fore iuuamentum, quàm nocumentum.

Quod verò omnia remedia aliquod nobis afferat nocumentû, Gal. lib. de optima secta ad Trasibulum circa finem habet hanc sententiam Gal. dignâ ¶ nullû remedium impunè potest administrari: omnia enim sunt præter naturam: ratio est, quia sanitas stat in medio: affectus verò præter naturam, & remedia sunt extrema, & per consequens sanitati contraria.

Idè cõfirmat Gal. tr. meth. c. 13. vbi loquès de mulla dicit ¶ in synochis optima est: quia extenuat crassos humores, glutinosos detergit, & ipsos excernit: nocet tamè, quia calorè febris adauget: idè ibi dicit de oxymellite, q. si immodicè illo vtamur radat intestina, tussim excitet, & neruosa lædat. Concludit esse admodû difficile inuenire auxiliû, q. citra noxâ magnificè proficit.

Collige igitur, quod si mulla, quæ ex melle, & oxymel, quod ex melle, & aceto fit, noxia sût: quâto magis medicamēta, quæ sunt in venenorû cõfinio nocere poterunt: quia nisi certò præciamus, quod medicamenta sint magis iuuatura, quam nocitura, nullo modo præbenda sunt.

Quo ad medicamenta electiue purgantia, hæc absolutè omnib. febricitantib. nocent: sententia est Galeni 1. lect. aph. comm. 24. quod omnia pharmaca, quæ purgant electiue, sint calida, & febricitantibus inimica.

Pari modo Gal. lib. quos, & quâdo purgare oportet dicit, nullû medicamētum febricitantib. cõferre, quia omne medicamentû electiui calidum est.

Potest tamè interdû contingere, quod licet medicamentû electiui noceat febricitantib. possit tamen magis iuuare, quam nocere: Sicuti dū materia est cõcocta vel quod materia turgat: est. n. Hipp. aph. ¶ cõcocta medicari, & mouere, nisi materia turgat, quæ turgēs materia, licet sit cruda, pharmaco purgari potest, vt declarauimus in comm. 22. aphorif. huius sectionis.

Insuper pharmaca, vt docet Galen. 1. de humorib. comm. 2. & comm. 12. nocēt iis, qui multis cruditatibus, aut glutinosis, crassiq; abundant edulius.

Præterea nocent iis, qui hypocondria habent flatibus distēta, aut vrinam supra modû calidam, aut habent aliquam viscerum inflammationē. Addit omnes istos ad purgationes esse ineptos. Ecce quod pharmaca & calida nocēt, & nocēt iis qui habent aliquâ inflammationē, vel humores glutinosos, & crassos, qui impediunt excrementorû transitû: corpora. n. vt docet Hipp. 1. aph. 9. ¶ cum quis purgare voluerit oportet fluida facere. Similiter Gal. lib. de curand. rat. per s. m. cap. 7. dicit vinoli, & gulæ dediti nō iuuantur multû purgatione, aut phlebotomia: dicit multum; quia habeat meatus oclusos.

Immo



Immo Galen. 3. aph. com. 15. maximè damnat vsum medicamentorū in sanis: non quia habeant crassos, & glutinosos succos, qui impediunt transitū euacuationis, sed damnat, ne corpora trahantur in malam consuetudinem: habet enim hæc verba ¶ si verò quisquā voluerit bis in mense, aut semel vti pharmaco, ne superfluitatum multitudo aggregetur, præter id quod nocerit, corpora quoque trahet in malam consuetudinem.

Accedit, quod pharmaca, quæ exhibentur, casu quo non purgēt, efficiāt hoc magnū malū, quod ipsa conuertantur in humorem euacuandū, sententia est Galen. lib. 3. simpli. cap. 24. vbi habet hæc verba ¶ medicamentum nisi purget, solum producet humorem, qualem trahere natum est.

Causa verò cur medicamenta exhibita interdum non purgant triplex esse potest, vt animaduertit Galenus lib. 1. de humor. comm. 27. Prima vel ob partiū expurgantium imbecillitatē. Secunda vel ob angustia viarū, nempe ob obstructions vel compressiones vel occlusiones. Tertia ob vitium excrementi, nempe: quia humores sint crassi, & viscosi, qui propterea indigeant præparatione facienda per incidentia, & detergentia.

Humores, qui sunt fluidi seu aquosi, qui possunt liberè purgari, vel sunt sicuti aqua Hydropicorū, quæ nō admittit coctionē: quia semper fluida est: idē in morbi principio purgari potest. Si verò humores sint præparati, & fluidi, sicuti in corporib. sanis, Hipp. & Gal. 2. de fracturis 29. admonet ¶ in fracturis ossiū eadē die, antequā videlicet fiant febres, & inflāmationes dādum esse veratrū, quod euacuando ichores melancholicos anteuertat inflāmationes, & febres. Immo Gal. 14. meth. 8. in inflammatione oris, linguæ, & oculorum in principio vtitur purgātē efficacissimo, videlicet ex aloë, colocynthide, & scamoneo: quia magis potest indicans ad indicandum, quam prohibens ad prohibēdum; dolor enim est vrgens, & propter dolorem maius sequitur damnum, quam sit illud, quod nascitur propter medicamenti exhibitionem, quando humores non sunt præparati.

Pari modo Galen. 14. methodi cap. 17. in casu Matronæ Romanæ correptæ herpete circa maleolos, cū non poterat localib. inducere cicatricem clanculum minimum scamoneo in seruum lactis immisit: vnde purgato corpore mulier fuit sanata: causa verò fouens herpetem erat bilis.

Præterea tribus modis medicamentum valde nocet, vel dum non purgat humores peccantes, vel dum medicamentum exhibitum non sit correctum; vel dum purgatiō impeditur.

Medicamentū non purgat humores peccātes, si dū esset purganda pituita, daretur scamoniū. Galen. enim 4. de ratione victus 64. dicit ¶ si biliosa repant deorsum, da scamonium, quia hoc medicamentum euacuat bilem, non pituitam, vel melancholiam.

Præter scamoniū adsunt quoq; alia, quæ purgant bilē, sicuti sunt folia, & flores persicæ, semina psilij, aloë, & plura alia. Quod verò aloë purget mordaces succos, colligitur ex Gal. lib. 1. de loc. affec. vbi habet hæc verba ¶ Colicos sanauit aloë: quia cōieci humores mordaces fluxisse ad collū intestinum.

Insuper ipsa bilis à natura instituta est ad purganda excrementa mordacia, sed non electiue: sed solum quatenus irritat expultricem.

Alexander Aphrodisæus secundo problematum secundo dicit, bilem se-

brem efficere, & tollere, quatenus propellit excrementa.

Quæ verò purgant pituitam, præcipua sunt agaricus, hermodactilus, turbit, colocintis, peplus, graciola, semina cartami, flores cartami, catapucia &c.

Quod purgât melancholiâ est eleborû, quo nos feliciter vtimur, epitimû, polypodium, & sena. De eleboro Galen. lib. de attrabile cap. 7. recitat famosum casum, quod Præti filias furore percitas melancholico Melanpodes medicus purgauerit veratro albo, & sanauerit.

Inter purgâtia serofos humores sunt eleteriû, gumigutæ, flores sambuci, mecoachan, salapa, succi ireos; hæc sunt præcipua pharmaca, ad differentiâ lenientiû. Adsunt quoq; alia quæ electiue nō purgât proposita à Gal. 3. de symp. caus. c. 2. vbi habet, quæ mordēt intestina quatuor sūt, medicamentû, ciborû, corruptelle, excrementa mordacia, & humores geniti in vlcere cacoethe.

Quo ad correctiua ipsius medicamenti nisi medicus diligens sit, in ipso corrigēdo, maximû in cōmodû ægrotatib. affert. Hipp. & Gal. 2. de rat. vict. 12. cōsiderantes correctionē dicūt, quod statim à sumpto medicamēto dāda sit ptissana hordeacea: quia detergit, pellit deorsû medicamentû ne herreat œsophago, & stomacho: subdit tamē Gale. quod dū medicamentû incipit operari, nō sit dāda ptissana: quia impediret medicamenti actionē: ideo iubet in fine purgationis, dandā esse ipsā ptissanā. Hinc Gal. 13. meth. 15. dum humores sunt in lima iecoris dare eleborum cū ptissana, vt minus calefaciat.

Quæ verò sistunt purgationē, inter cætera est sōnus: Galen. enim 4. aph. 15. reddit rationē, cur sōnus impediat purgationē, ait: quia in sōno actiones animales oriantur, quæ & per sensum hūit, & præterea per musculos in moribus voluntariis. Ecce quod casu quo medicamenti purgatio sit violenta, nulla alia res potest melius sistere ipsam purgationem, quam somnus, ope somniferi excitatus, causa verò est, non vt vulgares medici dicunt, quia per somnum concoquitur medicamentum, sed quia natura otiaitur, & cessat ab omni motu. Hinc impeditur quoque purgatio à theriaca, & ab omnibus narcoticis, quæ sistunt & impediunt naturæ motum.

### C A P. XVIII.

#### De remediorum inuentione desumpta à prognostico.

**E**X multis locis ad prognosticū pertinentib. colligi quoq; possunt remedia Nos pauca afferemus, vt inde quisque paucorū exemplorum luce eleuet se ad quā plurima alia dignoscēda. Hūc famosū tamē locū ad prognosticū pertinentē primo loco afferimus: quia maximē inseruit huic contemplationi: Gal. lib. 3. præfagiorū cōm. 29. habet hāc famosam sententiā ¶ si vires sint validæ & humores, qui prædominātur in corpore sint calidi, affectus ipsi terminantur per excretionē. Ex hoc prognostico colligimus hanc mirabilem doctrinā. quod virib. existentibus validis, humorib; calidis prædominantibus, vtendū sit medicamēto euacuante ipsam bilē, & præcipuē, si humores inclinēt per aluū. Si verò humores inclinēt per vrinam, auxilium diuersū, nisi aliquid obstatet, esset accommodatū. Si verò per vomitum, vel per insensibile perspirationē, vel per alias partes, illud eligemus, quo facile possent excerni humores peccantes, dummodo loca convenientia sint.

Subdit Galenus loco citato ¶ si vires sint validæ & humores sint frigidi,

crisis.



eritis fiet per abscessum, non per excretionem: Si verò vires sint debiles, & humores calidi, similiter per abscessum: si debiles & humores sint frigidi, vel homo moritur, vel vix longo temporis spatio liberatur. Ecce quomodo ex signis prognosticis de sumptis à diuina Galeni doct. colligi possint & remedia specifica, & materiae remediorum.

Deinde ex vrinis quoq; præcognoscimus, an sit medicandū: 4. enim aph. com. 70. Gal. nobis reliquit hæc pulcherrimā obseruationē ¶ vrina turbata, si citò sedimen crassum habet, citò moribū solutū iri significant; si verò sint turbatae, & non habent sedimen, tunc si vires aderunt, morbus ex necessitate erit longus, superabilis tamen: si verò vires sint imbecilles, ægri mortem prænunciant: Hæc doctrina Galeni paucis expressa est tanti momenti, quāti nos ex vrinis prædicere possumus, an æger sit moriturus, nec ne: si ægrum moriturum multo ante prænunciabimus, magnā acquiramus exultationem: quia reuera ad medici honorem, & artis admirationem magis refert prædicere mortem in morituris, quam salutem in conualituris.

Eandem doctrinā de vrinis obseruauit Hipp. & Galen. in comm. in casu famoso Hermocratis, ex eo, quia vrinae nunquā subsiderunt: Galen. in illa historia ait ¶ Vrinæ turbatas & subsidentes significare initium coctionis: In Hermocrate, qui periit, nunquā subsiderunt: sed de signis lethalibus satis superque egimus in explicatione aph. 12. primæ sectionis. Hoc vnū est in signis tam bonis, quam malis obseruandum, quod nisi per aliquot dies signa perseuerent bona, vel mala, nihil certi indicent: quare si contingat, quod vnico die sit signum saluberrimum, salutem non prænunciamus, nisi perseueret saltem per tres dies. Pati modo si vnus diei spatio appareat aliquod signum mortiferum, & non perseueret aliis diebus, ex illo nihil certi colligi potest. Hanc doctrinam desumpsimus ab Hippoc. 2. præfagiorum 26. vbi loquens de vrina optima, sic admonet ¶ vrina optima, est, cuius sedimentum sit candidum, leue & æquale per omne tempus, id est per plures dies.

Auicennas similiter prima primi doct. 3. c. 3. loquens de vrina habet hunc conceptum ¶ In vrina tunc signa esse verè mala, si perseuerent mala. Idē dicendum de omnibus aliis signis malis, vel bonis, quod sine perseuerantia, bona verè bona non sint, nec mala verè mala.

Præterea ex signis quoq; præsentib. remedia colligi possunt quia Galen. 2. in primam prædict. comm. 5. habet hæc ferè verba ¶ si virtus est debilis, sine vlla manifesta euacuatione, vel ostendit copiam grauantem, vel intemperie vnus principiorum: ex hac obseruatione statim dicimus ¶ si virtus est debilis ob humorum copiam: ergo sanguinis missio cōueniet: quia per sanguinis missionem tollitur suffocatio, & virtus reuivescet. Si verò humorum copia non adsit, quod facile dignosci potest ex habitu corporis, & ex ante acta viuendi ratione, non euacuantia, sed alterantia conuenient.

Pati modo dum præcognouerimus morbum longum, vel breuem futurum poterimus variis, & vario modo, vt remediis. Modum verò nos docet Galenus 3. præfagiorum 28. vbi habet hanc sententiam ¶ ob tres causas, morbos reddi posse longos, nempe vel ob particulam, cui ægrè curatio adhiberi possit. Secunda ob crudos & crassos humores. Tertia ob errorem commissum: inde remediorum materias eligimus: quia ob crassos humores vt-

mur incidentibus, cuiusmodi est oxymel: ob errorem commissum eligimus modum dietandi: ob partem læsam, cui ægrè curatio adhibetur alia prout pars quoque diuersa est, eligimus remedia, vt affectus præter naturam partis superetur.

Sed in explicatione 12. aphorif. satis superque egimus de signis indicantibus felicem, & de indicantibus infauftum finem.

## INDEX CAPITVM.

I. Vnde sit quod Medici raro inueniant verum & proprium remedium. pagin. 1

II. De remediorum inuentione desumpta à specificis differentiis affectuum omnium viscerum. pag. 8.

III. De remediorum inuentione desumpta à protopathia, & idiopathia, & à varia distinctione sympathia. pag. 20

IV. De inuentione remediorum auferentium illos morbos specificos qui redant sanguinem impurum. pag. 27

V. De remediorum inuentione desumpta à locis. pag. 31

VI. De remediorum inuentione desumpta à morbi magnitudine, more & motu. pag. 42

VII. De remediorum inuentione desumpta à morbis in mala conformatione, & præcipuè in cavitatē. pag. 47

VIII. De remediorum inuentione desumpta à causis specificis. pag. 52

IX. De remediorum inuentione desumpta à specificis affectibus ipsius san-

guinis.

pag. 61

X. De remediorum inuentione desumpta à specificis affectibus pituita. pag. 65

XII. De remediorum inuentione desumpta à specificis crudorum humorum affectibus. pag. 71

XII. De remediorum inuentione desumpta à conditionibus specificis ipsius bilis. pag. 73

XIII. De remediorum inuentione desumpta à specificis melancholicorum succorum differentiis. pag. 79

XIV. De remediorum inuentione desumpta ab humorum motu. pag. 84

XV. De remediorum inuentione desumpta à conditionibus indicationis. pagin. 90

XVI. De remediorum inuentione desumpta à reuulsione & deriuatione pag. 98

XVII. De inuentione remediorum, qua exercentur per phlebotomiam, & per purgantia medicamenta. pag. 100

XVIII. De remediorum inuentione desumpta à prognosticis. pag. 106

F I N I S.



SANCTORII  
SANCTORII

OLIM  
IN PATAVINO GYMNASIO  
MEDICINAE THEORICAM  
ORDINARIAM PRIMO  
LOCO PROFITENTIS

COMMENTARIA  
IN PRIMAM SECTIONEM  
Aphorismorum Hippocratis, &c.

EVM INDICE RERVM NOTABILIVM,  
& Quaestionum, & cum Indice Capitum

De Remediorum Inventionem.



VENETIIS. MDCXXIX.

APVD MARCV M ANTONIV M BROGIOLLVM.

*Superiorum permissu, & Privilegijs.*







# FRANCISCO MARIÆ II.

VRBINI DVCI VI.

*SERENISSIMO, ET INVICTISSIMO.*



TATICAM medicinam tot seculis sepultam, è tenebris in lucem, & hominum prospectum longo vsu & periclitatione arcessimus. Huius Diuinæ artis virtute longæuitatis cupidum ad centesimum quoque annum perducì posse existimauimus. Res tam magna, tam eximia, tam ab hominibus exoptata

longæuitas, eius patrociniū non aliundè, quam à veritate ipsa dependet: vsus enim, & experientia rem ipsam aperiunt: attamen cum veritas ex se sit molesta, & ex illa odium nascatur, pro fulcimento exoptat summum virum binis dotibus exornatum: altera, quod in omni doctrinarum genere super ceteros emineat; altera quod sit vitæ longeuæ studiosissimus, quique incolumitatem ad annos Nestoreos recto & perenni regimine dirigat. Talis es Tu Franciscè Maria celeberrime: quia si spectemus Tuę virtutis elogia, sunt in excelsò sita, vt non solum nostri, sed cuiuscunque seculi obiecta eminentissima, suntq; e diffusa, & per totius Europæ tractus, & quicquid Meridiano & Septentrione finitur peruadunt: si vellem lingua hac mea balbutiente laudi-

bus te in Cælum efferre, absque dubio potius nebulam tam radianti honori offunderem, quam serenitatis lucem: ipsa enim splendescens semper, ac splendore suo quam latissime fundens spargit omnia, omni ex parte illustrans, atque rutilans. Si spectabimus ingenij aciem & prudentiam: illa est supra humanam cuncta fides: ista est perfectissimæ prudentiæ exemplar. Si conferamus Te cum alijs Principibus, tibi Homericum carmen conveniet.

*Ille sapit solus reliqui volitant velut umbra.*

Si spectemus Principem, qui valetudini & longævitati accuratè incumbit, neminem te solertiores inueniemus, siquidem sprenisti semper noxia allectamenta non naturalibus blanditijs accersita, & illecebris voluptatis delinita; unde omne malum: unde innumeris immatura morte præreptis implentur feretra ante diem funesta. In tua longævitate omnes oculos coniectos habebunt, quando te sospitem, & incolumem propè centesimum annum intuebuntur.

In his Commentarijs explicantur artis præcepta ab Hippocrate in Aphorismorum modum disposita, quæ sunt artis summa capita paucis expressa, suntque sententiæ seminis instar mole quidem minimæ, & virtute maximæ, quo ad verba inopes, quo ad sensum locupletes, & ut vno verbo dicam sunt tot gemmæ collectæ ab Hippocrate ex alijs suis libris, eo modo, quo apes ex floribus suauissimum mel. Super his mea insudarunt commentaria, quæ Celsitudini Tuæ qualiacumque sint, dono, voueo, & consecro, in quibus si aliquid boni pro vita diutissime protrahenda affuerit, omne tibi de gerocomica medicina benemerito dicatum volo. Bene valeas Serenissime & inuictissime Dux & Nestoreos viuas in annos.


Anno Salutis M DC X X I X.

Serenissimæ Celsitudinis Tuæ

Seruus humilissimus

Sanctorius Sanctorij





# EPIGRAMMA

A D

PERILLVSTREM, PRÆSTANTISSIMVM,  
ET EXCELLENTISSIMVM VIRVM,

D. D. SANCTORIVM SANCTORIVM, &c.

IN COMMENTARIIS SVIS

Aphorismorum Hippocratis.



VNERA SANCTORI *qua nobis grata dedisti;*

SANCTORI *medica maximus artis honor.*

*Perge tuis medicos ornare laboribus hortos,*

*Commoda qua vita sint meliora, doce;*

*Sic duce te crescunt cupidi bona publica mundi,*

*Commendat nomen sic tua fama meum.*

*Sic ego, sic omnis medicis imbutus ephebus,*

*Artibus aeterno tempore gratus erit,*

*Et nomen sine fine tuum super astra feretur.*

*Rem medicam tali quod ratione iuvas;*

*Ut tua perpetuo, te fama superflite crescens*

*Plus sensim veteri, lumine lucis habet.*

*Sic studioforum, iuuenumque scientia crescens,*

*Fit magis ex libris ingeniosa tuis,*


*Utque*

*Virque senex nomenquetuum miratur & artes ,  
Sic colit & laudat teque tuosque libros .  
Et tua cum fructu perdocta volumina versas .  
Plurima, quæ nusquam viderat ante videt .  
Nunc quoque post multos alios summosque labores  
En colis Hippocratis scripta labore tuo .  
Vive diu, re pergatque fauens te sospite parca  
Nere tibi fufis stamina longa fuis :  
Opto ego vitali perfusus balsamo Hygeæ ,  
Ut vincas Pylîj secula trina Ducis .*

Benevolentia & grati animi ergò Paulus Parauicinus de Capellis  
Vulturano Berbenensis eiusdem Sanctoriij discipulus . P. P.







In Perillusttris

# D. SANCTORII SANCTORII COMMENDATIONEM

Pro editis in Aphorismos Hippocratis Commentarijs.



Æ c miranda Senis diuini oracula Coi,  
Queis agris rectam miseris præscribere vietus  
Normam, atque instituit tutò præcepta medendi;  
Sectio cui venæ proffit, purgatio quando,  
Et morbi certum docuit prædicere finem;  
Haud satis elapsis ænigmata cognita seclis;


Sanctorius, medicæ lumen qui præbuit Arti,  
Explicat ingenio mirabilis œdipus alter.  
Magnus Apollinei Sanctorius gloria cœtus,  
Atque Decus Patriæ, quam Cæsar condidit olim  
Iustinus, nomenque suo de nomine finxit.  
Urbs antiqua ferax oleæ, laticisque lyæi,  
Quam scopulo affixam pelagi circum alluit vnda,  
Nec procul aprici colles, lætique coronant,  
Et propius positæ circum stant ritè salinæ,  
Debita doctiloquo veræ præconia laudis  
Solue Viro, natoque tuo; nam clara per orbem,  
Æternum docta hæc viuent dum scripta per æuum,  
In precio dum Phæbuserit, tua fama vigebit.  
Vosque adeo Sacræ Iuuenes, qui incumbitis Arti,  
Abstrusos si tangit amor cognoscere sensus,  
Nocturna, hæc versate manu monumenta, diurna;  
Hippocratis nectar claro de fonte bibetis,  
Vestraque Phæbeæ præcingent tempora lauri.

*Alexander Bruns nobilis Polonus, & Iustinopolitanus Philosophus,  
ac Medicus Præceptor doctissimus, ac benemerito obseruantia, ac gratitudi-  
nis ergo P.*



# EPIGRAMMA

I N  
LIBRVM SANCTORII SANCTORII ETC  
DE INVENTIONE REMEDIORVM.




*Q*UOD malè curarent homines languentia membra,  
Viderat ex alta Pulcher Apollo Domo:  
Respondet Phæbus quæ morbis queritis agri  
Pharmaca mortales? quæ medicina datur,  
Tenditis in mortem tali ratione medendi,  
Corruit & labens, non reparatur opus:  
Resitui in melius, si vultis corpora lasa  
Viuentique frui commodiore Via,  
Discite quam vobis Methodum Sanctorius offert,  
Voluite tam doctum tempus in omne Librum:  
Optima præ reliquis medicandi dogmata tradit,  
Integra quoque modo sit retinenda salus.  
Extendite vitam, qui longum vultis in ævum,  
SANCTORIO Insigni dicite, viue diu.

Grati animi ergo Paulus Parauicinus de  
Capellis Vviterano Berbenensis P. P.



# INDEX QVÆSTIONVM.



E inscriptione. Quæst. 1.  
columna 3

An aphorismi aliquo ordini  
traditi sint. Quæst. 2. col. 7

De intentione Hippocratis,  
& medicinarum diuisione.

Quæst. 3. col. 9

An hic liber aphorismorum sit isagogi-  
cus. Quæst. 4. col. 10

De subiecto. Quæst. 5. col. 11

De medicina præstantia. Quæst. 6. col. 13

Quid intelligat Hippocrates per vitam.

Quæst. 7. col. 17

An medicina sit ars, & quæ ars, & de eius  
genere proximo. Quæst. 8. col. 18

Qua ratione ars medica sit coniectura-  
lis. Quæst. 9. col. 23

Qua ratione ars medica vocetur lon-  
ga. Quæst. 10. col. 26

Cur experimentum sit fallax. Quæst. 11.  
col. 33

De medicorum sectis. Quæst. 12. col. 35

Confidentia ægri in medicum cur inuenit.  
Quæst. 13. col. 58

Qua methodo dignoscantur peccantes  
humores. Quæst. 14. col. 64

In quot pericula solent incidere Athle-  
tæ. Quæst. 15. col. 76

Cur Athletæ famescant, & auidè come-  
dant. Quæst. 16. col. 78

Quodnam sit illud quod indicat primo,  
& per se venæ sectionem. Quæst. 17.  
col. 87

Quomodo in principio morborum acu-  
torum possit prævideri quo die morbus  
sit terminaturus. Quæst. 18. col. 104

An cibus multus tenuis sit plenus, & an  
paticus plenus dici possit tenuis. Quæst.

19. col. 110

De conditionibus acutorum morbo-  
rum. Quæst. 20. col. 112

De conditionibus corporum quæ sunt ac-

comodata ad ieiuniū. Quæst. 21. col. 121

De ieiunii detrimentis. Quæst. 22. col. 134

Quomodo contraria ut morbi, & remedia  
sint duo extrema. Quæst. 23. col. 145

An vnum contrarium vni tantum sit con-  
trarium. Quæst. 24. col. 147

An in omnibus peracutis conueniat ieiu-  
nium. Quæst. 25. col. 167

A quibus causis fiant morbi peracuti.  
Quæst. 26. col. 169

An febres semper adnexæ sint morbis  
acutis. Quæst. 27. col. 170

An quatuor tempora morborum disse-  
rant à quatuor temporibus sympto-  
matum. Quæst. 28. col. 171

An morbus in principio sit maior, quam  
in statu. Quæst. 29. col. 178

An ut ægri sanentur debeant transire per  
quatuor morborum tempora. Quæst.

30. col. 182

Cur in principio morbi robusta virtus  
non vincat morbum: in vigore lan-  
guida vincat. Quæst. 31. col. 191

An in vigore omnium acutorum nihil  
cibi dandum sit, ut iubet aphorismus.

Quæst. 32. col. 193

An in vigore fiat perfecta coctio. Quæst.

33. col. 195

Ex quibus signis colligitur, an vires pos-  
sint perdurare ad finem status. Quæst.

34. col. 207

Quomodo fiant paroxysmi febriles.  
Quæst. 35. col. 222

Ostenditur, nec cibos, nec alia re-  
media conuenire in paroxysmis.

Quæst. 36. col. 225

Ostenditur, & quæ sint, & quot sint tem-  
pora vniuersalia, & particularia fe-  
brium. Quæst. 37. col. 226

Ostenditur quando, & quomodo cibus  
sit ægris nocuus. Quæst. 38. col. 228

An Hippocrates doctrinam de pulsibus

# Index *Questionum*.

- caluerit. *Questio*. 39. col. 241  
 Quomodo successiua circuituum incrementa prænuncient paroxysmos, & morbos longos, vel breues. *Quest.* 40. col. 243  
 De causa immediata periodicationis. *Quest.* 41. col. 245  
 De methodo præcognoscendi paroxysmos, & vigores tardos, seu longos, vel breues. *Quest.* 42. col. 251  
 De signis assidentibus. *Quest.* 43. col. 257  
 Cur Hippocrates solum octauo die secauerit venam in Anaxione pleuritico. *Quest.* 44. col. 259  
 De signis coctionis. *Quest.* 45. col. 262  
 De signis criticis. *Quest.* 46. col. 263  
 De signis mortis. *Quest.* 47. col. 264  
 De spuro, & sputamine. *Quest.* 48. col. 272  
 De urinis. *Quest.* 49. col. 275  
 De alui excrementis, & sudoribus. *Quest.* 50. col. 284  
 Ostenditur, quæ corpora sint magis vel minus disposita ad ieiunium. *Quest.* 51. col. 293  
 De Aetatibus. *Quest.* 52. col. 295  
 De Calidi innati principijs. *Quest.* 52. col. 314  
 An calidum innatum sit solus calor temperamenti. *Quest.* 53. col. 317  
 An calidum innatum sit æthere. *Quest.* 54. col. 322  
 Quod calidum innatum sit temperamentum, & non calor temperamenti. *Quest.* 55. col. 333  
 Quotuplex sit calidum innatum, seu temperamentum innatum. *Quest.* 56. col. 346  
 A calor innatus differat specie vel gradu ab asciticio. *Quest.* 57. col. 351  
 Quodnam sit subiectum caloris febrilis, & naturalis. *Quest.* 58. col. 355  
 De calore influente seu de spiritibus. *Quest.* 59. col. 360  
 Quomodo calor natiuus perducatur nos ad senectutem, & mortem. *Quest.* 60. col. 365  
 An ver sit medium inter hyemem, & æstatem per negationem, vel per participationem extremorum. *Quest.* 61. col. 375  
 De somno in quibus Galenus conueniat & differat ab Aristotele. *Quest.* 62. col. 377  
 In quo anni tempore cibus debeat esse copiosior. *Quest.* 63. col. 38  
 Quomodo hyeme sit plus calidi innati, quam alijs temporibus. *Quest.* 64. col. 389  
 An solus victus humidus sit medicinalis. *Quest.* 65. col. 388  
 Quid intelligat per victum humidum. *Quest.* 66. col. 389  
 Methodus curandi affectus complicatos. *Quest.* 67. col. 393  
 De serie omnium indicantium. *Quest.* 68. col. 393  
 An contraria contrarijs curentur. *Quest.* 69. col. 401  
 An similia similibus conseruentur. *Quest.* 70. col. 405  
 De quatuor regulis pro cibandis ægris. *Quest.* 71. col. 415  
 Quomodo interpretandus sit aphorismus decimus secundæ sectionis, Impura corpora quanto magis nutries & *Quest.* 72. col. 417  
 Quando conueniât epichierastica, & quæ sint & quomodo multum & sapè illis uti liceat. *Quest.* 73. col. 419  
 Vnde morbi autumnales, & maligne febres oriuntur. *Quest.* 74. col. 424  
 De conditionibus perfectissimæ crisis. *Quest.* 75. col. 443  
 Quid agendum in die decretoria, si natura nihil operetur. *Quest.* 76. col. 447  
 An motus symptomatici sint adiuuandi. *Quest.* 77. col. 450  
 An critici dies pendeant à mense medicinali. *Quest.* 78. col. 453  
 De causis citæ, & tardæ apparitionis lunæ. *Quest.* 79. col. 455  
 Ostenditur quemlibet diem esse posse indicatorium & iudicatorium. *Quest.* 80. col. 459  
 A quibus causis proueniant dies critici. *Quest.* 81. col. 462  
 Quando topica applicantur corpori non purgato. *Quest.* 82. col. 468  
 Sex conditiones requiruntur, ut loca sint conferentia. *Quest.* 83. col. 469  
 Quænam sint conditiones, quæ reddunt loca magis & minus conferentia. *Quest.* 84. col. 473  
 De reuulsione. *Quest.* 85. col. 476  
 An reuulsio indicetur non solum à mate-



### *Index Quaestionum.*

- |   |          |   |           |
|---|----------|---|-----------|
| ria fluente, sed à fluxa, & fluxura.<br>Quaest. 86.                 | col. 480 | deliquit fieri possit. Quaest. 92. col. 515   |           |
| In quibus reuulsio & derivatio conueniant, & differant. Quaest. 87. | col. 471 | In quibus casibus conueniat sanguinis<br>evacuatio vsque ad animi deliquium.<br>Quaest. 93. | col. 516  |
| De speciebus coctionis. Quaest. 88.                                 | col. 483 | An in magnis doloribus ante phlebotomiam<br>conueniant anodyna. Quaest. 94.                 | col. 520. |
| Quid intelligat per non cruda. Quaest. 89.                          | col. 491 | Antequam materia turgens purgetur,<br>quæ sint prameditanda. Quaest. 95.                    | col. 523  |
| An materia tenuis sit incrassanda. Quaest. 90.                      | col. 496 |   |           |
| De minoratiniis. Quaest. 91.  | col. 499 |   |           |
| An euacuatio sanguinis vsque ad animi                               |          |   |           |

### *Finis Index Quaestionum.*



# INDEX RERVM ET SENTENTIARVM IN HOC OPERE CONTENTARVM.



<i>A</i>		
<i>Critio in philosophia est vincens in medicina est contempnans.</i>	col. 158	
<i>Actiones à quo temperamento oriuntur.</i>	347	
<i>Actiones naturales sunt conata.</i>	361	
<i>Acuti morbi vide morbos acutos.</i>		
<i>Acuti morbi cur interimant ob cibum.</i>	139	
<i>Acutorum morborum differentia qua sint.</i>	114	
<i>Acutorum morborum differentie victus quatuor.</i>	185	
<i>Adagia ut differant ab aphorismi natura.</i>	5	
<i>Aegyptij cur ante tertium diem non cibabant egros.</i>	130	
<i>Aegyptij cur alebamur columbis, ne peste corriperebantur.</i>	168	
<i>Aeger si obediat medico duo sunt contra morbum.</i>	41	
<i>Aegri qui sanati sunt cruda existente materia.</i>	450	
<i>Aeger continet duos scopos.</i>	202	
<i>Aegri cur in vigore non sunt nutriendi.</i>	202	
<i>Aegri à morbo. &amp; à ieiunio quomodo ledantur.</i>	125	
<i>Aegri sunt reducendi ad temperamentum aduentitium &amp; non primigenium.</i>	411	
<i>Aegri debiles quomodo magis nutriendi.</i>	427	
<i>Aegri condutiones quatuor sunt consideranda.</i>	523	
<i>Aequinoctis cur usus sit Hipp.</i>	166	
<i>Aeruginosa an per vomitum debeat educi.</i>	470	
<i>Aetates quae sint.</i>	295	
<i>Aetas decrepita duplex.</i>	295	
<i>Alchymistorum remedia cur noceant.</i>	140	
<i>Alimentum minuens vires in acutis in chronicis conseruans.</i>	203	
<i>Alui excrementa qua sint salubria.</i>	284	
<i>Andreas Laurentius ut errat in definiendo calidum innatum.</i>	342	
<i>Angina deplorata quomodo sectione aspera, arteria curetur.</i>	164	
<i>Anni diuisio varia.</i>	369. 370	
<i>Angustia specierum sex.</i>	82	
<i>Anni, tempore a respondendi quatuor regionibus quatuor aetatibus, quatuor temperamentis, quatuor humoribus quatuor elementis &amp; quatuor diei partibus.</i>	423	
<i>Appetitus vide famem.</i>		
<i>Appetitus in omni morbo ut praeannunciet salutem.</i>	368	
<i>Aphorismi nomen &amp; natura declaratur.</i>	4	
<i>Aphorismi definitiones varia.</i>	4	
<i>Aphorismi vnde se habent.</i>	5	
<i>Aphorismorum ordo est accidentaliter non essentialiter.</i>	5	
<i>Aphorismorum liber an sit isagogicus.</i>	10	
<i>Aphorismi Hippocratis non ordinati à Galeni methodo ut plurimum falsi.</i>	43	
<i>Apophiegmatata ut differant à natura apborismi.</i>		
<i>Apoplexia ex sanguine in ipsa accessione sicut mittendus.</i>	7	
<i>Apoplexia quibus calidis tollitur.</i>	7	
<i>Aqua non humefcat, neque intus, neque ex.</i>	3	
<i>Aqua ex Galeno.</i>	3	
<i>Aqua frigida quomodo inueni.</i>	3	
<i>Argen-</i>		



# In hoc opere contentarum.

*Argenterij error dum putat solos acutos  
esse morbos magnos.* 89  
*Argenterij error quod unus sit spiritus, &  
non plures.* 363  
*Arma quibus medici plebeinocent agros,  
qua sint.* 191  
*Ars medica quomodo est coniecturalis.*  
23. 200  
*Ars medica si curaret individua ut indivi-  
dua esset vana.* 25  
*Articulus τὸ ut differat ab ἐπ' & quid signi-  
ficat.* 120  
*Articulus ἐπ' & articulis τῷ quid signifi-  
cet.* 74  
*ἄρτος cur usus sit Hippocrates hoc aduer-  
bio.* 439  
*Assatio naturalis qua nam sit.* 485  
*Assatis conditiones qua sint.* 40  
*Athletarum exercitium est minima pars  
gymnastice.* 72  
*Athleta omnes cur famefcant.* 79  
*Athletarum conditiones, & mores.* 72. 73  
*Athleti pleni ad summum & in extremo  
ut differant.* 73. 74  
*Athleta in quor pericula incidant.* 76  
*Athletarum appetitum non fuisse voluptuo-  
sum.* 80  
*Athleta ἐν τῷ ἐχέῳ & ἐπ' ἀκρον.* 81  
*Athleta qui derepente moriuntur qui sint  
ibidem.*  
*Atra bilis ut per vomitū debeat educi.* 470  
*Atra à cibo per vomitum mouenda.* 471  
*Auenzoar vixit annos 135.* 17  
*Augumento existente in febricitante cur non  
sit dandus cibus.* 233  
*Aurum cur facit languidas vires.* 425

## B

**B** *Albus Stoicus fauet opinioni Cremo-  
nini de calido innato.* 338  
*Balncum proprium remedium hectica fe-  
bris.* 158  
*Basia mortuorum quomodo curentur.* 469  
*Bilis aruginosa à cibo per vomitum edu-  
cenda vel cum oleo.* 471  
*Bionis lien tumefactus per urinam libera-  
tur.* 471

## C

**C** *Acocchymia quotuplex sit.* 67. 68  
*Cacochymia à qua causa fiat.* 66  
*Calidū innatū si augeretur, animal conser-  
uari posset æternum.* 385. 375

*Calidum innatum duplex.* 370  
*Calidum natium nō differt specie ab asciti-  
sio.* 353. 352  
*Calidum natium à sua sede non dimoue-  
tur.* 357. 385  
*Calidi natui motus intus & foris ibidem.*  
*Calidum influens etiā si augeretur animal  
esset æternum.* 375  
*Calidum influens est subiectum febris &  
non natium.* 358  
*Calidum natium est membrorum omnium  
formatrix.* 359  
*Calidum innatum est primum efficiens ope-  
rationum, non influens.* 259  
*Calidum innatum triplex.* 346. 348  
*Calidum innatum esse temperamentum  
probatur.* 344  
*Calidum innatum esse immortale, prascire  
futura esse attribuitur ridicula.* 342  
*Calidum innatum esse auctorem operationū  
probatur ex Galeno.* 342  
*Calidum innatum non esse substantiam o-  
leosam & pinguem probatur.* 340  
*Calidum innatum, & temperamentum habēt  
vim calefaciendi, & refrigerandi.* 339.  
319. 320  
*Calidum innatum efficit operationes ut tem-  
peramentum.* 338  
*Calidum archigonum continet in se ad alte-  
ratricem & formatricem.* 348  
*Calidum innatum significat substantiam &  
qualitatem.* 317  
*Calidum innatum ex Auicēna continet in se  
virtutem immutatiuam, et formatiuam.*  
316. 317  
*Calidum innatum archigonum & non ar-  
chigonum.* 318  
*Calidum innatum esse quoddam mixtum ex  
Galeno, ibidem.*  
*Calidum corpus duplex esse potest vel co-  
pia calidorum, vel qualitate ex Galeno.* 44  
*Calor dupliciter consideratur, vel quo ad su-  
biectū, hoc semper minuitur, vel quo ad  
qualitatem, hac potest augeri.* 117. 118  
*Calor in senibus cur paucus.* 310  
*Calor quinque modis potest destrui.* 310  
*Calor asciticus quomodo differat a naturali.*  
306  
*Caloris gradus quo instrumento cognoscen-  
tur.* 137  
*Caloris motus duplex.* 309

# Index rerum, & sententiarum

Caloris nativi defectus ex Aristot. est frigus.	col. 315	virtutes videlicet nutrientem & medicinale.	426
Calor cordis cur sit materia respectu innati.	col. 315	Cibus quando magis dandus, hyeme an estate.	428
Calor augetur ob quinque causas.	372	Cibandi tempus colligitur ex parte affecta ex affectu, ex natura agrotum ex natura principij paroxysmi, ex quantitate & qualitate cibi.	433
Calor natus qua ratione hyeme plus sit.	385	Cicero cur damnet linguam gracam.	67
Caloris extinctio ob quatuor causas fit.	513	Circulus in febribus quid.	431
Canicula stella, & ante canicula quando oriantur.	60	Coctio ventriculi non iuuare calidos.	352
Cardialgia cur aqua frigida tollatur.	373	Coctionis species sunt tres, & non quatuor ut dicit Capuacens.	416
Caro cur mala febricitantibus.	421	Coctio secunda qua fit in hepate, velociter fit ibidem.	
Cataarrhus crudus dicitur ab Aristotele omnis & fit a defectu caloris interni, vel externi.	485	Coctio quete fit ex Aristotele & Hipp.	401. 502
Cachectichia quid significet.	137	Coctio in acutis unica salus.	139
Causarum morborum tres conditiones in medendo consideranda.	399	Coctio in hepate, & ventriculo dicitur elixatio.	484
Celsi sententia homo sanus, &c.	125. 142	Coctiones ab Aristotele diuiduntur in tres species.	484
Chelybs cur iuuat spleneticos.	82	Calum agere in hac inferiora ex Aristotele lumine, & motu.	458
Cheros quid significet.	29. 30	Calum unde dicatur.	369. & 48
Colericorum ebullitio an prohibeat sanguinis euacuationem.	517	Calum esse quintam essentiam probatur.	148
Chylorta. quid significet.	511	Coitus, minus nocet in plenis, quam in omnino vacuis.	138
Chymicorum remedia cur semper noceant.	140	Coitus abstinentia quomodo noceat.	409
Cibandi tempus in febribus a sex conditionibus colligitur.	433	Colores sinceri humorum cur mali.	273
Cibus inemptius quos agros uccauit.	432	Comparationes omnium indicantium decem sunt.	396
Cibus debet proportionari deflationi.	291	Conferentia & tolerantia iura & non iura.	58
Cibus quando multum, quando parum ante paroxysmum dendus sit.	232	Conferentia agri in medicum cur iuuat.	38. 39. 40
Cibus facit quod calor febrilis maneat contractus.	231	Consensus mirabilis inter uterum, & processus mamillares.	472
Cibus triplex minuens conseruans, & augens vires.	213	Consensus lienis cum renibus.	478
Cibus medicinalis habet duas qualitates.	387	Constipatio a nota & opem, id est condensare.	82
Cibi grati qui sint agris concedendi.	38	Consuetudo in agris obseruanda.	120
Cibus exiguus datus in valde euacuatis.	72	Corrobrans cor est pulvis grisus caesaris.	71
Cibus ut cibus cur agros semper ledat.	119	Contrarium uni est contrarium, est principium methodi.	92
Cibus importunus quos agros necauit.	119	Continua febres a Galeno diuiduntur in tres differentias.	236
Cibus an conueniat ratione morbi, vel ratione virum.	131	Contrarietas quid sit, secundum varios auctores.	146
Cibus cur febricitantibus morbus fit.	179	Contrarium non agit in contrarium sed in subiectum.	192
Cibus cur subtrahendus in principio morbi.	184		
Cibus in statu cur malus.	213		
Cibus quando dandus est in paroxysmis.	218. 221. 225		
Cibi pro agris colliguntur ex consuetudine & cur.	412		
Cibus medicinalis, quilibet est si habeat duas			



# In hoc opere contentarum.

Corpora robusta per errata tendunt ad mor-  
biam debilia ad moriem. 372  
Corpus coloratus ex Galeno indicat sani-  
tatem suspectam. 72. 73  
Cremoninus in quibus laudet, & in quibus  
damnet Hippocratem. 308  
Crisis lege iudicium.  
Crisis futura sciri potest qua die, & qua hora.  
37  
Crisis à quibus causis externis impediatur. 41  
Crisis quomodo à medicis ignariis impediatur.  
41  
Crisis bona sit quoque con difficulti tolerantia.  
58  
Crisim impediri à medicamento ostenditur  
exemplo agrorum Hippocratis. 55  
Crisis cur secum ferat varia symptomata &  
que sint. 167  
Crisis dum sit non datur cibus. 190  
Crisis bonae tres conditiones. 195  
Crisis optima septem conditiones. 264  
Crisis duplex videlicet: fiens, & facta. 439  
Crisis optima sex conditiones. 442. 443  
Crisis tres modi ad salutem, tres ad moriem.  
442  
Crisis conditiones ex Auerroe. 447  
Criticus dies fieri per lunam, ridiculum &  
cur. 457  
Cruda existente materia serosa, licet utri phar-  
maco & quomodo. 508  
Crudi humores cur à medicamento non pos-  
sint euacuari. 54. 476  
Cruda dum euacuantur: qua mala succedant.  
55. 501. 513  
Cruditatis gradus in plenitudine. 262  
Crudorum defectu quot mala efficiat ex Ga-  
leno. 475  
Cruditatis duplex est, videlicet aquosa &  
crassa. 476  
Cruditatis urina, catarrhi, facum, apostematis,  
puris, ex Aristotele s. mercurum sit à de-  
fectu caliditatis externa vel interna. 485  
Cruda opposita maturationi cur non pur-  
ganda ex Hipp. & Gal. 439. 401. 402  
Cruda materia portio, si cocta est, phar-  
maco ex Gal. utimur. 409  
Crudi humores sunt stabiles, & infixi. 502  
Crudi in toto, & cocti in parte quid indicent.  
505  
Cocti humores quomodo possint inueniri in  
principio morbi. 505

Cynanchem esse rabiem caninam. 500  
D  
Eh les vires ob defectum alimenti, vel  
ob morbi vehementiam. 88. 135. 191.  
206  
Decrepita aetas duplex. 299  
Decrepiti cur dum febricitant moriantur.  
290  
Decretoria v. causa, & v. signa. 263  
Decubitus in laus dextrum, vel sinistrum cur  
facilis vel difficilis. 257  
Definitio mala tribus modis potest esse ma-  
la. 53  
Desperari ex Hipp. & Gal. relinquendi pro-  
gnostico. 148. 156  
D. a insolita cur ledat. 134  
Diathesis quid ex Gal. 113  
Dies critici omnium peracutorum, & acuto-  
rum qui sint. 446  
Dies indicatoria qualibet esse potest quomodo  
probeur. 469  
Dies qualibet potest esse criticus quomodo pro-  
berur. 461  
Dies criticus à quibus causis fiat. 462  
D. flatio proportionatur cibo. 291. 310  
Digerentia quando conueniant. 401  
Digestio quomodo differat à coctione. 305  
Dispositiones mala noscuntur per anteceden-  
tia, & consequentia. 65  
D. sp. antes de nominibus venia indigni. 2  
D. st. etiones, communiter & proprie in  
Hippo. non habent locum. 75  
Diuites cur difficiliter sanantur pauperibus. 41  
Diuretica non danda in nephritica passione.  
420  
Dolor coxendicus ne claudicationem faciat  
comburatur. 405  
Dolor cur dolorem sedet. 404  
Dolores colici, & nephritici cur frigida per-  
fusiones sanantur. 373  
Dolores mitigandi ante reuulsionem & cur.  
261  
Dolores vehementes indicant faciendam eua-  
cuationem usque ad animi deliquium. 318  
Dolore vehementissimo existente an conue-  
niant anodyna ante euacuationem san-  
guinis. 520  
Dysenteria in principio maior sit diata  
quam in statu & augmento. 214. 215

# Index rerum, & sententiarum

**E** Clysis quid sit. col. 513  
 Epichierastica qua sint. 419. 420  
 Epicrasis duplex. 419  
 Epilepsia curatio cur subitanea. 243  
 Epilepsia cur ob ieiunium interdum fiat. 134  
 Epilogum numquam fecit Hippocrates in suis operibus. 212. 331  
 Errata leuissima cur preparant interdum ad mortem. 193  
 Erratum in agris exemplo nauigantis declaratur. 132  
 Erratum in sanis est via ad morbum in a-  
 gris est via ad mortem. 132  
 Error prima coctionis saepe corrigitur in se-  
 cunda ex Galeno. 124  
 Error in augmento communicatur vigori,  
 & non declinationi. 433  
 Euacuatio refracta ad unicam expulsio-  
 nem in acutis. 181  
 Euacuatio hepatis quando per aluum, quan-  
 do per urinam sit facienda. 474  
 Euacuatio symptomatrica an sit utilis. 451.  
 & 452.  
 Euacuatio ex Galeno aduersus Iulianum est  
 maxima medicina pars. 43  
 Euacuatio cum tolerantia cur non semper  
 bona. 46  
 Euacuatio spontanea à tribus causis. 49  
 Euacuationis bona quinque conditiones, vide-  
 licet, quid, quantum quando, quomodo,  
 ubi. 53  
 Euacuationis quantitas unde sumenda. 53  
 511  
 Euacuationis indebita quantitas tribus mo-  
 dis sit. 53  
 Euacuationem praecedunt ex Galeno sepa-  
 ratio, & concoctio. 448  
 Euforbium purgat phlegma. 526  
 Euforiorata cur sit aduerbium. 288  
 Exercitium à cibo fugiendum & cur. 124  
 Exercitium ex Galeno tria beneficia facit. 386  
 Exercitium cur augeat calorem. 386  
 Exsiccantia, ulceribus quando conueniant. 402  
 Experientia non est fidendum. 31  
 Experimentum quomodo fiat. 31  
 Experimentum duplex in fieri & in facto  
 esse. 38

Experimentum cur infallax. 33. 34  
 Experimentum falax sed non semper peri-  
 culosum. 33  
 Experimentatores sunt fortuna imitato-  
 res ex Galeno. 33  
 Extrema partes frigida si non incalescant  
 mortale. 225  
 Extrema euacuatio periculosa, quia & pec-  
 cantes, & non peccantes humores eua-  
 cuatur. 71. 72  
 Extrema refectio cur periculosa. 72  
 Extremis morbis, extrema remedia apho-  
 rismus ampliatur ad res politicas. 144  
**F**acies coloratio ex Galeno cur mala. 72. 73  
 Facilia cur semper spernantur licet sint ad-  
 miranda. 374  
 Facultatis naturalis quies ex Philotheo est  
 mors. 70  
 Fallax ut differat à periculoso. 115  
 Fames sit à quinque accidentibus ex Gal. 78  
 Fames excitatur à melancholia ex Galeno  
 contra Fuchium. 79  
 Famen exultantia ad tria capitare ducun-  
 tur. 30  
 Febris essentia an sit siccitas. 391  
 Febris putrida quomodo est in calefieri &  
 calefacto esse. 353  
 Febris subiectum quodnam sit. 356  
 Febris non attinet ad substantiam calidi  
 natui, sed ad qualitatem. 313  
 Febres intermittentes quomodo fiant, varia  
 opiniones. 231  
 Febres intermittentes quomodo fiant con-  
 tinuae & mortales. 230. 231  
 Febris maligna vide malignam febrem.  
 Febres maligna cur videntur parua. 174  
 Febris definitio quod sit conuersio ad igneam  
 naturam, an sit vniuersaliter vera. 392  
 Febres quintana septimana ex ipso Hippo-  
 crate non dantur. 226  
 Febris putrida iunguntur sex affectus ex  
 Galeno. 395  
 Febris putrida quomodo fiat. 222. 223  
 Febrem putridam non esse calorem accen-  
 sum in corde ut Altimarus. 222  
 Febris putrida non sit nisi coinquinetur  
 cor. 222  
 Febris pestilens ex Galeno quomodo fiat. 223  
 Fe-



## In opere contentarum.

*Febris periodica de tertio interitum sine putredine qua.* 224  
*Februm omnium intermittentium differentia.* 224  
*Febris exquisita, absoluta, producta, & enormis qua sint.* 224  
*Febres clodes qua sint.* 236  
*Febris tertiana exquisita cur non sit peior hemurico.* 274  
*Febris quomodo est conuersio natini caloris ad igneum.* 356  
*Fluxus à tribus causis fit.* 49  
*Fluxus à sex causis.* 49. 56  
*Focius quando incipit vita propria.* columna 340  
*Frigida potio robustis conuenit.* columna 147

### G

**G**alenus non cognouit eccentricos vel epiciclos. 459  
*Gallicus morbus an inter acutos sit.* columna 116  
*Gallicus morbus confirmatus cur decoctio non sane ur.* 173  
*Gelida partes ne in gangranam cadant quid agendum.* 147  
*Glacies quomodo tollat omnes dolores.* 373  
*Graecum idioma caret interdum abundantia verborum.* 488

### H

**H**abitus Athleticus nec assatim nec tarde soluendus est. & cur. 71  
*Habitus bonus sine euexia duplex, absolute bonus, & bonus in suo genere.* 73  
*Hætica febris quomodo habeat quatuor tempora.* 176  
*Hætica quomodo curetur.* 373  
*Hætica febris an sit magis refrigeranda quam humectanda.* 390  
*Hætica febres non omnes sunt sicca.* 392  
*Hemirriticus quomodo fiat.* 274  
*Hemirriticus cur peior sit quam tertiana exquisita.* 274. 275  
*Hemirritici differentia omnes.* columna 247  
*Hemirriticus an sit horificus.* columna 238

*Hæmorrhagia narium tolli tur euacuando ex eodem latere in cubito.* 471  
*Hepar totum aequaliter laesum non potest sanari.* 258  
*Hepar puli cur nocent fabricantibus.* 390  
*Hepatis concana pars per aluum, gibba per urinam.* 271  
*Hippocratis stirpes, origo & mores.* columna. 6  
*Hippocrates fuit annis 500. ante Christum.* 6  
*Hippocratis libri legitimi ut distinguantur a spuris.* 7  
*Hippocratis Commentatores antiqui.* columna. 7  
*Hippocrates cur tradiderit aphorismos sine ordine.* 8  
*Hippocratis aphorismi non sunt ordinum incapaces, ut quidam putant.* 8  
*Hispani cur in Italia nimium comedant.* 123  
*Homotona febre affectus quando nutriendus.* 233  
*Humidum triplex, aqueum, vitale, & alimentale.* 340  
*Humores in principio morbi possunt esse cocti & quomodo.* 505  
*Humores distincti à sanguine quinque modis vitiantur.* 67  
*Humores in parte cocti, & in toto crudi interimunt aliquando.* 503  
*Humorumurgentium conditio.* columna 67  
*Humorum peccantium signa unde desumantur.* 63. 64  
*Humores boni possunt stare cum viriute debili.* 422  
*Humores surgentes à se ipsis mouentur.* 468  
*Humores in corpore à facultatibus naturalibus mouentur, secus omnis fluxio ad inferiora fieret.* 468  
*Humores ut tennes incrassandi, ex Hippocrate & Aulic. & cur.* 497  
*Humores tennes quibus remedijs sint incrassandi.* 497  
*Humores crudi sunt in fixi & impecti.* 502  
*Humores crudi serosi pharmaco possunt purgari.* 508  
*Hydromel duplo magis nutrit quam vinum oligosorum ex Hipp.* 426

# Index rerum, & sententiarum

Hidrops Thoracis quomodo curetur.	153
Hidrops quo instrumento curetur ibidem.	
Hydrops unde fiat. & quo remedio tollatur.	77
Hydropici cur moriantur dum tota aqua simul euacuatur.	85
Hydropicos habere intemperiem siccam solidarum partium.	350
Hydropici quomodo habeant hepar frigidum. & calidum.	354
Hydrops cum febre qua methodo curetur.	395
Hydrops quando tollitur pillolis de haliacabao.	393
Hydropicis rabarbarum ex Auicenna est venenum.	444

## I

Iecoris abscessus à Gal. non curatur.	153
Iecoris abscessus quomodo sanari possit.	153
Ieiunium cum esu piscium cur probetur.	410
Ieiunium in prima parte vigoris obseruandum.	162
Ieiunium thesalicorum qua mala faciebat.	128
Ieiunantis hominis conditiones.	121
Ieiunium cur heclicis non conueniat.	163
Ieiunium nocere biliosi. probatur.	123. 134
Ieiunium an conueniat peste correptis.	167. 168
Ieiunia in acutis quando vitendum.	193
Ieiunium in agris in tribus casibus obseruandum.	198
Ieiunium non esse obseruandum in agris in octo casibus.	199
Ignis si non sanat nullum remedium sanat.	153
Impedimenta sanationis qua sint.	400
Imper gines quomodo sanentur.	469
Indicans phlebotomiam esse inominatum probatur.	96
Inflammatio dupliciter recedit à statu naturalis.	395
Influens calor quid sit.	371
Influens calor sequitur anni tempora.	371
Instrumentum quo curari possit iecoris abscessus.	153
Inest na habent retentricem priuatam non communem.	50
Intestina carere aut rice communi, con-	

ira Saxoniam.	50
Intemperies alia est solidarum alia humorum.	349
Iudicium difficile duplex.	34
Iudicium ex Aristotele & Galeno est magis adnexum arti quam experientia.	16

## L

Lapis vesica vel renum non potest comminus electuari ex vitro Mō agnana.	54
Lassitudo sensiva quando indicat sanguinem euacuandum usque ad polihimiam.	519
Lenientia maiora, minora & minima.	152
Lethalia signa qua sint.	264
Letheales morbi qui sint: qui prognostico relinquuntur.	156. 157. 188
Lien malè affectus cur astringentibus curetur.	83. 398
Lien quomodo euacuatur per urinam.	280
Lipohimia beneficia ex Galeno.	469
Lipohimia quomodo differat à syncope.	513
Lipohimia duplex vel ab morsum vel ob nimiam euacuationem.	513
Loci conferentia qua sint ex Gal.	469
Loci affecti quomodo mutant formam morbi.	274
Loci affecti cognoscuntur per quinque loca ex Galeno i. de locis affectis cap. 5.	
Localia in septem casibus applicanda ante euacuationem.	521
Longaui qui fuerunt.	17
Luna apparatus tarda aut veloc unde fiat.	453. 455

## M

Maginus errat dum defendit Gal. de mense medicinali.	456
Magnitudo morbi quomodo duplex dicatur.	149. 19
Maligna febris à motibus appositis fit.	424
Maris pars separata à toto cur citius putrescat.	407
Marsiliū Ficini exemplū de duobus dolys.	118
Marratio ex Aristotele triplex.	439
Medicamentum cur Hippocrates non dedit Pericli, Metoni, mulieri morosa, & virgini Larissa.	528
Medicamentum ob sex causas alium non mouet.	527
Medicamenti dosi conditiones.	526
Medicamenti conditiones qua uor considerantur.	525
Medicamentum, dum multum euacuatur quan-	



# In hoc opere contentarum.

quando magis alexandum.	194	morbus antiquum curatur tria tollenda sunt;	
Medicamentum sapē impedire crīsim pro-		ex Galeno.	374
batū exemplis agrorum Hippocratis.	55	morbi principium per accidens indicat ci-	
Medicina declaratur exemplo anorum dolo-		būm, & contrariationem.	214
rum.	405	morbi non fiunt sine præcedenti dispositio-	
Medicina sine usu; nesciunt.	411	ne.	65
Medici qui replent egros cur sint Carnifi-		Morbus vehemens & non magnus indicat	
ces.	190	phlebotomiam.	113
Medici qui remedia opposita simul faciunt		Morbus magnus quinque modis sumitur.	89
interimunt.	425	Morbi omnes curabiles, si occasio agendorum	
Medicamenta non agunt in morbos; sed in		non omittatur.	34
subiectum ex Aristotele.	192	Morbi ob quatuor causas ante statum hebe-	
Medicinam non esse docendam usu exempli		fiunt.	204
ex Gal.	32	Morbi qui hebesunt ob quatuor causas inte-	
Medicina præstantia ex sacra scriptura.	13	rimunt.	204
Medicina præstantia ex magno questu.	14	Morbus ut morbus prohibet cibum.	387
Medicina diuisio.	10	Morbi non fiunt ob unicum errorem.	192
Medicina subiectum.	12	Morbi lethales leuissimis remedijs ab Hippo-	
Medicinator a non potest capi, si vita in tri-		cratie irascitur.	181
plum ex Galeno prorogari.	15	Morbi qui sint quidiuiduntur in quatuor	
Medicina an sit ars, vel scientia.	18	tempora.	174. 175
Medicum versari circa vniuersalia.	19. 20	Morbi quomodo fiunt declaratur quatuor	
Medicum non semper imitari naturam.	515	exemplis ab Aristotele.	192
Medici conditiones.	37	Morbus acutus sine febre sua natura est	
Medici quomodo errant dum dant in omni		cronicus.	171
morbo medicamenta.	54. 55	Morbi acuti, an possint esse sine febre.	170
Melancholia ex Gal. excitat famem.	79. 80	Morbi acuti, a quibus causis fiunt.	169
Memoria quomodo differt a reminiscētia.	32	morbi perperacuti sino ieiunio ut plurimum	
Menses fluunt ob quatuor causas.	49. 470	ocidunt.	268
Mensis medicinalis quomodo fiat.	453	morbi tempus duplex vniuersale & parti-	
Mensis medicinalis non format dies crui-		culare.	175
cos.	454	Morbi perperacuti quo die indicantur.	160
Mensis medicinalis quomodo est chi meri-		Morbus ledens actionem naturalem semper	
cus.	454	est per essentiam.	346
Mensis medicinalis ex ipso Galeno est chime-		Morbi conditiones dua consideranda.	524
ricus.	465	Mortem non accidere in vigore & cur.	205.
Menstrua non sequantur motum lune.	463		206
Merion cruda existente materia sanatur &		mortis signa.	264
quomodo.	507	mortui ob cibum intempestiuum.	231
Mitridatis temperamentum aduentitium si-		mors nunquam accidit in postrema parte	
mile veneno.	412	vigoris.	202
Molynsis est defectus coctionis ventriculi, &		motus velox morbi in principio quomodo	
hepatis.	484	cognoscitur.	252
Morbi tempus triplex, vel ratione materia		motus velox præcognoscitur per 8. locos ibi-	
vel ratione gradus caloris, vel ratione		dem.	
symptomatis.	175	motus oppositi faciunt febres lethales.	424
Morbi augmentum quibus signis cognoscitur		Motus vel est criticus vel symptomaticus.	449
	173	Motus symptomatici prænotantur indicat.	450
Morbi facti non tolluntur ad ablationem		mulier trimestris fau grāuida cum cruda	
causa.	173	materia sanatur.	507
Morbi definitio ex Galeno.	240	mulieres quomodo cibis interimunt. egros.	129

# Index rerum, & sententiarum

## N

- N**aturalis facultas in morbis materialibus est principalior. 209  
 Natura si non mouet, mouetur, quomodo intelligat Auicenas. 448  
 Natura si diminuit moueat quid agendum. 449  
 Nauta vel nauigantibus assimilatur medicina. 132  
 Nervos oriri à corde reprobat expetientia. 379. 380  
 Neutra adiectiua in numero plurali sine articulo apud Græcos sumuntur aduerbia. 44. 45  
 Nocumenta principij communicantur augmento, & vigori, sed non è contra. 232  
 νόσος νόστος & νύστα quid significet, apud Hipp. 138. 139

## O

- O**bservationes agrorum Hippocratis non respondent diebus criticis à Galeno consideratis. 464  
 Occasio cur sit princeps. 28. 30  
 Occasionem quomodo pingebant veteres. 31  
 Oia siue articulo significat qualiter, & non qualia. 43. 47. 512  
 Ordo duplex vniuersalis, & particularis vel accidentalis. 9  
 Ossa in infantibus deficiunt 115. 9  
 Quum quomodo conueniat acutis non exat. 127  
 Oua cur mala febricitantibus. 420  
 Oxymentus malificus. 442

## P

- P**alpitiatio tollitur vino de saffra. 388  
 Pans, caro, oua, cur febricitantibus aduersa. 421  
 Paroxysmi accidentia. 432  
 Paroxysmi tempore cur nil dandum. 432. 226. 434  
 Paroxysmi habent sex tempora. 227  
 Paroxysmi in quibus remedia facienda sunt. 435  
 Paroxysmi non habent declinationem. 228  
 Paroxysmi febiles aliquando usque ad finem morbi auge ponunt. 239  
 Pausania casus. 361  
 Pedes congelati in gangrenam cedunt nisi in aquam immergantur frigidam. 147  
 Pepena quid significat ex Hippocrate. 487

- Periculosum, & fallax quomodo differat. 37  
 Periodicatio à qua causa fiat. 245  
 Perperacutorum ultimus terminus est quintus. 165  
 Perperacuti morbi quo die indicentur. 160  
 Perperacutis morbo laboranti, cur dederit vitellos ouorum. 159  
 Perperacuti cur raro terminentur in. 4. 165  
 Perspiratio in robustis maior hyeme quam æstate. 382  
 Perspiratio vide diffusio.  
 Perspiratio in puero cur maior quam in adolescente. 411  
 Perspiratio in æstate fit maior materia inutilis. 383  
 Peste affecti cur multum debent nutrir. 435. 183  
 Pestilentia character. 168  
 Pharmaca omnia calida ex Galeno. 504  
 Pharmaci euacuatio non est utilis nisi præcedat separatio, & ante separationem coactio. 46  
 Pharmacum an sit dandum in die critica si natura nihil moueat. 441  
 Pharmaco quando cruda existente materia ferosaliter uti. 508  
 Pharmacum vide medicamentum.  
 Pharmacum non operatur ob tres causas. 528  
 Phlebotomia à quo indicetur varia opinio. 88  
 Phlebotomiam non indicari à morbo magno probatur. 91  
 Phlebotomiam indicari ab innominato. 96  
 Phisica præseruata annis 23. 157  
 Pisces in acutis à Gal. conceduntur. 38  
 Pisces saxatiles pertinent ad tenuē victū. 126  
 Pituita quomodo in robusto hyeme oritur, & quomodo in debili. 374  
 pituita in robustis hyeme dominatur in parte externa, in debilibus in interna, & exire. 384  
 Plenitudo ad vasa & ad vires que sit. 73. 78  
 pleno corpori mortes repentina accidunt. 76  
 Pleura significat laus, & non membranam. 258  
 Pleuritici quando circa vigorem nutriendi. 163. 193  
 Pleuritici cur pleniorē cibum exigant versus statum. 180  
 Pleuritici signa pathognomica. 256  
 Pleuritici cur in pariem lasam habent decubum.



# In hoc opere contentarum.

cuticum facilem & aliquando non.	257
pleuritis differentia quatuor.	257
Pleuritis non fit solum a vena sine pari v.	258
Pleuritis cruditaris quatuor gradus qui	262. 272
sint.	
no. habet sex significata arti accommoda	165. 440. 488
ta.	
Prædicendo mortem medicus magis existi-	40
mat.	
Traludia ex Auerroe sunt octo.	2
Principiū morbi sumitur tripliciter.	493. 523
Procrastinatio cur periculosa.	30. 31
Profasis quid significet.	29
Prognosticū medicū debet esse hyporeticū.	16
Prognosticum de eueniū agri fugiendum.	16
Prognosticum notari dignum.	157
Pforæ, & ulcera capitis cur sanentur oleo	403
de cherna.	
Prissana quomodo cum in sculo piscium para-	126
batur.	
Pueri carent 115. ossibus.	159
Pueri cur magis concoquant.	305
Pueris cur non conueniant pharmaca, &	309. 288
missio sanguinis.	
Pueri cur magis resoluant.	303
Pueros esse calidiores quomodo probetur.	303
Pulsus humilis quomodo distinguatur ab in-	137. 209
ualido.	
Pulsus inequalis quomodo cognoscatur.	208
Pulsus inæuales quot sint.	209
pulsus doctrinam calcebat Hippocrates.	242
purgantia non conuenire in principio & aug-	490
mento probatur.	
purgantia pituitam, melancoliam, & bilem	489
qua sint.	
purgatos sub cane ex Gal. sapè incidere in	60
malam febrem.	
purgari sub cane quando inuuantur.	61
purgari nec pueros nec senes par est.	61. 62
purgantia efficaciora & minus efficacia que.	142
purgandū numquā est per partem lasam.	470
purgationem infra terminum debere subsi-	500
stere ex Hipp. Galeno & M. sue.	
purredo duplex in fieri & in facto esse.	416
putridus humor duobus modis prepara-	489
tur.	

**Q**uadragesimam cum esu piscium esse  
facilem ratione desumpta à Ga-

leno probatur.	416
Qualitates elementorum non esse formas sub-	319
stantiales probatur ex Aristotele.	
Qualia oportet (ait Hippocrates) si euacuen-	57
tur: nisi per qualia intelligamus qualiter	
aphorismus falsus est.	
Quartana utile remedium.	435
Quartana quo remedio sanetur.	186
Quintanas obscuras ex Gal. dari; sed obser-	241
ra a in inuictu euenire.	
Quintanas & septimanas febres nec à Ga-	241
leno nec ab Hipp. reuera admitti.	

<b>R</b> abiem caninam esse Cynachem.	500
Remedia omnia non impune admini-	442
strari.	
Remediorum actio est temperatiua, non	152
corruptiua.	
Remedia medica non vincere; sed attempe-	158
rare.	
Remedia aequalia duplicia in numero vel	155
in gradu.	
Remedia grauiora in grauissimis morbis	154
non habent locum.	
Remedia aequalia in gradu. cap. 89. artis	146
parua.	
Remedium quoddam ex multis applicatis in-	36
ueris vel nocueris est difficile inueniri ex	
Galeno.	
Remedia omnia aliquid mali efficere.	163
Remedia nec maiora nec minora debere esse.	24
Reminiscencia quid sit.	32
Renibus vitariis quando nocent diuretica.	54
Repletio valde danatur ab Hipp. & cur.	126
Replere repletos est minus malum quam	135
euacuare exinanitos probatur.	
Reicentrix non retinet vel à frigido conden-	51
sante, vel à calido liquefaciente, vel ob le-	
uitatem.	
Renulsiōis definitio.	480
Renulsiō quomodo fiat secundum rectitu-	479
dinem.	
Renulsiō an à stuentibus, fluxibus & fluxibus	480. 481
inducitur.	
Renulsiō an fidi per distantissima.	477
Renulsiōis quatuor conditiones.	476
Renulsiō quando per proxima, quando per	478
remota.	
Renulsiō & deriuatio in quibus conueniunt	481
& differant.	

**S**ana pars vicina sanat partem laesam. 355  
 Sanguis niger, & crassus permittendus ut exeat, sed non floridus. 510  
 Sanguis non est coctionis capax.  
 Sanguis non mittendus si cibus incoctus est in ventriculo. 159  
 Sanguinis euacuanti remedia maxima, minima, & minima. 152  
 Sanguinis euacuatio usque ad lypothymiam in quatuor casibus fit. 518  
 Sanguis an possit euacuari usque ad animi deliquium. 86  
 Sanguinis multitudo ex Galeno apoplexiam hydropem, & syncopem efficere potest. 77  
 Sanguis quot modis mutes propriam formam. 67  
 Sanguis quomodo distinguitur ab alijs humoribus. 66  
 Sanguis cur mittatur in omni febre quatuor responsiones. 55  
 Sanguinis missio in quibus morbis non conueniat. 62  
 Sanguinis euacuatio usque ad animi deliquium quando facienda. 515. 516  
 Sanguinis euacuatio usque ad lypothymiam in tribus casibus facienda. 516  
 Sanguinis euacuatio an sit facienda in causatione. 516  
 Sanguinis euacuatio usque ad lypothymiam in principio morbi facienda. 520  
 Sanitas non est finis in medicina, sed scopus. 12  
 Sani cur à medicinis laedantur. 53  
 Sarcotica quando applicantur cauo ulceri. 401  
 Saxonia damnatur dum iubet euacuationem symptomaticam fouendam esse in principio morbi, deceptus à praua intelligentia secundum aphorismi. 46. 512  
 Scammonium cum lacte pro matrona Romana vulceribus pedum correpta. 526  
 Scopus duplex in omni morbo considerandus. 184  
 Secta medicorum qua sint, & quomodo differant. 35  
 Semina parentum corrumpi in sua generatione. 338  
 Semina conservari eadem numero usque ad senectutem ridiculum. 438  
 Semen perdurare usque ad obitum idem

specie non idem numero. 349  
 Senes decrepiti; vide decrepiti  
 Senum calidum nativum esse exiguum declaratur duobus pulcherimis exemplis. 311  
 Senes cur cibum conuertant & non pituitam. 411  
 serofitates coqui posse ex Galeno. 507  
 serofitas ob quatuor causas in corpore cumulantur. 49  
 serofitas lactis continet duplicem naturam aqueam videlicet & igneam. 420  
 serofitas quod significet apud Hipp. 115  
 siccitas est etiam in butyro. 392  
 signa mortalia. 264. 226. 227  
 signa mox apparentia qua sint. 256  
 signa communia, antecedentia, & consequentia qua sint. 65  
 signa humorum peccantium unde desumantur. 63. 64  
 simile triplex, maius, minus, & aequale. 406  
 similia similibus quomodo conferuntur. 406. 407  
 similitudinis communia principia ex Galeno. 315. 320  
 simonis historia de latis pustulis. 450  
 somni definito qua sit. 379  
 somnus quid in quo conueniant & differant Gal. & Aristoteles. 377  
 somnus ubi fiat & à qua causa dissentiant Aristoteles & Galenus. 377  
 somnifera vera qua sint. 379  
 somnifera vera qua sint ibidem.  
 Spagiricorum error. 366  
 spagirici cur laedant semper patientes. 192  
 spagirici volunt vincere, & non moderari ideo occidunt. 145  
 splen cur sanetur astringentibus. 83  
 splenetici vide lien.  
 spiritus viatrioli cur laedat agros. 147  
 spiritus quor sint. 360  
 spiritus sanguinolentus quomodo curandus. 144  
 sputa qua bona qua mala sint. 273  
 pituitum quomodo differat à spumatamine. 272  
 status morbi vide vigorem.  
 statica artis fundamenta ex Gal. 70. 71  
 subiectum medicina est innominatum. 23  
 subiectum in medicina non esse corpus humanum probatur. 11  
 subsidencia vasorum cur efficiat syncopem. 71  
 subsidencia ex Gal. à tribus causis fit. 82. 83  
 sudo-



# In hoc opere contentarum.

sudores qui sint optimi & quando. 285  
suppurantia quando conueniant. 401  
sympomatica euacuatio an sit uilis. 451.

452

sympomatica euacuatio non fouenda contra  
saxoniā. 46

sympoma morbi est accidens, & vocatur  
symptuichos idest simul ueniens con mor-  
bo. 177

sympoma ex se nec augmentum vel decre-  
mentum habet. 177

syncope duplex à suffocatione & resolutione  
quomodo curanda. 159

syncope quomodo differat à lypothimia. 86.

513

synocha non purida indicat euacuationem  
sanguinis usque ad deliquium. 517

synocha inter ardentis collocatur. 516

synocha, homotona qua hora cibandum  
sit. 233

synocha febres an habeant quatuor tem-  
pora. 182

synocha perperacuta cur tractetur à Galeno  
cremone pissana. 158. 159

synochus non iudicatur per crisin. 433

synocha omnes quomodo fiant. 223

synochus usque ad animi deliquium tollitur  
phlebotomia. 433

T

Temperaturam esse constitutionem &  
constitutionem esse calidum natuum  
aqua actiones dependent. 337

Temperatura essentialis triplex. 346

Temperaturam esse causam intellectus. 337

Temperatura accidere unitates & cum  
positiones. 337

Temperatura essentialis est omnium mixto-  
rum forma. 348

Temperatura influens qua sit. 350

Temperatura hepatis agrorum non cognosci-  
tur per latitudinem venarum. 412

Tempora morborum nec cibum nec euacua-  
tionem indicant. 213

Tempus anni an indicet similia, vel con-  
traria. 408

Tetanus aqua perfusione sanari, & cur. 404

Tā articulus significat rem perfectum. 74.

164

Tolerantia, & conferentia qua indicent sa-  
lurem. 48

Tolerantia, & conferentia duplex salubris.

& non salubris.

312. 314

Topica in septem casibus applicanda aue  
euacuationem. 321

Transumptio humorum in uiuente admi-  
randa. 473

Turgere unde desumptum est. 494

Turgentes humores à se ipsis mouentur &  
non à facultate naturali. 468

Turgentes humores quando sint purgandi.

483. 527

Turgentes in acutis an raro turgant ibidē.

Turgentes humores in Critone Larissa, &  
Horofonte, cur pharmaco ab Hippocrate  
non sint purgati. 495

Turgentes humores an solum tenues sint,  
& non crassi. 496

Turgentes humores cur sint purgandi qua-  
tuor causa. 496

Turgentes humores numquam sunt in mor-  
bis chronicis. 522

V

Vacuū non attrahit. 51

Valesius quomodo erret dum negat  
coctionem ventriculi esse solum elixatio-  
nem. 486

Variola cur aqua nostrum curentur. 403

Vasorum inanitio fit ab sex causis. 207

Vena angusta ob quas causas fiant. 291

Venas latas qui habent possunt commodē  
ferre ieiunium. 291

Vena thoracis iecoris, & pulmonis, cur ubi  
est plenitudo facit rumpantur. 76

Vena sectio in qua regione comodē fiant, &  
quibus ventis spirantibus comodē fieri  
possit. 60

Venter quid significat. 48

Ventriculus ex Gal. est tamquam olla. 385

Ver in tres partes diuiditur. 375

Veris, & autumnus, differentia. 428

Veritatis prerogativa ex Galeno. 465

Vetula atheniensis cura alia, historia. 412

Victus tenuis ut differat à victu attenuante.

116

Victus à vigore desumitur. 131

Victus qui plus est facit noxas inemenda-  
biles. 128

Vigore existente datur victus tenuissimus  
ob tres causas. 190

Vigor cur sit forma diatandi. 131

Vigor morbi diuiditur in tres partes. 162.

188

Vigor

# Index rerum, & sententiarum

<i>Vigoris pars postrema non est periculo à ibi.</i>	<i>bus contraindicer.</i>	197
<i>Vigor morbi an tardus vel brevis quibus signis cognoscitur.</i>	<i>Vitam qui longam habuerunt.</i>	17
243. 251	<i>Vina diuturna quomodo reddi possit.</i>	125. 209
<i>Violenti cur morbis calidis non laborent cum vinum calidum sit ex Aristotele.</i>	<i>Vuligo quomodo sanetur.</i>	469
60	<i>Vulnora quomodo à plebeis chirurgis male tractentur.</i>	400
<i>Vinum cum pane ex Alexandro Aphr. cur iuncti febricitantes.</i>	<i>Vulnora ob 11. causas non sanantur.</i>	400
143	<i>Vomitus qua cautione mouendus.</i>	471
<i>Vinum Hippocraticum ad quid inuenit.</i>	<i>Vomitus maleficia.</i>	404
389	<i>Vomitus in hyeme cur periculosus.</i>	61
<i>Vinum de lassafraas tollit palpirationē.</i>	<i>Vomitus fit, vel à natura, vel à lasa re ren- trice, vel expultrice, vel attrahente.</i>	52
388	<i>Vrgentium quatuor classes qua sint.</i>	394. 396
<i>Vires debiles, vel ob morbum vel ob cibi ca- rentiam.</i>	<i>Vrina cruditas dicitur omotiss ex Aristotele &amp; à qua causa fiat.</i>	484
88	<i>Vrina qua indicant recidivam.</i>	283. 284
<i>Virtus debilis vel fortis quomodo per stati- cam dignoscatur.</i>	<i>Vrina rubra qua mala, qua bona.</i>	280. 281
137	<i>Vrina nigra quando bona quando mala.</i>	279
<i>Virtus in acutis minuenda, &amp; non conser- uanda, &amp; cur.</i>	<i>Vrinarii turbidarum dubitatio in Gal.</i>	279
184	<i>Vrinis exacta tractatio.</i>	275. 276
<i>Virtus in aegris quo robustior, eo tenuius alendum.</i>	<i>Vrinis crudis duo agri Hippocratis sanan- tur.</i>	49
198	<i>Vrina nubecula quando statum, vel augmen- tum indicent.</i>	210
<i>Virtus naturalis robusta quomodo cognos- catur.</i>	<i>Vulnora ob 11. causas ex Galeno non sanan- tur.</i>	400
210		
<i>Virtus suffocata quibus signis cognoscitur.</i>		
209		
<i>Virtus vitalis quomodo cognoscatur, an pos- sit perdurare.</i>		
208		
<i>Virtus qua debet conservari, est vitalis.</i>		
203		
<i>Vires cur minuenda in acutis.</i>		
<i>Virtus in quibus casibus indicet, &amp; in quibus</i>		

F I N I S.





# SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ

THEORICAM ORDINARIAM PRIMO

LOCO PROFITENTIS

Commentaria.

IN PRIMAM SECTIONEM APHORISMORVM

HIPPOCRATIS.

**V**ITA brevis, & ars longa nobis persuadent, vt in explicatione aphorismorum omittamus superflua, ac solum quæ sunt apprime necessaria ad aphorismos, & artem medicam addiscendam prosequamur. Cæterum, ne omnino illotis manibus ad horum interpretationem accedamus, hæc, sed paucis quidem, considerabimus. Primum de inscriptione. Secundum, an aphorismi aliquo ordine traditi sint. Tertium de intentione Hippocratis in hoc libello. Quartum an hic liber sit Isagogicus. Quintum de subiecto huius libri, & totius medicinæ. Postremò nonnulla pauca de artis præstantia.

Græci tamen, vt simplicius, & Amoenius in antepredicamentis ante textus interpretationem decem faciunt præludia.

Auerroes vero in primo text. primi Phisicorum proponit octo. Nos tamen pauciora. Sed antequam ad huiusmodi intentionem accedamus, hæc tria in his commentarijs pollicemur.

Primum in ijs, quæ parum utilitatis afferunt, non immorabimur: neque illos, qui fusè disputant de nominibus imitabimur. Contra quos Galenus lib. 3. de differentijs pulsuum cap. primo his ferè verbis inuehitur: Isti, qui in hac facultate disputant de nominibus, sunt venia indigni: quia tot, ac tanta sunt in hac arte, vt si vita nostra in triplum prorogaretur, adhuc illa exactè consequi non possemus.

Secundum, si in aphorismis latinis sensus fuerit clarus, syncerus ac fidelis. Nec verba Græca nec allaturos, nec nominatu-ros quidem: si vero in aphorismis Latinis Hippocratis arcana non fuerint omnino expressa, quod sæpè accidit, nos nonnulla è Græca eruditione eruta antea fortasse ab

alijs non visa, quæ nouum sensum, nouamque adferent intelligentiam, proponemus.

Tertium si à principijs huius Theorici, tamquam è Cælo aliqua colligi poterunt medicamenta, vel instrumenta nobis inferuentia pro conseruanda, vel recuperanda sanitate, illa in mediū afferemus: neque iniuria quidem: quia sicuti Practici munus est comprobare propria theoremata per ipsam theoricam, quæ comprobatio est à priori, & per demonstrationem propter quid: sic Theorici munus est propria theoremata per ipsam practicam confirmare, videlicet à posteriori, seu per demonstrationem quia.

## QUESTIO I.

### De Inscriptione.

**Q**uo ad inscriptionem, quæ est, Hippocratis Cei Aphorismorum sectio 1.  
Circa hanc inscriptionem tria sunt consideranda.

Primum, quid nomen aphorismi significet. Secundum, quænam sit aphorismi natura. Tertium verò de persona Hippocratis.

Quo ad nomen aphorismi, id deducitur à verbo Græco ἀπορίζω, quod verbum tria significat.

Primo significat separo: sic Galenus in commento primi aphorismi vocat aphorismos sententias separatas: similiter Diuus Matthæus cap. 15. inquit, quod pena, qua Rei afficiebantur, erat quod ab alijs separarentur, illamque separationem vocabant aphorismum.

Secundo ἀπορίζω significat constituo, seu definitio: sic Aristoteles 3. & 4. Ethicorum per ἀπορίζω intelligit constituo, seu definitio: ορίζω enim significat definitio.

Tertio ἀπορίζω significat eligo: similiter Aristoteles 4. politicorum dicit, ciues boni eligantur, id est ἀπορίζονται: sic Diuus Paulus electos vocat ἀπορίζουμένους: quare aphorizo significat separo, constituo, & eligo siue expurgo. hæc de nomine.

Quoad naturam aphorismi: aphorismus continet in se tres condiciones.

Prima quod sit sententia separata, di-

stineta, & sine ordine prolata; quæ conditio re vera magis se tenet ex parte nominis, quam ex parte rei: quia potius ethimologiam, quam intimum sensum patetefacit.

Secunda conditio est, vt aphorismus sit sententia constituta, definita, rara, & certa rerum explicatio.

Tertia, quod aphorismus sit sententia selecta, continens in se magnam vim.

Hæc duæ postremæ conditiones magis explicant intrinsecam aphorismi naturam: aphorismi enim sunt sententiae ex alijs libris selectæ, ita vt nullus sit aphorismus in hoc libro, qui non reperiatur in alijs Hippocratis libris: sicuti enim apes colligunt mel ex præstantioribus floribus: Sic Hippocrates ex his, quæ dixit in alijs libris, colligit has diuinas sententias, tamquam suauissimum mel, easque distribuit in septem sectiones.

Hinc varij Auctores respicientes modo ad primam conditionem, modo ad secundam & tertiam vario modo descripserunt aphorismos.

Auerroes in coll. & Mesues in lib. de consolatione medicamentorum, dum citant aphorismos, dicunt, sicuti dixit Hippocrates in libris separatorum sermonum.

Græci, Latini, & ipse Galenus respicientes ad secundam & tertiam conditionem, quæ magis explicant essentiam aphorismi, varijs conceptibus descripserunt naturam aphorismi.

Philotheus antiquus interpres, & commentator aphorismorum Hippocratis dixit, aphorismum esse sententiam quo ad verba inopem; sed quo ad sensum locupletem, quia paucis exprimit ea, quæ sunt magni momenti.

Hinc Suidas definiens aphorismum vult, esse sententiam tanti momenti, vt superet humanum captum: additque, Hippocratem illos composuisse potius Diuino, quam humano afflarum lumine.

Budeus definit aphorismum duobus verbis, dicens, aphorismum esse dictam sententiosum.

Galenus in Comm. 1. aphorismi inquit, aphorismum esse sententiam, quæ breuissimis verbis rerum proprietates maxime ad vsum accommodatas circumscribit. Immo Gale-



Galenus: dū Hippocrates 4. de ratione vic. 19. protulit illam diuinam sententiam, quæ his breuissimis verbis docet quando sit mittendus sanguis, *si morbus fuerit uehementis, atque floruerit, & virium robur affuerit, sanguinem detrahet*, miratur in illo Comm. cur Hippocrates dictam sententiam in aphorismorum numero nō collocauerit: quia paucis exprimit sententiam, quæ habet magnam vim, cum paucis doceat, quando sit mittendus sanguis: medici enim maximè existimātur, dum tempus opportunum mittendi sanguinem rectè percipiunt.

Ex his colligimus, aphorismum esse orationem inopem quo ad verba, locupletem vero quo ad sensum, esseque sententiam electam, & expurgatam, atque in se magnam vim continentem.

Sed inde oritur dubitatio, quia, si de ratione aphorismi esset oratio brevis & electa continens magnam vim, sequeretur, quod adagia & apophthegmata essent Aphorismi, quod non est dicendum.

Respondent nonnulli, aphorismos esse solum inuentos ad vsum medicum, atque aphorismos in alijs facultatibus non habere locum. Caterum falluntur, quia dantur aphorismi politici, de quibus Iustus Lipsius, Ioannes Cokierius, & alij scripserunt.

Quare dicimus, Aphorismos esse sententias breues continentes magnam vim, siue ad vsum medicum, siue ad vsum politicum, vel aliarum facultatum, sed selectas ex eadem facultate. Quando vero non sunt ex eadem facultate selectæ: sed per omnes vagantur: tunc apophthegmata, seu adagia vocari possunt.

Aphorismi enim Hippocratis præcipuè selecti sunt ex pronosticis, ex lib. prognos. ex lib. de aere, aquis & locis, ex lib. de ratione vic. ex Epidemicis, & ex alijs libris, ita ut nullus Aphorismus inueniatur in hoc libello Hippocratis, qui in dictis libris nō reperitur: quasi quod Aphorismi sint tamquam flores sententiarum alibi propositarum: quare & ex Medicina, & Morali Philosophia, & ex quolibet alia facultate aphorismi colligi possunt.

Quo ad personam Hippocratis, hic fuit

Princeps Coacæ academix. Hic fuit nobilis viroque patente. Fuit filius Heraclidis ex familia Asclepiadorum, quæ à Ioue, Apolline, & Esculapio originem duxit. A Ioue fuit vigesimus: ab Apolline decimus nonus: ab Esculapio decimus octauus: testis enim est Plato in Protagora, & Phædro, ubi inquit, Hippocratem natum esse ex progenie Esculapij. Apollo fuit inuentor medicinæ: vnde ars medica vocata est apollinea, & Phæbea: diciturque Apollo: quasi ἀπολύει, idest abluens à malis, vt dicit Plato in Cratilo, ubi agit de recta nominum impositione. Eusebius dicit, quod Apollo dicatur ἀπὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν νόσων, quia à morbis liberat.

Mater Hippocratis fuit Praxitea, quæ ab Hercule traxit ortum.

Hippocrates fuit sapientissimus, & doctissimus: Galenus n. 1. meth. cap. 2. vulg. Platonem & Aristotelem ab Hippocrate philosophiam desumpsisse. Fuit doctissimus: habuitque præceptores insignes. In Rhetorica habuit Gorgiam Leontinum. In Philosophia Democritum, in cuius gratiam doricè scripsit aphorismos. In medicina habuit eius patrem, & Herodicum illum famosum.

Habuit duos filios, Thessalum & Draconem, qui soliti erant à comicis irrideri: fortasse ob eorū inscitiam, quamuis re vera Thessalus apud Archelaum Regem Macedoniae fuerit in maximo honore. Habuit quoque filiam, quam dum esset in Macedonia collocauit aucto Aristotelis, vnde natus est Nicomachus.

Floruit Hippocratis Pater annis quingentis ante Christi aduentum. Post Homerum annis quadringentis: ante Aristotelem vero mortuus est annis centum & vndecim. Aetatis annorum 104. vt refert Suidas: obiitque in Latissa Thessaliæ, quæ est insula in arcipelago, atque nunc eius demus aduenis ibidem ostendi solet.

Hic fuit ille magnus Hippocrates, qui composuit aphorismos, vt refert Galenus in hoc commento, quod quidem potest quoque comprobare auctoritate, & ratione: auctoritate nō solum Galeni, sed omnium Græcorum, Arabum, & Latinorum, ad differētiā Hippocratis Aui, qui secus



dum opinionem nonnullorum, vt refert Galenus 1. de ratione victus comm. 18. composuit libros de fracturis & de articulis, ad differentiam Hippocratis nepotis, qui secundum opinionem Dioscoridis, referre Galeno 1. in 6. epid. com. 28. composuit libros de morbis. Idem probatur ratione: quia libri legitimi Hippocratis distinguuntur à spurjijs: nam in legitimis obseruatur summa breuitas, summa veritas, & summa dicendi grauitas: sed sic est, quod in aphorismis Hippocratis obseruatur summa breuitas, quia nulla dictio est superflua: summa veritas: quia ex Galeno 1. de V. P. 9. dictio Hippocratis voci Dei æquiparatur: obseruatur summa grauitas: quare aphorismi inter legitimos Hippocratis libros sunt collocandi.

Hic fuit ille magnus Hippocrates, qui fuit & probus, syncerus, & magno ingenio: agens enim de futuris capitis patefecit proprios errores: vnde factum est, quod Quintilianus lib. 3. cap. 8. de Hippocrate ista dixerit, *Hippocrates clarus in arte medicina videtur honestissime fecisse, dum proprios quosdam errores confessus est, hoc sine ne posterii peccarent.*

Celsus lib. 8. cap. 4. laudans Hippocratem ob confessionem proprii erroris, habet hæc verba. Leuia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt: at magno ingenio, magnaque nihilominus habituro, conuenit etiam simplex proprii erroris confessio, præcipue ne posterii decipiantur.

Post Hippocratem ante Galenum duodecim famosi aphorismorum interpretes numerantur, nempe Attalus, Bacchius, Donus, Erophilus, Eraclides, Lycus, Marinius, Pelops Galeni præceptor, Quintus, Ruffus, cuius adhuc extant monumenta, Soranus Ephesius, & Zeufis. Post Galenum innumerabiles fuerunt, sed inter recentiores, isti præcipue sunt legendi, nempe Trinerius, Oddus, Saluus Sclanus, Montanus, Cardanus, Capiuaceus, Zechius, & quamplurimi alij qui eandem doctrinam secuti sunt.

## Q V A E S T I O I I.

*An aphorismi aliquo ordine traditi sint.*

**O** mnes ferè dicunt, & ipse Galenus, aphorismos esse sententias separa-

tas, & sine ordine prolatas. Sed quomodo defendi poterit Hippocrates, quod tradiderit medicinam sine ordine? hoc sane videtur Hippocrate indignum: non ne poterat Hippocrates illud efficere, quod deinde fecit Euclides, qui omnia theoremata geometrica disposuit secundum ordinem compositium? Similiter non ne Hippocrates poterat efficere quod deinde effecit Aristoteles in analyticis, & moralibus, qui miro ordine resolutiuo omnia præcepta disposuit? in primo enim Post. in principio proposuit definitionem scire, quod est finis demonstrationis: deinde ex illa collegit omnia præcepta pro formanda demonstratione.

Parimodo in libris ethicorum ex notione finis, id est felicitatis præcepta collegit, quibus obseruatis reddi possumus (si velimus) felices & beati. Sic Hippocrates poterat in 1. aphorismo, vel in 2. proponere finem medicinæ: deinde ex fine colligere aphorismos potiores pertinentes ad partem physiologicam, deinde pertinentes ad simioticam, & pathologicam, demum omnes illos recitare, qui inseruiant pro conseruanda, vel introducenda sanitate, quem ordinem obseruauit Auicennas in 1. lib. Canonis, & Auerroes in libris colligit.

Respondent nonnulli pro Hippocrate, aphorismos esse ordinum incapaces. Hæc responsio est alijs deteriori: quomodo sunt ordinum incapaces? non ne Auicennas proposuit in Cantica 757. aphorismos miro ordine dispositos? Præterea non solum aphorismi, sed sabellæ, & nugæ possent secundum ordinem resolutiuum, vel compositiuum disponi.

Responder Galenus ad instantiam 1. de ratione victus 36. & 3. aphorismorum 16, his verbis. Non est mirum, si Hippocrates ijs quæ dixerit non dedit ordinem quia fuit primus inuentor: primi verò inuentores non possunt dare complementum rebus. Quare non est mirum, si aphorismi legantur sine ordine.

Sed augetur dubitatio, quia videntur aphorismi miro ordine contexti, quoniam à 4. aphorismo vsque ad 20. agit de ratione victus, ita vt, neque syllaba sine miro ordine prolata sit.



Nos respondemus, ordinem duplicem esse, alium vniuersalem, qui dat esse & formam libris, & est ordo resolutiuus, & compositiuus. Datur quoque ordo particularis, vel accidentalis, qui non est resolutiuus, vel compositiuus: sed inferuit pro aliqua occasione, vel ad memoriā: sicuti dum practicanes agentes de morbis incipiunt à morbis capitist: deinde descendunt ad morbos thoracis: iste ordo neque est resolutiuus, neque compositiuus: sed solum inferuit ad memoriā: simili ordine vsus est Hippocrates in aphorismis.

Quidam dicūt, librum aphorismorum, & artem paruum habere illam proportionem ad vniuersam medicinam in tot Galeni libris expositam, quam habent pueri infantes ad viros, quia dicunt: sicuti in infantibus multa deficiunt pertinentia ad solidas partes: sic in libris aphorismorum multa deficiunt pertinentia ad singulas medicinæ partes. Addunt in pueris infantibus deficiunt centum, & quindecim ossa, nempe duo ossa bregmatis, quæ adhuc sunt cartilagines, os ithmoide, duo ossa styloides, quatuor ossa coccygis, 3. dentes, 48. ossa sesamoidea, 16. ossa carporum, 8. tarforum, & 2. patellæ.

Nos respondemus, non esse parem rationē de arte parua, & de aphorismis: quia in arte illa multa deficiunt: sed in aphorismis omnia solida artis præcepta inueniuntur: ideo aphorismi nō habēt illam proportionem ad vniuersam medicinam, quam pueri ad viros: sed potius oppositum dicemus, totam videlicet medicinam, quæ multis, & superfluis verbis declaratur, habere illam proportionem ad aphorismos, quam habent pueri ad viros, quia paucis in ipsis omnia amplectuntur.

### QVÆSTIO III.

*De intentione Hippocratis & medicinæ diuisione.*

**Q**uo ad intentionem seu institutum Hippocratis in hoc libello, dicimus esse ex vniuersa medicina seligere sententias magis purgatas, ac ad vsum medicum accommodatas, dicimus ex vniuersa

medicina, & ex qualibet eius parte.

Diuiditur medicina in quinque partes: quarū prima dicitur physiologica, quæ agit de septem rebus naturalibus, quæ sunt elementa, temperamenta, humores, membra, facultates, spiritus & operationes.

Secunda pars medicinæ dicitur pathologica, quæ agit de morbis, symptomatis, & causis morborum.

Tertia dicitur simiotica, quæ agit de signis.

Quarta dicitur yginī, idē salubris, quæ agit de tuen. sanitate.

Quinta vero dicitur therapeutica, idē pars curatrix, quæ agit de recuperanda sanitate. Ab omnibus istis medicinæ partibus Hippocrates desumpsit sententias magis purgatas, ac magis ad vsum accommodatas, quæ sunt ipsi aphorismi.

In hac prima particula Hippocrates nixus illo fundamento, quod medicina (vt docet lib. de flatibus cap. 6.) sit additio, & ablatio, agit de additione & ablatione: de additione agit à 4. aphorismo vsque ad 20. quæ additio fit per victus rationem: de ablatione vero à 20. aphorismo vsque ad finem istius particulæ, in qua agit de loco, tempore, quantitate, & qualitate euacuationis, vt fusè in illorum aphorismorum declaratione explicabitur.

### QVÆSTIO IV.

*An hic liber aphorismorum sit Isagogicus?*

**Q**uæritur an hic aphorismorum libellus sit Isagogicus, videlicet an sit legendus ante alios, vel post alios. Ex vna parte videtur esse Isagogicus: quia Galenus in cōm. ait, aphorismos esse viles ad acquirendam primam disciplinam: ergo ante alios legendus est. Ex alia parte Galenus 1. de alimentis cap. 1. vult, compendiosas tractationes conuenire prouectis, & non tyronibus: sed sic est quod aphorismi pertinent ad compēdiosam tractationem, ergo conuenient prouectis, & non tyronibus.

Præterea sectione 4. aphorismorum cōm. 71. Galenus habet hanc sententiam *Nemo audeat accipere aphorismorum interpretationem, nisi prius totam medicinam ad-*



disceat: ergo liber aphorismorum post alios erit legendus.

Respondet Oribasius, aphorismos legi posse ante alios, & post alios: ante alios cum interpretare in arte medica versato: post alios sine boni interpretis auxilio: ratio est, quia in aphorismis continentur præcepta pertinentia ad quamlibet medicinæ partem, nempe ad physiologicam, pathologicam, simiopticā, yginī, & therapeuticā. Si igitur tyrones inciderēt in aphorismū ad therapeuticam pertinentem, nō præcognita pathologia, illum non intelligerēt, nisi ope boni interpretis. Dum verò dixit Galenus, cōpendiosas tractationes cōuenire prouectis, dicimus intellexisse sine Præceptoris auxilio.

## Q V Æ S T I O V.

De subiecto.

**Q**uestio est de subiecto: sed quia susus in commentarijs Auicennæ egimus de hac re: ideo paucis in hoc loco. Dicimus igitur, illud esse in hoc aphorismorum l. bello subiectum, quod est in tota arte medica: solum differt, quia subiectū in hoc libello traditū est doctrina aphoristica: in tota vero arte medica traditū est ordine resolutiuo, sed fustissima oratione.

Subiectum igitur medicinæ duplex est, aliud circa quod versatur ars medica, atque hoc est corpus humanum, quod à Galeno lib. de partibus artis medicæ cap. 8. vocatur secunda materia: per hoc subiectum ars medica non distinguitur à philosophia naturali: quia philosophia naturalis considerat & corpus humanum, & sanitatem.

Aliud vero est subiectum artem constituens, atque hoc subiectum est ratio formalis, per quam medicina distinguitur à philosophia naturali, & ab alijs artibus: hæcque ratio formalis ex Aristotele 1. Rhetoricorum iu principio, & ex Galeno lib. ad Trasylb. 28. est finis, per quem artes constituantur, & ab alijs distinguuntur.

Finis verus & proximus in medicina, per quem medicina constituitur, & distinguitur ab alijs facultatibus, si credendum est Galeno, Aristoteli, Auerroei, & probis Au-

ctoribus non est sanitas: sanitas enim est scopus, seu finis postremus.

Galenus lib. de sectis in principio habet hæc verba: *τὸς ἰατρικὸς σκοπὸς αἰσχύνη ἐστὶν: τὸ δὲ ἡγεμονικὸν αὐτῆς, ἰδέσθαι τὴν ὑγίαν*: id est sanitas est medicinæ scopus: finis vero est comparatio sanitatis.

Aristoteles 1. Rhetoricorum ad Theodectem cap. 1. habet hæc verba: non est finis medicinæ sanitatem introducere, sed quousque possibile est bene curare, quia rectè curamus etiam insanabiles. Neque Rhetoris finis est persuadere, sed aptè dicere ad persuadendum. Neque naturæ finis est portus: sed inuenire modum, quo possimus portum adipisci.

Auerroes 1. colliger cap. 1. habet hæc verba: Finis medicinæ non est ad sanandum, sed ad faciendum quod possibile est ex arte.

Hinc Galenus 2. meth. cap. 7. & 9. meth. 7. loquens de parte curatiua non dixit finem esse sanitatem: habet enim hæc verba: Finis proposita tractationis est inuenire remedia, vt bene curemus. Primo vero de tuen. sanir. in principio habet, Finem medici conseruantis esse modum inuenire, quo sanitas possit conseruari, prout possibile est: ita vt artifices omnes fabricent suum subiectum.

Hinc Aristoteles 2. Post. cap. vltimo & 6. Eth. cap. 4. asserit, artes versari circa generationem sui finis, siue sui subiecti formalis ad differentiam philosophiæ naturalis, metaphysicæ, & mathematicæ, quarum subiecta non fiunt, sed facta sunt ab æterno.

Quare concludimus cum Aristotele, quod bene, & quousque possibile est curare humanum corpus, quod consistit in remedium inuentione, sit finis, & ratio formalis partis curatricis.

Bene vero, & quousque possibile est conseruare, sit finis, & ratio formalis subiecti medicinæ conseruatricis.

Bene & quousque possibile est restaurare sit finis analepticæ.

Ideo subiectum in tota medicina dicimus esse corpus humanum, quod ex arte id est per rectam inuentionem remedium quousque possibile est curetur, conseruetur, præseruetur, & restauretur, traditum doctrina resolutiua fustissima oratione:



tione: subiectum verò in hoc libello idem esse, sed traditum doctrina æthoristica.

## QVÆSTIO VI.

### De medicina Præstantia.

**Q**uo ad medicinæ præstantiâ spectat, omiſſis alijs Auctoriſ. teſtes de ipſa ſunt ſacra Scriptura, Plato, Ariſtoteles, & Hiſtoriæ. Quo ad ſacram Scripturam: in Eccleſiaſtico legitur illud tritum & vulgatum. Honora medicum propter neceſſitatem: creauit enim illum Altiffimus: ſubdit, diſciplina medici exaltabit illum, & in conſpectu magnatum collaudabitur. Altiffimus creauit de terra medicinam, & vir prudens non abhorrebit illam.

Præterea medicina fuit in tali exiſtimatione, vt Ezechias ſcripſerit librum de medicamentis. Eſaias verò cap. 3. dum loquitur de medico, ſumit illum pro homine, qui ſemper affluat diuitijs: profertque hæc verba: non ſum medicus, & in domo mea non eſt panis, neque veſtimentum; quaſi dicat non ſum diues, quia ſupponit non inueniri medicum, qui diuitijs, & alijs fortunæ bonis non affluat.

Chriſtus Saluator Noſter in ſanando paralytico ſe medicum oſtendit. Diuus Paulus ad Timotheum oſtendit, ſe verſatiſſimum in medicina, dum dicit: noli adhuc aquam bibere, ſed modico vino vtire propter ſtomachum, & frequentes tuas infirmitates. ſimiliter Diuus Lucas Euangelista teſte Paulo exercuit medicinam.

Petrus Hiſpanus, qui deinde fuit Pontifex Romanæ Eccleſiæ, medicinam exercuit: extat enim eius liber de re medica, qui vocatur theſaurus pauperum.

Si verò inſpiciamus Platonē in Timæo, ubi agit de morbis, de febrium, & humorum peccantium differētijs, arbitratus eſt, nihil felicius humanis corporibus contingere poſſe, quam bene valere. Immo proponit quamdam cantilenam conuiuialem in Gorgia ſolitam celebrari à diſcumbentibus dicens: optimum eſt bene valere: ſecundo loco eſſe formoſum: Tertiò habere diuitias nulla fraude acquiſitas.

Si vero inſpiciamus Ariſtotelem, ipſe

fuit medicus, egitque de ſanitate et morbo.

Postremò ſi ex quæſtu, & mercede huius artis præſtantiam colligere velimus (licet Hippocrates ſcribens ad Abderitas dicat pro eius uſu mercedem nunquam accepiſſe) nulla eſſet iſta præſtantior (omiſſis alijs textibus) quam reſert Philippus Comineus lib. 6. cap. 7. ſuæ hiſtoriæ, nempe Lodouicum XI. Galia Regem ſuo medico dono dediſſe ſingulis menſibus decem millia aureorum & ultra, itaut ſpatio quinque menſium (vt reſert) receperit aureorum 54. millia.

Eraſtratus ob ſanitatem Antiocho Regi reſtitutam mercede dono habuit centum talenta quæ ſunt noſtrorum aureorum 60. millia.

Plinius mentionem facit de medicorum muneribus, inter cæteros nominat Caſſium, Arantium, Carpintaccium & alios, qui pro annua merce ſe habebant ducenta, & quinquaginta ſextertia, quæ ex Budeo ſunt ſex millia ducenta, & quinquaginta aureorum. Cæterum mittamus lucrum; ſeu mercedes, quæ ſanè non declarant medicinæ præſtantiam: quia non deſunt Principes, qui plus dant nebuloniſ, quam medicis, & philoſophis: dignitas enim, & medicinæ præſtantia inde eſt colligenda; quia vitam protrahit, & ſanitatē reſtituit, quod magis valet, quam infinitus theſaurorum numerus. Demum dignitas confirmatur, vt dictum eſt, quia illam ſacra Scriptura, illam Plato, Ariſtoteles, & omnes ſapientes ad ſydera extollunt.

## APHORISMVS PRIMVS.



*ITA brevis, ars longa, occasio praeceps: experimentum periculosum, iudicium difficile. Nec solum seipsum prestare oportet opportuna facientem: sed & agrum, assidentes, & exteriora.*

In explicatione omnium aphorismorum tria considerabimus. Primo scopum, & sensum aphorismi. Secundo singula verba, perpedemus: quia nulla est difficultas, immo nullus est articulus in aphorismis Hippocratis, qui aliquid mysterium in se non continent. Tercio, difficultates, quae contingunt in verborum explicatione pro viribus dilucemus.

Quantum attinet ad scopum, seu intentionem Hippocratis in hoc 1. aphorismo, dicimus, quod eius intentio sit tradere procerum, quo reddat nos attentos, dociles, & beneuolos, quod est adeo genericum, vt di ei possit procerum vniuersae medicinae.

Dum dicit, *Vita brevis*, duo comprehendit. Primo reddit auditores attētos: nihil enim potest magis, quam vitae breuitas reddere nos attentos, attonitos, & stupefactos.

Secundo addit rationem sui instituti, cur scilicet aphoristicè scripserit.

Vel dicimus respondere cuidam tacitae obiectioni; quia aliquis potuisset dicere, à Hippocrates, cur tractasti artem medicam difficilem quidem, & abstrusam doctrina aphoristica, quae est breuissima?

Respondet, quia vita est brevis, ideo nobis in hac vitae angustia videtur maximè difficilis. immo Galenus 3. de diff. pulsuum cap. 1. ait, si vita nostra in triplura prorogaretur adhuc non sufficeret pro arte medica exactissime consequenda.

Dum vero dicit, *experientia periculosa, & iudicium difficile*. reddit auditorem docilem, quia docet duas vias, quibus in arte medica sit incedendum: nempe iudicium, & experientiam. Haec duae viae vocantur à Galeno in comm. duo crura, dicendo iudicium esse crux dextrum, experientiam vero sinistrum.

Quod verò iudicium siue ratio sit erus dextrum, & per consequens sit magis adnexum artibus, quam experientia probari potest ex Aristotele, & Galeno: ex Aristotele in proœm. metaph. vbi dicit, scire & cognoscere magis inesse arti, quam ipsam experientiam: ex Galeno 1. meth. cap. 3. & 3. meth. 3. vbi inquit, methodum in arte longe praeferre experientiae.

Dum verò dicit, *non solum oportet. reddit auditores beneuolos*; quia ostendit ad sananda corpora non solum conspirare medicos, sed agros, astantes, & exteriora: itaut si aegrotantes non consequantur exoptatam sanitatem, fortasse à medicis promissam, non propterea medicos semper esse inculpandos: quia aegrotantes, si non consequantur finem, id accidere potest, vel ob agrorum, vel astantium, vel ob externatum rerum errata, quae reuera non sunt in potestate nostra.

Ideo medici prudentes, dum pollicentur salutem, procedant oportet hac hypotetica conditione, dummodo aegri, & astantes obediant, & exteriora non impediunt; qui verò aliter incedunt, primo non obseruant Hippocratis aphorismū; deinde saepe accidunt, vt imprudentes, & artis ignari reputentur. Oquoties medici alioqui doctissimi absolute pollicentur sanitatem, tamen aegri ob propria, vel astantium errata corruunt in malignum morbum, & intereunt; vnde fit, vt medici docti reputentur imprudentes, & artis ignari; quare merito Hippocrates efficaciter nobis commendat, vt in praedicendo salutem hac cautione procedamus, dummodo non committantur errata ab aegris, & astantibus, & exteriora rite comparata sint.

Neque alia Hippocratis, & Auicennae praecepta in praedicendo tradēda sunt obliuioni: Hipp. 3. praedictionis, vbi dicit consulo vt raro medici praedicant, quia si errauerint, erunt exosi & insanire existimabuntur: Auicennae, qui canticorum par. 1. tract. 2. tex. 489. ait, si apparuerint signa debilia de exitu, sta tunc & prolonga iudicium.

Diuiditur hic aphorismus in duas partes, in 1. tradit tres causas, cur ars medica sit longa, & difficilis. Prima est, quia occasio



casio agendorum sit ita velox, vt facile ef-  
fugiat. Secunda, quia experimentum sit  
fallax. Tertia, quia iudicium sit difficile.

In secunda parte tradit causas tres  
quæ augent difficultatem; quarum prima  
est, dum agri non obediunt. Secunda dum  
astantes non applicant remedia, vt par est.  
Tertia, sunt accidentia exteriora, quæ in-  
terdum omnia euertunt.

*QVÆST. 7. Quid intelligat Hippocrates  
per vitam.*

**M**ulti disputant quid intelligat per  
vitam.

Conciliator differentia 21. per vitam in-  
telligit motum cordis corpori communi-  
catum. Reijcitur, quia hæc vita conuenit  
etiam brutis, neque est hominis propria.

Montanus per vitam intelligit man-  
sionem animæ nostræ in corpore motus  
auctoritate Aristotilis lib. de respiratione  
cap. 13. vbi definit vitam esse mansionem  
animæ in corpore.

Primo fallitur Montanus, quia per vi-  
tam debemus intelligere illam, quæ arti  
medicæ comparatur: manet enim anima in  
attonitis, in mulieribus ystericis, in phre-  
neticis: tamen illa vita arti non compa-  
ratur.

Secundo, si per vitam intelligeremus  
mansionem animæ in corpore esset longa,  
& non brevis.

Auerroes 4. colligit cap. 40. refert, Auē-  
zoarem medicū peruenisse ad annos 135.  
annisque centum exercuisse medicinam.

Montanus in suis commentarijs in pri-  
mam sen. refert, Nicolaum Leoniceum  
medicum præstantissimum, qui fuit eius  
perceptor peruenisse ad annum 106. il-  
lumque in ultimo senio audiuisse legen-  
tem in Patauino Gymnasio sine specillis.

Nauiarctus, & Sauonerola referunt, Ni-  
colaum de Palaucinis habuisse filium re-  
putatum legitimum in anno. 100. suæ æta-  
tis. Horum vita certè non fuit brevis.

Sabelicus refert, Musicanos Indiæ popu-  
los peruenire ad annum. 130.

Srabo ait, seres Indos vt plurimum ac-  
cedere ad annum ducentissimum.

Sed quicquid sit de hac re, non potest

negari communis experiētia, & Diuini Da-  
uidis Prophætæ determinatio in Psalmis  
quod vitæ nostræ tempus sit vt plurimum  
annus septuagesimus, & in potentatibus  
octuagesimus, quæ mansio animæ in cor-  
pore neque est brevis.

Nos dicimus, per vitam Hippocratem  
intelligere intellectiuam: quia hæc sola ar-  
ti comparari potest: dicimus intellectu-  
uam, non quo ad actum primum, sed qua-  
tenus est in actu secundo, nempe in actu  
speculationis, quæ vita respectu artis est  
brevis. sed non breuissima: quia actus spe-  
culatiuus, & in infantibus, & dormienti-  
bus viger: immo in somnijs interdum ali-  
quid reconditi percipitur, quod vigilan-  
tibus nobis caligine quadam erat obuo-  
lutum.

Vel dicimus intelligere vitam esse bre-  
uem respectu actus discurrendi de re me-  
dica: quia interdum mensis spatio sunt me-  
dium res medicas vix speculantur.

*QVÆST. 8. An medicina sit ars, & quæ ars:  
& de eius genere proximo.*

**T**ria hic sunt ad examen reuocanda.  
Primum, an medicina sit ars, & quæ  
ars. Secundum, quodnam sit genus pro-  
ximum artis medicæ. Tertium, an sit conie-  
cturalis.

Quo ad primum, an medicina sit ars, &  
quæ ars. Auctores per celebres sunt discor-  
des. Erasistratus, vt refert Introducto-  
rius, & Plusquamcōmentator dicunt, me-  
dicinam esse scientiam, quatenus versatur  
circa vniuersalia: esse vero artem quate-  
nus versatur circa particularia.

Montanus vult, medicinam, vt est in  
animis, esse scientiam: vt dirigitur ad ope-  
rationem esse artem.

Conciliator putat, medicinam, quatenus  
est in inuentione esse artem: quatenus ve-  
ro est inuēta, esse scientiam, motus auctori-  
tate Aristotilis 2. Post. tex. 27. & lib. 6. Ethicorū  
cap. 4. vbi dicit, artes versari circa  
ea quæ sunt: scientias verò circa ea quæ  
sunt: quare infert Conciliator, quando ab  
Hippocrate ars fiebat, tūc ab illo fuisse vo-  
catā artem. cum vero modo sit facta, & non  
amplius fiat, esse vocandam scientiam, &



non artem. Cæterum hoc est miserimum, quod in disputationibus, & in humanis consultationibus sint ferè semper tot opiniones, quot imaginandi modi.

Argentarius tenet, medicinam neque esse scientiam, neque artem: sed esse quid medium, motus auctoritate. Arist. 3. Cæli tex. 61. vbi Philosophus nominat quasdam scientias effectiuas: dicit Argentarius, istas scientias effectiuas non esse veras scientias, neque veras artes, sed medium locum tenere.

Auicennas in prima primi cap. 2. vult, medicinam theoreticam, & practicam esse scientiam proprio modo sumptam.

Quo ad Erasistratum, & Plusquam commentatorem, qui dicunt, artem versari circa particularia, & non circa vniuersalia, asserimus istos reluctari Hippocrati, Aristoteli, Galeno, Auicennæ, & rationi.

Hippocrati, qui primo de natura humana in principio proponit multas demonstrationes, ibique loquens non vt Philosophus, sed vt medicus artifex habet hæc verba „ Qui altius de natura vult considerare, quam pertineat ad medicum, non audiat hos sermones: sed sic est, quod ibi demonstrat vt medicus artifex omnino distinctus à Philosopho. Neque verum est, quod quidam dicunt, medicum semper habere minorem propositionem particularem: quomodo minorem particularem? non ne aliquando Hippocrates loquens de natura humana facit conclusiones vniuersales, vt patet legentibus illum libellum? ergo minorem propositionem habet vniuersalem: quia conclusio semper sequitur deteriore partem: non enim potest esse conclusio vniuersalis, nisi ambæ propositiones sint vniuersales. Præterea non datur conclusio affirmatiua particularis, quæ non sit suffulta dicto de omni.

Aristoteli deinde reluctantur, quia in proœmio Metaph. dicit artem versari circa vniuersalia, & quaerere propter quid: experientiam vero circa particularia.

Galeno reluctantur qui 1. & 2. meth. cap. 7. asserit, medicum versari circa naturas specificas contentas in particularibus: particularia verò sicuti sunt materia remediorum, & affectus particulares, non

ingrediuntur methodum. Hinc 9. meth. cap. 12. 1. ad Glaucon. cap. 1. & 3. Meth. cap. 7. vult, indicationem solum desumi à natura, & ab affectu specifico.

Auicennæ aduersantur, qui in fine 1. cap. in 1. sen. dicit particularia, vt particularia esse incomprehensibilia, & vt talia non pertinere ad artem.

Rationi denique aduersantur: primo, quia non datur processus rationalis à particulari ad particulare, omnis enim discursus, & progressus rationalis est à continente ad contenta, quia nulla methodo, & nulla ratione particularia vt particularia scientiam vel artem faciunt.

Secundo illa ratio est monstruosa, quando subiectum quæsitum non continetur sub medio; sed sic est, quod si ratio est particularis, nihil potest sub ipsa contineri, & sic conclusio non erit necessaria: quia subiectum conclusionis non erit conclusum, omnis enim discursus & medicorum, & omnium artificum debet esse suffultus dicto de omni.

Postremò experientia est cōtra Erasistratum, & Plusquamcommentatorem, quia, dum sanamus Socratem laborantem, exempli causa, hæmicranæ, illam possumus diabolibano auferre, vel laborantem sanguineo fluxu, Philonio Persico, vel triferæ Persica sanare. Dicimus iisdem remedijs posse sanari infinita alia individua Socrati similia, iisdem ramen affectibus laborantia: quare non sanantur particularia, vt particularia, sed affectus specifici in particularibus contenti.

Ad Montanum, qui dicebat medicinam in animo esse scientiam, esse verò artem, quatenus dirigitur ad operationem. Respondemus, quod si esset verum, medicinam quatenus est in animo, esse scientiam, sequeretur, vt optimè tenet Auicennæ 1. coll. cap. 1. nullam esse differentiam inter Philosophiam, & Medicinam in animo existentes, quia etiam Philosophia est scientia salubrium, insalubrium, & neutrorum: distinguitur verò medicina à Philosophia, quia medicina est ars salubrium, insalubrium, & neutrorum: Philosophia verò est scientia salubrium insalubrium, & neutrorum.



Præterea etiam modus considerandi in medicina, quatenus est in animo, differt à Philosophia: quia scientia salubrium, insalubrium, & neutrorum in Philosophia traditur ordine compositiuo: in medicina vero ordine resolutiuo, vel definitiuo, isti ordines vocantur vniuersales & essentialia, quia dant artibus, & scientijs ipsam essentiam, & formam, à qua dependent.

Ad Conciliatorem, qui dicebat medicinam, quatenus est inuēta, esse scientiam. Respondemus si hoc esset verum, sequeretur, quod quælibet ars vilissima esset scientia, sequereturque quod ars fullonum, quatenus est inuenta, esset scientia, quod est ridiculum.

Deinde sequeretur, quod omnes scientiæ, vt Philosophia, Metaphysica, quando inueniebantur, fuissent artes.

Postremò fallitur Cōciliator, quia Arist. locis citatis per ea, quæ sunt (vt interpretatur Philoponus) intelligit contingentia, & per ea, quæ sunt, intelligit necessaria. Quod verò per ea quæ sunt Arist. intelligat contingētia, colligitur ex Arist. 6. Ethicorum citato, ubi habetur, circa eadem versatur quodammodo ars, & fortuna, sed fortuna versatur circa contingentia: ergo & ars versabitur circa contingentia, quatenus versatur circa affectus contentos in particularibus. particularia enim contingentia sunt: dicit quodammodo, quia fortuna versatur circa particularia, vt particularia sunt; ars verò circa particularia quatenus in ipsis continentur affectus vniuersales & specifiici.

Ad Argenterium respōdemus cum Simplicio: Aristotelem 3. Celi tex. 61. per scientias effectiuas intelligere artes proprio modo sumptas: ibi enim Simplicius exemplificat de arte ædificatoria, quæ est vera ars, ibique nomen scientiæ dicemus ab Aristotele esse acceptum communiter, & non propriè.

Neque probatur Auicennæ sententia, dum tenet, medicinam practicam esse scientiam proprio modo sumptam: quia Aristoteles 6. Metaphys. cap. 1. & 6. Ethicorum citato dicit, principia scientiæ esse solum in re: principia verò artis esse quoque in Artifice. Hac ratione medici-

na non potest esse scientia: quia est in potestate medici sanitatem introducere, & impedire, ne introducatur.

Deinde Galenus in Traſyb. cap. 14. inquit, finem medicinæ esse in faciente: quia potest esse in potestate facientis, idest medici, vt introducat, & impediatur sanitatem. Postremò medicina ab Hippocrate & Galeno plurimis in locis vocatur ars: quando verò Galenus in arte medica illam appellat scientiam, dicit communiter sumere nomen scientiæ, & non propriè. disputatio est an medicina propriè sit scientia, & non communiter.

**Q**uoad secundum, quodnam videlicet sit genus proximū, & immediatum medicinæ. Galenus in Traſyb. cap. 30. probat medicinam non esse scientiam: quia non est propter scire tantum. Deinde probat non esse facultatem factiuam, quia eius finis non consistit in actione: neque esse artem acquisitiuam, quia non versatur circa facta: neque esse effectiuam, quia de nouo aliquid non facit, vt ædificatoria, & sutoria: sed concludit, artem medicam corrigere collapsa; vel resarcire, sicuti est illa ars, quæ laceratas vestes confuit: immo negat, medicinam esse resarcitiuam, dicens adhuc inferiorem locum tenere: quia est ministra resarcientiæ naturæ: natura enim est illa, quæ corrigit, & resarcit.

Sed quomodo medicina non est resarcitiua? immo quomodo medicina non est effectiua? non ne medicina quæ reponit luxata est effectiua? Sicuti est ædificatoria, & sutoria: nō ne artifex, qui deponit cataractam, qui extrahit calculū vesicæ, qui abscindit & vrit membra sphacelo correpta, & aperit apostemata, est effectiua? Non ne medicus qui extrahit aquam hydropticorum per vterum, vel umbelicum, qui interdum sanare potest; non ne id præstat aliquid de nouo efficiendo? quare medica ars est effectiua: immo ipse Galenus interdum illam appellat effectiuam.

Respōdemus ad obiecta, medicinam duplicem esse, aliam effectiuam. & aliam resarcitiuam, siue ministram & ancillam naturæ resarcientiæ: ita vt genus proximum medicinæ, neque sit ars effectiua, neque resarcitiua.



Quodnam sit genus proximum medicinæ, intelligi non potest, nisi reuocentur ad memoriam quæ dicta sunt ab Arist. 1. Post. cap. 5. de tribus erratis circa vniuersale: Quorum primum est, dum attribuiamus passionem speciei individuo: Secundum, dum applicamus passionem generis speciebus: Tertium dū passionem generis innominati applicamus generi nominato; hocque postremum facit ad rem nostram: quia genus proximum medicinæ est innominatum: quoniam medicinæ genus proximum neque est ars effectiua, neque refarcitiua, neque ancilla refarcientis naturæ, sed quid commune, quod de his prædicatur: quod reuera caret nomine: ideo genus proximum medicinæ dici potest innominatum.

*QVÆST. 9. Qua ratione ars medica sit coniecturalis.*

**Q**VO ad tertium propositum, nempe qua ratione medicina sit coniecturalis. Primo sciendum, medicinam non esse coniecturalem ratione theorematum. quia theoremata sūt certissima: ideo Galenus lib. de opt. sec. ad Traſyb. cap. 4. reprehendit illos medicos, qui dicebant, artem medicam esse coniecturalem, eo quia habet præcepta coniecturalia, cum medicina vniuersalia præcepta habeat certissima, ac æternæ veritatis.

Dicimus igitur, artem medicam esse cōiecturalem ratione quantitatis morborum, remediorum, virtutis, ratione proprietatis idest idiosyncrasiæ, & ratione conditionum indiuiduantium.

Ratione quantitatis, medicina est coniecturalis: quia Galenus 1. ad Glauc. cap. 1. & 3. meth. 3. dicit, quod nec scribi, nec dici potest de vnoquoque illud esse quantum.

Ratione quantitatis morborum, quia Galenus 9. meth. cap. 15. habet hæc verba, „ Vt verum exhibentur remedium, non solum opus est cognoscere morbi speciem, sed etiam eius quantitatem, quæ quantitas ex Galeno 9. meth. 14. est certa mensura quantitatis recessus à naturali statu, quem recessum solum coniectura assequi possu-

mus. Nos diu cogitauimus, quomodo illud quantum morborum interdum percipi possit: excogitauimus quatuor instrumenta, quibus illud dimetimur. Primum est nostrum pulsilogium, quo per certitudinem mathematicam, & non per coniecturam possumus dimetiri vltimos gradus recessus quo ad frequentiam, & raritatem: secundum est vas quoddam vitreum, quo facilius possumus singulis horis intelligere quantum recedat temperatura calida, vel frigida à statu naturali. Tertium consistit in quatuor modis dimetiendi siccitatem, & humiditatem recedentem à statu naturali, quos proposuimus in 4. aphorismo 2. sect. staticæ nostræ. Quantum consistit in statica arte, quæ mensuram certam perspirationis colligere possumus, quæ experimenta in aphorismorū modum digesta in lucem edidimus. Horum instrumentorum icones posuimus, & declarauimus in commentarijs nostris primæ sen. Auicennæ.

Ratione quantitatis remediorum medicina est ars coniecturalis: quia Galenus lib. de curandi ratione per sang. mis. inquit, remedij quantitatem facere artem coniecturalem.

Ratio desumitur à Galeno in 3. parte artis med. vbi dicit, morbum calidum vt duo indicare frigidum vt duo: Galenus vero 7. meth. vlt. vult, remedium reducens ad statum naturalem esse æquale: quia si remedium fuerit minus non sanabit: si maius introducet contrarium morbum: similiter 3. de simplici medicina cap. 12. inquit, si remedium fuerit minus, iuuabit, sed tamen non sanabit: si maius contrarium morbum efficiet: quare est admodum difficile inuenire remedium æquale, & proportionatum, vt scilicet neque sit minus, neque maius, non maius, quia medici munus non est vincere, sed moderari, & attemperare: Vtinam medici officium esset vincere, medicina sanè esset valde facilis: neque remedium debet esse minus, quia hoc non compeſcit, & moderatur, vt par est.

Ratione virtutis est coniecturalis: quia nisi sciamus quanta sit, nescire possumus quantum debeat esse remedium: virtus enim est permittens, & indicans vitale, quod necessariò conspirat pro eligenda de-

ter-



terminata remedij quantitate: dum enim Hippocrates 4. de ratione vic. 19. dicit, quod tria conspirēt ad sanguinem mittendum, nempe vehemens morbus, virium robur, & ætas florens, supponit illa tria, & præcipuè virium robur in omni medica operatione esse considerandum, an permittat, nec ne, idest quando seu qua hora sit permittens.

Ratione idiosyncrasiæ idest proprietatis natura est coniecturalis: quia Galenus 2. de ratione vic. acutorum com. 11. tertio meth. 7. & alibi habet hanc sententiam, si naturam propriam, quam idiosyncrasiam vocant, exquisitè cognoscerem, talem me putarem, qualem fuisse ferunt Esculapium.

Naturæ proprietates variæ sunt, prout varia sunt individua: proprietas est, veluti si quis valde ab odore rosarum patere- tur: hic, si illi propinaretur Serapium rosatum, facile incideret in Lipothimiam: si- milis proprietates inveniuntur innumera- biles, quæ medico ut plurimum sunt oc- cultæ.

Demum ratione conditionum indi- duantium medicina est coniecturalis: quia individua ut individua sunt incōprehen- sibilia: hac ratione esset quoque ars medica imperceptibilis, si in individuis ut indi- dua sunt, versaretur.

Cæterum notandum est, artem medi- cam non sanare individua ut individua, sed tollere morbos específicos contentos in individuis. Quod hoc sic verissimum, pro- batur ratione, auctoritate, & experientia.

Ratione, quia ars medica si curaret in- dividua ut individua esset vana: quan- doquidem de individuis neque ars, neque scientia datur.

Præterea, si individua curarentur, illo- rum indicationes non ostenderent nobis remedia: quia non datur processus ab in- dividuo ad individuum: indicatio enim habet vim syllogisticam, quæ suffulta est dicto de omni, vel de nullo.

Insuper adest auctoritas Galeni lib. de opt. sec. ubi dicit morborum expulsionem indicari à specifico affectu, & non à singu- lari. Similiter 1. meth. 1. & 2. meth. 7. ha- bet, methodum esse applicandam specificis

Ideis in particularibus contentis.

Demum confirmatur experiētia: quoniam quodlibet remedium, quod potest sanare aliquem particularem hominem, sanare quoque poterit infinitos alios eadem ægri- tudine correptos: ergo & illud reme- dium, vel illa ægritudo erit specifica, & non particularis.

QVÆST. 10. *Qua ratione ars medica vocetur longa.*

**C**Ut ars medica vocetur longa, an re- spectu habitus, vel vsus, an respectu exercitij: variæ sunt opiniones.

Montanus dicit longam esse quo ad exer- citium, non quo ad habitum. Confirmat suam opinionem auctoritate Galeni. 9. de placitis c. 2. ubi ait „ Artem quo ad habi- tum vnius anni spatio comprehendi pos- se: longam verò esse quo ad exercitium.

Primo fallitur Montanus: quia exerci- tium non pertinet ad artem: exercitium. n. versatur circa particularia, sed de parti- cularibus neque ars, neque scientia datur: quia artes, & scientiæ sunt æternorum, & vniuersalium. Deinde ea, quæ dicuntur longa, & brevia seruant inter se propor- tionem: sed inter artem, & exercitium nulla seruatur proportio: ergo non dice- tur longa respectu exercitij: Minor pro- batur, quia ars versatur circa vniuersalia, & finita: exercitium verò circa particula- ria infinita: sed sic est quod ex Aristotele 8. Physic. non datur proportio finiti ad in- finitum, quare ars non dicetur longa re- spectu exercitij.

Postremo fallitur Montanus, dum pu- tat, Galenum. 9. de plac. 2. loqui de arte medica: ibi enim loquitur de musica, & de Rhetorica, quæ facultates anni spatio comprehendi possunt.

Quod vero ita sit: pater ex Galeno lib. de plenit. cap. 3. ubi habet hæc serē verba „ si spatio vnius anni ars medica posset comprehendi Hippocrates non dixisset ars longa, & vita brevis.

Cæterum, esto quod nono de placitis cira- to intelligat quoque de arte medica, dico quod posset stare Galeni sententia, intel- ligendo de habitu artis in vniuersali, & in



communi, quippe qui anni spatio addisci potest. Sed addimus ad habitum medicinæ nō solum pertinere methodū vniuersalē, sed præcipuē specificam rationem, cuius ars medica, & longa, & admodum difficilis, ne dicam imperceptibilis, est: quia ab Hippocrate ad hæc vsque tempora medici adhuc non intellexerunt omnia specifica indicantia, & indicata: immo in paucis, ad insectiles species ad medicinam pertinentes medici peruenire.

Nonnulli alij credentes Galenum 9. de plac. citato intellexisse de arte medica, quæ scilicet anni spatio comprehendi possit quo ad habitū, dicunt artem medicam dupliciter considerari, vel respectu inuentionis, atque hac ratione fuisse longam ipsi Hippocrati, qui fuit eius inuentor: vel considerari respectu habitus medicinæ inuentæ; atque hac ratione esse breuem, & anni spatio comprehendi posse.

Nos tamen putamus esse longam, & immensam: non solum ratione inuentionis, sed etiam ratione habitus medicinæ inuentæ: primo, quia Galenus lib. de plenit. dicit, si ars esset brevis ratione habitus, Hippocrates non dixisset ars longa. Deinde est longa quo ad habitum, quia, vt acquiratur huiusmodi habitus, oportet saltem legere totum Galenum, Hippocratem Auicennam, & obseruationes anatomicas, sine quibus medicina non intelligitur: neque satis est, vt intelligamus, nisi omnia mandentur memoriæ: an igitur iste habitus sit brevis, ceteri iudicent: cerrè nec anni spatio, nec centum annorum spatio omnino potest comprehendi.

Accedit, quod Hippocrates in hoc aphorismo per artem longam intelligat habitum, & vsum: quia de illa arte loquitur, quæ incedit duobus cruribus, nempe iudicio, & experimento, quod iudicium est difficile, & experimentum est fallax: est fallax: quia ex se nihil concludit, nisi rationi sit coniunctum: ratio verò, vel iudicium est illud, quod expurgat contingentiam, quæ contingit in indiuiduis, dum obseruamus experimenta.

Claudicant sanè in facienda medicina, qui altero de duobus cruribus sunt destituti, nempe ratione, vel experientia, siue

dicas habitu, vel vsum. Auerroes, qui habebat habitum artis, & non vsum in facienda medicina parum aptus erat: atque ineptissimi sunt nostrates empirici, qui habitu medicinæ carent.

Prima Dubitatio oritur, quia non videtur, quod ars sit longa: Galenus, lib. 1. de dignoscendis pulsibus cap. 2. inuehitur contra quosdam Sophistas his verbis, Desinite aliquando artem per Deos immortales ineptis nugis accumulare, quæ per se longa non est.

Respondemus, quod quamuis Aldinus codex legat οὐκ ὄντων καὶ ἐαυτὴν μακρὰν, id est non existentem per seipsam longam: in alijs tamen codicibus esse ὄντων καὶ ἐαυτὴν μακρὰν, id est existentem per seipsam longam. Sed data etiam prima lectione. Respondemus Galenum locutum esse comparatiuè, & non absolutè, quasi diceret, ars cerrè esset minus longa, si ineptus nugis, & falsis opinionibus purgaretur. Tumor tamen est prima responsio.

*Occasio Præcepti.* Hippocrates in aphorismo: affert tres rationes, cur ars medica sit longa. Prima ratio, quia occasio est præcepti. Secunda quia experimentum est fallax. Tertia quia iudicium est difficile.

Secunda dubitatio exoritur: quia nō videtur, quod ars sit longa ob tres rationes: Arist. enim 1. metaph. vult, artem esse longam ob duas rationes tantum, nempe ob experimentum, & iudicium difficile: de occasione verò præcipiti ne verbum quidem.

Responsio facilis est, quia occasio reducit ad experimentum. Arist. nihil dicit de occasione: quia occasio agendorum non pertinet ad Philosophiam, sed ad Artifices, quorum munus est operari.

» *Occasio Præcepti.* Græca dictio est οὐρανός: per cheros melius interpretatur tempus opportunū agendorum, quam occasio: nē: Primo, quia cheros apud Græcos communiter accipitur pro tempore opportuno agendorum: similiter Cicero 1. de officijs per occasionem interpretatur tempus opportunum agendorum.

Deinde causa, cur per cheros non debeamus interpretari occasionem, est, vt euitemus illorum errorem, qui putant, occasio-



nem esse quid diuersum à debita quantitate, & qualitate agendorum: quia debita quantitas, & debita qualitas est ipsummet tempus opportunum, vt docet Galenus cap. 85. artis paruæ, 1. ad Glauc. c. 1. & 3. de temperamentis tertio.

Demum per cheros non debemus interpretari occasionem; quia occasio est vox æquiuoca: ab Hippocrate enim, & Galeno primo. in primum Epid. 1. occasio sumitur in sensu longe diuerso à nostro proposito, quia ibi sumitur pro externo errore, quatenus esse possit morborum occasio, & non causa: hæcque occasio non dicitur *χαιρος*, sed *πρόοδος*.

Declaro quid sit profasis: error exempli causa in victu nō dicitur causa morbi, sed occasio, quæ vocatur profasis: error enim in victu neque est causa proxima, neque remota morbi: non proxima, vt omnes admittunt: non remota, quia si esset remota daret ipsum quod, nempe effectum similem, sed non dat: aliqui enim ob vsum maluarii fieri possunt hydropici: causæ, quæ sunt remotæ conspirant in effectum similem: maluaricum est res calida, hydrops est affectus frigidus. Quare cum occasio multipliciter sumatur, vt euitemus æquiocationem, merito per cheros interpretatur tempus opportunum, & non occasionem.

Insuper *χαιροὶ* ex Galeno lib. de morborum temporibus cap. 1. significat tempora morborum, & opportunitatem agendorum: quare & *χαιρός* & occasio continent æquiocationem; ideo melius est, vt interpretemur per cheros tempus opportunum agendorum, quam occasionem. Auctores omnes dicunt, quod *χαιρος τῶν πραγμάτων* significet tempus rerum bene gerendarum, quod faciliè amitti possit, quia sit breue.

Postremò Hippocrates lib. de præceptis in primis verbis definit quid sit cheros, didicens esse tempus opportunum, in quo non multum est, idest tempus angustum exhibendi præsidia, hæc sunt verba *χαιρος ἐστὶν. ἐν ᾧ χαιρός ἐστι καὶ χαιρός ἐν ᾧ χαιρός οὐ πολὺς*, idest tempus est, in quo cheros est, cheros est, in quo tempus non multum est.

Quod verò tempus opportunum agen-

dorum, de quo intelligit Hippocrates in hoc loco, sit valde breue, & valde angustum. Primo patet, quia Hippocrates lib. de locis in homine per cheriam intelligit temporis breuitatem. Deinde in hoc loco addita est particula *ὅτι*, quæ significat acutum, seu tempus angustissimum: quare per cheros oxys debemus intelligere quam maximam temporis breuitatem. Ecce quam efficaciter Hippocrates nobis commendat in remedijs exhibendis non esse procrastinandum; quia ob delationem ægri faciliè mori possunt.

Hinc Hippocrates scribens ad Crateuam habet hæc verba, „ In omni arte procrastinationem esse malam, sed potissimum in arte medica, in qua delatio est animæ periculum.

Ratio, cur delatio seu procrastinatio sit periculosa, est, quia ægrorum corpora ob externas & internas causas ita alterantur, vt post horam interdum ita mutantur, vt tempus opportunum agendorum omnino effugiat: dicimus tempus opportunum: quia *χαιρος* sine alia additione significat tempus opportunum breue: addita vero dictione oxys significat non solum breue sed etiam acutum, idest quamquod breuissimum: ideo Antiquus Interpres diminutè vertit per cheros oxys tempus acutum, cum potius acutissimum, & quamquod breuissimum debeamus interpretari; quia reuera opportunitas agendi consistit ferè in puncto: cum corpus nostrum ita sit in perpetua alteratione, & mutatione, vt interdum remedium, quod horis matutinis ægrum sanitari posset restituere, illum vesperti interimeret.

Oribasius loquens de occasione agendorum inquit: siquid quid igitur in fluxum deponit, & statim eleuat, & iterum deponat, non tangit eandem aquam: primo modo singulis horarum momentis corpus variatur, & occasio agendorum effugit.

Hac ratione Damascenus rectè dixit, non esse eandem sanitarem mane, & in sero; sic nec idem morbus, qui est nunc, in sero conseruatur: ideo rectè Pseudotheus dicit medicinæ difficultatem non esse solum in remedijs inuentione, sed quo morbo tempore, & qua hora sit remedium applicandum.



Hinc Veteres pingebat occasionem cum nouacula, quam dextrâ inferam gerebat: quia est (vt aiunt) *ἀκὺς πόνος ὁστρεπος* idest omni acie acutior.

Hinc Practicantes in illa ardua quæst. à quo scilicet tempus opportunum exhibendi remedia indicetur, determinant indicari à præsentia indicantis: quæ præsentia (vt dictum est) facile effugere potest.

Quare illi medici, qui remittunt in crastinum esse phlebotomandum, vel purgandum, sæpè non sine maxima ægrotantium iactura id efficiunt: quia ob procrastinationem ægri sæpè intereunt: idcirco, dum adest occasio agendi, sit noctu, vel inter diu, & præsertim in acutis, non est procrastinandum.

Galenus loquens de his primo prognos: habet hanc sententiam: „ Ita volat occasio, vt aliqui moriantur, priusquam vocetur medicus: aliqui acito medico illico moriuntur, sicuti Maritus Lecus ictericus, qui moritur die octaua, cum solum septima die vocauerit Hippocratem, quia neque vrinam, neque deiectionem emittebat: si antea fuisset vocatus Hippocrates, opportunè vrus fuisset deiectionis, & diureticis, & fuisset liberatus.

Hinc Hippocrates lib. de arte habet hanc sententiam „ Omnem morbum curari posse, si medicus occasionem opportunam agendorum non omittat.

*Experimentum fallax.* sed non est credendum, quod medicamentum semel exhibitum efficiat experimentum: quia semel exhibitum facit vnicam sensationem, atque ex illa fit memoria: deinde ex multis memorijs fit vnum experimentum, sicuti docet Aristoteles 2. Post. in fine, & 1. metaph. Hinc Galenus 3. meth. cap. 1. habet hæc verba „ si quis fuerit expertus sex vel septem homines aliqua medicina purgatos, dicere certò non poterit, quod omnes homines post hac illa medicina purgabuntur. Insuper 4. meth. cap. 3. habet hæc verba „ esset sanè felicitatis munus, si quis vel inspecto lytargiro, vel castoreo, vel cantharide protinus intelligeret eorum vires. Exempli causa, lytargirus pro ambustis prima vel secunda die valde iuuat: attamen tertia die & sequentibus diebus est

fallax, seu nihil facit.

Hinc Galenus 1. epid. 1. com. 1. maximè damnat Quintum medicum dicentem, experimētum sufficere sine causarum cognitione. Idem Galenus 3. aphorismor. com. 11. dicit, nō esse experientia fidendum: addit: quamvis sæpè idem vidimus, non possumus dicere sic semper erit. Galenus lib. aduersus Iulianum cap. 1. vocat medicos, qui experientia sine ratione incedunt, fortunè imitatores, quibus, si aliquid boni succedat, casu ex fortuito contingat.

Parimodo Galenus 2. de officina medica 22. similiter & 3. de officina medica 42. negat medicinam docendam esse vsu exempli: negat, quia nihil magis nos decipit, quam exempla, & experimenta sine ratione.

Mutatur enim occasio agendorum, quia indicantia mutantur, quibus mutatis remedium, quod hodie sanauit Socratem, cras interficere poterit Platonem eodem morbo laborantem. Hinc cantharides, quæ mouent vrinam, excitatque penis tentiginem: in aliquo qui patitur carunculam in collo vesicæ, excitant inflammationem, & illum intertrahunt. Hac ratione experimentum est periculosum, & fallax: vt igitur non fallat debet colligi ex multis memorijs, quia inde ratio, seu iudicium, quod est dextrum erus in facienda medicina, resurgit.

Præterea pro rei intelligentia sciendum, memoriam, experimentum, rationem, & reminisceniam non parum differre inter se: memoria reasumit species obiectorum sine syllogismo, ac ex multis istis memorijs fit experimentum: reminisceniam verò reasumit species per syllogismum, & per syllogismum inuenit illas, quæ à memoria exciderunt: ideo Arist. lib. de memoria & remin. cap. 2. dicit, reminisceniam neque de nouo inuenire, neque de nouo addiscere: ratio est, quia illi qui de nouo addiscunt, & de nouo inueniunt, querunt principia, & conclusiones: reminisceniam verò querit tantum conclusiones: quia principia in memoria conseruantur, ita vt reminisceniam differat à ratione, quia ratio querit quæ antea non fuerunt nota: reminisceniam vero querit antea nota, quæ exciderunt: experimentum verò caret virtute Syllogistica:



ca: ideo dicitur ab Hippocrate fallax.

Experimentum vocatur quoque periculosum ob subiecti humani nobilitatem: quia impendit periculum, ne dum facimus experimentum, noceamus: omne enim *πειραζέσθαι* est fallax, sed non omne fallax est periculosum: experimentum potest esse fallax in sanandis pernionibus: sed non periculosum, quia licet importunis remedijs perniones tractentur, non propterea morbus erit periculosus.

Tertia dubitatio occurrit, quia non videtur, quod experimentum sit fallax, sed certum & firmum: exempli gratia, lignum sanctum per certam experientiam depellit luem gallicam, & theriaca venena superat. Idem dicemus de infinitis alijs per experientiam inuentis: ergo experimentum non est fallax.

Respondetur experimentum dupliciter sumi, videlicet in fieri, vel in facto esse: in fieri est fallax: in fieri est veluti, dum periculum facimus de nouo, an aliquod medicamentum non antea expertum iuuat, & tale est fallax: experimentum vero in facto esse antea centies expertum, vt de ligno sancto, quod depellat luem gallicam, de theriaca, quæ superet venena, tale experimentum medico sapienti, & prudenti non est fallax: Est tamen fallax ijs qui ne sciunt actiua passiuus applicare.

QVÆST. II. Cur experimentum sit fallax.

**S**ed cur argumētum desumptū ab experimento sit fallax, non omnes intelligunt. Primo dicimus, quod sit fallax, cum experimentum efficit formam arguendi fallacem: ratio est, quia subiectum quæritur quod est minor terminus non subijcitur medio: medius enim in experimento est particularis, & particulare non potest continere aliud particulare, vnde conclusio infertur vana: eatenus enim conclusio est conclusio, quatenus eius subiectum sub medio continetur, estque conclusa.

Secundo, experimentum est fallax: quia caret dicto de omni, sine quo nihil inferri potest: quia dictum de omni est basis & fundamentum humanæ ratiocinationis:

omnia enim argumenta, quorum medius terminus est particularis, carent dicto de omni, vel de nullo.

Tertio, est fallax, quia argumentum desumptum ab experimento non tribus, sed duobus constat terminis. Exempli causa: qui probaret cichoream esse iuuaturam Platonem, quia iuuat Socratem, faceret argumentationem fallacem: quia in argumentatione essent tantum duo termini: Socrates enim & Plato formaliter conueniunt: Socrates tamen est medius terminus, Plato vero in argumento est minus extremum. Præterea quando termini non differunt formaliter sit principij petitio: sicuti si quis probaret, lunam pati eclipsem, quia patitur priuationem luminis solis: argumētum esset cū petitione principij: quia idē formaliter est luminis priuatio & eclipsis: quare cum argumētū ab experientia careat tribus terminis, pertinebit potius ad secundā operationem intellectus, quam ad tertiam, nempe ad ratiocinationem.

Quarto, experimentum est fallax; quia in experimento numquam termini sunt congeniti, & contemporanei, quod Aristoteli reluctatur, qui 2. Post. ostendit terminos in demonstratione esse contemporaneos: non enim valet, fuit interpositio terræ, ergo erit eclipsis. similiter dicimus, non valere hoc argumentum: medicamentum iuuat Platonem, ergo iuuabit Socratem eodem morbo quoque laborantem.

Postremo experimentum est fallax (vt dicit Orribasius) in ijs, quos sæpè sanauimus: ratio est: quia quantitates, & mensuræ affectuum semper mutantur, similesque non conseruantur recessus à naturali statu: vnde igitur illis, qui subiiciuntur illis medicis, qui solis experimentis, sprete methodo in facienda medicina, incedunt: isti sanè, vt dicit Plinius lib. 29. suæ historiæ, negociantur animas nostras, & experimenta per merces agunt.

*Iudicium difficile.* Dictio Græca, quæ significat iudicium est *πειραζέσθαι* proprie significat iudicationem, & non iudicium: iudicium explicatur per verbum *πείρω*, & non per dictionem *κρισις*: differt iudicium à iudicatione: iudicatio difficilis significat difficultatem respectu rei, & respectu



pectu nostri: iudicium verò difficile indicat difficultatem respectu nostri. Distinctio est Aristotelis 2. metaph. vbi dicit, difficultatem duplicem esse, aliam respectu rei, & aliam respectu nostri. Deus est cognitu difficilis respectu nostri, non respectu rei: materia prima est difficilis respectu rei, & respectu nostri.

Oribasius perperâ interpretatus est per crism illud iudicium, quod pertinet ad illam præcognitionem, an crisis sit terminatura ad bonum, vel ad malum, & per quas corporis regiones, & quo tempore sit euentura. Quæ interpretatio est nimis angusta, & recedit à Galeni mente, qui dat expositionem omnino diuersam: quia Galenus per crism primariò intelligit iudicationem naturæ, secundariò medici, qui tamen ratione, & experientia incedit: & iste medicus vocatur dogmaticus ad differentiam Empirici, qui sola experientia, & ad differentiam methodicorum, qui sola ratione communi incedebant.

QVÆST. 12. De medicorum sectis.

**D**E his medicorum sectis Galenus lib. de sectis, & lib. de opt. secta ad Trasyb. fusè agit: sed quia has sectas sæpè nominabimus, par est, ut illarum procedendi modum in remedijs inueniendis paucis declaremus.

Empirici non quærebant causas, quia putabant esse imperceptibiles, sed ex symptomatum syndrome eligebant remedia, ac pro inueniendis remedijs ad tria cōfugiebant; nempe ad *duo & sari* ad historiam, & ad analogismū, quod est argumentum à simili: similitudinemque desumebant ab his tribus, à materijs auxiliorum, à similitudine affectuum, & à similitudine locorum affectuum.

Methodici vero omnes morbos referebant ad duo communissima principia, videlicet ad laxum, & densum, & ex his mixtum, & in his quiescebant. Sed quam vana sit hæc secta Empirica, & multo magis methodica, satis superque declarauimus lib. 12. nostræ methodi vitandorum errorum, vbi de analogismo, & falsa experientia fusè egimus.

Dogmatica secta incedit ratione & experientia, habetque iudicationem difficilem: quia non quiescit tantum in communissimis, sed transit ad subalterna, & inde ad specifica, quod quantum sit difficile, alibi ostendimus: immo Galenus lib. 1. de dignoscendis pulsibus cap. 1. ostendens medicinæ dogmaticæ difficultatem asserit, per totam vitā suam laborasse in pulsum dignotione, & adhuc non peruenisse ad omnimodam absolutionem: sed addimus quamplurima tractari in arte medica, ad quorum omnium omnimodam absolutionem Galenus & alij Auctores non peruenierunt: iure merito igitur iudicatio est valde difficilis.

Quod verò iudicium sit difficile: Galenus in comm. hac ratione ostendit, si veritas esset inuentu facilis, tot ac tanti viri, qui illam quæsiuerunt in tam repugnantes sententias non deuenissent.

Quod vero iudicatio per experimēta sit difficilis, ostendit Galenus in hoc cōm. his verbis, „ Ut verū fateamur non exploratu facilis est iudicatio: quia dū æger post multa adhibita remedia melius, vel deterius habet, certò percipi non potest, quodnam illorum remediorum, quibus vñs est, iuuerit, vel nocuerit. Verum tamen si aliqua fides danda est medico, illi erit danda, qui sit natura prudens, qui habeat vegetum ingenium, qui sit in medicina & omnibus speculatiuis scientijs versatissimus & in experiētijs exercitatissimus qui non sit iactabundus, & qui ob alijs addiscere posse existimet, secus ille medicus casu, & fortuitu incedit, & omnis adempta est spes quod certò iuuet.

*Non solum oportet.* Hæc est secunda pars aphorismi. Duæ artificiosissime connexiones cum parte superiori tradi possunt.

Prima quod hæc quattuor proposita in hac secunda parte, nempe, medicus, æger, aetates, & exteriora respondeat quattuor propositis, in prima parte videlicet, arti longæ, tempori opportuno agendorum, velocissimo quidem, experimento fallaci, & iudicationi difficili: quasi dicat, cum ars sit longa, medicus debet solum opportuna facere: cum tempus opportunum agendorum sit velocissimum, ægi debent esse ad-



modum obediētes, ne effugiat agendum opportunitas: eum experimentum sit fallax, astantes solum debent administrare opportuna, neque debent alia experiri, quia experimenta sunt fallacia: cum indicatio sit difficilis, medicus debet curare, ne aegri ab exterioribus accidentibus laedantur: quia errata externa solent impedire crīsim, quæ difficilis est.

Secūda cōnexio est, quod ex prima parte colligi possunt quattuor conditiones optimi medici: in secunda vero docet, quæ requirantur præter medicum. Prima medici cōditio est, quod cum ars sit longa, & vita brevis, medicus debeat esse studiosissimus. Secunda cum tempus opportunum sit velocissimum, medicus debeat esse vigilantissimus. Tertia cum experimentum sit fallax, medicus in experimentis debeat esse versatissimus. Quarta cum indicatio sit difficilis, debeat esse doctissimus & prudentissimus.

In hac secunda parte igitur vult Hippocrates præter medicum conspirare aegros, astantes, & exteriora, in quibus, si cōtingat error, impediatur crīsis. Hinc Galenus 1. de diebus decret. cap. 11. inquit, „ medicum posse præcognoscere crīsim quo die, & qua hora sit futura, dummodo non cōtingat error in his, quæ dicta sunt ab Hippocrate in hac secunda parte huius aphorismi: cum igitur hæc quattuor sint proposita, quattuor quoque occurrunt consideranda pro intelligentia aphorismi. Primum de medici conditionibus. Secundum de aegro. Tertium de astantibus. Quartum de erratis externis.

Quo ad medici conditiones præter alias propositas, plurimæ afferuntur ab Hippocrate libro de præceptis, de decenti ornatu, & lib. de officio medici. Similiter Galenus 4. in 6. epid. com. 8 & 9. ubi inquit, medicum debere esse modestum, cautum, hilarem, facerem, grauem tamen, ne nimis videatur: gratum nempe aegrotantibus, interdum (ait) concedendo valde exoptata, dummodo non sint allatura aliquod notabile detrimentum: quia cuncta suauius assumpta ex Galeno loco citato melius coquuntur.

Parimodo Hippocrates 2. aphorismorū

38. habet hunc aphorismum „ Paulo deterior potus, & cibus, sed suauior præferendus est melioribus, insuauioribusque. Nos propterea febricitantibus sæpissimè grata, & suauia concedimus, sicuti sunt acetaria è floribus boraginis, è lactuca, & boragine coctis, & cum sacchari pauxillis: cōcedimusque pyra, poma, pruna, & persica cocta, auicuias cyprias, condimenta varia, sicut muretum, salsa communiter vocatum; sed quod fiat ex acetosa, & medulla panis cū pauxillo aceti, & sacchari: utimurque ouo recenti cum lacte semeloni, vel amygd. cum sacchro, & aquæ rosarum pauxillo in modum pulmenti testacei igne condensari. Similimodo pisces saxatiles Galeno comm. 27. primi de ratione vic. propositi ex aqua, porro, aceto, sale, & oleo parati, quod in acutis febribus Galenus sæpiè concedit: Nos interdum auratam, nullum in alto mari altum, & similes pisces admittimus: neque abhorremus à vino, vel oligosoro, vel cocto cum æquali aquæ portione, donec aqua vitæ exhalet. Hæc & similia ægrotantibus possunt concedi: quia inde aegri & iuuantur, & redduntur in alijs rebus maioris momenti magis obsequentes & quam maximè confidentes.

Galenus 4. in 6. epid. 8. loquens de confidentia ægrotum in medicū ait, ægrotum confidentiam valde iuuare: immo refert, nonnullos præstigiatores Pergami sanasse aliquos deploratos à seipso, & ab alijs medicis ob maiorem confidentiam, & maiorem obtemperantiam illis præstitam, quam sibi, & alijs.

Similiter conciliator differentia. 135. inquit, multos deploratos ab alijs medicis à seipso fuisse sanatos ipsidem remedijs, quibus alijs utebantur: quia in ipsos, & magis sperabant, & magis confidebant.

Quo ad aegrum, debet & ipse obedire, & habere confidentiam in medicum, secus vix aliquid boni sequi potest.

QVÆST. 13. *Confidentia aegri in medicum curat inueni.*

**D**isputant in hoc loco expositores ob quas causas ægrotum confiden-



ria in medicum iuuet ægros.

Opinio communis est, quod confidentia iuuet: quia confidentes maximè obtemperant, & morem gerunt præceptis.

Auicennas lib. 4. de animalibus cap. 4. ait, confidentiam iuuare non solum, quia reddat ægros magis dispositos ad sumenda remedia: sed quia imaginatio imperat causis naturalibus, hac lege, vt potentia inferiores ex ordine vniuersi inferuiant potentijs superioribus: addit quod potentia naturales sunt magis inferiores, quam sit imaginatio: ideo debent imaginationi præconceptæ salutis obedire.

Hæc sunt nimis communia. Neque Auicennas tradit modum, quo imaginatio faciat casum: ideo alia est querenda causa, cur confidentia iuuet.

Plurimi alij dicunt, imaginationem interdum efficere casum, confidentiamque ægrotorum iuuare, quia confidentia est quidam animi affectus: at sic est, quod animi affectus collocantur inter sex res non-naturales corpus alterantes; ideo dicunt confidentiam iuuare.

Cæterum falluntur, quia animi affectus possunt quoque nocere: causæ enim non-naturales habent hanc conditionem, vt possint iuuare, & nocere: hæcque ratione dicuntur non naturales: confidentia verò numquam nocet, sed semper iuuat.

Credimus nos, confidentiam iuuare, quia imaginatio mouet spiritus in illam partem, quam medicus sanare vult: quibus adiuta necessariò imaginatio iuuat partem læsam.

Quod verò imaginatio moueat spiritum in illam partem, quam ægri efficaciter imaginantur; sciunt hoc perbellè, qui imaginationibus venereis tentantur: dum sc. imaginantur partem, quam exercere desiderant.

Vt igitur ægrotorum confidentia in medicum conseruetur, duo sunt præcipuè obseruanda. Primum Galeni præceptum traditum secundo in sextu epid. 42. vbi inquit, „ medicum non debere spern ægrotantibus augere, quia sub fiducia peccant: mox videntes aliter succedere, & morbum protrahi, duo mala sequuntur. Primum fidem, & obedientiam in medicum

omniò amittunt. Secundum incidunt in longe maiorem tristitiam, quæ in ægrotantibus est multorum malorum radix. Galenus loquens de hac re loco proximè citato habet hæc verba „ Prudenti ægro veritatem dicito: imprudenti & timido illa solum dicito, quibus meliori animo sit, ita tamen, vt non magnoperè mentiaris, hac conditione, dummodo præceptis obtemperet: deinde egressus, his qui curam illius gerunt, veritatem dicito.

Secundum præceptum est illud Galeni 2. de diebus decretorijs secundo, quod medicus in prognostico valde ambiguo non loquatur firmiter, hæc sunt verba „ si nihil firmiter prælagire possumus, satius est tacere, quam temerè pronunciare.

Præterea medicus nullo pacto debet domesticos consolari, veritatem occultando: quia illi fidem, & medicus existimationem amitteret: quamuis non minus necessaria sit ægrotantium, quam domesticorum, qui ægris assistunt, confidentia.

Accedit quod maiorem confidentiam medicus acquireret in domesticis ex mortis, quam ex salutis prædictione: hinc rectè Valeſius 2. epid. ait „ ad medici honorem, & artis admirationem magis refert prædicere mortem in morituris, quam salutem in conualuturis.

**Q**uantum attinet ad *Astantes*. Hippocrates lib. de decr. ornatu iuxta finè proponit has condiciones his verbis „ oportet, vt eligatur vnus è discipulis, qui diu sit exercitatus, & profecerit, & patièter ægro seruiat. Præterea sciat recitare medico, quæ contigerit circa ægrum. Galenus vero loquens de astantibus 1. de diebus deeret. c. 11. inquit „ oportet, vt astantes sint prudentes, periti, patientes, diligentes, hilares, & ægrotantibus grati.

Quarta dubitatio, sed quomodo isti sanandis ægris requiruntur astantes, & exteriora: non ne Galenus 9. meth. 1. & Hippocrates 2. in primum epid. tex. 5. r. dicunt, artem constare his tribus, morbo, ægro, & medico? ibi tantum nihil dicit de Astantibus, & exterioribus.

Responsio est, Astantes, & exteriora se tenere ex parte medici.

Quintò dubitatio augetur, quia Hippo-



procrates 6. epid. 5. tex. 1. ait, naturam esse morborum medicatricem: ergo præter medicum erit quoque natura, de qua in hoc aphorismo nihil dicit, quare Auctor videtur diminutus.

Responsio est, naturam se tenere ex parte medici: quia medicus est naturæ minister.

Quantum attinet ad exteriora, Galenus 1. de diebus decret. 11. & in hoc cōm. habet „ Exteriora quæ impediunt crīsim esse vicinorum tumultus, strepitū eurrum, canum latratus, habitationem turbatarum plenam, nimis calidam, vel nimis frigidam, incendia, domorum ruinam, rixas, quantitatem vel qualitatem indebitam ciborum, & aliarum causarum nonnaturalium. Addimus nos sonum campanæ, & indebitum vsum aliarum rerum nonnaturalium.

Sed quæ maximè impediunt crīsim sunt nostrorum medicorum plurimi, qui importunè medicinis quotidie vexant ægrotos, eosque lacerant, & ad necem vsque deuerberant. Contra quos Hippocrates lib. de alimentis inuehitur, & Galenus 1. de diebus decretorijs 11. & 11. methodi 15. his ferè verbis „ Nonnulli medici (ait) quorum numerus his temporibus est maximus, quoties ad egrum accedunt, aliquid sine ratione faciunt, modo vtuntur cataplasmate, modo perfusionibus, modo adusionibus, nunc clysteres iniiciunt, venam secant, fricant, aut cucurbitulas affigunt, aut aliud quidpiam faciliunt. Adde etiam ego his temporibus medicos ferè omnes eadem crudelitate miseros ægros lacerare. Subdit Gal., hi quoties ad ægrum accedunt, toties peccant: quia iudicium crīses, & naturæ opera impediunt.

Hinc (ait Gal.) diuites, qui multos tales habent, multo deterius pauperibus curantur: quia semper noua remedia ab his efflagitant: tales non medici, sed non ab similes sunt ex triuio pharmacopæis. Tales non obseruauerunt aphorismum 29. secundæ sec. vbi præcipit Hippocrates, in augmento, & statu nihil agendum, dicens „ Si quid tibi videretur mouendum moue in principio, in augmento vero & statu quiescendū: isti vero præcipue in augmento &

statu ægros importunis remedijs lacerant impediunt crīsim, & naturæ opera. An inueniantur tales his temporibus medici, vel potius carnifices, cæteri iudicent.

Relinquitur igitur, vt solum medicus dogmaticus non impediatur naturæ opera, & iudicium, præcipue in ægro obtemperante: Galenus enim in 6. epid. 9. & 2. in 1. cōm. 51. ait, si æger obtemperauerit medico, erunt duo contra vnum, id est æger, & medicus contra morbum, & sic morbus facile superabitur: Galenus enim 2. Pronost. 43. & 6. epid. 9. ait „ paucos morbos esse mortiferos, si neque medici errent, neque ægri, neque ministri, neque aliquod noxium extrinsecus accidat.

## APHORISMVS SECVNDVS.



*In turbationibus alui, & vomitionibus, quæ sponte fiunt, si qualia oportet purgentur, confert, & facile ferunt: sin minus, contra fit: sic, & vasorum inanitio, si talis fiat, qualis fieri debeat, confert, & bene tolerant: sin minus, contra. Inspicere itaque oportet, & regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conueniat, aut non.*

Intentio Hippocratis in hoc lib. aphorismorum est tradere artem medicam ad vsum accommodatam doctrina aphoristica, id est per quædam semina, & quædam communes sententias, quæ sunt tamquam cardines, quibus nititur vniuersa medicina.

Sed quia medicina ad vsum accommodata definitur ab Hippocrate lib. de flat. cap. 6. quod sit additio eorum quæ deficiunt, & ablatio eorum quæ excedunt: ideo Hippocrates in hac 1. sect. respiciens ad redundantiam, & defectum humoris agit & de euacuatione, & de victus ratio-







*ποσότηα*, quod verbum est neutrum adiectiuum in numero plurali sine articulo, quod non significat facillima, sed facillimè: secus ille aphorismus nullum haberet sensum. Similiter in aphorismo 18. dicit *δυσποσότηα*, idest difficillimè, & non difficillima.

Præterea apud Græcos hæc neutra adiectiua sine articulis, & in numero plurali iuncta cum verbo similiter plurali transeunt in naturam aduerbiorum, quod infinitis exemplis ostendi posset: neque de hoc est dubitandum; præcipue in lingua Arica, quam Hippocrates vt plurimum secutus est, sicuti animaduertit Galenus 1. de humoribus comm. 2. his verbis, „ Attici quoque quorum lingua Hippocrates aliqua ex parte vtitur, numerum multitudinis pro numero singulari ponere consueuerunt.

Insuper *οἷα* ab Herodoto, & Tucidide sumitur aduerbitaliter pro qualiter: sicuti etiam patet in annotationibus apud Ioannem Scapulam. Quare si Hippocrates per *οἷα* intellexisset qualia non dixisset *καθ' ἑαυτὰς* in plurali, sed dixisset *καθ' ἑαυτὴν* in singulari: ideo per *οἷα* in hoc loco intelligit qualiter fieri debeat euacuatio, idest de conditionibus bonæ euacuationis; & non de euacuatione qualium: conditio vero bonæ euacuationis est, vt fiat qualiter fieri debeat, idest in d. critico, materia concocta, seu tempore opportuno.

Præterea Hippocrates primo de ratione vict. 23. dicit, „ si quæ à pulmone excernantur, sint qualia oportet, augenda est sorbitio. Galenus in comm. per qualia interpretatur qualiter: quia inquit, Hippocratem per qualia intelligere quod adsint concoctionis notæ, quæ excretio non est qualium solum, sed qualiter fieri, debeat.

Addimus, quod si per *οἷα* intelligeret qualia, aphorismus esset falsus: in febribus enim malignis, & lethalibus sæpè euacuatur qualia oportet cum conferentia, & tolerantia, itaut mitigentur, & sedentur calores febriles, melius dormiant, & quiescant: itaut tunc medici praua aphorismi intelligentia, decepti latentur

cum ægris & domesticis de signo futuræ salutis: attamen ægri post biduum ex humanis decedunt non sine magna illorum medicorum ignorantia nota: cur hoc euenit? quia euacuatio non est facta qualiter, idest cum signis concoctionis.

Saxonia alioqui vir doctissimus communis huius expositionis impetu abreptus in capite de diarrhæa disputans, an in euacuatione symptomatica media, quæ sit in morbi principio, & cum tolerantia, & quæ respondeat morbo, idest, quod in morbo bilioso biliosa euacuentur, tenet euacuationem non esse supprimendam, sed fouendam, licet sit in principio; & sic symptomatica, suffultus praua aphorismi intelligentia, quod scilicet, si qualia oportet purgari purgentur conferat & leuiter ferant: cum vera aphorismi interpretatio sit, si qualiter oportet purgari, & non qualia: quoniam in diarrhæa principio bilis euacuatio non potest fieri qualiter oportet: ideo neque est fouenda, neque supprimenda: sed vtendum est alterantibus in contrarium, auferentibus causam diarrhææ, inter quæ serum lactis videtur tenere primas.

Hinc Galenus 4. aphorismorum comm. 22. dat nobis hoc præceptum diuinum, quod ante vtilem euacuationem præcedere debeat separatio, & ante separationem, concoctio: sed sic est, quod in principio morbi non potest esse concoctio: quare licet in principio morbi obseruetur aliqua euacuatio cum tolerantia, causa est, quia ex Hippocrate 2. aphorismorum 30. in principio, & sine omnia apparent remissa, ideo tolerantia euacuationis in principio morbi pertinet ad naturam principij, & non ad conditionem bonæ euacuationis, quia sola illa euacuatio bona est, quæ fit qualiter oportet, idest concocta materia, seu in tempore opportuno facta.

Hinc Vegha, licet per *οἷα* non interpretetur qualiter, tamen veritate coactus protulit hæc verba in expositione huius aphorismi, per qualia non solum esse intelligendam speciem humoris euacuandi, sed etiam omnes alias conditiones, quæ requiruntur ad optimam euacuationem.



nempè ad euacuationem qualiter fieri debeat, idest in die critico, concocta materia, & in morbi declinatione.

Postremò si Hippocrates per *oia* intelligeret qualia, ut omnes expositores dicunt, præceptum esset vanum: Hippocrates enim vult admonere in aphorismo, medicum in euacuatione debere imitari naturam, quæ si euacuat, ut par est, confert, & ægri facillè tolerant: idem debet quoque medicus in euacuatione præstare.

Hoc posito, si per *oia* intelligeret qualia, præceptum esset vanum: quia sciunt omnes practiciantes paulo ante obitum euacuari excrementa praua, qualia quidem debent euacuari: dum vero dicunt, euacuationem illorum humorum, quæ est cum tolerantia, & conferentia esse imitandam, præceptum est inutile: quia turpe est, solum post factam euacuationem scire, quod multo ante erat sciendum: quoniam tolerantia, & conferentia sequuntur euacuationem, & solum post factum animaduertunt: de istis potest dici, sero sapimus phryges: si vero per *oia* interpretabimur qualiter, & non qualia, præceptum non erit vanum, sed diuinum quidem, quo animaduertimus, illam euacuationem esse bonam: quæ sit qualiter oportet, quæ sit, ut dictum est, in die critico, concocta materia, seruata debita quantitate, & qualitate: post istam solum sequitur vera & non apparens conferentia, & tolerantia.

„*Sic, & vasorum inanitio*: inanitio explicatur per dictionem *κενῶδες* quæ inanitio vel sponte fit à natura, vel à cibi nimia abstinentia, secundum quem significatum sumitur ab Hippocrate 2. acutorum 47. vbi ostendit Galenus *κενῶδες* significare *ασιτίαν*, idest cibi abstinentiam.

Sensus igitur aphorismi iste est: in perturbationibus ventris, & vomitibus spontaneis si fiat purgatio qualiter oportet, confert, & ægri leuiter ferunt: sin minus è contra. Idem dicit de vasorum inanitione. Quare medicus, qui est imitator natura euacuabit qualiter oportet, si inspexerit regionem, ætatem, tempus, & morbos.

Diuiditur aphorismus in tres partes.

In prima vult admonere, medicum debere esse imitatore naturæ non solum in purgatione, sed in quacunque euacuatione, dummodo euacuatio sit qualiter oportet, nempè cum conferentia, & tolerantia stabili, & firma, ad differentiam conferentia & tolerantia, quæ interdum post symptomatice euacuationem contingit, quæ non est stabilis & firma, sed breui tempore durat.

In prima parte igitur exemplificat qualiter fieri debeat euacuatio per medicamenta purgatiua.

In secunda parte vbi dicit „ sic & vasorum inanitio: exēplificat qualiter fieri debeat euacuatio per inanitionem faciendam per sanguinis missionem.

In tertia parte docet modum, quomodo fiat euacuatio qualiter oportet, qui modus percipitur inspicendo regionem, tempus, ætatem, & morbos: ex quibus facillè colligere possumus, non solum qualiter, sed etiam qualium fieri debeat euacuatio.

Quo ad verborum explicationem. Per ventris turbationes Hippocrates intelligit fluxus repentinos, qui solent torminibus alium perturbare. Similiter Galenus 4. aphorism. 78. accipit illud aduerbium sponte pro repente.

Per ventrem intelligit ventriculum, & intestina: quamuis, *κοιλίην* significet omnem cavitatem: deducitur enim *ἀπὸ τῆς κοιλίας*, idest à cavitare. Varo dicitur *καὶ* *κοίλον*, idest cauum vocari.

Quando Hippocrates per ventrem intelligit ventriculum, nominat ventrem absolutè sine limitatione: sicuti 6. aphorism. 14. dum dicit „ Hydrops detento, si aqua è venis in ventrem defluerit, soluitur morbus: idest si defluerit in ventriculum, & intestina. Dum vero per ventrem intelligit thoracem, vel alias cavitates, coarctat ventrem cum alia dictione, sicuti in aphorism. 38. 7. sectionis, vbi dicit „ destillationes in ventrem superiorem suppurant intra dies 20.

Quo ad spontaneas euacuationes, Galenus 4. aphorismorum com. 2. declarat, quid intelligat Galenus per sponte euacuari: dicitque sponte euacuantur quæcunque sine aliqua medici opera excernuntur, vel



vel à natura, vel ab aliquo irritamento, vel quia vasa humores continere non possunt. Parimodo Galenus lib. de diff. sympt. 6. loquens de spontaneo fluxu menses inquit fieri, vel à materia, vel ob dietesim, vel ob acrimoniam, vel ob serositatem, serositatemque sanguineam fieri, vel quia renes non attrahunt, vel ob diminutam sanguificationem, vel ob retentricem depravatam, sicut ex his Galeni locis, euacuationes spontaneæ sunt duum generum, aliæ naturales & aliæ symptomaticæ: naturales fiunt tempore opportuno à natura dominante, & per has (dicit Galenus) iuuatur animas: symptomaticæ vero, vt. symptomaticæ fiunt à vi morbi, ac semper malæ sunt. Idem dicit Galenus in Philisoi historia, his verbis, „ Decretoria non indicantia, aut lethalia, aut difficilis iudicij: lethalia, si iungantur cum signis lethaliibus.

Dictum est, euacuationes symptomaticas, vt symptomaticas semper esse malas, ad differetiam euacuationum, quæ sunt symptomaticæ mixtæ ex naturali, & symptomatica, quæ reuera non sunt omnino malæ: obseruauit enim Hippocrates in muliere trimestri fetu grauida, & in Pericle per sudorem symptomaticum mixtum videlicet ex critica & symptomatica euacuatione illos duos ægrotantes fuisse sanatos, vrina adhuc existente cruda: ratio est quia humores magna ex parte erant cocti; crudi vero, qui fuerunt partim euacuati, partim resoluti, ac paucorum dierum spatio in corpore relictis à natura cocti, & domiti fuere: quare omnis euacuatio symptomatica mixta iuuat, sed non quatenus est symptomatica, sed vt naturalis, & coctæ materię particeps.

Spontaneæ euacuationes ex Galeno 4. aphorismorum comm. 2. à tribus causis fiunt, videlicet à natura, vel ab irritamento, vel à vasis non valentibus continere. Si consideremus irritamentum expultricis, vel vasa quæ non possunt continere: dicimus fieri vel à copia grauante, vel à qualitate irritante, vel à frigore densante, vel à calido liquefaciente, vel ab imbecillitate retentricis partis mandantis, vel ab imbecillitate expultricis partis recipientis: quæ omnia colliguntur ex Galeno vt infra.

De euacuationibus, quæ fiunt à copia grauante, & à qualitate irritante mentionem facit Galenus 3. de symp. causis cap. 4. & pluribus in locis.

De euacuatione quæ fit à frigore densante mentionem facit Galenus 3. aphorismorum 12. vbi inquit frigus externum exprimere cerebri excrementa, perinde ac esset manus extirsecæ, quæ spogiam aqua imbutam exprimat: sic hyberno tempore fiunt fluxiones, & interdum pleuritides, nothæ.

Langius reprehendit medicos nostræ temporis, qui putant, frigus externum cerebrum comprimere posse: neque vidit hunc conceptum fuisse Galeni loco citato.

De euacuatione, quæ fit à calido liquefaciente: sermonem habet Galenus loquens de febribus hecticis, & ardentibus, in quibus apparent colliquationes in vrinis, & in fecibus crassis, quorum sæcum pinguedo obseruatur, si aqua calida permisceatur, & in ipsa supernatet. similiter Galenus de euacuatione quæ fit à calido liquefaciente loquitur 5. methodi 13. vbi proponit casum Matronæ Romanæ affectæ catarrho tenui, ac corrodente.

De euacuatione, quæ fit ob imbecillitatem retentricis partis mandantis mentionem faciunt Auctores, dum agunt de lienteria, & de cæliaco affectu, qui affectus fiunt propter ablatam, vel diminutam retentricem ventriculi, & intestinorum: Galenus enim 4. aphorismorum comm. 12. ait, leuitatem intestinorum fieri ob tres causas, videlicet ob debilitatem retentricis stomachi, ob intemperiem intestinorum, vel ob ipsorum exulcerationem.

Ex his colligimus, qd intestina habeant retentricem quidem, sed priuatam insertionis: negamus tamen quod habeant retentricem communem: quia pro communi sufficiunt intestinorum circumuolutiones, quæ totum chylum commodè retinent, quæ dum euadunt laxiores fit cæcæ, & deinde lienteria.

Dicimus quoque cum Laurentio lib. 1. controu. cap. 18. & cum Rudio contra ipsam Saxoniam, intestina non solum continere retentricem communem, sed etiam attra-



Attrice communi: De priuata vero attrahente fibris rectis infera gratia attrahendi alimentum nemo dubitat. Saxonia vero vult intestina habere quoque attractricem communem: idque probat: quia ratione doloris, vel caloris possunt ab alijs partibus attrahere humores: Nec vidit attractricem ratione caloris, & doloris fieri virtute vacui, talemque attractricem factam virtute vacui esse transmissionem, & non attractionem: quia vacuum, quod nihil est, aliquid efficere non potest: sed solum potest recipere quod expulsum est, sicuti ostendimus in commentarijs Apicennae, & in lib. de instrumentis huic contemplationi indicatis: sed satis superque idem ostendimus in decimolib. methuitorum errorum cap. 1.

De euacuatione, quae fit ab imbecillitate expultricis partis recipientis aliquid dicit Galenus 3. de facult. naturalibus cap. 3. dum asserit, Quamlibet partem expellere excrementa in aliam imbecilem, & illam adhuc in aliam imbecillio rem, donec omnium imbecillimam inueniat. Isti sex modi propositi sunt valde viles, quia aliud remedium requiritur, dum expultrix irritatur à copia grauantē, aliud à qualitate irritante: aliud vero in euacuatione facta à frigido condensante, & aliud omnino diuersum si fiat à calido liquefaciente.

Sed notatu dignum est, quod euacuatio facta à copia grauantē, & à qualitate pertineat ad irritamentum: illa vero quae facta est ab imbecillitate retentricis facta à frigido condensante & à calido liquefaciente reducatur ad vasa, quae non possunt humores continere. Illa autem quae fit ab imbecillitate expultricis recipientis ad nullum illorum trium modorum reducitur: ideo diuisio illa Galeni proposita 4. aphorismorum comm. 2. quod omnis spontanea euacuatio fiat vel à natura, vel ab irritamento; vel quia vasa continere non possunt non complectitur hunc postremum modum euacuationis.

Redeunt igitur vnde digesti sumus, dicimus, Hippocratem per spontaneas euacuationes non intelligere symptomaticas per sex modos declaratos, sed illas euacu-

ationes, quae sunt à natura domitante, quae semper sit qualiter oportet, & quam sequitur ex necessitate firma & stabilis conferentia & tolerantia.

In vomitibus. Querendum est, de quo vomitu intelligat Hippocrates. Sciendum igitur, vomitum vel fieri à vi morbi: vel à natura cum tolerantia, & conferentia. A vi morbi fit vel ob laesam expultricem, vel retentricem, vel attractricem. Quod fiat ob laesam expultricem omnes intelligunt. Quod vero fiat ob laesam retentricem, animaduertit Auicenna lib. 3. sen. 1. tract. 5. ubi ait de causis vomitus, atque fieri ob laesam retentricem, vel quia os ventriculi superum sit laxum, vel quia os inferius sit nimis validum, vel ob calum circa initium pylori, vel propter obstructions, & constipationes, ob quas aliquantulum impeditur chyli descensus: vnde vomitus.

Quod vero vomitus fiat ob deprauatam attractionem, Galenus 3. de symptomatum causis cap. 2. aduertit, dum dicit, ventriculum aliquando attrahere chylos, illosque reijcere per vomitum; quod ego interdum in praxi obseruaui.

His positis dicimus, Hippocratem in aphorismo per vomitus non intelligere istos symptomaticos, qui sunt à vi morbi sine legitima conferentia & tolerantia: sed intelligere illos, qui sunt à natura, qui sunt qualiter fieri oportet cum conferentia, & tolerantia perseverante, quae sola critica est.

Sed conferamus hanc theoricam Hippocratis ad ipsam practicam: inquit, tunc nos obseruare euacuationem per vomitum, vel per alias vias esse naturalem, quando sequitur tolerantia & conferentia, quae videlicet perseueret. Querimus nos quanam sint illae conditiones, quibus admonitus medicus, qui est naturae minister & imitator, non erret in facienda euacuatione: conferentia & tolerantia admonet post factam euacuationem, qualiter euacuatio facta sit, sed non ante. Medicus, si vult mederi, & sanare debet ante, quam euacuet praescire conditiones optimae euacuationis.

Quinque igitur loci proponuntur ab Hip-



Hippocrate & Galeno 2. in 6. epid. 3. & 33. à quibus sumuntur conditiones optimæ euacuationis, quæ sunt, vt antequam medicus operetur euacuando, vel alterando sciat quid, quantum, quando, quomodo, & ubi. si de hac prima conditione loquimur ex Galeno locoritato, *Quid ab absentia* indicatur, an videlicet, sine euacuandi, vel alterandi humores frigidi, vel calidi.

Quantum euacuandum desumitur ab euacuatione euacuandorum humorum. Dicimus tantam esse faciendam euacuationem, quanta est actiuitas malorum humorum; dummodo virtus permittat, quia illa existente debili parum & per epicrasim: si robusta, multum euacuamus.

Circa quantum, tria sunt aduertenda. Primum ne diminutè euacuemus. Secundum ne superflue: Tertium ne transcendenter, veluti si in hydropico quis sanguinem mitteret, vel bilem rhubarbaro euacuaret, euacuatio esset transcendens, & vitiosa: quia in hydropico sanguis & bilis desiderantur.

Idem Aristoteles 2. Post. tex. 4. docet esse obseruandum in tradenda diuisione, & definitione ne erremus. Primum ne addamus in definitione verbum superfluum. Secundum ne diminutum. Tertium ne ponamus aliquod verbum transcendens pertiñens ad aliud genus. Similimodo in euacuatione tribus modis errare possumus, vel euacuando superflue, vel diminutè, vel transcendenter, idest humorem non peccantem.

Quando verò desumitur à presentia humorum euacuandorum, & à virtute permittente, & ab absentia prohibentium. In quando obseruantur duo errata: transcendens videlicet, & superfluum: transcendens, & superfluum simul obseruantur, dum homines sani tractantur medicinis: Galenus enim 3. aphor. 14. inquit, si quis sanus vouerit bis in mense, aut semel vti medicamento, veritus ne aggregentur superfluitates, nocebit, & erit ei corpus in malam consuetudinem. In sanis medicamentum euacuans est transcendens, quia euacuat humores viles. Est superfluum, quia non solum euacuat, alui

excrementa, sed etiam excrementa euacuanda à natura per alias regiones.

Quomodo verò desumitur à passione euacuandorum humorum; tunc enim sunt humores euacuandi, quando possunt pati, seu vinci à medicamento: dum vero sunt crudi, non possunt pati, quia non sunt fluidi: corpora enim ex Hippocrate 2. aphor. 15. cū quis purgare vouerit oportet fluida facere.

Similiter Hippocrates 2. de humoribus comm. 15. dicit, Incoctos humores esse ita infixos, & stabiles in ipso corpore, vt à medicamento dimoueri non possint, nisi eouantur.

Circa quomodo duo committi possunt errata. Primum dum triuiales medici vtuntur remedio superfluo. Secundum dum vtuntur remedio extraneo, vel transcendente.

Exemplum superflui est, si in vitiatiss renibus, & vesica, quis semper vitatur diureticis: tunc renibus, & vesicæ adderentur quod addi non debet: Ideo Galenus 2. in 6. epid. comm. 7. ait, vitiatæ vesicæ, aut renibus melius est per alium deriuare, quam per vrinam euacuare: diximus (semper) quia Galenus 7. meth. vltimo inquit, Dum renes multo vitioso succo abundant per cathartica purgandum: si mediocri succo, per vrinam: Sed vt plurimum corpora searant crudis succis: ideo præstat prius per alium deriuare.

Exemplum extranei, seu transcendenteris remedij est, si in calculo vesicæ vteremur electuario vitri Montagnanæ pro corrodendo, & comminuendo vesicæ calculo, quod vsus est vir quidam Illustris, medico quodam iubente; inde ab eodem electuario trium mensium spatio fuerunt exosa intestina, ac miser ante diem dynteristis periit.

Vbi sumitur ab inhærentia humorum: Galenus lib. ad posthumum cap. 3. & alibi inquit, esse multas vias, per quas excrementa expellantur, idest per sanguinis eruptionem, per vomitum, per vrinam, & per sudorem. Quare, dum ad prædictas vias excrementa habent inclinationem, purgantia euadunt extranea, & transcendenteria, & etiam prohibentia.



Exempli causa: Horophons, qui in decimaseptima die est indicatus sudore, si in decimasepta sumpsisset pharmacum, non sudasset, & fortasse ob sumptum pharmacum ex humanis decessisset.

Si Cherionas, qui liberatur die vigesima multitudine vinarum biliosarum, pharmacum paulo ante sumpsisset, sine dubio fuisset saltem magna ex parte non sine periculo impedita illa crisis.

Si Meton, & virgo Larissæ, qui ægrantes liberantur febre acuta hemorrhagia è naribus, sumpsissent medicamentum ante crisin, fuisset impedita hemorrhagia. Sed de his ampla rationum serie agimus lib. 13. meth. vitandorum errorum. Caterum explicata prima parte aphorismi occurrunt nonnulla dubia.

Secunda dubitatio, dum euacuantur humores peccantes, euacuantur qualia oportet cum conferentia, & tolerantia: è contra vero dum euacuantur humores qui non peccant. Contra hoc dictum sic arguitur: sanguis in febribus biliosis vel melancholicis non peccat, tamen euacuatur cum conferentia, & tolerantia: quia Galenus 11. meth. 1. §. asserit saluberrimum esse in omnibus febribus putridis mittere sanguinem.

Responsio est sanguinem peccare copia, & non qualitate.

Vel respondemus, sanguinem euacuati gratia preservationis, & non curationis.

Vel respondemus Hippocratem in aphorismo intelligere de purgatione, & non de sanguinis euacuatione.

Responsio quoque communis est, sanguinem peccare non principaliter, sed vt causam sine qua non.

Tertia dubitatio dum euacuantur crudi humores, non euacuantur cum conferentia, & tolerantia, quia ex Galeno 1. de humoribus 1. §. humores crudi, & incocti sunt adeo infixi, & stabiles, vt à medicamento dimoueri non possint sine magno corporis detrimento: sed crudi humores sunt humores peccantes: ergo non euacuabuntur cum conferentia, & tolerantia. Præterea tantum abest, quod cruda euacuentur cum conferentia quod Galenus 4. de tuenda sanis. cap. 5. dicat, delectio cru-

dorum facit termina, rosiones: & obstruit angustas vias: ergo nullo pacto cruda debent euacuari.

Responsio pendet ex recta intelligentia aphorismi, quia (vt ostendimus superius) per ista non debemus intelligere qualia, sed qualiter fieri debeat purgatio: illud enim qualiter supponit naturam esse euacuandam in tempore opportuno, nempe in die critico, quo casu humores sunt cocti, & non crudi, & purgantur cum vera conferentia, & tolerantia.

Quarta dubitatio, dum euacuatur atra bilis, euacuatur humor peccans, & qualia oportet: sed sic est quod euacuatio atræ bilis nunquam est cum conferentia, & tolerantia: quia ex Hippocrate 4. aphorismorum 21. atra bilis si supra, vel infra exierit lethale.

Respondetur, atræ bilis euacuationem esse malam non ratione bilis atræ euacuatæ: sed ratione causæ ipsius atræ bilis, quæ causa est relicta in corpore, quæ est icteroris incendium.

Deinde respondetur, dum Hippocrates 4. aphorismorum 22. proponit prædictam sententiam, inquit, Incipientibus morbis, si atra bilis supra, vel infra exierit, lethale: quare non euacuatur qualiter oportet, dum in morbi principio mouetur: quia incipientibus morbis materia est cruda, & acris, & habet vim exedendi, & exulcerandi intestina: si verò in tempore opportuno, id est dum superata est atra bilis ab ipsa natura euacuetur, tunc euacuatio est qualiter fieri debeat, & ideo salutaris.

Hinc Hippocrates 7. aphorismorum 5. dum dicit ab insania difficultas intestinorum, bonum, licet insania fiat ab atræ bile: quia illa atra bilis spatio multorum dierum à natura superata, & victa non lædit, seu corrumpit intestina, sicuti incipientibus morbis.

Quinta dubitatio: non videtur, quod qualia oportet sint purganda, sed quanta, quia id purgatur, cui responder euacuatio: sed euacuatio respondet quantitati, & non qualitati: ergo Hippocrates debebat dicere, si quanta oportet purgari, purgantur, & non si qualia, quia qualitates



tates prauorum humorum alterantibus, & non purgantibus tolluntur.

Responderetur per qualia nos debere interpretari qualiter oportet purgari: hocque aduerbium qualiter amplecti quoque quantitatem.

Aristoteles enim s. metaph. cap. de quali dicit, qualitatem amplam habere significationem; quia inquit, sumitribus modis, nempe, vel pro qualitate de predicamento qualitatis, vel pro qualitate substantifica secundum quem modum rationalitas dicitur hominis qualitas, quia de homine predicatur in quale quid; vel per qualitatem intelligit differentiam omnium aliorum predicamentorum: quia qualibet differentia predicatur in quale de suo subiecto: atque secundum hanc significationem qualibet differentia cuiuslibet predicamenti sit quantitas, sit relatio dicitur qualitas, secundum quam subiectum dicitur quale: sic dicemus homines magnos dici à magnitudine, longos à longitudine, & sic de alijs.

*Sic & vasorum inanitio: si talis fiat, qualis fieri debet.* Hæc est secunda pars, quæ docet qualiter fieri debeat euacuatio faciendæ per inanitionem, videlicet per sanguinis missionem. Sed oritur.

Sexta dubitatio, quia Hippocrates: qui est omnium auctorum breuissimus, videtur superfluus, quia bis repetit eadem verba in principio aphorismi habet hæc verba „ Si qualia oportet purgari purgentur confert & facile ferunt: deinde iterum repetit eandem sententiam his verbis „ Si inanitio fiat qualis fieri debet.

Respondemus, intensionem Hippocratis in hoc aphorismo esse de qualitate euacuationis, vt est euacuatio, dicendo tunc esse bonam euacuationem, quando sequitur tolerantia, & conferentia. Hoc posito dicimus cum Oribasius in principio aphorismi exemplificare de euacuatione qualiter fieri debeat per medicamenta cathartica. Hic vero de euacuatione per sanguinis missionem: explicando per inanitionem ipsam phlebotomiam.

Nec valet, quod dicit Triuerius contra Oribasium, quod Hippocrates non intelligat de euacuatione per phlebotomiam:

quia qualitas euacuationis non pertinet ad sanguinis missionem: quoniam qualitas euacuationis, id est qualiter fieri debeat, pertinet ad euacuationem vt est euacuatio, quæ predicatur de purgatione & sanguinis missione, & (vt probatum est superius) de quantitate, & quacumque alia conditione optimæ euacuationis.

Septima dubitatio: proponit Hippocrates duas condiciones optimæ euacuationis, quæ sunt conferentia & tolerantia: quæ duæ condiciones aliquando observantur ante obitum post prauorum humorum euacuationem: ob quam mitescunt omnia, dormiunt, meliusque se habent ad oblata: attamen post tres vel quattuor dies ex humanis decedunt: ergo duæ condiciones non sufficient in declaranda optima euacuatione; quare Hippocrates videtur diminutus.

Responderetur, conferentiam & tolerantiam duplicem esse: aliam perseverantem: aliam vero non perseverantem, quæ interdum in euacuatione symptomatica contingit: posita distinctione dicimus, Hippocratem intelligere de conferentia & tolerantia perseverante, & de illa, quæ fit post euacuationem factam qualiter fieri debeat, quæ fit in die critico, i. cocta materia & in fine status, vt docet Galenus 3. de crisibus 6.

Octava dubitatio: non videtur, quod in euacuatione qualiter fieri debeat, sit facilis tolerantia: multæ enim euacuationes criticae & salutes conferunt quidem, sed ægri non facile ferunt: quia ex Galeno 3. de crisibus cap. 9. crises non sine certamine fiunt: immo sæpe in optima euacuatione excitantur dolores capitis, anhelitus difficultates, & varia symptomata, vt docet Galenus 3. de crisibus, quæ ægri non facile ferunt. immo Galenus aphorism. 23. huius primæ sect. vult, in vehementissimis doloribus, in ardentissimis febribus, & in maximis inflammationibus sanguinem esse euacuandum vsque ad animi deliquium, quam euacuationem certè ægri non facile ferunt: ergo in optima euacuatione non est facilis tolerantia, vt admonet Hippocrates.



Respondetur, quod crisis facta per euacuationem duplex sit, alia est facta per euacuationem optimam, & perfectissimam, & hæc semper est cum conferentia & tolerantia: de hac intelligit Hippocrates. Vel respondetur quod euacuatio critica consideretur vel dum fit, vel postquam facta est: primo modo non est sine certamine: Secundo modo sumpta non solum est cum conferentia, sed etiam cum facili tolerantia.

*Inspicere autem oportet.* Hæc est tertia pars aphorismi: Sicuti in prima parte Hippocrates docuit purgationem esse optimam, dum fit qualiter oportet: Et in secunda docuit inanitionem vasorum esse similiter optimam, si fiat qualiter oportet, id est in tempore opportuno, facta concoctione in die critico, & in statu morbi, ut docet Galenus 3. de crisis 6. & viribus ipsis permittentibus. Sic in hac tertia parte docet modum, quo observato intelligimus non solum qualiter: sed etiam qualium sit facienda euacuatio: quia proponit quatuor fontes, ex quibus hæc omnia facile colligere possumus, nempe regionem, ætatem, tempus, & morbos.

Dicit Hippocrates, esse inspiciendam regionem: quia ex regione colligimus qualiter humores sint euacuandi, & qualium sit facienda euacuatio, quoniam in regione calida, & sicca dominatur bilis: in calida & humida dominatur sanguis, in frigida & humida pituita: in frigida & sicca melancholia: talesque debent euacuari.

Præterea ex regione colligimus qualiter sit facienda euacuatio, videlicet an multum, vel paucum, vel affatim, vel per epicalim: quia ex Galeno lib. de sectis cap. 8. habetur, in Regione valde calida & valde frigida nec multam euacuationem, nec affatim factam convenire: ibidem enim habet hæc verba, Neque ijs qui incolunt Septentrionem, vel Ægyptum, & totam meridianam plagam convenit multa sanguinis euacuatio, & affatim facta: non multa: quia in his Regionibus non abundat sanguis: non affatim facta, quia ibi homines non polent robore: subdit

Galenus euacuationem multam, & affatim factam convenire ijs, qui inter hos sunt interiecti, dummodo non sint expositi ventis australibus: australes enim ventri auferunt robur, & laxant membra.

Hinc Galenus & ipse Aesclepiades, ut colligitur 3. epid. observarunt venesectionem confestim factam Romæ, & Athenis in pleuriticis non valde convenire: quia veraque civitas ventis australibus maxime est exposita. Addit Galenus in Hellepontio venesectionem affatim factam bene iuvare: quia ibi non australes, sed septemtrionales venti spirant. Hellepontus enim est interiectus inter septemtrionalem, & meridionalem plagam, cuius maior pars est sub quinto climate. Hinc colligimus quantum errent illi medici, & qui ventis australibus prædominantibus plenam faciunt euacuationem, & qui ventis septemtrionalibus dominantibus omittunt plenitorem euacuationem.

Præter Regionem, Hippocrates addit tempus, ex quo colligimus qualium, qualiter, & quando sit facienda euacuatio. Dicimus qualium, quia in tempore calido & æstivo humores calidi, & biliosi dominantur, & talium facienda est euacuatio: in tempore frigido, frigidi, & pituitosi: in temperato, sicuti est ver, sanguis est educendus: in tempore inæquali, sicuti est Autumnus, melancholia est purganda. Similiter Hippocrates 1. de natura humana tex. 34. & 35. inquit, hyberno tempore pituitam abundare: vere sanguinem: æstate bilem flavam: Autumno vero melancholiam: quare tempus anni indicat qualium humorum sit facienda euacuatio.

Colligimus quoque ex tempore qualiter & quantum sit euacuandum: Galenus 10. meth. ultimo inquit, tempore æstivo, aut parum, aut nihil esse euacuandum: quia fieret notabilis virium resolutio. Parimodo Hippocrates 4. aphorismorum 5. ait, sub cane, & ante canem difficiles esse purgationes: Galenus vero in comm. dicit plures sub cane purgatos incidere in malas febres. Canis oritur 20. Iunii, terminaturque 10. die Augusti, licet non ubique gentium habeat 50. dies: in aliquibus enim locis habet plures: in aliquibus vero pau-



ciores: sed notandum per ante canem intelligi illam stellam, quæ dicitur procyon, & est canis minor, quæ oritur per decem dies ante canem, atque hi dies vocantur prodromi, idest præcurrentes, in quibus non euacuatur sanguis, neque fiunt purgationes, intelligendo de purgationibus electis, non de lenientibus.

Ceterum tria notanda circa hoc præceptum. Primum sub cane, & ante canem spirantibus ventis septemtrionalibus, & urgente necessitate, & pharmaça, & phlebotomiam conuenire. Secundum notandum est: aphorismum esse intelligendum de multa, & assatim facta euacuatione non de pauca, quæ sit per cucurbitulas, vel hyadines. Tertium notandum, aphorismum esse intelligendum de pharmaça, non de lenientibus, quia hæc omni tempore conueniunt.

Similiter neque in tempore valde frigido conueniunt purgationes: tum quia corpora eo tempore non sunt fluida: tum quia ex Hippocrate 1. de natura humana hyeme dominatur pituita: de cuius ratione est consipare, & prohibere, ne corpora sint fluida.

Demum colligimus ex tempore, locum, per quæ sit facienda euacuatio: quia Hippocrates 4. aphorismorum 4. dicit æstate potius per superiora, idest per vomitum: hyeme verò potius per inferiora euacuandum: quia hyeme propter imperiũ, qui fit in ipso vomitu, interdum rumpuntur venæ, quia propter frigus non sunt ita laxæ, & ita molles, vt in æstate: deinde æstate dominatur bilis, quæ per vasa cholidoca ad Pylorum transmittitur; deinde ad ventriculum, unde vomitus promptior fit.

Post regionem ponit ætatem, ex qua colligimus qualiter, & qualium humorum sit facienda euacuatio. Colligimus qualiter: quia Hippocrates & Galenus 4. de ratione vic. in ac. 19. ponunt inter scopos mittendi sanguinem ipsam ætatem: excludantur rærum, duæ ætates, videlicet senilis, quia in hac virtus est languida, & multo magis excluditur puerilis: dicimus multo magis puerilis: quia in senibus robustis conuenit euacuatio & purgatio, quæ non ita conueniunt in pueris robustis: quoniam ex Gale-

no 9. meth. 17. „ Puerorum corpora ita facile diffantur, vt aliquando contingat post euacuationem in pueris corpora adeo exhalare, vt paulò post euacuationem exhalent animam ipsam.

Deinde ex ætate colligimus qualium humorum. Ex Galeno enim lib. de salubri diæta habetur „ ætates indicare dominũ peccatium humorum: senes enim „ propter debilitatem, & ipsi pueri propter ingluuiem indicant pituitam: Adolescentes sanguinem. Iuuenes bilem: viri qui sunt in ætate consentitiæ melancholiam esse euacuandam.

Post ætatem proponit morbos, ex quibus colligimus, an sit euacuandum, quid sit euacuandum, & quando. An sit: sicuti tabidi, hestici, hydropici, syncope vel cardialgia, vel fluxu correpti indicant sanguinem non esse euacuandum: dicitur vel fluxu correpti: quia Galenus 1. ad Glauc. 14. in fluxu cum febre, quamuis fluxus non sit præmultitudinis ratione, nec purgandum, nec phlebotomandum, iubet: febres vero putridæ, & omnes interperies cum materia, & omnes morbi, si vires permittant, indicant sanguinem esse euacuandum, & humorem purgandum. Similiter dicimus, omnes morbos magnos viribus permittentibus indicare sanguinem esse mittendum.

Morbos verò typos dicimus indicare varios humores esse euacuandos: quia typos vel est de tercio in terrium diem, & indicat bilem esse euacuandam: vel de quarto in quartum & indicat melancholiam, vel quotidie inuadit, & indicat pituitam euacuandam.

Quo ad quando, Tempora morborum indicant quando: quia principium morbi indicat sanguinem esse mittendum: augmentum & statum esse quiescendum: Hippocrates enim 29. aph. 2. sec. ait „ Si quid tibi videretur mouendũ modo in principio: in augmento vero & statu quiescendum: finis statum, & declinatio indicant esse purgandum; hinc Hippocrates 27. aphor. huius 1. sec. ait „ concocta medicari: quæ igitur perfecte concocta sunt in fine status, & in declinatione habent locum. Ecce quam artificiose Hippocrates



ex his quatuor verbis, nempe regione, tempore, ætate, & morbis nos facillimè docet & qualiter, & qualium humorum, & quomodo sit facienda euacuatio.

Nona dubitatio ex dictis suboritur: Hippocrates videtur diminutus: quia præter regionem, tempus, ætatem, & morbos alia dantur signa indicantia humores prædominantes. Galenus in comm. considerat colores. Similiter lib. 1. de humoribus Hippocrates & Galenus tex. & comm. 1. dicunt ex coloribus colligi posse humores prædominantes: alibi ex actione laxa, ex qualitate mutata, & exuntibus mutatis humores peccantes facillè colligi posse affirmat. Præterea Galenus 4. aphorismorum 2. proponit Cæli statum particularem, naturam ægrotantis, consuetudinem, vitæ studium, & præcedentem victus rationem, ex quibus colligere possumus qualiter & qualium humorum debeat esse euacuatio. Insuper secundo ad glauc. 2. proponit robur, præsentem constitutionem, consuetudinem, & naturam ægrotantis: de quibus Hippocrates in aphorismis nihil dicit; ergo est diminutus.

Responsio est, quod hæc omnia virtute contineantur in quattuor propositis ab Hippocrate in aphorismo, idest in regione, tempore, ætate, & morbis: Vel dicimus, illa quatuor fuisse proposita, ut exemplis quatuor præcipuis illustraret modum dignoscendi peccantes humores. Immo ab Auicenna 4. primi proponuntur loca, ex quibus qualiter, & qualium debeat esse euacuatio: itaut Auicennas videatur facere omnium locorū Hippocratis, & Galeni veluti fasciculum, ut inde exactissimè intelligatur qualiter, & qualium debeat esse euacuatio: quæ loca his trib. carminibus declarantur. Ars, Ætas, Regio, virtus, complexio, forma. Mos, & symptoma, repletio, tempus, & vsus. Et bene si numeres, figuram addere debes. Alia tria carmina continentia omnia loca proposita, & nonnulla alia circumferuntur per se holas, quæ sunt, Temperies, ætas, cælitatus, ars solita, morbus, vsus, causa, locus, symptomata, innata facultas: Consimiles morbi, mos, motus, pharmaça, gestus.

QUEST. 14. Quæ methodo dignoscantur peccantes humores.

Cæterum, nisi omnia proposita signa reducantur ad aliquam certam methodum, potius confusio, quam doctrinam parient. Dicimus igitur humores peccantes, qui debent euacuari, vel dignosci per signa propria; vel per syndromem signorum communium, quæ communia signa in vnum collecta non sunt minoris efficacie, quam demonstratio quia, quæ ex propriissimo signo constat.

Quo ad signa, quæ singula seorsum sumpta indicant certum aliquem humorem prædominari sunt hæc tria, sapes, colores, & typi. Dulcis sapor insipidus indicat pituitam euacuandam: dulcis manifestus ex Galeno 2. de facul. nat. cap. 9. indicat sanguinem: sapor amarus bilem: salus pituitam: acidus melancholiam, & secundario pituitam: sed de his fusius egimus lib. 5. meth. vitæ, & in comm. nostris Auicennæ.

Si verò de coloribus loquamur Galenus in hoc comm. huius aphorismi inquit, colores indicare humores peccantes, nisi ad intra regurgitauerint: regurgitant verò ex Galeno 4. de tuen. san. 4. ob tres causas, vel ob frigus aeris ambientis, vel ob libidinem, vel ob animi passionem, nempe ob iram, timorem, vel mæsticiam.

Colores verò humorum sunt decem videlicet, albus, qui indicat pituitam, pallidus pallidam bilem, citrinus flauam, luteus vitellinam, ruber sanguinem, vel sanguinis icorem, viridis poraceam, eruginosus prassinam, cæruleus isaridem, color niger turbidus indicat melancholiam naturalem ex Galeno 3. de loc. aff. 7. color niger splendidus atram bilem adustam ex Galeno 4. aphorismorum 23. de quibus coloribus fusè egimus in comm. nostris artis paræ quest. 49.

Si vero de typis loquamur, dicimus motum de tertio in tertium indicare bilē: de quarto in quartum melancholiam; & quotidianum pituitam.

Quando verò hæc signa humorum propria non habentur: tunc accedendum est ad syndromen signorum communium, quæ est



est paris efficaciz cum signo proprio, quod docere potest, an peccet vnus, vel alius humor.

Notandum igitur signorum communium aliqua esse necessario antecedentia: aliqua vero necessario consequentia.

Necessario antecedentia desumuntur à duobus fontibus: quorum primus continet sex res nonnaturales. Secundus corporis dispositiones.

Causæ nonnaturales sunt sex: Prima est aer: Secunda cibus & potus. Tertia somnus & vigilia: Quarta motus & quies: Quinta animi passiones: Sexta quæ excernuntur & retinentur.

Hæ causæ nonnaturales non valde alterant corpus, nisi sit dispositum: immo Galenus lib. de causis morborum capit. 2. inquit; sine subiecti dispositione nec ignis combureret, nec gladius incideret. Similiter Aristoteles 2. de anima tex. 24. inquit; actum actiuorum esse in patiente benè disposito. Hinc aer feruidus, & potus calidissimus: sicuti est vinum maluatium, possunt hydropem efficere, qui est affectus frigidissimus, si ad hydropem corpora sunt disposita: immo si non sint disposita disponuntur: quia calidissima sensim superat calorem naturalem, vnde corpus frigescit.

Hinc Aristoteles 3. sec. probl. 1. loquens de varia subiectorum dispositione quaerit, cur vinolenti non calent, cum vinum calidum sit.

Respondet, quia valde calida superant naturam, & suffocant calorem naturalem: ideo ait) vinolentos morbis frigidis vexari. Similiter senes sua natura frigidi interdum post vsum frigidorum hyberno tempore incidunt in causonem, cur? quia illa corpora, vel propter abstruções, vel alias causas disposita sunt ad cumulandam bilem, & non pituitam.

Quoad malas dispositiones dicimus, dignosci posse per loca antecedentia, & consequentia. Loca antecedentia sunt quinque, idest, ætas, habitus corporis, affectio hæreditaria, suppressa euacuatio, & loci affecti sue afficiendi.

Sicuti in mala valetudine lienis indicatur melancholia: in mala valetudine cere-

bri, glandularum, & ventriculi vt plurimum pituita: dum vero afficiuntur membrana, & ipsum hepar, bilis peccare solet: diximus membranas: quia membranae sua natura densa non penetrantur, nisi ab humore tenui, & acri, cuiusmodi est bilis: vnde Hippocrates 6. aphorismorum 33. qui acidum eructans, non sunt pleuritici: quia ructus acidi indicant pituitam, quæ ob suam crassitiem, & lëtiorem non penetrat membranas, quæ sua natura sunt densa.

Loci verò affecti cognoscitur per quinque loca proposita à Galeno 1. de loc. aff. 5. & lib. 2. cap. 9. quæ sunt, actio laesa, situs excrementa, doloris proprietas, & propria accidentia. Sextus verò locus colligitur ex Hippocrate 4. aphorismorum 33. vbi dicit, si qua ante morbum pars laborauerit, ibi morbi sedes.

Loca vero consequentia, quæ indicant viscerum dispositiones, sunt quinque. Primo sunt substantialiter inhaerentia, quæ sunt illa, quæ tactu dignoscuntur. Secundo sunt necessario accidentia, quæ pertinent ad compositionem, sub qua sunt, magnitudo, situs, numerus, & figura. Tercio sunt operationes. Quarto quæ consequuntur operationes, sicuti sunt qualitates mutatae, exētia, vel retenta immodicè. Quinto sunt iuuantia & lædētia. Si igitur ex qualibet istorum locorum vnum signum colligemus, componemus syndromen sufficientissimam, quæ nos illico docebit, an peccet vnus, vel alius humor.

Præcognitis humoribus corpus nostrum lædentibus. Sciendum istos peccare posse, vel plenitudine, vel qualitate: si plenitudine, secunda est vena: si qualitate alterandum, & deinde purgandum corpus.

Galenus in comm. sic definit purgationem, Purgatio est humorum, qui sua qualitate molestant. Vnde resultant duo affectus videlicet plenitudo præter naturam, & cacochymia. Plenitudo fit à sanguine ex Galeno lib. de plenit. cap. 2. cacochymia ab alijs humoribus.

Distinguitur sanguis ab alijs humoribus: quia solus sanguis ex Galeno lib. de atra bile cap. 2. extra corpus concreuit: quæ igitur euacuantur per venam sectam,



nisi conereſcant, non pertinet ad naturam ſanguinis; ſed, potius ad cacochymiam, ſi vitiat ſint humores: quia cacos ſignificat malum, chymos verò ſignificat ſucum.

Humores igitur diſtincti à ſanguine quinque modis vitari poſſunt.

Primo vel ob immoderatam agitationem; ſicuti quando ſunt turgent, de ratione quorum humorum turgentium eſt, quod moueantur à ſeiſis, & non ab aliqua facultate expultrice, vel attractrice.

Secundo vel quia ſint vitiat humores quando mouentur ad aliquam præcipuam corporis partem, vt ad cerebrum, iecur, vel ad alias partes, efficiuntque tumores, nempe eryſipelas, ædema, vel ſcirrhus.

Tertio vel quando mutant naturam, ſicuti dum putreſcunt, & corrumpuntur.

Quarto dum mutant ſpeciem, ſicuti dum bilis flaua fit vitellina: vel dum vitellina fit porracea, & porracea eruginofa, & ſic de alijs.

Quinto quando adaugetur quantitas, veluti quando bilis flaua præter naturam augetur.

Queritur, an ex ſanguine fieri poſſit cacochymia. Reſpondemus, quod ſanguis dū conſeruat propriam formam nullomodo efficere poſſit cacochymiam: ſed ſolum quando mutat formam.

Mutare poteſt ſanguis propriam formam his duobus modis, vel dum pars tenuior ſanguinis ob putredinem vertitur in bilem, & craſſior in melancholiam, vt docet Galenus 2. de diſſ. feb. 9. & 1. de criſibus 12. & Aſclepias prima primi. Vel mutat propriam formam, dum corrumpitur: corrumpitur verò duobus modis, vel dum humor in pus facceſcit, vel dum ob putredinem conuertitur in cinerem.


Diſtinguitur cacochymia: quia alia ſumitur à loco: alia ab affectu. A loco, vel eſt in venis, vel extra: vel in toto corpore, vel in vnica parte. Hinc Galenus lib. de curandi ratione per ſ. m. cap. 4. dicit cacochymiam vel eſſe vinuerſalē, nempe in toto, vel particularem, ideſt in aliqua parte, vt in iecore, liene vel alijs partibus.

Ab affectu ſumuntur differentiæ cacochymie, quia vel cacochymia eſt ſimplex,

vel mixta cum plenitudine: hæc mixta vel eſt vincente plenitudine, vel vincente cacochymia: ſi fiat vincente cacochymia dicitur cacochymia plethorica: ſi fiat vincente plenitudine dicitur plenitudo cacochymia: ſi verò æqualis ſit, dicitur cacochymia æqualis.

Notandum non ſolum plethoram tolli euacuatione; ſed etiam cacochymiam: Galenus enim lib. de ſimp. medic. cap. 5. habet, duos affectus poſtulare euacuationem, nempe cacochymiam, & plenitudinem: quam plenitudinem diſtinguit in vniuerſalem, & particularem: ſubdit iſtos affectus poſtulare euacuationem; ſed non protinus ſanguinis miſſionem: quia aliquando eſt purgandum, vt in cacochymia: at in pleuritide ſolum eſt phlebotomandum: ita ut Galenus non neget in cacochymia interdum eſſe venam ſecandam.

#### APHORISMVS TERTIVS.



**H**ABITVS Athletarum, qui ad ſummum bonitatis attingunt, periculoſi, ſi in extremo conſtiterint: neque enim poſſunt in eodem permanere, neque quieſcere. Cum verò non quieſcant, neque poſſint proficere in melius, reliquum eſt igitur, vt decidant in deterius. His de cauſis bonum habitum ſtatim ſoluere expedit, vt corpus rursus untriri incipiat. Neque compreſſiones ad extremum ducende: periculoſum enim. Sed qualis natura fuerit eius qui debet perferre, ad hoc ducere conuenit. Sic, & euacuationes, quæ ad extremum deducunt, periculoſæ, & rursus reſectiones, cum extrema fuerint, periculoſæ.



Omissis altercationibus, quæ sunt ab Expositoribus circa continuationem huius aphorismi cum superiori, quatuor faciemus. Primo paucis aphorismum cum superiori conectemus. Secundo sensum & diuisionem aphorismi proponemus. Tertio verba perpendemus, & ex illis nouum sensum, & nouam intelligentiam colligemus. Quarto quæstionem famosam circa aphorismum examinabimus, quæ est, à quo indicetur per se primo mis-  
si sanguinis.

Quo ad primum, continuatio hæc est: cum dixerit Hippocrates in prima parte superioris aphorismi, quod si purgatio, & euacuatio fiat qualiter oporteat, conferat, & ægi facile ferant: atque in secunda parte proposuerit quatuor fontes videlicet regionem, tempus, ætatē & morbos, ex quibus nos facile colligere possumus non solum qualiter, sed etiam qualium humorum, & quādo debeat esse optima euacuatio: merito agit in hoc aphorismo de quantitate euacuationis: quia cognita rei natura & qualitate essentiali, statum se ostendit consideratio quantitatis.

Infima dubitatio occurrit circa hæc continuationem: quia Galenus in comm. 23. aphorismi huius sect. inquit, Hippocratem in hoc 2. aphorismo egisse de indicatijs qualitatis euacuationis: de indicatijs vero quantitatis in illo 23. quare si ageret hic de quantitate euacuationis, Hippocrates esset superfluous.

Respondetur, Hippocratem in hoc 3. aphorismo agere de quantitate euacuationis, ut est euacuatio: in 23. vero de quantitate humorum euacuandorum, dum dicit, quæ euacuantur multitudine metiendā non sunt.

In hoc aphorismo agens de quantitate euacuationis, ut est euacuatio, duo facit: primo dat normam circa nimias euacuationes, & nimias repletiones.

Secundo ostendit, nimias euacuationes, & nimias repletiones esse fallaces.

Id probat argumento à minori, quod à Cicerone vocatur in Topicis à minoris comparatione, efficacissimum quidem, & æquū est: Vbi nimie repletiones, & nimie euacuationes sunt fallaces, & po-

riculosæ in Athletis, quorum corpora sunt robusta, quanto magis erunt fallaces, & periculosæ in debilibus & ægris: Probat Hippocrates antecedens, videlicet quod nimie repletiones in Athletis sint periculosæ: hoc modo: Athletæ non possunt in eodem statu permanere; neque in melius proficere, ergo reliquum est, ut in deterius decidant. Non possunt in eodem statu permanere: quia ex Galeno in comm. & lib. de bono corporis habitu in Athletis semper fit maior sanguinis augmentatio: ideo tandem erit necessarium, ut decidant in deterius: non enim potest semper fieri noua sanguinis additio, quia venæ non sūt infiniti sanguinis capaces: quare alterum de duobus necessario sequitur, vel, ut rumpantur venæ, vel ut calor à nimia sanguinis copia suffocetur. Neque poterant in eodem statu quiescere: quia, ut optime animaduertit Philotheus, facultates naturales nunquam quiescunt: ipsorum enim quies est mors.

Præterea non possunt in melius proficere, quia sunt in summo gradu bonitatis: talis enim erat illorum status, ut semper fieret maior sanguinis additio, quam resolutio: vnde ex necessitate sequebantur, vel rupturæ venarū, vel suffocationes, & mortes repentinae.

Cæterum, quomodo cognoscatur, quādo maior fiat additio sanguinis, quam euacuatio, vel maior fiat euacuatio, quam additio, vel an additio sit æqualis euacuationi, non omnes ita facile intelligunt: quo non intellecto nunquam cognoscemus qui sint Athletæ, qui temperati, qui ad tabem vergant: hæc sanè dignosci non possunt, nisi perpendamus ea, quæ eduntur ac bibuntur, & præterea excrementa sensibilia, & insensibilia, & præcipue insensibilia, quæ sunt maioris ponderis (ut nos probauimus in staticis experimentis) quam omnia excrementa sensibilia simul vnita. Quod vero pro tem necessaria cognitio requiratur ponderatio, Nos docet Galenus 6 de tuenda sanitate, non longe à principio, vbi habet hæc verba: Vbi quod corpore exhalat minus est ijs, quæ eduntur ac bibuntur, redundant morbi oriuntur: solent ergo prospici-



ciendum est, ut eorum quæ eduntur, & bibuntur respectu eorum quæ excernuntur, conueniens mediocritas seruetur: conueniens mediocritas seruabitur si in utrisque ponderabitur quantitas. Hæc sanè sine statica nostra sunt imperceptibilia.

Suffulta est statica tribus fundamentis: primum diffinitione medicinæ tradita ab Hippocrate lib. de stat. cap. 6. dum dicit, medicina est additio eorum quæ deficiunt, & ablatio eorum quæ excedunt. Secundum suffulta est experimentis staticis, quæ cursu multorum annorum obseruauimus, quæ adeo certa sunt, ut contineant certitudinem mathematicam. Tertium fundamentum artis staticæ colligitur ex Galeno 6. de tuen. sanit. cap. 6. citato, & ex alijs locis, ut fusius ostendimus in comm. nostris Auicennæ.

Diuiditur aphorismus in duas partes. In prima Hippocrates probat, habitum athleticum esse euacuandum, quia in eodem statu non potest permanere, nec in melius proficere. In secunda ubi dicit (neque compressiones) tradit tres causas, cur habitus Athleticus neque affatim, neque tardè sit soluendus: dicit enim *μη σπασθῆναι*, idest non cunctanter, idest per epictasim, idest per partem post partem, seu parum pro vice.

Prima causa, cur non affatim sit soluendus habitus Athleticus, est ne vasa ducantur ad subsidentiam: nimia enim subsidentia efficit syncopem: quia impedit transitum alimenti ad cor.

Quod verò ita sit, patet per ipsam prædictam, quia & remedia curatoria, quæ repellunt alimentum, & spiritus ad cor, sicuti est aqua frigida in faciem coniecta, iuuant syncopæ affectos, & remedia præseruatoria, quæ roborant cor, quæ impediunt, ne spiritus vaneant, cuiusmodi est puluis griseus cæsaridis ad vnciam semis superbibendo vini albi generosi vncias quatuor circiter: quod remedium in hoc proposito tenet primas.

Secunda causa, cur non statim sit habitus ex toto soluendus, est, quia omnes euacuationes extremæ sunt periculosæ: in extrema enim euacuatione euacuatur hu-

mor peccans, & non peccans: non enim totus sanguis peccat: nititur Hippocrates aphorismo 1. secundæ sectionis ubi dicit, omne nimium esse naturæ inimicum.

Tertia causa, cur non omnino sit soluendus habitus plethoricus, est, quia resolutiones extremæ sunt fallaces, tum quia natura debilitata ob nimiam euacuationem cibum non potest concoquere: tum quia non potest ob debilitatem concoctum cibum distribuere. Accedit quoque subsidentia quæ fit post nimiam euacuationem, quæ maximè impedit alimentum transitum ad cor, & ad alias partes. Hæc est diuissio, & sensus aphorismi.

Quo ad verba *ἐν τοῖσι γυμναστικαῖσι* idest in gymnastis, idest in exercitantibus. Galenus lib. ad Trasylb. cap. 41. dicit, illam esse artem gymnasticam, quæ agit de omni exercitio. Athletarum exercitium est minima artis gymnasticæ pars: quare Hippocrates non intelligit in hoc aphorismo de Athleticis, ut nonnulli putant: sed de gymnastis, qui amplectuntur omnia exercitia. Galenus tamen in hoc comm. & lib. ad Trasylb. cap. 3. & Philotheus antiquus Hippocratis interpres per gymnastas exponunt Athletas; quia Athleticæ sunt illi, qui habent has duas condiciones, de quibus Hippocrates mentionem facit: quarum prima est, quod tales gymnastæ ad summum bonitatis perueniant. Secunda quod istorum habitus sit fallax. Sed cur Hippocrates vsus est nomine generis idest in gymnasticis, & non dixit in Athleticis? ratio est, quia possunt inueniri gymnastæ, qui non sint Athletæ, qui habeant illas duas condiciones, nempe quod acquirant habitum summæ bonitatis, & habitus illorum sit fallax. Credimus tamen, Hippocratem præcipuè intellexisse de Athleticis, quia tunc magnus erat Athletarum numerus.

Athletæ nudi in Theatris ad luctam, & ad alias validas exercitationes se populo ostendebant. Hi se totos saginabant multis ac bonis alimentis, eo fine, ut multa caro generaretur, & corpus splendidum, speciosum, bene coloratum, & robustum redderetur: quamuis corpus factum speciosius, & coloratius, quam ante, ex Cel-



so lib. 2. cap. 2. indicet sanitatem suspectam conceptus verus & notata dignus, Hi omnino coitum fugiebant, eo fine, ut pulcherrimi, & fortissimi conseruarentur. Caterum in illis talis in dies fiebat sanguinis augmentatio, ut facillè inciderent aut in caloris suffocationem, aut venarum rupturam. Hoc hominum generis Galenus vocat miserum, vocatque Athletas quasi ἀθλίους, idest miseros.

Secunda dubitatio dixit εὐεξία ἐπ' ἀκρον idest boni habitus ad summum: non vpo in loco iste habitus Athleticus vocatur ab Hipp. bonus habitus ad summum: nihilominus bonus habitus ad summum est ille, qui consistit in quatuor humorum symetria, & optima partium commensuratione: sed sic est, quod in Athleticis neque quatuor humorum symetria, neque optima seruabatur commensuratio: non symetria, quia in ipsis tres humores non proportionabatur sanguini, sanguis enim debitam excedebat proportionem. Neque obseruabatur optima partium commensuratio, quia in ipsis pars carnosa debitam superabat proportionem: quare habitus athleticus non erat bonus ad summum: immo Athletæ ob vasorum plenitudinem facile incidebant in plenitudinem quo ad vires.

Galenus 2. de natura humana comm. 1. dicit, duas esse plenitudines, vnam quo ad vasa nimis repleta, aliam quo ad vires, quæ sit ab humorum corruptela, quæ ferme in opprimendis viribus tenet primum locum.

Præterea Plato 3. de Republica, Galenus in hoc comm. & lib. de const. artis dicunt, habitum athleticum neque ad actiones civiles, neque ad alias artes esse idoneum.

Responderetur, æuexiam idest bonam habitudinem aliam esse absolutè bonam, quæ inuenitur in corporibus quadratis, & sexpissimè (ut ait Galenus) in fossilibus: aliam vero esse euexiam cū hac additione Athleticam, quæ euexia est bona in suo genere, & non absolutè: sic dicimus, medicinam bonam, venenum bonum, & Ethiopem pulchrum: sic dicimus, habitum athleticum esse bonum in suo genere.

Tertia dubitatio oritur ex tex. Græco:

quia Hippocrates videtur incidere in manifestissimam tafologiam, idest in superfluum verborum repetitionem: quia dicit ἐπ' ἀκρον εὐεξία, idest bonæ habitudines ad summū: tamen statim subdit ἢ ἐν τῷ ἐσχάτῳ εὐεξία idest si extremo finit: sed sic est quod idem videtur esse bonæ habitudines ad summum, & bonæ in extremo. Sine intelligentia horum verborum Græcorum certe aphorismus intelligi non potest.

Respondemus differentiam esse inter ἐπ' ἀκρον & ἐν τῷ ἐσχάτῳ: quia quando ἐπ' constructur cum accusatiuo indicat motum, & rem esse in fieri, & in via, & formam adhuc non esse acquisitam. Præpositio vero ἐν cum articulo τῷ significat quietem, & rem definitam, & quæ iam deuenerit ad terminum ad quem, ultraquem terminum non datur alius terminus.

Quod verò præpositio ἐν cum articulo τῷ significet vltimum terminum, supra quem ascendendi non potest, confirmatur ex Aristotele 1. Celi tex. 100. vbi appellat Deū πάν τὰ πρῶτον cum articulo, idest illud ens omnino primum & τὸ ἀκροτάτον, idest, illud summum, supra quod nō dantur alia entia.

Ecce quod Hippocrates in aphorismo duo respicit, primo illos qui non possunt in eodem statu permanere: secundo illos qui ad melius non possunt proficere.

Qui sunt illi, qui non possunt in eodem statu permanere? sine dubio sunt illi qui habent plenitudinem ἐπ' ἀκρον, quæ plenitudo adhuc est in fieri.

Qui sunt illi, qui ad melius non possunt proficere? sunt qui habent plenitudinem ἐν τῷ ἐσχάτῳ, idest in vltimo termino. Hinc si diceremus euexia, idest bonæ habitudines peruenerunt ἐπ' ἀκρον, idest ad summum: ergo in melius nō possunt proficere, falsa esset consequentia: ratio est, quia inter plenitudinem quæ adhuc est in fieri, & plenitudinem, quæ est in vltimo termino non parua reperitur latitudo: Athletæ enim qui habebant plenitudinem: ἐπ' ἀκρον erant fortissimi, & robustissimi, & per multos annos in Theatris se exercebant: dum vero perueniebant ad illā plenitudinem, quæ erat ἐν τῷ ἐσχάτῳ idest in vltimo



ultimo termino, statim rumpebantur venæ, vel calor suffocabatur, & derepentē ex humanis decedebant.

Hinc si Hippocrates in aphorismo, non addidisset *ἐν τῷ ἐξῆς* eius argumentum fuisset vanissimū: quia plenitudo ad summum potest adhuc in melius proficere: sola enim plenitudo, quæ est *ἐν τῷ ἐξῆς* idest in extremo, & in ultimo termino plenitudinis non potest in melius proficere, & de hac intellexit Hippocrates.

Quarta dubitatio: Hippocrates in aphorismo videtur sibi contradicere: quia vocat habitum Athleticum, & ex alia parte dicit esse lubricum: non ne de ratione habitus ex Aristotele in prædicamento qualitatis est ut sit stabilis, & difficilis mutationis, & non lubricus?

Respondēt omnes ex Galeno lib. de alimentis, habitum Athleticum vocari dispositionem Athleticam, & non habitum: ita ut ab Hippocrate sumatur nomen habitus communiter, & non propriē.

Non est admittenda hæc responsio. Primò: quia dispositio nullo modo potest vocari habitus: habitus tamen potest vocari dispositio.

Deinde istæ distinctiones communiter & propriē, latomodo, & stricto modo non conveniunt in explicatione aphorismorum Hippocratis, qui propriissimè locutus est, qui neque articulum proposuit sine mysterio: istæ distinctiones tenera potius inferiunt ad fugam, & est eis potius logicorum, vel quorundam monachorum, quam conveniant doctrinæ aphoristicæ, & medicinæ, in qua agitur de viâ conservanda, vel recuperanda.

Respondemus igitur nos, habitum Athleticum, vel considerari, ut est habitus *ἐν τῷ ἐξῆς*, & sic est fallax & lubricus: quia Athletæ incipiunt amittere habitum. Quid significat lubricus habitus? significat habitum amissum, & conversum in dispositionem facilem, mobilem: vel consideratur habitus Athleticus, qui pervenerit ad summum, idest *ἐν τῷ ἐξῆς* & talis habitus in Athleticis erat stabilis, spatioque 10. annorum, & ultra perdurabat.

Restant duo de Athletis consideranda.

Primum in quot pericula habitus Athleticus, qui est *ἐν τῷ ἐξῆς* solitus erat prolabi: quia Hippocrates inquit, nimias repletiones esse periculosas. Secundum cur Athletæ, cum sint sanguine repleti, fameliscant & avidè comedant.

Quæstio 15. In quot pericula solent incidere Athletæ.

Quod ad primum ex Hippocrate 4. de ratione victus, Athletæ in quatuor pericula magni momenti incidere solebant: primum in venarum rupturam: Hippocrates enim 4. de ratione vict. & Galenus in hoc comm. & lib. de bono corporis habitu asserunt, habitum Athleticum incidere in rupturam venarum pulmonis, thoracis, vel iecoris. Oribasius hic loquens de Athletis habet hæc verba, in his, aut venæ disrumpuntur, aut arteriæ, aut spiritus vitalis, vel calor naturalis ex nimia constipatione extinguitur: sæpius in apoplexiam vidimus istos incidisse, & derepentē præfocatos defecisse.

Cur verò præcipuè venæ thoracis, pulmonis, vel iecoris rumpeantur ob nimiam repletionem: tres sunt rationes.

Quarum prima est, quia distæ venæ habent tunicas tenuiores.

Secunda quia citius, & magis impletur, quam alia.

Tertia ratio est, quia in illis venis est maior copia calidi innati, unde maiori quoque indigent euentatione: sed quia contingit, quod in continua euentatione venarum fibræ fiant magis tenues: ideo sunt magis obnoxie rupturæ.

Secundum periculum Athletæ est, quia facile cadunt in vasorum interceptiones: unde apnæa, aphonia, apoplexia, & mortes repentinæ sequuntur: causa vero horum accidentium est, quia spiritus vitalis ob maximum sanguinis plenitudinem non excurrit ad plexum mirabilem: unde cessat spirituum animalium generatio: unde apoplexia, & mors.

Quod vero ob sanguinis plenitudinem fieri possint apoplexiæ, & reliqua accidentia patet per ipsam præcticam, quia in ipsa accessione apoplexiæ à copia sanguinis



guinis, secta vena cubiti, apoplectici, ut vidimus, statim sanantur.

Ætius, & celsus secant venam in accessione apoplexiæ: immo Gentilis non solum in accessione apoplexiæ factæ à sanguinis copia, sed etiam in accessione vertiginis, si sanguis copia peccet, vult esse secandam venam. Veli igitur his agris, dum eorum medicus eligit post accessionem, sanguinem mittendum, quia in ipsa accessione sæpè moriuntur: interdum enim remittunt phlebotomandum in crastinum, & in accessione intereunt.

Postremo ipse Hippocrates 4. acutorum comm. 24. animadvertit propter venarum interceptiones quasdam fieri suffocationes ex sanguine: quo casu præcipit Hippocrates loco citato, venam in cubito dextro esse secandam. Valeant igitur, qui in accessione apoplexiæ vel apoplexiæ ex sanguinis copia non admittunt venæ sectionem.

Tertium periculum Athletarum est, dum incidunt in suffocationes, quia calor innatus suffocat eo modo, quo lucerna ab olei nimietate, & quo flamma in cucurbita, quæ quanto maior est, eo citius extinguitur. Parimodo sanguis, quo copiosior est, eo citius calorem suffocat, & suffocando cor, iecur, & cerebrum refrigerat.

Quod probatur ex Galeno, & ex ipsa practica: ex Galeno 4. de ratione vie. comm. 23. ubi ait, dum præ nimia multitudine sanguinis calor suffocatur, sunt apoplexiæ, syncopes cardiacæ, & aqua inter cutem: idque sæpè accidit ob menses, vel hemorrhoidas suppressas.

Probatur ex ipsa practica: quia remedia auferentia dictos affectus post factam euacuationem sunt calida. Hinc pro hac apoplexiâ iuuant peonia, grana paradisi, quæ calida sunt: ipsum vero cranium à quadam proprietate iuuare videtur: pro hac syncope post euacuationem iuuant oleum de corticibus citri, & lignum sassafras: Pro hydropse aqua centauri maioris, quæ videtur habere primas.

Quartum periculum est, dum Athletæ incidunt in torius massæ sanguineæ putrefactionem ob prohibitam perspirationem factam à sanguinis multitudine: quo

casu ob duas plenitudines lateratur corpus, nempe plenitudine quoad vasa, & plenitudine quoad vires; quæ distinctio est Galeni lib. de plenit. cap. 3. & 2. de natura humana comm. 1. & alibi.

Plenitudo quoad vasa est respectu vasorum: hæcque facillè intelligitur.

Plenitudo quoad vires non supponit humorum multitudinem, sed humorum corruptellam, & cacochymiam, quæ plenitudo dicitur quoad vires, quia vires ferre non possunt illos prauos humores, licet essent in pauca quantitate: ab istis viribus corpus persequitur maxime onerosum, & maxime plenum: ideo dicuntur pleni quoad vires, seu respectu virium. De hac plenitudine Hippocrates in hoc aphorismo non intellexit, sed de illa quoad vasa.

QVÆST. 16. Cur Athletæ famescant, & auidè comedant.

**Q**uo ad secundum nempe, cur Athletæ, quorum venæ sunt sanguine refertissimæ, famescant, & auidè comedant: Pro intelligentiā sciendum ex Galeno 1. de symp. causis cap. 7. ad excitandam famem naturalem quinque conspirare accidentia.

Quorum primum est priuatio alimentorum partium existentium sub cutē: loquens ibidem Galenus de hoc primo accidente habet hanc sententiam, Vnumquodque animal in ambietem aerem digeritur per insensibilem perspirationem, quæ euacuatio, ut ostendimus in statica nostra, solet esse longè plenior, quam omnes euacuationes sensibiles simul vnitæ.

Secundum accidens pro excitanda fame est suctus siue tractus: quia membra, quæ cuti substernuntur alimento priuata trahunt illud à vicinis venis, & hæc ab alijs quadam continuatione, donec tractio perueniat ad ventriculi orificium, quod est vltimum.

Inde statim oritur tertium accidens, quod est quadam oris ventriculi diuulsiō.

Quartum ex diuulsiōe sensus oris ventriculi suboritur, merito nervorum ambientium os, qui procedunt à sexto pari nervorum cerebri.



Inde statim oritur quintum accidens, idest appetitus qui fit in cerebro: si enim mens agrotaret, animal non famesceret: nec doleret, licet alia quatuor adessent accidentia.

In fame vero morboſa, ſicuti in boulimo, idest in fame bouina, & in fame canina non ſeruatur iſte ordo: in boulimo omnes partes corporis ſunt priuata alimento, trahunt à vicinis, & diuellunt os ventriculi: tamen deficit ſenſus oris ventriculi, vel ob refrigerationem, vel ob ſemi paralyſim.

In fame canina è contra fit: quia ibi nulla eſt priuatio alimenti, nullus ſuctus: ſed propter humorem frigidum, & acidum, & propter ſenſum exquisitiſſimum neruorum ambientium ſtomachum: fames inſignis excitatur: ideo eleganter dicunt medici in boulimo eſſe famem ſine appetitu: in fame verò canina eſſe appetitum ſine fame.

His ſuppoſitis querendum eſt, quæ ratione Athleta fameſcant, & auidè comedant, cum ſint alimento reſertiſſimi, quod ſua præſentia ceſſare facit ſuctum, diuulſionem, & reliqua accidentia famem efficiantia iam ſuperius propoſita.

Reſponder Breſaulus in Athletis non fieri famem ratione iſtorum accidentium: ſed ratione melancholiæ à ſplene tranſmiſſæ ad ventriculum: citat Auicennam dicentem in prima primi melancholiam excitare famem, ſed eſto melancholiam habere hunc uſum, non propterea arbitramur hanc eſſe dubij ſolutionem. Deinde dicemus, appetitum Athletarum eſſe naturalem, & non caninum, & Athletas non eſſe melancholicos.

Leonardus Fuchſius reprehendit Auicennam dicendo non inueniri in Galeno quod dicat, melancholiã excitare famem.

Fallitur quia, & Oddus, & Valeſſius colligit ex Galeno melancholiam naturalem excitare famem: primo enim de ſymp. cauſis cap. 7. habet hæc verba, „ Immoderatio ſucci frigidi excitat famem vitioſam: inferunt ex his verbis, ergo moderatio ſucci frigidi excitabit famem naturalem: addunt, ſed melancholia naturalis eſt ſuccus frigidus.

Præterea addimus nos alium Galeni locum clariorem lib. videlicet de plenit. cap. 11. vbi habet hanc ſententiam, „ Quando lien ob imbecillitatem non attrahit humorem melancholicum, ille per vomitum interdum expellitur: addit: nonnulli ob hanc euacuationem ſuppreſſam mæſtitia melancholica vexantur: nonnulli cibos auidiſſimè concupiſcunt, idque præcipuè ſi excrementa melancholica ſint valde acida. Ex hoc loco colligimus melancholiam ſecundum Galenum habere uſum excitandi appetitum.

Poſtremò Galenus ſ. de V. P. cap. 4. loquens de melancholia naturali dicit, habere hunc uſum, vt promoueat actionem ventriculi, & valde iuuat actionem: addimus, ſed ſic eſt quod inter actiones ventriculi eſt etiam appetitus, ergo per ipſum Galenum melancholia excitabit famem.

Demum patet per ipſam practicam, melancholiam excitare appetitum: ſiquidem illa quæ ſolèt excitare famem ad tria capita reducantur, videlicet ad ea quæ ſopitum excitant appetitum, vt ſunt acida, agreſta, aliũ, ſynapi, diaſynapi, ſalita, naſturtium, & quæ ex his componuntur: vel ad ea, quæ roborant, vt ſunt vinum abſynthite, piper garyophylli: vel ad ea, quæ cogunt in arctum os ventriculi, vt ſunt adſtringentia, & aqua frigida, vt docet Hippocrates 4. in ſextum epid. tex. 20. vbi dicit, „ Aqua vorax: tunc ſic, ſed ſic eſt, quod melancholia eſt acida, & vt acida ſopitum excitat appetitum, vt aſtringens roborat, & cogit in arctum: & vt frigida reddit homines voraces.

Sed quid quid ſit de his, quæ excitant famem naturalem conſtanter aſſerimus in Athletis, appetitum eſſe naturalem, & non vitioſum à melancholia videlicet: ideo dicimus, dubium propoſitum de Athletis adhuc eſſe in ſuo robore: quia & appetitus illorum erat naturalis, & in ipſis nullus erat alimenti defectus.

Maſſilius inquit Athletas habuiſſe appetitum voluptuoſum, qui ſequitur ciborum recordationem.

Neque rectè ſanè reſponder: quia requiritur cauſa excitans ipſam recordationem, qua deficiente recordatio ciborum



potius nauseam, quam appetitum mouet.

Alteratio verò istorum est veluti cecorum pugna: non enim intellexerunt vim verborum graecorum aphorismi. Nos igitur respondemus, Athletas esse posse in duplici statu, vel *ἐν τῷ ἰσχυρῷ* vel solum peruenisse *ἐπ' ἀνδρῶν*: qua posita distinctione dicemus Athletas *ἐν τῷ ἰσχυρῷ* non famescere: sed solum illos, qui petuenerunt *ἐπ' ἀνδρῶν* qui sunt fortissimi: suntque calidi & humidi, vt sues: quo fit vt in ipsis validissimè omnia coquantur, & inde valde famescant.

Non parua enim est latitudo inter *ἐπ' ἀνδρῶν* & *ἐν τῷ ἰσχυρῷ*: quia illi qui perueniunt ad *ἐπ' ἀνδρῶν* adhuc sunt in motu: illi verò qui sunt *ἐν τῷ ἰσχυρῷ* incipiunt esse in quiete: quare nisi illic euacuentur, omnino quiescunt idest moriuntur: quia dum anima vegetatiua, seu distributio alimenti & nutritio quiescit, animal detrepente moritur: hæc enim anima semper est in actu secundo, quo ablato cessat eius esse.

Hinc rectè asserit Philotheus, animæ vegetatiuæ quietem mortem esse: animæ tamen sensitiuæ quietem esse ipsam vitam: quia facultates animales per somnum & quietem roborantur. Hinc Galenus 4. de V.P. non sine ratione assimilauit animam vegetatiuam beluæ, quæ sine cognitione operatur, sed semper operatur.

Neque est dicendum, vt quidam dicunt, distributionem alimentum in Athletis cessare, quia mēbra nō possunt extendi: si quidem est, quod non possent amplius extendi; dicimus quod nutritio, & alimenti distributio perseverare potest, dum modo ita conseruetur insensibilis perspiratio, vt proportionetur additioni: dum verò non proportionatur, & membra amplius non possunt extendi, ex necessitate vel calor natiuus ab alimento suffocatur, vel ab ipso vena rumpuntur, & sequitur mors.

Dicimus igitur, vt redeamus vnde digressi sumus, quod de ratione famis naturalis sit defectus alimenti: quando verò Athletæ sunt in extremo plenitudinis, licet in eorum ventriculo essent decem libras melancholiam dicimus, stomachum tunc non posse cogi in arctum: & nisi præce-

dat suetus, appetitum naturalem fieri nullo modo posse.

*Neque compressiones ad extremum ducenda; idest, non esse euacuandum vsque ad *ἐκφυγίστας*.*

Leoniceus per symptosias interpretatur compressiones. Quæ interpretatio est aliena, & à Græcæ dictione, & à veris medicinæ fundamentis. A Græcæ dictione, quia *ἐκφυγίστας* est à verbo Græco *συμπίπτω* quod significat conficere, vel subideo, & non comprimo.

Interpretatio quoque Leoniceus est aliena à veris medicinæ fundamentis: quia symptosia est quædam species angustia, quæ dicitur subsidencia, & non compressio.

Angustia verò ex Galeno lib. de diff. morborum & alibi sub se continet sex species, nempe obstructionem, compressionem, subsidenciam, coalescentiam, oclusionem, (quæ non ab humoribus, sed à re solida fit), & constipationem, quæ ex Galeno 2. in primum epid. 7. est angustia meatuum insensibilium, atque ex Galeno 1. meth. 4. fit à frigore externo, & vocatur densitas (vt air) meatuum insensibilium: stipatio dicitur *ἀπὸ τῆ σίγης* quod significat condensare; ideo dum meatus insensibiles occluduntur dicuntur constipati; compressio ergo differt à subsidencia: quia compressio fieri solet à tumore, & interdum à nimia pinguedine comprimente.

Subsidencia verò ab his causis nullomodo fieri potest: sed fit, dum vasa subsident, & flaccescunt: subsident vero ex Galeno 3. de symp. causis secundo, vel quia contrahuntur ora vasorum propter atrophiam, vel contrahuntur propter refrigerationem, vel propter molliem, vt accidit in crumena ære vacua.

Præterea probatur per ipsam practicam, compressionem differe à subsidencia: quia remedia quæ iuuant pro auferenda compressione, non iuuant, sed potius nocent pro auferenda subsidencia. Exempli causa chalybs preparatus in lienis tumoribus comprimētibus meatus ipsius lienis valde iuuat: habet tamen vim adstringendi, vt obseruatur in alui fluxibus, & vt adstringens tollit fluxiones;

F. qui-



quibus ademptis facillè humor fluxus assumitur. Hinc Galenus 11. meth. 16. animaduertit in remedijs pro auferendis tumoribus splenis esse permiscenda astringentia, vt auferatur fluxionis occasio: quæ adempta, quod reliquum est facillè resoluitur: Hoc remedium astringens certè non sanat subfidentiam, sed potius prohiberet, ne vasa iterum impleantur: quare maxima, & notabilis differentia est inter compressionem, & subfidentiam.

*Periculosum enim*: supple euacuare vsque ad omnimodam subfidentiam: quia omnimoda subfidentia aditum alimenti ad cor intercludit, vnde syncope, & apoplexia. Hinc Galenus 12. meth. cap. 1. reprehendit medicum quemdam quinquagenarium dolore capitis insigniter affectum, qui sibi ipsi venam incidens vsque ad subfidentiam, viribus non valentibus, dolore sanatur: sed impofterum mansit decolor & imbecillis, inciditque in quamdam atrophiam, vt vix ad pristinum statum rediret.

Ideo subdit Hippocrates esse euacuandum *Quatenus natura fert*: Galenus per naturam 12. meth. 1. & lib. de curandi ratione per s.m. cap. 12. interpretatur virtutem vitalem; quæ ex ipsis pulsibus præcipuè dignoscitur.

Sexta dubitatio exoritur, quia quando Hippocrates inquit, esse euacuandum quatenus natura fert, videtur desumere quantitatem euacuationis à viribus: quod relictatur principijs meth. medendi: idque probatur hoc argumento. Quod non potest indicare genus auxilij euacuatorij, non potest indicare quantitatem, vel qualitatem auxilij: sed virtus non potest indicare genus auxilij: ergo non indicabit quantitatem, vel qualitatem auxilij: Maior est Galeni lib. de opt. sec. cap. 45. vbi probat contra methodicos, quod tempus morbi non potest indicare quantitatem vel qualitatem auxilij: quia tempus non potest indicare genus auxilij. Similiter robur non indicat genus auxilij euacuatorij, ergo nec quantitatem auxilij indicabit: sic genus euacuationis indicabitur à genere repletionis, & species euacuationis à specie repletionis, & quantitas, &

qualitas euacuationis indicabitur à quantitate, & qualitate repletionis: minor est clarissima: quia si robur indicaret euacuationem, vt dicit Galenus lib. de opt. sect. 42. & in hoc loco, idem indicaret quoque in sanis.

Respondemus cum Galeno lib. de opt. sect. cap. 12. robur non indicare remedium, sed contraindicare, idest permittere quod est vitile, definiens enim contraindicans dicit esse illud quod indicat vitile permittendo. Hinc Galenus 9. meth. cap. 12. & 13. & lib. de curandi ratione per sang. mis. 14. inquit tantum esse euacuandum quantum vires permittunt, & non quantum indicant, quia nihil indicat.

Hinc quoque Galenus 7. meth. 6. vbi loquitur de intemperie sicca ventriculi, dicit, hanc intemperiem semper esse iunctam cum virtute debili: ideo non permittere cibaria valde reficientia.

Septima dubitatio: Hippocrates 2. de ratione vic. tex. 10. videtur desumere quantitatem euacuationis à coloris mutatione: ergo non à natura: ergo Hippocrates non debet dicere quatenus natura fert: loco citato Hippocrates dicit, dum color sanguinis mutatur ad bonum, & rubrum colorem, signum est totum malum sanguinem esse euacuatum: sistendamque tunc esse euacuationem.

Responderetur, colorem esse tamquam signum, & non tamquam indicans ipsam phlebotomiam. Præterea signum indicatis sanguinis euacuari, & non euacuandi, est signum fallax: quia aliquando in magnis febribus sanguis qui euacuatur floridus est, & talis vt copiosè euacuatus auferre potest ipsam febrem. Quare in omni euacuatione & refectione meta quantitatis est desumenda à viribus, non quatenus sunt indicantes: sed quatenus sunt permittentes: Quodnam vero sit illud quod venæ sectionem indicat, paulo infra declarabitur.

Concludit Hippocrates in fine aphorismi extremas inanitiones, & extremas repletiones esse periculosas. Primo hæc sententia confirmatur ab Hippocrate aphorismo 31. 2. sec. vbi dicit, Plurimum atque repente euacuare, replere, ca-



lesacere, refrigerare, vel quomodolibet corpus mouere, periculosum: quia omnem nimium est naturæ inimicum. Omne nimium est naturæ inimicum: quia bona ipsius naturæ consistunt in symetria, & quod est nimium symetriad tollit, ut in comm. præcipit Galenus.

Hinc medici officium est moderari, & non vincere, Hinc valeant spagirici, qui remedijs validissimis tēant vincere, vincendo enim tollunt symetriad, & sæpē miseros ægrotantes ad necem vsque conducunt. Quare optime Hippocrates & summa cum ratione concludit, in nimias euacuationes non solum esse fallaces, sed etiam periculosas.

Præterea si non licet repente totam aquam hydropicorum per paracentesim euacuare, quanto minus licebit extremam sanguinis euacuationem facere?

Similiter si non licet totum pus alicuius magni abscessus euacuare, quod pus est toto genere præter naturam, quanto minus licebit sanguinem, qui est viæ thesaurus, copiosissimè euacuare: nimia enim vacuitas, & immodica purgatio vel in rabem, vel in animi deliquia deducunt.

Causa vero cur euacuando totum pus alicuius abscessus, & totam aquam hydropicorum agri moriantur à Galeno 6. aphorismorum comm. 27. declaratur his ferè verbis „ Aperiantur ora arteriarum, & simul cum pure, vel aqua exhalant spiritus vitales magno cum naturæ incommodo. Collige multo magis ipsos spiritus in sanguinis copiosi euacuatione, ob consensum venarum & arteriarum euacuari, & exhalare: Cur verò liceat aliquando ex Hippocrate, aphorismo 23. huius sec. euacuare vsque ad animi deliquium infra declarabitur.

Octaua dubitatio: inquit Hippocrates & Galenus extremas euacuationes esse periculosas: attamen aphorismo 23. huius sec. laudat euacuationem vsque ad animi deliquium: Galenus quoque in comm. asserit, in calidissimis febribus, & in maximis inflammationibus, & vehementissimis doloribus euacuationem sanguinis vsque ad animi deliquium continere.

Respondet Bressanulus, Hippocratem

& Galenum laudasse euacuationem sanguinis vsque ad animi deliquium exclusiue, & non inclusiue.

Fallitur: quia Galenus 1. aphor. 13. 9. meth. 4. & lib. de curandi ratione per sang. miss. iubet esse euacuandum sanguinem vsque ad animi deliquium inclusiue: ibidem enim describit animi linquentis accidentia: Similiter 9. meth. 4. citato proponit beneficia, quæ febricitantes colligunt ex animi deliquio: habetque hæc verba „ Celerimè ex animi deliquio refrigeratur totum corpus febricitantis: nemo inuenire potest ipsis ægris, & naturæ iucundius, & vtilius remedium isto. Deinde subdit, superuenit alui deiectio, aliquando bilis vomitio, sudores, & maiores totius corporis: sed sic est quod istæ sunt conditiones lipothymia, idest animi deliquij inclusiue & non exclusiue.

Respondemus nos ad dubium: quando dixit Hippocrates, extremas euacuationes esse periculosas, non intellexisse de corporibus quadratis, & absolutè robustis, sed de Athletis, quorum corpora non erant absolutè boni habitus, quia sanguis superabat aliorum humorum proportionem: virtus vitalis reuera solum in illis hominibus est robusta, in quibus reperitur quatuor humorum symetria, & optima partium commensuratio, quæ omnia in Athletis deficiebant: pars enim sanguinea, & pars carnosæ superabant aliorum humorum & aliarum partium proportionem.

Vel respondemus: in hoc aphorismo per extremas euacuationes intelligere illas, quæ deueniunt ad omnimodam vasorum subsidentiam, vnde ut plurimum syncopes, & mortes repentinæ sequuntur: in aphorismo verò 23. Hippocrates & Galenus in comm. intelligunt de euacuatione vsque ad lipothymiam, sed non vsque ad syncopem: de qua euacuatione intelligit in hoc aphorismo.

Maxima enim est differentia inter syncopem, & lipothymiam, ut colligitur ex 12. meth. cap. 12. vbi definit syncopem, quod sit præceptum omnium virium lapsus: lipothymia verò est casus virium, sed non omnium, pulsus enim non amittuntur, ne-



que sensus omnino auferuntur: à syncope nunquam natura colligit aliquid beneficium, à lypothimia verò quamplurima.

Vel respondemus Hippocratem dicere in aphorismo, quod extrema euacuationes sint *σφαλλεῖς*, idest fallaces, idest quod aliquando sint malæ, & aliquando bonæ: dum verò Hippocrates vult intelligere aliquid esse periculosum, non dicit *σφαλλεῖς* sed *επικλινόντες*: maxima est differentia inter fallax, & periculosum, ut dictum est in primo aphorismo.

Postremo Hippocrates colligit in fine aphorismi, repletiones nimias esse quæque periculosas, quod probatum est superius, quia omne nimium est naturæ inimicum. Idem confirmatur ex Hippocrate 2. acutorum tex. 3. vbi habentur hæc verba, „Efficax argumentum est, quod maxime mutationes eorum, quæ circa naturam & habitum nostrum contingunt, maxime morbos pariant: quare, & maximæ euacuationes, & maximæ repletiones erunt fugiendæ.

*QUEST. 17. Quodnam sit illud quod indicat primo, & per se venæ sectionem.*

**Q**ueritur in fine istius aphorismi, quodnam sit illud indicans, quod primo & per se indicet venæ sectionem.

Dum dixit Hippocrates in Athletis eo usque esse euacuandum, donec natura fert proposuit permittens videlicet virtutem vitalem validam, quæ sola permittit validam sanguinis euacuationem, sicuti mediocri mediocrem, & debili debilem: quod distinctè docet Galenus 9. meth. cap. 12. & 13. idem affirmat lib. de cur. ratione per sang. miss. cap. 14. Parimodo Galenus 7. meth. cap. 6. loquens de rescipientibus inquit, interperiem siccam, quæ semper iuncta est cum virtute debili, permittere debilia rescientia: quia virtus valida indicat valida rescientia, mediocri mediocria, & debili debilia.

Hic notatur error medicorum triuialium, qui in agris debilibus solent confugere ad rescientia valida, nempe ad contusa caponis, & alia id genus: quibus potius de ac veneno ipsos ægros iugulant: nec

viderunt Hippocratem & Galenum 2. de ratione vic. tex. com. 48. dicentes „Qui sunt debiles ob inanitionem vasorum egent alimento: qui verò sunt debiles ob morbi vehementiam, vel dolores prægressos non egent alimento, sed potius euacuatione.

Nec legerunt Galenum 1. aphorismorum comm. 17. dicentem „Si vires sint debiles ob morbum, & non ob alimenti defectum parum, & sæpè alendum.

Quod vero vires debiles à valido alimento lædantur confirmat Galenus 7. meth. cap. 6. loquens de vino pro debilibus. ait vinum generosum lædere vires debiles: quia sicuti virtus valida postulat valida rescientia, sic debilis solum debilia permittit.

Hic obiter damnantur plurimi medici, qui vires ægrotorum valde debiles maluatice rescipi posse arbitrantur. Hactenus de permittente.

Caterum, quia Hippocrates nihil dixit de indicante venæ sec. sed solum aliquid dixit de permittente: merito ab Expositoribus in hoc loco tractatur, quodnam sit illud indicans, quod primo & per se indicet sanguinis euacuationem. Nos igitur paucis aliorum opinionibus explicabimus, easque ex vna parte confurabimus: ex alia spero fore quod ex omnibus opinionibus aliquem fructum colligamus: quia ex illis intelligemus requisita inseruientia profacienda sanguinis euacuatione. Demum nostram opinionem subnectemus.

Prima est opinio communis: defenditurque à Massaria lib. de scopis, mittendi sanguinem, & à multis alijs ante, illum, quod videlicet indicans proprium, & adæquatum sit magnitudo morbi.

Primum fundamentum pro hac opinione desumitur ab Hippocrate 4. de ratione vic. in ac. tex. 19. vbi protulit hanc sententiam „In acutis morbis sanguinem detrahes, si vehemens morbus videatur, ætasque floruerit, & virium robur adfuerit. Miratur Galenus in comm. & 7. meth. 7. cur Hippocrates non collocauerit hanc sententiam in aphorismorum numero, quia paucis verbis continet magnam vim.

Secundum fundamentum pro hac opinione



nione desumunt à Galeno 4. meth. 6. vbi dicit, quod magnitudo morbi aut præsens aut imminens, atas florens, ac virium robur indicent venæ sectionem.

Quid verò intelligat Hippocrates per morbum magnum explicat Galenus 4. meth. 6. dicens, morbum magnum summi tripliciter.

Primò dicitur morbus magnus ob afflictæ partis præstantiam, veluti dum cor, iecur, cerebrum, & alia viscera principalia afflicta sunt, quæ licet leui affectu vexentur, affectus dicitur magnus, quo casu sanguis mittendus est.

Secundò dicitur magnus morbus ob caecoethiam, id est ob malum morem, sicuti sunt febres malignæ: itaut si esset hæc malignitas in paruo ulcere, aut vulnere, morbus esset vocandus magnus, & sanguis esset mittendus.

Tertiò dicitur morbus magnus ob magnitudinem affectus, sicuti sunt magna apostemata, magna ulcera, & magna vulnera, licet occupent partes ignobiles, & à visceribus distantes.

Præterea datur quoque morbus magnus ratione dignitatis, de quo nihil dixit Galenus loco citato: sicuti dum passio ysterica sit à semine corrupto, dicitur magnus ratione dignitatis, vt animaduertit Galenus lib. 6. de loc. af. cap. 5. ad differentiam passionis ystericæ, quæ à menstruo corrupto sit, quæ non est magna ratione dignitatis.

Quintò datur morbus magnus ratione imbecillitatis virtutis non valentis vincere morbum, licet ex se morbus non sit magnus: de hac magnitudine locutus est Galenus lib. de totius morbi temporibus cap. 4. itaut morbus magnus sumatur quinque modis. Tres sunt explicati à Galeno 4. meth. 6. quartus verò morbus magnus explicatur à Galeno 6. de loc. aff. 5. Quintus morbus magnus libro de totius morbi temporibus cap. 4.

Hic notatur Argerij error, dum putat, Hippocratem per morbum magnum solum intellexisse morbos acutos.

Recedit à Galeni doctrina: atque experientia aduersatur: recedit à Galeno quia à aphorismorum comm. 47. explicans

aphorismum Hippocratis, qui est „ Quibus venæ sectio prodest, his verè venæ secanda: mentionem facit de arthritide, cui morbo sæpè prodest venæ sectio, sed sic est, quod arthritis est morbus chronicus, & non acutus.

Aduersatur experientia, quia venæ sectio iuuat in quartanis, in desillationibus, & alijs morbis longis: quare per morbum magnum qui indicare potest venæ sectionem non intellexit solum morbos acutos.

Opinio cõmunis, quod morbus magnus cum viriū robore indicet venæ sectionem, nõ potest omnino infringi, quamuis reuera sit aliena à questione: quia questio est, quodnam sit proprium & adæquatum indicans venæ sectionem.

Nos admittimus, magnitudinem morbi cum viriū robore semper indicare venæ sectionem: sed negamus, quod venæ sectio primo & per se à morbo magno semper indicetur: quia multa sunt in phlebotomia, quæ non sunt remedia morbi magni, sicuti præbere motum sanguini, dum quiesce peccat, eo tempore, quo nullus imminet morbus magnus. Pari modo, dum volumus auferre faciei serpiginem, quando nullus morbus magnus imminet. Similiter per phlebotomiam auferuntur faciei maculæ, quæ vocantur basia mortuorum vel faciei rubor intus, quæ pertinent ad decorationem, & non ad morbum magnum.

Audio in Galia, feminas pallidas existimari pulchriores: ibi vt fiant palidæ, iubent ipsæ, vt illis mittatur sanguis: quare multa facit phlebotomia, quæ à morbo magno non indicantur: concedimus igitur valere hanc: est morbus magnus cum viriū robore, ergo sanguis mittendus: negamus tamen valere vice versa, nempe sanguis est mittendus: ergo est morbus magnus.

Hæc igitur communis opinio rejicitur à Trincanello, qui fuit ante Massarium & à multis alijs. Nos verò illam his quatuor argumentis efficacissimis explodimus.

Primum argumentum est tale. Morbus magnus per se indicat magnum remedium, sed non e contra magna remedia, sed



magnum remedium curatorium, & non præseruatorium.

Præterea esto, quod morbus magnus indicet magnum remedium absolute, quid tum? Non ne magnum remedium æquè dicitur de purgatione, de venæ sectione, de vesicantibus, de vñionibus, & de multis alijs? ergo morbus magnus neque indicabit per se primo venæ sectionem, neque remedia, quæ in ipsa venæ sectione continentur.

Insuper, si quis diceret est, morbus magnus, ergo sanguis est mittendus, efficeret argumentum à genere ad speciem, vitiosum quidem, quia faceret transitum à positione consequentis non conuertibilis ad positionem antecedentis, procederetque ex medio termino communiori, quam sit quæsitum, seu prædicatum conclusionis, quod in humana ratiocinatione non habet locum.

Demum morbus magnus indicat remedium magnum curatorium, & non præseruatorium: venæ sectio est remedium præseruatorium, quia tollit causam.

Secundum argumentum: si morbus magnus indicaret per se primo venæ sectionem, sequeretur quod vnum vt vnum indicaret duo, idest quod magnus morbus indicaret magnum remedium, & sanguinis missionem, quod quidem reluctatur rationi, Galeno & Aristoteli.

Rationi, quia vnum contrarium vni tantum aduersatur.

Galeno, quia 11. meth. cap. 13. inquit: vnum vt vnum indicare vnum, & nō plura: Immo suffultus hoc principio composuit totam medendi methodum: ac qui illud destrueret, destrueret methodum seu totam medicinam therapeuticam: quæ nititur hoc principio, quod contraria contrarijs curentur: hac lege, quia vnum contrarium vni aduersatur, & non pluribus.

Aristoteli quoque reluctatur, qui nixus hoc principio, quod vnum vni aduersatur, inuenit Cælum esse quintam essentiam, vt colligitur ex tex. 10. primi de Cælo, vbi inquit, si motus circularis conueniret per se, & propriè igni, sequeretur, quod duo vni aduersarentur, idest quod motus circularis ignis, & motus rectus

fursum aduersarentur motui recto graduum deorsum: inde concludit motum circularē per se primo conuenire Cælo: addit, cum motus immediatè proueniat à natura rei intrinseca, motusque circularis sit natura & specie diuersus à motu recto, infert Aristoteles, ergo natura Cæli erit quoque diuersa secundum essentiam à quatuor elementis: ideo dabitur quinta essentia. Ecce igitur quod qui negaret hoc principium, quod vnum tantum vni aduersetur destrueret quintam essentiam, & per consequens totam fabricam librorum de Cælo.

Tertium argumentum desumptum est à Galeno 9. meth. cap. 14. vbi dicit in diuisione indicantium, & indicatorum non esse transeundum de genere morborum in genus causarum: addimus, sed qui dicunt morbum magnū indicare missionem sanguinis transeunt de genere morborum in genus causarum, quod est vitium norferendum: missio enim sanguinis respici causam, quæ genere differt à morbo, licet morbus calidus indicat remedium curatorium, & non præseruatorium; remedia enim curatoria desumuntur à morbo, præseruatoria vero à causa.

Ecce igitur quod remedia sunt perquirenda in eodem genere: quia contrarium vnius generis non potest esse contrarium alterius: hac ratione contrarium primoribus calidis inuenitur in genere primarum qualitatum: contrarium saporis falso inuenitur in genere saporum, & non in genere primarum qualitatum: contrarium nigredini inuenitur solum in genere colorum: quia genera sunt impermiscibili. Immo etiam illorum differentia subalternæ. Hinc Aristoteles 2. Post. text. 19. vbi in perquirendo quod quid est faciendum esse diuisionem in eodem genere, diuidendo per contrarias differentias vsque ad propriissimas.

Quartum argumentum, morbus magnus est differentia subalterna: missio sanguinis est quoddam aggregatum differentiarum specificarum: sed sic est, quod ex Galeno 1. ad Glauc. cap. 1. in remedijs inueniendis, & in affectibus præter naturam procedendum est à generalissimis differentijs ad subalternas, ac deinde à subalternis



ternis ad specificas: quia illi qui persistunt in subalternis, neutiquam sciunt mederi.

Præterea committitur erratum circa vniuersale attribuendo superiori quod conuenire debet inferiori, & specifico. Hinc qui dicunt, morbus est calidus, ergo frigiditas lactuæ iuuabit, peccant: non enim valet, quia calidum adhuc subdividitur in quatuor gradus; ideo Galenus 7. meth. vult. habet: remedium tantum esse, quantus est recessus à statu naturali: quia si esset maius introduceret contrarium morbum: si vero minus non sufficeret. Hinc tertio de simp. medicina cap. 12. habet hæc verba „ si remedium est plus statim nocebit: si vero minus iuuabit quidem, non tamen sanabit: quare debet esse æquale.

His argumētis infringitur opinio multorum, qui torrente opinionis communis abrepti in hanc sententiam lapsi sunt.

Nos enim fatemur, morbum magnum cum virium robore semper indicare venæ sectionem, sed non primo, & per se, seu conuertibiliter, & adæquatè, quia iam ostensum est fieri posse venæ sectionem quando morbus magnus neque est præsens, neque imminens.

Secunda opinio est Trincavelli, Salusitani. & multorum dicentium plenitudinem, quæ excitat, vel excitare potest morbum magnum primo & per se indicare venæ sectionem. Cōfirmās suam sententiā ratione, & auctoritate: ratione, quia plenitudo est contraria euacuationi sanguinis. Auctoritate, quia Hippocrates 2. sec. aphorismorum 22. habet hunc aphorismum „ morbi qui ex repletionem sunt, euacuatione curantur; ergo plenitudo indicabit sanguinis euacuationem.

Reijciuntur sic: concedimus plenitudinem indicare sanguinis euacuationem: sed negamus, quod plenitudo indicet primo & per se. Primum probatur quia Galenus 9. meth. cap. 11. habet hæc verba „ Venæ sectio utilis est, vel quando sanguis non feruat suam qualitatem: vel quia nimia crescit multitudo: ecce quod præter plenitudinem, etiam mala qualitas indicat venæ sectionem: ergo plenitudo non indicabit sanguinis euacuationem primo & per se.

Secundò Auicennas 4. 1. doc. 5. cap. 20. habet hæc verba „ vnusquisque phlebotometur, aut propter sanguinis multitudinem, aut propter malitiam, aut propter vtrumque: ergo non sola plenitudo indicabit venæ sectionem.

Tertiò Galenus lib. de ratione curandi per sang. missionem cap. 9. inquit in morbo magno, quamuis nulla sit plenitudinis nota, venam esse secandam.

Quartò Galenus 5. meth. 14. proponit hos duos casus: Socratem, qui paucum, & Platonem qui multum sanguinem habent: subdit si Socrates, & Plato morbo magno vexarentur, vtrique esset mittendus sanguis: ergo secunda est etiam vena, quando non est plenitudo.

Nec valet, dum dicunt, plenitudinem duplicem esse, aliam totius, & aliam partis: quia hæc plenitudo partis in corporibus sanguine destitutis est nimis metaphorica, ne dicam chimerica, & ridicula, quia hæc distinctione posset quoque defendi opinio Menodoti, qui dicebat, syndromen phlethoricam indicare venæ sectionem: Quoniam pro Menodoro possemus dicere, syndromen phlethoricam duplicem esse, aliam totius, & aliam partis: quia dum sanguis euacuatur, saltem in aliqua parte debet esse iusto copiosior, sed hæc reluctantur Galeno.

Quo ad Trincavellium, concedimus & nos, plenitudinem indicare missionem sanguinis, sed non per se primo, ita ut sanguis mitti non possit, nisi adsit plenitudo.

Quo ad rationem, dum dicebat, plenitudinem sanguinis esse contrariam missioni sanguinis.

Respondemus hæc duo videlicet plenitudinem, & missionem sanguinis non esse propria contraria: quia latius se habet missio sanguinis, quam plenitudo; quoniam per missionem sanguinis non solum euacuamus, sed refrigeramus, reuellimus, deriuamus, deobstruimus, & multa alia facimus, quæ omnia indicata id est remedia delirescunt in illa sanguinis missione à chirurgo facta, quæ reuera non est remedium, sed materia multorum remedium, vel aggregatum multorum indicatorum.



Tertia opinio fuit Horatii Eugenij præcessoris mei viri alioquin doctissimi, qui dicebat, morbum magnum factum à sanguinis plenitudine, vel à fluore indicare sanguinis missionem.

Hæc opinio est valde diminuta, quia in phlebotomia præter plenitudinem & fluorem sunt alia plura, ut diximus: quare hæc opinio tamquam diminuta relinquitur.

Quarta opinio fuit Hieronymi capiuaeci præceptoris nostri, qui dicebat, vehemens peccatum sanguinis indicare primo & per se sanguinis missionem: sed vehemens peccatum sanguinis (ait) considerari posse tribus modis videlicet, aut vehemens peccatum secundum formam aut secundum quantitatem, aut secundum motum. Addebat quod peccatum sanguinis secundum formam indicet euacuationem sanguinis eradicantem: peccatum secundum quantitatem euacuationem minorantem: secundum motum indicet euacuationem reuellentem.

Primò, hæc sententia non accipitur, quia sanguis dum peccat secundum formam vires destruuntur, quo casu purgandum potius esset, quam phlebotomandum.

Secundò dum sanguis peccat secundum formam ex sententia Galeni 2. de crisibus cap. 12. & alibi: atque ex Auicenna, ubi agit de humoribus in prima primi, à putredine corrumpitur: parsque tenuior vertitur in bilem & crassa in melancholiam: idè dum peccat secundum formam est purganda bilis, vel melancholia, & non phlebotomandum.

Tertiò fallitur, quia sanguis, dum quantitate peccat, non semper est minuendus: non ne sanguis peccat quantitate etiam quando est iusto partior? Quis esset tam fatuus, qui tunc sanguinem euacuaret?

Colligimus tamen ex Capiuaeci opinione hunc fructum, quod sanguis copia peccans sit minuendus, peccans motu reuellendus quamuis hæc non indicent per se primò.

Verior opinio est Vallesij libro 7. controuersiarum cap. 2. ubi dicit, venæ sectionem non esse vnum remedium, sed esse multorum remediòrum aggregatum, quod

debet indicari ab aggregato multorum indicantium: Concludit, & rectè quidem, non dari vnicum affectum, qui per se indicet venæ sectionem.

Nos verò dicimus, indicans venæ sectionem esse innominatum, quia & illud, quod prædicatur immediatè de plenitudine de fluore, de qualitate calida, de sanguine obstruere, de quiete peccare, & de alijs qualitatibus dicimus, hoc aggregatum carere nomine: octo nos enumeramus indicata, quæ continentur in venæ sectione.

Primum est eradicans.

Secundum est tollens plenitudinem.

Tertium est tollens malignā qualitatem.

Quartum est tollens calorem.

Quintum reuellens.

Sextum est deriuans.

Septimum est præbens motum sanguini quiete peccanti.

Octauum est de obstruens, nisi immediatè saltem mediare.

Quare aggregatum horum indicatorum, siue remediòrum, quæ colliguntur ex ipsa sanguinis euacuatione, non habet nomen: dum enim euacuatur sanguis, corpus refrigeratur. Præterea potest fieri humorum eradicatio, reuulsio, vel deriuatio, meatuum apertio, vel dari potest motus sanguini, vel auferri aliqua mala qualitas in sanguine existens: quo pacto verò nominetur hoc aggregatum, nescitur.

Quod verò in philosophia & medicina sepius in hæc innominata incidamus, nos admonet Aristoteles 1. post. cap. 5. ubi animaduertit, præcipuum erratum circa vniuersale accidere, quādo genus, de quo aliquid queritur, est innominatum. Quis est ille, qui posset nominare genus proximum, quod solum conuenit equo & asino? Quis est ille, qui sciret nominare obiectum adæquatum visus, quod conuenit luci, & colori? idem de alijs propemodum infinitis dici potest.



## APHORISMVS QVARTVS.



**V**ICTVS tenuis atque  
exquisitus in morbis  
quidem longis semper,  
in acutis vero, in qui-  
bus non conuenit, peri-  
culosus. Et rursus qui ad extremum  
deuenit tenuitatis, gravis est. Nam,  
& repletiones, quæ ad extremum de-  
ueniunt, graves sunt.

Vario modo connectitur hic aphorismus cum superiori.

Montanus connectit hoc modo: cum medicina curatrix triplici instrumento perficiatur, videlicet chirurgico, pharmaceutico, & diætetico, ut docet Celsus, & Galenus 1. de ratione vic. in ac. comm. 6. Cum igitur Hippocrates egerit in 2. aphorismo de pharmacia, id est de euacuatione, quæ habetur per pharmacum: & in 3. de chirurgia, id est de euacuatione pertinente ad chirurgiam: meritò in hoc 4. aphorismo incipit agere de diætâ usque ad aphorismum vigesimum exclusiue.

Hæc connexio non respôdet ijs, quæ dicta sunt ab Hippocrate in aphorismis declaratis: quia in 2. aphorismo locutus est de qualitate euacuationis in communi, nempe qualiter esse debeat, non solum in pharmacia, sed in chirurgia, & diætâ: dicimus & diætâ, quia dicit, sic & vasorum innanitiò, quæ per diætâ quoque fit. In tertio vero aphorismo dat normam circa nimias euacuationes similiter pertinentes ad pharmaciâ, & chirurgiam: atque circa nimias resectiones, quæ certè solum pertinent ad diætâ, & non ad chirurgiam, vel pharmaciâ: cuare non incipit Hippocrates solum in hoc 4. aphorismo agere de diætâ: cum egerit quoque in secundo & tertio: incipit tamen de diætâ, sed magis particulatim faciens de ipsa tractatum ita completum, ut nihil desiderari possit ab hoc aphorismo usque ad vigesimum exclusiue: quia agit de quantitate, qualitate, de

modo & tempore cibandi. Incipit distinctius à diætâ, tum quia ex Galeno lib. de medicamentis paratu facilibus in arte medica tenet primum locum: tum quia acturus in fine istius particulæ de modo vtendi ipsa euacuatione non poterat ignorata victus ratione de hac re aliquid dicere.

In hoc aphorismo agens de quantitate & qualitate victus incipit damnare tria errata, quæ committuntur in cibandis ægris, qui acuto morbo vexantur: quorum primum est, dum exhibent victum exquisitè tenuem, vbi non conuenit. Secundum dum exhibent victum extremè tenuissimum, vbi non conuenit. Tertium dum exhibet victum crassum in acutis: itaut Hippocrates damnet in acutis vniuersam viuendi normam.

Similimodo Hippocrates 1. de ratione vic. in ac. tex. 13. damnat & reiecit illos, qui in omni morbo utebantur vnica viuendi norma, ptisana videlicet vel alio cibo: sicuti & nos valde damnamus nostratum plurimos, qui in omnibus febribus acutis, sint peracutæ exactè vel non exactè, vel acutæ exactè, vel non exactè, præbent ouum & panem excoctum, contusa caponis, vel illud stillaritiu pullo- rum crassum & viscosum, quod vix in chronicis morbis conueniret: quæ errata quomodo, & quot intrerimant infra declarabitur. Ostendemus quod victus, qui in acutis non exactè conuenit, in peracutis sit tamquam venenum.

Diuiditur hic aphorismus in tres particulas. In prima damnat illos, qui vtuntur victu tenui & exquisito, sicuti est cremor ptisanæ, quem damnat in morbis longis, & in illis acutis, in quibus non conuenit: quia ex Hippocrate & Galeno cremor ptisanæ conuenit in acutis exactè, qui terminantur circa decimumquartum diem. Non conuenit verò in acutis ex decidentiâ, quorum terminus est quadagesimus, ut docet Hippocrates 1. Prognost. 28. Neque conuenit in alijs morbis longis, neque in peracutis exactè, qui terminantur in primo quaternione: quia in his ægri tractantur ieiunio: Neque in peracutis non exactè, qui terminantur in



prima septimana; quia pro istis cremor  
ptisanæ esset cibus nimis plenus: Demum  
non conuenit in acutis non exactè, qui  
terminantur 20. die; quia pro his esset  
cibus nimis tenuis: his enim conuenit  
tota ptisana.

In secunda parte damnat victum ex-  
tremè tenuem, vbi videlicet non conue-  
nit: per extremè tenuem intelligit ieiun-  
ium, vt infra patebit.

In tertia parte damnat victum exactè  
crassum, qui in nullo morbo conuenit:  
ita ut Hippocrates semper abstinerit ab  
extremis videlicet ab immodica repletio-  
ne, & immodica inanitione.

Ex his colligimus quantum errauerint  
Thesalus, & Erasistratus, dum reprehen-  
debant Hippocratem (vt refert Galenus  
1. de ratione vic. in ac. comm. 25.) Thesa-  
lus dicebat, Hippocratem nimium reple-  
uisse ægros: sed si Thesalus fuisset ab Hip-  
pocrate ad cenam inuitatus, & illas epu-  
las præparasset, quas laudat in morbis pe-  
racutis exactè videlicet cibum extremè  
tenuem idest ieiunium, certè in salutato  
hospite discessisset.

Erasistratus dicebat Hippocrate ægros  
necasse fame: sed Erasistratus ostendebat  
se Hippocratem non legisse: quia Hip-  
pocrates, prout morbi erant magis vel  
minus acuti, maiorem, vel minorem in-  
diam obseruandam docebat, licet incli-  
naret in ieiunium: vnde Galenus 1. acu-  
torum comm. 25. citato inquit, potius  
ignoscendum esse Erasistrato, vt pote qui  
verisimilia dicat, quam Thesalo dicenti,  
Hippocratem ægros nimium repleuisse.

Præterea Galenus maxime damnauit  
Petronam medicum, qui vt patet primo  
de ratione vic. in ac. 17. in febris acutis  
concedebat carnem assatam, vinum ni-  
grum, & alios cibos, qui solum homini-  
bus bene sanis conueniunt.

Parimodo eodem comm. 17. reprehendit  
illos medicos, qui ægros alliciunt victu  
suauis, & agunt (vt ait) malo dolo. Simi-  
liter nostratum plurimi digni sunt repre-  
hensione, dum maxime recedunt à præ-  
ceptis Hippocratis in hoc aphorismo tra-  
ditis allicientes ægrotantes victu suauis,  
qui non conuenit: sicuti dum concedunt

hepar pulorum assatum febricitantibus:  
perinde ac essent Petronæ sectatores.

Quoad verborum intelligentiam, dicit  
victus vox græca est διατα, nomen diætæ  
apud Hippocratem, & Galenum sumitur  
duobus modis, vel pro fonte diætetico, in  
quo continentur sex causæ nonnaturales:  
quarum prima est Aer, secunda cibus &  
potus, tertia somnus & vigilia, quarta  
motus & quies, quinta quæ excernuntur  
& retinentur, sexta animi passionēs: atque  
in hoc sensu diætā sumitur à Galeno tertio  
in tertium epid. 9. & in tertia parte artis  
med. lib. ad Trasyb. 35. primo de ratione  
vic. in ac. & alijs in locis: Vel sumitur  
nomen diætæ, pro vt significat cibum, sicuti  
in hoc loco sumitur ab Hippocrate quæ  
cibum Galenus in comm. diuidit in suas  
differentias, sine quarum distincta cogni-  
tione ægri acuto morbo laborantes regi-  
& sanari non possunt.

Sed ante diuisionem cibi, sciendum est,  
cibum minui plus, minusve prout mor-  
bi sunt magis, vel minus acuti: quia ex Ga-  
leno 1. acutorum 44. morbus vt morbus  
non indicat cibum: Immo ex Hippocrate  
7. aphor. 65. cibus febricitantibus morbus  
fit: & primo ad Glauc. 10. inquit Galenus,  
quod virtus quanto validior, tanto maius  
sit adhibendū remedium, & tanto minus  
cibandū: sed quia sine cibo ægri nō possunt  
sustineri: ideo de differentijs ciborum, qui  
omnibus ægris conueniant, agendum est.

Galenus in comm. diuidit victū siue ci-  
bum in tres differentias, in plenum medio-  
crem, & tenuem: deinde tenuem in qua-  
tuor differentias, nempe in exactè tenuis-  
simum, in tenuissimum, in exactè tenuem,  
& in tenuem non exactè. Plenus est victus  
vulgaris, qui consistit in carne, ouis, pisci-  
bus, & cæteris cibis, qui sanis conueniunt,  
hic sanorum cibus vocatur à Galeno in  
comm. augens vires; exhibetur magis vel  
minus plenus, prout vires sunt magis vel  
minus robustæ.

Mediocris victus consistit in cibis li-  
quidis, & facili confectionis, vt sunt oua  
recentia, panis tritus excoctus, atque hic  
cibus mediocris à Galeno vocatur cibus  
æquans, idest vires conseruans, tales, quales  
erāt prius, conuenitque corporibus neutris



ut sunt senes, & conualescentes, in morbis chronicis, & in acutis ex decidentia, qui ex Galeno 2. de diebus decret. 12. vel sunt exacte ex decidentia (Hi non excedunt quadagesimum) vel non exacte ex decidentia, qui perveniunt ad sexagesimum. His omnibus convenit victus mediocritas.

Hinc irridendi sunt illi medici, qui consulant viris bene sanis solum victum medicum, ut pote auculas, ova recentia, panem tritum excoctum, parvos pullos, & alia id genus, quæ debilibus solum sunt proportionata: tandem per hunc victum natura vilesceat & vires quoque satiscunt.

Tenuis verò cibus convenit acutis morbis, & vocatur à Galeno victus minuens vires: in comm. habet hæc verba „ In morbis longis studemus vires conservare: in acutis verosatis est illas moderate debilitatas conservare: addit, quia si illas voluerimus conservare, quales in principio accessimus, fieret additio ad morbum. Idem testatur Galenus 4. meth. cap. 6. Causa vero, cur per alimentum fiat additio ad morbum, duæ sunt: Prima quia natura per cibum à certamine divertitur: Secunda quia excrementa cibi augent morbum.

Prima dubitatio Galenus in comm. inquit, in acutis morbis alimentum debet esse minuens vires: si minuens, quomodo vires superabunt morbum? non ne vires sunt illæ, quæ certant cum morbo, & mortum depellunt?

Respondemus alimentum minuens vires non esse minuens respectu morbi: quia minuendo vires cum paucis cibis, morbus citius superatur: dicitur verò minuens vires respectu virium.

Quod vero vires diminutæ per cibum possint esse validæ in relatione ad mortum, patet ex Galeno 9. meth. cap. 4. dum in curatione febris synochæ laudat venæ sectionem usque ad animi deliquium, quia post animi deliquium excitantur vomitus, alui dejectio, sudores & miores, & inde natura se extollit, & quam citissime morbum depellit: quo depulso temporis brevimento vires recuperari incipiunt: ideo alimentum minuens vires non est minuens respectu morbi.

Galenus in comm. dividit victum tenuem

in quatuor differentias. Prima est victus extremè tenuissimus, & est ieiunium, quod convenit morbis, qui iudicantur ad salutem primis quatuor diebus, si vires validæ sint. Idem dicit secundo de diebus decretorijs, cap. 12. atque isti morbi vocantur exacte peracuti, & à Barbaris Latinis perperacuti: tales sunt angina acutissima, febres malignissima & pestilentes, quæ tractantur victu extremè tenuissimo, ieiunio videlicet: ieiunium vocabant victum extremè tenuissimum, quia in ieiunio vivens nutritur pituita, quæ dicitur victus extremè tenuissimus.

His temporibus neque audemus spatio quatuor dierum agros robustos tractare ieiunio, ut tractabat Hippocrates, tanto minus debiles: quia si debiles spatio trium vel quatuor dierum tractarentur ieiunio, antequam morbus in vigore consisteret, obirent: ideo non semper observanda est tam rigida vivendi ratio, ut agrotantes morbo perperacuto correpti sine vilo cibo & potu spatio trium vel quatuor dierum relinquantur: facienda enim est distinctio temporis, ætatis, regionis, & consuetudinis, ut bene videamus quinam sint illi, qui ferre, vel non ferre ieiunium possunt: quod præceptum reliquit Hippocrates 17. aphorismo huius sectionis, dum præcipit, condonandum esse aliquid temporis, regioni, ætati, & consuetudini.

Non parva sanè est differentia inter hæc & Hippocratis tempora. Dum Hippocrates 6. aphorismorum 28. ait, Eunuchos non laborare podagra, Galenus in comm. reddit hanc rationem: quia tempore Hippocratis Eunuchi erant temperatiores nostris, & Galeni temporibus, in quibus homines magna ex parte erant, & sunt intemperatiores, & debiliores: ideo nos loco ieiunii concedimus iussulum parvæ pulæ ad duos vel tres cyathos diei spatio, vel tantundem melle.

In peracutis verò, qui terminantur in fine primæ septimane, concedimus cretorem prissanæ. In acutis exactis, qui terminari, solent in fine secundæ septimane, totam prissanam.

In acutis non exactis, quorum terminus est vigesimus concedimus ovum vel aui-

culam montanam, vel pulpam parui puli cum ptissanæ cremore bis in die : Gali verò qui quater in die edunt, quater quoque alendi, nisi morbus valde prohibeat : Seruandæ enim sunt, quantum possumus, consuetudines : ideo Hippocrates & Galenus 2. de ratione vic. 23. dicunt „ Ter in die repleti nihil mali, si fuerint assueti .

Parimodo inspiciendæ sunt ætates, tempora, & consuetudines particulares : quidam enim ieiunio sunt assueti, quidam omnino insoliti sunt : atque ut summam dicam, quida ieiunium ferre, & quida ferre non possunt .

Secunda differentia est victus tenuissimus, sed non extremè tenuissimus, atque ex Hippocrate hic victus est ipsa mulla, quæ vocatur mellicraton, conuenitque morbis peracutis non exactè, qui terminantur in secundo quaternione, videlicet in fine primæ septimanæ . Admonet Galenus in comm. si in his morbis peracutis, viribus non fidamus, succo ptissanæ loco mullæ vtendum : quare inspicere oportet ipsas vires, quia in ægris robustis proposita præcepta obseruantur : in debilibus nequaquam .

Tertia differentia est victus exquisitè tenuis, & est cremor ptissanæ, qui conuenit acutis exactè, quorum terminus est decimusquartus dies, vt docet Hippocrates 2. aphorismorum 23. sed hac lege, & vt vires sint validæ, & vt benè videamus, an in exactè acutis sit aliquis affectus, qui prohibeat ipsum cibum, sicuti animaduertit Hippocrates & Galenus 1. de ratione vic. 33. in pleuritide vbi dicit „ Si ptissanam dederis pleuritico, antequam soluatur dolor, ægrum sanguinis euacuatione, vel alui subductione iugulabis : quia dolor, & deinde inflammatio augebitur, vnde mors .

Quarta differentia est victus tenuis non exquisitè, sicut est rota ptissana, quæ conuenit morbis acutis non exactè : quorum terminus est vigesimus, vt docet Galenus 2. de diebus decretorijs vltimo, & alibi . Morbis verò chronicis conuenit panis trixus excoctus & alia fercula mediocritia .

QVÆST. 18. Quomodo in principio morborum acutorum possit prævideri, quo die morbus sit terminaturus .

**S**ed antequam alia verba aphorismi declaremus, tria occurrunt consideranda . Primum quomodo in principio morborum acutorum possit præcognosci, an morbus sit terminaturus in primo, vel secundo quaternione, vel in secunda septimana . Hoc certè nisi præcognoscatur, superflua redditur hæc de ciborum differentiis cognitio . Hinc Galenus 3. de crilibus cap. 5. tenet, in nulla re adeo esse medicum exercendum, quam in vigoris, vel status morbi præcognitione : quia vigor seu status morbi est norma dicandi, ac præcognito statu, vel vigore futuro, quopactò sint cibandi ægri, omninò nescitur .

Secundum, quod est considerandum pro intelligentia aphorismi, est, an cibus tenuissimus copiosus, possit dici plenus, vel paucitas pleni possit dici tenuissimus . Occasio istius questionis est Galenus in comm. qui inquit „ Ptissana quod deacea sua natura non est exquisitè tenuis, nisi casu quopauca sumatur .

Tertium erit de conditionibus morborum acutorum : quia & Galenus videtur varius, & Auctores inter se sunt discordes .

Quantum attinet ad primum, quomodo scilicet primis diebus possit præcognosci, an morbi sint perpetacuti, vel peracuti, vel acuti exactè, vel acuti non exactè seu quo tempore, & quo die sint terminaturi, Nos non inuenimus Auctores, qui distinctè scripserint de hac re tanti momenti : dicimus tanti momenti, quia hac re non intellecta, Hippocratis doctrina redditur omninò superflua . Dicimus tamen hæc omnia colligi posse ex historijs ægrorum Hippocratis .

Primo ex historia Philischi colligitur quando morbus est terminaturus in fine primæ septimanæ : Galenus enim in côm. protulit hanc sententiam „ Quando symptomata grauissima apparent tertio vel quarto die, morbum illum terminaturum ad salutem, vel mortem in secundo quaternione, id est circa septimum diem .



Philiscus in 3. & 4. die habuit symptomata grauissima & lethalia, nempe urinas nigras, quæ inortem protendebant. Non erat verendum de morte in quarto, quia signa lethalia cæperant apparere in quarto: neque erat verendum de morte in quinto: quia exacerbationes in die pari obseruabantur: acceptum enim est in medicina ab omnibus, quod ægrotantes semper iudicentur in die maioris exacerbationis. Neque vsque ad octauum Philiscus poterat excurrere, quia octauus est ultra secundum quaternionem: ergo debebat mori in sexta die: quia obseruatum est à Galeno (vt refert in hac historia) quod ubi tertius vel quartus dies habet grauissima symptomata iudicium ad salutem, vel mortem expectandum esse in secundo quaternione.

Ex hoc casu Philisci duo colligimus præcepta: alterum quod ubi tertius, vel quartus dies habet symptomata grauissima, morbum esse peracutum non exactè & terminatum iri circa finem primæ septimanæ, vel ad mortem, vel ad salutem.

Alterum præceptum, si exacerbationes fiant maiores in die pari: iudicium in die pari expectandum esse: si maiores fiant in die impari, in impari. In Philisco quartus dies fuit maioris afflictionis, quàm tertius: ideo obiit in sexto, & non in septimo.

Erasinus in secundo & tertio die apparuit urinis nigris valde delirauit: ob hanc rationem debebat iudicari in quarto: quia lethales exacerbationes secunda die apparuerunt: obiit tamen in quinta: Galenus reddit rationem, cur obierit in quinta die, dicens, quia primum diem habuit quietum.

Ex hoc casu Erasini duo notanda sunt: primum exacerbationes grauissimas in secunda die indicare morbum peracutum, idest peracutum exactè, idest terminatum iri in quarta, vel quinta: cuius talis est perperacutorum terminus, sicuti ostensum est ex Hippocrate & Galeno: secundum est notandum: si prima dies sit quies, vel non enumerati, vel iudicium deferendum esse ad diem sequentem, videlicet ad quintum, in quo mortuus est.

In vxore Dromedæ grauius symptoma-

ta, videlicet sudores frigidi apparuerunt in tertio: ergo mors circa finem primæ septimanæ: cur? quia sudores frigidi in tertio non indicant morbum perperacutum, cuius terminus est quartus, vel quintus dies: ergo non erat mors expectanda in fine primi quaternionis: quia non in secundo die apparuerunt lethalia symptomata, sed in tertio die, qui est index secundi quaternionis: ergo iudicium erat expectandum vel in quinta, vel sexta, vel septima. Non in quinta, quia quinta pertinet ad perperacutos. Non in septima, quia exacerbationes grauiiores fuerunt in quarto, videlicet stilla meri præter alia symptomata: ergo in sexto, in quo moritur, erat expectandum iudicium ad mortem.

In adolescente decumbente in foro mendacium ait in tertio & quarto die fuisse grauius symptomata: ergo morbus peracutus: ergo circa finem primæ septimanæ iudicium: sed quia in tertio partes extremæ apparuerunt liuidæ, & urina nigra: ideo mors vel in quinto, vel in septimo, vel in sexto; non in quinto, tum quia dies erat adolescens robustus: tum quia dies quintus est terminus perperacutorum, & non peracutorum: non in sexto, quia signa mortalia apparuerunt in tertio: ergo in septimo. Non euasit, quia liuiditas partium extremarum, vt docet Galenus in hac historia, alterum de duobus significat, vel emori natium calorem, vel viscerum apostema, quæ sunt insuperabilia.

In Sileno die tertio apparuerunt exacerbationes, & urina nigra: ergo Sileni morbus est peracutus non exactè: ergo iudicium expectandum in fine primæ septimanæ: non in sexto die: sed in septimo, quia in tertio fuerunt exacerbationes lethales: sed quia in quinto die habuit multas deiectiones mæras, protrahendum fuit iudicium ad nonum: sed quia in octaua die eruperunt papule, idest petiula, iudicium delatum est ad diem undecimum, quo die decessit.

Collige ex hoc casu, & vires robustas, & motus symptomáticos protrahere in longum iudicium, sicuti in hoc casu animaduertit Galenus, qui præterea obserua-



nit motus symptomaticos intendum iuuare, quatenus participant imperfectam crislum. Notandum illos motus symptomaticos aliqua ex parte iuuare, qui vocantur symptomatici ratione temporis, & non ratione exentis: ratione temporis sunt, quando in principio morbi biliosi, fluxus biliosus obseruatur: si vero in morbo bilioso fluxio esset pituitosa, vel melancholica, esset excretio symptomatica ratione exentis, quæ semper nocet, & nunquam iuuat.

In Horophonte adolescente robustissimo in quarto apparuerunt vrinae nigrae, & extrema frigida, & in quinto faeces nigrae, atque in eodem die omnia fuerunt exacerbata cum signis lethalibus, quæ reuera ostendebant moriturum in septima: sed quia in quinto lien caput intumescere, & magnam partem pravorum humorum recipere: ideo neque in septimo, neque in nono obiit: quia (ut animaduertit Galenus) prauum humores in octaua die in vtramque tibiā confluxi sunt: non in vndecima quia in noua dies sudauit, & sudores in die impari semper boni: ergo debebat terminari, & iudicari ad salutem quattadecima die: sed quia vna pars pravorum humorum confluxa erat in vtramque tibiā, & alia pars relictā fuit in venis: ideo totidē relinquebantur dies pro absolūenda illorum coctione: ergo vel in decimasexta vel decimasextima, vel decima octaua, vel decimanona, vel vigesima erat iudicandus: non erat expectandum iudicium in decimasexta vel decima octaua, vel vigesima, quia exacerbationes maiores fuerunt in die impari: non in decimanona: quia nunquam aliquis ex putrida febre mortuus est, vel sanatus in decimanona ut Hippocrates & Galenus obseruatur in filia Eurianactis, quæ licet mortua sit decimanona, inquit Galenus in comm. illius historię nō obiit ob illud morbum, sed ob destillationem, & tabem, qui duo affectus, ut ait ordinem criticorum dierum peruertunt: quare Horophons fuit iudicatus ad salutem die decimasextima.

Quem casum miratus Galenus dicit Horophontem fuisse sanatum præter rationem, & ob maximum robur: habuit enim

varia signa lethalia, nempe extrema frigida, vrinas, & feces nigras, & sordiditatem postquā succi biliosissimi fuerunt repressi.

Ex hoc casu colligimus, morbos suæ naturæ petacutos ob robur paulatim subire formam acutorum non exactè: tuncque hoc fieri, quando adfunt hæc duo, nempe robur virium, & motus symptomatici ratione temporis mixti cum criticis: quæ duæ conditiones sunt in causa, ut non solum iudiciū ad mortem, vel in aliud tempus protrahatur, ut dictum est de Sileno, sed etiam ut morbi sua natura mortales terminentur ad salutem, ut in Horophonte.

Hinc experientia patet, quod signa mortalia tum ob robur, tum ob motus symptomaticos mixtos cum criticis possint esse fallacia, & nihil mali indicent.

Colligimus tamen ex propositis historijs, & ex alijs ab Hippocrate narratis, ut plurimum in morbi initio, qui sint morbi perperacuti, qui petacuti, qui acuti exactè, & inde quis victus conuenire debeat in principio morbi, quo non præcognito de norma dietandi in acutis facta est alia.

Primum colligimus, morbum fore perperacutum, & agrum ieiunio tractandum, si grauissima symptomata in primo vel secundo die appareant, ut in casu Phrenetici, qui tertio die mortuus est. Idem colligimus in casu Erasini, qui mortuus est die quinta & non quarta: quia inquit Galenus primum diem fuisse quietum: in hoc casu in secundo die tutius præuidere possumus terminum perperacutorum, quam in primo: sicuti confirmat Galenus 8. meth. cap. 3. his verbis „ Ego verò nec in omnibus agrotantibus fateor exactè me scire in primo die affectum: ergo in secundo die tutius præuidebimus & affectum, & vigorem.

Secundum præceptum, quod ex propositis historijs colligi potest, est quod grauissima symptomata in tertio & quarto indicent morbum esse petacutum non exactè: si lumque ita iudicatum in fine primæ septimanae, ut contingit Philisco, Vxorī Dromedari, & Adolescenti decumbenti in forō mendacium: hosque morbos tractari mellicrato, vel iusculo parue pullæ: quia agri



nostratibus solum mellicratum reuera sufficere non potest.

Tertium si exacerbationes sint maiores in die pari: in pari ægrum iudicatum iri ex Hippocrate dicendum est; quare ex his non solum colligimus in qua septimana sit terminaturus morbus, sed etiam quo die.

Quartum præceptum est, quod robur, & motus symptomatici possint in longum protrahere morbum, qui sua natura sit brevis, atque ob robur morbus mutet formam, videlicet, ut ex peracuto fiat acutus, ut contingit Horophonti, qui morbo peracuto correptus ob robur incidit in acutum ad salutem tandem terminaturum.

Quintum si tertio die appareant signa lethalia, corpore existente robusto, nullo modo sequitur mors die quinta, sed iudicium potrahi potest ad septimum, ut contingit Adolescenti decumbenti in foro mendacium, qui in tertio habuit extremam liuida, quod est signum omnino exitiosum, & indicans moriturum in quinta: tamen ob robur mortuus est in septima.

Sextum præceptum est, quod nemo indicetur ad mortem, vel ad salutem die decimanona: ac sicut filia Eurianactis decima noua fuerit iudicata, id euenisse (Galenus docet) propter destillationem & tabem, qui affectus peruicere solent criticorum diem ordinem.

Deinde habemus decem signa indicantia morbos longos, vel breues, quæ desumuntur ab ipso Galeno 2. de differentiis feb. vnde decimo, secundo de crisi bus vnde decimo, & secundo prælag. comm. 28.

Primum signum morbi longi desumitur ab humorum copia.

Secundum à lentore.

Tertium à crassitie.

Quartum à virtutis imbecillitate.

Quintum ab angustia meatuum.

Sextum à loco affecto: sicuti si lien est affectus, morbus longus erit.

Septimum ab erratis commissis.

Octauum à temperatura, quia frigida longum: calida breuem indicat morbum.

Nonum ab ætate; senes enim longum, iuuenes breuem.

Decimum ab anni tempore, autumnus & hiems longum pollicentur morbum: æstas vero & ver breuem, quia oppositorum eadem est disciplina. Ex aliquorum signorum syndrome possumus colligere longitudinem, vel breuitatem morbi.

Deinde morbi breuitatem, vel longitudinem colligimus à sex rebus non naturalibus, ut pore ab aere crasso, vel frigido longus morbus sit: à tenui brevis: à cibis multis, crassis, & frigidis oritur morbus longus: à tenuibus brevis: somnus longus morbum longum, vigilia vero breuem facit: motus breuem, quies nimia longum, animi passionnes; ut mæror & mæstitia longum, ira breuem præostendunt.

Præterea, ut distinctius omnia declaratur Galenus 2. prælag. comm. 28. dicit febrem esse longam ob tres causas, videlicet vel ob particulam aliquam corporis male affectam, vel ob errores commissos: vel ob humores crassos, & viscidos.

Libro vero 2. de crisi b. 11. dicit, fieri longos, vel breues ob quatuor causas, quæ dependent, vel à loco, vel à materia, vel ab affectu præter naturam, vel à facultate. Secundo vero de differentiis febrium vnde decimo dicit fieri longos ob quatuor causas, nempe vel ob materiam multitudinem, vel ob crassitiam, vel ob imbecillitatem, vel ob angustiam.

*QVÆST. 19. An cibus multus tenuis sit plenus, & an paucus plenus dici possit tenuis.*

**Q**Varitur, an cibus tenuissimus copiosè sumptus videlicet cum appetitu sit victus plenus, & an paucitas pleni possit dici tenuissimus, veluti si quis drachmam tantummodo porcinae carnis in cena sumeret & nihil aliud; quæri solet an dici possit victus tenuissimus.

Ex vna parte Galenus in cõm. huius aphorismi vult, quod tota pristina hordeacea, si pauca sumatur, sit cibus tenuis exquisitè. Ex hac auctoritate plurimi colligunt, quantitatem ciborum mutare victus differentiam: ita ut dicant, paucillum victus pleni esse tenuissimum, & tenuissimum copiosum esse victum plenum.

Ex alia parte nos auctoritate, & experientia suffulti oppositum sustinemus: auctoritate Galeni 8. meth. 2. & 3. de facul. nat. 4. afferentis, cibum plenum in quavis minima quantitate non gerere vicem tenuis cibi: quia 8. meth. citato habet hæc verba „ In pane, ouo, & carne esse duas partes, videlicet vtilem, & inutilem: vtilem (inquit); iurimum nutrire, & in ventriculo febricitantium cum difficultate concoqui: atque dum coquitur, deinde in venis coctionem non absolui: reddit rationem, quia pars utilis panis, oui, & carnis in febricitantibus inflammatur, & aduritur: inutilem verò excrementosam, ait, non esse frigidam, & humidam, sed acrem, mordacem medicamentosam, & exitiosam: quare inquit pro febricitantibus esse eligendum alimentum frigidum & humidum, ut est ptisana, & non oleosum, & pingue.

Valeant igitur qui in febribus acutis præbent oua, carnes, & panem.

Præterea concludimus, quod nec ouum, nec quarta oui pars assumpta sit victus ita tenuis, sicuti sunt quatuor libræ ptisanæ collatæ. Immo ex ipso Galeno 3. de facul. nat. 4. colligimus, difficilius concoqui in ventriculo febricitantium quartam partem oui, quam integrum ouum: quia victus non coquitur, nisi ventriculus illum amplectatur: sed sic est, quod ventriculus non potest amplecti minimam oui portionem, quo fit ut relinquuntur spacia inania inter cibum, & ventriculum: quibus relictis, cibus in ventriculo manet crudus.

Quod verò citius concoquatur ptisana ad duas vel tres libras, quam ouum, & citius digeratur quarta pars oui, quam integrum ouum, confirmatur experientia: quia si in alembico essent duæ libræ cremoris ptisanæ facillimè instillari possent: si verò in eodem vase pro instillatione poneretur ouum, difficilis esset instillatio, & si quarta pars oui difficilior: quia antequam in vapores esset conuersa, combureretur. Quando verò Galenus dixit, ptisanam esse victum exquisitè tenuem, si pauca sumatur, dicimus Galenum non fecisse transitum ab una in aliam alimenti speciem: sed permansisse in consideratione

eiusdem hordei, dicendo eius cremorem esse victum tenuem exquisitè, & ptisanam totam esse victum tenuem quidem, sed non exquisitè: si vero pauca ptisana sumatur, dicimus tantum valere, quantum valet maior cremoris copia, quæ tamen talis sit, ut commodè possit à ventriculo amplecti.

Quare falluntur illi medici, qui dicunt, ita esse cibum tenuem ouum, vel duas auiculas montanas, vel quartam puli partem, vel panem excoctum, sicuti est libra cremoris hordei, qui in acutis morbis est proprius cibus, & non panis excoctus, quo vtuntur nostrates: quod etiam maxime Hippocrates reprehendit primo de ratione vic. in ac. tex. 25. ubi habet hæc verba „ In acutis panis non datur, sed solum ptisana: sed facto iudicio panis dari potest. Paulo infra Hippocrates loquens de pane, cur in acutis non conveniat dicit tex. 27. „ Panis neque humectat, neque secat: addimus, sed in acutis, & humectare, & secare seu incidere, vel detergere est operaprecium: ergo panis in acutis non conveniet, quod à paucis observatur.

#### QVÆST. 20. De conditionibus acutorum morborum.

**Q**uo ad conditiones acutorum morborum Galenus videtur varius: quia 2. de diebus decret. 12. & 3. de diebus decret. cap. ultimo proponit tres conditiones acutorum, quas desumpsit ab Archigene. Prima, quod omnes acuti sint celeres. Secunda, quod agant cum impetu. Tertia, quod sint periculosi: per hanc postremam conditionem excluduntur ephimeræ, & febres intermittentes.

Secunda dubitatio: ex alia parte Galenus 1. de crisi bus cap. 16. & 1. de diebus decret. cap. vult, inquit, dari febres acutas, in quibus non subest periculum: ergo tertia conditio non videtur necessaria: ideo Altimarus motus his auctoritatibus negat, quod omnes acuti sint periculosi.

Nos autem respondemus acutos per se, & ratione sui esse periculosos: ratione virium



virium robustatum non esse periculosos.

Tertia dubitatio exoritur : quia Galenus 2. aphorismorum 19. proponit duas conditiones acutorum morborum. Prima quod celeriter iudicentur. Secunda quod acuti statim magnitudinem habeant. Quare præter tres erit quarta conditio, quod sc. acuti sint morbi magni. Ex altera parte non videtur, quod omnes acuti habeant magnitudinem : quia Hippocrates 4. de ratione vic. tex. 19. vult in acutis sanguinem esse detrahendum, si morbus fuerit magnus : ergo non omnis acutus erit magnus.

Solutio desumitur à cod. Græco : quia dū dicit Hippocrates loco citato : si morbus videatur magnus, dicit *ισχυρός*, idest vehemens, & non *μέγας*, idest magnus : omnis enim vehemens est magnus, sed non viceversa, omnis magnus est vehemens. Valeant illi, qui ex hoc loco Hippocratis 4. de ratione vic. in ac. 19. colligunt magnitudinem morbi indicare venæ sec. quia Hippocrates loquitur de morbo vehementi, qui valde differt à morbo magno.

Quarta dubitatio quo ad verborum explanationem dicit *ἐν τοῖσι μακροῖσι αἰσὶν αἰθέσι* idest in longis passionibus, & non in longis morbis : sed sic est, quod morbus acutus non est passio : quia passio significat rem in fieri : morbus verò significat rem in factio esse, vt docet Galenus 2. meth. 2. & 1. de loc. aff. 3. vbi vocat dispositionem morbosam *διὰθεσιν* diathesis est in factio esse, & non in fieri.

Respondet Galenus huic dubitationi 3. aphorif. 28. fuisse in vsu apud antiquos, morbos tam chronicos, quam acutos vocari passiones.

Per morbos longes intelligit morbos, qui excedunt quadragesimum diem : quia licet acutorum terminus sit vigesimus dies, nihileminus, si perdurent vsque ad quadragesimum, dicentur acuti, vel quia sint ex decidentia acuti, vel quia ipsi acuti post vigesimum paulatim ita diminuantur, vt omnino desinant in 40. die : si vero ultra quadragesimū excurrant, verè chronici vocantur, seu temporanei, qui videlicet temporis cursu longiori terminantur : chronicus enim significat temporaneum.

*Et in acutis vbi non conuenit.* Dicit Hippocrates in aphorismo victum tenuem & exquisitum in acutis vbi non conuenit esse fallacem.

Discrepant auctores quid intelligat Hippocrates per morbos acutos : morbi enim acuti multiplices sunt : dantur enim morbi acuti qui terminantur in primis quatuor diebus, qui vocantur perperacuti : dantur acuti, qui terminantur in fine primæ septimanæ, qui vocantur peracuti : dantur acuti exactè qui deueniunt vsque ad decimum quartum diem : dantur acuti non exactè, qui excurrunt vsque ad vigesimum diem : & acuti ex decidentia, cuius terminus solet esse quadragesimus. Quaritur de quibus acutis intelligat Hippocrates.

Capiuaceus, Paternus, Bresauus, & alij plures per morbos acutos, in quibus non conuenit victus tenuis, & exquisitus (qui est succus prissanæ) intelligunt a. utes ex decidentia.

Horum interpretatio nō potest defendi : Galenus in comm. habet hæc verba „ Quod adiectum est sermoni de acutis, in quibus non conuenit, dicitur propter peracutos : Græca verba hæc sunt „ *διὰ τὴν κατ'ὅψιν ἀνέγχεσθαι* : ergo per morbos acutos non intelliget acutos ex decidentia.

Deinde si per morbos acutos intelligeret acutos ex decidentia. Hippocrates fuisset superfluous : quia acuti ex decidentia sunt morbi longi : satis enim fuisset Hippocrati, si dixisset in morbis longis victum tenuem, & exquisitum esse fallacem.

Causa erroris istorum fuit Leoniceus, qui verbis Galeni addidit particulam negatiuam, hoc modo „ Non esse dictum propter morbos acutos, quæ particula negatiua in Græco cod. non reperitur.

Causa erroris Leoniceni fuit, quia Galenus statim subdit hæc verba „ De peracutis verò mox dicemus : ex his inferebat : ergo non dixit propter peracutos.

Hæc mutatio verborum Auctoris non est admittenda, quando optimus sensus ex Auctoris verbis colligi potest : quādo enim dixit de peracutis mox dicemus, intelligere possumus fuisse dicemus : ideo per acu-



ros vbi non conuenit victus tenuis, & exquisitus, qui est cremor ptissanæ, dicimus Hippocratem, intellexisse perperacutos, & peracutos, in quibus victus tenuis, & exquisitus non conuenit: quia est nimis plenus.

Similiter per acutos vbi non conuenit victus tenuis, & exquisitus dicimus Hippocratem intellexisse quoque acutos non exacte, qui excurrunt vsque ad vigesimū, in quibus morbis cremor ptissanæ est nimis tenuis: immo hic victus tenuis, & exquisitus, si vires sint debiles, non conuenit morbis acutis exacte: quia solum conuenit morbis acutis exacte, supposita virtute robusta.

Hippocrates miro artificio dixit, victū tenuem, & exquisitum idest cremorem ptissanæ in acutis vbi non conuenit, esse fallacem: quia hæc dictio fallax indicat, & posse, & non posse conuenire: potest etiā in peracutis conuenire ratione virium labentium, vt dicit Galenus in comm. non potest conuenire ratione morborum peracutorū: quia in peracutis cremor ptissanæ est nimis plenus: itaut valeant hæc consequentia, est fallax victus tenuis, & exquisitus: ergo non necessario, & semper nocebit: ergo interdum poterit conuenire, quando videlicet vires magis possent ad indicandum, quam morbus peracutus ad prohibendum. Quod vero ita sit patet ex Galeno in comm. vbi inquit, „ si in peracutis, viribus non fidamus, succo ptissanæ vtendum ..

O quā artificiosis verbis vsus est Hippocrates & quā inaccessibili, & felici breuitate nobis insinauit per illā dictionem *σφαλεραί*, victū tenuē, & exquisitum conuenire, & non conuenire, & aliquando iuuare, & aliquando nocere respectu diuersorum. In toto Ioanne Scapula, vel linguæ Græcæ thesauris non inuenietur dictio aliqua, quæ significet posse, & non posse conuenire respectu diuersorum, nisi *σφαλεραί* idest fallaces: quare per *σφαλεραί* perperam interpretantur periculosæ, quia hæc dictio periculosa non habet illam vim, qua ostendi possit, victū tenuem, & exquisitum conuenire, & non conuenire, & iuuare, & non iuuare posse, vt dictum est.

Quinta dubitatio ex verbis Hippocratis oritur, dum dicit, victum tenuem, & exquisitum non conuenire in morbis longis, quod videtur reluctari experientia: quia morbus gallicus est longus; tamen victu tenui tractatur, nempe passulis, amygdalis, & biscocto, qui victus in illo morbo est saluberrimus.

Respondemus, amygdalas, & passulas cum biscocto non esse victū exquisitè tenuem: quia victus tenuis ex Galeno in comm. est minuens vires, sed sic est quod passulis, amygdalis, & biscocto vires conseruantur, quales erant in principio: hac ratione in morbo gallico propositus victus est æquus vires, & non minuens. Præterea in gallico morbo cōceduntur ossellæ ex carne vitulina, quæ pertinent ad victū plenum. Deinde morbus gallicus non est longus, quia mensis spatio sanari potest, nisi sit omnino inueteratus. Postremò notandum, Hippocratem in aphorismo asserere, victum tenuem exquisitum in morbis longis esse fallacem: ergo non ex necessitate nocuus: quia dictio fallax significat posse conuenire, & non posse conuenire habita relatione ad diuersa, vt dictum est.

Sexta dubitatio, non videtur quod victus exquisitè tenuis conueniat in morbis longis: quia Auicennas in morbis longis vtitur victu tenuissimo: sicuti lib. 4. fen. r. vbi agit de cura quartanæ, in qua præcipit, victu tenuissimo vtendum vsque ad tres hebdomadas. Similiter lib. 3. fen. 2. vbi agit de paralyti, in cura paralyti vtitur victu tenuissimo, sicuti est aqua hordei, & aqua mellis per spatium trium dierum: Immo subdit, si paralytici hunc victum tenuissimum tolerant, illo esse vtendum vsque ad decimumquartum diem. Denum Auicennas lib. 3. fen. 14. loquens de cura ascitis vult, in principio esse vtendum victu tenuissimo: quare si quartana, paralyti, & ascitis sunt morbi longi, & diuturni: ergo in morbis longis laudandus erit victus tenuissimus, quod est contra aphorismum.

Respondemus, esse magnam differentiam inter victum tenuem, & victum attenuantem, vt docet Galenus lib. de attenuantis victus ratione cap. 1. 2. & 8. & in hoc



hoc aphorismo: vinum enim album attenuat, tamen inter victum plenum connumeratur. Posita hac distinctione Respondemus, Auicennam vsum fuisse victu attenuante propter humores crassos, & viscidos, qui obseruantur in quattana, paralyli, & ascite propter obstructions, & consueque Auicennam vsum fuisse victu attenuante, quousque natura ferre potest: quia subdit ipse Auicennas „ Natura non ferente victum attenuantem confugiendum esse ad carnes, & oua. Vel Respondemus Auicennam proposuisse victum tenuem, & attenuantem quatenus indicatur à morbi causa, & non à virtute.

Septima dubitatio oritur ex verbis Hippocratis, quia dicit, victum exquisitè tenuem esse periculosum: si periculosum, ergo reuerendus: quia Galenus 14. meth. 13. fam. et laudat illos tres Asclepiadis scopos, videlicet cito, tuto, & iucundè esse edendum. Quare si victus tenuis, & exquisitus non est tutus, est relinquendus.

Respondemus esse periculosum victum tenuem, & exquisitum vbi non conuenit, nò tamen erit periculosus in morbis acutis exactè, dummodo vires non sint debiles: quare victus tenuis & exquisitus potest dici salax etiam in acutis exactè, dum vires admodum languent, sed si vires persistant in suo robore, nullus victus in acutis exactè magis potest conuenire, quam victus tenuis & exquisitus, qui est cremor pristinæ hordeaceæ.

Sed circa Galeni commentum hæc duo occurrunt considerata dubia.

Octaua dubitatio: dicit Galenus in côm. victum plenum augere vires: medicrem victum vires conseruare: quod non videtur: quia ex Galeno 1. de tuen. sani. cap. 2. vires à principio generationis vsque ad obitum semper diminuntur: scilicet nisi hoc esset, essemus immortales: quare neque victus augens vires, neque conseruans dari potest: sicut enim lumen lucernæ semper oleum depascitur: sic calor noster naturalis virium substantiam absorbit, vnde senectus & mors.

Respondemus, calorem naturalem dupliciter conseruari, vel penes substantiam caloris: & hoc modo calor nec potest au-

geri, nec conseruari sicuti erat prius: quia semper minuitur: vel penes quantitatem ex alimento ortam, & hoc modo potest augeri, & conseruari: augetur enim post somnum, post cibum, post vini generosi potionem.

Marsilius Ficinus in suo argumento Athlantici Platonis, proponit pulcherrimum exemplum, vnde colligimus, quomodo caloris substantia semper, & in dies magis diminuatur, tale fermè est: accipiat dolium mero plenū: extrahaturque quotidie vini ephiala: deinde alia aquæ ephiala illic infundatur: ait, in dolio etiam post multos dies seruari eandem vini quantitatem, sed non eandem vini substantiam: si nos quotidie amittimus aliquid substantiæ nostræ, conseruat tamen eadem quantitas, & eadem qualitas caloris saltem ascititij, dum corpus nutritur, vel agitur, non tamen eadem calidi innati substantia.

Nona dubitatio: Galenus in côm. huius aphorismi, & primo ad Glauc. cap. 10. dicit, vires validas in acutis indicare victum tenuem, & in peracutis inediā. Ex alia parte Hippocrates aphorismo 14. huius sec. vult, vires validas indigere copioso alimento, vbi dicit „ Qui crescunt.

Respondemus, vires dupliciter considerari, vel in sanis, vel in ægris: in sanis vires quanto sunt validiores, tanto plenior cibum exposculant: In ægris verò totum oppositum, quia ægri quanto sunt validiores, tanto tenuiorem indicant cibum. Hippocrates aphorismo 14. considerauit vires in sanis, & in his, qui crescunt, qui habent plurimum calidi innati: ideo inquit copioso indigere alimento: egent copioso alimento, tum ratione virium, tum ratione suoris contenti ipsius substantiæ. Ecce quod vires validæ validum exigunt alimentum, & debiles debile: hac ratione, si quis posset digerere 50. vncias alimenti, & fumeret, solum 49. temporis spatio tabesceret, & propter hoc erratum tandem interiret.

Præterea, quod virtus valida in ægris (de quibus Hippocrates in hoc aphorismo intelligit) indicet victum tenuem, patet ex Galeno 1. de ratione vic. in ac. 44. vbi



inquit, omnem nutritionem morbum augere, & omnem nutritionis defectum morbum minuere. Pater similiter ex Galeno lib. de opt. sec. ad Trasylb. cap. 43. ubi inquit, morbum contraindicare alimentum, idest prohibere alimentum.

Insuper Galenus in hoc comm. dicit, cibum vires conservantem in acutis morbis esse morbi auctificum. Præterea Hippocrates lib. 7. aphorismorum 65. habet hunc aphor. „ Si quis febricitanti cibum præbeat, quem sanis, valenti robur, & ægro-  
tanti morbus fit. Ratio aphorismi colligitur ex eodem Hippocrate, 2. sect. aphorismorum 10. ubi inquit „ Impura corpora quanto magis nutries, tanto magis lædes. Parimodo Hippocrates 2. sect. aphorismorum 17. habet „ Vbi alimentum præter naturam plus ingestum est, hoc morbum facit. Postremò quantò magis morbus vrget, tantò magis cibum prohibere oportet. Hinc Hippocrates aphorismo 11. huius sect. ait, in accessionibus abstinere oportet, atque Auicennas 4. 1. cap. 1. inquit, quando natura est occupata in maturatione humorum, cibis omninò prohibetur.

Cæterum ex tribus historijs Hippocratis præcipuè colligimus, cibum in paroxysmis, seu quando vrget morbus, non esse præbendum, ac dum præbetur ægrum interire.

Prima historia est illa, quæ proponitur ab Hippocrate 1. epid. 3. 29. de ægro innominato, qui decessit è viuis: quia cenauit calefescens, nempe quando vrgebat paroxysmus, idest in principio augmenti, & principio status paroxysmi. Alia historia est de Filia Philonis, quæ mortua est ob eanam intemperstiuam. Tertia est de filia Euryanactis (de qua Hippocrates mentionem facit 3. epid. 2.) quæ in principio paroxysmi come lit vix racemum, & ob hoc erratum incidit in delirium, & inde moritur. Ecce quomodo vires in ægris in accessionibus, vel dum vrget morbi nihil cibi indicent, dummodo possint ferre inediam.

Rursumque qui ad extremum deuenit tenuitatis, grauis est. Hæc est secunda pars aphorismi, in qua concludit, victum ex-

tremè tenuem, idest ieiunium esse graue, & molestum, supple, quibus non conuenit. Capiuaceus putat per extremè tenuem intelligere exquisitè tenuem, sicuti est cremor ptisanæ, quemadmodum Hippocrates intellexit in prima parte. Sed quantum recedat à vera intelligentia verborum Hippocratis paulò infra declarabitur. Decima dubitatio exoritur: quia Gal. 9. meth. 13. ait virtutem in acutis & omnibus morbis omnium primam custodiendam esse: ergo non solum ieiunium erit graue, & molestum, sed exitiosum; quia vires per ieiunium non possunt consistere, vnde ægri moriuntur.

Respondemus, Hippocratem in hoc aphorismo intelligere de robustis, in quibus ieiunium nec graue, nec molestum est: dū vero Galenus dicit, virtutem omnium primam esse custodiendam, intellexit de languida, & non de robusta.

Vndecima exoritur dubitatio: quia diximus Hippocratem per victum extremè tenuem intelligere in hoc aphorismo ieiunium, quod non videtur, quia Hippocrates appellat ieiunium victum extremè tenuissimum, & non extremè tenuem: magna est differentia inter extremè tenuem, & extremè tenuissimum. Vocatur ab Hippocrate ieiunium victus extremè tenuissimus: quia in ieiunio, licet nihil omninò sumatur, ratione pituitæ, quæ conuertitur in bonum nutrimentum, dicitur victus.

Respondemus ad dubitationem (ab alijs ante me, quod sciam non solutam) & responsio colligitur ex recta intelligentia verborum Græcorum, dum Hippocrates ieiunium vocat victum, qui ad extremum tenuitatis deuenit his verbis *ἐς τὸ ἐλάχιστον τῆς τροφῆς*. Articulus *τῆς* significat extremum, seu ultimam partem latitudinis tenuitatis: namque articulus semper significat rem definitam, & completam: si dixisset *ἐς ἐλάχιστον* sine articulo non significasset ultimum terminum, qui est ieiunium: extrema enim tenuitas habet latitudinem: sicuti etiam extrema plenitudo, quæ (ut diximus superius) habet *ἐπ' ἀκρότητος* & *ἐν τῇ ἐκείνῃ*: extrema tenuitas habet *ἐς ἐλάχιστον* & *ἐς τὸ ἐλάχιστον*, τὸ ἐλάχιστον est ieiunium, quia



quia est ultima pars tenuitatis cibi: in hoc aphorismo additus est articulus το: ergo per extremè tenuem uictum Hippocrates intelligit ieiunium, & non uictum exquisitè tenuem, qui est cremor prissanæ.

Hinc valde recessit ab aphorismi intelligentia Capiuaceus, qui putabat, Hippocratem in hac secunda particula aphorismi non loqui de ieiunio, sed de victu exquisitè tenui, idest de cremore prissanæ, sicuti est locutus in prima parte, itaut apud Hippocratem idem sit victus exquisitè tenuis, & extremè tenuis. Sed si Capiuaceus perpenderit Græca verba in hunc errorem non fuisset lapsus.

Dicit victum exquisitè tenuem idest ieiunium esse graue: vox Græca est χαλεπαὶ idest difficiles διαίται: sunt difficiles ægrotis, qui audientes quattuor dierum spatio in morbo perperacuto esse ieiunandum, terrètur: sunt difficiles medico imperanti hanc extremam cibi tenuitatem, quia si æger moriatur, medicus trahitur in culpam, licet fortasse ob assistētium, vel ægroti erratū id evenisset: esset difficile, si præscriberetur ieiunium, ubi non conuenit, nempe si vires essent debiles, si morbi essent peracuti non exactè, vel acuti exactè, vel morbi essent chronici, in quibus ieiunium nullomodo conuenit, licet vires sint robustissimæ.

Cum igitur Hippocrates in hac secunda particula intelligat de ieiunio, videndum est, quænam sint corpora apta, & quæ ineptra ieiunio: namque plurima sunt corpora alioquin robustissima: quæ in morbis exactè peracutis, si ieiunio tractarentur, interirent.

Galenus loquitur de corporibus ieiunio ineptis 1. de ratione vic. in ac. 44. Nos verò ex Hippocrate & Galeno colligemus omnes conditiones, ob quas corpora possunt, vel nō possunt ieiunium ferre: decem igitur reperio in Galeno, & Hippocrate.

QVÆST. 21. De conditionibus corporum, quæ sunt accomodata ad ieiunium.

**P**rima est complexio frigida, quæ facile ieiunium fert: quia in hac complexione minor alimenti resolutio fit. Hac

ratione calidi & siccī, vt pichtoroli, qui sunt illi, qui abundant amara bile, non sūt tractandi ieiunio, secus in hecticam elabuntur: sicuti Galenus 8. meth. ostēdit contra medicos diatritarios, qui spatio trium dierum ieiunio tractabant pichrocolos febricitantes, atque paulo post in hecticam incidebant, & moriebantur. Similiter pueri, quorum temperamentum est calidum, egent plurimo alimento, quia maxima à calore puerorum fit alimenti resolutio. Parimodo senes decrepiti sunt inepti ad ieiunium: quia vt dicit Oribasius eorum pituita est vitrea, quæ non potest superari ab illorū calore; ideo sæpè cibis sunt reficiendi: vnde fit, quod senes febricitantes facillimè moriantur: quia earum natura cibo frequenti diuertitur, & deinde victoria se tenet ex parte morbi.

Secunda conditio corporis apti ad ieiunium est corporis densitas, & virtus aliqua ex parte valida. De corporis densitate Galenus lib. de cibis boni, & mali succi cap. 10. & Hippocrates lib. de salubri diætā tex. 29. inquit, corpora densa non ita resolui vt rara.

Tertia conditio est consuetudo pauci cibi, sicuti obseruauimus in Aloyio Cornelio, qui lib. de propria salubritate refert, se diutissimè sanum conseruasse sumendo vnus diei spatio 12. vncias cibi, & 14. vncias vini. Immo refert se consilio amicorum, & medicorum, qui tam rigorosam diætā damnabāt, sumpsisse quatuordecim vncias cibi & 16. potus, ob quam mutationē refert paulo post in maximā febrem incidisse, quæ depulsa reuersum ad consuetam alimenti quantitatem saluberimè vixisse vsque ad annum ferè centesimum.

Quantum possit consuetudo ostendit Hippocrates & Galenus 2. acutorum 20. ubi dicunt, melius esse in victus ratione solita, licet sit vitiosa, persistere, quam subito ad meliorem victus rationem transire. Galenus in comm. inquit, si transitus ad insolitos cibos nocet sanis, quantò magis ægris. Valeant igitur medici dum in ægris vtuntur cibis valde insolitis, quia inde maximum illis nocumentum inferre possunt.

Quarta conditio corporum facillè ieiunium



nium ferrentium; est regio frigida & humida.

Quinta, ut os ventriculi sit validum & non ita facile dissolubile, sicuti erat illud Diodori Grammatici, qui ex Galeno lib. de uenæ sec. uentriculo existente uacuo, bilis uellicabat os ventriculi & statim in epilepsiam incidebat: sumptus vero cibus omne malum, summovebat. Quod vero corroborato ore ventriculi cesser vertigo, seu epilepsia, potest probari per ipsam præcticam: quia sumpto diacitonij pauxillo parati cum cinamomo, & sacharro, cessat prædictus affectus. Parimodo solet interdum reddios ventriculi inualidum ob flatu, ob quos in lipothymiam incidunt. Quod vero flatu hoc malum efficiat, confirmatur quoque per ipsam præcticam: quia in hoc casu vsus triphera saracenica præstantissimo est remedio.

Sexta conditio, qua dignoscitur corpus dispositum ad ieiunium, est, si alimenta, quibus utuntur, sint coctû difficilia, quia ieiunio vsu diu manere possunt sine cibo. Referunt de Hispanis, qui in propria regione parum comedunt, quia eorum alimenta non breui spatio coquuntur, & resoluuntur: dum vero in Italiam, vel Germaniam se conferunt nonnulli à mane ad vespertas comedentes vix famem ammuere possunt: causa est alimenti varietas. Triticum Hispanicum ob terræ ariditatem est adeo densum, & durum, ut præbeat alimentum, & validum, & coctû valde difficile: nostrum verò coctû facile. Idem referunt de vino Hispanico, de fructibus, & de oleribus. Idem quoque dici potest de Græcia, & de his, qui incolunt meridianam plagam, qui (ut alunt) ob eandem causam possunt facili ieiunium ferre: quod non accidit apud nos, ubi & triticum, & vinum, & olera, & fructus, & carnes sunt magis molles, & magis resolubiles ob regionem molliorem, & temperatorem.

Septima conditio, quæ sint senes in primo senio: quia ex Hippocrate in hac prima seci aphorismo decimo tertio habetur „ Senes facillimè ieiunium ferunt: per senes intelligit senes in primo senio: quia Græ-

ca dictio est *ῥεπόμενοι*, per gerondes Græci omnes intelligunt senes in primo senio: ferunt enim facili ieiunium, quia abundant pituita naturali, illamque commodè conuertunt in bonum alimentum: senes verò in ultimo senio abundant pituita vitrea, quæ non potest conuertri in alimentum: ideo sæpè nutriendi sunt.

Octaua, quod venæ sint latæ, & sanguine refertæ.

Nona, quod virtus sit valida, & non facile resolubilis.

Decima, quod corpora nō vrantur pluribus laboribus, & exercitijs: quia alimentum facili per immoderata exercitia absorbetur: Galenus enim lib. de alimentis cap. 2. loquens de rusticis, qui post paucum cibum ingestum illico laborant, habet hæc verba „ Carnes exinanitæ rapiunt ex ventre succum non solum semicoctum, sed aliquando omnino crudum, cum à cibo se fatigauerint, & ob hanc causam morbis grauissimis corripuntur: interdum tamen minus læduntur, quia post laborem (ait Galenus lib. de cibis ut infra) incidunt in somnum profundum, qui maximè iuuat coctionem crudi succi paulo ante attracti, ita ut in ipso hepate, & in ipsis venis corrigatur erratū primæ coctionis, quod in robustis sæpè fit, ut animaduertit Galenus lib. de cibis boni, & mali succi cap. 3: ita ut non sit semper vera illa communis sententia, quod error primæ coctionis non corrigatur in secunda.

Vndecima addi pōt in his, qui crescūt, ieiunium non convenire, sed esse graue, & molestum: quia calor, si cibo priuentur, humidum proprium radicale depascitur.

Nam & repletiones quæ ad extremum deueniunt graves sunt. Hæc est tertia particula aphorismi, quæ docet, victum extreme crassum esse grauem, & molestum.

Duodecima dubitatio exoritur, quia Hippocrates in hoc tex. videtur varius: in aphorismo præcedenti dixit, repletiones extremas esse periculosas: in hoc vero aphorismo non dicit esse periculosas, sed esse graues. Hæc duæ voces nempe esse periculosum, & esse graue valde differunt: quia non omne graue est periculosum.

Respondemus, Hippocratem in præceden-



denti aphorismo locutum fuisse de sanis, & dixisse esse fallacem, & non periculosam: fallax sanè non semper est graue: ostensum est in explicatione primi aphorismi, fallax maximè differre à periculoso.

Præterea in hoc aphorismo loquitur de ægris, in quibus cibus extremus semper est grauis, & semper lædit: ideo dū locutus est de sanis dixit, repletiones extremas esse fallaces, quia modò iuuant, modò nocent: in hoc aphorismo loquitur de ægris, in quibus victus extremè crassus semper est grauis. Læsiō in ægris à duplici causā dependet, vel à morbo debilitante vires, vel à ieiunio diminvente vires, quæ benè sanis non ita conueniunt: quia licet, & nimium comedant, & seuerè obseruent ieiunium, semper simili gaudent sanitate.

De benè sanis loquens Celsus lib. 7. cap. 1. habet hanc sententiam, „ Homo sanus, qui bene valet, & sui iuris est, nullis obligare se legibus debet: varium debet habere vitæ genus: modò ruri esse, modò in vrbe, modò nauigare, venari, quiescere interdum, sed frequentius exerceri: subdit: nullum cibi genus, quo populus vescatur, fugere debet: interdum in conuiuiō esse, interdum ab eo se retrahere, modò plus iusto, modò minus assumere. Deum nec medicum, nec pharmacopolam consulere: quare homo sanus victus varietate roboratur, & minus obnoxius redidit ægritudinibus. Addit quoque Celsus: reliquis verò qui sanitatem quærulam habent in exquisito victu eousque permanendum, quousque ad robustam peruenierint: hætenus Celsus.

Sed longè meliori doctrina suffultus Galenus, quam Celsus, qui 8. meth. cap. vlt. loquens de corporibus saluberrimis, nempe de ijs, qui sanitate fruantur inculpata dicit, si vitam diuturnam ducere cupiant, extremas, & frequentes mutationes prorsus timere debent, quia temporis cursu corpora bene sana disponuntur ad ægritudines, & inde ad mortes.

Colligimus, extremas repletiones, & extremas euacuationes esse graues, & molestas, non solum in ægris, sed etiam in bene sanis: quia symmetriam tollunt.

Addimus, extremas repletiones maius

malum efficere posse, quam extremas euacuationes: Id colligimus ex Galeno 2. de ratione vic. in ac. comm. 20. ubi habet hanc Diuinam sententiam, „ Minus malum est euacuare illos, qui indigent repletionem quam replere illos, qui indigent euacuatione: quia extrema repletio suffocat calorem, & omninò auferit vires inferuentis vitæ instrumentis: extrema uerò euacuatio resoluit spiritus, & humores, sed non tollit aptitudinem instrumentorum inferuentium spirituum generationi.

Ex quo præcepto colligimus, quantum nostratum medicorum plurimi recedant à ueris medicinæ fundamentis: dum nimium replent ipsos ægros: dum scilicet in peracutis, quando solum cremor ptisanæ sufficeret concedunt oua, contusa caponis, stillaticiumque illud crassum, quod uix in chronicis morbis esset admittendum.

Decimatertia dubitatio occurrit circa Galeni comm. in quo habetur, uictum plenum esse oua, alicam, & pisces: uictum uero tenuem esse ptisanam. Hæc non respondent ijs quæ alibi dicta sunt ab ipso Galeno: quia 1. de ratione uic. comm. 27. in morbis acutis laudat pisces, ergo pisces pertinebunt ad uictum tenuem, & non crassum: quia in acutis tenuis dumtaxat conceditur: loco enim citato habet hæc uerba, „ Si ptisana fastidierit, dandi sunt pisces saxatiles, ex aqua, porro, aceto, oleo, & sale cocti.

Præterea ex ipso Galeno lib. citato, ptisana non fit sine piscibus: quia ptisana fit ex iure albo, in quo pisces maritimi fuerint cocti: in hoc iure albo piscium dissoluebant antiqui ptisanam, quam dabant in febre acuta, & in pleuritide: parumque salis adijciebant, ut conseruarent appetitum (Valeant Nostrates, qui uictum omninò insipidum præbent) ergo si cum ptisana dantur pisces, uictus erit plenus: ergo malè Galenus in cōm. dum dicit, ptisanam esse uictum tenuem.

Respondemus, pisces saxatiles pertinere ad uictum tenuem, non saxatiles ad uictum plenum. Præterea ius album piscium, ex quo dissoluebant ptisanam, fuisse sine piscium substantia, solamque pi-

scium



scium qualitatem continebat, hoc sine ut alteraret, & refrigeraret febricitantes: pisces uerò reiiciebant.

Decimaquarta dubitatio: in hoc comm. Galenus inquit, oua constituere uictum plenum, tamen Galenus 1. ad Glauc. cap. 10. & 10. meth. 3. in tertiana exquisita dabat ouorum vitellos: sed sic est, quod in tertiana exquisita conuenit victus tenuis, & exquisitus: ergo oua pertinebunt ad victum tenuem, quod negat Galenus in hoc comm.

Respondemus, ouum tremulum in aqua coctum ad tenuem victum pertinere: ouumque tremulum conseruare temperamentum symmetrum, habereque vim refrigerandi; hac ratione esse cibum epichierasticum, quod dici non potest de ouo cocto in sartagine, vel indurato, quod certe ad victum tenuem nullo modo pertinere videtur: dicimus tamen non conuenire in peracutis, neque in acutis exactè, sed ad acutos non exactè esse accommodatum.

## APHORISMVS QVINTVS.



*N tenui victu agri delinquunt, quo fit, ut magis ledantur: quicunque enim error committitur, maior in hoc fit, quam in paulo pleniori victu. Præterea etiam sanis periculosus existis valde exquisitus victus, & constitutus: quoniam errores grauius ferunt: ob hoc igitur tenuis victus, atque admodum exquisitus, eo qui sit paulo pleniori magis periculosus.*

Intentio Hippocratis in hoc aphorismo est difficillima: illa tamen præcognita facile sensum aphorismi intelligemus. Nos in medium proponemus aliorum sententias, illasque examinabimus, quæ cum reuera de

medio non tollant omnia dubia, nouam in medium proponemus, quæ (nisi me fallat) aperiet verum Hippocratis sensum, & omnia dubia de medio tollat.

Vulgaris expositio est, quod Hippocrates in hoc aphorismo admoneat semper esse inclinandum potius ad victum pleniorum, quam ad tenuiorem: quia Hippocrates dicit, agros magis lædi à victu tenuiori, quam à paulo pleniori.

Hæc expositio est omninò aliena à mente Hippocratis, Galeni & veritate ipsa. Est aliena à mente Hippocratis, quia 2. de ratione vic. 37. habet hæc verba, „ In acutis semper studendum est ciborum detractiōni, & non adiectiōni, donec morbus maturescat. A Galeno est aliena, quia in eodem comm. 37. habet hanc sententiam, „ victus, qui plus est in acutis efficit noxas inemendabiles: qui verò minus est emendari potest, cibi paucillum præbendos: quare non solum melius est inclinare ad paulo tenuiorem cibum: sed est omninò necessarium hoc efficere pro salute ægrotantis.

Quod verò errata, quæ sunt in victu tenuiori longè facilius corrigantur, quam errata, quæ sunt in victu pleniori, colligi potest ex illa historia à Galeno proposita 10. meth. cap. 13. vbi refert, quædam ægrotum ob nimiam inediam præscriptam à medicis Thesalicis ad tantam imbecillitatem deuenisse, ut vix oculos attolleret, qui deinde paucò cibo cum vino tenui diluto à Galeno exhibito sustulit oculos, & statim vires fuerunt restitutæ. Errata verò quæ sunt in victu pleniori non illic emendantur, sed longa inedia & euacuatione. Quare victus tenuis non videtur fallacior paulo pleniori.

Præterea Hippocrates & Galenus 2. de ratione vic. 19. dicunt, „ In acutis morbis illos minus lædi, qui accipiunt potum solum, quam qui prissanā collatam: & multo magis illos lædi, qui integram prissanam accipiunt.

Insuper cibus paulo plenior in acutis febribus non nutrit, quia non coquitur: calor enim febrilis impedit: deinde obseruandum est, quod admonet Galenus 11. meth. cap. 15. quod videlicet cibus, qui non coquitur, excitat corruptelas, in quibus



bus (ait) aliquid etiam prioris cibi bene cocti euacuatur: vel nisi excitentur corruptellæ, cibus crudus non coctus in ventriculo, vel in hepate maximè auget febrem. Accedit, quod sicuti cibus semper distrahit naturam à certamine cum morbo, sic morbus, sit febris, vel alius quævis distrahit naturam à cibi concoctione.

Demum inclinare ad victus plenitudinem est ingredi in pessimam mulierum opinionem, quæ semper dicunt, satius esse pugnandum cum imbecillitate, quam cum ipso morbo: ob quam opinionem quotidie pereunt innumeri; mulieres enim hac diabolica opinione percitæ interimunt suos parentes, suos viros, suos filios, & tandem luunt poenas peccati interimendo semetipsas: atque in hoc sunt adeo peruicaces, & irrationales, ut à medicis persuaderi non possint.

Caterum par est, ut videamus quid dicant alij de intensione & sensu ipsius aphorismi: quod quidem est valde vtile, quia ex omnibus aliquem fructum colligemus: quamuis scopum, ni fallor, non tetigerunt.

Antonius Musa vocatus Bresauola ait, Hippocratem in aphorismo non facere comparisonem inter vnum victum, & alium victum: sed inter errata, quæ sunt in tenui victu, & in paulò pleniori: ita ut dicat Hippocrates, maiora esse illa errata, quæ fiunt in tenuiori, quàm in paulò pleniori. Fallitur quidè: quia Hippocratis aphorismus est in postremis verbis, ubi dicit, ob hoc igitur victus tenuis, & exquisitus paulò pleniori est fallacior. Ecce quod Hippocrates comparationem facit inter vnum & alterum victum, & non inter errata. Deinde adhuc persisteret contradictio in Hippocrate, qui constanter sustinet 2. de ratione vic. in ac. 37. studendum esse ciborum detractiōni: ergo in paulò pleniori victu erunt maiora errata, quàm in tenuiori.

Salus Sclanus, & ante illum Fuchsius dicunt, Hippocratem in superiori aphorismo dānasse tres malas viuendi normas, quibus imperiiti medici vrebantur. In hoc verò aphorismo dicunt, Hippocratem aliū tangi re errorem, in quem incidebant medici diatriarij, qui in principio morbi agros inedia, seu ieiunio macerabant: atque

solum quattuor, vel quinto die agros cibare incipiebant, semper magis in diebus sequentibus augendo ipsum victum.

De his medicis Aristoteles. 3. Polit. c. 11. mentionem faciens dicit, quod in Ægypto medici aliquo supplicio afficiebantur, si ante tertium diem agros cibarent, vel à ijs auxilijs vterentur. Contra istos disputat Hippocrates 2. de ratione vic. tex. 15. & Galenus 1. ad Glauc. cap. 8.

Sed, quod contra istos in hoc aphorismo loquatur, neque somniauit Hippocrates; quia in hoc loco non intelligit de victu tenui exhibendo in principio, vel augmento, vel statu morbi: quia de his agit in sequentibus aphorismis, ut ostendemus.

Deinde non tollit apparentem contradictionem, dū hic dicit Hippocrates, victum tenuem esse fallaciorem, & 2. de ratione vic. in ac. 37. semper studendum esse ciborum detractiōni.

Triuerius videns in Hippocrate hanc contradictionem, quod scilicet dicat in hoc loco, victum tenuiorem in acutis esse magis fallacem, & 2. de ratione vic. studendum esse detractiōni: Respondet victum tenuiorem esse magis fallacem pleniori intelligi debere, vel in chronicis, vel in acutis.

Posita hac distinctione vult Triuerius, Hippocratem 2. de ratione vic. citato intellexisse de acutis: in hoc verò aphorismo de chronicis. Sed valde fallitur, quia in hoc aphorismo loquitur de illis morbis, quibus conuenit victus tenuis: sed sic est quod victus tenuis conuenit acutis, & non chronicis; ergo de acutis intelligit.

Thadæus Florentinus, & Capiuaceus pro solutione dicunt, victum tenuiorem, & pleniorē bifariam considerari posse, vel respectu totius morbi, vel respectu status morbi: respectu totius morbi dicunt, tenuiorem esse fallaciorem: Hippocratem verò in hoc aphorismo intellexisse esse fallaciorem respectu totius morbi: respectu verò status seu vigoris victum pleniorē esse periculosiorem; & hoc modo dicunt Hippocratem intellexisse 2. de ratione vic. 37. quod, si in acutis semper studendum sit detractiōni, habita relatione ad statum morbi. Hæc Responsio nullo modo potest defendi, quia dum loquimur de victu,



debemus semper intelligere de victu respectu status, seu vigoris morbi: quia vigor, vel status morbi (quod in idē recidit) est norma dietādi: quare proposita distinctio doctrinā Hippocratis nō respondet. Præterea vultis videre, victū omnium acutorū desumi à vigore: nō ne morbi, qui terminantur in secūdo quaternione tractantur ab Hippocrate sola mulla? respectu cuius? respectu vigoris, qui proximus est. Idē dicēdum est de omnibus alijs morbis.

Nos autem dicimus in præbendo cibo in omni morbo duo esse cōsideranda. Primum, an cibus conueniat ratione morbi: deinde an conueniat ratione virium: quæ cōsideratio nisi fiat à medico, actum est de norma cibandi. Quo posito dicimus Hippocratem in superiori aphorismo ostendisse, in quibus non conueniat victus tenuis & exquisitus ratione morbi, dum dixit neque in morbis longis, neque in omnibus acutis conuenire, id est non conuenire in perperacutis, peracutis, & acutis non exactē: conuenire tamen in acutis exactē, qui terminantur 14. die.

In hoc verò aphorismo, Hippocratem ostendere eundem victum tenuem exquisitē non conuenire ratione viriū debiliū morbis acutis exactē: quia in victu tenuiori ægrotantes debiliores magis peccant, quam in paulo pleniori.

Hoc præceptum Hippocratis nō solum est verum de tenui, & exquisito victu, sed ampliari potest ad omnes morbos: hoc modo: si ægrotantes debiles in perperacutis ieiunio quatuor dierum cursu, tractarentur, & in peracutis per integrā hebdomadam sola mulla, peccatum esset grauius, in victu tenuiori, quam in paulo pleniori, ac sæpē ob huiusmodi erratum ægri interirent. Hinc Galenus 8. meth. vlt. asserit, si vires sint debiles, magis esse attendendum viribus, quam morbis: quia tunc magis possunt vires ad indicādum cibum, quam morbi ad illum prohibendum.

Sed vultis videre quod Hippocrates in hoc aphorismo cōsideret victum respectu viriū debiliū, & non respectu morbi, patebit ex Galeni comm. in quo dicit, ista errata esse maiora in tenui victu, quia ægri cum hoc victu ob debilitatem non

peruenirēt ad statum, quod non accideret in ægris robustis: deinde patebit ex eōm. superiori, quod Hippocrates intelligat de debilibus: quia ipse Galen. habet hæc verba „ Si vires sint debiles in peracutis locomulx dandus est cremor prissanæ, ne in tenui victu peccent ægroti. Postremò patet hanc esse veram intepcionem Hippocratis in hoc aphorismo: quia tollit omnī dubia: quoniam dum dixit Hippocrates 2. acutorum 37. semper studēdum esse de tractioni ciborum, cōsiderauit morbos: dum verò dixit in hoc aphorismo in tenui victu magis peccare ægros, quam in paulo pleniori, cōsiderauit vires debiles.

Manardus lib. 4. epist. 2. tractat fusc hanc rem, & plurimos reprehendit: concludit (& rectē) esse intelligendum Hippocratem hoc modo: si ex æquali errore peccent in tenui, & paulo pleniori, quod magis errent in tenui: quare supposito, quod sint debiles, dum committuntur errata in tenui non potest reprehendi, quia maius peccatum est in paulo tenuiori ratione viriū debiliū, & non ratione morbi, vt diximus.

Diuiditur aphorismus in tres partes, in prima ponit rationem aphorismi, cur victus tenuis, & exquisitus sit magis fallax, quam paulo plenior, & est, quia in tenuiori victu magis leduntur supplē debiles, quam in paulo pleniori.

In secūda parte cōfirmat argumēto à minori, q̄ tale est, si victus tenuis, & exquisitus lædit sanos, videlicet debiles, multo magis lædet ægros debiles: error enim in sanis. (vt dicit Oribasius) est via ad morbum: in ægris verò est via ad mortem. Parimodo Hippocrates lib. de veteri medicina exemplo nauigantium declarat errata commissa in morbis magnis esse longē grauiora, quam in morbis leuioribus: aut, sicuti error nauigantium in maris tranquillitate non valde lædit, & in magna procella paruus error nauem perdit: eadem ratione error in morbis leuioribus non valde lædit: in acutis verò, & magnis passionibus error leuis potest interimere.

In tertia parte ponit aphorismum, qui est, quod tenuis, & exquisitus victus sit fallacior, quam sit paulo plenior, supplē in debili-



bilibus: quia in hoc aphorismo respicit vires agrotantis, & non morbum.

Quo ad verba primæ partis dicit in tenui victu per tenuem intelligit tenuem victum ratione qualitatis, & quantitatis: tenuissimus enim, utpote mulsæ in maxima quantitate, posset etiam strangulare. Quo pacto verò cognoscatur quamnam quantitas conueniat, id solum coniectura assequi potest: ex Galeno enim lib. de ratione curandi per sang. mis. 12. remedij quantitas efficit artem coniecturalem. sed satis fusè ostendimus superius, non solum remedij quantitatem, sed morbi, & virtutis quantitatem, idiosyncrasmam, & conditiones indiuiduantes efficere artem coniecturalem.

Quidam per tenuem victum intelligunt tenuem in genere, & rectè quidem. Eugenius reijciebat hæc opinionem hoc argumento. Id in præmissis debet intelligi, quod infertur in conclusione: sed in conclusione infert Hippocrates de tenui victu, quod sit sallacior, quam paulo plenior in debilibus: ergo in prima parte, ubi proponit præmissas, intelligit de tenui exquisito. Errat Eugenius: immo ostendit se esse logicæ oblitum; quia argumentum à genere ad speciem affirmatiuum videlicet est efficacissimū: & est tale in aphorismo. Si in victu tenui in genere peccant agroti, ergo tanto magis peccabunt in victu tenui exquisito: quare per tenuem in prima parte intelligit tenuem in genere: deinde concludit de tenui in specie, secus argumentum nullam haberet efficaciam.

Per paulo pleniorē intelligit victum tenuem, sed dicit pleniorē, facta comparatione inter victus tenues: sic dicimus, succum hordei esse pleniorē victum, quam sit mulsæ, & mulsam pleniorē, quam sit victus exactè tenuissimus: qui ieiunio perficitur: Quare Hippocrates in aphorismo de tenui victu, & non de plenior locutus est.

Galenus in comm. tradit duas causas, cur errata, quæ sunt in agris in victu tenuiori sint grauiora, quam in paulo pleniori: Prima, quia natura agrorum ob victum tenuiorē sit debilior: deinde æger

non potest peruenire ad statum. Secunda causa est, quia dum ægri vtuntur victu tenuiori faciunt mutationem ad insolita, quæ mutatio debilibus est maximè molesta: Hinc Philotheus inquit, ægros offendit ex cibi nouitate: sed addimus tantò magis offendit, quantò magis ægri debiles sunt. Hippocrates lib. de veteri medicina inquit, si quis consuetam cenam omittat, os valde amarum fieri, iracundiam, vel tristitiam excitari: quare ægri qui omittunt horas consuetas cibandi, cibique vtuntur insolitis, insulsis, & tenuissimis in nauseam incidunt, & valde læduntur. Hippocrates 2. sec. aphorismorum 50. ita damnat insolita, ut dicat, consueti deteriora esse minus molesta in suetis melioribus: ideo Galenus 8. meth. 9. ait, naturam gaudere consuetis: tertio verò de simp. med. cap. 18. refert, quandam vetulam solitā cicuta vesci, ex ipsa tandem nō noxam, sed beneficium collegisse. Cur verò natura gaudeat assuetis, & qua de causa vetula ex longo cicutæ vsu colligeret beneficium, nos ampla rationum serie ostendimus lib. 4. meth. nostræ vitandorum errorum.

#### QVÆST. 22. De Ieiunij detrimentis.

**H**ippocrates 2. de ratione vic. 44. proponit ieiunij damna, aitque biliosorum ventrem ob ieiunium repleri cruditatibus ex quibus eleuantur vapores ad caput & inde tempora pulsare. Parimodo tex. 30. 2. acutorum ait, ob inediam bilem reddi amariorem: Galenus verò 2. aphorismorum comm. 22. inquit inediam in tempestiuam in biliosis febrem excitare.

Postremò biliosi facilè ob inediam incidunt in febrem hecticam, ut animaduertit Galenus 8. meth. ubi agit de pichrocolis, quare medici, qui in acutis morbis debent studere detractiōi ciborum, debent quoque distinguere corpora apta ad ieiunium ab illis corporibus, quæ sunt ieiunio omninò inepta. Præterea Galenus lib. aduersus Erasistratum cap. 9. ait ex ieiunio epilepsiam oriri posse, ut contingit Dioscoro Grammatico: subdit in eodem capite, ieiunium caput replere, & tensionem vehementem circa brachia efficere



ideo quænam sint corpora apta, & quæ inepta ieiunio est dignoscendum. Idque facillè non solum ex dictis colligeretur, sed etiam ex ipsa practica, nempe ex iuuantibus & lædentibus, itaut valeat hæc: victus tenuissimus debiles ægrotantes lædit: ergo vtendum pleniori: quamuis etiam victus paulò plenior in acutis noceat: quia inter duo mala semper minus est eligendū: in robustis perperacuto morbo correptis ieiunium magis iuuat, quam nocet: ideo illo vtendum: in debilibus verò & in pichrocolis longè magis nocet, quam iuuat: ideo pleniori vtendum: itaut ieiunium interdum maximè iuuat, interdum maximè noceat.

Neque est contra hos, illud quod refert Aristoteles 3. Polit. cap. 11. de Aegyptijs, qui medicos aliquo supplicio afficiebant, si ante tertium diem ægros cibarent, vel alio auxilio vterentur: quia Aegyptij erant pituita referti, solitique erant vii cibis multi nutrimenti, talesque ieiunio facillè sanantur, licet vires sint debiles: quia Hippocrates & Galenus 2. de ratione vic. 48. habent hanc sententiam „ Qui sunt debiles ob inanitionem vasorum egent alimento: qui verò sunt debiles ob morbos prægestos, & morbi vehemētiam non egent alimento, sed potius euacuatione. Aegyptij in morbis peracutis non poterant esse debiles ob inanitionem vasorum, quia erāt refertissimi pituita: ideo in perperacutis summo cum beneficio ab omni cibo, & potu abstinebant.

Prima dubitatio: contra hanc sententiā Hippocratis est dubitandum: quia Hippocrates 2. de ratione vic. tex. 40. inquit „ esse minus malum euacuare illos, qui indigent repletionem, quam replere illos qui indigent euacuatione. In hoc aphorismo verò, totum oppositum dicit: in quo habet, quod maior error fiat, dum ægri in victu tenui delinquant, quam dum peccant in victu paulò pleniori: ergo vel malè in aphorismo, vel loco superius citato.

Prima responsio est, quod loquatur Hippocrates in hoc aphorismo de debilibus, in quibus vtendum est victu paulò pleniori: in robustis verò paulò tenuiori, si morbo peracuto vexetur. Hinc Galenus

2. de ratione vic. 44. proponit duos ægros „ debilem videlicet cum magno morbo, quem nutrire conuenit, & robustum cum eodem morbo, quem (ait), si nō nutries rectè ages: si verò contrarium in vtroque egeris, videlicet non nutries debilem cum magno morbo, & nutries robustum, eodem modo vtroque peribit.

Deinde respondemus, Hippocratem 2. de ratione vic. considerasse morbos, sed non vires: ratione morbi vult victum debere esse tenuiorem, & studendum semper esse ciborum detractio: negat tamen ratione virium, quia dā languent, vult victum debere esse paulò pleniorē.

Demum possumus respondere cum Cardano, & alijs, Hippocratem 2. de ratione vic. considerasse quantitatem cibi exhibendam in vigore: in hoc verò aphorismo qualitatem: quando enim laudat victum paulò pleniorē, in hoc aphorismo non intelligit quantitatem, sed qualitatem: sic cremor ptisanæ est cibus plenior, quam multæ quantitas decuplo maior. Quod verò Hippocrates 2. de ratione vic. consideret quantitatem cibi habita relatione ad vigorem, siue ad statum morbi, patet ex tex. 15. secundi acut. citati, vbi leguntur hæc verba „ si quinta die sit futurus morbi status & æger solo potu sit vsus, sufficere nō potest: melius est (ait Hippocrates) si protinus ab initio des ptisanam, & neque tertia, neque quarta die dare incipias, nisi morbus sit iudicatus. Ex his verbis colligimus quod æger quāto magis accedit ad statum, tantò cibus debeat esse tenuior: itaut status morbi sit vera cibandi norma.

Vt igitur perfectè cognoscamus, quænam cibi tenuitas in acutis conueniat, duo sunt præscienda, alterum, quando status futurus sit, quod præcognoscas in morbi initio oportet: quo pacto verò præcognoscatur, ostendimus in explicatione superioris aphorismi: alterum quanta sit ægrotantis virtus, quam sola coniectura assequi possumus.

Nos tamen diu insudauimus, vt virtutis vitalis quantitatem certa cognitione assequi possimus: inuenimusque tria instrumenta, quorum icones proposuimus in



commentarijs nostris supra Auicennam.

Primum est pulsilogium nostrum, quo distinguimus pulsū humilem à pulsu inualido, hoc modo, si pulsus, qui antea fuit vehemens & frequens remittat vehementiam & frequentiam, dicitur humilis: invalidus verò ut plurimum caret hac conditione, quod, scilicet fiat quietior: hæc maior vel minor frequentia si perexigua sit, à medicis sine pulsilogio dignosci nō potest.

Secundum est instrumentum vitreum, quo quisque manu propria dimetiri poterit singulos caloris gradus: dum enim magnus caloris augmentum paucorum dierum spatio fit, virtutis constantia significatur.

Tertium per staticam perpendi potest perspiratio insensibilis, quāta singulis horis fiat: unde virtutis firmitas & constantia significatur: inde præcognoscitur vsque ad quod tempus possit illa virtus perducere ægrotantes: quo præcognito scimus præscribere victum, an scilicet solo ieiunio vel sola mulsā, vel ptisanæ cremore sit incedendum.

Præterea etiam sanis periculosus existit. In hac secūda parte Hippocrates proponit argumētum tale: si victus valde tenuis nocet sanis: ergo multò magis nocebit ægris, argumentum non videtur cōcludere: quia ex ipso Hippocrate 4. aphorismorum veratrum nigrum, si sanis exhibitum efficit colliquationes, & maximè nocet: ergo & ægris: non valet, quia in quibusdam ægis veratrum est præstantissimum medicamentum.

Respondemus, quod quando fit comparatio inter duo, illa duo debent convenire tertio: sed sic est, quod victus tenuis potest nocere sanis & ægis: veratrum verò sanis scilicet imper noceat, & nunquam iuvet: quare comparatio non tenet, & argumētum ut uanum relinquitur.

In tex. dicit καθεστὼς καὶ ἀκριβὲς διαίτα, i. statā, seu constitutā exquisitā diætā sanis sunt σφαλεραί, i. fallaces: cathestichia significat diætā statā & continuā, & meritiò, quia nisi esset statā, sed solum unius diei, in sanis non esset fallax: immo maximè iuvaret. Ex his colligimus quantum erraverint, qui dixerunt dictio-

nem cathestichiam non esse necessariā, sed ab aliquo fuisse additam.

Secundum observandum est quorundam erratum, qui dum Hippocrates dicit sanos gravius ferre errata in victu tenui putant textum esse mendosum, & legunt, quia errata graviora ferunt, & non gravius ferunt. Primò errant, quia non sunt mutanda verba Auctoris. Deinde argumentum Hippocratis esset cōtrarium: quia si sani possent ferre graviora errata in victu tenui, ergo & ægri ferre poterunt graviora errata in victu tenuiori, quàm in paulò pleniori.

Postremò quod sani gravius ferant errata in victu tenuiori patet, quia Galenus cap. 86. artis med. asserit, „ Qui utuntur coitu minus peccant, dum sunt cibo pleni, quam omninò vacui. Similiter omnes animi passionēs minus nocēt plenīs, quam vacuis: quare falsum est, quod ægri in victu tenui ferant graviora errata.

Ob hoc igitur tenuis victus, atque admodum exquisitus.

In hac tertia particula cōtinetur aphorismus, qui infertur ex prima & secunda parte, ubi dicit, victū magis tenuem ledere ægros, quia nocet sanis. Confirmatur ex Hippocrate 2. de ratione vic. in ac. 20. ubi habetur: quæ læduat sanos magis lædere ægros: verum est hoc Hippocratis assumptū, hoc supposito, quod dicta lædat sanos, & ægros: ideo valet argumētum, diætā exquisita lædit sanos, ergo multò magis ægros, qui sunt imbecilles: quamvis multa sint, quæ sanos lædant, & non ægros, veluti medicamenta purgantia, quæ maximè lædunt sanos: attramen maximè iuvant ægros, ut paulò infra declarabitur. Ceterum, qui nō animadvertūt Hippocratem dicentem tenuem & exquisitum victum esse periculosiorem intelligere de ægris debilibus, & non de robustis, de quibus reuera totū oppositum est dicendum, in robustis videlicet victū pleniorē esse periculosiorem paulò tenuiori, nec aphorismum, nec practicā medicinæ percipient.

Dum se offerunt curandi morbo acuto laborātes, statim medicus debet providere, ut quān cūctissime fiat praeiū humo-



rum concoctio: quia in acutis vnica salus consistit in celeritate concoctionis, quæ à nulla re magis impeditur, quàm ab ipso cibo: ideo in acutis causa mortis est, quia cibus non nutrit: nō nutrit, quia nō cōcoquitur: non cōcoquitur, quia febris impedit: vnde duo mala protinus oriuntur: primū per cibum vires nō restaurantur: secundum per cibum natura maximè diuertitur à morbi concoctione. In morbis verò longis ratio est diuersa: quia in lōgis impendit periculum de vitium casu: quia status, qui est norma diætadi, maximè distat à principio. In acutis non vires debiles angunt nos, sed morbi magnitudo: hac ratione, in acutis minus, in chronicis plus cibis indulgendum: Galenus reddit rationem, cur minus cibi in acutis, dicens quod in acutis promptius sit addere, quam demere: addere enim illico possumus nutrimentum: demere verò excrementa solum temporis spacio valemus: intra quod æger potest mortem obire: quod de chronicis dici non potest: quia spacio multorum dierum tuto demere possumus excrementa.

Dixit in fine aphorismi Hippocrates *magna ex parte*. hoc artificio, quod fortasse alij non animaduertunt (licet multa dicant circa hanc dictionem magna ex parte) quia aliquando debiles, de quibus hic considerauit Hippocrates, inueniuntur, qui in morbo acutissimo nempe duorum dierum: sicuti sunt quædam anginae perniciose, possunt suffere ieiunium: in quibus non est verum, quod victus tenuis sit paulo pleniori fallacior: ideo dicit magna ex parte in debilibus victum tenuem & exquisitum esse periculosiorem paulo tenuiori.

Postremo notandum est, hoc præceptum ampliari posse ad victū tenuissimū, quod scilicet in debilibus victus tenuissimus sit periculosior, seu fallacior victu pleniori, quamuis Hippocrates in aphorismo solum intelligat de victu tenui & exquisito.

Tertia dubitatio occurrit dum Hippocrates dixit, peccatum grauius esse in victu tenui, quàm in paulo pleniori: cōtra hoc tale est argumētum: ille victus in morbis acutis est periculosior, qui est magis contrarius, & magis nocet; sed victus plenior

est magis contrarius: ergo victus plenior periculosior: minor probatur ex Hippocrate 2. de ratione vic. 37. vbi habetur in acutis potius esse studendum ciborum detractioni, quam adiectioni.

Respondemus, Hippocratem in hoc aphorismo considerasse vires debiles: secundo verò de ratione vic. considerasse morbum, supponendo, vires esse robustas. Deinde respōdetur, Hippocratem in hoc aphorismo cōsiderasse diætā statam id est perseuerantem, quæ diætā ab Hippocrate in aphorismo dicuntur catēstichiz, quæ sunt à principio morbi vsque ad finem status, quæ non conueniunt, nisi in peracutis.

Quarta dubitatio: Hippocrates aphorismo 7. inquit, in peracutis extremè tenuissimo victu vtendum: per victum extremè tenuissimum intelligit ieiunium: ergo si ieiunium non est periculosum in peracutis, tantò minus erit periculosus victus tenuis, & exquisitus, de quo in hoc aphorismo.

Respondemus: in hoc aphorismo similiter cōsiderasse morbos acutos cū virtute debili: in septimo verò aphorismo cōsiderasse peracutos cum virtute robusta. Hac vnica responsione tolli possunt aliæ quam plurimæ instatiæ contra hunc aphorismū.

Quinta dubitatio: ille victus, qui minus grauat vires, minus lædit: sed victus tenuior minus grauat vires: ergo minus lædet, quam plenior.

Respondemus eadem distinctione, nempe Hippocratem cōsiderasse in hoc aphorismo vires debiles, quæ requirunt victum paulo pleniorē. Quando verò laudat Hippocrates magis ieiuniū, id est victum extremè tenuem, dicimus tunc respicere morbum, & non vires. De ratione enim morbi est cibum prohibere, vt superius ex Hippocrate & Galeno ostendimus.

Sexta dubitatio: peccatum positium magis nocet, quam priuatiuum: sed peccatum ob victum pleniorē est positium, & ob victum tenuiorē est priuatiuum, ergo in victu paulo pleniori erit maius peccatum.

Respondemus, argumentum procedere respectu morbi: sed non respectu vitium: quia



quia sicuti per cibum morbus augetur, sic per cibum augentur vires, quæ morbum depellunt.

Septima dubitatio: ille victus, qui magis auget morbum, est periculosior: sed victus plenus magis auget morbum, quam victus tenuis, ergo plenior est periculosior.

Respondemus, argumentum esse verum ratione morbi: sed Hippocratem in hoc aphorismo dixisse esse maius peccatum in paulo tenuiori respiciendo ad vires: quia sicuti inedia est viribus inimica, sic cibis est inimicus morbo.

Octava dubitatio, in qua probatur maius malum esse in victu pleniori: illud malum, quod citius, interimit, maius est: sed victus plenior citius interimit: ergo maius peccatum erit in pleniori, quam in tenuiori. Maior est clara: quia victus plenior in acutis vnica hora potest suffocare: cibus verò tenuissimus non resoluet vires, nisi post multum spatiū. Præterea eadem responsione tollitur argumentū quo tolluntur argumenta superiora, dicendo quod Hippocrates considerauerit morbum acutum cum virtute valde debili, quam in omnibus morbis medicus inspicere debet.

Nona dubitatio, qua probamus, non esse maius peccatum in victu tenuiori, quam pleniori: sed peccatum esse æquale. Extrema mala quæ possent euenire in victu tenuiori & pleniori sunt æqualia, ergo non erit maius malum in tenuiori, quam in pleniori; patet antecedens: quia in victu tenuiori potest sequi mors cum resolutione: in pleniori verò per suffocationem.

Respondemus aphorismum non esse de extremis malis, sed de morbis acutis, ubi est suspicio de viriū casu: qua occasione maius malum est inclinare in tenuiorem victum, quam in pleniorē: quia medicus in quolibet ægrotante magis debet considerare vires, quam morbum: ideo dum medicus suspicatur, quod vires non possint ægrum perducere ad finem vigoris, ut tutius progrediatur, cibo paulo pleniori uti debet.

Decima dubitatio: argumentum Hippocratis est, quod victus tenuis noceat sa-

nis: ergo multò magis ægris, non videtur concludere: quia ex Hippocrate & Galeno 4. aphorismorum habetur, elleborum in sanis exhibitum efficere colliquationes, & maximè nocere, ergo & in ægris: non valet consequentia: quia elleborus aliquando in ægris quam maximè iuuat.

Respondemus non valere consequentiam, quia non est par ratio de elleboro, & victu tenui: quia dum sit comparatio inter duo debent illa conuenire in tertio: tertium esset quod elleborus posset iuuare sanos, & ægros, quod non admittitur: quia sanis, & elleborus, & omnia medicamenta nocent: victus verò tenuis nocere potest sanis & ægris importunè exhibitus, & iuuare potest si opportunè exhibeatur.

Vndecima dubitatio: Hippocrates inquit in aphorismo, quod victus ratio valde tenuis, & stata hominibus sanis sit parum tuta. Hæc sententia aduersatur Celsi lib. 1. cap. 1. ubi proponit sententiam his temporibus ab omnibus receptam, quæ est, quod sanus homo, qui & bene valet, & suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet: ergo homo sanus tuto poterit uti quacumque victus ratione, sit plena, sit stata, vel tenuis, dummodo illi placeat: ergo vel fallitur Hippocrates, vel Celsi sententia communiter recepta non est probanda.

Respondemus duplicem esse modum cibandi sanos: alterum consistere in diminuendis viribus paucio cibo, hæc sine, ut natura distracta à cibo lapsus aliquem corporis non perfectè sani posset vincere, & superare: alterum modum cibandi consistere in conseruando, & augendo ipsas vires. Celsi sententia non est de primo modo, quia loquitur de omnino sanis. Hippocratis verò aphorismus est de primo modo, nempe de modo, quo natura non distracta à cibo morbum facilius vincere possit.

Duodecima dubitatio non videtur quod magis peccet in paulo pleniori: quia si natura cibum cōcoqueret, vires augerentur, quibus adactis æger citius sanaretur.

Respondemus quod sicuti cibus diuertit naturam pugnantem cum febre, sic febris diuert-



diuertit à cibi concoctione: ideo cibus debet esse tenuissimus, ne diuertat naturam à certamine cum morbo: quia huius concoctionis celeritas in acutis est vera salus: quoniam ob humorum prauorum tardiores concoctionem aeger moritur. Hinc Galenus primo de ratione vic. in ac. 44. proponit duos agros, videlicet debilem, & robustum cum morbo magno: deinde dicit, si nō nutries robustum, debilem verò nutries rectè facies, si verò contrarium in utroque egeris, uterque peribit, & robustus si ipsum nutries, & debilis si sine cibo relinques.

Decimatertia dubitatio: non videtur quod peccet agroti in victu paulò pleniori ob rationes allatas ab Alexandro Aphor. 2. sec. probl. 67. vbi ait, vinum cum pane à proprietate iuuare febricitantes: quia membra recreantur, & firmiora redduntur ad concoquendam materiam morbi: sed sic est, quod vinum cum pane pertinet ad victum plenum: ergo cum victu pleniori aegri non peccabunt.

Respondemus, Alexandrum loqui de febricitantibus debilibus: atque intelligere de vino tenuissimo, & in pauca quantitate, vt reficiantur vires debiles ne cadāt.

#### APHORISMVS SEXTVS.

**E**X TREMIS morbis, extrema exquisitè remedia optima sunt.

Egit in duobus superioribus aphorismis de victu tenui exquisitè, qui est medius inter tenuem, & extremè tenuissimum. Concludit in superiori aphorismo, hunc victum tenuem exquisitum esse fallaciorem, quàm sit victus paulò plenior: quiquidem aphorismus est verissimus & falsissimus: verissimus in debilibus, quia in debilibus semper debemus inclinare in victum paulò plenorem: falsissimus in robustis: quia secundo de ratione vic. in ac. 37. loquens de robustis dixit, in acutis semper esse studendum ciborum detractio.

In hoc verò, & sequenti aphorismo agit de victu tenuissimo, qui conuenit morbis extremis, qui sunt perperacuti, qui terminantur in primo quaternione, & peracuti, qui terminantur in secundo quaternione, qui parimodo vocantur morbi extremi: *id est 1a & 2a.* Particula *de* est coniunctiua, non inuenitur tamen in cod. Galeni: sed ferè in omnibus alijs.

Continuatur aphorismus hoc modo. Postquam egit superius de victu tenui exquisitè: modo se conuertit ad victum tenuissimum, qui est vel ieiunium, uel mulla: ieiunium dicitur victus extremè tenuissimus: mulla uerò dicitur tenuissimus non extremè.

Hic aphorismus propositus est ab Hippocrate propter uictum morborum peracutorum: tamen potest applicari morbis longis, remedijs magnis, chirurgicis, pharmaceuticis, & rebus politicis. Applicatur morbis longis, quia ipse Galenus 5. meth. cap. 15. illum applicat sputo sanguineo, quod fit ex erosione, qui affectus est diuturnus. Ibi enim reijciens Erasistratum, qui putabat in omni morbo curam à leuioribus incipiendā, inquit „ Vbi impendit vitæ erosio, sicuti in sputo sanguineo ex erosione, est a ratione alienum à leuioribus remedijs exordiri: quia extremis morbis extrema remedia conueniunt: ibi. n. proponit Galenus tria remedia extrema in sputo sanguineo conuenire: quorum primum sunt purgantia medicamenta. Secundum medicamen quod dicitur dispermaton, quod præcipue fit ex sem. papaueris: Nos verò & obiter huius loco vitimur pillulis de cynoglossa feru. ulum vnum, alternis diebus post cenam. Tertium sunt cerata ex thapsia, quæ bregmati applicantur: Nos verò huius loco vitimur sinapismo ex duabus partibus caricarum pinguium, & ex vna parte sem. sinapis cum aceto acerrimo, quo excitantur in pericraeco & rubor, & pruritus.

Applicatur aphorismus extremis remedijs chirurgicis, & pharmaceuticis: inter quæ numerantur à Galeno 2. aphorism. 29. phlebotomia & purgatio. Sed præcipue per extrema remedia pertinentia ad extremos morbos intelligit hæc tria, nempe san-



sanguinis euacuationem vsque ad animi deliquium. Secundum, potum frigida. Tertium ieiunium.

Potest quoque applicari aphorismus rebus Politicis, sicuti applicatur à Cicerone primo de officijs, vbi citat hunc Hippocratis aphorismum, his verbis „ sicuti medici extremis morbis extrema instituunt remedia: ita & nos in maximis rebus maxima adire pericula non debemus timere.

Præterea norandum, hunc aphorismum tribus principijs esse suffultum. Primum quod contraria contrarijs curentur. Secundum quod cōtraria inter se sint extrema. Tertium quod illud, quod vni extremo aduerfetur, sit vnum & nō plura: quia extremis morbis remedia extrema, & non media exquisitè aduerfantur.

Quo ad primum, quod contraria contrarijs tollantur est in arte medica tamquam axioma. Quod aliquo modo confirmatur ab Hippocrate lib. de flatibus. c. 6. dum tradit medicinæ definitionem, quod scilicet sit additio, & ablatio, vbi ait „ sicuti cibus tollit famem, & potus sitim: sic euacuatio tollit repletionem, quæ omninō inter se sunt contraria.

### QVÆST. XXIII.

*Quomodo contraria vi morbi, & remedia sint duo extrema.*

**Q**UOD verò contraria sint inter se extrema, & morbi, & remedia sint duo extrema, omnes intelligunt: sed quomodo sint extrema, non omnes percipiunt.

Aristoteles 10. metaph. tex. 13. dicit cōtrarietatem esse maximā differentiam eorum, quæ sunt sub eodem genere: neque Aristoteles distinctè per hanc definitionem declarat cōtrarietatem: quia per cōtrarietatem potest intelligere oppositionem priuativam, sicuti intellexit 1. Physic. dum dixit: in omni genere vno dari vnam primam contrarietatem, sumendo videlicet cōtrarietatem pro oppositione priuativa.

Themistius 1. Physic. circa tex. 47. distinctius definit contraria, quod scilicet contraria sint illa, quæ extremos margines obtinent.

Diuus Thomas in meteorologicis adhuc clarius dicit, contraria esse duas formas in eodem genere distantissimas: ideo contrarium, quod sanat, debet esse extremum respectu morbi, & non medium.

Demum Galenus in arte med. cap. 89. magis ad propositum nostrum de his loquens ait, remedia morbis debere esse quidem extrema, sed æqualia in gradu (per hanc definitionem ostenditur differentia inter Empiricos Alchimistas, & dogmaticos) itaut si affectus præter naturam sit calidus in tertio gradu, remedium debeat esse frigidum in tertio gradu: quia medici officiū nō est vincere, sed moderari, & attemperare, q̃ Alchymistæ non intelligunt: quia volunt vincere remedio potētiori, & non æquali. Quod verò ex Galeno remedium debeat esse æquale: ibidem subdit „ si affectus sit in parte corporis profunda, tātò frigidius eligendum est remedium, quantum, postquam peruenerit ad locum affectum, sit æquale in gradu.

Hinc Galenus lib. de const. artis medicæ cap. 12. inquit, si recessus à statu naturali sit maximus, maximus quoque debeat esse retrocessus, qui fiat per eandem viam, sed progrediendo modo opposito versus mediocre, & nequaquam versus extremū: quia si progredieremur versus extremum introduceremus cōtrariam agritudinem. Hinc actio, quæ fit à bonis remedijs, non fit à maiori, sed ab æquali opposito: quia sic reducit ægrum ad symmetriam, siue ad sanitatem: quia sanitas nihil aliud est, quam symmetria: si affectus est calidus in secundo gradu, remedium debet esse frigidum in secundo gradu, sed non vt reducat ad secundum gradum frigiditatis: sed vt ex secundo gradu caliditatis, & secundo frigiditatis fiat symmetria, & equalitas: ideo valde errant Chymici: dum putant malas temperaturas frigidas auferri posse spiritibus calidissimis, qui vincunt morbum, & naturam, intemperies contrarias introducentes.

Quod verò remedium debeat esse æquale, patet quoque ex tertio de simp. medicina cap. 12. vbi habet Galenus hanc sententiam „ si remedium est plus, protinus nocet: si minus non sanat, nisi longo temporis cursu. Quare colligimus in facien-



da medicina hæc duo esse obseruanda, primum, vt remedium cōueniat ratione morbi: quod certè conueniet, si fuerit contrarium æquale progrediens ad medium. & non ad extremum: secundum vt conueniat ratione virium totius, & partium.

Hinc valde errant illi empirici, qui vtramque conditionem transcurrunt. At, vt aliqua exemplorū luce hoc innotescat, libeat aliquod illorū erratum proponere. Dum volunt sanare pedes gelidos eorum, qui penniues iter fecerunt, ijs quæ actū calefaciunt, errant: quia illud pedum frigus volunt vincere: quibus calefactis deinceps (proh dolor) pedes facessunt in gangrenam: cur hoc? quia per actū calida resolunt calidum natium pedum, nec vident remedium per experiētiā cognitū, quod est, pedes immergere in aquam è profundo putei recenter haustam: quæ hæc duo afferūt beneficia: primum reducit ad mediocrem pedem congelatū: deinde cōseruat vires partis, quibus peractis, si bidui spatium vino nigro pedes abluātur, liberantur.

Parimodo quidam pro febre ardente importunè præbent frigidam, videlicet in debilibus: nec vident, frigidam calorem naturalem vincere, & debiles interimere, quod non accidit in robustis: quia vt frigida, nisi aliquid aliud impediāt, illos maxime iuuat. Similiter dum Chymici vtuntur oleo, vel spiritu vitrioli vincunt calorem, & introducūt frigiditatem immoderatam. Quod verò hic spiritus sit valde frigidus experientia patet, proijcendo ipsum super carbonem accensum, quem adeo illum extinguit, vt vix iterum ignescat.

#### Q V Æ S T. XXIV.

*An vnum contrarium vni tantum sit contrarium.*

**Q**UOD VNŪ CŌTRARIUM VNI SOLI SIT CONTRARIUM PRIMÒ PATET EX GALENO 9. meth. 12. vbi habet hæc verba „ Conferētis indicationē semper esse vnum: deinde 11. meth. 13. ait, vnā semper dari ex quaque re indicationē: lib. de opt. sect. ad Trasylb. 45. dicit vnum indicare vnum: quia vnum vni aduersatur, intelligendo respectu vnius, & eiusdem, ad idem, se-

cundum idem, eodem modo & eodem tempore: quia vnum, respectu diuersorum potest indicare centum indicata: vnica enim est febris putrida, tamen Galenus 11. meth. 13. in eacurāda proponit plures indicationes respectu diuersorum, quæ desumūtur vel ab humorum copia, vel crassitie, lentore, prohibita perspiratione, putredine, & febre.

Demum Aristoteles primo Cæli hoc principio suffultus, quod vnum cōtrarium vni sit contrarium, inuenit morum circulares per se primo conuenire Cælo. Cælūque esse quintam essentiam, & perpetuo motu circulariter moueri, ita vt non sit timendum, vt dicit Aristoteles 9. metaph. tex. 17. quod Cælum aliquando ster.

Quoad verba aphorismi. Nonnulli per extremos morbos intelligunt lethales primo falluntur: quia Galenus 2. aphorismorum 29. asserit, desperatos non esse curandos, sed solo prognostico relinquendos. Deinde Galenus 11. metaph. 9. habet hæc verba „ In quo omnino desperata salus est, imprudentis consilij fuerit infamare præsidia, quæ multis alijs fuisse salutis. Præterea Hippocrates primo præfag. 4. protulit hanc sententiam „ morituros prænoscentes, prænunciansque culpa uacabit. Postremò lib. de const. artis medicæ cap. 16. habet hæc verba „ Infontem fore medicum, & ab omni mortis culpa fore immunem, si morituros ægros prænunciauerit. Quare si vera sunt hæc præcepta, nō est credendū per extremos morbos Hippocratem intelligere lethales: quia morbis lethaliibus neque remedia extrema, neque leuia conueniunt.

Dicimus nos per morbum extremum intelligere morbum magnum, & uehementem, & præcipuè perperacutum, & peracutum: quibus morbis conuenit uictus tenuissimus: quia victus tenuissimus est remedium extremum, de quo intelligit Hippocrates.

Præterea per extremum morbū intelligere possumus morbum magnum & uehementem: magnus verò morbus vel ratione dignitatis, vel ratione propriæ essentię, vel ratione cacoethię, vel ratione læsionis partium præstantium, quæ omnia indigent declaratione.



Morbus magnus ratione dignitatis solet exemplis illustrari in vteri suffocatione, dum efficitur à semine corrupto: ex Galeno lib. 6. de loc. aff. 5. vocatur præfocatio vteri facta à semine corrupto morbus magnus ratione dignitatis, quia semen est dignius sanguine menstruo: Præfocatio verò à sanguine menstruo non vocatur à Galeno magna ratione dignitatis: symptomata sanè longè seuiora sunt in vteri præfocatione facta à semine corrupto, quam à sanguine menstruo suppresso, & corrupto: ideo remedia magis extrema conuenient in præfocatione ex semine, quam ex sanguine, quia in præfocatione ex sanguine, euacuatio sanguinis ex saphana sæpè tollit symptomata illius effectus: in præfocatione verò ex semine, sanguinis euacuatio parum vel nihil iuuat, sed confugiendum est (omisso verò remedio, quod omnes norunt) ad mitridaticam confectionem, & in seuissima præfocatione ad ceratum mercuriale applicandum parti hippogastricæ: quo nos interdum feliciter vtimur & ad alia maiora ex mercurio composita.

Parimodo Galenus loquens de morbo magno ratione dignitatis 3. de tuen. sanit. cap. 9. hoc exemplo illum declarat, si aliqua pars esset contusa, ac materia excrementitia constitueret in illam partem, apostemataque efficeret, dicit, si vtrique affectio pari intervallo à naturali statu recederet, curâ esse exordiuendam à phlegmon, quia phlegmon est magis dignitate pollens.

Similiter febris pestilens, quæ fit à sanguine corrupto dicitur morbus magnus, & vehemens ratione dignitatis: quia est magis vehemens, quam febris ardens, quæ fit à bile: morbus maior est, qui fit à sanguine corrupto, quam qui fit à bile: quoniam quod amicum est, dum corrumpitur, magis naturæ aduersatur: quia quod amicum est, dum corrumpitur, vertitur in contrarium positiuum: quod est venenum verè contrarium naturæ nostræ, quod de aliis humoribus dici non potest. Quando igitur morbi sunt magni ratione dignitatis, tunc remedia debent esse extrema exquisitè, vt dictum est superius.

Quo ad morbum magnū, & extremum ratione propriæ essentiae, dicimus illum

esse, qui est multi lapsus, sicuti est magna aliqua inflammatio, vbi cūque sit; vel magnum aliquod vulnus, vel vlcus, sit in pedibus, vel coxis à visceribus distantibus, vel in quavis alia parte non præstanti.

Insuper datur morbus magnus, vehemens, & extremus ratione cocoethiæ id est mali moris: sicuti est febris maligna, quæ ex omnium opinione inter acutos collocatur: cuius cacoethiæ signa à Galeno proponuntur lib. 3. de prælag. expul. cap. 4. quorum primum est, quod pulsus à naturali statu recedere non videatur. Secundum quod egri fateantur febrem non percipere. Tertium quod vrina reddatur similis naturali. Quartum additur ab Hippocrate & Galeno 3. de ratione vic. in ac. 14. quod est, si post defectiones biliosas calor vehemens reddatur, dicunt esse signū malignæ febris. Sed in explicatione 12. aphorismi quamplurima malignæ febris signa proponemus.

Demum datur morbus magnus, siue extremus ratione partium principum, sicuti est vlcus pulmonis, aut ventriculi, licet per exiguum sit, quod si in coxis, vel brachijs esset, vix morbus dici posset: tamen in pulmone, in corde vel hepate mortem prænūtiat. Hanc distinctionem morbi magni in tres differentias proponit Galen. 4. meth. 6. Nos igitur per morbos extremos ab Hippocrate propositos intelligimus peracutos: dicimus tamen aphorismū posse ampliari ad morbum magnum aliquem ex his quattuor modis declaratis, quibus magnis morbis, magna, & extrema remedia conuenire possunt.

„ αἱ ἐξ αὐτῶν διακρίσεις, id est extremæ curationes.

In tex. Græco non leguntur extrema remedia: sed extremæ curationes: quia Græca dictio est therapia, quæ significat curationes, & non remedia: remedia tamen sunt instrumenta curationis.

Curatio sumitur tribus modis. Primò pro depulsione omnium affectuum præter naturam: sint morbi causæ, vel symptomata: secundum hanc significationem lib. 9. meth. 15. dicit, affectū præter naturā indicare curationem. Secundò sumitur curatio pro depulsione morbi habentis causam, qui partim fit, & partim factus est: sicuti



est febris putrida, & omnes morbi, qui dependent ab aliqua causa antecedenti. Tertiū sumitur curatio pro depulsiōe morbi facti, qui non amplius sit, nec à causa dependet: sicuti est febris ephimera, & hectica. In hoc loco Hippocrates per Therapias id est per curationes intelligit curationes in communi, quæ sunt per contraria, ut colligitur ex Galeno 9. meth. 15. ubi dicit primam indicationem sumi ab effectu præter naturam, qui indicat contrarium: subdit contrarietatem esse illam distantiam, quæ est ab affectu naturali ad affectum præter naturam.

Sed addit Hippocrates *ἡ ἀντιθεσις* id est exquisitè: quia si morbus est calidus in secundo gradu, exquisitum remedium debet esse frigidum in secundo gradu: & sic de alijs: si morbus est extremus & magnus, magnum & extremum debet esse remedium.

Capiuaceus in hoc loco diuidit remediū magnum in absolutū & respectiū: quæ diuisio non est ex natura rei: quia magnū & parū ex Aristotele sunt relatiua vera, quæ dicuntur secundum esse, & non secundum dici: dicitur enim formica magna & mōs paruus, ut dicit Aristoteles in predicamēto relationis: imò dici potest formica maxima, & torus terræ globus minimus, & tamquam punctum impastibile respectu primi mobilis: quare implicat dicere, remedia esse absolutè magna, quia semper dicentur magna respectu remedium inferiorum.

Si de magnis remedijs loquamur, Galenus 2. aphorismorum 29. proponit duo remedia, quæ appellat magna, videlicet purgationem, et phlebotomiam: in hoc loco ieiunium vocatur remedium magnum. Purgantia magna quæ sunt magis vehementia & quæ collocantur in primo ordine sunt veluti antimonium, colocynthide, catapucia, elaterium, esula, gumigutæ, scamoneum, & eleborus.

Medicus verò rationalis, cuius officium est reducere ad symmetriam, admodum raro his magnis, & efficacissimis vtitur.

Deinde dantur remedia minora, quæ sunt magis in vſu, sicuti sunt agaricus, hermodactilus, turbit, rhabarbarum, gra-

tiola, & alia id genus. Sub his adhuc sunt minora, quæ licet alicui possint esse magna, & extrema, alteri tamen possunt esse leuia; quia nullum potest esse remedium magnum, quod alicui non sit leue.

Sub his adhuc dantur minora, ut infusio rosarū, sena, manna electa, quæ partim sunt purgantia, partim lenientia: immo tam varia inueniuntur corpora, ut alicui hæc sint magna, & vehementia, atque alicui leuia & blanda lenientia.

Sub his adhuc sunt leniora, ut cassia, tamarindi, cremor tartari. Deinde adhuc magis leuia inueniuntur, ut oleum amygdulæ dulce, Laccocctum cum saccharo, quod Iulii vocant panellam, vel cum iure pulli.

Demum leuissima proponitur lenientia à Galeno quinto de tuen. san. cap. 9. si curati sunt pruna damascena cum melle macerata, vel cum mulso: inter herbas, metcurialis, matina brassica, cnicus in pillula: & resina therebentina, quæ omnia citra noxam alium leniunt.

Phlebotomia est remedium magnum, si fiat per sec. venę cubiti: deinde est saluatiua sectio, cucurbitula, vel hirrudines, quæ hemorrhoidibus, vel alijs venis applicantur. Sub his sunt pili suiles, qui immixti inter narium pinas leniter cōprimendo sanguinis paucillum euacuant. Sub his sunt illa, per quæ euacuatur sanguis per hemorrhoidas leniter illas comprimendo sicuti sunt squarina, vel piscis canis coriū vel tella aliqua aspera, vel applicando folia ficū, vel leniter ea comprimendo, vel idem faciendo cum folijs boragin 3, quorum vſu sanguis commodè egreditur.

Remedia tamen magna sunt hæc tria, purgatio electiua, phlebotomia, & ieiuniū, de quo præcipuè intelligit Hippocrates in aphorismo. Sed præter hæc tria propositi aphorismus potest ampliari ad alia remedia longè maiora, quæ varijs affectibus præter naturam cōueniunt: sicuti est illud propositum ab Hippocrate 7. aphor. 45. dū loquitur de hepatis abscessu his verbis „ Quibus per durū iecur adurit, si purum pus effluat, & album, salus sunt: si verò qualis amurca profluat, intereunt. Omnia remedia, quibus videntur nostrares in hoc abscessu hepatis sunt minora, & vana quidem.



dem. quia solum hoc propositum ab Hippocrate in aphorismo inter extrema iuuare potest. Nostrates relinquunt hunc casum tamquam desperatum: atque reuera eius cura neque in Galeno, neque in alijs Authoribus (quod sciam) inuenitur. Nos autem pro extrahendo hoc pure proposuimus instrumentum commotum, & tutum in nostris commetarijs Auicennae: lumen tamen est cura cum protestatione, ne si pereant, in medicum culpam trahant: pereunt enim, si pus appareat ut amurca.

Similiter dantur alia remedia extrema, quae non excluduntur ab aphorismo, sicuti est austro, & sectio, quae sit inter tertiam, & quartam costam pro extrahendo pure in empyemate, quod magnum remedium proponitur ab Hippocrate lib. 3. de internis affectibus, ubi loquitur quoque de hydrope thoracis. Nos vero tutius tertiam costam terebella perforando aquam euacuamus: in costae enim perforatione nervi, venae, & arteriae musculorum intercostalium non sunt. Vel vitrum instrumentum ex nostra inuentione pro euacuanda aqua hydropicorum faciendo paracentesim inter tertiam & quartam costam. Vel si aqua est in abdomine per umbilicum, de quo etiam instrumento in commentarijs nostris Auicennae egimus, eiusque iconem proposuimus. Plurima alia, quae sunt remedia extrema, quae tuto, & feliciter administrantur per instrumenta, ipsorum icones in eodem libro descripsimus.

Sed ut paucis progrediamur, remedium magnum, & extremum in morbis maximis, & extremis ex Hippocrate est ignis 7. n. aphor. vltimo dicit, Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat, quae ignis non sanat sunt immedicabilia. Vltiones sunt remedia extrema, ut in sphacelo, gangraena, & in demorsis à cane rabido.

Per extrema exquisitè intelligit illa contraria, quae sunt aequalia in gradu, hisque vitantur, ubi impendet vitæ periculum. quia tunc morbus est exquisitè extremus: quo casu medicus dogmaticus non debet imitari Erasistratum, qui incipiebat à paruis remedijs, contra quem Galenus 5. meth. cap. 15. his verbis inuehitur, Si parua

nihil profecerint, agredienda sunt maiora: nam in morbis, in quibus periculum non impendet, vera ea opinio est: at ubi moriendum agro prorsus est: si phthoe semel ager detineatur, alienissimum à ratione est à minoribus remedijs inchoasse. Maiora igitur remedia debent esse exquisitè opposita, id est aequalia in gradu, & non in numero: sicuti affectui calido in tertio, remedium æquale in gradu debet esse frigidum in tertio, si exquisitè opposita esse debent: in numero verò dici potest frigidum in secundo, quod multoties exhibitum in morbis leuioribus temporis cursu sanare potest, quamuis hæc non sint exquisitè extrema. Ex alia parte aphorismus non videtur omnino verus ob dubia, quae occurrunt.

Prima dubitatio in Hippocrate videtur contradictio manifesta: quia in aphorismo superiori in acutis laudat victum paulò pleniorē: in hoc verò aphorismo, in quo similiter agit de acutis, dicit, extrema esse applicanda remedia: per morbos intelligit acutos, & per remedia ex omnium consensu, intelligit ieiunium: ergo contradictio videtur manifesta.

Respondetur in aphorismo superiori considerasse agros acuto morbo correptos cum virtute languida & debili: in quo casu in tenui victu peccant agroti: in hoc verò aphorismo considerasse morbum cum virtute valida, & robusta, quae in morbo acutissimo non indiget cibo: quia morbus ut morbus semper cibum prohibet.

Secunda dubitatio: non videtur quod victus tenuissimus conueniat extremis morbis: quia dantur morbi extremi, qui non tractantur victu tenuissimo: Galenus enim 5. meth. cap. 15. vult spurum sanguinis cum imminete pulmonis erosionē esse morbum extremum, tamen non tractatur victu tenuissimo: ergo non omnes morbi extremi, extremis remedijs sanantur.

Respondetur, morbum extremum duplicem esse, vel esse simpliciter extremum, vel esse extremum in suo genere: Hippocrates in hoc aphorismo intelligit de morbis perperacutis, qui simpliciter sunt extremi, & non de extremis in suo genere: omnis enim morbus diuturnus, si deploratus sit.



sit extremus est in suo genere, vt deplorata phthisis, deplorata pleuritis, hectica deplorata, & similes sunt, qui dicuntur extremi in suo genere.

Tertia dubitatio: Hippocrates in tertio aphorismo huius sec. dicit, esse euacuandum quatenus natura fecit. Idem confirmat aphorismo 23. ergo non semper conuenient remedia extrema, quamuis morbi essent extremi.

Auicennas 4. primi cap. 1. sic determinat hanc dubitationem: si vires tolerat, semper conuenire remedia extrema: si non tolerant conuenire leuiora. Galenus verò 5. meth. 15. sic respondet: in morbis in quibus periculum non imminet à leuioribus esse exordium: vbi verò imminet vitæ periculum, ait, alienissimum esse à ratione, à leuioribus inchoasse.

Quarta dubitatio: aphorismus Hippocratis videtur reluctari experientia: quia in febribus ardentibus, quæ pertinent ad extremos morbos, vtimur leuissimis refrigerantibus: sicuti sunt iuscula cichoreæ, boraginis, acetosæ: sed hæc non sunt extrema, nec æqualia feбри inchoanti.

Respondetur, quod remediū est æquale morbo extremo dupliciter, vel quia sit oppositum æquale in gradu, vt est aqua frigida opposita æqualis in gradu feбри ardenti: vel balneū frigidæ, quo Galenus 10. meth. ult. sanauit hecticam tertij gradus, seu, vt melius dicā, sustulit solum calorem, relicta siccitate, vt remedium extremū, quod conuenire possit extremo calori, sit aqua frigida, quæ æqualiter in gradu opposito respicit extremum calorem: vel dicimus remedium esse æquale oppositum in numero, quod non semel, sed multoties exhibitum reddat æquale in gradu, quod probatur hoc exemplo: vnico ictu mallei excutari potest lapis, eadem tamen per exigua excavatio fieri potest à mille aquarum guttis cadentibus, & percutientibus ipsum lapidem: dicimus omnes illas guttas esse æquales in virtute vnico ictui mallei: parimodo leuiora remedia multoties exhibitæ erunt æqualia ijs remedijs, quæ sunt æqualia in gradu, quæ semel exhibitæ sanare possunt, sicuti est portio frigidæ quanta vno haustu fami potest, febrem

ardentem sanare potest.

Quinta dubitatio ex Galeno 5. meth. 15. habetur, vbi imminet vitæ periculum, conueniunt remedia extrema, vbi non imminet, leuiora: ergo non semper extremis morbis extrema remedia conuenient, quia in morbis peracutis, in quibus non imminet periculum, conuenient quoque remedia leuiora.

Respondetur, quod in peracutis semper imminet periculum: deinde dicimus Hippocratem per extremum remedium precipuè intelligere ieiunium, quod solum in exacte peracutis (dummodo vires persistent) est extremum remedium. Præterea extremis morbis vnum remedium extremum, & æquale solum proportionatur: sed hoc extremum est æquale vel in gradu, vel in numero: quod in numero multoties exhibitum potest dici æquale in gradu: quia non differt specie ab æquali in gradu: ambo enim vnum faciunt remedium. Hinc rectè Galenus 9. meth. 12. conferentis indicatum semper esse vnum, 11. meth. 13. & lib. de opt. sedā similiter dicit vnum indicare vnum, & non plura: ideo extremis morbis extrema conuenient remedia, quæ extrema subdividuntur in extrema in gradu & extrema in numero.

Sexta dubitatio: extremis morbis lethali- bus neque remedia extrema, neque leuiora conueniunt, quia ex Galeno 2. aphorismorum 29. desperati solo prognostico sunt relinquendi, ne infamentur præsidia: ergo aphorismus Hippocratis non est absolute verus, quod extremis morbis, extrema remedia conueniant. Præterea videtur esse in Galeno quædam contradictio: quia 10. meth. cap. 10. etiam auctoritate Tucididis habet hæc, Quæto satius est aliquid nonnulla fiducia, vel cum periculo facere, quam spe adempta certo perire: tanto profectò satius est potentibus auxilijs pugnare, quam nihil agere: ergo desperati non sunt relinquendi. Insuper Celsus ait, melius est anceps experiri remedium, quam nullū: aggedimur tamen curam cum protestatione præiudiciando videlicet astanubus futurum periculum: eadem nos admonet Ga-



lenus 12. meth. 3. ergo desperati non erūt relinquendi.

Respondemus pro Hippocrate, aphorismum habere locum, vbi spes non est omninò adempta. Pro Galeno vero nonnulli respondent, dum prohibuit, desperatos esse curandos, non absolutè voluisse esse relinquendos: Sed tantum prohibuisse magnorum remediòrũ vsum, ne infametur ars, solum seniora remedia esse adhibenda: quia si deinde æger ex humanis decedat, propter leuiora remedia non infamabitur medicus.

Hæc responsio primò reiicitur: quia Galenus 2. aphorismorum 29. absolutè dixit, desperatos esse relinquendos. Deinde Galenus 10. meth. 4. proponit curationem hæcticæ tertij gradus, quæ est morbus omninò desperatus: vsus est in illa febre balneo aquæ frigida, quod sanè est, remedium maximum, & non leue.

Respondemus Nos, morbos desperatos esse duum generũ, alios ita desperatos, vt nullus vnquam euaserit, & tales absolutè relinquuntur solo prognostico: alios verò esse ferè semper deploratos, itaut interdum aliquis euaserit: sicuti sunt hæctici tertij gradus, qui hoc vnico remedio, nempe balneo frigida, licet rarissimè ad aliquam lubricam sanitatem redacti sũt: Auicennas tamen vbi agit de phthisi dicit, mulierem quandam fuisse remedijs præseruatam ab hoc morbo per spatium 23. annorum: ideo tales non sunt relinquendi, sed cum protectione curandi, vt executus est, Galenus (vt refert) 10. meth.

Sed in prognosticando nõ est hoc præceptum obliuioni tradendum: quod ad medicum honorem, & artis admirationem magis referat prædicare mortem in morituris, quam salutem in conualuturis.

Septima dubitatio: non videtur, quod extremis morbis extrema conueniant remedia quia ab agente æquali in gradu opposito nulla potest actio prouenire, quia agens, vt vincat, debet superare virtutem passi, vt in physicis ab Aristotele p. obatum est.

Respondetur: extrema remedia non vincere morbum extremum: quia si vincerent introducerent contrarium mor-

bum: sed extrema remedia attemperare, & moderari: sic remedium frigidum in secundo gradu non solum tollit morbum calidum in primo gradu: sed introducet morbum frigidum: quare actio remedium non dēt esse corruptiua, sed contemperatiua. Quādo Aristoteles dixit ab agente æquali non prouenire actionem, intellexit de actione vincente ipsum passum nouamque formam in ipsum passum introducente: nos verò medici intelligimus de actione contemperatiua, vel reducēte ægrum ad æqualitatem, & ad symmetriam: quo peracto natura ipsa, & non medicus est ille, qui immediatè morbum propellit.

Octaua dubitatio, hæctica febris est morbus extremus, tamen extremum remedium idest ieiunium, de quo intelligit Hippocrates in hoc aphorismo non conuenit hæcticæ feбри: quia Galenus vult, vt hæctici parum & sæpè nutriantur.

Respondetur: Hippocratem in hoc aphorismo præcipuè intelligere de morbis extremis, qui statim habent extremos labores, & tales sunt perperacuti, de quibus loquitur etiam in 7. aphorif.: hæctica verò non est huiusmodi.

Cæterum, quia hic aphorismus potest ampliari ad morbos longos, vt patet ex Galeno 5. meth. 15. ideo hæcticæ feбри conuenient aliqua remedia extrema, sed non omnia: illud verò remedium extremum quod conuenit hæcticæ feбри ex Galeno 10. meth. 10. est balneum frigida, quo reduxit quendam patientem hæctica tertij gradus laborantem ad meliorem statum: atque licet remedium hoc sit valde periculosum, maluit Galenus (vt loco citato refert) potentissimis præsidij aliquid facere, quam spe adempta permittere, vt æger certò pereat.

Nona dubitatio: non videtur, quod extremis morbis conueniat remedium extremum, quia Galenus 9. meth. 3. proponit casum cuiusdam iuuenis palestrici, qui patiebatur synochum putridam, quæ iudicata est quarta die. Galenus in illo casu vsus est cremore prissanæ, qui pertinet ad victum exquisitè tenuem, qui conuenit acutis exactè, & non perperacutis: ergo



morbo extremo non conueniet remedium extremum, quod est ieiunium: febris illius iuuenis fuit morbus perperacutus, quia quarta die fuit iudicatus.

Respondetur, casum illius iuuenis, ut ibidem refert Galenus, fuisse sinochum putridam perperacutam quidem: cui noluit Galenus 1. die mittere sanguinem, quia fortasse cibus non erat illa die in ventriculo concoctus: euacuauit tamen octaua hora noctis ante tertium diem sanguinem usque ad animi deliquium: facta euacuatione sudauit, & dormiuit usque ad meridiem: deinde transacta die tertia exhibuit ptisanæ cremorem, quia erat sanatus, quo tempore poterat quoque dare cibum pleniorē, & sic nulla est dubitatio.

Decima dubitatio: Galenus 12. meth. 6. in febre acuta cum syncope, quæ est morbus extremus, & perperacutus exhibet victum plenum videlicet vitellos ouorum, deinde galorum testiculos, alicam, & panem cum fructibus acerbis, demum cerebella porcellorum cocta cum porro, & anetho, & carnes ipsas, ergo extremis morbis non conueniet extremum remedium idest ieiunium.

Respondemus, aphorismum esse verum supposita virtute robusta: Galenum verò loco citato locutum fuisse de febre acuta cum syncope, quæ est præceps omnium virium lapsus.

Præterea syncope duplex est, alia fit à suffocatione, in qua statim facienda est euacuatio per epicrasim, & pro hac proponitur victus tenuissimus: alia verò fit per resolutionem, in qua meatus sunt constipandi, ne spiritus omnino dissoluantur, quod fit victus crasso: nempe virellis ouorum, alica, cerebellis porcorum, quæ generant alimentum crassum, viscidum, & frigidum.

Demum pane cum succis acerbis utimur, ut melius meatus constipentur, ne spiritus omnino exhalent: de hac syncope intellexit Galenus loco citato, cui ratione virium debilius nullo modo potest conuenire remedium extremum idest ieiunium.

Vndecima dubitatio: Hippocrates in

tertio aphorismo declarato damnat extremam sanguinis euacuationem: quia vasa reducerentur ad subsidientiam, & ager interiret: ergo si hæc extrema euacuatio non debet fieri in Athleticis, qui & sunt robusti, & indigent hac euacuatione, tantò minus extremis morbis conueniet.

Respondetur, Hippocratem in hoc aphorismo per extrema remedia intelligere extrema proportionata ratione morbi, et ratione virium: ideo in proposito aphorismo inquit, eousque esse euacuandum, quousque natura fert: 4. verò de ratione vic. 19. vult Hippocrates morbum vehementem indicare sanguinem esse mittendum, hæc lege, ut vires permittant: Si vires sunt robustissimæ conuenit ieiunium, ac illa extrema sanguinis euacuatio, quam vires ferre possunt.

Duodecima dubitatio: Galenus in commento dicit, terminum morborum peracutorum exactè esse tertium diem: Hippocrates tamen 5. aphorismorum 6. loquens de quodam morbo peracuto exactè idest de conuulsione dicit, terminum esse quartum diem his verbis, „ Quicumque distentiones, seu conuulsiones corripiuntur, in quattuor diebus pereunt: si verò hos effugerint, sani fiunt: ergo peracuti exactè possunt terminari quarta die: & non tertia, ut dicit Galenus in commento. Immo Erasimus correptus morbo peracuto exactè iudicatus fuit quinto die: ergo sciri non poterit, quisnam sit extremus morbus, & per consequens quanam debeant esse extrema remedia: ergo aphorismus imperfectus.

Respondetur ex Galeno 4. aphorismorum 59. illum esse morbum exactè peracutum, qui potest iudicari tertio, quarto, vel quinto die, qui est ultimus terminus omnium peracutorum exactè, & omnium extremorum morborum, de quibus intelligit Hippocrates in hoc aphorismo.

Decimatertia dubitatio: Hippocrates 2. de ratione vic. tex. 1. agens de pleuritide, quæ est morbus extremus, exorditur à fomento, sed sic est quod fomentum est remedium leue, & pleuritis est extremus morbus: ergo extremis morbis non conuenient extrema remedia.

Respondetur, pleuritidem esse diuini ge-



generum: aliam leuem: alia verò magnam: leuis fuit in Anaxione: ideo in ipsa primo vltus est fomentationibus, deinde sanguinem euacuauit. In pleuritide verò magna, & extrema semper exordiantur Hippocrates & Galenus à sanguinis euacuatione, vel à purgatione, quæ sunt duo magna, seu extrema remedia.

bi esse indulgendum, quantum morbus recedit ab extremis morbis: de qua secunda parte paulò infra.

Quantum attinet ad primam partem, dum dicit quod victus extremè tenuissimus conueniat illis morbis, qui habent extremos labores, probari potest auctoritate, & ratione: auctoritate videlicet aphorismi sequētis, vbi dicit „ Quando morbus in suo vigore constiterit, victu tenuissimo vtendum: sed sic est, quod morbi peracuti semper sunt in suo vigore: ergo in ipsis semper victu tenuissimo vtendum.

Ratione quoque probatur: quia Galenus in comm. inquit „ tum propter magnas febres: tum propter magnas phlegmasias idest inflammationes, & ardores natura in vigore est maxime occupata coctioni: ideo cibus non est distrahenda: vel vt verbis Hippocratis loquar, victu extremè tenuissimo est vtendum, idest ieiunio. Accedit, quod in vigore cibus facile corrumpitur, inde corruptella auget morbum: quo aucto virtus fit debilior, & minus concoquit, vt colligitur ex Hipp. 2. acut. 48.

Prima dubitatio occurrit, quia non videtur, quod morbi, dum sunt in vigore, sint tractandi ieiunio, quod sic probatur: dantur acuti non exactè, quorum vigor perdurat per tres dies: quo casu ager est valde debilis, & ieiunium ferre nō potest: ergo non est verum, quod in vigore acutorum conueniat ieiunium per tres dies.

Respondetur, vigorem diuidi in tres partes, nempe in anteriorem, in qua solum vigor est in fieri: in posteriorem, quæ est vigor in facto esse, in qua agri sunt reficiendi: quia morbus est victus & superatus à natura: quo tempore cibus commodè dari potest: In mediam, in qua vigor partim est in fieri, partim in facto esse. Per vigorem Hippocrates intelligit vigorem in fieri, cuius tempus est breuissimum, vt vix in non exactè acutis contineat vnus diei spatium: quo casu si vires non sint admodum debiles, ferre possunt ieiunium: Dicimus admodum debiles: quia vbi vires non ferunt: cibi pauillum cum tempore agrotantibus dari potest.

Secunda dubitatio: Hippocrates & Galenus in comm. tenent, non esse cibandum

L in

## APHORISMVS SEPTIMVS.



*BI igitur morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu vtendum est. Vbi verò*

*non, sed pleniorē victum contingit adhibere: tantum cibi indulgendum est, quanto morbus extremis est mollior.*

Diuiditur hic aphorismus in duas partes. Prima inferitur ex superiori aphorismo, sitque hic perfectissimus syllogismus: extremis morbis extrema conueniunt remedia: sed morbus peracutus est extremus: ergo morbo peracuto conuenient extrema remedia. Maior propositio est aphorismus præcedens. Minor probatur ab Hippocrate in prima parte huius aphorismi hoc modo: ille est extremus morbus, qui habet extremos labores, sed morbus peracutus habet extremos labores: ergo est extremus.

Per extremos labores Galenus in comment. intelligit symptomata vehementia, & vehementes accessiones, quæ fieri solent in morbi vigore. Syllogismus est in secunda figura ex duabus affirmatiuis: sed valet, quia maior est conuertibilis, & reducitur ad primam.

*Vbi verò non.* Hæc est secunda pars, quæ continet aliam conclusionem, quæ est hæc: vbi verò non conuenit victus extremè tenuissimus, sed plenior (ait) tantum ci-



in peracutis ob magnas febres, quod præceptum non uidetur tutum, & verum: quia febres magnæ exsiccant humidum substantificum, quod debet absque dubio refocillari. Præterea si febris ut febris prohibet alimentum: ergo omnis febris: ergo & hæctica: sed sic est, quod hæctici sæpè sunt reficiendi.

Respondetur, Hippocratem loqui de peracutis putridis, in quibus abundat sanguis, & in quibus vires permittunt ieiunium. Præterea esto, quod ieiunium ali quod detrimentum afferat, nos tractamus, an maius ex ieiunio colligatur beneficium, quam maleficium: Nos cum Hippocrate & Galeno admittimus (licet ieiunium novum sit) longe maius afferre beneficium, quam maleficium: supponendum enim est in arte medica, quod dictum est à Galeno lib. de opt. secta ad Trasylb. circa finem, & 11. meth. cap. 11. nullum remedium posse impunè administrari, cum omnia adferant aliquid mali: sed quia maius spectatur beneficium, quam maleficium: idcirco tunc remedia esse proponenda.

Tertia dubitatio: inquit Galenus in comm. magnas phlegmasias idest inflammationes prohibere cibum; quod non videtur, quia ex Hippocrate 1. de ratione vic. 47. in pleuritide versus vigorem est augenda sorbitio: sed versus vigorem phlegmasia sunt maiores: ergo phlegmasia non prohibent cibum.

Respondetur, inflammationes esse duum generum: aliqua tales, ut referuntur materiae, seu peccantia excrementa ad unicam expulsionem: sicuti dum apostemata suppurantur: facta enim suppuratione tota euacuatur materia: ista phlegmasia versus vigorem cibum omnino prohibent: vel materię euacuatur per multiplices expulsionem; sicuti in illa pleuritide, in qua sputamina à morbi principio usque ad vigorem euacuuntur, ita ut versus vigorem serè tota materia peccans sit expulsa: tunc phlegmasia versus vigorem non prohibent cibum: immo cum corpus sit excrementis vacuum, cibum aliqua ex parte augendus est. Hinc dum medici plus iusto perturbant agros multis medicinis, & multis modis corpus euacuando à principio

morbi usque ad vigorem, importunè quidè (licet in vigore sit omnino abstinentum à cibis ob rationem propositam) sumus coacti aliqua ex parte agros præter rationem euacuatos nutrire: quamvis satius esset in principio morbi & non in vigore omnia efficere iuxta aphorism. 29. secundæ. sec. 11, si quid tibi videtur mouendum moue in principio: in augmento, & statu quiescendum, quod nostratum plurimi non observant.

Quo ad verba Hippocratis: singula ad examen sunt revocanda. Primum, quid intelligat Hippocrates per morbum peracutum: quid per statim, & quid per extremos labores.

Bresaulus, & plurimi alij putant, Hippocratem intelligere per morbum peracutum non solum morbum exactè peracutum, qui à Barbaris vocatur perperacutus, sed etiam morbum peracutum non exactè.

Primo fallitur, quia Hippocrates in hoc aphorismo intelligit de illis peracutis, qui extremos habent labores: sed tales sunt perperacuti idest peracuti exactè, qui terminantur in primo quaternione, & non peracuti non exactè, qui terminantur in secundo quaternione.

Secundo Hippocrates in hac prima parte loquitur de illis peracutis, quibus convenit ieiunium in toto morbo: sed tales terminantur in primo quaternione: ergo intelligit de peracutis exactè.

Tertio dicit in aphorismo, hos morbos indigere *τῇ ἐξ αἵματος ἀσπασίᾳ*: articulus τῇ indicat ultimum terminum tenuitatis, & talis est ieiunium: ergo intelligit Hippocrates de perperacutis, sicuti sunt illæ anginae, de quibus Hippocrates 3. Progn. ait plurimum dolorem efficere in faucibus nullo apparente tumore, quæ aliquando prima die strangulant.

In his anginis suffocantibus, omnibus alijs remedijs prius expertis, Galenus in introductione cap. 13. Holerius, & ante ipsum Rhasis, Auenzoar, & Avicennas secant tracheam arteriam inter secundum & tertium anulum, quod non sine periculo fit. Nos verò tutius, & felicius vitum instrumento, illud immittendo intra tertium & quartum anulum: ibique detineretur, donec inflammatio superatur: deinde illud



extrahitur nullo vulneris relicto vestigio, atque à periculo strangulatus liberantur dummodo præter anginam pulmo non sit latus: huius instrumenti iconem in commentarijs Auicennæ posuimus .

Quartò Gal. in hoc comm. per morbos peracutos exponit ultra quos nō sunt alij, supplè acutiores morbi: ergo Hippocrates in hoc aphorismo per morbum peracutum intelligit peracutum exactè, qui à Barbaris vocatur perperacutus.

Quo ad dictionem illam (statim) Galenus per statim vult Hippocratem intelligere quatuor dierum spatium: ergo intelligit de perperacutis, qui terminantur in primo quaternione.

Bresauolus inquit, Galenum per statim Hippocratem intelligere spatium quatuor dierum, vel paulo ulterius. Addit Bresauolus Galenum per paulo ulterius intelligere usque ad septimum diem .

Decipitur: quia septimus dies non est paulo ulterius, sed multo ulterius. Dicimus Nos per paulo ulterius intelligere quintū diem, qui pertinet ad perperacutos: quod probatur: quia Galenus 3. de crisib. cap. 4. inquit, morbos peracutos exactè terminari in tertio die, & aliquando quinto die .

Addit rarò terminari in quarto: quia acuti fiunt à bile, & bilis mouetur in die impari: Immo Galenus ibidem dicit, semel tantum vidisse peracutum exactè terminasse in quarto. Refertque Archigenem bis tantum vidisse perperacutum terminatum in quarto: ideo ferè semper vel in tertio, vel in quinto. In quinto quando motus est tardior, ut fuit in Erasino. In tertio quando motus est velocior, ut fuit in Phrenetico, qui in tertio die decessit.

Quid verò intelligat Hippocrates per extremos labores colligimus ex Codice Græco: quia dicit *πóρος*. Latini non habent vocem, quæ contineat tam multa significata, ut hæc vox *pones*, quæ significat labores, & omnia mala, quæ oriuntur à morbis perperacutis .

Primo *πóρος* significat laborem: ideo Hippocrates 2. sec. aphorismorum primo dicit, „ Vbi somnus laborem facit, lethale dicit *πóρος* *πóρος* .

Secundò *pones* significat causam doloris. Hinc Hippocrates in Cranone vocat dolores calidos & frigidos, utiturque hac voce *πóρος* .

Tertio *pones* significat tristem sensum ex Hippocrate 2. aphorismorum 6. dum dicit, quicumque dolentes dolores non sentiunt mens agrotat, per dolentes legitur *πóρος* *πóρος* .

Quartò *pones* significat exercitium, defatigationem, & laborem: sic Hippocrates 2. aphorismorum 16. dicit. Vbi fames, laborandum non est .

Quintò ex Hippocrate per *pones* 2. aphorismorum 48. intelligitur lassitudo, & motus corporis .

Sextò ex Galeno 8. meth. 3. ubi mentio fit de hoc aphorismo inquit, per extremos labores Hippocratem intelligere maximas accessiones, maximos casus, & maximas irritationes. Quare Hippocrates miro artificio vsus est hac dictione *pones*, ut comprehenderet omnia proposita significata, & præcipuè maximas inuasiones, comprehederetque illa, quæ obseruantur in ipsis inuasionibus, qualia sunt calor insignis, dolores, defatigationes, lassitudines, vigilia, conuulsionones, animi deliquia, casus virium, vomitus, difficultas respirandi, & omnia illa, quæ possunt explicari per hanc dictionem *pones*, quæ dictio cum tam multa comprehendat, maximè inferuit aphoristica doctrinæ .

Inde colligimus magna verborum Hipp. mysteria; dum per plura significata verbi æqui uoci strictum sæpè explicat aphorismorum archana: sic aphorismo 10. dum dicit, quæ indicantur & indicata sunt *ἀπλως* quod aduerbium habet tria significata. Primū *ἀπλως* significat integrè: Secundū significat dies pares: Tertium significat nuper inde patet aphorismum amplari secundū tria significata. Primum in quo crisi integra non sit mouendum, vel nouandum: Secundum, quod in diebus paribus non sit mouendum, vel nouandum. Tertium, quod in crisi nuper facta, imperfecta tamen non sit mouendum, vel nouandum: quia Galenus 3. de crisib. cap. 4. dicit, crisis in idem tempus incidere cum accessione: sed sic est quod in accessione abstinere oportet à re-



medijs & à cibis: ratio traditur à Galeno 3. de crisib. cap. 2. vbi ait: in crisi sunt difficiles anhelitus, varij dolores, & plura alia mala, quæ debilitant, ideo parumper expectare oportet, vt aliqua ex parte vires recreentur: maximè propterea miramur Hippocratis ingenium, quo inuenierit vocem explicantem tam multa symptomata, quæ superueniunt morbis perperacutis.

Cicero tamen 2. quæst. Tuscul. reprehendit linguam Græcam, quod vnica dictione multa declaret, proponit exemplum istius vocis (ponos) Hippocrates tamen ad sydera laudibus extollendus est: quia paucis desiderans explicare omnium symptomatum varietatem, inuenit hanc vocem, quam si in thesauris linguæ Græcæ quæsis-  
 uisset, aliam tam mirabilem vocem, præter hanc certè non inuenisset.

Plura relinquuntur querenda pro intelligentia primæ partis: primum an in omnibus morbis perperacutis conueniat victus extremè tenuissimus, idest ieiuniū. Secundum à quibus causis fiant acuti morbi. Tertium an febres semper annexæ sint morbis acutis. Quartum an vigor morbi differat à vigore symptomatum.

### QVÆST. XXV.

*An in omnibus peracutis conueniat ieiunium.*

**P**rima facie nō videtur, q̄ in omnibus peracutis cōueniat ieiunium; quia peste correpti benè nutriuntur: tamen pestis est morbus perperacutus, ergo in perperacutis victus extremè tenuissimus idest ieiunium non conueniet. Præterea Galenus 3. epid. 3. §8. mentionem faciens de famōsa quadam pestilentia testatur, solum illos euasisse, qui sibi ipsis vim inferentes cibum sumebant. Idem quoque mutatus Auicennas 1. quatti tract. 4. cap. 4. dixit, quod in febribus pestilētibz, dum cadit appetitus, cogantur ad comestionem, quia solum illi, qui sumunt cibum in morbo illo sequissimo & acutissimo sanantur. In istis reuera appetitus adeo cadit ob auram pestilētem os ventriculi ferien-

tem, vt potius mortem, quam cibū eligāt. Respondent nonnulli, pestilentiam non esse collocandam in numero perperacutorū: ideo ieiuniū pestilentie non conuenire.

Primò falluntur: quia & pestilentia & febres pestilentes interdum terminantur tertia vel quinta die: quare si natura non est auocanda à certamine cum morbo, ieiunium conueniet: deinde Galenus in febribus pestilentibus præscribit cibum longè pleniorē, quam sit mulsā. ergo ieiunium non conueniet.

Respondemus ad difficultatem: indicationem cibandi principalissimam esse desumendam à viribus: ideo cum in pestilentia vires cadant, illis ex animo est attendendum. Quod verò in pestilentia vires subito cadant, animaduertit Galenus 3. de prælag. expul. vbi inquit, quod character febrium pestilentium sit virium casus. Horum vires reficiuntur columborum iusculo, & carne: immo erat in Aegiptiorū arcanis, quod qui columbis cōtinuo vesci solebant, pestiferis morbis non corripentur. Cōcludimus ergo, quod Hippocrates dum vult in perperacutis esse vtrūq̄ victu extremè tenuissimo locutus sit de perperacutis, vbi virtus est valida & robusta, quæ possit ieiunium vsque ad vigorem perferre, & non de perperacutis cū virium casu.

Quinta dubitatio: Hippocrates 2. de ratione vic. 20. vult, mutationē in victus ratione acutorum morborum esse cauendam: quare transitus ad omnimodam inediam in perperacutis vt docet Hipp. in aphorismo erit cauendus: quia non potest nisi nocere.

Respondetur omnimodam inediam, siue ieiunium triū dierū absque dubio aliquod detrimentum asserere in perperacutis: sed maleficium compensari longè maiori beneficio: quia sine ieiunio acri ferè semper moriuntur, dum acutissimis morbis corripuntur, sicuti sunt anginosi, qui spatio duorum vel trium dierum obire possunt ieiunio verò obseruato naturam non diuertitur à certamine: ideo vincit morbum, ac licet in vltima parte vigoris æger relinquatur admodum debilis: refici tamen potest sine aliquo vitæ periculo.

Præterea omnia remedia sunt naturæ importuna, vt animaduertit Galenus lib de-



de opt. secta ad Trasyb. cap. 41. sed præbenda sunt, dum afferunt plus beneficij, quam maleficij. Hinc Galenus 4. aphorif. comm. 67. habet hæc „ Admittenda sunt illa, quæ plus utilitatis afferunt, quam damnum.

## Q V Æ S T. XXVI.

*A quibus causis fiant morbi peracuti.*

**C**um ex Hippocrate in peracutis vtendum sit victu extremè tenuissimo, videndum est à quibus causis fiant morbi peracuti, hoc sine, vt illicò, & bene intelligamus quando victu tenuissimo sit vtendum. De hac re multa dixerunt Iacobus de Partibus, Cardanus in comm. & multi alij: attamen nos morborum peracutorum acutiem reducemus ad quinque causas: quibus præcognitis faciliè intelligi poterit, quando victu tenuissimo, seu ieiunio erit vtendum.

Prima morborum acuties fieri potest à febre intensa, cuius internæ causæ sint in venis valde proximis cordi.

Secunda affectuum præter naturam acuties fit à magnitudine affectus: sicuti à dolore colico seuissimo: vel à dolore aurium, vel à quocumque affectu præter naturam habente magnitudinem ratione propriæ essentia, vt colligitur ex Galeno 3. prognost. Addimus quoque à quocumque affectu habente magnitudinem ratione dignitatis.

Tertia fit acuties ab impetu materiæ de membro ad membrum: vel quando materia turget, vel quando materia in thorace transmittitur ad cor: vel quando materia delapsa in pectus occupat lenes arterias, vel aliquo alio modo excrementa mittuntur ad partem principatum obfidentem.

Quarta fit acuties à copia, vt in peripneumonia, quæ deberet esse morbus longus: quia fit à pituita: attamen ratione copiarum est morbus ita acutus, vt vel breui suffocare possit: ideo in ipsa victu tenuissimo vtendum.

Quinta acuties fit à maligna qualitate, de qua mentionem facit Galenus 3. in 3.

epid. 25. & 26. quæ malignitas quomodo fiat, & cuius naturæ sit, nos ampla rationum serie lib. 8. methodi nostræ vitandorum errorum declarauimus.

## Q V Æ S T. XXVII.

*An febres semper adnexæ sint morbis acutis.*

**Q**ueritur pro intelligentia peracutorum, an febres semper adnexæ sint morbis acutis. Ex vna parte videtur quod de ratione omnium acutorum morborum sit febris continua: quia Galenus in hoc comm. 2. aphorif. 19. & 1. de ratione vic. 18. inquit „ Natura acutorum morborum est, vt eorum febres sint continuæ.

Sexta dubitatio circa hunc aphorif. ex alia parte sunt auctoritates, & experimēta, quæ indicant, febrem non esse adnexam omnibus morbis acutis. Primò colligitur ex Hippocrate 6. aphorif. § 1. vbi habetur hic aphorismus „ Quicumque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt, & stentunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit: ex hoc aphorismo colligimus, dari posse morbos acutissimos, sine febre. Deinde Galenus exponens aphorismum 30. quintæ sect. qui est, mulierem gravidam capi morbo acuto, perniciosum. Galenus in comm. dicit, sententiam Hippocratis esse verā, siue intelligatur de acutis cum febre, siue de acutis sine febre, vt est apoplexia, & conuulsio. Idem quoque affirmat Galenus 1. Prognosticorum. 25. Quare dari possunt acuti sine febre.

Præterea patet experientia, dari acutos sine febre, sicuti sunt apoplexiæ, conuulsiones, & species quedam carismaticis, quæ vocatur ignis Sancti Antonij, qui affectus solent esse sine febre. Hinc Galenus 2. aphorif. 19. dicit raro sunt morbi acuti, quibus non adsint febres, vt in apoplexia: ergo acuti stare possunt sine febre.

Pro solutione apparentis contradictionis quidam dicunt, sententias Hippocratis & Galeni, licet vniuersaliter, & sine limitatione proferantur, esse veras vt plurimum, & non semper. Ceterum illi reijciuntur, quia Hippocrates, & Galenus nos de-

deciperent proponēdo propositiones vniuersales, quæ nō semper sint veræ. Deinde licet signa lethalia proposita ab Hippocrate 6. aphor. 18. Galenus dicat in comm. vt plurimum esse vera, dicimus id accidere ratione virium robustarum non esse lethalia: sed propositiones vniuersaliter prolatas nulla habita relatione ad materiam contingentem circa quam versantur indiuidua, semper esse veras. Præterea sepius obseruamus, morbos acutos sine febre: quia, vt dictum est, apoplectici, epileptici, vel conuulsione correpti sine febre interdum inueniuntur.

Quidam alij respondent, acutos sine febre esse ex se, & sua natura morbos chronicos, & non verè acutos: sicuti est epilepsia, & peripneumonia, vt colligitur ex Galeno 6. aphor. cōm. 47. vbi inquit, conuulsionem, peripneumoniā, & omnes morbos acutos sine febre sua natura esse chronicos: dicuntque ex accidenti esse breues, quatenus natura non possit eorum vehementiam diu sustinere. Quæ responsio non est improbanda.

Nos tamen dicimus, Galenū nunquam dixisse febrem esse de natura acutorum, & licet Galenus in hoc comm. faciat mentionem de febribus, quæ à morbis acutis sunt inseparabiles: dicimus loqui de illis acutis, qui sunt cum febre, quæ haud dubiè ab illis sunt inseparabiles: non tamen per dicta verba apparet, quod omnibus acutis sit adnexa febris: quemadmodum perpendendo non solum verba Latina, sed etiam Græca colligi potest.

### Q V Æ S T. XXVIII.

*An quatuor tempora morborum differant à quatuor temporibus symptomatum.*

**R**elinquebatur cōsiderandum, an quatuor tempora morborum differant à quatuor temporibus symptomatum: seu an vigor morbi differat à vigore symptomatum. Ocasio istius quæstionis est Galenus, qui in comm. huius aphorismi definit vigorem morbi esse summam rem symptomatum, quasi quod veli Galenus principium morbi esse principium symptomatum,

augmentum morbi augmentum symptomatum, & vigorem morbi esse vigorem symptomatum.

Plurquamcommentator disputat de hac re in arte medicinali, & tenet, dari quatuor tempora morborum ratione essentiae morbi, & quatuor tempora ratione symptomatum omninò diuersa: quod probat quatuor argumentis.

Primum argumētum plurquamcommentatoris est tale. Principium morbi non est principium symptomatum: neque augmentum morbi augmentum symptomatum, nec status morbi status symptomatum: sed principium symptomatum est in augmento morbi, & augmentum symptomatum in statu morbi: ergo quatuor erunt tempora morborum, & quatuor symptomatum.

Secundum argumētum: morbus, qui est salutaris in principio, ratione essentiae est acerbissimus, & in peiori statu, quam esse possit: ratione verò symptomatum est mitissimus: E contra euenit in statu, videlicet, morbum in statu esse mitiorē, & symptomata sauiora. Hinc Hippocrates loquens de symptomatis 2. aphorismorum aphorismo 30. dicit, „ Circa initia & finem morbi omnia tenuissima, in statu vero sauiora. Similiter Galenus 3. de ratione vic. comm. ult. loquens de morbis salutaribus dicit, morbum salutarem in statu esse mitiorem, quam in principio, non tamen esse mitiorem quo ad symptomata.

Tertium: dantur febres malignissimæ, quæ in principio videntur esse adeo paræ ratione symptomatum, vt sapissimè decipiant medicos versatissimos: qui eas parui faciunt: tamen in augmento, vel statu symptomata incipiunt adeo grauiā, & sauiā, vt improuiso æger propter illa ex humanis decedat: quare tempora morborum, & symptomatum erunt diuersa.

Quartum argumentum: Galenus primo de crisib. 13. & Auicennas 1. quarti tract. 1. c. 4. distinguunt symptomata, quod aliqua sint quæ insequuntur morborum tempora, vt umbra corpus: aliqua verò non insequi morborum tempora. Symptomata, quæ insequuntur morborum tempora, sunt, sicuti in principio morbi vrinæ crudæ, spura cruda.



da. Symptomata vetò, quæ insequuntur augmentū, sunt quædā coctionis rudimenta, quæ, si de vrinis loquamur, obseruantur in vrinæ substantia, in cōtentis, & in coloribus. Symptomata vetò quæ insequuntur statum, sunt signa perfectæ coctionis, vt puta, si de vrina loquamur, quod eius nubeola sit alba, vnita, & æqualis: si de substantia, quod neque crassa, neque tenuis sit: si de colore, quod sit citrina. Eadem signa maioris vel minoris coctionis obseruantur in pleuriticorum sputis. Insuper dantur alia symptomata, quæ non insequuntur quatuor tempora morborum: de his loquens plusquamcommentator dicit, illa pertinere ad quatuor tempora symptomatum: infertque dari quatuor tempora morborū, & quatuor tempora symptomatū, quæ non insequuntur morbum.

Pro decisione istius difficultatis primò dicimus cū Galeno 3. de crisib. 4. in morbis quatuor esse considerata, nempe ideam, magnitudinem, motum & morem: ita ut vna ex his quatuor conditionibus non sit de ratione alterius: quia vna potest stare sine alia.

Secundò dicimus, quatuor tempora morborum, quæ à motu sensibili mensurantur, non conuenire ideæ morbi, vt est idea: quia omnibus ideis conueniret, quod dici non potest: quia quatuor tempora morborum non conueniunt hecticæ, vel ephimeræ febri: nec morbis, qui sunt immateriales, qui videlicet carent causa humoralis: Immo hæc quatuor tempora neque conuenient morbis materialibus quando facti sunt, & non amplius fiunt, sicuti sunt gummi, podagra nodosa, condylomata, carnis excrecentia, catarrhacta perfecta, polypus, pterygium, fistula confirmata, & infiniti alij affectus, qui non amplius sunt in fieri, sed solum in facto esse.

Hinc irridendi sunt illi medici, qui putant decocto guaiaci, vel salsa auferti posse gummos capitis confirmatos, fistulas confirmatas, condylomata, & reliquos affectus in facto esse, qui non amplius fiunt, quippe qui non tolluntur ab ablationem causæ antecedentis. Idem confirmatur per ipsam practicā, quia cū factus est morbus, sicuti sunt gummi, & alij propositi affe-

ctus non causam auferendo sanantur, sed aperiendo ferro, vel caustico, vel phænigmate: Si vetò ossis corruptella adesset remedijs auferentibus ipsum affectum, & non ipsam causam, in curatione progredimur.

Tertiò non solum Idea morbi quatenus est Idea diuidi potest in quatuor tempora, sed neque magnitudo, neque mos diuisibilia sunt in quatuor tempora. Patet de morbi magnitudine ob afflictæ partis præstantiam, veluti si de corde, & pulmone loquamur, tabidus affectus non diuiditur in quatuor tempora. Patet de magnitudine morbi ob cacoethiam: quia dantur vlcera maligna, quæ nō amplius fiunt, quæ non habent quatuor tempora. Patet de magnitudine ratione propriæ essentia: quia febris hectica est magna ratione propriæ essentia, tamen non habet quatuor tempora: ideo solus motus humorum est diuisibilis in quatuor tempora, quæ sola coctionem humorum respiciunt, non idea, non magnitudo, vel mos ad coctionem pertinent. Hinc quando Galenus 3. de ratione vic. vlt. dixit morbum salutarem in statu esse mitiorem, & symptomata esse sæuiora, dicendum est esse mitiorem ratione Ideæ, vel moris, sed non ratione motus: sic quando Hippocrates 2. aphorismorum 30. dixit circa initia, & finem omnia leuiora, intellexit ratione motus, non ratione ideæ, magnitudinis, & moris. Parimodo febres malignissimæ in principio sunt paruæ ratione motus: sunt tamen in excessu ratione moris, & Ideæ: ideo medici prudentes non debent solum symptomata ad motum pertinentia perpendere: sed etiam illa quæ non insequuntur motum, sicuti sunt illa, quæ pertinent ad ideā, magnitudinem, & malignitatem.

Sed vera ratio, cur idea, mos, & magnitudo morbi non diuidantur in quatuor tempora, est, quia idea, magnitudo, & mos pertinent ad prædicamentum qualitatis, nempe ad habitū, & dispositionem: tempora vetò morborum non ad qualitatem, sed ad prædicamentum quantitatis, in quo est motus cōtinuus, & motus augmenti, & decrementi. Continuus est in quantitate ratione fluxus: quia ex Aristotele 3. Phys. cap.



cap. i. motus est de genere continuorum.

Præterea cum tempus sit in prædicamento quantitatis, & non qualitatis: ideoque morbi magnitudo, & mos pertineant ad prædicamentum qualitatis videlicet ad habitum & dispositionem, sequetur quod qui diuidet ideam morbi, magnitudinem, & morem in quatuor tempora facient transitum de genere in genus, videlicet à Prædicamento qualitatis ad prædicamentum quantitatis, quod non est admittendum, quia & prædicamenta sunt impermixtibilis, & illorum differentiarum multo magis: quia ex Aristotele in ante prædicamentis: „ Diuersorum generum non subalternatim positorum diuersa sunt species, & differentie: quare qui dicunt, dari quatuor tempora symptomatum prodeuntium ab idea, magnitudine, vel more attribuunt proprietatem quantitatis ipsi qualitati, quod in Philosophia est erratum non ferendum: Tempus enim est mensura motus: hæc mensura est in quantitate, & non in qualitate. . . Tempus morbi ex Galeno lib. de totius morbi temp. cap. i. dicitur morbi ætas: quare sicut ætates sunt quatuor: sic morborum tempora sunt quatuor, videlicet principium, augmentum, status, & declinatio.

Insuper tempus morbi tripliciter consideratur: vel penes motus materię, videlicet bilis, pituitę, vel melancholicę putridę: motus efficit quatuor tempora manifestissima, de quibus modo loquimur: vel consideratur tempus morbi penes motus essentię, seu gradus caloris præter naturam, vel alterius qualitatis: vel tertio considerantur quatuor tempora ratione symptomatum: si verò considerentur quatuor tempora penes motus materię videlicet bilis, pituitę, vel melancholicę putridę: hoc tempus morbi est manifestissimum, & sensibus valde apertum: hocque duplex est, aliud vniuersale, & aliud particulare: vniuersale totam morbi latitudinem complectitur, à principio videlicet vsque ad finem: diuiditurque in quatuor tempora, nempe in principium, augmentum, statum & declinationem.

Tempus verò particulare ipsius est illud quod consideratur in vniuo paroxysmo,

quo similiter habet principium, augmentum, statum, & declinationem: hæcque tempora tam vniuersalia, quam particularia, quę sunt omnibus manifesta conueniunt solum illis morbis, qui partim sunt in fieri, & partim in facto esse, qui morbi vocantur materiales, à causis scilicet antecedentibus prodeuntes: sicuti sunt febres putridę.

Si verò consideretur tempus morbi penes motum essentię, seu gradus caloris, vel alterius qualitatis præter naturam, negari non potest, quod quatuor morborum tempora aliquo modo, & per quandam similitudinem conuenire possint omnibus morbis in facto esse: sic dicimus febrem hæcticam primi gradus habere hæc quatuor tempora: principium erit quando calor naturalis ita incipiet absumere humiditatem toridam, vt effervescat, sed non exsicceat, de qua effervescencia loquitur Galenus i. de diff. feb. cap. 9. Augmentum verò hæticę primi gradus erit quando humiditas torida incipiet exsiccare: status erit, quando humiditas torida erit magna ex parte exsiccata: declinatio verò ad salutem erit quando ista humiditas torida incipiet instaurari.

Similiter dantur quatuor tempora secundi vel tertij gradus hæticę febris, sed non sunt ita sensibilia, & manifesta: quia non dependent à causa antecedente, sed ab actione eiusdem caloris, qui formaliter non differt à febre hætica: ideo hæc quatuor tempora dicuntur secundum essentiam, & non secundum materiam.

Idem dicimus de quolibet subiecto alterabili, sit animatum, vel inanimatum, quod possit mensurari, per quatuor tempora videlicet per principium, augmentum, statum, & declinationem.

Demum dantur quatuor tempora ratione symptomatum, quę incipiunt, & desinunt cū morbo: sicuti sunt symptomata morbi pathognomonica, quę indicant cruditatem, vel coctionem, sed hæc quatuor tempora symptomatum coincidunt cum quatuor morbi temporibus: quia hæc symptomata insequuntur morbum vt umbra corpus.



Dantur quoque alia symptomata, quae similiter insequuntur morbum aliquem superuenientem, & umbra corpus: quia valet haec; est symptoma: ergo est morbus: symptoma dicitur accidens morbi: accidens vocatur *συμπεσυχός*, quod significat simul veniens cum morbo: atque licet Galenus 3. de ratione vic. ult. dicat, morbum in statu esse mitiorem, & symptoma vehementia, dicimus morbum esse mitiorem: quia vel brevis sanitatem praenunciat: symptomata verò sunt vehementia, quia etiam morbus in statu est vehemens, siquidem symptoma, ut symptoma semper sequitur morbum, ut umbra corpus: hacque responsione facile tolluntur argumēta proposita. Idem patet ex Galeni exemplo ibidem proposito de inflammatione: dum pus conficitur, inflammatio est mitior: symptomata tamen saeva sunt: quia augetur febris: saeva sunt, quia sequuntur febre, quae saevior est, & non inflammationem, quae mitior est: symptoma saevum sequitur morbum saevum, mite sequitur mitem.

Ad Argumēta pluraque commentatoris, ex dictis facile solvi possunt. Ad primum quod scilicet principii morbi non sit principium symptomatum: neque augmentum morbi sit augmentum symptomatum: ergo quatuor erunt tempora morborum, & quatuor symptomatum: consequentia est falsa: quia symptomata variantur non ex se: sed quia ipsi morbi variantur ob materiam: siue ob humores magis vel minus grauantur: symptoma ex se, neque habet augmentum, neque decrementum: quia eius esse consistit in hoc, ut semper insequatur morbum, ut umbra corpus.

Ad secundum argumentum parimodo respondetur, symptomata mitiora, vel saeviora esse, quia morbus, & eius causae sunt saeviores, vel mitiores. Neque admittimus morbum in principio ratione essentiae esse in peiori statu: Galenus enim lib. de totius morbi temporibus cap. 3. & 4. dicit, incipit morbus cum exigua humoris quantitate, & tandem ad summum venit: quia ipse citus ex Hipp. sectione aphorismo 65. agrotanti morbus fit. Similiter in morbi principio, dum incipit putredo,

illa exigua est, tñ tamquam scintilla auget putredinem: quare ratione essentiae febris putrida non est acerba in principio: sed semper magis fit acerba, donec natura ipsam discutit, quod fit in fine status, seu in principio declinationis.

Ad tertium respondemus, licet in febribus malignis symptomata sint parua in principio & saeva in augmento & statu: non propterea sequitur, quod illa tempora sint symptomatum, quia sunt tempora morbi maligni, à quo symptomata prodeunt, quae insequuntur morbi conditiones, ut umbra insequitur corpus: ita ut si magis saeva fiat malignitas in augmento, & statu, magis saeva fiant symptomata: quia ipsi morbi sunt illi, qui variantur, & dum variantur variantur symptomata: quare non dantur quatuor tempora symptomatum, sed omnia tempora respiciunt ipsum morbum.

Ad quartum negamus, dari symptomata, quae non insequantur morbum: sed omnia dicimus illum insequi, qui dum variatur, varia quoque observantur symptomata, quae semper insequuntur morbum, ut umbra insequitur corpus: quare non dantur quatuor tempora symptomatum diuersa à quatuor morborum temporibus.

### QVÆST. XXIX.

*An morbus in principio sit maior, quam in statu.*

**H**ippocrates in aphorismo dicit, ubi est morbus peracutus, statim habet extremos labores. Quærent Expositores, an morbus in principio sit maior, quam in statu. Plurimè commentator in arte med. considerans hunc aphorismum probat morbum in principio esse maiorem, quam in statu.

Primum argumentum est tale: Hippocrates in hoc aphorismo ait, quod morbus in principio statim habeat summos labores: ergo morbus est maior in principio, quam in statu. Argumentum est vanissimum: quia Hippocrates intelligit de peracutis, qui parum durant, & in toto morbo habent summos labores: ita ut

M per-



perperacutus morbus fit, quasi vnus pato-  
zyismus trium dierum, vel paula vltcrius,  
vt dicit Galenus in hoc conum.

Secundum argumentum : quo probat  
Plusquamcommentator, morbum esse  
maiores in principio, tale est. Morbus  
eo tempore est maior, quo materia est  
magis copiosa, & magis cruda: sed in  
principio materia est magis copiosa, &  
magis cruda: ergo in principio morbi  
erit maior.

Respondetur, falsam esse maiorem, &  
minorem propositionem: maior est falsa:  
quia morbus magnus nō. sumitur à quan-  
titate humoris: In plethoricis, qui optima  
gaudent sanitate, multa est humoris quan-  
titas: tamen non vexantur morbis: neque  
in principio morbi est maior cruditas:  
Galenus enim lib. de totius morbi tem-  
poribus cap. 3. & 4. inquit, Incipit mor-  
bus cum exigua quantitate, supple humo-  
ris, & tandem ad summum venit: cur? quia  
ipse cibus, vt docet Hippocrates 7. sec.  
aphorismorum aphorismo 65. febricitan-  
ti morbus fit: quia propter morbum, vel  
propter febrem natura diuertitur à cōco-  
ctione, vnde cibus male concoctus dege-  
nerat in causam morbi ficam.

Sic dū incipit putredo in morbi princi-  
pio, exigua quidem est: mox ita exigua, tã-  
quā scintilla auget putredinē in augmēto,  
& statu: ratio proponitur à Galeno 1. de  
diff. feb. 4. vbi dicit, quod rāgitur à putri-  
do putrefcit: sic Galenus 2. de diff. feb. vlti-  
mo inquit, in omnium putridarū febrium  
principijs confluere calorem naturalem  
cum spiritibus ad fomitem putredinis,  
& inde in sanguine putredinem augeri.  
Hinc in morbi principio interdum maio-  
ris putredinis occasio aufertur, quod non  
potest fieri in augmento. & statu: quem-  
admodum obseruatur in vinis: dum in-  
cipiunt corrumpi, quæ si cito euētentur,  
uina in aliud dolium commutādo, redeū-  
t: si verò putredo, vel corruptella sit pro-  
gressa, vt vina in acetum, vel vapam-  
redant, non amplius fient bona: quare  
nullo modo cōcedimus in principio mor-  
bi esse maiorem cruditatem & peiorem  
qualitatem. Præterea esto, quod in prin-  
cipio esset maior cruditas, dicimus illam

esse adeo pauca malitia, vt respectu ma-  
teria, quæ reperitur in augmento non sit  
comparāda: quare minor propositio quo-  
que falsa est, q̄ scilicet materia in princi-  
pio sit magis copiosa, & peioris qualitatis.

Tertium argumentum: tunc morbus  
est minor, quādo à natura vincitur, sed in  
statu vincitur, ergo tunc est minor. Re-  
sponderetur vinci morbum in declinatione,  
vel in postrema parte status. Præterea  
negamus vinci morbum in statu, quia in  
statu est finis victoriæ: dicimus vinci in  
principio & augmento, quia tunc virtus  
est fortior, & magis disponit passum, quā  
in statu: sic centum guttæ cadentes non ex-  
cauant saxum, vnica tamen guttula minor  
omnibus alijs, excauat: quia ab alijs guttis  
materia est disposita: dicere nō possumus,  
guttulam postremam minimamque vin-  
cere, & excauare, sed alias disponēdo sen-  
sim vincere. Hinc in principio & augmen-  
to magis vincitur morbus, quam in statu.

Quartum argumentum, tunc maior est  
morbus, quando symptomata sunt sum-  
ma: sed in apostematis principio, & aug-  
mento, dum sit pus, symptomata sunt sum-  
ma: ergo in principio, & augmento maior  
erit morbus, quam in statu.

Respondetur, morbos materiales esse  
dum generum: aliquos esse in quibus re-  
seruatur materia peccans ad vnicam ex-  
pulsionem criticam, & tunc morbus ma-  
ior est in statu: aliquos verò esse in quibus  
materia peccans in morbi principio  
incipit expelli: itaut circa finem augmen-  
ti euacuatio cessare incipiat, sicut in pleu-  
ritidis principio per tussim, sputamina  
euacuantur, & in fine augmenti expulsio  
seu euacuatio cessare incipit, itaut in vi-  
gore pleuritidis serē tota materia peccans  
sit expulsa: in his summitas symptoma-  
tum est in principio, & non in vigore.

Idem dicimus de omnibus morbis, in  
quibus natura, vel medicus in principio,  
vel augmento maximē euacuatur: in his cer-  
tē expulsio non omninō seruatur ad vni-  
cam expulsionem criticam. De his loquēs.  
Hippocrates 1. de ratione vic. dicit: in  
pleuritide, in qua non seruatur expulsio  
humoris peccantis ad vnicā expulsionem;  
dandam esse totam pissanam: in princi-  
pio



pio verò, dum natura est grauata, & in expulsiōe occupata, non totam pituitiam, sed tantum eius cremorem dandum esse.

Dantur quoque alij morbi, qui leniter, & molliter incipiūt sine euacuatione: deinde augentur, referuanturque excrementa versus statum ad vnicam expulsiōem: de his loquens Hippocr. 1. epid. sec. 3. tex. 10. habet hæc verba „ Quidam morbi leniter, & molliter incipiūt, & postea adaugētur, & tandem summi sunt: dicimus in istis materiam peccantem referuari ad vnicam criticam expulsiōem, & in his, morbi summitatem esse summam symptomaticā: de his Galenus in hoc comm. intelligit, & Hippocrates in aphorismo dum dicit „ Vbi morbus peracutus est, extremos habet labores toto morbo perseverantes: quia de perperacutis loquitur, in quibus materia peccans referuatur ad vnicam criticam expulsiōem.

Queritur: an Hippocrates loquatur in hoc aphorismo tam de morbis salubribus, quam de lethaliis. In quæstione sequenti considerabimus, an in omnibus salubribus morbis ægri solum sanentur in morbi declinatione, ita ut sit necessarium ad sanitatem recuperandam agros transire per quatuor morborum tempora. Quantum attinet ad primum dicimus Hippocratem intelligere de morbis salubribus: quia proponit remedium, quo morbi peracuti sanentur, quod est victus extremè tenuissimus, nempe ieiunium.

In morbis, in quibus omninò est adempta spes, neque Hippocrates, neque Galenus aliquod proponunt remedium: Hippocrates enim 1. prælag. tex. 4. habet hanc sententiam „ Morituros prænosens prænuñciatque culpa vacabit.

Galenus 2. aphorismorum 29. asserit, desperatos nò esse curandos, sed solo prognostico relinquendos. Immo 11. meth. cap. 9. habet hæc verba „ In quo omninò desperata salus est imprudētis consilij fuerit apud vulgum infamare remedia, quæ multis alijs fuere saluti. Quare cum Hippocrates in hoc aphorismo proponat remedium peracutorum morborum, dicendum est, Hippocratem loqui de ægris salubribus, qui videlicet remedio ab eo

proposito in aphorismo possint restitui sanitati.

### Q V A E S T. XXX.

*An ut ægri sanentur debeant transire per quatuor morborum tempora.*

**Q** Væritur, an sit necessarium, quod, ut ægri sanentur, pertrāseant per quatuor morborum tempora: ita ut non possint sanari, nisi in morbi declinatione, in quo tempore nemo vnquam moritur: nisi casu quo in ipsa declinatione nouus alius morbus superueniat, qui possit ægrum interimere.

Nos probare possumus auctoritate, & experientia, quod ægri possint sanati, non solum in declinatione, ut omnes putant, sed in principio & augmento. Gal. 9. meth. 4. refert se venæ sectione vsque ad animi deliquium facta in principio morbi iugulasse febrem: ergo non est necessarium, ut in omnibus morbis salubribus ægri percurrant quatuor tempora.

Parimòdo Galenus 13. meth. cap. 11. dicit in principio ophthalmiæ per medicamentum purgans opthalmiam sanasse: id potest cōingere, si in toto corpore materia esset cocta, & in parte tantum esset cruda: quo casu facta coctæ materiæ euacuatione fluxio ad oculos cesset, & confluxa cito euanescat.

Dubium est de febre synocha: quia non videtur, quod post principium sequatur augmentum, & status: quia paracraftica, quæ est illa febris synocha, quæ semper declinat, carere videtur augmento, & statu. Similiter homotona febris est illa, quæ caret augmento, & declinatione: quia semper manet in eodem statu: quare non videtur, quod morbi materiales, qui partim fiunt, & partim facti sunt, semper habeant quatuor tempora.

Respondent nonnulli, paracrafticam, & homotonam habere augmentum, & statum, sed insensibilem. Nos dicimus quatuor tempora esse sensibilia: sed non considerari respectu nostri tactus: quo non distinguimus in pulsu, vel calore differentiam sensibilem: sed considerari respec-



de concoctionis, quæ in vrina apparet, ex qua sensibiliter colligimus principiū, augmentum, statū, & declinationē, intelligēdo de synocha putrida quæ partim est in fieri, & partim in facto esse. De hac quoque credimus, sanguinis missione, & alijs remedijs posse sanari nō solū in statu, & declinatione, sed et in principio, vel augmento.

**V**bi vero nō. Hæc est secūda pars aphorismi, in qua proponit hæc cōclusio- nem: quod quāto morbus magis recedat à morbo extremo, seu à vigore, tātò plenior debeat esse cibus: quāto verò minus recedat, tantò tenuior: ita ut sicuti vigor est norma diætandi, sic virtus sit norma permittendi remedia, hac lege, ut virtus quāto validior sit, tantò validius admit- tat remedium, & quāto debilior, tantò lenius, & mitius.

Septima dubitatio Bresaulus, & nonnulli alij dicūt, hæc conclusionem Hippo- cratis proposita in secūda particula istius aphorismi non esse veram in omnibus pe- racutis, tum quia in illa pestilentia, de qua mētionem fecit Hippocrates 3. epid. 3. § 8. peste affecti magis nutriebantur in vigo- re, quam alijs temporibus: nihilominus sanabantur: tum quia ex Galeno 8. meth. pichrocoli nutriuntur in principio paro- xyismi, & in ipso vigore, alioquin in fe- brem hecticam labuntur.

Bresaulus, & alij non possunt defendi: quia Galenus in cōm. 11. aphorismi huius sectionis inquit, sententiam Hippocratis in hoc loco propositam nō solum esse ve- ram in peracutis, sed in omnibus morbis: per omnes morbos intelligit acutos, tum quia Hippocrates hic loquitur de acutis: tum quia in chronicis non conuenit vi- ctus tenuis, sed mediocriter, de quo medio- cri victu non agitur in his aphorismis.

Ad instantias respondemus, quod pe- ste coinquinati, & pichrocoli debent ma- gis nutrirī in vigore: quia magis potest virtus cum siccitate coniuncta ad indi- candum cibum, quam morbus ad prohi- bendum: virtus enim in peste facilē ca- dit: immo Galenus 3. de præfag. ex pul. 3. ait, quod character pestis sit virium casus:

dum vires cadunt, iacta est alea, nisi statim reficiantur.

Quo ad pichrocolos dicimus, quod ma- gis possit periculum, ne pichrocoli in hecticam labantur, quam vigor paroxys- mi, & morbi ad prohibendum cibum: quia nisi illo tempore nutriantur, in he- cticam cadunt.

Quare in omni morbo expedit videre, quisnam scopus præualeat, an ille qui est desumptus à viribus: an ille qui est de- sumptus à morbo: Notandum tamen, tunc prævalere scopum desumptum à vi- ribus, quando cum illis viribuseger non potest perducere vsque ad finem vigoris: quia licet vires sint debiles, dummodo possint durare vsque ad finem vigoris, non indicant reficientia. Hinc Galenus cōm. 4. huius sectionis habet hæc ver- ba „ Si conseruaremus vires in acutis, quales accepimus in principio morbi, fie- ret additio ad morbum: ideo Medicus, ut Hippocratis præceptis obsequens sit, in acutis ita tenui victu uti debet, ut vires quoque languidæ conseruentur, hac lege tamen, ut possint durare ad finem status: quia tunc facillimè panis, & vini pauxillo possunt restaurari.

Valeant igitur illi medici, qui volunt conseruare vires, quales erant in prin- cipio morbi, & qui in ipso augmento, & in principio vigoris reficiunt ægros ouis, contuso caponis, & similibus: quia faciunt additionem ad morbum: vnde pernities, & mortes magna ex parte sequuntur.

Octaua dubitatio occurrit, dum dicit Hippocrates in secunda parte aphorismi tantum cibi esse indulgendum, quantum morbus recedit à vigore, quod videtur esse contra communem usum: quia dum labimur in aegritudinem, statim prima & secunda die, quæ maximè distant à vigore per regulam Hippocratis, egri essent benè nutriendi, tamen minus nutrimur, hoc- que maximè iuuat.

Respondemus, in principio morbi sub- trahi cibum, non ratione maximi recessus à vigore: sed ratione cruditatum, & ra- tione plenitudinis ventriculi ob cibos præcedentes paulo ante ingestos: quare præceptum Hippocratis erit verum post



exhibitum leniens medicamentum, cuius auxilio excrementa, quæ sunt in primis vijs sunt euacuata. Deinde plenior, vel tenuior debet esse victus, prout morbus est magis, vel minus acutus, vel (quod id est) prout magis, vel minus à vigore recedit.

Quatuor sunt morborum acutorum differentiæ, ac quatuor sunt victus tenuis differentiæ. In peracutis eligitur victus extremè tenuissimus, id est ieiunium. In peracutis extremè tenuis, sicuti est multa; sed in vigore extremè tenuissimus. In exactè acutis cremor ptisanæ: in vigore tamen extremè tenuissimus: in acutis non exactè tota ptisana. In vigore, vel extremè tenuissimus, vel multa tantummodo. Hæ victus differentiæ observantur in virtute robusta: si verò est languida, ut non possit perdurare vsque ad finem status, tunc virtuti attendendum est cibus, qui vires ita reficiant, ut possint perdurare. Quatuor dubitationes occurrunt, quæ unica solutione tolli poterunt, ut infra.

Nona dubitatio Hippocrates in hoc aphorismo dicit in peracutis summè tenuissimo victu vtendum. In aphorismo 5. magis laudat victum pleniorē: ergo sibi contradicit.

Decima dubitatio: vbi sunt extremi labores, vires prosteruntur, sed vbi vires prosteruntur, cibo sunt reficiendæ: ergo in peracutis, in quibus extremi sunt labores, non erit vtendum victu extremè tenuissimo: quia magis est attendendum viribus, quam morbo.

Vndecima dubitatio: in peste ex Hippocrate 3. epid. 3. 58. qui magis nutriebantur liberabantur peste: sed pestis est morbus peracutus: ergo in morbo peracuto non conueniet victus extremè tenuissimus.

Decima secunda dubitatio: ex Galeno passim in methodo, semper magis est attendendum viribus, quam morbo: ergo victus extremè tenuissimus, qui vires dimittit, reprehendendus.

Responsio ad istas quatuor postremas dubitationes unica est, quæ multæ aliæ difficultates tolli possunt: quæ est, quod aphorismus sit verus, vbi vires possunt perdurare sine cibo: vbi verò non possunt

perdurare, illis cibus sunt reficiendæ, quibus possint conseruari ita languidæ & debiles, ut sufficiant, ac possint perdurare vsque ad ultimam partem vigoris, in qua parte nullum subest periculum, & in qua parte nemo moritur, nisi nouus superueniat morbus.

## APHORISMVS OCTAVVS.

**Q**uando morbus in suo vigore constituerit, tunc victu tenuissimo vtendum est.

Zechius, Crispus, & multi alij sic connectunt. Cum Hippocrates in superiori aphorismo dixerit, in omnibus morbis peracutis esse vtendum victu extremè tenuissimo. In hoc aphorismo vult in omnibus morbis esse vtendum victu extremè tenuissimo: at non omni tempore, sed solum in morbi vigore.

Hæc connexio non continet veritatem: quia in hoc aphorismo intelligit solum de peracutis, & non de omnibus morbis. Quod sic probatur: Galenus in hoc comment, hunc aphorismum non esse separatum à precedenti: sed in precedenti ex consensu omnium intelligit solum de peracutis: ergo non intelligit de omnibus morbis. Deinde Galenus 8. meth. 3. citans hunc aphorismum inquit esse de peracutis, & non de omnibus morbis. Postremò, si in hoc aphorismo intelligeret de omnibus morbis, aphorismus esset falsus: quia dantur morbi chronici, qui sunt adeo longi, & diuturni, ut eorum vigor durare possit per mensem. Non inueniunt laborantem quartana trium annorum cursu, quæ etiam fuit depulsa (ut obiter doceam materiam remediij) pulvere radice affari ad 3. 1. & semis in principio accessionis, cum vino albo generoso ter in tribus paroxyzmis eodem modo sumpto. Certe vigor in hoc luene fuit valde longus, atque sine cibo in toto vigore non perdurasset.

Capitaneus sic connectit. Cum Hip-



pocrates superius locutus sit de victu aegrotantium, quatenus victus prohibetur à toto morbo perperacuto. Reliquum erat, ut ageret de victu, quatenus prohibetur non à toto morbo peracuto, sed ab aliqua eius parte. Sed quia pars quæ cibum prohibet duplex est, vniuersalis, vel particularis: vniuersalis est vigor: particularis est paroxysmus: in hoc aphorismo dicit, Hippocratem agere de ratione victus, quatenus prohibetur à parte vniuersali ipsius morbi, videlicet à vigore. In aphorismo vero 11. quatenus prohibetur à parte particulari morbi, id est à paroxysmo: ibi enim inquit, „ In accessionibus abstinere oportet, nam cibum dare nocuum est.

Hæc connexio, nisi esset diminuta, non esset improbanda. Quod verò sit diminuta, patet: quia omittit quæ considerantur ab Hippocrate in secunda parte superioris aphorismi, vbi dicit, cibum esse tenuiorem, vel pleniorum prout magis vel minus recedit à vigore.

Nos sic connectimus. Cum Hippocrates in prima parte superioris aphorismi locutus sit de victu perperacutorum, ac dixerit, in toto morbo perperacutorum vitandum esse victu extremè tenuissimo. Atque in secunda parte superioris aphorismi egerit de victu omnium acutorum, qui obseruari debet in principio, & augmento, dicendo victum debere esse tenuiorem, vel pleniorum, prout morbus magis, vel minus recedit à vigore. In hoc aphorismo vult prohibere victum in vigore omnium acutorum, dicendo in vigore acutorum quando morbus habet maximam vim, non esse dandum cibum, habetque maximam vim in vigore peracutorum, acutorum exactè, & nõ exactè.

Pro intelligentia istius aphorismi sex occurrunt consideranda. Primum quid intelligat per morbum. Secundum quid per vigorem. Tertium quid per victum tenuissimum. Quartum, cur Hippocrates iubeat in vigore nihil cibi dandum esse. Quintum an in vigore omnium acutorum liceat vti ieiunio. Sextum an in vigore fieri possit cibi concessio.

Quo ad primum: quid per morbum

Hippocrates intelligat, dicimus intelligere morbum salutarem, & non lethalem. Primum quia agit de morbo, qui potest peruenire ad vigorem, qui non est lethalis. Secundò quia vitatur extremò remedio, nempe ieiunio, quod Hippocrates non vitetur, si per morbum intelligeret lethalem, quia ex Galeno 2. aphor. 29. lethales solo prognostico sunt relinquendi, atque 11. meth. 9. ait „ In quo omnino salus desperata est, imprudentis consilij fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere saluti.

Quod vero Hippocrates vsus sit in morbis lethaliibus remedijs leuissimis, & non extremis colligi potest ex historijs aegrorum Hippocratis in epidemicis propositis: ibi in Philisco, qui mortuus est sexto die, non vsus est pharmaco, vel phlebotomia, sed solum 2. die vsus est clystere, & in 5. die glande.

Similiter in Erasino, Hermocrate, vel Alijs morbo lethali correptis non videmus, quod Hippocrates aliquo remedio extremo vsus sit.

Quo ad secundum nempe, quid intelligat Hippocrates per vigorem, an totum vigorem, vel aliquam vigoris partem. sciendum pro intelligentia, vigorem esse tempus morbi diuisibile in tres partes, in priorem, posteriorem, & mediam: prior pars adnectitur fini augmenti, & hæc pars est vigor in fieri tantum: posterior pars adnectitur principio declinationis, & est solum in facto esse. Pars verò media partim est in facto esse, & partim in fieri: de hac parte media Hippocrates intelligit in aphorismo.

Quod verò Hippocrates per vigorem intelligat partem mediam vigoris, patet, quia vitatur dictione *νῆσιμα*, & non *νῆσιμος*: *νῆσιμα* significat morbum non solum factum, sed etiam fientem: quia *νῆσιμα* est nomen verbale dependens à prima persona præteriti passivi, & omnia huiusmodi verbalia significant rem partim esse in fieri, & partim in facto esse, *νῆσιμος* verò significat solum partem factam ipsius morbi: quia *νῆσιμος* formaliter est mala constitutio: at sic est quod de ratione male constitutionis est res facta.

Hæc



Hæc tria omnia sunt inter se distincta  
*νόσος νόσος νόσος* : *νόσος* significat  
 agrotationem, idest morbum in abstra-  
 cto : *νόσος* significat ideam morbi, quæ  
 est facta, & completa : *νόσος* signifi-  
 cat morbum in concreto, idest formam  
 morbi iunctam cum materia : sed quia  
 de ratione materiæ est alteratio : ideo *νό-  
 σος* est pars morbi partim facta, &  
 partim in fieri : quia est idea adhuc in ma-  
 teria. Quare cum Hippocrates in apho-  
 rismo vratur dictione *νόσος*, intelligit  
 per vigorem morbi partem mediam, quæ  
 partim est facta, & partem fit.

Præterea si per vigorem intelligeret vl-  
 timam partem vigoris, aphorismus esset  
 falsus : quia æger in vltima parte vigoris  
 est in tuto, & tunc est reficiendus : est in  
 tuto : quia morbus tunc est victus, & supe-  
 ratur : est reficiendus, quia victo morbo,  
 vires sunt augendæ.

Quoad tertium : quid intelligat Hip-  
 pocrates per victum tenuissimum, qui ex-  
 plicatur per illas dictiones *τῇ λεπτότητι  
 διατηροῦνται*.

Prima dubitatio occurrit circa propo-  
 sita verba : quia Hippocrates videtur sibi  
 contradicere : superius enim dixit, in vi-  
 gore esse vtendum victu extremè tenuis-  
 simo. Hic verò dicit solum tenuissimo si-  
 ne illa dictione extremè : ideo nonnulli di-  
 cunt Hippocratem in hoc aphorismo non  
 intelligere de ieiunio.

Respondetur Hippocrati in hoc apho-  
 rismo intelligere de victu extremè tenuis-  
 simo, idest de ieiunio : quod colligitur ex  
 Græca voce *τῇ λεπτότητι* : quia articu-  
 lus *τῇ* significat vltimum terminum ten-  
 uitatis, qui est ieiunium : articulus enim  
 significat rem completam : sicuti exposui-  
 mus in 3. aphorismo *ἐν τῷ ἐλάττω* nempe  
 articulum *τῷ* ibi significare vltimum ter-  
 minum plenitudinis.

Plurimi tenent Hippocratem in hoc  
 aphorismo intelligere de potione, sicuti est  
 multa, quia non nominat victum extre-  
 mè tenuissimum, qui est ieiunium. Sed  
 aduersantur Galeno, qui in eodem inquit,  
 in vigore illorum paracutorum, quæ dicun-  
 tur paracuti non exactè, cōuenire victum  
 extremè tenuissimum, at in hoc aphorif-

mo loquitur de vigore. Deinde vt patet  
 ex solutione dubitationis per *τῇ λεπτότητι*  
 intelligit vltimum terminum tenui-  
 tatis, & hic terminus est ieiunium. Præ-  
 terea Galenus 19. aphorismo huius sect.  
 dicit, nihil dandum esse ante iudicationē :  
 ergo tantò minus in iudicatione : sed sic  
 est, quod in vigore fit iudicatio : ergo in  
 vigore nihil omninò dandum, neque ipsa  
 multa, contra multos, qui per tenuissi-  
 mum victum intelligebant multam.

Nonnulli alij, vt Crispus dicunt Hip-  
 pocratem in hoc aphorismo intelligere de  
 vigore omnium morborum tam acuto-  
 rum, quam chronicorum, dicuntque quod  
 habita relatione ad alia tempora, in vigo-  
 re vtendum sit victu tenuiori, quam in  
 principio, & augmento. Primò fallun-  
 tur, quia Hippocrates loquitur in his  
 aphorismis de acutis, & non de chronicis  
 morbis. Deinde, si per tenuissimum in-  
 tellexisset cibum tenuiorem esse præben-  
 dum in vigore, quam in principio, &  
 augmento, non esset locutus modo super-  
 lativo, sed comparatiuè, dixissetque tenui-  
 ori, & non tenuissimo vtendum.

Quoad quartum : cur scilicet dicat Hip-  
 pocrates, in vigore esse vtendum victu  
 tenuissimo, tres sunt causæ. Prima pro-  
 ponitur à Galeno in hoc eodem his verbis  
 „ In vigore non oportet distrahere natu-  
 ram ad alteram nouam coctionem : cum  
 eo tempore natura humorum morbos  
 facientium coctioni fortiter vacet.

Secunda causa, cur in vigore nullus ci-  
 bus conueniat, est, quia tunc natura est  
 adeo occupata morbo, vt cibis non co-  
 quatur, sed corrumpatur : deinde cibi  
 corruptella maximè auget morbum.

Tertia causa proponitur ab Hippocra-  
 te 2. acutorum tex 48. vbi dicit, quod na-  
 tura in vigore effecta debilis minus con-  
 coquat : ideo victu extremè tenuissimo  
 vtendum : possuntque sine cibo persistere,  
 quia quando sunt in vigore, sunt ferè in  
 fine : ideo possunt per paucas horas sine  
 cibo perdurare.

Hinc illi medici, qui copiosius nutriunt  
 vigoris tempore à Dogmaticis Medicis  
 iure merito vocantur carnifices : quia tot  
 in tenuissimo bello non occidunt, quot  
 agro-



agrotantes à cibo exhibitò in vigore suffocantur. Arma hostilia, quibus inerrant agros in ipso vigore, sunt caponis contusa, vel expressa, vel stillantia illa viscida, iuscula crassa, oua, & quamplurima, quæ ad plenum & non ad tenuem viciũ pertinent: facilesque sunt medici impetiri, vt incidant in hunc errorem, quia vident mulieres hac via incedere nempe ad miseriam agrotantis pernitiem. Nec valent, dum dicunt, agros in vigore esse admodum debiles, quia ex Galeni præcepto comm. 4. huius aphorismi habentur hæc verba, „ Aegri sunt conseruandi debiles vsque ad finem vigoris, secus fiet additio ad morbum .

Deinde non distinguunt, quinam sint illi debiles, qui indigent cibo, quemadmodum Hippocrates, & Galenus 2. de ratione vic. 48. distinguunt, his ferè verbis, quæ aureis litteris in cordibus nostris essent inscribenda, „ Qui sunt debiles ob inanitionem vasorum egent alimento: qui verò sunt debiles ob dolores prægressos, & morbi vehementiam, non egent alimento, sed potius euacuatione.

### Q V Æ S T. XXXI.

*Cur in principio morbi robusta virius non vincat morbum: in vigore languida vincat.*

**A** Verroes 4. coll. cap. 33. querit, cur natura in vigore, in quo est valde debilis, possit morbum vincere, cum non potuerit illum vincere in principio, vel augmento morbi, quando ipsa virtus erat robustissima.

Respondet Auerroes hoc accidere, quia actus actiuorum sunt in patiente bene dispositi, quæ sententia est Aristotelis 2. de anima 24.

Humores in principio morbi sunt rebelles, in augmento verò minus rebelles: sed in media parte vigoris sunt ita dispositi, vt à virtute debilissima & languidissima, nisi cibis distrahatur, possint vinci & superari.

De dispositione, ob quam introducun-

tur forma substantialis: & accidentales locus est Aristoteles primo Physicorũ tex. 67. vbi dicit, agentia non agere in contrarium, id est in subiectum contrariũ. Iste enim habet hæc verba, „ à se inuicem contraria pati est impossibile: inde colligimus, nostras medicinas non agere in morbos, sed in subiecta viscera: inde quoque colligimus, spagiricos, qui putant suis medicinis vincere morbos, à veris medicinis scopis longè abesse, & quod deterrimũ est superando morbos lædere viscera, & introducere affectum contrariũ, qui est primo deterior: dirigenda est igitur actio medica in materiam: seu in subiecta viscera ea disponendo, & non in formas morbificas, alioqui actum esset de re medica. Hinc Aristoteles 8. Physi. tex. 13. disputans contra Heraclitum dicentem omnia semper moueri, dicit ante augmentationem & diminutionem prius fieri dispositiones, quibus effectus solum fieri augmentationem, & diminutionem: quod principium summè necessarium pro efficienda mutatione substantiali, & quauis alia accidentali: Aristoteles eodem tex. idem declarat quatuor exemplis huic contemplationi accomodatissimis. Primum est de aquarũ guttis cadentibus, & excavantibus lapidem: dicendo aliquas disponere, & aliquas paucas ex euare. Secundũ exemplũ est de arbore, quæ ex lapide nascitur, quippe quæ cursu temporis, dum arbor augetur, disponat lapidem ad scissionem: & dispositũ vnico momento scindat. Tertium est de aquarum congelatione, quæ non fit sine præcedenti dispositione. Quartum exemplum pertinet ad nostrum propositum, atque est de agrotò tendente in sanitatem, vbi dicit, prius disponi subiecta viscera, nempe in principio, & augmento, & in prima & secunda parte vigoris: deinde post dispositionem à virtute quoque languida, & imbecilli sanitatem introduci.

Similiter post dispositiones in visceribus diu conceptas sunt morbi, & febres curatu difficiles: dicimus curatu difficiles: quia vt colligitur ex Galeno 1. ad Glauc. cap. 2. 4. de ratione vict. comm. 115. & in historia Sileni in epidemicis propter etata



rata externa sine præcedenti viscerum dispositione: possunt quidem fieri febres diatriæ, sed non febres putridæ, vel hectica, vel morbi curatu difficiles. Hinc Hippocrates 4. de morbis ait „ morbos diu conceptos ἀπὸς ἐλάττωσιν id est subito erumpere. Galenus verò in historia Sileni, qui propter potationes, & intempestiua exercitia incidit in affectum lethalem, habet hæc verba „ Vtique Silenus non incidisset in grauissimum affectum propter illa errata externa, nisi antea fuissent præparata viscera. Hæc sunt rationes, cur post leuissima errata, corpora multo ante malè disposita incurrant in morbos curatu difficiles, & interdum lethales. Hæc quoque sunt rationes, cur in statu, natura existente debili, sanentur ægri, quia scilicet materia tunc maximè est ad expulsionem disposita.

## QVÆST. XXXII.

*An in vigore omnium acutorum nihil cibi dandum sit, ut iubet aphorismus.*

**Q**uærebatur tãdem, an in vigore omnium peracutorum, & acutorum seuerè vtendum sit ieiunio, vt dicit aphorismus. Respondemus, acuto esse duum generum, aliquos, in quibus reseruatur materia peccans ad unicam expulsionem: aliquos verò in quibus natura in principio, & augmento morbi ita expellat excrementa, vt quando morbus sit in vigore, omnia accidentia sint remissa, sicuti euenit in pleuritide, in qua nõ in vigore sit sputaminum expulsio, sed in principio & augmento. Posita hac distinctione dicimus aphorismum Hippocratis, qui docet in vigore esse vtendum victu tenuissimo, esse intelligendum de acutis, in quibus reseruatur materia peccans ad unicam expulsionem & non de illis, in quibus à principio vsque ad statum excernitur materia peccans. Hæc doctrinã est Hippocratis primo de ratione vic. tex. 23. & 25. vbi loquens de pleuritide habet hæc verba „ Quoties sputamina excernuntur qualia, & qualiter excerni debeat,

augenda est sorbitionis quantitas. Ad dimus, sed in statu seu vigore, quod idem est, expulsa sunt copiosa excrementa, ergo in vigore vtendum est pleniori cibo, quam in principio & augmento: quia in illis roborata natura in vigoris principio aliqua tenui sorbitione, quod reliquum est, ab ipsa facilius vincitur.

Præceptum Hippocratis potest etiam ampliari ad euacuationem factã ab arte: quãdo videlicet in principio, & augmento medici importunè vexant ægros euacuantibus reiterãdo bis, & ter non solum sanguinis missionem, sed etiam lenientia & purgantia: tunc si ægri in prima parte uigoris post hanc importunam euacuationem sunt admodum, debiles absque dubio augenda est sorbitio.

Præterea est profectò prudentis consilij in principio morbi euacuare: deinde in augmento, & statu quiescere iuxta aphorismum Hippocratis 29. secundæ sec. „ si quid tibi uideatur mouendum moue in principio: in augmento uerò & statu quiescendum, quia concocta sunt medicanda, non cruda ex Hippocrate 22. aphorismo primæ sect. nam mouedo cruda innumerabilia mala suboriuntur, sicuti explicabimus in aphorismo 22. huius sectionis.

Petrus Crispus, & nonnulli Alij dicunt, aphorismum Hippocratis esse uerum in omni morbo, & in pleuritide & alijs similibus, in quibus nõ reseruatur materia ad unicam expulsionem in morbis ex bile (dicunt) nullo excepto in uigore utendum esse uictu extremè tenuissimo.

Ad Hippocratem dicentem in uigore pleuritidis esse augendam sorbitionem. Respondent esse augendam, non pronutritionem, sed ut fauces madefiant, hoc fine, ut facilius sputa reijciantur. Cæterum Crispus non tollit dubitationem: quia aliud est madefacere fauces, & aliud sorbere & deglutire. Hippocrates pro madefaciendis faucibus proposuisset ἐλαττωματα id est lambitiua, & gargarismata quæ statim expuuntur, & non sorbitionem.



## QVÆST. XXXIII.

*An in vigore fiat perfecta coctio.*

**R**elinquebatur considerandum, an in vigore fiat perfecta cōcoctio. Auerroes 3. coll. cap. 9. inquit : quando cessat cōcoctio, cessat augmentum : ergo in augmento fiet perfecta cōcoctio, & non in vigore : ergo in augmento erit vtendū victu extremē tenuissimo, & nō in vigore.

Galenus verò in hoc comm. dicit, perfectam cōcoctionē fieri in vigore : primo de crisib. cap. 17. & 18. loquens de cōcoctione puris, dicit perfectum pus fieri in vigore. Similiter Hippocrates 2. de ratione vic. 48. & alibi, & in hoc aphorismo, ne diuertatur natura à cōcoctione, agros non esse cibandos in vigore.

Nonnulli respōdent Auerroem fuisse deceptum ab æthimologia huius dictionis status, quasi quod status dicatur, quia natura stet, & quiescat ab omni operatione.

Nos dicimus, cōcoctionem fieri in augmento, sed perfici in prima parte status seu vigoris, quod Auerroes non negasset. Deinde in secunda parte vigoris naturam separare humorem iam cōcoctum. In tertia naturam efficere expulsionem, & in declinatione perficere eandem excrementorum expulsionem : quare si natura in prima parte vigoris distrahatur cibus à morbi cōcoctione : in secunda parte humor noxius non separabitur ab innoxio, ac inde facilè recrudescet : si verò in tertia vigoris parte impediretur expulsio, crisis nō fieret, & sic ager morbo non liberaretur. Ad crism bonā Galenus 4. aphorismorum 22. docet tria requiri, primo cōcoctionem, post cōcoctionem, separationem, & post separationem euacuationem.

Dubitatio Hippocrates videtur asserere in hoc aphorismo, victus rationem sumendam esse à morbi uigore : tamen primo de ratione vic. in ac. 44. Galenus docet, morbum prohibere cibum, atque solam uisum cibum indicare : cibus enim ex Hippocrate 7. aphorismorum 65. agrotanti morbus fit.

Respondetur uigorem morbi prohibe-

re, & non indicare cibum, ideo 11. pporates in aphorismo dicit, in uigore uel tenuissimo esse utendum cibo : hæcque est causa, quod tenuior, uel plenior cibus dandus sit, prout uidelicet tempus cibandi magis, uel minus distat à uigore : plenior, si multum distat : tenuior, si tempus cibandi à uigore parum distat : quia in uigore acutorum nihil dandum est. Idem est dicere in uigore utendum esse victu extremē tenuissimo, ac dicere in uigore nihil cibi dandum esse.

## APHORISMVS NONVS.



**C**ONIECTARI autem oportet, an ager cum victu sufficiat perdurare, donec morbus consistat; & nunquid prius ille deficiat, nec possit cum victu perdurare, ut morbus ante deficiat atque hebetescat.

Nonnulli connectunt hunc aphorismum cum superiori hoc modo. Cum Hippocrates superius locutus sit de victus quantitate sumpta indicatione à morbi uigore. In hoc aphorismo similiter loquitur de victus quantitate, sed sumpta indicatione à uiribus.

Hæc connexio uidetur pulchra, facilis, & breuis : tamen continet falsitatem, & reluctatur ipsi Galeno. Continet falsitatem : quia Hippocrates in hoc aphorismo intelligit de maiori, uel minori tenuitate victus : sed sic est, quod maior uel minor tenuitas pertinet ad qualitatem, & non ad quantitatem victus, ergo agit de qualitate victus, & non de quantitate.

Reluctatur Galeno, qd lib. de opt. secta. ad Trasylb. cap. 39. inquit « Quid Hippocrates dixit in 8. aphorismo in uigore utendum esse victu tenuissimo, locutus est de qualitate, & nō de quantitate victus. Decepti fuerunt : quia uidetur Galenum



in comm. 16. aphorismi huius sectionis, qui est victus humidus febricitantibus confert, dixisse Hippocratem in precedentibus aphorismis egisse de quantitate victus, inde putarunt, omnes præcedentes fuisse de quantitate victus: tamen solum aphorismi, qui sunt post duodecimum vsque ad decimum sextum exclusiue, sunt de quantitate victus, & non isti præcedentes, quos exposuimus.

Dicimus igitur nos, Hippocratem superius egisse de ratione victus sumpta indicatione à toto morbo perperacuto, & à vigore peracuti. In hoc aphorismo verò agere de ratione victus sumpta indicatione morbo acuto, & ab ipsa virtute: à morbo quatenus prohibet cibum: quia morbus à quantò maior est, tantò magis prohibet victum, atque quantò minor, tantò minus illum prohibet: à virtute non vt indicante cibum, sed vt coindicante, & non contraindicante: virtus verò coindicans potest comparari dupliciter ad morbum acutum: vel ad morbum acutum, in quo reseruatur materia peccans ad vnicam expulsionem criticam, de quo morbo egit superius: vel comparari potest ad morbum acutum, in quo non reseruatur materia peccans ad vnicam expulsionem: atque de his acutis in hoc aphorismo intelligit in secunda parte: sicque tractatus de ratione victus erit completus.

Sed pro intelligentia aphorismi tria sunt considerata. Primum quid sit indicans, quid coindicans, & quid contraindicans.

Secundum in quibus casibus virtus coindict.

Terrium in quibus casibus virtus contraindicit.

Quo ad primum dicimus, quod indicans, vel consideratur ratione morbi, vel ratione virtutis: si consideretur ratione morbi, dicimus morbum magnum indicare remedium magnum: morbum paruum remedium paruum: morbum calidum remedium frigidum, & sic de alijs: si verò consideretur indicans ratione virtutis: tunc virtus, vel consideratur in sanis, vel in ægris: si in sanis virtus robusta semper indicat cibum plenum quo ad qualitatem, &

quo ad quantitatem, quæ tamen non excedat vires; virtus debilis indicat victum tenuem quo ad qualitatem, & quo ad quantitatem.

Si verò consideretur virtus in ægris, tunc virtus non amplius indicat, sed vel coindicat, vel contraindicat: coindicat, dum permittit quod indicatur à morbo: permittit, dum potest perdurare vsque ad vigorem, tunc in ægris virtus vel est robusta, vel debilis: si robusta, quantò est robustior, tantò tenuiorem victum indicat: si debilis, vel potest perdurare vsque ad vigorem, vel non: si potest perdurare, ita debilis virtus est conseruanda: si non potest perdurare non coindicat, sed contraindicat, & tunc pleniori cibo est vtendum: quia magis potest illa virtus ad indicandum cibum, quam morbus ad prohibendum. Hinc Galenus 11. meth. cap. 5. loquens de virtute quatenus est coindicans, & contraindicans protulit hæc verba „ Quoties vires ferunt, exhibendus est cibus conueniens ratione morbi: quoties verò non ferunt, augendus est victus, qualis esse potest cõueniēs ratione virium robustarum: in morbis acutis cibus est propositus à Galeno comm. 4. & 7. huius sectionis, vbi dicit, in perperacutis proponendum esse ieiunium: in peracutis multam: in exacte acutis cremorem prissanæ: in acutis non exacte totam prissanam.

Quo ad secundum quod erat considerandum, in quibus casibus videlicet virtus coindict. Sciendum in tribus casibus virtutem coindicare. In primo dum virtus est robusta, quæ semper coindicat, id est permittit quod indicatur à morbo. In secundo dum virtus est debilis, quia sit suffocata, quo casu melius coindicat, quam virtus robusta: quia ita suffocata melius sufficit ieiuniū, quam robusta. In tercio casu, dum virtus est debilis, possit tamen ita debilis perdurare vsque ad vigorem: Galenus. n. in comm. 4. huius sec. habet hæc verba „ sufficit, vt virtus cõseruetur debilis vsque ad vigorem: quia in postrema parte vigoris ager est in tuto, & tuto resciri potest: si verò non potest perdurare, contraindicat, indicando videlicet victum contrarium morbo, & sic spernitur etiam in perperacutis



cutis ieiunium, quo casu præberi potest pitissanz cremor.

Quo ad tertium, quod erat considerandum, nempe in quibus casibus virtus contraindicer: sciendum est, virtutem in octo casibus præcipue contraindicare, idest non posse perdurare vsque ad vigorem sine alimento. Primus, in alimenti defectu, sicuti in valde senibus, in lenteria, in cæliaci passione, & in aliqua maxima hæmorrhagia. Secundus in assuetis copiosis cibis. Tertius, in æstiuis temporibus, seu in locis calidis. Quartus, ieiunium non est obseruandum in illis, qui patiuntur lumbricos: docet enim Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem cap. 13. ubi sunt lumbrici, corpus extenuari: quia ingestum alimentum depascuntur, ipsosque lumbricos mordere, & terebrare i testina illorum, quorum ventriculus cibus vacuus est. Quintus, in ætate puerili, vel decrepita: in puerili, quia eorum corpora facile resoluntur: in decrepita, quia cibus magna ex parte conuertitur in pituitam vitream, quæ illos non nutrit. Sextus est imbecillitas oris ventriculi, ob quam facili de causa ob inediam fit morsus, vt accidere solebat Diodoro Grammatico (de quo Galenus 5. de loc. aff. 6.) qui ob ieiuniū sepe in grania acciderit epilepsiæ incidebat. Septimus, in peste coinquinatis: Galenus enim 3. de præfag. expul. 3. habet, Quod caracter pestis, & febris pestilentis, vel malignæ sit virium casus, ideo cibo resciciendi. Octauus in picrocholis, qui ob ieiunium incidunt in hæcticam, & nisi opportunè nutriantur, moriuntur: ideo Galenus 10. meth. admonet, picrocholos in principio paroxysmi quoque esse nutriendos, tum ne incendant in febrem hæcticam: tum vt humectentur cibo: quia hoc modo hæticæ periculo facilius liberantur. De his casibus mentionem facit Galenus 1. de ratione victus 44. secundo de ratione vic. 45. & alijs in locis.

Diuiditur hic aphorismus in duas partes. In prima dicit, habendam esse coniecturam de viribus ægotantis, an possit cum victu tenuissimo perdurare vsque ad vigorem: intelligitque de victu sumpta indicatione à virtute comparata ad illos acutos, de quibus egit superius, in qui-

bus reseruatur materia peccans ad unicam expulsionem. In secunda parte dicit habendam esse coniecturam de ægro, an scilicet cum victu tenuissimo sanari possit, intelligit de victu sumpta indicatione à virtute comparata ad illos acutos, de quibus egit 1. de ratione vic. 23. & 25. ubi dicit, „tales acutos ante vigorem deficere & hebescere, ubi Hippocrates ait tales esse interdum pleuritides, in quarum vigore dari potest tota pitissana. Parimodum sunt plurimæ euacuationes à natura vel à medico in principio, & augmento, itaut morbus hebescat, ægri tunc erunt magis nutriendi in vigore, quam in principio.

Quoad verba: dicit Hippocrates, habendam esse coniecturam supple de quantitate uirtutis ægotantis, an possit cum præscripto victu perdurare usque ad vigorem, quod certè solum coniectura assequi potest, sicuti animaduertit Galenus 1. ad Glauco, in principio, & 3. meth. cap. 3. dicens quantitate assequi coniecturam, illamque nec scribi, nec dici posse.

Quantitates igitur, quæ faciunt artem coniecturalem, sunt quantitates remediorum, inter quæ remedia cibi quantitas etiam collocatur, quam nos coniectura assequimur, illamque utimur in præscribendo victu: similiter quantitas uirtutis, & quantitas morborum concurrunt ad faciendam artem coniecturalem. Præterea sunt etiam aliæ duæ quantitates, quæ faciunt eandem coniecturam, quæ ad propositum nostrum non faciunt in explicatione istius aphorismi, quæ sunt conditiones indiuiduantes, & idiosyncrasiæ; de qua Galenus 3. meth. 7. habet hæc verba, „si naturam propriam, quam idiosyncrasiam vocant, exquisitè cognoscerem, talem me putarem, qualem mente concipio fuisse Esculapium.

Sed Hippocrates in aphorismo dicit, habendam esse coniecturam quantitatibus uirtutis, & morborum, & per consequens remediorum. Primo habenda est coniectura de quantitate uirtutis: quia nisi sciamus, quanta sit uirtus, scire non possumus quantum debeat esse remedium dieteticum, chirurgicum, & pharmacæu-



cum. Dum Hippocrates 4. de ratione vic. 19. vult, in mittendo sanguine tres scopos concurrere, nempe morbum vehementem, virium robur, & aetatem florentem, dicimus dictos scopos conspirare quoque in præscribendo victu tenuissimo.

Similiter ex Hippocrate quantitas morbi facit artem coniecturalem, quæ morbi quantitas nihil aliud est, vt docet Galenus 9. meth. 14. nisi illa certa mensura quantitatis recessus, à quo medici debent colligere remedij quantitatem: inde Galenus lib. de curandi ratione per sang. mis. cap. 12. inquit, quantitatem remedij efficere artem coniecturalem. Hippocrates igitur in aphorismo dicit, habendam esse cōiecturam supple quantitatis virtutis, & per consequens quantitatis recessus à statu naturali factus in ægto, & remediorum: quia reuera istæ quantitates solum coniectura, & nō certa scientia dignosci possunt: quo pacto verò per artificiosam coniecturam prædictæ quantitates dignosci possint, paulo infra declarabimus.

In codice Græco legitur *συντεταγμέναι*, id est simul esse faciendam coniecturam de viribus, & de morbis: quia duo sunt scopi: alter qui desumitur à viribus; alter, qui desumitur à morbo tamquam prohibente ipsum cibum: ideo semper videndum est, quis ex duobus scopis præualeat, ne incidamus in erratum methodicorum, qui à morborum temporibus cibandi indicationem desumebant, decepti, vt ait Galenus lib. de opt. sec. ad Trasib. 39. à praua intelligentia superioris aphorismi, qui est: quando morbus in suo vigore constituerit vel tenuissimo victu vitandum: qui aphorismus est de prohibente cibum, & non de indicante: si esset facienda coniectura solum de viribus, dixisset *τετρατάσσαι*, & non *συντεταγμέναι*. Deinde aphorismus nō explicasset hoc eximium præceptum, quod scilicet simul, & eodem tempore sit necessarium vires, & morbum perpendere: quia non valet, vires sunt debiles, ergo cibis sunt augendæ: quia si esset aliqua angina acutissima & breuissima: licet

vires essent debiles, non essent augendæ, nec corroborandæ cibis: quia ita debiles possent sufficere vsque ad vigorem, qui post primam, vel secundam diem succederet: quo adepto, vel incipiente declinatione ægri ad libitum nutriri possunt, quia ex Galeno 3. de crisib. 7. & 9. in postrema parte vigoris, & in declinatione nemo moritur.

Dicit „ *an æger cum præscripto victu perduret ad vigorem*: dicit, an æger: quia in ægro duo continentur scopi, alter desumendus à viribus: alter à morbo: ideo non dixit, an virtus, sed an æger perduret: quando virtus potest perdurare vsque ad vigorem præualeat scopus desumptus à morbo: quando verò non potest perdurare, præualeat scopus desumptus à viribus, & merito quidem: quia indicatio desumpta à viribus obscurat omnes alias indicationes: ideo dixit coniectari oportet, nempe qualis videlicet scopus præualeat: quare vires vel possunt durare sine cibo vsque ad vigorem peracutorum, vel non possunt: si possunt, nihil cibi dandum: si non possunt, in principio, & augmento nutriendum, hac lege, vt quo magis morbus approximetur vigori, eo magis de cibo aliquid detrahatur: dum verò morbus est in vigore, summa inedia est obseruanda: si verò accidat, vt ante vigorem æger non sit nutritus, & cogatur in ipso vigore nutriri, inquit Hippocrates 2. de ratione vic. esse valde malum coactè ægros nutrire in summo morbi vigore: tamen si vires non sufficiant, & illo tempore cadere videantur, cibi ita paucillum dandum est, vt nō diuertat naturam ab opere suo: quia dum vigor est in postrema parte, ita ut non amplius possit crescere, cibis rutilius exhibetur: quia tunc morbus vitatus est.

„ *An ne prius deficiat, & cum tali victu non possit perdurare*.

Prima dubitatio: hæc est secunda pars, in qua videtur Hippocrates ponere verba superflua: immo Truerius non intelligens verborum Hippocratis mysteria dicit Hippocratem esse superfluum incidereque in manifestissimam tautologiam:



giam: quia Triuerius asserit idem esse deficere, & non posse perdurare.

Respondemus deficere, & non posse perdurare esse verba diuersa: non enim valet consequentia, vires deficient, ergo non possunt perdurare: quia vires quoque deficientes interdum possunt perdurare vsque ad vigorem: sicuti in illis, qui detinentur angina, quippe qui non possunt deglutire per tres dies: deficient quidem vires, sed tamen perdurant, & sanantur.

Præterea deficere indicat defectum, non omnimodam extinctionem. Insuper Hippocrates non sine aliquo misterio addit, an prius deficiant: voluit enim admonere in morbis peracutis sufficere virtutem debilem, talemque esse conseruandam vsque ad vigorem: quæ doctrina est Galeni. com. 4. huius sectionis, vbi alimentum acutorum morborum appellat minuens vires, non conseruans, neque augens ipsas vires. Quod certè non animaduertunt Medici Plebei, qui non solum vires in acutis volunt conseruare, sed etiam augere, nõ sine magna agrotantium perniciæ. Idem confirmat Galen. experientia 10. meth. cap. 13. quod scilicet vires valdè deficientes cibi pauxillo illico resistentur, si tempore opportuno nutriantur: ibi ostendit exemplum cuiusdam iuuenis febricitantis, cuius vires ieiunio importuno à diatritarijs præscripto erant ferè extinctæ: ibi dicit Galenus, panis pauxillum cum uino tenui iuuenem sumendo statim oculos sustulisse, astantes cognouisse, & vires illud fuisse resituras.

*Vel morbus ante deficiat, & hebescat,* idest ante vigorem: Hippocrates 1. epid. 3. tex. 10. inquit, dari morbos, qui in principio augentur, & deinde sub iudicio morbi mites fiunt.

Secunda dubitatio: sed quomodo morbus ante vigorem poterit deficere & hebescere? hoc certè non conuenit augmento, quod est ante vigorem, sed solum declinationi, in qua morbi deficere, & hebescere solent.

Respondetur Hippocratem addidisse hæc postrema uerba propter illos

morbos, in quibus natura non conseruat totam materiam peccantem ad unicam expulsionem: sicuti obseruatur in pleuritide, in cuius principio, & augmento per tussim expellitur materia peccans. Idem obseruatur ab Hippocrate 1. de ratione uictus 23. & 25. in morbis acutis. Hique sunt, qui ante vigorem deficient, & hebescent: quo casu in statu seu uigore plenius nutriri oportet, quam in augmento.

Hinc obseruamus ob tres causas ante statum, seu ante vigorem, morbum deficere, & hebescere posse. Prima ob euacuationem à medico factam in morbi principio, & augmento satis copiosam. Eadem ratione Galen. 1. ad Glauc. refert, se in principio iugulasse febrem sanguinis missione vsque ad animi deliquium. Secunda causa, dum natura expellit materiam à parte nobili ad ignobilem. Tertia, quando materia peccans non reseruatur ad unicam expulsionem: quando videlicet præcesserunt euacuationes per crises imperfectas, per vrinam, sudorem, per aluum, vomitum, vel per insensibilem euacuationem, quæ maior est (vt probauimus in staticis) quam omnes sensibiles euacuationes simul unitæ. Inde fit quod Galenus 3. de crisib. cap. 6. dicit in fine augmenti interdum expelli materiam coctam: deinde morbum mitiorem reddi, idest deficere, & hebescere.

Tertia dubitatio occurrit: quia interdum morbi ante vigorem ob multas euacuationes deficient & hebescent, tamen in principio vigoris interimunt: ergo non valet: deficient & hebescent morbi, ergo sunt salutares.

Respondemus, morbum post multas euacuationes criticas imperfectas deficere, & hebescere posse: deinde eundem morbum interimere: idque ob quatuor causas. Prima: quia materia peccans, licet pauca sit, trāsferatur ad partem nobiliorem. Secunda, quia sit delata ad locum angustiores, in quo fiat inuincibilis. Tertia, quia vires reddita propter præcedentes euacuationes debiles minus possint resistere. Quarta, quia humor occultet arma hostilia: quia non sit adhuc benè sermen-



mentatus: nulla enim putredo, vel malignasante fermentationem se ostendit.

Caterum pro intelligentia aphorismi ista adhuc occurrunt consideranda. Primum, dū dicit Hippocrates an æger cum præscripto victu perduret vsque ad vigorem, supponit, neminem moti posse in vigore, tamen infiniti moriuntur in vigore: Galenus enim 3. de crisib. 5. & 9. dicit hanc esse prærogatiuam solius declinationis, vt in ipsa nemo moriatur. Secundum quod est considerandum, inquit Galenus si vires sint imbecilles, & nō possint perdurare, esse reficiendas. Quæritur de qua viriū imbecillitate intelligat, an de illa, quæ provenit à labore, & vehementia morbi: vel de illa imbecillitate, quæ provenit à vasorum inanitione, quæ sine dubio ante vigorem est cibus reficienda. Tertium quomodo præcognosci, & ex quibus fontibus colligi possit, quando vires valeant, vel non valeant perdurare vsque ad vigorem: quæ consideratio est magni momenti: quia si in hac re committitur error, id in ægrotantis perniciem succedit.

Quo ad primum, dum supponit Hippocrates in hoc aphorismo, neminē mori posse in vigore: sciendum est, solutionem difficultatis à Græca dictione desumi: quia dicit in aphorismo πρὸς τὴν ἀκμὴν: particula τὴν significat ultimam partem, vigoris, quæ est in facto esse, & non amplius fit, in qua parte morbus est superatus: & victus: tres sunt partes vigoris, vt dictum est: si dixisset πρὸς ἀκμὴν sine articulo, sententia esset falsa: quia infiniti possunt in prima parte vigoris, & in media ex humanis decedere: in postrema verò quæ adnectitur declinationi nemo moritur: quia æger adeptus est victoriam, & lata est sententia de bona salute ægrotantis. Ratio quoque est: quia in postrema parte vigoris amplius non fit motus, nec morbus ultra progreditur depascendo, vel putrefaciendo: vbi non fit motus, ibi non potest fieri mutatio, vbi non potest fieri mutatio, non potest fieri corruptio, vbi non potest fieri corruptio, non potest fieri mors: quia mors est mutatio, & corruptio: immo mors supponit

mutatum & corruptum esse.

Quarta dubitatio ex dictis suboritur, quia non videtur valere hæc consequentia: morbus est factus, & non amplius fit: ergo est victus, & superatus: quare licet postrema pars vigoris sit in facto esse, & nō amplius fiat, non propterea morbus erit superatus, & victus: quod confirmatur experientia: quia febris hectica est in facto esse, & non amplius fit: ergo morbus est victus, & superatus, non valet, quia hectica primi vel secundi gradus potest humidum naturale depascere, & ulterius progredi.

Respondetur in ultima parte vigoris non solum morbum esse victum, & superatum, sed non amplius coinquinare, vel depascere: quia illa pars postrema immediatè adnectitur declinationi, quæ mutatio est in melius, & non in peius: ideo egri tunc sunt in tuto: hectici verò non sic, quoniam hectica tabes depascit exsiccando in dies magis, nisi arte infrænctur humectantibus, & refrigerantibus.

Quo ad secundum: cū dicat Hippocrates: si vires sint ita imbecilles, vt non possint perdurare, quæritur de qua imbecillitate intelligat. Respondet Galenus 2. de ratione vic. 48. vires deficere ob duas causas, nempe vel ob defectum alimentis, quo casu, nisi reficiantur, non perdurant, sed brevi spacio exoluntur, & egri moriuntur: vel ob laborem & vehementiam morbi nulla tamen existente vasorū inanitione, hoc casu non exhibetur cibus. Hinc Hippocrates 2. de ratione vic. citato habet hæc verba, „ ingens malum est dare potum, & sorbitionem corpori debilitato ob laborem, & acumen morbi. Ecce non valere consequentiam, vires sūt debiles ob laborem, & vim morbi, ergo reficiendæ sunt cibus: Galenus in prædicto comm. 48. habet hæc verba, „ sæpè ægri ob dolorem sine pulsu redduntur, & animi defectione vrgentur ob morbi vehementiam, in his non est danda sorbitio, nisi accadat, quod illa imbecillitas pēdeat à vasorum inanitione: hæc accidentia, vt asfixia, quæ est pulsus amissio, & animi defectus fieri possunt, vel ex repletionem, vel ex veneficiis qualitativis prodeuntibus ab



utero, vel ab alijs partibus: quare hæc corpora propter hæc accidentia reddita imbecillia, & admodum languida, cibis non sunt reficienda, nisi casu, quo vasa sint inanita. Valeant igitur nostratum plurimi, qui non distinguunt imbecillitatem procedentem à vasorum inanitione ab illa quæ pendet à dolore, vel morbi vehementia.

Notandum, vasorum inanitionem (ut perfectè illam dignoscamus) à sex causis fieri posse. Prima ab euacuatione sensibili facta à medico, uel à natura, cuiusmodi est aliqua insignis hemorrhagia, uel fluxus, uel nimij sudores.

Secunda ab euacuatione insensibili, quæ præcipuè fit in corporibus rari habitus, qui facillimè resoluntur. Hæc insensibilis euacuatio solet esse longè plenior, quam omnes sensibiles simul unitæ ut declarauimus in aphorismo 4. 1. sect. staticæ nostræ.

Tertia à longa inedia fit vasorum inanitio.

Quarta à laboribus præcedentibus.

Quinta à præcedentibus uigilijs, cui iuncta sit inedia.

Sexta à maximo, & diuturno morbi labore, cui unita sit parimodo aliqua inedia: in his casibus, cibis uirtus est reficienda.

Insuper reficienda est, dum adsunt contraindicantia, quæ satis superque declarauimus, cuiusmodi sunt alimenti defectus, consuetudo multorum ciborum: æstiuæ tempora, ætas puerilis, uel senilis, lumbrici, morsus oris uentriculi, qualis erat in Diodoro Grammatico: picrocholi, & peste affecti.

#### Q V Æ S T. XXXIV.

*Ex quibus signis colligitur, an vires possint perdurare ad finem status.*

**Q**uomodo uerò præcognoscatur, atque ex quibus signorum fontibus colligi possit, an vires possint uel non possint perdurare usque ad finem status: paucis explicabimus.

Primo sciendum, tres esse uirtutes cor-

poris nostri custodiendas, nempe animales, naturales, & vitales, & præcipuè vitales, quia in hoc aphorismo de his intelligit: Galenus enim 1. de ratione vic. 44. dixit, vitalem facultatem esse respiciendam, dum cibamus, & purgamus: subdit, „ ope facultatis vitalis sani edimus, bibimus, cætera omnia vitæ munia exercemus: propter hanc nos ægros nutri-

mus. Quo ad animales virtutes, dicimus faciliè perdurare posse, quod cognoscitur ex commoda inspiratione, quæ maximè ad vitalem virtutem confert: non enim ut cognoscatur virtus animalis imperamus ægrotantibus ut ambulent, vel eant salutatim, quia (ut dixi) commoda, & quieta inspiratio est signum sufficiens, quod facultas animalis perdurare possit. Deinde animales sunt istius conditionis, ut morbo depulso faciliè reficiantur.

Parimodo naturales virtutes faciliè perdurant, nisi cibis multis opprimantur: ideo Hippocrates in hoc aphorismo præcipuè intelligit de virtute vitali, sine qua neque animales, neque naturales refici possunt.

Quo ad vitales, ex quibus signis videlicet possint præcognosci, an possint perdurare cum victu tenuissimo usque ad uigorem. Nos confugimus ad quinque signorum fontes.

Quorum primus desumitur à resistentia arteriæ: resistentia uerò cognoscitur, dum quatuor digitis comprimitur, & compressa resistit: in plurimis ægrotis pulsus uidetur debilis, tamen illum comprimendo resistit, ille certè non est debilis.

Secundus fons desumitur à pulsus æqualitate, ita ut ualeat consequentia, pulsus est æqualis, ergo non est debilis, quia omnis pulsus factus iusto debilius est inæqualis.

Deinde inæqualitas pulsus distinguitur hoc modo: uel consideratur in unica pulsatione, uel in pluribus, quæ dicitur sistematica idest collectiua: inæqualitas in unica pulsatione solet efficere tres pulsus inæquales: quorum primus est intercisus, idest inæqualiter excut-



currens. Secundus est dicrotus idest bis feriens. Tertius est transiens à celeritate ad tarditatem, vel vice versa. Si verò consideretur inæqualitas in sistematica, idest in pluribus pulsationibus; tunc arteriæ occuratio non est similis; quia oriuntur decem tales differentiæ inæqualitatis pulsus, quæ sunt istæ, nempe in magnitudine, paruitate, duritie, mollietate, vehementia, humilitate, crebritate, raritate, tarditate, & frequentia.

Tertius fons desumitur à differentia inter pulsum humilem, & debilem, quam differentiam nos ex pulsilogio sic comprehendimus: si pulsus ægrotantis tactui nostro occurrere videatur debilior, quam fuerit die antecedenti; inueniatur tamen cum aliqua minori frequentia; perceptibili per nostrum pulsilogium: ille pulsus nullo modo erit debilis, sed humilis: sitque humilis, quia vehementia causarum morbificarum remissa sit, qua remissa, virtus vitalis commode potest perdurare vsque ad vigorem.

Quartus fons, siue quartum signum indicans virtutem posse perdurare desumitur à pulsu resistente. Cognoscitur resistentia, si saltem semel ipsum tangendo vehementius feriat digitos.

Quantum signum, si pulsus modo eleuetur, modo vix eleuetur significat oppressionem, & suffocationem virtutis: hæc virtus ita oppressa est illa, quæ magis potest cum ieiunio perdurare, quam robusta: quia robusta per ieiunium minuitur: suffocata verò per ieiunium augeatur.

Quo ad naturalem virtutem, hæc est apprimè necessaria, sed non in omni morbo, sed solum in morbis materialibus, qui concoctione superantur. Hinc Galenus 4. de prælag. expul. cap. 12. vult, facultatem naturalem in morbis materialibus esse principalem; sequi deinde vitalem, & deinceps animalem: vult esse principalem habita relatione ad concoctionem, sed non ad vitam protrahendam, quod non naturali, non animali, sed principaliter debetur vitali.

Colligimus ex tribus fontibus signo-

rum, an naturalis cum victu tenuissimo possit perdurare vsque ad vigorem.

Primus fons colligitur ex concoctione, & humorum malorum separatione, quæ omnia obseruantur præcipuè in vrinæ nubecula, hoc modo: si versus fundum vergat, indicat magna ex parte ipsum statum: si verò in superiori parte persistat, indicat principium augmenti: si in medio, finem augmenti: si versus fundum detineatur, ipsum statum significat. In alijs quoque euacuationibus, quæ per aluum, & per tussim fiunt: idem quoque, si alia signa consentiant, indicare possunt; habemus enim ex Galeno 4. aphor. comm. 22. ad crism tria esse necessaria, nempe concoctionem, separationem, & expulsionem.

Secundus fons signorum indicantium vires naturales robustas desumitur ex appetentia: quia Galenus 3. epid. 3. comm. 72. habet, facultatem naturalem imbecillam cognosci ex inappetentia: robustam verò ex appetentia naturali; ibi loquitur Galenus de Pario, qui mortuus est die 120. præcognouit Hippocrates ex Parij inappetentia facultates naturales vsque ad vigorem non duraturas, & propterea morituras.

Tertius fons desumitur à perspiratione insensibili, estque præcipuus, quia perspiratio, si debita & solita quantitate, & solito tempore fiat, certè indicat facultatem naturalem esse robustam. Quopactò vero facillimè in sanis, & ægris possimus dimetiri perspirationem, in staticis nostris, & in commentarijs supra Aui-cennam docuimus.

## APHORISMVS DECIMVS.



**Q**UIBUS igitur statim morbus consistit, his statim tenuis victus adhibendus est: quibus verò posterius debet consistere, his, & ipso consistendi tempore, & parum ante illud.



*illud, cibis subtrahendus, prius vero uberius agendum, ut ager sufficiat.*

Hic aphorismus adeo facilis visus est, ut à multis non fuerit iudicatus dignus expositione: nihilominus nonnulla pauca in ipso scitu digna obseruari possunt.

Nonnulli dicunt, Hippocratem in hoc aphorismo colligere per epilogum, quæ hæcenus dicta sunt de victus ratione: itaut hic aphorismus sit præcedentium epilogus. Hocque probant ratione, & auctoritate Hippocratis & Galeni. Ratione, quia in hoc aphorismo proponit victum tenuem, & tenuissimum: sed de victu tenui, & tenuissimo superius egit: ergo est epilogus. Confirmant quoque auctoritate Hippocratis, quia utitur his vocibus (quibus igitur) bis repetens has voces: quare inferunt esse epilogum. Idem cōfirmant auctoritate Galeni: quia in comm. habet hæc verba „ In hoc aphorismo Hippocrates habet eundem sermonem cum sermone, quem habuit superius.

Ex alia parte nos defendimus, non esse epilogum, quia Hippocratis grauitas, & dicendi breuitas non admittunt epilogum. Præterea epilogus in aphoristica doctrina non est necessarius, ac quando esset necessarius, esset ponendus in fine huius sectionis, & non paulo post principium. Demum nunquam inuenietis epilogum in operibus Hippocratis, neque in fine huius sec. neque in fine septimæ sectionis, neque in fine aliorum librorum: pepigit enim hoc ab initio, dum dixit (vita brevis,) nullam proferre syllabam sine summo artificio: quare adduci non possum, ut credam, hunc aphorismum esse epilogum.

Ad instantias, dum dicebant, Hippocratem loqui in hoc aphorismo de victu tenui, & tenuissimo, de quo egit superius. Respondemus, Hippocratem in hoc aphorismo, nec victum tenuem, vel tenuissimum nominasse, sed solum dixisse *ἀσθενῆς*, idest ten uiter esse alendum.

Ad argumentum desumptum à verbis Hippocratis qui bis repetit (quibus igitur)

ex qua repetitione colligunt, aphorismum esse illatum ex superioribus, & propterea esse epilogum. Respondemus, quod hac ratione sequeretur, omnes libros Euclidis esse epilogum primi libri, quia demonstrationes omnium librorum tandem inferuntur ex primis principijs, de quib. egit in primo libro. Præterea epilogus non inferitur ex superioribus, sed breuiter repetit quæ dicta sunt in toto libro.

Ad Galenum dicentem Hippocratem habere eundem sermonem cum sermone superiori, respondemus esse eundem sermonem, sed sermonem superiorem esse magis particularem, hunc verò esse magis vniuersalem: superius intellexit solum de peracutis exactè, & non exactè; hic verò aphorismus potest ampliari ad acutos exactè, & non exactè, ad acutos ex decidentia, & ad chronicos, quod scilicet in ipso vigore omnium morborum tenuiter sit alendum. Demum mirandum est, quomodo multi dicant, hunc aphorismum esse repetitionem septimi & octauum quod nullo modo defendi potest. Non est repetitio septimi: quia in septimo vult esse vtendum in toto morbo victu extremè tenuissimo: in hoc verò aphorismo de hoc victu ne verbum quidem: non est repetitio octauum, quia in octauo vult esse vtendum victu extremè tenuissimo in vigore peracuti: in hoc verò aphorismo vult in vigore omnium morborum tenuiter esse alendum.

Intentio igitur Hippocratis in hoc aphorismo est docere modum, ordinem, & progressum, qui obseruari debet in omni morbo circa rationem victus, itaut iste aphorismus sit omnium aphorismorum regula de victus ratione in quolibet morbo obseruanda.

Diuiditur aphorismus in tres partes. In prima docet ordinem cibandi, qui debet obseruari in morbis, qui statim videntur: dicitque tenuiter in his esse alendum. In secunda docet ordinem obseruandum in morbis, qui non statim videntur, dicitque in ipso vigore, & paulo ante esse demendum cibum. In tertia dicit (antea) idest in principio & augmento morbi plenius esse alendum.

Quo



Quo ad primam partem ait „ *Quibus vigor statim futurus est tenuiter esse alendum*: ergo non intelligit de perperacutis: quia in perperacutis nihil dandum est: non intelligit de peracutis, vt multi putant, quia in peracutis non tenuiter, sed tenuissimè est alendum: ergo intelligit de acutis exactè, & de acutis non exactè, in quibus vtimur victu tenui, vel tenuiter nutrimus, quod idem est.

Quo ad secundam partem „ *Quibus vero posterius*: non dicit parum posterius, vt præceptum possit ampliari ad acutos ex decidentia, & ad chronicos, in quorū vigore paulo ante est demendus cibus: quæ quidem sententia non conuenit acutis quia in acutis in vigore ipso non parum, sed multum cibi est demendum.

Quo ad tertiam partem per se est clarissima. Declarauit Galenus in 5. comm. huius sectionis, cibum diuidi in tres differentias, videlicet in tenuem, qui dicitur minuens, in mediocrem, & in plenum. Tenuis conuenit acutis: mediocris acutis ex decidentia, & chronicis: plenus verò conuenit sanis robustis: in hoc aphorismo intelligit de tenui, & mediocri.

Dicit in principio plenius esse alendum: quia Hippocrates 2. de rōne vic. tex. 15. habet „ melius est sorbere in principio, quam inanitis vemis, quia tunc est tempus iudicij, quod per cibum impeditur.

Prima dubitatio occurrit non spernenda: quia Hippocrates videtur desumere indicationem cibandi, & euacuandi à morborum temporibus, quod in arte medica nō admittitur: cibandi, quia in hoc aphorismo inquit, in vigore tenuiter esse alendum. Paulo ante vigorē cibū esse demendum: in principio & augmento plenius esse alendum: ergo indicationem cibandi desumit à morborum temporibus. Euacuandi, quia 2. sect. aphorismorum 29. dicit Hippocrates „ Si quid tibi videtur mouendum moue: cum verò consistit, & viger morbus ab euacuatione quiescēdū. Hæc doctrina aduersatur Galeno lib. de optima secta ad Trasylb. vbi ostendit, nullam indicationem cibandi, vel euacuandi esse desumendam à morborum temporibus. Non cibandi: quia ex Galeno 5. apho-

rismorum 64. & 1. de ratione vic. 44. indicatio cibandi desumitur à viribus. Non euacuandi: quia indicatio euacuandi desumitur ab humoribus præter naturam.

Respondemus tempora morborum secundario, & per accidens indicare & cibum, & euacuationem. Sic dicimus principium morbi per accidens indicare cibum pleniorē: quia natura tunc non cerrat cum morbo. Similiter principium morbi indicat esse euacuandum; quia in principio natura non est occupata morbo.

Sed pro intelligētia aphorismi duo occurrunt consideranda. Primum an sit vera Hippocratis sententia, quod versus statum cibus sit subtrahendus. Secundum cum dicat Hippocrates ante statū cibum esse demendum, cur non dicat etiam statim post statū, id est in declinatione parū cibi esse dandum: quemadmodum, & ipse Hippocrates & Gal. 1. de ratione vic. 25. de nutriendo ægro in declinatione obseruant: quia natura valde abhorret saltum ab extremo ad extremum, ideo si nihil in vigore dandum sit, in declinatione non multum, sed parum cibi exhibendum.

Secunda dubitatio: quo ad primum, non videtur ante statum cibum subtrahendum esse: quia Hippocrates 1. de ratione vic. 23. in quibusdam acutis in principio dat cremorem prissanæ: in statu totam prissanam: ergo versus statum, & in statu ipso non solum cibus est subtrahendus, sed augendus. Deinde Auicennas lib. 3. fen. 16. tract. 2. cap. 7. agens de dysenteria iubet primis duobus diebus à cibo abstinendum, deinde esse alendum: similiter in angina Auicennas primo dat oxymel, & aquam hordei: deinde auget cibum præbendo oui vitellum. Demum secundum communē vsum in acutis prima & secunda die ferè nihil damus: deinde summo cum beneficio tenuiter nutrimus, quod valde iuuat: ergo versus statum in acutis cibus non est subtrahendus.

Ad Hippocratem respondemus, ipsum dedisse versus statum integram prissanam in pleuritide: quia pleuritis versus statū incipit deficere, & hebescere: quia materia peccans vt plurimum in pleuritide



non referuatur ad vnicam expulsionem: ideo pleuritici versus statum, & in principio status sunt minus grauati, quam in principio, & augmento morbi. Aphorismi verò Hippocratis sunt de acutis, in quibus referuatur materia peccas ad vnicam expulsionem. Ipse Galenus 3. de ratione vic. vii. proponit hanc distinctionem de acutis, quod aliqui sint, in quibus tota materia morbifica ad vnicam expulsionem referuatur, de quibus locus est Hippocrates in aphorismis præcedentibus: aliqui verò sunt, in quibus non referuatur materia morbifica ad vnicam expulsionem, sed in principio, & augmento semper euacuatur: itaut morbi in statu incipiant deficere, & hebescere: sicuti sunt pleuritides multæ, angine, & febres, in quibus natura: vel medicus plus debito, & importunè euacuat in principio, & augmento: ideo in statu ægri minus grauati morbo pleniori tractantur cibo.

Ad Auicennam respondemus multis modis. Primò dicimus in dysenteria, angina & alijs inflammationibus parcius esse alendum in principio nõ ratione morbi, sed vt prohibeatur fluxio: isti enim morbi in principio propter fluxionem maximè augentur, nisi paucis cibis tractentur: ideo fluxio magis potest ad prohibendum cibum, quam ad permittendum.

Secundò respondemus in dysenteria, angina, & phrenitide primis diebus esse cibos amouendos gratia præseruationis: quia isti morbi primis diebus valde augentur. Tertiò in principio vtimur omnimoda inedia in his affectibus: quia ventriculus, & venæ meseraicæ sunt repletae pituita alimentali, quæ supplet vires alimenti: ideo à cibo abstinendum. Quartò in dysenteria à cibis abstinemus: quia remedia pro dysenteria magna ex parte habent vim nutriendi. In dysenterico affectu vtimur loricantibus, sicuti est iusculum pedum vituli, quod habet vim loricandi, & nutriendi: deinde vtimur euacuantibus, & refrigerantibus humores mordaces, quæ aliquomodo nutriunt, sicuti sunt tamarindi, diaprura si ne scamoneo ad drachmas quatuor

cum sero lactis chalibeato, quod medicamentum euacuat, refrigerat, corroborat, & aliquomodo nutrit.

Præterea diuertimus fluxionem ab intestinis diureticis, cuiusmodi sunt lac amygd. dule. seminum melonum cum aqua vileni conuersa in iusculum parue pulæ. Demum vtimur astringentibus, & corroborantibus, sicuti sunt diaforbon, diamespillum cum pauxillo seminum acaciæ, diacitonium, ossa panis in succo citoniorum, vnum ex prunis siluestribus, & in casu difficili caseus antiquus dulcis lotus & decoctus in muiua citoniorum, est Auicennæ præstantissimum quidem: itaut ipsa remedia dysenteria ferè omnia nutrant: clysteres ipsi loricantes ex iusculo intestinorum cum seruo hyrcino cum oui vitello & albumine cum vncia litargirij, quippe qui tollunt tenesmum, sanant vlcera, & aliqua ex parte nutrire possunt. Propter has causas in principio, & toto morbo in dysenteria cibus subrahendus est.

Ad experientiam desumptam ab vfu communi, quod scilicet prima & secunda die maximè iuuat, si cibus non sumatur. Respondemus non ratione morbi iuuare, sed quia primis diebus corpora sunt repleta cruditatibus, quæ per ieiunium in nutrimentum conuersi possunt.

Postremò respondemus ad omnes difficultates: regulas Hippocratis non verificari, quando virtus contraindicat: dum enim dicit, in perperacutis nihil dandum regula non tenet, si virtus vt debilis contraindicat. Similiter dum dicit, in vigore peracutorum nihil cibi dandum, non debet obseruari, si virtus contraindicat: contraindicat vero in octo casibus, quos superius distinctè recitauimus.

Tertia dubitatio: quo ad secundum cur Hippocrates nihil dicat quid sit agendum statim post statum, videlicet in ipsa declinatione, sicuti docuit primo de ratione vic. 25. Respondent multi Hippocratem dum dicit (sub vigore) comprehendere quoque declinationem: quia præpositio (sub) significat paulò ante, & paulo post vigorem.

Hæc interpretatio est nimis violenta: quia



quia in Græco legitur *πρὸ ἐκείνου μικρὸν ἀπαρτίζεσθαι*, idest ante ipsum parum auferendum, & non sub ipso; apud Græcos nunquam præpositio *πρὸ* significat sub, quare dum interpretantur sub ipso, efficiunt textum mendosum, legendum enim est ante ipsum.

Dicimus igitur nos, Hippocratem in hoc loco non agere de ratione victus observanda in declinatione, sed de ratione vic. habita relatione ad vigorem: quia dum morbi sunt in declinatione, nemo moritur, ut animaduertit Galenus 3. de crisibus c. 5. & 9. ideo consideratio declinationis ad hos aphorismos non pertinet.

## APHORISMVS VNDECIMVS.



*N* *accessionibus abstinere oportet, nam cibum dare nocuum est, et quibus per circuitum sunt cessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.*

In illis aphorismis Græcis, in quibus inuenitur dictio *ἢ* idest autem: continetur hic aphorismus cum postremis verbis præcedentis aphorismi hoc modo: postrema verba sunt „ antea verò plenius alendum videlicet in principio & augmento; ne quis igitur crederet in omni tempore principij, & omni tempore augmenti ægros esse alendos, Hippocrates statim in hoc aphorismo excludit tempus paroxysmi, quod in principio, augmento, & statu morbi fieri solet: hæc continuatio est Philothei; habet enim hæc formalia verba „ Cum docuerit Hippocrates in superiori aphorismo, quando oportet nutrire; nunc docet quando non oportet.

Sed quia dictio *ἢ* idest autem non est in cod. Galeni: ideo conectemus aphorismum non cum ultimis verbis præcedentis aphorismi, sed cum alijs aphorismis superioribus, hoc modo. Cum Hippo-

crates superius egerit de victu ægrotantium quatenus à toto morbo peracuto prohibetur. Reliquum erat ut ageret de victu ægrotantium, quatenus prohibetur à parte morbi: sed quia pars morbi cibum prohibens duplex est, alia vniuersalis, & alia particularis: de vniuersali idest de vigore egit quoque in aphorismo superiori, dum dixit in vigore tenuiter esse alendos ægros: relinquebatur, ut ageret de victu ægrotantium, quatenus prohibetur à parte particulari, quæ est paroxysmus: ideo inquit in hoc aphorismo, in ipsis paroxysmis, idest in ipsis accessionibus cibum adimere oportet.

Cardanus sic connectit, & rectè: cibum prohibetur solum ab his tribus, nempe à morbi genere, à tempore, & ab accessione: de morbi genere intellexit, dum dixit, in toto morbo peracuto nihil cibi dandum: de tempore prohibente cibum intellexit, dum dixit in vigore peracutorum, vel tenuissimo cibo vitendum: de accessione in hoc aphorismo, dum dixit, in ipsis accessionibus cibum adimere oportet.

Eandem doctrinam Hippocrates manifestius, & c'arius docet 1. de ratione vic. 46. & 4. de ratione vic. 39. dicimus manifestius, & clarius: quia non solum docet cibum esse adimendum in accessionibus, sed docet, quando ægri sint cibandi his verbis „ Cum pedes fuerint frigidi, non solum à sorbitione, sed etiam à potu esse maximè temperandum, sed cum caliditas ad pedes descenderit, & reliquerit cor, & thoracem, dandum esse cibum.

Hic aphorismus ad purgationem, venæ sectionem, & ad quoduis aliud præsidium ampliari potest: immo concluditur argumento à minori efficacissimo, quod in accessionibus, vel paroxysmis non conueniant remedia chirurgica, nec pharmaceutica: argumentum enim sic deducitur: si de quo minus videtur inesse & inest, ergo de quo magis, nempe si cibum non est dandus in accessionibus, tanto minus erunt administranda remedia chirurgica, vel pharmaceutica: quia hæc, naturam à certamine cum morbo



magis distrahunt, quam cibum. O quoties nostratum plurimi non animaduertentes an pedes sint calidi, vel frigidi, dant cibum, dantque medicamenta, venam secant, quando adhuc extremæ partes frigescunt: unde fit, quod sæpiissime ægrotantes interrimant.

Diuiditur aphorismus in duas partes. In prima docet, non esse dandum cibum in paroxysmis: quia cibum dare noxium est. In secunda non esse dandum cibum in paroxysmis, seu in accessionibus, quod idem est, illorum morborum qui habent circuitus.

Ex hoc aphorismo colligi solet hæc demonstratio. Abstinentum est ab omnibus his, quæ nocent ægrotis: sed cibum dare in accessionibus nocet ægrotis: ergo in accessionibus à cibo abstinentum. Parimodo Galenus lib. 12. meth. in principio & lib. 14. eiusdem inquit, officium medici esse cito, tuto, & iucundè sanare. Hi tres scopi propositi fuerunt ante Galenum ab ipso Asclepiade. Similiter Hippocrates lib. 1. epid. sec. 2. tex. 50. inquit his verbis, te ita exercito in morbis ut pro sis, aut ne quid noceas.

Sed quia idem videtur esse quod dicit in prima parte, & in secunda: in prima dicit, in accessionibus abstinere oportet. In secunda in accessionibus, quæ redeunt per circuitus: sed sic est, quod morbi qui habent paroxysmos sunt illi, qui redeunt per circuitus: ergo superfluum est Hippocrates. Auctores valde laborarunt in declarando quid intelligat Hippocrates in prima, & quid in secunda parte.

Philotheus asserit, Hippocratem in prima parte intelligere de paroxysmis febrium, & omnium morborum. In secunda addit aphorismo Hippocratis dictionem paulò ante, dicens, aphorismum esse legendum hoc modo, non esse nutriendum paulò ante paroxysmos, ita ut Hippocrates faciat mentionem de morbis, qui ha-

bent certos circuitus, in quibus facile cognosci potest, quando sit cibandum paulo ante accessionem.

Ambo aduersantur Galeno: quia in comm. vult in prima parte Hippocratem intelligere de paroxysmis omnium febrium continuarum. In secunda de paroxysmis febrium intermittentium, & omnium morborum, qui redeunt per circuitus, sicuti sunt apoplexiæ, asma, colicus dolor, catarrhus, hæmicranea, hæmorrhagia, lienosus affectus, mania, melancholia hypochondriaca, nephritis, podagra, vertigo: Demum omnes affectus hereditarios, qui redeunt per circuitus, amplexus est.

Quod verò Galenus in prima parte intelligat de paroxysmis continuarum febrium, & in secunda de paroxysmis intermittentium, & aliorum morborum, qui redeunt per circuitus, patet, quia habet hæc verba, In accessionibus licet dare cibum, vel quando declinant, vel quando cessant paroxysmi. Dum dicit, vel quando declinant intelligit de paroxysmis continuarum febrium: dum dicit, vel quando cessant, intelligit de paroxysmis intermittentiis, qui redeunt per circuitus. Deinde confirmatur, quia in superioribus egit de continuis febribus, ideo prius de ipsis intelligere debet. Quare rejiciendi sunt Oribasius, & Saluus Sclanus, qui addunt verba aphorismo Hippocratis dicentes, legendum esse paulo ante accessionem, cum nihil dicat.

Quo ad verba dicit in accessionibus abstinere oportet. Per accessiones intelligit quatuor tempora accessionis siue paroxysmi, videlicet principium, inæqualitatem, augmentum & statum accessionis, in quibus temporibus à cibo abstinendum est: declinatio verò propriè non est pars accessionis: idem enim significat accessio, & paroxysmus, sed est reuera pars circuitus.

Deinde notandum ex Galeni côm. 19. per accessiones, in quibus non est dandus cibum, esse intelligendas accessiones ordinatas, & non inordinatas: quia in accessionibus inordinatis non habemus regulam de victu exhibendo.

Præterea notandum est præceptum Hip-



paroxysmi, dum dicit, non esse cibandum in paroxysmis, limitandum esse, quod non habeat locum in contraindicantibus, sicut in picrocholis, qui ex Galeno 10. meth. 3. nisi in principio paroxysmi cibo humectentur, incidunt in hecticam febrem. Parimodo præceptum Hippocratis non habet locum in his octo casibus, de quibus etiam superius, videlicet in alimenti defectu, in corporibus qui multis, & copiosissimis cibis sunt assueti, in ætate puerili, vel senili, in morsu oris ventriculi, in peste affectis, in locis calidissimis, in quibus facile corpora resoluantur, & in habitu bilioso, sicuti sunt picrocholi, qui etiam in accessionibus sunt cibandi.

Insuper ægri non sunt cibandi in paroxysmis aliorum morborum, ut in dolore collico, nephritico, & alijs doloribus, secus dolores fierent saevissimi: causa verò, cur neque in accessionibus, neque in ipsis doloribus, neque paulo ante ægri sint cibandi, colligitur ex Galeno 3. de diebus decret. cap. 8. dicente paroxysmos esse quasi stimulos incitantes naturam ad pugnam: additque in paroxysmis fieri crism: ideo cibus naturam non esse diuertendam à certamine cum morbo.

Notandum quoque est, Hippocratem per cibum intelligere cibum solidum ad differentiam potus, quia potus alterantes, ut syrupi, vel iuscula tenuissima in statu morbi, quando calor ad pedes detenderit, non prohibentur.

*Et quibus per circuitum.* Circuitus Græcè dicitur periodus: circuitus differt à typo: quia periodus (ut exemplis illustremus) quotidianæ febris est 24. horarum, tertianæ 48. quartanæ 72. typus verò significat ordinem ipsum: hinc dicitur typus quotidianus, tertianus, & quartanus: ultra hos ordines medici in praxi non cognoscunt alios typos: quamvis Hippocrates 1. epid. 3. tex. 2. clarescat, dari quintanam, septimanam, & nonam febrem: Galenus verò in illo comm. solum fatetur, se observasse obscuras quasdam quintanas. Ibidem Galenus laudat Dioclem: quia contradixit Hippocrati de septimanis, & nonanis febr-

bus. Quare ego suspicor hanc opinionem de septimanis & nonanis febribus non fuisse Hippocratis: sed fuisse additam ab aliquo antiquissimo Auctore: ratio quæ me movet est, quia Hippocrates in alijs suis operibus nunquam facit mentionem de alijs febribus intermittentibus, quam de tertianis & quartanis.

Sed varia occurrunt considerata pro intelligentia istius aphorismi. Primum quomodo fiant paroxysmi febriles: quia illi sunt evidentiore, quam sint paroxysmi aliorum morborum; hoc cognito facilius intelligemus, cur in accessionibus abstinendum sit à cibis. Secundum quot sint tempora vniuersalia morborum, & quæ sint, & quomodo cognoscantur, & quot sint tempora particularia, quæ conveniunt circuitibus, de quibus loquitur in aphorismo. Tertium quando, & quomodo cibus sit ægris nocuus. Quartum quando ægris sit dandus cibus.

### QVÆSTIO XXXV.

*Quomodo fiant paroxysmi febriles.*

**Q**uomodo verò fiant paroxysmi febriles. Primò sciendum ex Galeno 1. de diff. feb. cap. 1. febrilem paroxysmum consistere in accensione cordis: deinde, calorem febrilem diffundi, vel in omnes partes, vel solum in nobiliores, ut inquit Galenus 1. in 6. epid. 28. dicit: vel solum in nobiliores: quia febris interdum non diffunditur ad cutim: ita ut febris non semper sit morbus totius.

Secundò sciendum, aliud esse principium accessionis, & aliud principium febris: principium accessionis non est principium febris: quia in principio accessionis calor in corde non est adhuc accensus: Ideo erravit Altimatus, qui dixit, primum calorem esse accensum in corde. Aliud enim est calor accensus in fonte putredinis: & aliud in corde, ob cuius accessionem solum fit febris, neque vlla febris fit, nisi calor putredinis compinginet cor, & constituat cor in calefacto esse.

Tet-



Tertiò sciendum, si partes solide cordis sint accensæ, fieri febrem hecticam: si humores, putridam; si spiritus, diariam. Præterea si solidæ sint accensæ, non necessario eo usque accenduntur humores, vel spiritus, quousque fiat febris putrida; vel diaria: hoc docet Galenus 8. meth. cap. 1. exemplo lignorum igni appositorum, quæ prius incallescunt, deinde accenduntur: Accedit, quod partes solidæ cordis, licet essent frigidæ, possunt incallescere: cognoscitur caliditas cordis ex Galeno 4. de præfag. expul. 5. ex pulsu paruo, languido, & tardo. Exemplum est opium, si igni apponatur, potest incallescere, manente eius substantia adhuc frigida: sic solidæ cordis partes quo ad substantiam possunt incallescere, frigidæque conservari, humores tamen, vel spiritus esse accensos.

Sed sumamus pro exemplo illa, quæ inferuntur proposito nostro. Putredo, siue accensio, vel fit in humoribus cordis: vel in humoribus extra cor: si in humoribus cordis, fit accensio ex putredine, fit febris pestilens, ut docet Galenus 3. de præfag. expul. 3. & 2. de diff. feb. cap. 4. & in hac febre non sunt paroxysmi: quia ipsa febris est vnicus paroxysmus. Vel accensio fit ab humoribus extra cor, quo casu accenduntur humores cordis per fuligines, quæ ut efficiant febres, oportet, ut coinquinent cor, & vincant, secus non fit febris: quia quando cor solum incalcescit, & non sit coinquinatum, & secundum aliquam partem victum, seu positum in calefacto esse, febris nullo modo fieri potest.

Deinde fuligines, vel eleuantur à sanguinis efferuescentia sine putredine, vel ab adusta bile sine putredine, vel à putredine bilis, pituitæ, vel melancholiæ: si à sanguinis efferuescentia sine putredine eleuantur, fit synochus, quæ potest esse vel homotona, vel epacmaistica, vel paracmaistica: Homotona fit quando tanta est perspiratio, quæ euaporat, quanta est illa, quæ retinetur: epacmaistica quando plus est quod remanet, quam illud quod exhalat, proceditque augendo: paracmaistica quando plus est

quod exhalat, quam illud quod retinetur, quia semper procedit decrescendo.

Si verò fuligines eleuantur ex bile adusta sine putredine, fit quadam periodus de tertio in tertium, de qua Galenus agit lib. 10. meth. 6. & vocatur synochus. Idem sentit Valesius quinto contro. 19. quod datur synochus ex bile adusta sine putredine, quæ efficit periodum de tertio in tertium, quod non admittit Iulius Alexandrinus, qui de hac re loquens, impugnat Nicolaum Florentinum, & ipsum Valesium.

Si verò eleuantur fuligines ex bile, melancholiæ, & pituita putrida, varij sunt circuitus: quoniam ille qui fit à pituita est 24. horarum ad summum: Circuitus, qui fit à bile est 48. horarum, à melancholiæ 72. horarum.

Præterea, sicuti ex Galeno 3. in 1. epid. 5. dantur tres differentię tertianarum intermittentium, videlicet exquisita, cuius paroxysmus non excedit duodecim horas. Absoluta, cuius paroxysmus non excedit 24. & producta, cuius paroxysmus non excedit 36. additur quarta differentia idest enormis, quæ normam videlicet excedit, cuius paroxysmus excedit 36. quæ tamen adhuc est intermittens: sic dari possunt quatuor differentię febris quartanæ intermittentis, & quatuor quotidianæ intermittentis: eadem tamen seruata proportionem, hoc modo: si paroxysmus exquisitæ tertianæ non excedit duodecim horas, sic paroxysmus exquisitæ quartanæ non excedet 18. horas. Parimodo si absoluta tertiana non excedit 24. horas, sic paroxysmus absolutæ quartanæ non excedet 36. horas: si paroxysmus productæ tertianæ non excedit 36. horas, sic paroxysmus productæ quartanæ non excedet 54. horas. Similiter si enormis tertiana excedit 36. horas: sic enormis quartana excedet 54. horas. Ad eundem modum, si quotidiana exquisita non excedit sex horas, absoluta non excedet 12. producta non excedet 18. Enormis verò excedet.

Qui igitur non præcognoscit, an intermittentes sint exquisitæ, absolutæ, productæ, vel enormes, ut dictum est, ne-



nescient certè, qua hora sit cibandus æger, nec quando sint purgandi, vel alterandi humores, & vt summam dicā, his non præcognitis, medicus fortuitò, & casu incedet non sine magno ægrotātis discrimine: ideo dum Hippocrates in aphorismo dicit, in ipsis accessionibus cibum dare nocuum est, & abstinere oportet, supponit, nos distinctè intelligere longitudinem, vel breuitatem paroxysmorum omnium febrium.

## Q V Æ S T. XXXVI.

*Ostenditur, nec cibos, nec alia remedia conuenire in paroxysmis.*

**Q**uare vt aphorismus rectè obseruetur, quando videlicet dandus sit cibus: primum præceptum obseruandum colligitur ex Hippocrate lib. 1. de ratione vic. in ac. 46. & 4. de ratione vic. 39. vbi admonet, cibum dandum non esse, nisi calor febrilis reliquerit cor, & ad pedes descenderit, subdit, cum pedes fuerint frigidi non solum à sorbitione, sed etiam à potu maximè esse temperandum: Prohibet etiam omnem portionem, quæ habeat vim alterandi: quia habet hæc verba quarto de ratione vic. citato, nisi calor ad pedes descenderit, & reliquerit cor, nec sorbitionem, ne aliud quidquam dato, ita excludat non solum iuscula, sed & serum lactis, aquam hordei, & si quid leuius istis inueniri possit: quoniam aliquid etiam tenuissimum exhibendo, natura à certamine cum morbo diuertitur.

Insuper cibandi sunt ægri hac lege, vt in principio paroxysmi facta sit in ventriculo prima coctio: de secunda nihil dicitur, quia ita cito fit, vt in ipsa celebranda à certamine cum morbo natura non diuertatur. Si verò paroxysmi sint ita continui, vt nulla appareat declinatio, tunc parum pro vice ægri sunt nutriendi. Si verò vires sint imbecilles, & pedes manent semper frigidi, & morbus longior sit, quam peracutus, ferè semper moriuntur, isti parum, & sæpè nutriuntur, ne vires omnino cadant.

**D**emum notandum circa hunc aphorismum, nõ solū à cibo in paroxysmis abstinendum: sed à purgatione, venæ sectione, & alijs remedijs chirurgicis, vel pharmaceuticis, quæ certè in paroxysmis non habent locum, quod potest probari argumento à minori, quia si in paroxysmis cibus aliquis tenuis quoque noceat, quia diuertit naturam à certamine cum morbo: quantò magis remedia, quæ sunt omnia præter naturam diuertent ipsam à certamine cum ipso morbo? Hic notatue error multorum, qui sæpissimè dant cibū ægrotantibus, licet pedes sint adhuc frigidi, & quod peius est, vtuntur phlebotomia, purgationibus, & alijs remedijs eo tempore, quo natura est, maximè occupata morbo, vnde & febres malignæ, & mortes ob medicorum inscitiam facillè succedunt.

## Q V Æ S T. XXXVII.

*Ostenditur, & quæ sint & quot sint tempora vniuersalia, & particularia febrium.*

**Q**uæ attinet ad secundum: quot scilicet sint tempora vniuersalia, & quæ sint. Cum igitur morborum tempora, alia sint vniuersalia, & alia particularia, loquēs Galenus lib. de morborum temporibus cap. 1. de temporibus vniuersalibus, inquit esse certas morborū ætates, sicuti sunt ætates in animalibus: hæc verò tempora vniuersalia ex Galeno lib. de opt. sec. ad Trasib. cap. 37. distinguuntur ex morione causarum morbiicarum, & ex symptomatum vehementias sunt hæc quatuor: principium, augmentum, status, & declinatio. Principium morbi habet duas conditiones: prima ut symptomata habeat leuiora, quæ cōditio proponitur ab Hippocr. 2. aphorismorū 30. vbi dicit, In principio, & sine omnia leuiora: Secunda conditio est, vt in vrinis nullum appareat signū coctionis.

Augmentum similiter habet duas conditiones: prima vt symptomata notabiliter incipiant ægrum vexare: Secunda vt appareat in vrinis signum coctionis, ita vt natura incipiat separare contenta



ab ipsa substantia efficiendo vel nubeculam, vel hypostasim saltem imperfectam.

Obiter tamen notandum est hoc, quod maximè confert ad prognosticum, quod si symptomata incipiant notabiliter vexare, & ex alia parte nullum appareat signum coctionis, ut plurimum moriuntur.

Status habet duas conditiones: prima ut symptomata sint ad summum aucta: secunda ut appareant signa perfectæ coctionis: quæ si non appareant, quando ad summum aucta sunt symptomata, signum est victoriam se tenere ex parte morbi, & inde ægrum non amplius conualiturum.

Declinatio parimodo habet duas conditiones: prima, ut symptomata sint facta leuiora: secunda, ut natura incipiat expellere, nisi verò incipiat expellere, quando symptomata facta sunt leuiora, impendet periculum recidiuæ, quod signum nunquam nos decipit.

Quo ad tempora particularia, quæ cōueniunt circuitibus ex Galeno lib. de morb. temp. cap. 3. sunt sex: videlicet principium paroxysmi, inæqualitas, augmentum, status, declinatio, & interuallum, quod dicitur integritas seu infebrecitatio.

Principium circuitus est donec perdurat rigor, vel extremarum partium frigiditas: quo tempore ex Galeno 4. de ratione vic. 3. calor recurrit ad cor.

Inæqualitas est post rigorem, sed antequam augeatur caliditas, quod est inter finem rigoris, & principium accessionis.

Augmētum est, dum calor diffunditur ad partes extremas, quo tempore partes extremæ non sunt amplius frigidæ, sed incipiunt incalescere.

Status est quando caliditas extremarum partium sit æqualis caliditati thoracis.

Declinatio est, dū calor incipit relinquere cor, ut admonet Galenus loco citato.

Interuallum seu integritas est omni moda infebrecitatio. Hæc sunt illa tempora: quæ conueniunt circuitibus omnium febrium interminentiũ.

Notandum tamen est, febres continuas habere solum quinque tempora, quia carent interuallo, seu integritate, id est infebrecitatione.

**C**ognitis temporibus particularibus colligimus nō esse cibandos ægros, in paroxysmis, intelligēdo per paroxysm os hæc quatuor tēpora, nempe principium, inæqualitatem, augmentum, & statum: nihil dicimus de declinatione: quia declinatio non est pars paroxysmi.

Prima dubitatio oritur circa aphorismum Hippocratis: quia Galenus lib. de morborum temp. cap. 5. & 6. & primo de crisib. 3. vult, paroxysmos habere declinationem: ergo si in accessionibus cibum dare nocuum est, per hunc aphorismum neque in declinatione ægri erunt cibandi: ergo nunquam.

Responderi potest huic instantiæ: paroxysmum reuera nō habere declinationem: quia Galenus lib. de morb. tēporib. c. 6. diuidit circuitum in accessionem, & remissionem: deinde diuidit accessionem in quatuor tempora, videlicet in principium, inæqualitatem, augmētum, & statum: remissionem verò in declinationem, & interuallum: ideo Galenus lib. de morb. temp. & Aulcennas cap. de horis febrium definiunt paroxysmū, quod sit deterior pars periodi: ergo declinatio non pertinebit ad paroxysmum. Deinde respondemus, statum paroxysmi diuidi in partem anteriorem, mediam, & posteriorem: quæ pars posterior est pars facta: ad quam, si ægri perueniant extra lutum pedes habent: quia non amplius impendet vitæ periculum: sicuti asserit Hippocrates dum vult, ut ægri perdurent cum cibo tenui vsque ad vigorem, id est vsque ad vltimam partem vigoris, in quam nemo moritur: quia in illa parte, si cibis reficiantur, non propterea natura diuertitur à certamine: siquidem morbus tūc est victus, & superatus.

### Q V Æ S T. XXXVIII.

*Offenditur quando, & quomodo cibus sit ægris nocuus.*

**Q**uo ad cibum quando, & quomodo sit nocuus ægris. Primò dicimus, cibum esse nocuum ægris quatenus sunt ægri. Secundò quatenus sunt in



in vigore morbi. Tertiò quatenus sunt in principio accessioneis, in inaequalitate, in augmento, & quatenus sunt in vigore accessioneis: Quartiò est nocuus aegris, quatenus sunt propè accessiones.

Quod cibus sit nocuus aegris, quatenus sunt aegri, confirmatur ratione, & auctoritate Hippocratis, & Galeni. Ratione: quia aegri nullo vtuntur exercitio. Quod verò ob hanc rationem sit nocuus aegris, probatur argumento à minori hoc modo: si cibus est nocuus aegris, quando nullo vtuntur exercitio, quanto magis erit nocuus aegris in lecto iacentibus? Secundò est nocuus: quia cibus semper distrahit naturam à certamine: ideo Galenus in comm. 8. huius sec. habet hæc verba „ non oportet naturam cibo distrahere ad alteram coctionem, quando vacat coctioni humorum morbum efficientium. Deinde morbus vt morbus contraindicat cibum, vt probatum est superius. Præterea auctoritate Hippocratis 2. aphor. 9. idem confirmatur, dum dicit „ impura corpora, quanto magis nutries, tanto magis lades: ergo cibus aegris, quorum corpora sunt impura, nocuus erit. Similiter 7. aphorismorū 65. Hippocrates habet hunc aphorismum „ cibus febricitantibus morbus fit. Galenus 1. ad Glauc. 10. videtis cibum esse adeo nocuum aegris, vult in tertiana notha, ægros non quotidie, sed solum alternis diebus nutriendos esse.

Insuper dicimus, cibum esse nocuum aegris, quatenus sunt in statu vniuersali, seu in vigore morbi, esseque magis nocuum in statu, quam in principio & augmento. Primò quia Hippocrates aphor. 8. huius, loquens de peracutis nò exacè ait, peracuti non exacè dicuntur qui terminantur in secundo quaternione dicèdo „ quando morb. est in vigore, vel tenuissimo victu, idest ieiunio vtendum, & in 10. aphorismo nuper declarato loquens de acutis ex decidentia, & de chronicis vult in statu tenuiori esse alendum: antea verò idest in principio, & augmento plènius alendum, quam in

statu: ideo cibus præcipuè in statu aegri est maximè contrarius.

Secunda dubitatio ex dictis consurgit, quia videtur, quod cibus sit magis nocuus in principio, quam in statu: contra id quod dictum est: idque probatur duabus rationibus. Prima ratio est, quia in principio corpora sunt magis impura, quam in statu: ergo magis nutriendum in statu. Secunda ratio: sicuti se habet æger in temporibus particularibus morbi: sic se debet habere in vniuersalibus: sed in tempore particulari idest in paroxysmi vigore plus cibi dandum est, quam in principio, & augmento paroxysmi: ergo etiam in vigore vniuersali morbi plus cibi dandum erit, quam in principio, & augmento particulari.

Respondetur ad primam rationem negando, quod in principio morbi corpora sint magis impura: tunc enim sunt magis impura, quādo putredo est magis fermentata: sed in statu est magis fermentata, quam in principio, vel augmento.

Ad secundam rationem respondemus non valere similitudinem inter tempora vniuersalia, & particularia: quia in principio vniuersali materia quiescit, atque est omninò incocta: in principio particulari paroxysmi materia est in motu, & concoquitur: in principio vniuersali omnia accidentia sunt remissa, vt docet Hippocrates 2. aphor. 30. In particulari verò omnia sunt in summa agitatione. In principio vniuersali conueniunt lenientia, & phlebotomia: in particulari verò nec lenientia, nec phlebotomia: sola enim quies est illa, quæ in principio paroxysmi conuenire potest.

Demum dicimus, cibum esse nocuum aegris, quatenus sunt in principio paroxysmi. Quod confirmatur ratione, & auctoritate Galeni & Hippocratis. Ratione, quia in principio paroxysmi cibus impedit, ne fiat transmissio humoris percutantis à venis maioribus ad minores, & à minoribus ad extra venas: modò febres, quæ sunt intermittentes ob hanc impeditam transmissionem sunt continua, & continua sunt malignæ, & ma-



ligna mortales, sicuti contigit filia Philonis, & agro inominato, qui agrotantes ob cenam intempestiuam, ut dicit Hippocrates, mortui sunt. Intermittentes sunt continuæ, dum à cibo impeditur transmissio, quia humor peccans non transmittitur extra venas, & statim putrescit in venis.

Gentilis tenet, intermittentes fieri, dum humor peccans actu putridus in venis expellitur ad extra venas.

Communis opinio est, quod dum expellitur ad extra venas adhuc non sit actu putridus: quia coquinaret sanguinem, & febris fieret continua.

Fernelius rectius sentit in hoc, dum tenet, continuas fieri ex humoribus sanguini permixtis: intermittentes verò ex humoribus sine sanguine. Sed quid quid sit, cibus in principio paroxysmi semper impedit, ne à venis ad extra venas fiat transmissio. Causa est, quia in principio paroxysmi calor est contractus ad ima: inde propter cibum perseverat multò magis contractus: quo casu febris non se ostendit, & tales sunt malignæ.

Ceterum, quia dictum est, probari posse auctoritate Hippocratis & Galeni cibum esse nocuum ægris, quatenus sunt in principio accessionis: ideo cõfugiendū est primo ad Hippocratem qui r. de ratione vic. 46. & 4. de ratione vic. 39. loquens de statu ægrotum existentium in principio accessionis, & de nocumento cibi (si tunc exhibeatur,) habet hæc verba, „ Venter de necessitate calet, fastiditque cibum, intēditur hypocondrium: subdit, dolet æger, lancinatur, vellicatur, & vomere affectat. Subdit expedit dare sorbitionem, dum calor ad pedes descendit, secus sorbitio euadit perniciofa.

Idem confirmatur auctoritate Galeni, quod scilicet cibus sit valde noxius in principio accessionis: quia lib. de morborum temp. cap. 3. & 3. de prælag. 3. inquit: virtus in principio est suffocata, & à cibo multò magis suffocatur.

Præterea cibus est nocuus ægris, quatenus sunt in augmento: quia tunc augetur calor febrilis, & cibus redditur acris, & tandem corrumpitur, ob quam corru-

ptellam febris multò magis intenditur.

Diximus quoque cibum esse nocuum ægris, quatenus sunt in statu paroxysmi, quia calor adhuc non reliquit cor: non tamen est ita nocuus, sicuti est in principio, & augmento paroxysmi: tum quia in principio & augmento calor febrilis non est adhuc diffusus: tum quia (& hæc est præcipua causa) nocumeta principij, & augmenti communicatur vigori, sed non vice versa: quia præfens malum nõ potest communicari præterito, sed solum futuro, & futura declinatio non est capax nocumenti præteriti: ideo nocumenta vigoris non communicantur alijs: quia statim sequitur declinatio, in qua ægri sunt in tuto, & in ipsa nemo moritur.

**Q**uo ad tempus cibandi ægros, Hippocrates docuit in accessionibus non esse dandū cibum. Relinquitur ergo, ut cibus exhibeatur, vel in declinatione, vel interuallo, vel multo ante principij paroxysmi, vel paulò ante. Galen. i. meth. c. vltimo omnia docet. Primò docet quando multo ante paroxysmum sit dandus cibus, his verbis, „ si iecur, aut vētricus patiatur inflammationem: vel in corpore sit adeo magna humorum redundantia, ut pedes diu conseruentur frigidi, vel somnus in principio paroxysmi sit profundus, cauenda est cibatio paulò ante paroxysmum, ut res perniciosissima: tunc enim adeo ante paroxysmum est æger cibandus, ut cibus in principio paroxysmi sit omninò conuersus in chylum. Secundò Galenus docet loco citato quando paulò ante paroxysmum sit dandus cibus, his verbis, „ Si verò non fuerit inflammatio, vel succorum redundantia, vel somnus profundus, corpusque sit siccum, paulò ante: immo in ipso paroxysmo corpora sicca, ut picrochola cibo sunt humectanda, ne in hecticam cadant: quia in his cibus siccitatem corrigit.

Sex igitur sunt consideranda, ut rectè intelligamus, quando sit dandus cibus, videlicet pars affecta: affectus: natura principij paroxysmi: natura agrotantis: quantitas, & qualitas cibi.



Pars affecta, quia Galenus 11. meth. citato inquit „ si iecur, vel ventriculus sit valde lēsus, multo ante paroxysmum nutriendum est. Affectus est considerandus: quia in omni graui affectu: nisi sint contraindicantia multo ante paroxysmum æger nutriendus est. Dum verò morbus est vniformis, vt in homotona, ex Galeno 11. meth. cap. 5. ad duo confugimus, videlicet ad consuetudinem, & ad faciliorem tolerantiam: quia si æger solet cibari hora decima octaua vel alia, illa est eligenda.

Insuper naturæ principij paroxysmi est consideranda: quia si diu partes extremæ conseruetur frigida, somnusque sit profundus in principio ipsius paroxysmi: tunc multo ante paroxysmum est cibandum. i. in fine status præteriti paroxysmi: immo, & in statu ipso potius, quam paulò ante.

Porro natura ægrotantis est consideranda: pituitosam, & sanguinei multo ante: biliosi verò paulò ante, & in ipso principio.

Demum quantitas, & qualitas cibi: quia si cito digeritur ratione qualitatis, & quantitatis paulò ante, si tardè, multo ante: ideo Auicennas prima 4. de his inquit „ Ita esse ægros cibandos, vt aduentante paroxysmo ventriculus sit vacuus.

Tertia dubitatio occurrit, Galenus dixit aliquando ægros esse cibandos in principio, & aliquando in statu: tamen nihil dixit de augmento: immo semper prohibuit cibum in augmento, quod nostratum plurimi non obseruant.

Responsio facilis est, quia in augmento incipiunt praua symptomata: ideo si in augmento cibarentur sine dubio in statu fierent sæuiora accidentia. Hinc Cornelius Celsus lib. 3. cap. 5. habet hæc verba „ si propter necessitatem urgeat cibandi necessitas, satius est consistente febre aliquid cibi offerre, quam incrementum, & satius est instante, quam incipiente. Valeant igitur triuiales Medici, qui post quinque horas circiter à principio paroxysmi, quando pedes non sunt omnino calidi, dant ouum, vel iusculum cum caponis stillatitio crasso, & coctum difficili: quo nihil est perniciiosius.

Quarta dubitatio Hippocrates in hoc aphorismo dicit, in accessionibus nihil dare oportet: idē quoque repetit aphor. 19. ergo est superfluum.

Responderetur: Hippocratem in hoc aphorismo intelligere de ciborum quantitate. In aphorismo verò 19. de modo vtendi ipsis cibis. Deinde in aphorismo 9. non solum de cibo prohibendo in accessione: sed etiam ante accessionem: quare varia in varijs locis est Hippocratis intentio. Nonnulli respondent ad dubium, hoc loco Hippocratem in hoc aphorismo prohibere cibum, in 19. verò cibum & potum: sed prior solutio magis probatur.

#### APHORISMVS DVODECIMVS.



ACCESSIONES verò & constitutiones morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituum successiva incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora intervalla fiant. Sed & ex his, quæ mox apparent, indicia sumuntur: quemadmodum in morbo laterali si circa initia statim sputum appareat, morbum breuiat: si verò postea appareat, producit. Et vrina, & alij excrementa, & sudores, quacumque apparuerint, vel bonam morborum indicationem, vel malam, vel breues, aut longos fore morbos ostendunt.

Hic aphorismus est maximè utilis: quia tradit methodum præcognoscendi futuros paroxysmos, & constitutiones, siue futuros vigores, sine quibus victus ratio institui non potest. Agit de signis  
non

non demonstratiuis, sed prognosticis, & est primus aphorismus, qui agit de hac re.

Connecitur cum superiori aphorismo, ut docet Galenus in comm. hoc modo: tria sunt necessario considerata in victu instituendo, primò vires ægrotantis: secundò accessiones: tertio constitutiones, seu vigores, an scilicet morbus sit futurus longus, vel brevis.

Primò sunt consideranda vires, quia vires per se primo indicant alimentum, ut docet Galen. 1. de ratione vic. 44. de viribus mentionem fecit Hippocrates aphor. 9. dum dixit coniectari autem oportet, & in fine aphor. 10. dixit „ antea verò plenius alendum, ut ægrotus perferre queat.

Secundò oportet considerare accessiones, seu paroxysmos, tamquam illos, qui prohibent cibum, de quibus in aphorismo superiori.

Denum oportet considerare constitutiones, seu vigores, à quibus norma dietandi dependet, non tamquam indicantes, sed tamquam prohibentes ipsum cibum, de quibus vigoribus egit habita tamen varia consideratione in aphor. 4. 7 8 & 10. huius sectionis.

Cum igitur hæc tria proposita absolute tractatum de instituendo victu. Reliquum erat, ut in hoc aphorismo Hippocrates doceret, qua arte & quo ingenio possint præcognosci futuri paroxysmi, an longi, vel breues, & qua arte possint præcognosci vigores, an tardè, vel citò sint aduentaturi, seu constitutiones, an scilicet morbi sint futuri longi, vel breues. Quod ut faciat, in hoc aphorismo Hippocrates tradit quatuor fontes signorum indicantium futuros paroxysmos, & futuros morborum vigores, quorum primus continet signa, quæ desumuntur à morbis ipsis. Secundus fons continet signa, quæ colliguntur ex anni temporibus. Tertius continet successiua incrementa. Quartus verò continet signa mox apparentia.

Quo ad diuisionem, Philotheus diuidit hunc aphorismum in duos aphorismos, quæ diuisio videtur esse Galeni, qui volens exponere illa verba „ & circuituum

successiua incrementa dixit: hæc verba esse finem aphorismi: ergo sequentia verba pertinebunt ad alium aphorismum, & si aphorismus erit duplex.

In primo aphorismo, vel in prima parte huius aphorismi proponit tres fontes indicantes paroxysmos, & futuros morbi vigores, qui sunt morbi, anni temporis, & circuituum successiua incrementa. In secundo aphorismo vel in secunda parte tradit signa mox apparentia indicantia futuros paroxysmos, an longi, vel breues, & futuros morborum vigores, an scilicet tardè, vel citò sint aduentaturi, quod idem est, ac diceret, si morbus esset longus, vel brevis, vel an constitutiones pertineant ad morbos acutos, vel ad chronicos.

In prima parte Hippocrates primò ponit morbos. Galenus verò in comm. dat exemplum de febribus intermitentibus, & de continuis. De intermitentibus dicit, tertianam supple exquisitam indicare bilem, & per consequens paroxysmos breues futuros, & vigorem cito aduentaturum: nam Hippocrates 4. aphorismorum 59. inquit „ septem circuitibus, quod longissimum est, hanc tertianam terminari: ad differentiam tertianæ nothæ, quæ bile iuncta cum pituita, vel melancholia fit: hæc longos paroxysmos, & tardos vigores prænuunciat. Quartanam ait indicare melancholiam, quæ longos paroxysmos, & tardum vigorem indicat. Quotidianam pituitam, quæ tardum morbi vigorem prænuunciat.

Deinde Galenus in comm. dat exemplum de continuis: diuiditque febres continuas in tres differentias, nempe in incendentes, quas vocat caufodes idest ardentes: in succedentes, quas vocat typhodes, quæ vocantur etiam elodes, idest humidæ, quæ statim prima die sudare incipiunt absque vilo beneficio, tales indicant morbi longitudinem, & hamitricos idest semitertianas. Facta diuisione dicit Galenus incendentes indicare paroxysmos breues, & vigorem citò aduentaturum: hæc sunt duum generum: quædam habent accessionem, sicuti tertianæ continuæ: quædam non habent ac-



cessionem, ut sunt synochæ febres. Succedentes (ait) paroxysmos longos, & tardum vigorem: quia hæc febres fiunt, vel à pituita, vel à melancholia. Semiterrianas (ait) indicare medium statum idest nec longos paroxysmos, nec tardos vigores: quia fiunt ex bile, & pituita.

Sed, quia Galenus in *comm.* mentionem facit de hæmitriteo, aliquid dicendum est de hæmitriteo. Dantur quatuor species hæmitritei. Quædam componitur ex tertiana continua, & quotidiana continua: hæmitriteus sanè ex Galeno 2. de diff. feb. est febris composita ex tertiana, & quotidiana. Secunda species hæmitritei sit ex tertiana intermittente & quotidiana continua. Tertia species ex quotidiana intermittente, & tertiana continua. Quarta ex quotidiana intermittente, & tertiana intermittente.

Insuper obiter notandum, hæmitriteum esse morbum compositum per complicationem, & non per confusionem: morbus verò compositus per confusionem est quando duo humores inuicem confunduntur, atque ita miscentur, ut fiat vnica massa, sicuti euenit in tertiana notha, in qua pituita sequitur motum bilis, bilis tamen omnino prædominatur. Morbus verò per complicationem est duum generum: quorum primum est quando sunt duo humores, qui faciunt duos morbos, sed non per confusionem, ut dictum est, quamuis in eadem parte peccent varij humores. Secundum genus morbi per complicationem est, quando ex vno humore putrefacto in diuersis locis fiunt duo morbi, sicuti sunt duæ tertianæ, vna scilicet ex bile putrescente in vna parte, & alia ex bile similiter putrescente in alia parte. Hæmitriteus igitur est febris composita per complicationem, ita ut sint duæ febres, vna quotidiana, quæ ex pituita fit, & alia tertiana, quæ ex bile.

Sed quia quatuor modis sumitur hæmitriteus, dicimus exactum hæmitriteum ex Hippocrate 3. in quintum epid. 5. & ex Galeno 2. de diff. feb. 8. & alibi esse febrem horificam.

Prima dubitatio: disputant tamen plu-

rimi, quomodo hæmitriteus sit febris horifica: quia non videtur, quod sit horifica: tertiana enim facit rigores, & non horores: ergo non erit horifica.

Respondemus Nos ad hæc instantiam, hæmitriteum fieri horificum, quando vna & eadem hora simul tertiana, & quotidiana inuadunt: ideo Galenus dicit, hæmitriteum esse febrem horificam in reduplicatione, quando vna, & eadem hora duæ accessiones fiunt: sitque horror, quia bilis flaua eodem tempore agitata ita obtunditur à pituita, ut fiat horror, & non rigor.

Deinde Hippocrates proponit secundum fontem signorum, in quo continentur anni tempora: quia morbi non sufficiunt ad præcognoscendos futuros paroxysmos & futuros vigores; sed requiritur syndrome quatuor signorum, videlicet morborum, temporum, circuituum, & signorum in ox apparentium.

Dicit, anni tempora indicare paroxysmos futuros, & futuros morborum vigores: quia anni tempora indicant humores peccantes, & per consequens, an futuri paroxysmi breues, & an morborum vigores cito, vel tardè sint aduentaturi. Hinc morbi, qui fiunt in vere ut plurimum fiunt à sanguine, qui efficit febres synochas, quæ breues sunt: immo morbi, qui fiunt in vere magna ex parte sunt breues. Morbi verò qui fiunt in æstate, ut plurimum fiunt à bile quæ similiter prænunciat paroxysmos breues, & vigores citissime aduentaturos: immo à quacumque causa fiant morbi, in æstate semper euadunt breuiores: ideo Hippocrates secundo aphorismorum 25. loquens de quartana, quæ sua natura longa est, inquit æstiuas quartanas breues, autumnales verò longas, & maxime quæ hyemem attingunt. Morbi verò, qui fiunt in autumnno, ut plurimum fiunt à melancholia, quæ indicat morbos longos: sed à quacumque causa fiant morbi in autumnno sunt longi, & periculosi, tum quia illa temporis inæqualitas prohibet illorum morborum resolutionem: tum quia autumnus recipit humores tempore æstatis superaffatos. Morbi denique,



que, qui sunt hyeme, vt plurimum sunt à pituita, quæ & paroxysmos longos, & tardum vigorem prænunciant: immo à quacumque causa fiant morbi, hyberno tempore sunt longi, quia ob frigus tarda est morbosicarum causarum resolutio.

Notat Galenus in comm. dum Hippocrates facit mentionem de anni temporibus intelligendum esse de ætate, de temperamento, de cōsuetudine, de regione, & de celi statu: quia si morbi in æstate sunt breuiores, idem dicendum est, in iuuentute, morbos esse breuiores, in senectute longiores; & sic de alijs temperaturis.

*Circuituum successiuæ incrementa:* dicit Hippocrates indicare paroxysmos, & vigores. Hinc periodus de tertia in tertiam indicat peccare bilem, inde paroxysmos & vigores fore breuiores. Periodus vero de quarta in quartam indicat melancholiam, quæ lēgitudinem significat.

Periodus quotidiana indicat pituitam, quæ parimodo paroxysmos, & vigores tardos prænunciat.

Sed circa hanc primā partem aphorismi quatuor occurrunt considerata. Primum examinabimus verba Hippocratis.

Secundum considerabimus, cur Hippocrates inter signa indicantia paroxysmos, & vigores non proposuerit in hoc aphorismo virtutem: non ne ex Galeno 2. de diff. feb. vlt. habetur, virtutem imbecilem prænunciare paroxysmos longos, & tardos vigores? & virtutis validitatem indicare breues fore paroxysmos, & vigores cito aduenturos?

Tertium cōsiderabimus quomodo circuituum successiuæ incrementa possint prænunciare futuros vigores. Res sanè non videtur ita facilis, quia dantur febres ex Galeno primo de crisis 3. quarum paroxysmi vsque ad finem morbi semper anteponunt: & dantur febres, quarum paroxysmi vsque ad finem posponunt: quō igitur circuituum successiuæ incrementa indicare poterūt futuros vigores?

Quartum quæ nam sit causa immediata periodorum considerabimus: videlicet qua de causa pituita quotidie ex- ceter paroxysmos, bilis alternis diebus, &

melancholia de quarto in quartum.

Quo ad verba aphorismi, Hippocrates in hac parte vult docere, morbos, anni tempora, & successiuæ circuituum incrementa, seu periodorum (quod idem est) indicare futuros paroxysmos, & futuros morbi vigores: hæc sunt verba, τὸς παροξυσμὸς καὶ τὰς καλὰς ἀνάσεις: per catastasis, & ipse Galenus & ferè omnes alij interpretantur constitutiones: ita vt vellint, quod Hippocrates dicat, morbos indicare constitutiones. Cæterum hæc expositio mentē Hippocratis reuera non explicat: immo reddit hunc artificiosum aphorismum omninò inartificiosum: quia secundum illorum interpretationem Hippocrates diceret, quod morbi significant constitutionem: quæ constitutio est genus proximum morbi: quod artificium esset Hippocratis, quod morbi significarent suum genus: veluti quod homo significaret animal: æquæ vtilitas est in medicina, quod morbus significet suum genus?

Deinde constitutio, quæ est idea morbi non vocatur καλὰς ἀνάσεις, sed vocatur καλὰς ἀνάσεις seu diathesis: quis dixit hoc? ipse Galenus 1. de diff. symp. cap. 1. vbi sic definit morbum, ὁ ὅλος ἐστὶ καλὰς ἀνάσεις παρὰ φύσιν.

Insuper morbi non possunt ostendere constitutionem: quia in ostensione fieret petitiu principij, procederetque Hippocrates per ignotiora: vniuersalia enim sunt nobis notiora: ideo constitutio est nobis notior, quam morbus: quare quod est minus notum non potest indicare magis notum: ideo per καλὰς ἀνάσεις debemus interpretari vigores, sicuti interpretatur Cenomanus, & non constitutiones.

Præterea colligitur ex Græca observatione καλὰς ἀνάσεις significare statum, & vigorem morbi: quia apud Herodotum rerū status dicitur καλὰς ἀνάσεις πρᾶγμα.

Addit Hippocrates, siue quotidie siue alternis diebus, siue per maiora intervalla fiant. Dicit quotidie alludendo ad quotidianam, cuius paroxysmus quotidie fit. Dicit alternis diebus significando tertianam: addit per maiora intervalla:

non



non dixit de quarto in quattum, ut comprehenderet non solum quartanam, sed quintanam, septimanam, & nonanam, de quibus intervalis Hippocrates loqui videtur 1. epid. sec. 3. tex. 2. 7. & 9. quamvis Galenus ibidem fateatur, se non vidisse, nisi obscuram quandam quintanam: immo laudat loco citato Dioclem: quia contradixit Hippocrati credenti dari quintanam, septimanam, & nonanam.

Probat Galenus non dari, nisi tres circuitus, his rationibus, quarum prima hæc est: si darentur plures circuitus, quam tres propositi: ergo præter pituitam, bilem, & melancholiam darentur alij humores, ex quibus quintana, septimana, & nonana febres fierent.

Secunda ratio Galeni est: si darentur alij circuitus præter tres propositos, obseruarentur quotidie ab omnibus: sed (addit) ego nunquam obseruavi, nisi obscuram quintanam, quæ ex praua viuendi ratione, & casu acciderit: quare rectè dicit Galenus aliquè addidisse in epidemicis illas quintanas, septimanas, & nonanas: quia nunquã Hippocrates, neque in aphorismis, neque in prognosticis, neque alibi de illis circuitibus mentionem fecit.

Secunda dubitatio quo ad virtutem: cur Hippocrates inter signa proposita non collocauerit uirtutem, ex qua facilè præcognoscimus, an longi, vel breues sint futuri paroxysmi, & morbi vigores, ut colligitur ex Galeno 2. de diff. feb. ult. Accedit, quod à virtute principalissima dictandi indicatio desumitur.

Respondet Galenus in comm. vires facilè dignosci ex pulsibus, & ex ijs cur scripsit Hippocrates in Prognosticis: ideo proposuit solum illos fontes, qui poterant satis superque nobis declarare futuros paroxysmos, & an morbi vigores breues vel longi sint futuri.

### Q V Æ S T. XXXIX.

*An Hippocrates doctrinam de pulsibus caluerit.*

**I**N hoc loco nonnulli dicunt, Hippocratem de pulsibus nihil dixisse: quia doctrinam de pulsibus non calebat: refe-

runt quoque, Hippocratem nunquam tetigisse pulsus suis agris, quæ calumnia certe non est ferenda. Galenus enim primo de diff. pulsuum cap. 2. habet hæc verba, omnium primus fuit Hippocrates, qui nomen pulsus litteris prodidit, & artis de pulsibus non fuit ignarus.

Deinde Hippocrates 7. de morbis popul. in principio loquens de grauissimis accidentibus febris continuæ Pithodori dicit pulsus ei non defecisse: ideo fuisse liberatū, quamvis habuerit refrigerationes totius corporis, exceptis temporibus: dicit exceptis temporibus: quia quando tempora sunt refrigerata, in quibus sunt arteriæ visceribus vicinæ, signum est, cerebrum & cor esse refrigeratum, unde cita mors.

Præterea Hippocrates 4. de morbis popul. refert, pulsus zoli fabri fuisse tardos, & tremulos.

Insuper Hippocrates lib. de alimentis circa finem vult, signa salutis, & mortis esse desumenda à venarum pulsationibus id est à pulsibus.

Amplius lib. 2. de morbis mulierum loquens de pulsu habet hæc verba, pulsus ad manus accelerantes, debiles, deficientes esse mortis indicia.

Demum in coacis prænot tex. 25. ait, letargicos habere pulsus tepidos, tardos, & sepultos. Valeant igitur illi, qui dicunt, Hippocratem non tetigisse pulsus.

Porrò in his pulsuum locis citatis miro artificio continentur serè omnes differentiæ pulsuum: quia tangit illas differentiæ, quæ pertinent ad hæc tria capita, à quibus omnia, quæ sciri possunt de pulsibus, desumuntur, nempe ad motum, ad corpus arteriæ, & ad virtutem vitalem.

**C**Ausa verò cur Hippocrates in hoc aphor. nihil dicat de pulsibus, est, quia sufficenter futuri paroxysmi, & futuri morborum vigores colligi possunt ex morbis, anni temporibus, ex circuituum successivis incrementis, & ex signis mox apparentibus.

Neque est mirandū, nihil dixisse de virtute, quia reliquit etiam locos affectos, qui indicant breues, vel longos morbos, sicuti sunt apoplexia, vel epilepsia, qui affectus sunt



funt à crassis humoribus; hac ratione humorū crassiorū illi affectus essent longissimi, tardique essent vigores, tamen ratione loci affecti. i. ratione capitis, vnde facultas expultrix validissima prodit, affectus fiunt brevissimi. Hinc Galenus 2. de symp. causis cap. ult. dicit, epilepsiam fieri à multitudine pituitæ acervatæ in ventriculis cerebri: ideo eius solutionem esse subitanæ; quia paroxysmi epileptici non fiunt ab intemperie, sed à materia, quæ est soluta facilis. Ecce, quod ubi malum non fit ab intemperie, discussio facilis est. In hoc loco Hippocrates solum de illis sermonem fecit, quæ sufficienter prænunciare possunt futuros paroxysmos, & futuros vigores.

### Q V Æ S T. X L.

*Quomodo successiva circuituum incrementa prænunciant paroxysmos, & morbos longos, vel breves.*

**Q**uomodo circuituum successiva incrementa indicare possint futuros vigores, & futuros paroxysmos. Primò sciendum est, futuros vigores non solum indicari à successivis periodorum incrementis: sed etiam ab alijs signis simul unitis, seu per syndromen collectis.

Secundò sciendum est ex Galeno 1. de crisiibus 3. 16. & 17. hæc tria esse observanda pro vigoris præcognitione. Primò antepositionem, & postpositionem paroxysmi antecedentis: Secundò longitudinem, & brevitatem antecedentis: Tertiò vehementiam, & debilitatem symptomatum: quare si viderimus paroxysmum anteponi, & simul fieri longiorem, & symptomata fieri vehementiora; inde colligemus paroxysmos futuros longiores, & vigores tardius aduentaturos. Hæc tria simul unita requiruntur: quia nec antepositio sola, nec postpositio sufficiunt pro cognitione futuri vigoris: non enim valet sit antepositio paroxysmi: ergo morbus est in augmento: quia antepositio interdum fit, quādo morbus est in ipsa declinatione: requiruntur igitur alia duo, nempe longitudo, & brevitās paroxysmi: ac vehementia, & debilitas symptomatum.

Parimodo si viderimus paroxysmum posponi, & simul esse breviorē, ac symptomata esse debiliora: inde colligemus paroxysmos & breviores futuros, & vigores celerius aduentaturos. Præterea si fieret antepositio paroxysmi, & paroxysmus esset brevior, & symptomata debiliora, dicere poterimus, vigorem quoque cito aduentaturum: si verò eadem hora paroxysmi invadant, tardus erit vigor, & morbus erit longus & solutu difficilis, quod colligitur ex Hippocrate 4. aphorismorum 30. ubi habetur, „ Quib. accessiones sunt quæcumque hora febris dimittitur, eadem si cras repetat, iudicium habet difficile: Galenus interpretatur difficulter solubile: ideo invasionis, seu paroxysmi æqualitas indicat & tardum vigorem, & solutu difficilem: quia ex Galeni comm. significat materiæ fixationem.

Causæ verò, cur paroxysmi fiant longiores, & breviores, & vigores tardiores, aut velociores, proponuntur à Galeno 2. de diff. feb. ult. 2. de crisiib. 11. & 2. præfag. 28. ubi habetur, „ longas accessiones fieri propter 11. causas, videlicet vel ob copiam, vel lætorem, vel crassitiem humoris, vel ob meatuum angustiam, vel ob virtutis imbecillitatem, vel ob particulam internā malè affectam, vel ob erratā commissa, vel ob locum affectum frigidum, vel ob morbum frigidū, vel ob ætatem senilem & demum ob anni tempus frigidum. Breves uerò accessiones fieri à contrarijs causis: quia contrariorum eadem est disciplina: nempe ob materiæ paucitatem: vel ob materiæ tenuitatem: ob virtutem validam: ob meatuum apertionem, & ob alias causas oppositas.

Addi potest ex Galeno 3. Prognost. 32. & 2. de diff. feb. 3. paroxysmos celeriores, & tardiores fieri à veluti cinere præteriti paroxysmi: cinis enim est finis putredinis, & in quolibet paroxysmo fit: hic cinis habet vim fermentatiuam putredinis: ex Galeno enim 3. prognost. 32. & 2. de diff. feb. 3. habetur, quod hic cinis magis, vel minus copiosus in corpore detentus possit efficere paroxysmos longiores, & breviores, & vigores velociores, & tardiores: habetque hæc verba „ si natura  
illum



illum veluti cinerem humorum supra modum adustorum euacuare non antequerit, ille rursus in corpore manens, & calesfactus excitabit de nouo aliam febrem. & efficiet non solum tardum vigorem, sed etiam recidiuam. Cōgnoſcitur, hunc cinerem in corpore detineri, & non euacuari, dum in vrinæ nubecula nō conspicitur. Hic cinis distinguitur ab arenulis: quia in nube manet, nec petit fundū, vt arenulę.

### QVÆST. XLI.

#### *De causa immediata periodicationis.*

**P**RO aphorismi intelligentia agendum est de causa immediata periodicationis, cur scilicet pituita quotidie accendatur: bilis alternis diebus, & melancholia de quarto in quartum. Primò opimones aliorum: deinde nostram proponemus.

Auerroes 4. coll. 27. vult, periodos fieri à natura, & à calido innato. Ratio præcipua est, quia proprium est naturæ, & calidi innati mouere, attrahere, coquere, & retinere amicum, & familiarem succū, & expellere inimicum. Non accipitur hæc opinio: quia pituita ex Auerroë, vt crassa, deberet tardius moueri à calido innato, & non velocius bile: pituita enim quotidie, bilis solum alternis diebus mouetur.

Conciliator differentia 88. inquit, periodos à motu lunæ, & ab humorum forma pendere. Primò dicit, pituitam à luna citius moueri, quam alij humores moueantur: quia luna præest aquæ, & alijs humiditatibus: pituita verò est magis humida, quam alij humores: hinc dicit fluxū, & refluxum maris fieri propter lunam. Deinde confirmat, pituitam moueri à luna: quia sicuti in quotidiana modica quies comprehenditur, seu modica pausa, vt ipse dicit: sic in luna ob Epicycli paruitatem non percipitur lunæ statio, & retrogradatio: itaut pauca pausa quotidianæ dependeat à pauca pausa ipsius lunæ.

Refellitur Conciliator, tum quia vnus rei vnica est causa, & non duæ; ipse verò ponit lunam, & formam humorum tamquam causas proximas periodicationis: tum quia dicit esse modicam pausam in

quotidiana, eo quia in luna ob epicycli paruitatem sit ita pauca pausa, vt non percipiatur lunæ statio, & retrogradatio.

Valde errat Conciliator: quia supponit, lunam esse posse retrogradam, & stationariam, alioquin modicā quietem pituitæ in quotidiana ex luna colligere non potuisset: quod suppositum est falsum: quia Eccentricus lunæ ferens epicyclum mouetur 27. diebus: Epicyclus verò 32. diebus: quo posito implicat dicere, Eccentricum esse velociorem, & epicyclum tardiozem, & lunam habere paucam pausam: quia nulla est, & nullo pacto esse potest retrograda, & stationaria. Soliti sumus dare exemplum de homine speciante in naui contrario motu, quando nauis velocius homine spaciante moueatur, tunc certè in illo non daretur statio, vel retrogradatio.

Fernelius lib. 4. de febribus cap. 11. dicit, causam periodorum esse naturam & qualitatem contractæ putredinis. Non potest accipi hæc opinio: quia non reddit causam, cur pituita putrida citius, & bilis tardius moueatur. Deinde sequeretur, quod paroxysmi fierent post factam putredinem, & non quando sit putredo. Demum peto à Fernelio de causa primi paroxysmi, quando adhuc non est contracta putredo.

Gentilis & Arculanus dicunt, periodos fieri à proprietatibus occultis. Reiecit hanc opinionem, 8. methodi nostræ vitand. errorum: ostendimusque non dari qualitates occultas, quas dicunt esse substantias immediatè operatrices. Deinde Galenus 3. de praesag. ex pul. cap. 5. contra Erasistratum habet hanc sententiam, qui nihil sciunt ad alterum de duobus confugiunt, vel ad nomina ignota, vel ad qualitates occultas.

Nec rectè sentit Eugenius meus Præceptor, dum dicebat, sciri nō posse causam periodicationis: solebat enim confugere ad hæc duo carmina Datis Aldigeri Poetæ celeberrimi, qui in ore sæpè habebat, *stassi ciò nel poter della natura. Ella el fece, ella el sà sol da se stessa.* Sed his carminibus omnes lites facile dirimi possent: Galenus enim 1. meth. 5. inquit, nullam esse scientiam perfectiorem, quam illam, quæ habe-



tur per causam. Idem admonet Aristoteles 1. Physic. tex. 1. ubi inquit „ Tunc enim putamus vnumquodque cognoscere cum causas primas, principiaque prima & vsque ad elementa cognoscimus: quare qui relinquunt difficultates insolutas, quando causae possunt inueniri, sunt & illi relinquendi.

Valesius lib. 4. contro. cap. 25. & plurimi Recentiores dicunt, periodos varias fieri ab humorum maiori, vel minori copia. Sic dicunt, pituitam velocius moueri efficereque quotidianam: quia in corpore est copiosior alijs humoribus: melancholiam verò tardius: quia est in minori quantitate: bilem verò esse quidem in maiori quantitate, quam sit melancholia: sed in minori quam sit pituita: ideo moueri de tertio in tertium.

Hæc opinio Valesij, fuit Alexandri Aphrodisi 2. probl. deinde illam securus est Argenterius lib. de causis morborum. Contra istos est experientia: quia si copia efficeret varias periodos, sequeretur, quod bilis in maxima copia extra venas existens citius moueretur, quam si esset in pauca, quod non videtur, quia tertiana semper seruat eandem periodum de tertia in tertiam diem, sit multa, vel pauca bilis. Præterea ex Auerroe 3. celi 67. & ex ipso Aristotele quantitas nullo modo esse potest principium æbium: ideo actiones non sunt in prædicamento quantitatis.

Nonnulli Recentiores, inter quos fuit Thomas Minadous, tenent, causam periodorum esse inquinamenta cinerulenta. Fundamentum pro hac opinione desumunt à Galeno 2. de diff. feb. 4. ubi ait „ In pituitosa febre relinqui plurimum inquinamenti: ideo pituitam celerius accendi: Addunt in tertiana non quotidie accendi: quia in fine putredinis bilis parum inquinamenti relinquitur: in quartana verò minus.

Hæc opinio Minadoi patitur instantias insolubiles: nec responderet quæsitio: quia quærimus causam periodicationis in communi, & non in febribus tantum. At sic est, quod inquinamenta cinerulenta in nephritico, in podagrico, & in lue gallica affectis, febre putrida destitutis dolores

pe riodicè vexant: ergo inquinamenta cinerulenta non erunt causæ adequatæ periodicationis. Si loquamur de lue gallica: hæc solet quotidie horis vespertinis inuadere: deinde post mediam noctem cessare: die sequenti verò iisdem horis vespertinis periodicè redire: ergo inquinamenta cinerulenta, quæ solum in putrida febre obseruantur, non erunt causæ adequatæ periodicationis.

Præterea, si inquinamenta cinerulenta essent causæ periodicationis in febribus putridis: ego peterem ab illis de primo paroxysmo febris putridæ, à quo inquinamento excitetur, cum nullum fiat cinerulentum, nisi post primum paroxysmum: omnia enim cinerulenta in putridis febribus sunt in fine paroxysmi, & non antea. Nos admittimus ex Galeno hæc cinerulenta augere accessiones: negamus tamen esse causas periodorum immediatas.

Nos verò (vt diximus in methodo nostra) varias membrorum dispositiones esse causas periodicationis in communi. Hæc opinio videtur esse Galeni secundo de diff. feb. vlt. ubi habet hæc verba „ Quæcumque per circuitus accessiones huius, ex membrorum dispositionibus ortum habent. Quod verò humores putridi non efficiant periodos patet, quia ubicumque essent humores putridi, ibi semper efficient periodos: sed hoc non apparet: bilis enim putrida extra venas facit tertianam: eadem bilis in venis proximis cordi non tertianam, sed ardentem, in qua nulla periodus obseruatur. Amplius ex Galeno tertio de symp. causis secundo si bilis peccat in toto ambitu corporis facit icterum: si in parte peccet bilis, fit erisypella: ibique putrescit sine periodicatione. Parimodo dicimus de pituita, & melancholia, qui humores si erumpant in cutim pedum, & ratione putredinis efficiant vlcuscula, nulla inde sequitur periodus quotidiana, vel quartana: ergo ab humoribus non fiunt periodicationes. Relinquitur ergo, quod periodicationes fiant (vt colligitur ex Galeno loco citato) ex membrorum dispositionibus. Caterum quænam sint istæ membrorum dispositiones, non omnes animaduertunt.



Non credimus, membra vario modo disponi & vario modo operari ob varias membrorum conditiones, vid. licet vel ob varium situm partium, ob meatus, magnitudinē, figuram, substantiam, temperaturam, compositionem, connexum, ob vasorum progressum, vel ob vasorum exordium, & officium ipsorum membrorum, merito quatum dispositionum in membris sanitas, agritudo, & omnes alij affectus generantur.

Quo ad febres putridas: quanto magis lesa viscera erunt in situ magis distantia à corde, tanto periodus tardior erit: hæc est Galeni opinio primo ad Glauco. ubi dicit, quotidianam fieri in ventriculo, tertianam in iecore, quartanam in liene: hinc pituita putrefacta in ventriculo quotidie inuadit, quia est cordi proximior: bilis putrefacta in iecore vel circa iecur alternis diebus inuadit: quia post ventriculum iecur est cordi proximius: melancholia putrefacta in liene facit quartanam, quia magis distat à corde, quam iecur: quando verò humores putrescunt in locis valde distantibus à corde, vt in pedibus & brachijs, tunc nulla obseruatur periodus febrilis.

Præterea possunt ob membrorum situm, & ob alias conditiones alias periodos obseruari. In nephritica passione ob arenulas, vel lapillum conglobatum, vt plurimum obseruatur periodus sex mensium, plus minusve ob varias renum dispositiones, vel quia papillæ ita ocludunt vteres, vt non possit lapillus egredi, nisi aliqua ex illis rumpatur. In hæmorrhagiæ naribus, vel hæmorrhoidibus, vel vtero, varia obseruatur periodicatio, prout meatus magis vel minus sunt aperti, & prout sunt maiores, vel minores, magisque vel minus densi, vel prout viscera sunt magis, vel minus intemperata: variusque sit vasorum progressus, & prout connexio vasorum sit magis vel minus compacta, & prout pars læsa magis vel minus sit proxima cordi. In archetide sunt periodi, vel annuatim semel, vel bis, prout articuli ad recipiendos humores confluxos sunt magis, vel minus dispositi, & prout partes mandantes plus minusve participant illis dispositionibus, que concurrunt ad tardam, aut velocem

excrementorum expulsionem. Dispositiones articulorum sunt cauitas maior, vel minor; intemperies articulorum magis, vel minus frigida & ea vel acquisita, vel hereditaria: Idem dicimus de parte mandante, quæ magis, vel minus promptè propellit excrementum, prout magis, vel minus est intemperata: quare prout varia sunt corpora, variantur periodicationes, quæ per se dependent à varijs membrorum dispositionibus, & non ab humoribus per se primo.

Secunda dubitatio oritur ex dictis: quia periodi videntur primo & per se fieri ab humoribus, & non à varijs membrorum dispositionibus: itaut in praxi valeat hæc consequentia: in febribus obseruatur periodus de tertio in tertium, ergo peccat bilis: de quarto in quartum, ergo melancholia: ergo causæ proximæ periodorum erunt humores, & non membrorum dispositiones.

Responderi potest, periodos indicare humores peccantes quo ad existentiam humorum, id est quo ad quod, sed non quo ad propter quid: quia humores sunt causæ remotæ periodorum, & non proximæ: causæ verò remotæ ex Aristotele 1. post. tex. 30. dant solum quod, sed non propter quid: valet quidem, periodus est quotidiana: ergo pituita in ventriculo putrescit: sed propter quid fiat periodus quotidiana, dum pituita putrescit in ventriculo, & non fiat tertiana, vel quartana, hoc non desumitur à pituita putrescente, sed à membrorum dispositionibus, id est à situ ventriculi, qui est cordi valde vicinus: immo neque absolutè valet: sunt periodi: ergo dantur humores putridi prædominantes: quia dantur periodi, quæ sunt ab humoribus non putridis, vt ab arenulis, à lue gallica, à lapillis & ab alijs causis.

Demum si humores essent causæ proximæ periodorum, ipsa periodus non solum indicaret existentiam humorum, sed etiam intrinsecam, & essentialem humorum naturam: quia proprii affectus declarant rem naturam: humores igitur erunt causæ remote periodorum: at sic est, quod ex causis remotis nihil concluditur affirmatiue: quia ex Aristotele 1. post. citato, vt causa



remota non potest fieri nisi argumentum in camelitres, quod est negatiuum, & vt tale dare non potest ipsum propter quid, sed solum ipsum quod, idest existentiam rei: ideo concedimus, bilem putrescentem indicare posse febrem tertianam, pituitam putrescentem quotidianam, & melancholiam putrescentem quartanam: sed cur ex istis humoribus putridis fiant ista periodicationes, ex humoribus certè colligi non potest, sed solum ex varijs membrorum dispositionibus tamquam ex causis proximis, vt dictum est.

„**S**ed ex his quæ mox apparēt indicia. Hęc est secunda pars aphorismi, in qua Hippocrates proponit signa mox apparentia, quæ longum, vel breuem morbum prænuntiant: datque exemplum prius de spūto, quod scilicet in principio pleuritidis apparens breuiet morbum: postea videri apparet producat: deinde dat exempla de vrinis, de alui excrementis, & sudoribus, quæ vel bonam, vel malam crism indicant: vel breues, vel longos morbos prænuntiant: hic est sensus secunde partis.

#### Q V Æ S T. XLII.

*De Methodo præcognoscendi paroxysmos, & vigores tardos, seu longos, vel breues.*

**M**ethodus, quam proposuit Hippocrates in hoc aphorismo pro præcognoscendis paroxysmis, & vigoribus, an longi, vel breues sint futuri, constat ex quatuor fontibus, videlicet ex morbis, anni temporibus, & circuito successus incrementis, & ex signis mox apparentibus: de quibus fontibus in hac secunda parte. Hac methodus est pulchra, & artificiosa, aphoristica tamen. Nos verò præter hanc, aliam methodum magis locupletem ab his, & ab alijs Hippocratis & Galeni locis desumpsimus, quæ maximè respondet practicæ medicinæ, constatque ex o cto locis.

Primus desumitur à velocitate, vel tarditate motus principij ipsius morbi, vel à tarditate, aut velocitate symptomatum: valet enim consequentia, principium mor-

bi est velox: ergo morbus erit brevis: principium est tardum, ergo longus. Similiter symptomata grauissima apparēt in primo quaternione, ergo brevis erit morbus. Hic locus obseruatur in ægrotantibus Hippocratis, sicuti in Philisco, & Anaxione & omnibus alijs: duo ramen isti propositi casus sūt famosi. De Philisco Galenus querit in comm. quomodo Hippocrates poterat in principio prænosce morbum esse breuē, concludit id colligi posse ex velocitate principij, & symptomatum: habet enim Galenus hæc verba, „ Vbi tertius & quartus dies habent graui symptomata, breui expectabis iudicium, quia morbus brevis est: De Anaxione Pleuritico, Hippocrates prænouit pleuritidem illam fore longam ex tarditate principij: in octaua enim die tussis adhuc erat sicca, & omnino cruda: quia nisi incipiat concoctio, non incipit augmentum: atque in die octaua Hippocrates secuit cubitum, ideo fuit solum liberatus 34. die.

Secundus locus desumitur à determinatis horis diei: quia sicuti ex Hippocrate lib. de natura humana, & alibi quatuor elementa respondent quatuor humoribus, & quatuor humores quatuor anni temporibus, & quatuor anni tempora quatuor ætatibus, videlicet pueritiæ, adolescentiæ, iuuentuti, & senectati: sic quatuor humores respondent quatuor diei partibus ideo in meridie dominatur, & mouetur bilis: horis vespertinis vsque ad mediam noctē melancholia: post mediam noctem pituita, siue catarrhus, & horis matutinis sanguis: quare si moueantur symptomata in meridie, breues erant accessiones, & vigores cito erunt aduentaturi: quia in meridie indicatur bilis, quæ morbos, & accessiones breuiat: si vespere dominatur melancholia, vnde longi paroxysmi, & morbi diuturni sunt: si media nocte symptomata moueantur, indicatur pituita, vnde affectus longus: si horis matutinis symptomata sint, sanguis mouetur: & per consequens affectus brevis: hinc omnes synochæ sunt breues.

Tertius locus desumitur ab imbecillitate loci affecti, quæ imbecillitas si ante morbum fuerit, morbus, qui occupat illam partem, longus erit. Hippocrates 4. aphorism.



morum 33. habet hunc aphorismum notatu dignum „ si qua ante morbum pars laborauerit, ibi morbi sedes: hæc pars igitur debilis, dum morbo corripitur, prænuñciat morbum longum: quia ut debilis non potest nisi longo temporis spacio morbum vincere: quia facultas expultrix debilis est. Quod verò partes, quæ ante morbum sint imbecilles, indicent morbi longitudinem, patet ex Galeno 2. de diff. feb. ult. ubi proponit quinque causas longitudinis morbi, & paroxysmi, videlicet humorum copiam viscositatem, crassitiem, meatuum angustiam, & virium imbecillitatem.

Quartus locus desumitur à natura & conditione paroxysmorum: hinc Galenus 1. meth. ult. & 2. de diff. feb. 8. docet, si rigores paroxysmorum diu durēt, vel diu durēt partium extremarum refrigerationes, vel accidat, quod somnus in principio paroxysmi sit profundus, dicit indicari excrementorum redundantiam, quæ & longos paroxysmos, & morbos diuturnos prænuñciat: è contra verò ubi rigores, & frigiditas extremarum partium parum durant, nec somnus sit profundus, morbus brevis, & paroxysmi breues significantur.

Insuper Auicennas prima 4. trac. 1. cap. 4. loquēs de paroxysmis indicantibus breuitatem, vel longitudinem proponit præceptum quoddam Diuinum, quod est: si in fine accessionis sequetur aliqua euacuatio, & deinde accessio, quæ subsequitur, mitior fiat: inquit indicari morbi breuitatē: subdit: Si vero subsequens accessio post factā euacuationem nō fiat mitior, sed sit omnino similis præcedentibus, nihil colligi potest: si verò sauior: signum est, euacuationem illam præcedentem fuisse merè symptomatice, quæ vel mortem, vel morbi longitudinem prænuñciat; quæ doctrina maximè consentit Hippocrati & Galeno hæc dicentibus in Philisco „ Decretoria non iudicantia esse lethalia, vel aliquid iudici, lethalia, si iungantur cum aliquo signo lethali: parimodo euacuatio symptomatice est decretorium non iudicans, & ferè semper malum prænuñciat: nihilominus medicus debet inspicere alios locos, & videre an simul consentiant: quoniam singuli propositi loci seorsum sum-

pti nos facile possunt fallere: sed per syndromen vniti æquivalent demonstrationi quia: vnum. n. tollit seu expurgat alterius contingentiam: sic præceptum Auicennæ alioquin vtile interdum nos fallit, quoniā accessiones tempore crisis post factā optimam euacuationem fieri solent sequiores, tamen sunt omnino salutares.

Quintus locus desumitur à situ, seu loco, ubi stabulantur humores. Hinc bilis extra venas efficit morbum longiorem, quam si eadem bilis peccaret in venis: namque bilis extra venas efficit tertianam, quæ si est exquisita ex Hippocrate terminari solet 14. diebus, quod longissimum est. Eadem bilis in venis efficit ardētem, quæ septem diebus terminatur: quia ex Galeno 3. in primum epid. comm. 17. in tertiana exquisita loco accessionum enumerantur dies: sic lib. de differentiis feb. & alibi vnica dies febris ardentis proportionatur vnico circuitui tertianæ. similiter ex Galeno 3. de symp. causis cap. 2. si bilis in toto ambitu corporis peccat facit icterum, qui morbus longus est, & per consequens vigor tardus: si eadem bilis in parte peccat facit erisypellam, cuius vigor velox est: ratio diuersitatis est, quia bilis effusa in totum ambitum è capillaribus sudat: bilis vero quæ facit erisypellam per vasa maiora rejicitur: vnde calidior, & resolutioni accommodatior: idem dicimus de omnibus alijs succis in morbo.

Cæterum accedamus ad alia exempla, ut res melius intelligatur: Galenus 6. aphorismorum 53. dicit mucum mordacem in cerebro efficere maniam, cuius vigor interdum tardus est: attamen si idem succus mordax esset in cute, efficeret non maniā, sed exiguum pruritum, vel vlcusculum, cuius vigor velocissimus est. similiter si catarrhus contineatur in cerebri ventriculis efficere potest epilepsiam, quæ est velox: si idem catarrhus in pectus decumbat efficit asthma, cuius vigor tardus est: si in articulos, efficit podagram, vel alium articulare morbum, qui longissimus est. Si melancholia peccet in cerebro efficit affectum melancholicum per essentiam, cuius vigor tardus & morbus tardus, & valde longus sit. Sim-



ore ventriculi excitat intensam famem, cuius vigor in propinqua rana superatur. Denique ipse status ob varios siccus, & brevis, & longos morbos efficere potest. Hinc dum occupat cor efficit palpitacionem, cuius vigor interdum tardus est: si idem status occupat ventriculi cavitatem, ruclum; si intestinum rectum, crepitum, cuius vigor est ventus velocissimus: si occupat penem efficit priapismum, cuius vigor ob partis densitatem non est ita velox: quare qui inquirunt humores peccantes, omissio aliorum locorum examine, sapissimè decipiuntur. Hinc Galenus damnat imperitos medicos, qui à specificis non desumunt remedia: sicut lib. de opt. sect. ad Trasyph. cap. 9. ubi reicit illos, qui oleum applicant oculis dolentibus, quib. est maxime inimicum: causa erroris est, quia vident oleum esse anodynum in alijs partibus: inde colligunt ex hoc communi conceptu, oleum quoque oculos iuuaturum. Hæc ratio communis in praxi est omnium errorum origo, ut docet Galenus 3. meth. 7. & 1. ad Glauc. cap. 1. Hinc Galenus huius methodi nunquam oblitus, quod videlicet solum remedia à specifica indicatione desumpta sanare possint, 5. meth. ult. cum omnium admiratione illico sanavit penis cariem siccis remedijs proportionatis, quam medicus Thesalicus tamquam incurabilem reliquit, quam sanationem miratus Thesalicus erupit in hæc verba, non tantum letatus sum de salute hominis, quam tristatus, quod in mala secta fuerim educatus: inde Galenus colligit, & loco citato & 1. ad Glauc. 1. remedia generica, & subalterna esse vanissima, solumque illa sanare, quæ à specifico affectu desumuntur.

Sextus locus desumitur à symptomate gravitatis, aut leuitatis: valet enim symptoma est cum sensu gravitatis: ergo morbus longus: quia indicat humorum frigidorum redundantiam, ut observatur in oedemate, in scyrthis, in apostematibus, in dolore gravatino, & in plurimis alijs affectibus. Similiter valet: morbus est cum symptomate leuitatis: ergo morbus brevis.

Septimus locus desumitur à varietate

partium læsarum, nam si læsus est lien, peccat melancholia: ergo morbus longus: si glandula, ergo affectus longus, tum ratione humoris crassius, & viscidius, quo faciliè implentur, tum ratione imbecillitatis facultatis naturalis glandularum, & præcipuè ex poltericis, nulla enim est corporis pars, quæ obtineat facile res naturales imbecilliores, quam ipsæ glandulae. Si læsæ sint membranae quæ ad partem internam, ut pleura, dura mater, & aliæ omnes: signum est peccare bilem: ergo affectus brevis. Quod vero membranae læsæ indicent, bilem esse causam læsionis, patet ex Hippocrate Aphor. 33. ubi habet, qui acidum eructant non valde sunt pleuritici: Galenus in comm. reddit hanc rationem, quia qui acidum eructant sunt pituitosi, & pituita quatenus crassa non potest membrana densitatem penetrare: ergo membranarum morbus ut plurimum erit biliosus, & brevis.

Octavus locus desumitur à signis mox apparentibus de quibus Hippocrates in secunda parte huius aphorismi mentionem facit. Signa mox apparentia sunt illa, quæ neque necessario incipiunt cum morbo; neque necessario desinunt cum morbo: quia hæc signa mox apparentia non sequuntur naturam, & essentiam morbi.

**S**ed & ex ijs quæ mox apparent. Hippocrates in hac 2. parte aphorismi declarat, quænam sint signa mox apparentia: sumitque in exemplum pleuritidem, cuius signa mox apparentia dicit esse hæc tria, sputamina, sudores, & urinas, quæ proponuntur ab Hippocrate ad differentiam signorum pathognomoniconum, quæ sunt illa, quæ semper coitantur morbum, ut umbra corpus. Signa pathognomonica pleuritidis proponuntur à Galeno in hoc comm. suntque hæc quatuor tussis, difficultas respirandi, dolor lateris pungitius, & febris continua: hæc quatuor signa incipiunt, & desinunt cum pleuritide; immo, si unicum ex quatuor propositis deficiat non est pleuritis: immo si omnia quatuor adessent, & dolor non esset pungitius, sed gravatius non esset pleura inflammatio, sed vinculorum hepatis,



paris, in qua tussis sicca, difficultas respirandi, febris continua, & dolor grauius obseruantur.

Signa mox apparentia, quæ vocantur ab Hippocrate epiphenomena continent sub se quatuor signorum differētiās, nempe signa assidentia, signa coctionis, & cruditatis, signa critica, & symptomatica, & signa salutis, & mortis.

## QVÆST. XLIII.

### De signis assidentibus.

**Q**uo ad signa assidentia primò sciendum, interdum reduci ad mox apparentia, interdum non esse mox apparentia, sed inuadere cum morbo, quod patet: quia ipse Galenus in comm. laudat Praxagoram, qui in vno libro locutus est de signis assidentibus, & in alio de mox apparentibus: si idem essent hæc duo signa, non esset laudandus Praxagoras: idèò dicimus signa assidentia aliquando mox apparente, & aliquando inuadere cū ipso morbo.

Ceterum signa assidentia sumuntur pro illis signis ab Hippocrate in hoc aphorismo, quæ sunt mox apparentia, & quæ non conituntur naturam morbi, sed si tum partium affectarum, idèst indicant morbum esse vel in parte dextra, vel sinistra, vel anteriori, vel posteriori, interiori, vel exteriori, in superiori, vel inferiori: veluti in pleuritide dolor circa iugulum, quod signum à Galeno in comm. vocatur assidens: quia ostendit partem superiorem pleuræ esse læsam. Similiter dolor circa hypocondrium ex Galeno indicat partem inferiorem pleuræ esse inflammata. Item decubitus facilis supra latus læsum est signum assidens: quia significat pleuram esse læsam versus cavitatem thoracis. Decubitus verò difficilis significat pleuram esse inflammata versus costas, & musculos intercostales: quo casu aget in latere opposito melius decumbit.

Hinc quatuor ortæ sunt differētiæ pleuritidis, prout varius est situs ipsius pleuræ. Prima pleuritis dicitur intercostalis, quæ fit à ramo venarum excurrentium per musculos intercostales. Secunda dicitur

pleuritis hypocôndriacæ, quæ fit à vena sine pari. Tertia dicitur pleuritis antica, quæ fit à venis mammarijs. Quarta est dorsalis, quæ fit à venis excurrentibus per pleuram dorsæ, quæ nullo modo fieri potest à vena sine pari: quare nescio quopactò possit defendi Vesalius, dum tenet, pleuritidem solum fieri à vena sine pari: & quia vena sine pari oritur à parte dextra: venæ cauæ, vult in omni pleuritide venam basilicam esse secandam in dextro cubito. Sed in methodis vitandorum errorū satis superque hæc Vesalij opinionem reieciimus.

Præterea non solum inflammatio membranæ, quæ communiter dicitur pleura efficiit pleuritidem, sed etiam qualibet inflammatio lateris manente illæsa (si fieri possit) ipsa membrana, vocabitur pleuritis: quia pleura propriè non significat membranam: Quis dixit hoc? Galenus 3. de articulis comm. 37. vbi dicit, quod etiam costæ vocentur *πλευρæ*: Similiter Gaza in Arist. per pleuram vertit costam, quia costæ efficiunt latus: sic latus navis ab omnibus vocatur pleura: quare, qui putant pleuræ solum significare membranam, falluntur: quia inflammatio pleuræ propriè est inflammatio lateris, sit in membrana, sit in costis, vel in musculis intercostalibus. Hinc qualibet pars lateris habebit signa assidentia, quatenus latus habet octo differētiās positionis partium, à quarum situ diuerso oriuntur signa assidentia diuersa, quæ indicant locum affectum.

Insuper notandum est, signa assidentia in omni morbo esse considerata: quia qualibet corporis pars habet omnes differētiās positionis, licet partes affectæ non semper secundum omnes partes sint læsæ: quare in omni morbo sunt perquirenda signa assidentia, vt intelligamus vbi sit morbus.

Hinc Galenus loquens de vario situ ipsius hepatis 5. de loc. aff. 7. dicit hepar interdum esse læsum in parte conuexa, interdum in parte conuexa, atque prout in vario situ hepar est læsum, sic varia proponuntur medicamenta: si verò morbum sit localiter læsum, nempe secundum aliquas partes, læsio non potest auferri, affectusque redditur insanabilis: quia opifex



sanitatis non potest esse, nisi pars sana ipsius membri: quare si nullibi est sana, morbus sanari non poterit.

Sic Galenus in arte med. in 3. parte, ubi agit de ulceribus, & 4. meth. cap. 1. habet: „ nec vlcus, nec vulnus sanari potest, nisi caro subiecta sana sit. Diuus Thomas loquens de hac re 2. de anima 58. habet hanc sententiam „ sanitas non potest alicui reddi, nisi aliqua pars sana sit: ratio est, quia reuera sanitas introducit a parte sana vicina virtute proprii calidi innati: quia operationes formaliter pendent à calido innato: & non à corde, nisi materialiter: quia calor influens cordis est pabulum, & materia caloris innati.

Oppositum tamen tenent Peripaterici, nempe omnes operationes omnium partium corporis in virtute cordis formaliter à calore influente pendere: materialiter verò à calido innato.

Quod hæc opinio peripatericorum ab Averroce explicata 3. coll. cap. 2. non respōdeat veritati, & experiētiæ: Pater: quia cor robustissimum sanare non potest per exiguum alicuius infimæ partis corporis affectum: sed calor innatus singularum partium est ille, qui est sanitatis opifex. Exemplum si vepres, seu spina infixa sit alicui parti infimæ: certè virtute cordis non separabitur, sed virtute calidi natui illius partis: idem dici potest de quolibet alio affectu exiguo, licet sit infimarum partium.

### QVÆST. XLIII.

*Cur Hippocrates solum octavo die secauerit venam in Anaxione pleuritico.*

**C**eterum antequam ad signa coctionis accedamus, Expositores. quærun in hoc aphorismo, cur Hippocrates secauerit venam in Anaxione octaua die, & non in principio, quod est contra aphorismum Hippocratis 2. sect. aphorif. 29. ubi ait, si quid tibi videtur mouendum, moue in principio.

Causa Anaxionis, qui est de pleuritide consideratur à Galeno in hoc comm. & mirantur Expositores, cur Hippocrates

non incæperit curationem pleuritidis à sanguinis missione: sed hoc remedium adeo necessarium ad octauum diem distulerit.

Quidam dicunt, Hippocratem in casu Anaxionis fuisse solum vocatum septima die, sed non tollunt dubitationem: quia Hippocrates refert illam historiam à prima die, deinde vsus fuit sexta die fomentationibus.

Manardus lib. 12. epist. prima asserit Hippocratem misisse sanguinem in octaua, quia fuit dubius, an sanguinis missio, vel potius purgatio conueniret. Addit: quando vidit Hippocrates in septima omnia apparuisse deteriora, in octaua sanguinem esse mittendum statuisse.

Fallitur Manardus: quia Hippocrates in ipso principio pleuritidis prænouit, morbum illum esse magnum. Præterea Galenus 2. de ratione vic. vndecimo inquit: „ In pleuritide, licet dolor ad hypocondriū veniat, & phlebotomia illo casu sit auxilium minus, quam purgatio: attamen Galenus dicit, tutius esse phlebotomare, quam purgare: addit, quia ex venæ sectione nullum periculū impendit: ex pharmaco maximū: quia periculū est, ut plus, vel minus per pharmacum euacues, quam par sit: de phlebotomia hoc dici nō potest, quia euacuamus quantum volumus: quare Hippocrates non videtur, quod possit defendi.

Altimarus tenet, non omnem pleuritidem postulare venæ sectionē, quia in exigua nō sit phlebotomia: sicuti erat in Anaxione: ideo inquit, non fuisse sectam venā, sed quod Hippocrates errauerit, non est admittendum. Accedit, quod in principio illius pleuritidis erat febris, tussis, difficultas respirandi, & dolor lateris pungitius: ideo sanguis non erat omittendus.

Montanus dixit, Hippocratem, distulisse phlebotomiam ad octauum diem: quia prius voluit fomentationibus dolorem mitigare: sed poterat Hippocrates ptimis diebus anodynus dolorem sedare, & eodem tempore venam secare.

Nos credimus, Hippocratem in Anaxione non solum sanguinem misisse in octaua die, sed etiam in secunda, aut tertia, ita ut his sanguinem euacuauerit: omisit tamen rela-



relationē primæ phlebotomiæ: quia sicuti admonet Galenus, nō scripsit illos casus, ut nos remedia, sed solum prognostica doceret, id est dies criticos, & ea quæ rarò accidunt: rarò autem contingit, quod in pleuritico vena octaua die sit secunda.

Ideo Hippocrates 2. de ratione vic. in principio inquit, in pleuritide statim incipiendum à fomentationibus ex tex. 9. si fomenta non iuuent, statim sanguinem esse euacuandum.

Causa verò, cur in pleuritide sit incipiendum à fomentis, est, ut mitigetur dolor: quia dolor est vrgēs, & est causa fluxionis: dicit ad partem dolentem transmitti sanguinem: ideo ante alias reuulsiones, dolorem prius esse mitigandum.

Hinc Auicennas prima quarti: tract. 1. cap. 20. ait, „ antequam ad contrariam partem detrahes, & reuelles, dolorem mitigato.

Nos ostendimus ex Galeno lib. 15. meth. nostræ, qui est de indicantium æquilibrio, ante morbum, ante impedimenta, & ante causas morborum principales esse attendendum vrgentibus, ostendimusque dolorem inter vrgentia collocari.

Demum Galenus in Anaxionis historia dicit, Hippocratem facere mentionem de phlebotomia facta in octauo die, ut reprehederet illos medicos qui habent pro lege vitra quartū diem venam nō esse secandam.

Hinc Galenus 9. meth. 5. ait non esse diurnum numerum inspicendum, sed virium robur. quia (addit) & 6 & 7. & sequentibus diebus sanguis mitti potest, dummodo vires permittant.

**H**ippocrates in aphorismo docuit morbos, anni tēpora, successiua circuituū incrementa, & signa mox apparentia indicare longitudinem, vel breuitatem affectus. Nos superius diuisimus signa mox apparentia in signa assidentia, in signa coctionis, & cruditatis, in critica & symptomatrica, & in signa salutis, & mortis. Declarauimus signa assidentia pleuritidis exemplo proposito ab Hippocrate in aphorismo & alijs quamplurimis exemplis. Reliquum est, ut ad alia signa declaranda accedamus.

## Q V Æ S T. XLV.

## De signis coctionis.

**Q**uo ad signa coctionis hæc sunt semper fida, & secura: ideo Hippocrates 1. epid. 2. tex. 45. & 3. de crilibus cap. 4. habet, „ coctionem iudicationis celeritatem, & salutis securitatē indicare. tex. verò 46. subdit Hippocrates, „ cruda & incocta ostendere vel futuros abscessus, vel morbi longitudinem, vel mortem, vel recidivas: primo verò de crilibus cap. 15. ait, „ signa coctionis fidam, & certam præbere salutis præcognitionem.

Notandum tamen ex Galeno in comm. signa cruditatis suscipere magis, & minus: addit in comm. „ Maximè cruda, si à vi morbi expellantur, finem malum, & interdum exitiosum prænunciare, non tamen ratione cruditatis esse finem exitiosum: quia cruditas in principio morbi, ut probauimus in nostra arte parua, est signum neutrum per negationem extremorum, id est neque esse signum bonum, neque malum: sed ratione motus symptomatrica, dum cruda mouentur, esse signum perniciosum: quia tunc indicat victoriam se tenere ex parte morbi, & non ex parte naturæ: quia indicatur maxima humorum acrimonia, quæ non potest à natura vinci, & superari.

Galenus in comm. loquens de pleuritide mentionem facit de gradibus cruditatis pleuritidis. Primus gradus (ait) est nihil penitus expuere: tunc est pleuritis in prima parte principij: quæ cruditas, neque est bonum, neque est malum signum: ideo dicitur signum neutrum per negationem extremorum.

Secundus gradus est, dum expuitur ichor tenuis peccantis humoris, qui pertinet ad secundam partem principij: ad hunc gradum pertinent sputa subrussa, & subflana, si tenuia sint.

Tertius gradus, dum expuitur humor crassus, & crudus.

Quartus, dum expuitur crassum coctum quod pertinet ad augmentum.

Addit Galenus in comm. si expuantur, flaua, vel viridia sincera nō permixta indi-



cari mortem, & multò magis si livida: & nigra sint: namque ex Galeno 2. Prognog. 38. omnes sinceri colores deterrimi sunt, quia validissimas intemperaturas indicant: permixti verò non sunt: ita mali. Hæc signa non pertinet ad coctionem, vel cruditatem, sed ad morem, idest ad malignitatem, & ad mortem.

## Q. V. Æ. S. T. XLVI.

*De signis criticis.*

**Q**uo ad signa critica: hæc differunt à signis coctionis, & cruditatis: quia signa coctionis sunt fida, & semper bona: signa verò decretoria non semper fida: quia interdum salutem, interdum mortem, vel longitudinem significant.

Insuper signa decretoria sunt in duplici differentia: quædam sunt signa solum: quædam sunt signa & causæ: signa solum sunt senti nox sine ratione molesta, quod signum proponitur ab Hippocrate 2. sect. aphorismorum 13. dicente „ Quibuscunque crisis idest iudicatio fit, his nox gravis ante accessionem. Præterea dolor repente inuadens caput, difficultas respirandi præter rationem crism præcedunt, de quibus signis Galenus egit 3. de crilibus 11.

Decretoria verò, quæ sunt signa, & causæ, sunt vrinx, alui profluvia, sudores, hæmorrhagix, vomitus, & abscessus.

Hæc decretoria quæ sunt signa, & causæ, vel sunt cum signis coctionis, vel sine signis coctionis: si cum signis coctionis, salutem: Si verò sine signis coctionis vocantur decretoria non iudicantia, quæ ex Galeno 1. de crilibus cap. 8. indicat longitudinem, vel recidivam: si verò æger debilis fit & cum signo lethali indicat mortem.

Demum decretoria vel apparent in statu, vel declinatione, & hæc sunt fida & salutaria: vel apparēt ante statum, videlicet ante coctionem: hæc non sunt fida: quia (vt optimè docet Galenus 3. de crilib. 6.) fiūt ab aliquo irritamento: hinc Galenus 3. de crilib. cap. 6. de crisi habet hanc sententiam „ crisis tantò deterior est, quanto magis anticipat statum.

De ratione optimæ crisis sunt hæc tria

munia à Galeno proposita quarto aphorismorum comm. 21. coctio, separatio, & euacuatio.

Præterea septem conditiones perfectissimæ crisis proponuntur à Galeno: sex enumerantur in comm. 20. aphorismi huius sectionis: quarum prima est, vt crisis fiat per euacuationem inferiorem, idest per alium, per vrinam, & per sudorē partium extremarum, & non per abscessum.

Secunda vt humor peccans totus, & solus euacuetur, idest non permixtus alijs humoribus non peccantibus.

Tertia vt euacuatio fiat *κατ' ὄψιν* id est secundum rectitudinem.

Quarta vt fiat cum tolerantia.

Quinta quod humores, qui euacuantur, sint concocti.

Sexta vt euacuatio fiat in die critica.

Septima, quæ colligitur ex Galeno 3. de crilib. 6. qd fiat in fine status ipsius morbi.

Vnica ex his conditionibus deficiente, crisis non erit integra. Sed vocabitur infida, obscura, & cum periculo recidivæ.

## Q. V. Æ. S. T. XLVII.

*De signis mortis.*

**Q**uo ad signa mortis à nobis in praxi non semel obseruata, & collecta ex Galeno 1. & 2. Prognost. & ex alijs locis reduci possunt ad hæc quattuor capita, nempe ad læsas partes ad vitam necessarias, ad excrementa, ad corporis dispositiones, & ad actiones vitales, animales, & naturales.

Ad læsas partes vulneratas, sunt partes quæ proponuntur ab Hippocrate 6. aphorismorum 18. quibus vulneratis, sequitur mors, hic est aphorismus „ secto cerebro pulmone, corde, septo transuerso, ventriculo, intestino tenui, hepate, & vesica, lethale. Sed possunt addi aliæ partes, vt potè sectis renibus, liene, trachea, arterijs, & venis iugularibus, vena & arteria magna, venis pulmonis, & si quæ alig sint ex maioribus venis, & arterijs, nervorum sarculis, lethale. Galenus in comm. huius aphorismi per lethale intelligit non necessariò lethale, sed vt plurimum & ferè semper lethale.



Quo ad signa lethalia, quæ desumuntur ab excrementis, quæ ut plurimum mortem prænunciant, hæc quindecim à nobis in praxi non semel fuerūt obseruata: prius tamen inuenta in Hippocrate & Galeno.

Quorum primum est vrina nigra quo ad substantiam, & non quo ad contenta.

Dicimus non quo ad contenta, sed quo ad substantiam, quia in passione nephritica, & in muliere menstruata vrinæ contenta semper apparent nigra.

Nigra vrinæ substantia fuit obseruata lethalis ab Hippocrate in Pythione, Philisco, & multis alijs: non tamen semper est lethalis: quia in Heropito, in Horofonte, in Melidia, in Nicodemo, & in vxore epi-  
cratis non fuit lethalis.

Secundum signum lethale est dum in vrina apparet quædam corona nigricans crassa in nube quadā circulari, hoc significat humores esse combustos, & ut tales propter igneum spiritum petere partes superiores nempe cor, vel cerebrum & interirere.

Tertium signum est vrina destituta omni odore, & est Auicennæ secunda primi doc. 3. cap. 4. significat in hepate esse ablatam coctionem.

Notandum tamen est Auicennæ præceptum secunda primi doc. tertia cap. 3. ubi ait, tunc in vrina signa esse verè mala, si perseveret mala, quod præceptum desumpsit ab ipso Galeno 2. præfag. 26. ubi dicit, si inter coctas vrinas nulla cruda incidit, ea optima est.

Præterea perseverantia requiritur non solum in signis, quæ desumuntur ab vrina sed in omnibus alijs signis, in malis malum confirmatur: parimodo in bonis perseverantia confirmat signum esse salutare.

Quartum signum sunt colliquationes in vrinis, quæ indicant liquefieri pinguedinem, & resolui humidum radicale.

Quintum, sputamina nigra ex Hippocrate 4. aphorismorum aphorismo 22.

Sextum, vomitus atræ bilis ex Hippocrate loco citato.

Septimum, excrementa alui nigra ut pix ex quarta aphorismorum 21.

Octauum faeces biliosissimæ & fetidissimæ ex quarta aphorismorum 47. & 2. Pro-

gnost. 20. addit etiam liquidissimas esse exitiosas.

Nonum, sudores frigidi. Hinc Hippocrates 1. Prognost. tex. 30. (ait) sudores frigidos circa caput, collum, & vultum in acutis mortem significare, in mitiori febre morbi longitudinem. Parimodo 4. aphorismorum 37. sudores frigidi indicant mortem: quia ex Galeno in comm. indicant tantam esse frigiditatem, ut neque à calore natiuo, neque à febrili possint calefieri. Idem docet Aristoteles in problematibus loquens de sudoribus. Præterea calidi sudores in principio morbi, si continui sint, indicant mortem, ut obseruauit Hippocrates in Erasino, & hoc non semel in praxi obseruauimus.

Decimum, stillæ meri sanguinis, quæ indicant mortem in vxore Dromedæ.

Vndecimum, excrementa aurium dulcia indicant humidum radicale ipsius cerebri liquefcere, quod est lethale: est Hippocratis 6. epid. 5. tex. 19.

Duodecimum, lachrimæ inuoluntariæ, est Hippocratis 4. aphorismorum 42. Galenus enim primo in sextum epid. comm. 21. habet hæc verba, lachrimæ in acutis uoluntariæ bonæ: inuoluntariæ malæ: quia moribundis non fiunt lachrimæ: ergo dum fiunt inuoluntariæ sunt lethales.

Decimum tertium, lentores circa dentes, ut plurimum minantur finem exitiosum ex Hippocrate 4. aphorismorum 53. habetur, fortes febres in his ægrotantibus fieri.

Decimum quartum, viscositas circa cutim signum est exitiosum: quia tunc resoluitur humidum natiuum.

Decimum quintum, excrementa pauca, & praua ex Galeno 2. proreth. 47. siue per vterum, siue per aluum, vel alias partes excernantur: Galenus in comm. inquit, dum praua, & pauca excernuntur alterum de duobus indicari, vel naturam non posse tolerare morbi magnitudinem, vel esse valde imbecillam. Similiter Hippocrates 3. coac. præfag. sec. 3. tex. 8. inquit, dum pauca apparent veluti stillæ sanguinis mori, vrinæ pauca, vomitus, & excrementa alia pauca, & praua omnino malum est, & pessimum, si de proximo se consequantur.

Similiter Hippocrates 1. proreth. sec. 3. tex.



tex. 42. ,, dicit sanguinis eruptiones vehementes sunt pessimæ: quia fit. *ἡσυχία* quam dicit esse metuendam.

**A**D corporis dispositiones octo lethalia signa reducuntur. Primum est facies hippocratica, quæ describitur à Galeno 12. meth. 6. quod scilicet nares sint acutæ, oculi concavi, & tempora collapsa: sit talis facies: quia flaccescunt vena & arteriæ, & exsiccatur humiditas musculorum exiguorum faciei: quare si in partibus istis remotis vasa, & muscoli flaccescunt, quanto magis erunt flacidæ partes internæ ipsorum viscerum, in quibus morbus altas agit radices?

Secundum signum est florida facies, & æger tristis valde: hoc signum in acutis febribus minatur delirium, & est Hippocratis 2. prædict. 14. Notandum, colorem floridum non esse solū in summitate genarum, ut in tabidis, & peripneumoniciis, sed in tota facie.

Tertium signum: dormiunt ut hiantes, est Hippocratis 6. aphor. 1. & ex Galeno indicat egros magna indigere inspiratione ob cordis incendium.

Quartum, durities circa cutem frontis: est Galeni 3. in 6. epid. 29. quod significat ab incendio interno corpus exsiccati: hoc signum prænuñciauit mortem in Adolescente melibæ die 25. hoc signum frequenter observatur à mulieribus Ungaricis: quæ comprimunt digitis cutem frontis: si post compressam non redit cutis ad proprium situm, prænuñciat ægrum moriturum: quod sanè frequenter contingit.

Quintum, suspensa hypocondria, est Hippocratis signum observatum lethale in pluribus ægrotantibus in Epidemicis: quia omnia excrementa ad viscera retrahuntur, unde faciliè opprimuntur.

Sextum, sunt digitus denigratus, quod signum erat in Adolescente decumbente in foro mendacium. Galenus in illo comm. dicit, digitos denigratos alterum de duobus significare, vel emori natium calorem, vel inflammationem viscerum.

Septimum, macula violacea, & nigra, seu petiolæ nigrae indicant mortem ob

eandem causam, ob quam digiti, & ungues liuidi fiunt.

Octauum, stertores indicant subsidentiam vasorum pulmonis ob virium casum, ac nemo cum hoc signo euadit.

**A**D actiones actuales rectrices, sex lethalia signa, eaque præcipua reducuntur. Primum est delirium cum permutatione ad peius: hoc signum proponitur ab Hippocrate 1. in 3. proter. 26. Galenus in comm. declarans quid intelligat cum permutatione ad peius, inquit esse permutationes ad peius, si prius delirent cum risu, & deinde cum rixa: vel prius delirium sit intermittens, & deinde continuum.

Secundum, dum æger non credit se valde agrotare, licet febre acuta sit correptus. Hoc signum indicat internam instrumenta iudicii seu ratiocinationis facultatis esse victa.

Tertium est, dum æger ex timido fit audax, & è contra, hoc indicat ipsum cor, & naturam propriam corrumpi: hæc omnia signa magna ex parte desumpsimus ab Hippocrate locis citatis.

Quartum signum est amissio memoriæ rei notissimæ, ut pote nominis alicuius familiaris amici, est Hippocratis 1. in 1. prædic. 30. indicat calidum natium cerebri valde resoluti.

Quintum est oblitio cum rigore, quæ indicat calorem natium vincti, ut animaduertit Galenus in illo comm. 2. in 1. prædic. 30.

Sextum sopor cum lassitudine in declinatione morbi, est Hippocratis secunda aphorismorum primo: indicat enim futuram recidiuam, quæ erit peior radice.

**A**D actiones sensitivas reducuntur octo signa: ac præcipua desumpta à hoc oculis: Hippocrates enim 4. in sextum epid. tex. 28. dicit ,, Oculi, ut valent, ita & totum corpus. Plinius lib. 7. historiarum naturalium cap. 51. inquit signa lethalia in oculorum & natium aspectu esse indubitata.

Primum signum est dum ægri distrahunt palpebram inferiorem in supernam palpebram,



Uram: sicuti fieri solet, dum aliquid incidit in oculos, quod signum fuit obseruatum ab Hippocrate in Cidis filio, qui apparente hoc signo breui ex humanis decessit.

Secundum, oculi senſu periti dum dormiunt, est Hippocratis 6. aphorismorum 52. nisi ramen id post alui fluxionem fiat; indicat hoc signum totum corpus à magno viscerum incendio exſiccari.

Tertium venulae oculorum si paleant, vel nigricent est lethale ex Galeno 1. præſag. 10.

Quartum surditas superueniens in acutis febribus indicat mortem: est Hippocratis 4. aphorif. 49. Idem habetur 1. Prognost. 31. sed clarius 4. aphorif. 49. ubi Hippocrates alia plura signa lethalia proponit: hic est aphorismus, „ In febre non intermittente, si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus peruertatur, si non videt, non audit, imbecillo iam corpore, in propinquo mors: causa est, quia dum partes peruertuntur, id fit per conuulsionem, quæ superueniens febribus acutis præſignat mortem.

Quintum, odor cadauerosus.

Sextum vox glangosa ex 2. prædic. 13. est ex Galeno loco citato à siccitate orta à nimia inflammatione, & est principium ſtertoris.

Septimum, comæſta ut lutus, est malum signum: quia indicat abolitionem gustus.

Octauum: dum ægri non ſrunt cum lingua artida, ut in Hermocrate: Galenus in illa historia dicit, vel ſignificare mentis alienationem, vel emori natium calorem, utrumque indicat mortem.

**A**d actiones motrices animales reducuntur nouem signa. Primum reſpiratio magna & rara, ut in Sileno: Galenus in comm. vult hoc signum indicare mentis alienationem.

Secundum, reſpiratio frequens ut pulſus: natura enim vſum ita auctum ſuſſerre non poteſt.

Tertium signum, si in reſpiratione moueantur ſcapulae, & pinæ natium ob debilitatem moriuntur, quia indicatur talis debilitas, qualis morbum vincere non pot.

Quartum, motus conuulſiui, qui ut plu-

rimum mortem præſignat.

Quintum, ſingultus ex inanitione.

Sextum signum malum est, dum æger vult ſapè reſidere, ex 1. præſag. 2. colligitur ſignificari internum angorem.

Septimum, dum ægris omnes ſitus ſunt moleſti, est Galeni 1. præſag. 16. Si hoc signum est continuum, mortem ſignificat, vide Galenum 3. præſag. 13.

Octauum 1. Prognost. 25. „ ſtridere dentibus in febribus, quibus non est conſuetum, infaniam & mortem ſignificat.

Nonum colligitur ex 7. epid. 28. de Pherecide vlt. dicit quod habebat signum mortale: quia in lecto decumbens vix poterat ſe conuertere.

**A**d operationes vitales reducuntur Septem signa deſumpta ab Hippocrate 2. de morbis mulierum. Primum, pulſus admodum contracti perſeuerantes ſunt exitioſi.

Secundum pulſus intercidentes.

Tertium valde debiles.

Quartum deficientes, veluti aſſixia.

Quintum conuulſiui pulſus.

Sextum minimi.

Septimum ad manum maximè accellerantes. Valeant, qui putant Hippocratem non teriſſe pulſus.

**A**d operationes naturales octo signa lethalia reducuntur. Primum deſumitur à decretorijs non indicantibus: ideo Galenus in Philisco, & paſſim lib. de criſibus nobis reliquit hanc ſententiam, „ Decretoria non indicantia aut lethalia, aut difficiliſ indicij: lethalia ſi iungantur, cum aliquo ſigno lethali: difficiliſ indicij, ſi nullū aliud appareat ſignum exitioſum.

Hæc decretoria non indicantia obſeruantur, dum in acutis, & malignis febribus in morbi principio vel augmento exſtantur ſudores copioſi, frigidi, vel calidi, vel alui fluxus, vel alia euacuationes.

Hæc decretoria non indicantia vocantur motus ſymptomatici: qui ſunt dum generum: aliqui ſunt ſymptomatici ratione exeuntis, veluti dum in morbo melancholico euacuatur bilis, in bilioſo pituita, vel melancholia, & tales motus ſunt ſymptomatici pernicioſi. Aliqui verò ſunt motus ſymptomatici ratione tempeſtatis,

dum scilicet in morbo bilioso euacuatur bilis, in principi morbi, & in pituitoso pituita, & isti non sunt ira mali.

Secundum signum exitiosum est, si in febris hiant maximi rigores sine ulla euacuatione per aluum, vel urinam, vel sudores, vel per vomitum, vel per hæmorrhagiam: hoc signum est Galeni 4. aphor. 46.

Tertium, rigores maximi sine consecutione caloris partium extremarum: hoc signum fuit obseruatum in muliere decumbente in foro mendacium, quod fuit lethale.

Quartum, rigores maximi in debilibus, febre non deficiente: est Hippocratis 4. aphor. 46.

Quintum, rigores in principio febrium ardentium est signum malignitatis, ut colligitur ex Galeno 2. in 1. epid. 75. atque ex Hippocrate 2. epid. 1. significat bilem velicatem membranas viscerum, & ipsa viscera opprimere.

Sexum signum est, dum concoctrix est ablata, sit prima coctio quæ fit in ventriculo, vel secunda, quæ fit in hepate, vel tertia, quæ fit præcipue in visceribus obtingentibus principatum: est Galeni 3. de crisib. sexto & tertio de symp. causis cap. 1. ubi vult: si ventriculus nihil concoquat fieri lenteriam, vel tympanitem: si coctio in hepate deficiat, fieri ascitem: si tertia coctio est ablata, fieri anasarcam, qui affectus indicat finem exitiosum.

Septimum, est passio diabetica in febre maligna, quæ est certum mortis indicium: quia fit à retentrice ablata (sed non ob intemperiem frigidam, ut dicit Auicennas, ubi agit de diabete: quia in viuo non est tanta frigiditas) & fit ut dicit Galenus 6. de loc. aff. 3. ab attractrice renum deprauata à materia calida in ipsis febribus: addimus quoque fieri à concoctione ferè extincta sæpè ob gangrenam, quæ læsiones enunciant finem exitiosum.

Octauum signum est, si in statu adsit summitas symptomatum cum urina cruda, est lethale: quia de ratione status sunt duo signa: quorum primum est summitas symptomatum, secundum est perfectissima coctio, si primum est sine secundo, est lethale. Hæc de signis lethalibus.

## QVÆST. XLVIII.

De sputo, & sputamine.

**I**N secunda parte aphorismi loquens Galenus de signis mox apparentibus mentionem facit de sputo, dicendo quod si statim appareat circa morbi initium breuem fore morbum, intelligens per initium, tres primos dies, ut infra declarabitur, si postea, ut in Anaxione, longum fore morbum. Concludit deinde urinas, alui excrementa, & sudores longum vel breuem prænuñciare morbum, sed de his distinctius.

Quo ad sputum, notandum ex Galeno 1. de crisib. cap. 5. sputum differre à sputamine: sputum enim est illud naturale quod tempore sanitatis expuitur: sputamen vero est, dum cum sputo proicitur aliquid morbificæ substantiæ. Hippocrates in aphorismo per sputum intelligit sputamen. Galenus in comm. de sputamine habet hæc verba: si sputamina in pleuritide apparuerint statim id est in tertia die, pleuritidis terminabitur decima quarta: si autem tertiam diem apparuerint terminabitur in septima, & ad summum vndecima eadem proportionem dici potest, quod si sputamina apparuerint in sexta, terminaturam pleuritidem in 27. si post octauam in 34. die, ut in Anaxione. Galenus in comm. istius aphorismi facit mentionem exemplo sputorum de gradibus cruditatis pleuritidis, dicens primum cruditatis gradum esse quando nihil omnino expuitur, quod indicat pleuritidem esse in prima parte principij: in Anaxione non solum tertia dies, sed etiam octaua ad primam partem principij pertinebat: quia tunc nihil expuebat.

Secundus gradus cruditatis pleuritidis est dum expuitur pituita cruda: tuncque morbus est in secunda parte principij.

Tertius gradus est dum expuitur tenue sputum cum aliqua tantum obscura coctione, & cum aliqua facilitate: tuncque morbus est in fine principij, quod colligitur ex Galeno primo de crisibus cap. 18. & ex hoc comm.

Quartus gradus est dum sputum crassum est obscure coctum: dicimus obscure: quia



quia appareat inaequale, videlicet partim coctum, & partim crudum: tuncque pleuritis est in augmento.

Quintus gradus cruditatis est, dum sputamina reijciuntur flaua, viridia, cruenta, & syncera, quæ non solum indicant cruditatem, sed malignitatem.

Hinc Hippocrates, & Galenus 2. Prognost. 38. & 40. dicunt, colores synceros. Semper malos, & deteriores: quia indicant calidissimas dyscrasias: dum verò isti colores sunt permixti aliorum humorum caloribus non sunt ita mali: quia non est à temperatura naturali tā insignis lapsus. Caterum, qualiscumque sit lapsus in pleuritide, dummodo vires sint robustæ, venæ sectio semper conueniet: ideo Hippocrates in Anaxione die octaua à morbi principio phlebotomiam non abhoruit.

Dubitatio: cum Galenus in hoc comm. mentionem faciat de sputis rufis, flauis, nigris, & liuidis synceris, quod scilicet sint deteriora, quam permixta alijs humorum coloribus, videndum est, cur huiusmodi excrementa sint ita mala: quod prima facie non videtur: quia sequeretur quod deterior esset tertiana exquisita, quæ à syncera bile fit, quam hæmorrhæa, qui simul fit à bile, & pituita: Nihilominus optimi sputi conditiones sunt ex Hippocrate & Galeno in comm. & alibi quod sint cocta, sintque alba, læuia, & æqualia: alba: quia tunc reddita sunt partibus solidis similia: læuia ex Galeno 1. acut. 15. dicuntur læuigata, id est non aspera, nec diuisa: taliaque sunt à natura superata: æqualia ex Galeno 2. Prognost. 28. sunt illa quæ vbiq; sunt vniformia, neque sunt in vna parte crassa, & in alia tenuia, neque in alia alba, ac in alia rubra, vel alterius coloris.

Insuper notandum ex Hippocrate 2. Prognost. 26. quod de ratione sputi optimi sit trium propositarum conditionum perseruantia: namque si vnica die sputa essent æqualia, altera verò die inæqualia, alterum de duobus indicaret, vel humores peccantes varios esse, vel à patiente esse commissum erratum in sex rebus non naturalibus. Addit Galenus in comm. præter tres optimi sputi conditiones, quod scilicet sint alba, læuia, æqualia, habeat præte-

rea, quod sputa neque nimis crassa, neque nimis tenuia sint.

Tertia dubitatio: quo ad difficultatem propositam, cur scilicet sputa syncera, flaua, vel alterius coloris synceri sint deteriora, quam si essent alijs extremis commixta: instantia erat de tertiana exquisita quæ fit à syncera bile, quæ reuera non est deterior hæmorrhæa à bile, & pituita facta.

Primò respondemus in tertiana exquisita bilem synceram transmitti extra venas: ibique ab alijs humoribus eius acrimoniam obtundi, secus in euacuatione per aluum efficeret diarrhæam, & dysenteriam. Vel dicimus, si eadem bilis quæ facit tertianam exquisita esset in venis proximis cordi efficeret ardentem, & malignam febrem.

Præterea bilis syncera depulsa ad ventriculum, intestina, & mesenterium faciliè vincitur: quia in his partibus & maxima est virtus concoquendi, & maxima commoditas expellendi prauos humores: quæ si essent in pleura statim interirerent.

Quod verò maxima vis transmutandi & concoquendi sit in ventriculo, intestinis, & mesenterio patet experiètia: quia in his partibus maxima ciborum, & potuum moles breui spacio in aliam substantiam transmutatur. Hinc superius diximus, humores in varijs partibus varios affectus producere; namque mucus mordax in cerebro ex Galeno loco citato efficit maniam: in cute pruritus, qui est affectus minimus respectu maniae: flatus in corde palpitacionem: idem flatus in ventriculo ructum; in recto intestino crepitum, & sic de alijs.

Quarta dubitatio: quò ad instantiam de hæmorrhæa quod non deberet esse affectus sæuior, quam sit tertiana exquisita, quia non constat ex synceris humoribus, sed ex bile, & pituita.

Respondemus, hæmorrhæam, seu semitertianam legitimam esse compositionem ex tertiana intermittente, & quotidiana continua: sed hanc compositionem non esse per humorum confusionem, sed per complicationem: declaro per confusionem esse, quando bilis permiscetur pituitæ, & ex hac permixtione vnica massa putrescens



fit; quæ febris est simplex: quia prouenit à putredine vnius massæ in qua humores inuicem se attemperant, licet ita mixti consecuti sint fere vnam formam: quia illa massa, neque est bilis, neque pituita, sed quoddam mixtum à putredine corruptum per humorum confusionem. Per complicationem verò est quâdo humores non simul miscentur, sed vnus humor est in vna parte, & alius in alia, itaut vnus alium non attemperet. Parimodo componuntur morbi per cõfusionem, veluti de pleuritide, quæ est tumor inflammatorius pleuræ, sicuti in pleura est intemperies, soluta vnitas ipsius pleuræ, & magnitudo aucta; vel componuntur morbi per complicationem, veluti dum varij sunt morbi in varijs corporis partibus: medicus igitur in morborum complicatione debet hanc distinctionem animaduertere: quia modus medendi morbis complicatis per confusionem est valde diuersus à modo medendi morbis complicatis per compositionem.

Sed redeamus vnde digressi sumus de semitertiana, quæ fit per complicationem: quæ est deterior: quia pituita putrescit in venis: syncera bilis extra venas. Accedit quod pituita separata à bile non potest acrimoniam bilis retundere: ideo hæmitriteus est febris mali moris, non solum, quia syncera bilis non contemperatur à pituita, verum etiam, quia pituita non iuuatur à bile: dum verò bilis cum pituita confunditur inuicem se remittunt, & maximè iuuantur.

## QVÆST. XLIX.

### De vrinis.

**C**Um Hippocrates in aphorismo inter signa mox apparentia collocet vrinas, alui fæces, & sudores: de his aliquid dicendum. Hippocrates 6. epid. 8. tex. 7. diuidit totum corpus, in continentia, contenta, & imperum facientia: inde ad reparandas has tres corporis partes tria sunt necessaria: nempe cibus, qui est necessarius pro continentibus, quæ sunt partes solidæ: potus pro contentis, idest humoribus, & aer pro spiritibus, qui vocantur imperum

facientes: sic tria resultant excrementa, nempe alui fæces à cibo: vrinæ à potu: sudores, & excrementa insensibilia ab excrementis tertie cõctionis. Alui excrementa, quæ sunt 100x apparentia, primò significant statum ipsius ventriculi, & intestinorum: secundariò statum ipsius hepatis, quatenus bilis, vel sanguis fecibus permiscetur, vel quatenus melancholia & catarrhus cum alui excrementis excernuntur, quæ lienen vel cerebrum indicare possunt.

Similiter vrinæ primariò significant renes, venas, & arterias magnas & hepatis gibbam: secundariò possunt significare statum omnium læsarum partium, quatenus ab omnibus partibus possunt excrementa deduci ad venam cauam, & inde per emulgentes ad renes, & vesicam.

Sudores, & halitus insensibiles primariò indicant excrementa tertie cõctionis: secundariò conditionem aliarum partium, idque præcipuè ostenditur per halitus: qui nostra arte statim perpenduntur.

Quantum igitur attinet ad vrinam, tria in ipsa considerantur nempe continentia, substantia, & contenta. Per continentia medici intelligunt vrinarum colores. Per substantiam intelligunt crassitatem, & tenuitatem. Per contenta intelligunt, & hypostasim idest sedimentum, & suspensum quod dicitur *επιαισθημα* quod in medio firmatur, & nubeculam quæ non consistit in medio, sed tendit ad summitatem: similiter inter contenta ponuntur omnia, quæ vrinæ supernant, sicuti sunt spumæ, guttæ oleoginosæ, corona, quæ à Græcis dicitur *αλως*, & tellæ aranæ cum circulis maioribus, & minoribus cum lineis à centro ad circumferentiam. Hæc omnia inter mox apparentia collocantur, de quibus omnibus Hippocrates intelligit in aphorismo.

Quantum attinet ad continentia videlicet ad colores: sciendum est ex Galeno primo de crisibus cap. 1. 2. quod omnes vrinæ remissioris coloris, quam sit color subflauus, indicant defectum caliditatis: vrinæ verò intensioris coloris indicant excessum caloris.

Per vrinam subflauam Galenus intelligit palcarem, quæ est modicè pallida: de hac



hac loquens Galenus 2. de tuen. fau. 1. 2. habet hæc verba „ Vrina modicè pallida est indicium perfectæ coctionis.

Præterea notandum est, colores remissiores subflauo in ipsis vrinis esse albos, & valde pallidos: Intensioris verò coloris esse flauos, subrubros, impensè rubros, oleosos, caruleos, virides, & nigros, quauis duntur multi alij colores intensiores subflauo, sicuti sunt vrinæ spicæ, auræ, & crocæ: de quibus Actuarius lib. de vrinis: omnes tamen ad prædictos reducuntur.

Sed quomodo fiant colores albi, nigri, & medij dependentes, vel independentes, legenda est nostra digressio quadragessima octaua in comm. artis paræ & in Auicenna quæst. propria, licet apud nos vnicuique inspectione & hæc omnia per experimenta illico intelligantur, & quomodo fiant colores medij dependentes, & quomodo fiant dependentes.

Quid verò vrinæ albæ & valde pallidæ, quæ sunt infra subflauum, indicent: primò cōfugimus ad Auicennam lib. 1. fen. 2. doc. 3. cap. 2. vbi dicit, vrinas albas perseverantes cū eadem albedine indicare priuationem digestionis: dicit perseverantes: quia nisi ita albæ perseverent per plures dies non indicabūt priuationem digestionis: quia reddi possunt albæ ex tribus causis nempe ex nimio potu, ex vigilia, vel ex nimio coitu.

Hinc duæ conditiones sunt obseruandæ, vt vrinæ albæ indicent priuationem digestionis. Primæ vt sint albæ, & perseverantes: secunda vt non sint splendida, seu valde lucidæ: ideo Galenus 2. præfag. 26. habet hæc verba „ si inter coctas vrinas nulla inciderit cruda, ea optima est (addit) si aliquando apparuerit cocta, aliquando cruda, illa indicat in varijs locis humores peccare: itaut in vna parte sint cocti, & in alia crudi: ideo solum vrinæ perseverantes verè possunt indicare omnes humores esse coctos, vel crudos.

Deinde vrinæ albæ, & pellucidæ, sunt valde malæ, de quibus Hippocrates 4. aphorismorum 72. protulit hunc aphorismum „ Pellucida & albæ vrinæ præsertim in phreneticis, si superueniant, malæ. Immo Hippocrates 3. epid. prænouit egrū quartum moriturum quinta die ex vrinis

pellucidis albis, & tenuibus: in hoc agro in secūda die apparuit suspensum paucum genituræ humanæ simile, signum quidem perniciosum: prænouit Hippocrates egrū quinta die moriturum: quia secunda die apparuerunt quoque vrinæ albæ, & lucidæ vnde factus etiam fuit surdus, & delirauit.

Prænouit quoque Hippocrates, ex vrinis albis, & pellucidis tenuibusque vxorē Dealcis in phrenitidem lapsuram, & tandem die vigesima morituram.

Quinta dubitatio ex dictis exoritur, quomodo vrinæ albæ, & lucidæ, quæ sunt infra colorem subflauum indicare possint ægros præ nimio calore febrili morituros: non ne confirmatum est ex Galeno, vrinas albas indicare defectum caloris?

Respondetur, vrinas albas per se non indicare phrenitidem, sed ex accidenti quatenus scilicet indicant vrinæ turbidum, & crassum delecterium quiddè, quod erat euacuandum per vrinam, in corpore detineri, & detentum inuadere cor & præcipuè cerebrum: vnde phrenitis.

Insuper respondemus, vrinas albas indicare summam cruditatem: luciditatem verò magnum incendium, ratione cuius fieri potest phrenitis. Propter hæc causam in Sileno prius secuta sunt vrinæ crassæ, & subiugales; deinde lucidæ, & tenues, deinceps cantus, risus, delirium, & indo mors.

Quod verò vrinæ lucidæ postquam fuerunt subiugales, & crassæ prænuncient finem exitiosum, probari potest argumento à minori hoc modo: si illud crassum, & turbulentum vrinæ, dum euacuatur, est adeo naturæ hostile, vt indicet perniciem, quantò magis erit naturæ hostile, quando in corpore detinebitur?

Hoc argumentum confirmatur per experimenta Hippocratis. Primò patet per historiam vxoris Philini, quæ (vt refert Hippocrates) filiam pepererat cum vrinis subiugalibus; inde delirauit, & paulò post mortua est.

Deinde confirmatur per casum famulæ Eualcidæ phreneticæ, quæ periit: quia in toto morbo vrinas habuit turbatas.

Confirmatur quoque per casum Polyphanti, qui cum vrinis subiugalibus mori-



tur conuulsus. Quare si ita crasse, & turbida sunt mala, erunt peiores quando erunt pellucidæ, & tenues: quia illud crassum, & turbulentum naturæ inimicum in corpore detentum, & non euacuatum lethalia symptomata efficere solet.

Notandum ex Galeno 1. de crisi- bus 12. triplicem esse differentiam vrinarum turbidarum. Primam ait, esse dum micte paulò post resident, & has esse mitiores. Secunda differentia est, dum semper turbida manent. Tertia dum puræ minguntur, & deinde turbantur.

Sexta dubitatio oritur circa vltimam differentiam: quia sæpè in sanis hominibus puræ minguntur, & deinde turbantur: quomodo igitur istæ erunt deteriores subiugalibus? quæ solum in ægris minguntur.

Respondetur, Galenum loco citato loqui de turbidis, & subiugalibus: hæc sunt verba Galeni „ triplex est vrinarum turbidarum differentia: istæ quæ vocantur puræ à Galeno sunt illæ puræ: quæ intus relinquunt crassum, quod est deleterium: ideo sunt deteriores: hæc certè non conuenient sanis.

Quo ad vrinæ colores, qui sunt intensiores, quam sit palea, & subflauus, dicimus tantò esse peiores, quantò magis approximantur vrinis nigris: quia nigra excrementa omnia ex Hippocrate 4. aphor. 21. & 22. mortem prænu- nciant.

Duo tamen de vrinis nigris sunt notanda: vnum ex Galeno 1. de crisi- bus 12. habetur, vrinam nigram significare vel magnum incendium, vel caloris extinctio- nem: atque ambo mortem portendere.

Secundum notandum est de vrinis nigris esse intelligendum quo ad substan- tiam, & nò quo ad sedimentum: quia vri- na nigra quo ad sedimentum in quinque casibus nihil mali significat. Primus casus est dum in nephritico rumpitur aliqua re- num papilla à lapillo ingrediente vete- res, quo casu statim vrinæ sedimentum fit nigrum ob sanguinis paucitatem, quamuis vrinæ substantia omni nigritudine sit de- structa.

Secundus casus nigredinis vrinarum obseruatur in mulieribus menstruatis.

Tertius in suppressis menstruis, vt nota- Galenus in muliere morosa, vbi dicit vri- nam nigram in ipsa muliere non fuisse pe- riculosam, quia menses erant suppressi.

Quartus casus post epotum elleborum superuenire solet nigrum vrinæ sedimen- tum, vt refert Actuarius de seruo suo in lib. de iudicijs vrinarum.

Quintus dum splen depletur per vri- nam, vrinæ apparent nigrae quo ad sedi- mentum: quia euacuatur humor melan- cholicus.

An verò splen depleri possit per vasa vrinaria: à multis non creditur, quia Ga- lenus 12. meth. cap. 17. ait, nulla est via à liene, vt per vrinam superfluum possit euacuari. Attamen ex Hippocrate 2. epid. 2. tex. 27. in historia Bionis habetur, Bio- nem habentem splenem elatum, & tumi- dum, vrinæ profluuium fuisse liberatum. Insuper Galenus 2. ad Glauc. 2. docet sple- nem interdum depleri per vrinæ pro- fluuium: sed per quæ vasa non docet. Ego autem puto, vt in sectione corporum ob- seruauimus, splenē euacuari posse per vrinam per duos furculos arteriales prædeuntes ab arterijs splenis, qui deinde implantan- tur in arterias emulgentes. Quo pacto verò apparens contradictio in Galeno tolli possit, non est ita facile: sed nos a- i- bi satis superque de hac contradictione scripsimus.

Colores verò qui sunt supra vrinæ sub- flauas tendentes ad nigrum sunt subrubri, valde rubri, oleosi, cærulei, & virides: vri- næ subrubrae ex Hippocrate 1. præfag. 27. indicant securitatem & morbi longitudi- nem, sed eo modo, quo intelligit Galeus 4. aphor. comm. 71. vbi citans Hippocra- tem dicentem vrinam subrubram esse sa- lutatem dicit, esse intelligendum de sedi- mento rubro, quod scilicet indicet securi- tatem & morbi longitudinem.

Hinc in Cleonactide in die 40. minxit vrinam rubram & morbus protogatus est ad 80. diem, in quo factum est iudicium ad salutem per sudorem, vrinæ sedimento existente rubro, & laui.

Vrina verò rubra indicat securitatem, quia affectus est in sanguine. Indicat lon- gitudinem, quia indicat sanguinem esse



factum tenuem, & per consequens incoctum, ut dicit Galenus in comm. longo tempore temporis spacio concoquitur: quia ferè tota massa patitur illam cruditatem, quando urinae tales sunt: quia urinae deplent venam cauam, quae est venarum truncus maximus.

Urinae verò impensè rubrae ex Galeno 1. prædic. 2. comm. 25. sunt valde crudae: ideo indicant maiorem longitudinem, & vna securitatem.

Si verò rubedo sit in sedimento, indicatur maior longitudo, & maior iecoris imbecillitas: quia significat maiorem recessum à statu naturali.

Fernelius vult, urinam impensè rubram non reddi ex sola imbecillitate alteratricis iecoris, nisi renes quoque affecti sint: quia dum sanguinolenta transeunt per renes, nutriuntur illa portione sanguinis, quae in serositate est dispersa: quare cum urinae sint sanguinolentae, renes non nutriuntur, & per consequens sunt malae affecti. Valdeant igitur Saxonia, & nonnulli alij qui contra Fernelium dicunt urinam sanguinolentam illæsis renibus reddi posse: id probant, quia etiam hepaticus fluxus lotius fieri potest, illæsis intestinis. Falluntur quia non est par ratio de renibus & intestinis: quia intestina sanguine lotiuo non nutriuntur.

Quod verò urina rubra absque sedimento rubra non indicet securitatem, confirmatur per Hermocratis casum citatum ab Hippocrate 3. epid. 1. in quo apparuit urina rubra, quae indicabat sanguinem adeo crudum, & serosum, ut natura non potuerit illum concoquere: ideo ex humanis Hermocrates decessit.

Oleosa verò urina ex Galeno 1. de crisis 12. vel significat colliquationem, vel in potu fuisse venenum haustum, ut dicit Auicenna, ubi agit de urinis: ibique addit, si appareat in oleosis aliqua hypostasis de vita sperandum: si minus, valde timendum.

Similiter caruleae urinae significant ex Auicenna lib. 7. fen. 2. doct. 3. cap. 2. & mortificationem, & haustum venenum, ut de oleosis dictum est.

Virides ex Galeno 1. de crisis 12. sunt

in via ad nigredinem factam, vel ab incendio, ut in febre ardente, vel à congelatione, ut in valde senibus & mortem significant. Isti igitur sunt colores, qui collocantur inter signa mox apparentia, de quibus Hippocrates in aphorismo intelligit.

Quo ad urinae substantiam, quae similiter ad signa mox apparentia reducitur, duae sunt conditiones, nempe crassities, & tenuitas, utraque conditio ex Galeno 1. de crisis 12. significat cruditatem: tenuitas, quia indicat naturam adhuc non incepisse coctionem: siquidem ex Aristotele 4. Meteor. cap. de coctione, coctio fit incrassando, dum verò incipit concoctio, statim remittitur tenuitas.

Crassities similiter significat cruditatem, quia flatuosi spiritus, ut ibidem docet Galenus, sunt permixti: sicut permixcentur in vinis novis, & in urinis subiugalibus: Hinc Galenus 2. prædic. comm. 40. ait, urinas crassas, & turbidas fieri, quia agitantur crassi humores à flatuoso spiritu, qui est ille, quippe eleuat partes crassas, ea ratione, qua panis fermentatur, dum in maiorem molem attollitur, vel ea ratione, qua melancholia in terram coniecta eleuat bullas: vel sicut spiritus in musto, qui reddit vinum turbidum: haec exempla à Galeno loco citato proponuntur. Similiter 4. aphorismorum comm. 40. habet haec verba „ tales urinae, quales sunt iumentorum, sunt à materia crassa, ac densa à calore agitata. Haec siquidem maximè, & ab extrinseca caliditate videntur in spiritum solui, ut bitumen, pix, & resina.

(Addit turbatae quae cito sedimem crassum habent, cito morbum solutum iri significant: subdit quod est maximè notatu dignum „ urinae quae non resident in robustis ostendunt longam fore morbum, in debilibus mortem praenunciant. Ecce, quam mirabile praesagium ex urinis turbidis colligi potest, quod certè nos nunquam fefellerit in praedicendo.

Quo ad urinam tenuem, si aegri febre liberantur cum urina tenui, expectanda est recidiva, nisi à medico prohibeatur. Accedit, quod si febris fuerit maligna, recidiva esset deterior, & ut plurimum mortalis: quia de ratione recidivae ex Auicenna est

haec



hæc conditio, quod semper sit, sua radice deterior: causa est, quia sicuti corpora decidentia sunt robustiora, sic conualescentia sunt debiliora: unde fit quod sæpè recidiuæ interrimant, sicuti contigit Hermocrati qui decimaquarta die febre maligna liberatur, tamen capit decimaseptima apparere vrina tenuis: unde Hippocrates præuidit Hermocratem in 27. moriturum, quod non contigisset, si vires perdurassent vsque ad vltimam partem vigoris.

Quo ad crassitiam ex Galeno 2. præfag. comm. 26. habetur in fine morbi, vrinam si debito crassior sit, minari recidiuam, intelligendo de crassitie substantiæ ipsius urinae, non de crassitie contentorū: quia interdum urinae sunt admodum crassæ, quo ad sedimentum, & sunt bonæ, quando per aliquā crism ita crassæ redditæ sint: crassities verò urinae quo ad substantiam nunquā potest esse per crism: quia semper significat cruditatem. Dum Galenus primo de crisibus 12. dicit turbidarum vinarum peiores sunt quæ puræ minguntur, ac deinde turbantur: intelligit quo ad substantiam vrinæ, non quo ad contenta: dum in sanis puræ minguntur, & deinde turbantur sunt tales quo ad contenta: non quo ad substantiam: quia in sanis eadem semper manet vinarum substantia.

Quo ad contenta mox apparentia quatuor esse possunt, nempe sedimentum, suspensum, ancorima idest nubecula, & quæ supernatant. Quo ad sedimentum siue hypostasim, Hippocrates 7. aphorismorum 31. si fuerit crassum & veluti farina crassius morbi longitudinem significat: sed hæc lege vt non sit criticum: quia quando sedimentum, est crassum, & criticum indicat morbi solutionem: sciendum tamen quod sedimentum in vrina sana non inuenitur: inuenitur tamen suspensum.

Quo ad suspensum, quod est illud quod iacet in medio, docet Hippocrates 2. prognost. 26. in sanis debere esse album leue æquale & moderatè crassum.

Notandum quoque est, quod multi falluntur: dum credunt, æqualitatem suspensi significare æqualitatem substantiæ suspensi, quod non est dicendum, quia quando su-

suspensum est leue ex necessitate est æquale: quare per æquale cum Hippocrate & Galeno loco proximè citato intelligimus suspensum album, & leue quod æqualiter perseueret tales, idest multis diebus ita vnitum, non diuulsum, & hoc dicitur æquale: quia nisi perseueret tale, indicator morbi longitudo, quod confirmatur ab Hippocrate in Historia Cleonactidis, in quo apparebat vrina modo cocta idest cum suspensio albo, & leni, modo cruda idest sine suspensio quod indicabat morbum Cleonactidis fore longum: ideo solum die 80. fuit liberatus à febre, illa enim inæqualitas apparitionis suspensi indicabat plurimas esse materiæ crudæ portiones, quæ indigebant coctione: sicuti adponet Galenus in comm.

Quo ad nubeculam dicimus, indicare humores seu vapores ad caput excurrentes. Caterum, si in vrina non appareant aliæ malæ conditiones, nihil mali significatur, quia paulo post, ipsa nubecula in suspensum faciliè degenerare solet.

Quo ad ea, quæ supernatant, quæ sunt spumæ, & bullæ, si cito dissoluantur nihil mali indicant: si tardè, affectū pituitosum. Gutæ verò oleoginosæ indicant colliquationem. Tellæ aranæ cum circulis, & corona significant perfectam coctionem, & omnimodam separationem.

## Q V Æ S T. I.

*De alui excrementis & sudoribus.*

**Q**uo ad alui excrementa: Galenus in comm. huius aphorismi proponit duas conditiones optimarum facum. Prima vt excernantur illa hora, qua tempore sanitatis. Secunda quod neque duræ, neque molles sint, habeantque mollem consistentiam, æqualem, tam in principio, quam in fine excretionis.

Septima dubitatio Hippocrates 2. præfag. 14. videtur diuersus à Galeno: quia dicit alui excrementa debere esse liquida siue strepitu exeuntia, & cum ordine. Galenus verò vult excrementa neque dura neque mollia esse, ergo vel male Galenus, vel Hippocrates.

Re-



Respondemus, Galenum loqui de excrementis significatibus alui coctionem: Hippocratem verò de excrementis significantibus crism, in qua semper liquida sunt: ratio est, quia per crism euacuantur excrementa, quæ ab internis visceribus procedunt, quæ sunt liquida.

Præterea sciendum est de alui excrementis, quod admonent Hippocrates & Galenus 2. præfag. 23. vbi habent, „ quod deiectio excrementorum varia, & diuersa, multas, & curatu difficiles affectiones indicet.

Quo ad sudores criticos duæ sunt præcipuæ cõditiones: prima vt fiant cum signis coctionis. Secunda vt fiant diebus imparibus. Dies impares, in quibus sudores sunt laudandi, recensentur à Galeno 8. in sextum epid. cõm. 9. sunt dies 3. 5. 7. 9. 11. & 14. qui est septimus secunda septimana, 17. & 20. qui est 7. tertia septimana 27. & 34. qui est post 20. dies 14. Ceteri dies sunt indicia laborum.

In diebus imparibus peccat bilis, quæ facillè soluitur: In paribus mouetur melancholia, quæ naturæ est magis rebellis, & difficile soluitur.

#### APHORISMVS DECIMVSTERTIVS.



**S**ENES facillimè ieiunium ferunt: secundo loco qui ætatem consistentem habent: minus adolēcentes: omnium minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt viuidiore.

Cum Hippocrates à 4. aphorismo vsque ad hunc 13. exclusiue egerit de ratione victus ægrotorum. In hoc aphorismo, & in alijs sequentibus vsque ad decimum nonum inclusiue agit quoque de ratione victus sanorum: sed in hoc aphorismo de ratione victus sumpta indicatione ab ætate: itaur hic aphorismus sit regula omnium aphorismorum, qui sunt de ratione victus. Quod sic probatur: ex hoc aphorismo

colligimus ex ætatum differentia quando parum, quando multum, quando semel, & quando parum & multum, & per plures vices sit cibandum: ergo est regula omnium aphorismorum: vult enim Hippocrates multum & semel in senibus! primi senij: multum, & per plures vices in pueris viuidiorebus: parum, & sæpe in decrepitis esse cibandum: in medijs ætatibus plus minusue, prout magis, vel minus ad pueritiam, vel senectutem vergunt.

Cum igitur Hippocrates in superiori aphorismo proposuerit quatuor fontes signorum indicantium futuros paroxysmos, & futuros morbi vigores, eo fine, vt illis cognitis facillè dignoscamus, quam victus tenuitatem, & quod ieiunium virtus ferre possit vsque ad vigorem: Ideo in hoc aphorismo declarat quænam ætates facillimè, & quæ difficillimè ieiunium ferant: ac merito in hoc loco de ætatibus: quia superius egerit de victu tenui sumpta indicatione à morbo: deinde de victu tenui sumpta indicatione à virtute: reliquum erat, vt ageret de victu tenui sumpta indicatione ab ætate: quod facit in hoc aphorismo.

Similimodo progreditur Hippocrates 4. de ratione vic. tex. 19. dum proponit scopos mittendi sanguinem principalissimos, quos vocat *κρυψιλάτες* vbi agit de ratione curandi per sanguinis missionem sumpta indicatione à morbo, à virtute, & ab ætate, dicens „ sanguinem detrahes, si vehemens fuerit morbus, viriumque rebus affuerit, & ætas floruerit. Ecce quam artificiosè Hippocrates in hoc aphorismo quoque progreditur sumendo indicationem primò à morbo, deinde à viribus, & tertio ab ætate, quod non solum fieri debet in phlebotomia, & in ratione victus, sed in omnibus alijs magnis remedijs.

Hæc connexio est memoriæ consignanda: quia docet quomodo sit procedendum in actu practico, docendo semper esse hæc tria respicienda, morbum, virtutem, & ætatem.

Diuiditur hic aphorismus in quatuor particulas. In prima proponit victum ætatis senilis. In secunda victum ætatis consistentis. In tertia victum adolēcentium.



tium. In quarta videtur puerorum.

Quo ad verborum explicationem, & aphorismi intelligentiam: per senes intelligit senes in primo senio, qui dicuntur γέροντες, vt animaduertit Galenus in cōm.

Per ieiunium Galenus in comm. explicat, Hippocratem intelligere omnimodam inediam, quam solum senes, qui sunt in primo senio facile ferre possunt. Secundum hanc interpretationem aphorismus non est verus de quacumque aetate senili.

Addit Galenus, vel Hippocratem per ieiunium intelligere non omnimodam inediam, sed cibi paucitatem; atque secundum hanc interpretationem aphorismus esset verus de quacumque senectute, & præcipue de decrepitis, qui paucis, & sæpe exhibitio cibo sunt nutriendi.

Nos tamen credimus cum Philotheo, cum Celsis, & multis alijs, Hippocratem per ieiunium potius intelligere omnimodam inediam, quam solum γέροντες, qui sunt senes in primo senio, ferre possunt, ad differentiam senum, qui sunt in vltimo senio, qui vocantur πέμπελοι, quæ vox significat senes ad pompam funeralium bene dispositos & præparatos, sicuti sunt decrepiti.

Celsus lib. 1. cap. 3. citans hunc aphorismum Hippocratis habet hæc verba: „ Quo ad ætates atinet, ieiunium facillime ferunt mediæ ætates: minus iuuenes, & minimè pueri, & senectute confecti: quare per senes non intelligit in hoc aphorismo senectute confectos, sed solum illos, qui sunt in primo senio.

Quod verò senes in primo senio facillime ieiunium ferant patet argumento à contrarijs: primo enim topicorum cap. 8. oppositorum eadem est disciplina: quare si corpora puerorum, quæ sunt calida & humida, difficillimè ieiunium ferunt: corpora contraria quæ sunt frigida, & sicca, sicuti sunt illa, quæ sunt in primo senio facillimè ieiunium ferunt: corpora enim decrepita quo ad excrementa sunt frigida & humida, & non sicca.

Præterea senes non decrepiti facile ferunt ieiunium ob tres causas: prima quia pituita in ipsis conuertitur in alimentum, quæ in

decrepitis conuerti non potest: quia conuertitur cibis in ipsis magna ex parte in pituitam vitream, quæ est omnino nutritioni inepta.

Secunda causa est calor diminutus: in lucerna enim quanto ellychnium maius est, tantò citius oleum absumit: ideo diutius cum cibo aliquo determinato perdurant.

Tertia ratio est, quia corpus senum est rugosum, & durum, vnde fit quod alimentum cum difficultate penetrat, & cum difficultate resoluitur; vnde non ita promptè appetunt, vt iuuenes. Totum oppositum obseruatur in pueris. Namque Galenus 9. meth. cap. vlt. inquit, puerorum substantiam omnium facillimè resolui, & diffilare: quia est humidissima: Sexto verò de tuen. san. cap. 6. dicit alimentum proportionari diffilationi, vult, quæ pluri alimento pueros indigere, quam iuuenes, & longe pluri, quam senes: quia alimentum tantum esse debet, quanta est diffilatio: ideo Galenus primo de ratione vic. 44. protulit hæc sententiam, „ si nihil efflueret è corpore nostro, nihil cibi daremus: quare cum pueri maximam habeant diffilationem, duo debent à medico obseruari. Primum quod non sint tractandi inedia. secundum (vt docet Galenus 11. meth. 14.) quod pueri non sint euacuandi per medicamenta, vel per venæ sectionem: quia facillimè resolverentur.

Demum Galenus in sequenti comm. probat exemplo aquæ, olei, picis, & ferri ad solem appositorum, corpora humidiora facilius resolui, sicciota verò difficiliter. Inde colligimus, quod vbi est facilior resolutio, & diffilatio, vt obseruatur in pueris, ibi plus cibi dandum sit: vbi verò difficilior est resolutio & diffilatio, sicuti in senibus, ibi minus cibi exhibendum. In decrepitis verò licet resolutio, & diffilatio minima sit, parum, & sæpe nutriendum, ac magis quam in senibus primi senij: quia in decrepitis (vt dictum est) pituita sit vitrea, quæ est in ipsis omnino nutritioni inepta.

Deinde dicit Hippocrates εύραστα, id est facillimè, & non facillima: quia neutra pluralia, vt εύραστα, sine articulis transeunt in naturam aduerbiorum, vt probauimus in explicatione 2. aphorismi huius



huius sect. Poterat dicere Hippocrates *εὐκόπως* idest tolerabiliter: sed dixit *εὐκόπῃ* *τα* quod neutrum prolatum sine articulo ab Hippocrate semper sumitur aduersarialiter.

Deinde dicit „ *secundo loco qui aetatem consistentē habent, minus adolescentes.* Quæritur cur Hippocrates omiserit iuuenes. Galenus in comm. Respondet omisisse iuuenes, quia medio modo se habent inter adolefcētes, & aetate consistentes, idest mediomodo se habent in ferendo ieiunio: namque non ita ferunt ieiunium, sicuti illi, qui sunt in aetate consistentia: ferūt tamen magis ieiunium, quam adolescentes, quorum aetas maximè propinqua est pueritiæ.

Subdit Hippocrates „ *Omnium minimè pueri, præsertim, qui inter ipsos sunt viuiores.* Galenus affert duas rationes, cur pueri indigeant pluri alimento: prima est, quia crescunt: secunda est quia præditi sunt maiori calore.

Sed Hippocrates mira breuitate explicat, cur pueri viuiores minimè omnium possint pati ieiunium, dum dicit *πρὸς πυρότητα* quod verbum continet in se duas conditiones, primo comprehendit aetatis viuacitatem, & promptitudinem ad agendum: ex Galeno enim in arte parua cap. 29. habetur, promptitudinem ad agendum esse certissimum caliditatis indicium: ea verò quæ sunt prompta ad agendum, sunt quoque pròptia ad resoluendum alimētum.

Secundo *πρὸς πυρότητα* comprehendit etiam calorem: quia *θυμός* non solum significat animum, sed iram, & seruorem, & per consequens calorem ad differentiam iracundiæ, quæ dicitur oxythimia, quæ non calorem, sed frigiditatem indicat: hinc irati viri magis dissant, & resoluunt, atque maiori indigent ciborum quantitate, quam iracundi: quare cum pueri sint maiori calore, & maiori humiditate donati, & per consequens magis resolutibiles, erunt magis nutriendi.

Post pueros sequuntur adolescentes: deinde iuuenes: post iuuenes sunt aetate consistentes, & postremò senes in primo senio, qui minimè omniū sunt nutriendi. De decrepitis nihil dicitur, quia in sequentibus dubitationibus declarabitur.

Prima dubitatio occurrit, quia dictum est, senes decrepitos pati non posse ieiunium, quod videtur rationi aduersari, quia eorum corpora tardius dissantur & resoluuntur & tardius famescunt. Ex alia parte Galenus 5. de tuen. san. 4. ait sæpè cibados esse decrepitos, alioqui resoluuntur, & moriuntur.

Respondetur, in decrepitis dissilationem minorem quidem esse: sed quia eorum pituita sit vitrea, quæ non conuertitur in alimentum, sicuti conuertitur in senibus primi senij, necessitate coacti debēt parum & sæpè cibari: vnde fit, quod si decrepiti in febrem leuissimam incidant facillimè moriantur: quia coacti sunt in ipsis paroxysmis, ne resoluātur, cibum sumere: vnde facile à morbo interimuntur: Eorum calor assimilatur lucernæ, quæ est propè extinctionem, quæ indiget continua, & paulatim facta olei adiectione: dicimus paulatim, quia si affatim oleum infundatur, extinguatur: sic in ipsis pauco utimur cibo, ne calor suffocetur, ac sæpè exhibetur, ne resoluatur.

Secunda dubitatio: Hippocrates inquit, pueros difficiliter ferre ieiunium, quàm adolescentes, & iuuenes. Contra hoc habemus in comm. sequenti, & in Auicenna prima primi, caliditatem iuuenum, & adolefcētium esse æqualem caliditati puerorum: ergo æqualis erit dissilatio: ergo iuuenes, & adolefcētes æquè ferent ieiunium, ac pueri.

Respondetur caliditatem natuiam puerorum quoad substantiam esse maiorem, quam iuuenum: esse vero æqualem quo ad qualitatem, licet humiditas puerorum efficiat caliditatem halituosam, ita ut tactus noster non animaduertat caliditatis acrimoniam.

Deinde respondetur, quod licet caliditas puerorum sit æqualis caliditati iuuenum, non tamen est æqualis dissilatio, & alimenti resolutio: quia pueri sunt humidiores, & vt tales longè magis dissant, & resoluunt, quam iuuenes, qui sunt calidi, & sicci. Sic Galenus in comm. sequenti dat exemplum de ferro ignito, & de oleo: dicit, ferrum ignitum esse calidissimum nihilominus ratione siccitatis non resoluitur:

T five-



si verò eadem ferri caliditas esset in oleo, & aqua, quammaximè oleum. & aquam resolveret, & exsiccaret: difflatio enim seu vapor eleuatur ab humido, & non à sicco. Quare cum cibus ex Galeno 6. de tuen. san. sexto & primo de ratione vic. comm. 44. proportionetur difflationi, plus cibi dandum erit pueris, quam iuuenibus.

Causa verò cur Galenus dixerit, cibum debere proportionari difflationi, & non euacuationi sensibili, est, quia, vt probauimus in staticis, euacuatio insensibilis sola est longè plenior, quam omnes sensibiles simul vnita.

Tertia dubitatio. Galenus 2. de temperamētis cap. 4. inquit, q̄ qui habent venas latiores facilius ferat ieiunium, quam illi, qui habent venas strictas. Totum oppositum asserit Galenus in arte parua vbi loquens de hepate calido inquit, istos habere venas latas, esseque calidi hepatis: sed sic est, quod calidi difficilè ferunt ieiunium: ergo Galenus sibi contradicit. Hæc dubitatio proposita est ab Argenterio in hoc loco, & à Triuerio contra ipsum Galenum.

Respondent tamen Triuerius & Argenterius, locum Galeni 2. de temp. esse mendosum, vel Galenum esse deceptum.

Respondent Alij, & rectè quidem, venas esse latas vel ob sanguinis copiam, vt in Athleticis, quorū corpora ob sanguinis plenitudinem habebant venas latas & tales faciliè ferre ieiunium, vel venas esse latas à natura: ac tales homines esse calidos, & ieiunium ferre non posse.

Similiter dicunt, venas angustas esse vel ob nimias euacuationes, quo casu ieiunium ferri non potest, vel esse angustas à natura, talesque esse frigidos, propterea faciliè ieiunium ferre: quia in his pauca est difflatio.

Quarta dubitatio: dictum est, senes ratione siccitatis inedia ferre: tamen Galenus 2. de ratione vic. 29. & 10. meth. 5. inquit corpora sicca inedia ferre non posse.

Respondetur, corpora sicca vel esse coniuncta cum caliditate, vel frigiditate: primo modo inedia ferre non possunt: sicuti picrocholi, qui calidi sunt & sicci, de quibus Galenus locis citatis intellexit: secundo nempe corpora sicca iuncta cum frigiditate ieiunium faciliè ferre posse.

Quinta dubitatio nō videtur, quod corpora sicca ratione frigiditatis inedia ferant: quia Galenus in arte parua cap. 62. & 63. asserit, ventriculum frigidiorē magis appetere, ergo minus inedia ferre.

Respondetur, Galenum in arte parua comparasse appetitum concoctioni dicentem, ventriculum frigidiorē plus appetere quam concoquere, sed nō absolutè, quod scilicet concoctio in frigido maior sit, quā in calido: quia vult in frigido facta comparatione inter virtutem concoquendi, & appetēdi maiorem esse virtutem appetendi, quam concoquendi, quod non est contra Galenum: & Hippocratem.

Sexta dubitatio: dictum est ab Hippocrate in aphorismo: senes, quisuis, in primo senio facillimè ieiunium ferre: q̄ videtur reluctari experientie: quia senes decrepiti tardius famescunt & tardius eorum corpora diffantur, & resoluuntur: ergo faciliores erunt in ferendo ieiunio, quam senes in primo senio.

Respondetur, q̄ ferre ieiunium intelligatur dupliciter, vel quod tardius famescant, vel quod facilius ferant cibi paucitatem. Decrepiti tardius famescunt, & difficilius diffantur eorum corpora: tamen non ferunt facilius ieiunium: quia nisi cibo paucos, & sæpè exhibito succurrantur, resoluuntur, & moriuntur ob causas superius allatas.

Septima dubitatio non videtur, quod semper pueri plus appetant, quam adolescentes, & adolescentes plus quam iuuenes: quia inueniuntur iuuenes qui duplo magis appetunt, & concoquunt, quam pueri: ergo aphorismus non erit semper verus.

Respondemus, Hippocratem in aphorismo fecisse comparationem respectu vnius individui, nempe quod Socrates puer difficilius ferat ieiunium, quam dum erat adolescens, vel inuenis: quia facta comparatione ad diuersa indiuidua, aphorismus esset falsus: potest enim contingere, quod Socrates puer facilius ferat ieiunium, quam Plato adolescens.

Deinde respondemus per faciliè ferre ieiunium Hippocratem intelligere, quod faciliè tolerant ieiunium, & ab ipso non offe-



offendantur, non quod non appetant: quia corpora picrochola ob intemperiem calidam & siccam, & ob bilis copiam non appetunt quidem cibum, tamen quam maxime à ieiunio offenduntur.

### Q V Æ S T. LI.

*Ostenditur, quæ corpora sint magis vel minus disposita ad ieiunium.*

**S**Ed tria occurrunt adhuc consideranda pro intelligentia aphorismi, primū quænam sint corpora magis, & minus disposita ad ieiunium. Secundum, cur Hippocrates & Galenus fuerint adeo solliciti in dignoscendis ataribus. Tertium in sequenti quæstione: quæ sint, & quot sint atates.

Quoad primum: ad memoriam reuocandæ sunt decem conditiones, quæ patrefaciunt corpora magis vel minus disposita ad ieiunium: prima conditio est complexio calida & humida, quæ maxime resoluit: vnde redditur corpus ineptissimum ad ieiunium; sicuti sunt corpora puerorum sua natura calida & humida, quæ difficilime ieiunium ferunt: sed quia oppositorum eadem est disciplina: corpora opposita sunt frigida, & siccæ, hæc erunt aptissima ad ferendam inediam.

Secunda conditio corporis minus dispositi ad ieiunium est corporis raritas: quia Galenus lib. de cibis boni, & mali succi cap. 10. & lib. de salubri diæta 29. asserit, corpora rara magis resolui: densa verò minus: ideo densa esse magis disposita ad ieiunium: rara verò minus: vbi enim multa est difflatio, ibi est multa resolutio, vbi est multa resolutio, ibi difficilius ieiunium ferri potest: quia vt dictum est à Galeno 6. de tuen. sanir. 6. cibus proportionatur difflationi.

Tertia conditio est consuetudo multi cibi. Hinc Galenus 1. ad Glauc. cap. de tertiana concedit oua, & carnes ijs qui multis cibis sunt assueti: quia ob prauam multorum ciborum consuetudinem minus apti sunt ad ferendum ieiunium: tantum enim potest consuetudo, vt Hippocrates 2. de ratione vic. in ac. tex. 23. ha-

beat hæc verba „ ter in die repleri, nihil mali si fuerint assueti.

Quarta conditio est regio calida, in qua multa fit difflatio.

Quinta os ventriculi validum, & non ita facile dissolubile, sicuti erat dissolubile illud Diodori Grammatici, qui ex Galeno lib. de venæ sect. ventriculo cibis vacuo existente, bilis os velicabat, & in epilepsiam statim incidebat: sumpto cibo, omne malum sumouebat.

Sexta conditio est vsus alimenti coctui facilis. Exemplum proponitur de Hispanis, qui in propria regione parum comedunt: in Italia verò & Germania, licet à mane ad vesperras cibum sumant, vix satiantur: causa est, quia in Hispania ob terræ ariditatem, vinum, & reliqua, quibus pro alimento vtuntur, sunt coctui difficilia: apud nos verò ob terræ humiditatem omnia sunt coctui facilia: quare apud nos Hispani ferre non possunt ieiunium. Idem dicendū est de alijs regionib. valde calidis.

Septima conditio est ætas puerilis, & decrepita, quorum corpora ad ieiunium non sunt disposita, vt dictum est superius.

Octaua: dum venæ sunt exinanitæ indicant corpora non esse ad ieiunium apta: ideo Galenus 2. de temp. 4. inquit, qui habent venas latas, & multum sanguinis, magis ferre possunt ieiunium, quam qui habent venas angustas: hinc Galenus 1. de ratione vic. in ac. comm. 44. & alibi dicit „ Qui habent vasa plena, & lata minus esse nutriendos, ergo tales apti sunt ad ieiunium.

Nona conditio est virtus facile resolutibilis, quæ ieiunium ferre non potest.

Decima conditio: illi sunt ad ieiunium inepti, qui pluribus laboribus, & exercitijs vtuntur.

**Q**Uo ad secundum, cur Hippocrates & Galenus fuerint adeo diligentes in dignoscendis ataribus, vt hic & abbi de hæc re egerunt. Ratio est, quia regula cibandi desumitur à vario temperamenti statu. Isti verò varij temperamenti status seu mutationes sensibiles sunt ipsæ atates. Temperamentum natiuum acquisitum in vtero matris est calidissimum & humidissimum:



idum verò nascimur, quotidie vsque ad obitum exsiccamur, & demum refrigeramur; quoties autem obseruatur aliqua sensibilis temperamenti mutatio, vnica constituitur ætas: sic pueri cum sint, & calidissimi & humidissimi constituunt hanc deteronnatam ætatem, vt sint ita resolubiles, vt nullo modo ieiunium ferre possint. Deinde sequuntur alię ætates, semper minus resolubiles, tum ob defectum humiditatis, tum caliditatis, vnde minor distatio. Præterea Medici ab ætatibus desumunt remediorum quantitatem: quia ex Galeno 9. meth. 14. tantum debet esse remedium, quantus est recessus à naturali statu, status verò naturalis varius est, prout variæ sunt ætates.

### Q V Æ S T. LII.

*De Aetatibus.*

**Q**uo ad ætates, nempe quæ sint, & quot sint. Primo sciendum, ætates certo annorum numero describi non posse: Galenus enim 3. præfag. comm. 28. habet hæc verba „ Non quilibet certo tempore explet dentes, pubescit, floret, aut declinat. Similiter Galenus 6. de tuen. sanit. cap. 2. inquit, vnā annorum mensuram cunctis non conuenire. Immo Aristoteles 7. Polit. cap. 17. damnat illos, qui ætates per septimanas diuidunt: ac merito, quia ætates variæ sunt prout varia est actio caloris in humidum substantificum. Hinc factum est, quod variæ traditæ sint ætatum diuisiones ab Aristotele, Hippocrate, Galeno, & Astrologis habita varia rerum consideratione.

Ab Aristotele: duæ traduntur ætatum diuisiones, prout vario modo corpora viuētia considerantur. Prima ætatum diuisio traditur 3. de anima tex. 59. vbi dicit tres esse ætates, nempe incrementem, consistentem, & decrescētem: habita hac consideratione, quod omne genitū habeat principium, statum, & declinationem, seu principium, medium, & finem: vel quia nutrimentum maius apponatur, vel æquetur, vel sit minus quam oportet.

Secunda diuisio proponitur ab Aristote-

le lib. de iuuentute, & senec. quæ est in duas ætates, videlicet in iuuentutem, & senectutem: quæ diuisio fuit Hippocratis lib. de salubri dieta tex. 7. habita hac consideratione, quia sub orbe lunæ omnia vel augentur, vel decrescunt: non enim datur status seu quies. Hinc nonnulli: vt Curcius, negant dari ætatem consistentiæ quoad sensum, sed solū dari quoad rationem.

Aliqui tamen subtiles parum in philosophia versati dicunt, dari ætatem consistentiæ, quia inter duos motus oppositos mediat quies.

Sed falluntur valde: quia hæc ætas consistentiæ esset momentanea, & per consequens chimerica. Præterea iuuentus, & senectus, non sunt motus oppositi: quia motus exsiccationis in viuētibz est continuus, & in motu continuo non mediat quies.

Ab Hippocrate parimodo duæ traduntur ætatū diuisiones: prima legitur in hoc aphorismo: & primo de dieta, lib. qui inscribitur brevis adnotatio dogmatū Hippocratis (referente Galeno) & lib. de natura humana, vbi facit quatuor ætates respondentes quatuor anni temporibus, quatuor humoribus, quatuor elementis, & quatuor diei partibus.

Prima ætas est puerilis, quæ responderet aeri, veri, sanguini, & horis matutinis.

Secunda est iuuentus, quæ responderet igni, ætati, bili, & horis meridiei.

Tertia est ætas consistentis, quæ responderet autumnō, melancholiz, terra, & horis vespertinis: senectus quæ responderet hyemi, pituitæ, aquæ & horis nocturnis.

Secunda diuisio traditur ab Hippocrate lib. de carnibus, & lib. de septimestri partu vbi ætates septenario numero distinguit.

Prima ætas est dum dentes fiunt, quæ consistit in primo septenario.

Secunda est pueritia, quæ consistit in secundo septenario, excurretque vsque ad annum 14.

Tertia est adolescentia: quam dicit excurrere vsque ad annum 21.

Quarta est iuuentus, quæ continet duas septimanas, producitque vsque ad annum 35.

Quinta est ætas consistentiæ, quæ simili-



ter continet duas annorum septimanas, & excurrit vsque ad 49. sexta est primum senium, quod parimodo continet duas septimanas, & producit vsque ad annum 63. Septima est vltimum senium quod vsque ad obitum extenditur.

A Galeno quatuor traduntur ætatum diuisiones.

Prima legitur lib. de salubri diæta, vbi diuidit ætates secundum diuisionem quatuor primarum qualitatuum.

Secunda ætatum diuisio habetur 2. de natura humana comm. 13. 14. & 15. vbi diuidit ætatem in incrementum, & decrementum: vt fecit Aristoteles lib. de iuuentute, & senectute, & Hippocrates lib. de salubri diæta.

Tertia diuisio proponitur à Galeno 3. aphorismor. comm. 30. vbi diuidit ætatem, in incrementem, consistentem, & decrepitem: deinde subdiuidit decrepitem cum manifesto virium lapsu, & sine manifesto virium lapsu, quam ætatem distinctionem desumpsit ab Aristotele 3. de anima tex. 59. eandem diuisionem Auicenna proponit in prima primi cap. de ætatibus.

Demum ætatum diuisio proponitur à Galeno in sex ætates.

Prima est pueritia, quæ ex lib. 6. de tuen. san. cap. 2. extenditur vsque ad annum quartumdecimum.

Secunda est pubertas, quæ ex Galeno 3. aphor. comm. 27. extenditur vsque ad annum decimumoctauum.

Tertia est adoleſcentia, quæ ex Galeno 5. aphor. comm. 9. durat vsque annu 25.

Quarta est iuuentus, quæ producit, vt docet Galenus 3. aphor. comm. 30. ab anno 25. vsque ad 35.

Quinta est ætas consistentiæ, quæ dicitur *αὐξητική*: dicitur quoque *καθ' ἑαυτήν*, id est constanti potius quam consistenti, vt nonnulli interpretantur: quia consistere potius pertinet ad ætatem iuuentutis, quam ad virilem.

Quod verò ætas consistentiæ non debeat vocari consistentiæ patet, quia à Galeno 3. aphor. 30. vocatur declinans: quomodo igitur erit ætas consistentiæ, & declinans? hæc certè implicat: potest dici constantiæ: quia constantia respicit potius animi,

quam corporis vires, virilis ætas profectò animi constantiam obseruat: hæcque ætas extenditur vsque ad annum 49.

Sexta est senectus, quam Galenus in hoc comm. diuidit in senectutem crudam, quæ vocatur senectus viridis, & in decrepitam, qui senes vocantur à Græcis *πρόμαλοι*, quæ vox significat senes ad pompâ funeralium accomodatos, præparatos, & bene dispositos atque orcho quameitissime demandandos.

Octaua dubitatio ex dictis oritur, quia in hoc comm. Galenus diuidit senectutem in viridem, & decrepitam, ita vt nihil dicat de secundo senio. Insuper Galenus 5. de tuen. san. cap. 4. & vltimo agens de geromica idest de illa medicinæ parte, quæ pertinet ad senes, subdiuidit ætatem decrepitam in duas partes: itaut senectus triplex sit, alia quæ dicitur cruda seu viridis, & dicitur primum senium, quod excurrit vsque ad annum 63. secunda senectus est media quæ continet duas septimanas, & dicitur senium, quod excurrit vsque ad annum 77. Tertia verò senectus est decrepita quæ à 77. vsque ad obitum producit: ergo Galenus in hoc comm. diuidens senectutem in viridem, & decrepitam est diminutus.

Respondere potest, mediam senectutem subtrixisse: quia hæc media modo vergit ad crudam, seu viridem, modo ad decrepitam: itaut sit media, seu neutra per participationem extremorum: vel dicimus fuisse in vsu apud Galenum, & Hippocratem interdum nominare solum extremas: quia media subintelliguntur.

Galenus tamen 5. de tuen. san. citato subdiuidit ætatem decrepitam in duas differentias, prout duplex est victus ratio: idque declarat exemplo Antiochi Medici senis 80. annorum, & Thelephi qui parum distabat ab anno 100. Ambo erant decrepiti: sed quia victus ratio erat diuersa: ideo diuersa debet constitui ætas decrepita.

Diuersa erat victus ratio in Anthiocho, & Thelepho: quia Antiochus (vt refert Galenus) quoridie utebatur balneo, Telephus solum bis vel ter in mense. Antiochus ante ientaculum egros vili-

visitando pedibus conficiebat quasi trium stadiorum spacium. Thelephus verò longè minori exercitio utebatur. Antiochus semper pisces saxatiles, vel illos qui in alto mari degunt, in prandio sumebat. Thelephus interdum pisces, interdum autem ex iure comedebat, itaut victus ratio erat diuersa, ob quam diuersitatem duplex ætas decrepita constituta est ab ipso Galeno.

Conueniebant isti duo senes (ait) quia ambo ante ientaculum fricabantur, prius aluo deiecta. Ambo hora tertia sumebant ientaculum ex melle atico cocto, panem, vel alcam sumendo: ambo hora septima habebant prandium, prius sumendo, quæ reddunt aluum lubricam, cuiusmodi sunt pruna damascena, Hispanica, vel mercurialis. Ambo (ait Galenus) in cæna non pisces, sed autem ex iure sumebant.

Denum sunt Astrologi, qui similiter faciunt septem ætates, vt refert Proclus, & Plotinus in lib. de anima, & daemone; ac vnicuique ætati attribuunt vnum planetam. Infantia attribuitur lunam, quia infantes, & luna sunt corpora humida.

Pueritiæ attribuunt mercurium magis inuentorem: quo tempore pueri tam multa cognoscunt naturalia, quod si in alijs ætatibus tanta perciperent, facti senes essent veluti Dij terrestres.

Pubertati, venerem, quia membra genitalia in hac ætate incipiunt fieri robusta. Hinc Aristoteles 3. de historia animalium cap. 14. ait „ hanc ætatem declarari vocis mutatione, testium magnitudine, & ortu pilorum circa pubem; tuncque incipiunt sæpissimè pudendis admouere manus.

Adolescentiæ perfectæ attribuunt solem: quia in hac ætate est magnanimitas, & animi splendor, in qua ætate, si pecuniæ essent in illorum potestate, profusè admodum impenderent.

Ætati vigoris attribuunt Martem: quia in hac ætate arma concupiscunt.


Ætati consistentiæ, quæ ab Hippocrate vocatur *habesentia* attribuunt Iouem: in hac ætate trahimur ad studium veritatis.

Senectuti dicunt præesse Saturnum: quia hæc ætas est frigida & secca, & per accensum humida: Ecce quod corpora nostra vario modo considerata ab Auctoribus

discinguuntur in varias ætates.

**C**ommoda tamen, & ex rei natura inuenta est ab Hippocrate in hoc aphorismo diuisio in quatuor ætates, nempe in senilem consistentem, adolescentem, & puerilem: quia victus ratio in qualibet ex istis debet esse valde diuersa, nutriendo semper magis illos, qui sunt proximiores primæ generationi, sicuti sunt pueri: deinde minus Adollescētes, atque minimè omnium senes, tam sanitatis, quam ægritudinis tempore.

#### APHORISMVS XIV.



**V**I crescunt plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento, alioquin corpus absumitur: senibus verò parum calidi innati inest, paucis propterea fomitis egent: quia à multis extinguuntur. Hanc etiam ob causam febres senibus non similiter acuta sunt, frigidum enim eorum corpus.

In hoc aphorismo Hippocrates reddit rationem, cur senes facillimè, & pueri difficillimè ieiunium ferant, quæ est: quia qui crescunt plurimum habent calidi innati, plurimoque egent alimento: itaut ex mente Galeni, & Philothei hic non sit nouus aphorismus: sed sit ratio precedentis.

Diuiditur aphorismus in duas partes. In prima reddit rationem, cur pueri difficillimè ieiunium ferant, dicendo, qui crescunt plurimum habent calidi innati: at sic est, quod qui plurimum habent calidi innati plurimum resoluunt, & qui plurimum resoluunt plurimò egent alimento: quia ex Galeno 6. de tuen. sanit. 6. & alibi, alimentum debet proportionari diffinitioni: quare si multa est difflatio, relictus cibibus, si pauca paucus conuenire debet. Plurimo



rimo egent alimento, quia plurimum resoluunt per insensibilem perspirationem, quæ perspiratio, ut probauimus in staticis longe magis euacuat, & resoluit, quam omnes euacuationes sensibiles.

In secunda parte reddit rationem, cur senes facillimè ieiunium ferant, quæ est, quia paucum habent calidi innati. Confirmat Hippocrates quod senes habeant modicum calidi innati: quia non ita facillè febricitant, ut iuuenes. Suffulta est hæc Hippocratis ratio hoc fundamento, nempe quod caliditas febrilis differat ab innata caliditate solum gradu, & non specie: secus vanissima esset Hippocratis ratio: quia si caliditas febrilis à caliditate innata differret specie, non valeret hæc cōsequentia: senes habent modicum calidi innati: ergo minus febricitant: quia, si caliditas natiua differret specie à febrili, senes possent multum febricitare, & modicum calidi innati habere, ac versa vice, posset quis plurimum habere calidi innati, & nunquam febricitare.

Quo ad verborum explicationem: dicit *qui crescunt*. Notandum per incrementum Hippocratem intelligere illud quod in qualibet corporis parte sit secundum tres dimensiones, quod certè primò pueris, deinde Adolescentibus conuenit: dum enim adulti fiunt pinguiore, & crassiores non verè augentur: quia non augentur secundum omnes dimensiones, videlicet secundum longitudinem, latitudinem, & profunditatem: ideo illa pinguedinis, & carnis augmentatio propriè dicitur iuxtapositio, & non augmentatio.

Immo si præter modum pinguedo crescat euadit morbosa, atque indicat suā ablationem: medici enim illam excedentem remedijs diminuunt, cuiusmodi est lenimentum ex oleo, auripigmento, & melle, quo abdomine illinito statim facultas generatrix ipsius pinguedinis diminuitur, sine tamen aliarum partium iactura.

Dicit (*plurimum*) quid intelligat Hippocrates per plurimum calidi innati non conuenient Expofitores.

Plurimi putant, Hippocratem intelligere in pueris esse plurimum calidi innati quo ad substantiam, sed non quo ad quali-

tatem & robur natiui caloris: quia vident in iuuenibus esse plus caliditatis, & plus roboris, quam in pueris.

Lycus (referente Galeno in comm. & libello aduersus Lycum) reprehendit Hippocratem, probatque triplici argumento esse in iuuenibus plus calidi natiui, quam in pueris, hoc modo: Hippocrates vel intelligit per plurimum calidi natiui plurimum secundum substantiam, vel secundum qualitatem, vel secundum robur: addit: sed in pueris neque est maior substantia calidi natiui, neque intensior qualitas, neque maius robur quam in iuuenibus: ergo pueri nullo modo habent plurimum calidi innati, ut tenet Hippocrates.

Primum argumentum quo probat Lycus, in pueris non esse copiosiorē substantiam calidi innati, est, quia in maiori corpore calido est copiosior caloris substantia, quam in minori: infert: ergo in iuuenibus, quorum corpora sunt maiora, erit plus calidi innati, quam in pueris.

Secundò probat de qualitate: ex eo quia sensu patet, iuuenes esse calidiores, ad motum vegetiores, & cibos concoquere duriores, quam pueros. Additur, Hippocratem errare in voce: quia qualitates non dicuntur plurimæ, vel paucæ, sed intensæ, vel remissæ.

Tertiò probat de robore: quia iuuenes sunt robustiores, quam pueri.

Addit Lycus, Hippocratem similiter errare in voce, quia esto, quod puerorum robur maius sit, non debet dici plurimum, sed validum: & quia validum robur non consistit in plurimo calido, sed in maximè temperato: Ergo non rectè Hippocrates: dum dixit qui crescunt plurimum habent calidi innati.

Ad primum argumentum Lyci dicentis, in pueris non esse copiosiorē substantiam calidi innati: quia eorum corpora sunt minora.

Primò respondemus ex Galeni comm. distinguendam esse caloris substantiam, quod videlicet alia sit substantia natiui caloris, alia ascititij: substantia natiui est ærea, & aquea: hæcque maior est in pueris, ascititij verò est terrea & ignea, quæ certè maior est in iuuenibus, & longè maior in febrili.



febricitantibus. Hac posita distinctione dicimus, Hippocratem in aphorismo intelligere de nativa, non de ascititia; quare qui non distinguunt nativum ab ascititio non loquantur de calore: quia à nemine intelliguntur.

Dum dicunt in maiori corpore calido esse copiosorem calorem nativum: argumentum valeret, si dum corpora augentur, eodem modo etiam nativus calor cresceret: utinam hoc esset: tantum enim abest quod nativus calor suscipiat augmentum, ut quotidie magis decrescat, & magis ascititius fiat. Hinc Galenus 2. de temp. 2. ait „ animal recentem editum esse calidissimum intelligendo de nativo calore: deinde in dies magis nativum fieri actem, & semper decrescendo progredi: ideo Galenus in comm. loquens de nativo, ait pueros habere calorem abundantior: iuvenes verò actiorem.

Præterea ridicula est hæc consequentia: corpus calidum est maioris molis: ergo est calidius corpore calido minoris: quia in minori corpore potest esse calor abundantior, quam in maiori, quod non solum est verum in corpore mixto, sed etiam in simplici: sic in dolio vini generosi potest esse calor abundantior, quam in magno dolio vini oligophori: parimodo nativus in pueris est abundantior, quam in adultis.

Insuper Galenus lib. aduersus Lycū cap. 7. confirmat exemplis pulcherrimis in pueris esse copiosorem calorem, quam in iuuenibus. Primum exemplum est de tetrapharmaco, taleque est: si aliquis medicamento tetrapharmaco, quod ex cera, adipe, pice, & resina equa portione conflatur, duplum picis aliorum proportionem indat, certè in tetrapharmaco erit plus picis, non solum quoad substantiam, sed quoad qualitatem, & robur.

Secundum exemplum est de medicamento composito ex Aristolochia: ait Galenus si in medicamento ex Aristolochia facto ex thure, mirra, farina orobi, esset aristolochia in longe maiori copia, certè sine ulla hæsitacione in hoc medicamento esset plurimū aristolochiæ quoad substantiam, qualitatem; & robur. Parimodo in pueris calidum nativum non solum ad aliarum

proportionem erit plurimum quoad substantiam, qualitatem, & robur, sed etiam absolutè intelligendo de aerea substantia, quam immediatè temperamentum essentialiale insequitur.

Ad secundum Lyci argumentum, quod erat iuvenes sunt calidiores pueris: quia sunt ad motum vegetiores. Respondemus concludere de calore ascititio acti, mordaci, & igneo; sed nō de nativo suavi & temperato: itaque non debemus confundere nativum calorem cū ascititio, ut Lycus faciebat, secus cogeremur fateri febricitantes habere abundantior calorem nativum, quam pueros inculpati sanitate præditos.

Præterea si pueri habent calidi innati substantiam abundantior, ut probatum est, habebunt quoque illas qualitates, quæ necessario dependent à substantia, ipsamque necessario comitantur, vegetiores.

Galenus in hoc comm. susa oratione declarat differētiā inter calorem nativum, & ascititium, dicens, nativum habere suaves euaporationes similes illis, quæ sunt ex aqua tepida: ascititium verò habere euaporationes mordaces illis similes, quæ eleuantur è corpore sicco excalesceto, sicuti à ferro ignito, & alijs similibus ignitis rebus in commento Galeni propositis.

Hinc calor nativus magis concoquit, & magis resolvit in pueris, quam in adultis; quia eorum corpora sunt calida & humida, taliaque certè non habent iuvenes. Pro huius doctrinæ confirmatione pergit Galenus in commento dicens, de ratione euaporationis duas requiri conditiones, altera quod corpus sit calidum: altera quod sit humidum, & non siccum, quia halitus seu vapores non eleuantur à sicco, quod his verbis Galenus in comm. confirmat „ si ad solem ardentem aquam & ferrum pari pondere exponas: deinde sequenti die perpendas aquam, & ferrum, inuenies aquam multo seipsa minorem effectam: ferrum verò pristinum pondus conservare: inde quoque apparet, pueros esse calidiores & humidiores intelligendo de calore nativo, cuius essentia præcipuè consistit in temperatura calida & humida, & non in illa calida & sicca, quam possident iuvenes.



Dum dicunt, iuuenes esse vegetiores ad motum.

Respondemus motum velocem à calore igneo, & ascititio provenire: sic maniaci sunt ad motum vegetiores ratione caloris acris, & mordacis, & non natiui, qui consistit in calido & humido temperato.

Ad Lycū dicentē, iuuenes esse calidiores pueris, quia magis concoquūt cibos duros.

Respondemus Lycum, & qui illum sequuntur, non intellexisse differentiam inter coctionem, & digestionem: admitimus iuuenes magis digerere cibos duros: pueros verò magis concoquere: concoctio quidem est mutatio vnius substantiæ in aliam, vt lactuca in sanguinem, & sanguinis in ossa: digestio verò non est mutatio, sed est solum delatio, seu transmissio cibi vel alimēti ab vna ad aliam partem. Hinc Galenus 12. meth. cap. 3. tradens aliquam differentiam inter coctionem & digestionem, inquit coctionem fieri per somnum, digestionem verò per vigiliam: dicit coctionem fieri per somnum: quia per somnum calor dispersus per sensiteria retrahitur, ad imas partes, & cum calido innato viscerum vnitur, & geminatur, ac ita geminatus tantæ est virtutis, quantæ possit substantias transmutare: dicit digestionem fieri per vigiliam, quia in vigilia calor influens seiunctus ab innato non potest quidem conuerttere, vel transmutare cibum in chylum, & chylum in sanguinem: potest tamen digerere, seu transferre, vel transmutare alimentum ad venas, & à venis ad partes nutriendas, & excrementa foras expellere.

Quod verò pueri sint calidiores, & magis concoquant, facile colligi potest ex incremento, quod maximam supponit præcedere concoctionem: ideo Galenus 1. de Usu P. 7. dicit, pueros ob incrementū valde concoquere, quod in adultis non fit. Quomodo verò pueri magis concoquant, quam iuuenes, nos satis superque ostēdimus contra Conciliatorem quæst. 57. in commentarijs nostris in primam primi Auicennæ.

Ad tertium Lyci Argumentum probans, pueros quo ad robur nō habere plurimum calidi innati, ex eo quia iuuenes sint longè robustiores pueris.

Respondemus Hippocratem loqui de illo robore, quod solum provenit à calido natiuo, quod maximè obseruatur in concoctione, & augmentatione, quæ duæ actiones sūt maximè omnium difficiles, & quæ in pueris sunt longè calidiores, quam in iuuenibus.

Quod verò iuuenes ex Lyco sint robustiores:

Respondemus quo ad motum voluntarium esse robustos; tum quia eorum instrumenta ad motum destinata sunt vnde quaque perfecta, quæ in pueris adhuc non sunt stabilia: tum quia motus voluntarij iuuenum non parum iuuantur à calore ascititio, quales interdum obseruantur in phreneticis, qui paulo ante obitum possunt efficere motus ita validos, vt vix plures homines sani, & robusti, possint vnum phreneticum sternere, & insrenare. Ecce igitur quam vana sit hæc consequentia, motus sunt validiores: ergo plurimum habent natiui caloris.

Insuper vbi plurimum est substantiæ calidi natiui, ibi certè erit plurimum qualitatis, & roboris ipsius calidi natiui: Sed in pueris, vt probatum est ex Galeno libello citato exemplo terrapharmaci, & medicamenti ex aristolochia plurimum est quantitatis substantiæ: ergo erit quoque plurimum illius qualitatis, & roboris.

Præterea, vbi actiones caloris sunt validiores, & efficaciores, ibi quoque caloris robur est validius, & efficacius: sed in pueris actiones caloris sunt huiusmodi, quia in ipsis est vna augmentatio, quæ superat oēs alias actiones: hæc certè non est in adultis.

Demum in puoris omnia membra sunt sanguinea: in senibus verò exanguia: quare si oppositorum eadem est disciplina, vt videlicet senes, quo magis sunt exanguies, eo magis sunt & calore, & robore destituti: ergo pueri quorum membra maximè omnium sunt sanguinea, plurimum habebunt calidi innati, & quo ad substantiam, qualitatem, & quo ad robur.

Accedit, quod illi sunt calidiores, qui sunt proximiores fonti caloris: ideo Galenus 2. de temp. 2. animal recenter editum est calidissimum: idcirco pueri omni modo sunt calidiores iuuenibus, nempe quo ad substantiam, qualitatem & robur.



Ex his colligimus Hippocratem non errasse in re, ut Lycus temerè imprudenter, & sine ulla ratione attribuit Hippocrati dicenti qui crescunt plurimum habent calidi natiui.

Præterea Lycus in errorem venia indignum prolabitur, dicens, Hippocratem errasse quoque in voce, dum vsus est hoc vocabulo (plurimū) quia hæc substantiæ calidi innati, nec qualitati, nec robori applicari potest: non substantiæ: quia hæc vox plurimum pertinet ad quantitatem: non ad qualitatem: quia qualitas dicitur intensa, vel remissa, non plurima, multa vel pauca: non ad robur, quia robur dicitur validum, vel inualidum, & non plurimum, vel paucum. Insuper robur plurimum dependet à calido maximè temperato, & non à plurimo: inquit Lycus, Hippocratem abusum fuisse vocabulo, & errasse in voce.

Sed vnicæ responsione hæc Lyci obiecta tolluntur à Galeno in comm. dicente, quod tempore Hippocratis: ut refert Teophrastus, in lib. de calido & frigido fuerit maximè in vsu, quod calidum dicitur plurimum, vel multum, vel paucum, tam referendo ad quantitatem substantiæ calidi, quā ad qualitatem, & robur: ideo cōmunis vsus loquendi nō erat ab Hippocrate relinquendus: quia Auctores debent uti vocibus, quæ sunt in vsu, & quæ faciliè intelliguntur: sic & Nos loquentes de ægritudinibus, quæ pertinent ad qualitatem dicimus esse magnas, vel parvas: sic dicimus apoplexiam esse magnam, vel parvam, & omnes alios morbos esse magnos, vel paruos, quamuis morbi sint qualitates & non quantitates, similimodo de robore, seu virtute, dicimus esse magnam, vel parvam, finitam, vel infinitam: quamuis omnis virtus sit qualitas, & non quantitas.

Præterea ut omninò rejiciatur Lycus. Respondemus quod licet (plurimum) significet quantitatem, attamen applicari potest substantiæ, qualitati, & robori. substantiæ: quia in prædicamento substantiæ genus generalissimum est corpus generabile: qualitati, & robori, quia ex communi vsu loquendi virtus potest dici multa, & plurima: licet virtus sit qualitas: ergo potest dici robur quoque plurimum: qua-

re Hippocrates neque in re, neque in voce errauit.

Cæsar Cremoninus in Patauino Gymnasio celeberrimus partim laudat Lycum partim damnat. laudat dum contradicit Hippocrati dicenti, quod in pueris sit plurimum calidi innati sumendo calidum pro ratione substantiæ: quia vñ cum Lyco tenet in maiori corpore esse maiorem calidi substantiam, colligitque in adultis, & non in ijs qui crescunt esse plurimum calidi innati ratione substantiæ.

Laudat quoque Lycum, quod dicat calidum sumptum pro qualitaris intensione esse maius in iuuenibus, quam in pueris; quia iuuenes sunt ad motum vegetiores, & res duras magis concoquunt.

Damnat Lycum dicentem, Hippocratem errasse in re, & in voce: si intelligat per plurimum calidi, quod pueri quo ad robur habeant plurimum calidi innati, & sint robustiores iuuenibus. In re, quia robur plurimum consistit in maximè temperato calore, & non in plurimo. In voce, quia abutitur vocabulo plurimum: quia nō dicitur plurimum robur: sed validum robur: in hoc (Cremoninus defendit Hippocratem: & rectè: quia tempore Hippocratis (ut refert Galenus in hoc comm. ex Teophrasto) hic modus loquendi nimirum plurimum robur erat vocabulum vsitatum. Similiter Aristoteles, ut dictum est, vocat virtutem finitam, vel infinitam, quare dici potest plurimum robur: eadem ratione Cremoninus poterat laudare Galenū quod posset dici plurimū ratione qualitatis, quia & ipsa virtus est qualitas.

Quod verò Hippocrates dum dicit, qui crescunt plurimum habent calidi intelligat solum de robore, seu de vi agendi, & non de substantia, & qualitate calidi, probat Cremoninus hoc modo: Dicit Hippocrates, qui crescunt habent plurimum calidi: ideo egent plurimo alimento, alioquin corpus absuitur. Addit sed sic est quod illud absūmī pertinet ad robur agēdi, non ad qualitatem, quasi quod robur, seu virtus non sit qualitas: nos quærimus ab illo, cur illud absūmī non pertinet quod ab substantiam. Immo magis propriè ad substantiam: quia substantia est illa,



la, quæ absumitur, & ipsa qualitas quatenus necessarius subiectum comitatur.

Præterea comprobatur, quod intelligat solum de robore agendi ex sequentibus verbis, quæ sunt, *senibus inest parum calidi: ideo paucis egent succendiculis: quia à multis extinguitur.* Infert Cremoninus: sed sic est, quod ista extinctio nihil aliud est, quam actionis impedimentum.

Ego respondeo, quod illa extinctio nihil aliud est quam substantiæ, qualitatis, & tandem roboris amissio, itaque ex fundamentis ipsius colligimus, Hippocratem per plurimum calidi principaliter intelligere quo ad substantiam, ut dicit Galenus in comm. consecutus verò intelligere quo ad qualitatem, & robur nativi caloris, quæ omnia satis superque probauimus contra Lycum, neque est, ut eadem in hoc loco repetamus.

*Plurimo igitur egent alimento.* Quatuor possunt esse causæ, cur pueri copiosiori egent alimento.

Prima quia eorum caliditas, quæ maxima est, maximè quoque in humidum agit, illud resoluendo, & exsiccando. Accedit quod calidum innatum habet duplicem motum; vnum deorsum versus alimentum gratia conseruationis seu noui ignis generationis: alterum sursum ad instar flammæ: vterque in puero est velocior: ideo copiosiori eget alimento: quia in motu velociori velocius absumitur alimentum.

Secunda causa est perpetuum alimentalis substantiæ effluuium, quod in pueris maximum est, tum ratione caloris, tum ratione humidi aerei maximè resolubilis: ob quam causam Galenus 9 meth. 17. ait, pueris non conuenire euacuationem artificialem, quæ fit per medicamentum, & per sanguinis missionem: quia eius insensibilis perspiratio quam maxima est, ut nos quoque in staticis probauimus. Hinc Galenus in comm. proponit duas causas diffilationis, nempe caliditatem, quæ sola reuera non sufficit: quia ait in commento, ferrum ignitum habere inrensam caliditatem, tamen non efficere diffilationem, vel perspirationem insensibilem: quia ex ferro ignito non eleuantur vapores, si eleuaretur aliquid amitteret sui ponderis, & fieret leuius: ideo proponit secun-

dam causam, quæ est humiditas, quæ maxima est in pueris, ob quam causam maiorem habent diffilationem, & inde egent copiosiori alimento: Galenus enim 7. de tum. sani. 6. vult alimentum proportionari diffilationi, ac quantitatem nutritionis à quantitate diffilationis coincideri.

Tertia causa, cur pueri egent copiosiori alimento, est, quia maximè augentur.

Quarta est, quia magis concoquunt, ac merito quia concoctio est elixatio, & elixatio fit à calido & humido, non à calido, & sicco.

*Alioquin corpus absumitur.* calor quinque modis consumitur, videlicet à nimio calore: vnde Hippocrates 2. Prognost. 1. à febre acuta hydrops. A defectu alimenti. A frigido potuiuo. A frigido potentiis, ut ab opio, & à suffocatione ob nimium alimentum: sed ex Aristotele libello de vita & morte caloris extinctio ad duos modos reducitur: primus modus est per resolutionem: secundus per suffocationem: si pueri non tractarentur copioso alimento, calor ageret in adipem: deinceps in carnosam substantiam, & tandem in membranofam: hac ratione per resolutionem rabescerent, & interirent.

*Senibus verò parum calidi innati inest: paucis propterea fomitis egent.* Inest senibus caloris parum: quia eorum humiditas nativa, quæ est caloris subiectum, est ferè resoluta seu exsiccata ab ipso calore: Calor enim innatus ex Philotheo semper in agendo est occupatus, id est in absumendo humidum, ideo in senibus non solum est parum caloris, sed etiam parum humiditatis propriæ & nativæ: sed cum qualitas actiua non exhalat sine passiva, nec passiva sine actiua: ideo vtraque magna ex parte in senibus exhalauit: propterea in ipsis parum inest caloris nativi quo ad substantiam, qualitatem, & robur.

Deinde senes egent paucis fomitis, seu alimentis: quia sicuti exiguus lucernæ ignis olei multitudine facile extinguatur: sic senum calor multis cibis facile extinguipotest.

Hippocrates in hoc aphorismo tangit duas causas mortis senum: altera quæ fit per resolutionem humidi: dum dicit 2.



alioquin corpus absūmitur: altera quæ sit per suffocationem caloris, dum dicit, quia à multis cibis extinguitur: senes verò sunt proximi mortis, tum ratione pauci caloris, cum suo exiguo humido nativo facile resolubili: tum ratione suffocationis: immo si credendum est Aristoteli lib. de vita, & morte cap. 14. senes ultimi senij moriuntur omnes per suffocationem & non per resolutionem; habet enim hanc sententiam, senum instrumenta inspiratio, ni destinata adeo exsiccantur, ut non possint eleuari: vnde fit quod ille paucus ignis per suffocationem marcescat.

Quod verò in senibus sit exigua substantia calidi innari, exigua qualitas, & exiguum robur, declaratur à Galeno & Marfilio Ficino pulcherrimis exemplis.

A Galeno lib. aduersus Lycum, ubi proponit hoc exemplum. Accipitur doliū, & cyathum aqua plenum, in utroque sit uncia meri, dicimus eandem esse quantitatem vini in doliō, & cyatho: dicunt tamen in cyatho esse plus substantiæ, plus qualitatis & roboris vini, quam in Doliō: sic in senibus calor nativus est veluti vini uncia, quæ est in doliō aqua pleno: ideo exiguus est in substantia, qualitate, & robore. Hoc exemplum inseruit Manardo, & Nonnullis alijs asserentibus, calidum implantatum totum conservari usque ad obitum, eiusque substantiam non minui, sed reddi aquosam, ut in senibus. Nos verò credimus calidum nativum minui, eo modo, quo oleum in lucerna.

A Marfilio Ficino in Athlantico Platonis proponitur hoc exemplum: si esset dolum mero refertum; & multoties in die vini ephiala extraheretur, & vicium per foramen supernum alia aqua ephiala infunderetur, certè brevi spatio vinum redderetur pauxillum in substantia, qualitate, & robore. Id potest applicari calido innato puerorum, & senum; calidum puerorum erit vinum merum: senum erit vinum dilutum. Hoc exemplum inseruit illis, qui putant, calidum nativum non conservari tale in quantitate usque ad obitum, sed semper minui.

*Hanc etiam ob causam febres senibus non æquè acuta accidunt: quia eorum corpus est*

*frigidum.* Circa hæc verba Hippocratis primò est notanda causa, cur senes non ita febricitent, ut iuvenes, quæ est, quia corpus senum est frigidum: ideo dum senes febricitant, ut plurimum moriuntur, quia causa, cur in febres incidunt sunt vehementissimæ: at sic est, quod causæ vehementissimæ citius senes, quàm iuvenes, extingunt.

Secundò notandum, in pueris calorem esse ita copiosum, ut raro dum febricitant, partes extremæ diu frigida conserventur, ut in senibus: quando verò manent diu frigida in pueris, ut plurimum moriuntur.

Tertiò notandum: Hippocratem per hoc exemplum de febribus intelligere de qualitate calidi nativi, non de substantia: quia febris non pertinet ad substantiam calidi nativi, sed ad eius qualitatem: substantia sanè ex se est inalterabilis usque ad obitum: non est capax alterationis: minui tamen potest. Ad quam verò qualitatem pertineat febris infra declarabitur. Sed circa aphorismum in gratiam adolescentium varia dubia proponuntur.

Prima dubitatio: iuvenes sunt calidiores pueris: ergo pueri, qui sunt illi, qui crescunt non habent plurimum calidi innati: probatur antecedens: quia iuvenes sunt vegetiores ad motum: ergo calidiores.

Responderetur, in pueris instrumenta ad motum non esse adhuc stabilia, & perfecta.

Secundò, responderetur, plurimum calidi desumi ab actione calorifica omnium difficillima, quæ est augmentatio, & non à motu, quippe qui potest quoque fieri validissimus ab asciticio calore, sicuti in maniacis, & phreneticis interdum observatur.

Secunda dubitatio: adulti magis concoquant res duras, quam pueri, qui crescunt: ergo adulti, & non qui crescunt, erunt calidiores.

Respondemus, adultos magis digerere: pueros verò magis concoquere: concoctio est transmutatio substantiæ: digestio est transmissio alimenti à ventriculo ad iecur, vel ad intestina, vel ad cutem, & deinde in ambientem aerem sine substantiæ transmutatione. Præterea ex Galeno lib. 1. de fac. lib. cap. 1. nonnulli citius digerunt bubulam carnem, quam pisces saxatiles ob hanc acrem & mordacem in ventriculo



existentem: talis certè in pueris non inuenitur, vt in adultis.

Tertia dubitatio: Hippocrates dicens, qui crescunt habent plurimum calidi, facit transitum de genere in genus: quia plurimum pertinet ad quantitatem: calidum verò ad qualitatem, vel substantiam (vt dicit Galenus in comm.) ergo damnandus Hippocrates.

Respondetur ex Galeno in comm. quod hic modus loquendi plurimum calidi erat maximè in vsu tempore Hippocratis. Parimodo Galenus lib. 1. de diff. feb. cap. primo habet hæc verba, medici vocat febrem magnam, vel paruam non propriè nomen quanti accommodantes, hæc tamen facere sunt assueti non in febribus tantum, sed in mille alijs rebus. Similiter apud Nos inualuit vsus, dum dicimus, morbus est magnus, vel paruus: magnus & paruus pertinent ad quantitatem: morbus verò ad qualitatem. Præterea, responderetur, per calidum intelligere quoque substantiam, vt probatum est: substantia verò sequitur molem: ideo in prædicamento substantiæ constituitur corpus generabile, & corruptibile pro genere generalissimo: ita ut omnia quæ sunt in recta linea prædicamenti substantiæ sint corporæ, & per consequens dici possint magna, parua, multa vel plurima.

Quarta dubitatio, si qui crescunt habent plurimum calidi, vel haberent plurimum ratione substantiæ, vel ratione qualitatis, vel ratione roboris: sed sic est, quod nullo modo potest dici plurimum: quia plurimum pertinet ad quantitatem.

Responsio tradita est superius, quia hoc est argumētū Lyci satis superque solutum.

Quinta dubitatio: non videtur, quod pueri egeant copiosiori alimento, quam iuuenes, quia iuuenes duplo magis, quam pueri comedunt.

Respondetur, pueros indigere copiosiori alimento habita relatione ad suum corpus: si enim iuuenes haberent calidum natium puerorum, duplo magis comederent.

Sexta dubitatio: si qui crescunt haberent plurimum calidi innati, & adulti haberent minus calidi, sequeretur quod cali-

dum innatum, quod ex ipso Galeno est substantia, susciperet magis, & minus, quod est contra præcepta Aristotelis dicentis, substantiam non suscipere magis & minus.

Respondetur dum substantia est plurima, non propterea est magis substantia, Elephas enim non est magis substantia, quam formica, licet elephantis substantia plurima sit, & formica sit admodum pusilla.

Septima dubitatio: iuuenes tactui calidiores occurrunt: ergo non qui crescunt habebunt plurimum calidi, sed adulti.

Respondetur in pueris calidum esse plurimum respectu caliditatis aeræ: in iuuenibus verò qualitatis igneæ, & ascititiæ. Respondet quoque Galenus: plurimum calidi esse in pueris habita proportionem corporis puerorum ad corpus iuuenum: si enim in iuuenum corpore duplo maiori, quam sit corpus puerile, calidum natium esset duplo magis, quam in pueris, non cessaret corporis augmentatio, corporaque iuuenum magis auerent. Demum si plus calidi innati essent in iuuenibus: quia habent calorem mordaciorem, sequeretur, quod in febricitantibus esset plus calidi natui quam in pueris sanis.

Sed pro intelligentia aphorismi varia occurrunt considerata. Primum quid sit calor innatus, nimirum ex quibus principiis fiat, an sit substantia, vel accedens: an sit corpus mixtum, an sit cælestis vt Fernelius. An differat specie, vel gradu ab ascititio: de subiecto caloris febrilis: de influente. Postremò cur calor natius productus gratia conseruationis nos perducat ad mortem, & de causis mortis.

#### Q V Æ S T. LII.

##### De calidi innati principijs.

**G**alenus s. simp. cap. 8. vult confundi calidum natium cum spiritu innato, & humidum radicale cum humido seminali. Insuper in hoc comm. & libello aduersu Lycum asserit, hoc calidum innatum fieri ex semine, & sanguine menstruo: in plantis in metallis, & alijs mixtis dicimus fieri ex illis principiis, quibus semen,



men, & sanguis menstruus aliqua proportionem respondent: corrupto calido innato, mixta corrumpuntur, quia à calido innato mixtorum essentia dependet.

Neque Galenus principia communia calidi innati ignorauit, vt quidam putant quia si loquamur de principijs similaritatis, cuius essentia reuera est calidum innatum, Galenus satis superque quarto simplicium cap. 2. intellexit: ibi enim asserit quod frigidi proprium sit contrahere, & condensare: calidi fundere, & liquare: deinde similia congregare. Parimodo 17. de Viup. cap. 14. habet hæc verba „ Frigus corpus densat, cogit, & constringit, prohibetque, substantiæ defluuium: calor verò contra, corpora rarefacit, liquat, tenuat, ac digerit. Idem confirmat Hippocrates 3. epid. 6. tex. 24. Hæc certè sunt principia communia, quibus sit similaritas: quare nescio qua ratione dici possit, Galenum ignorasse innati caloris, vel similaritatis principia communia.

Neque ignorauit Galenus in omni mixto esse calidum proprium, quo corrupto mixtum corrumpatur. Secundo enim de temp. cap. 6. dicit, quod omnia, quæ putrescunt, aduentitio calore sint calida, proprio verò calore sint frigida. Aristoteles verò 4. Meteorum cap. 2. defectum natiui caloris appellat frigus, & statim concludit, putrefactionem esse communem passionem frigiditatis propriæ & caliditatis alienæ: ex his colligimus Galenum rectè intellexisse, non solum hominem, sed omnia mixta habere calorem innatum: illudque distinctum ab aduentitio. Valeant igitur, qui sequuntur Lycum dicentem in maiori corpore calido esse plus calidi natiui, cum interdum sit plus natiui interdum plus aduentitij.

Præterea Galenus non ignorauit calidum esse præcipuum agens: frigus verò attemperare: ac humidum esse tamquam glutem. Parimodo Aristoteles 2. de generatione 49. ait, terram sine humido non posse consistere: sic Auicennas, qui proficitur esse Galeni interpretem, inquit in prima primi loquens de terra, siccum terreum concurrere ad retentionem, & fixationem, vt videlicet partes mutuo se comprehen-

dant, & figuras custodiant. Neque ignorauit Galenus quomodo elementa veniant ad mixti compositionem, videlicet per mutuum actionem, & passionem: quomodo duæ qualitates sint actiue, & duæ passiuæ, vt declarauimus ex Galeno in comm. nostris artis paræ: quomodo in plantis, & in his, quæ ex putri fiunt, sit aliquod proportionale semini & sanguini menstruo, & aliquid proportionale hepatis, & ventriculo, quod est in radicibus, per quas dispensatur alimentum in omnes surculos.

Neque demum ignorauit, cor esse fontem caloris actualis, seu vitalis, qui per totum corpus diffunditur, discrepans tamen in hoc ab Aristotele, vt declarat Auerroes 3. coll. cap. 2. vbi loquens ex sententia Philosophi de calore cordis habet hæc ferè verba „ calor qui transmittitur à corde ad iecur, & ad nonnullas alias partes est sicuti forma partium: calor verò innatus istarum partium est sicuti materia. Medici verò totum oppositum cum Galeno tenent, nimirum calorem cordis esse materiam, seu pabulum caloris innati ipsarum partium similarium: calorem verò harum partium esse sicuti formam, à qua omnes operationes dependent: quare à Peripateticis valde discrepant: quia Peripatetici tenent, omnes calores à corde provenire: Galenus verò negat, calidum innatum, & implantatum à corde prodire: ideo in arte parua cap. 9. dicit, partes aliquas nostri corporis ex se ipsis, & non à corde habere regimen: neque indigere arterijs, & venis, nisi pro vita diuturniori, quatenus calor cordis efficitur pabulum innati ad meliorem vitam.

Idem confirmat Galenus 1. de loc. aff. cap. vlti. quod scilicet facultates naturales sint connatæ, & à corde non proueniant.

Hæc Galeni opinio cõfirmatur experientia: quia in syncope partes corporis priuantur calore influente cordis, tamen viuunt per suum calidum innatum, quod à corde non venit: sic mulieres ystericæ interdum adeo præfocantur, vt credantur mortuæ, & viua sepeliuntur: viuunt tamen per suum calidum innatum, & non per calorem cordis: quia tunc neque arteriæ pulsant, neque cor palpitat: ideo



Galenus & communia, & particularia intellexit, & melius fortasse quam Peripatetici: quare dum præclarus Philosophus reuerenter contra Galenum inuehitur: hæc reuerentia seu modestia est superflua: quia in hoc proposito non habet locum.

### Q V Æ S T. LIII.

*An calidum innatum sit solus calor temperamenti.*

**Q**uo ad naturam calidi innati prius sciendum, calidum innatum aliud esse quod Galenus lib. aduersus Lycum cap. 7. appellat *ἀρχήγονον*, idest principale, idest primo, & immediatè genitum ex semine, & sanguine menstruo, quod calidum innatum in prima constitutione ex Galeno in comm. sequenti omnia membra efformat.

Parimodo Auicennas de hoc calido loquens doctrina sexta cap. 2. primæ sen. dicit in ipso esse duas virtutes, vnam, quam vocat immutatiuam, in qua residet alteratrix, quæ est illa, quæ omnibus membris præbet temperaturas: vocatur immutatiua, quia immutat semen in neruos, in membranas, & in alias partes similes: aliã verò virtutem dicit esse ipsam formatricem: quæ non dat temperaturas, sed compositionem, videlicet figuras, situs, meatus, & numerum.

De hac formatrice egimus quæst. 117. in commentarijs nostris Auicennæ, vbi proposuimus nouem opiniones de formatrice: tandemque ostendimus & alteratricem, & formatricem à calido innato archigono prodire, quod vivit, & est vitæ principium: nec valet in vtero non est organicum, ergo non vivit: quia in vtero vivit vita matris effusa per vasa umbelicalia: dum verò membra, quæ adnascuntur fiunt perfecta, tunc solum vita cordis ipsius fetus vivere incipiunt. Qui sunt in Anatomia viuorum brutorum fixum gestantem versati, de hac re non dubitant.

Nerui, membranz, & cæteræ partes similes, quæ immediatè fiunt à semine, & sanguine menstruo, genitæ sunt cum suo calido innato, quod non est archigonon:

quia hoc caret virtute generandi, & efformandi de nouo alias partes: cor enim robustissimum non potest de nouo efformare partem, quamvis vilem, & paucillam: differt enim hoc innatum partium genitarum ab archigono, vt filius à patre: loquès igitur Galenus in comm. sequenti de calido innato quatenus prædicatur de innato pendente immediatè à semine, & innato partium seminalium, habet hæc verba. Nec aliud quicquam ab initio efformauit animal, adauxit, & ad mortem vsque nutrit, quam calor innatus, qui est omnium operationum opifex. Idem confirmat 8. de plac. cap. 6.

Præterea Galenus primo ad Glauc. cap. 2. vocat ipsum calidum innatum substantiam ipsam, his verbis „ natus calor, vt nonnulli Philosophi, & summi medici putant, existit substantia virtutum: aut saltem primum, & maximè necessarium instrumentum: ac merito, quia Galenus in hoc comm. & 1. de temp. cap. 6. ait „ calidum innatum significare non nudam qualitatem: sed subiectum, & qualitatem simul: sic Aristoteles in prædicamēto qualitaris dicit, album significare qualitatem, & subiectum: sic nos per calidum non intelligimus calorem solum: ergo calidum innatum non erit solus calor temperamenti: itaque calidum innatum non erit simplex qualitas calida, sed erit mixtum ex quatuor elementis: quia subiectum, ex quo fit, mixtum est: fit ex semine, & sanguine menstruo: sanguis menstruus ex Galeno primo de tuen. sani. cap. 2. respectu seminis est frigidus, & humidus: semen vero respectu sanguinis menstrui est calidum, & siccum. Hinc dum huius mixti pars terrea absorbitur, remittitur per cibum, dum aquea per potum, dum aerea, per inspirationem; dum ignea, per pulsum: ergo mixtum est, ergo non erit solus calor temperamenti.

Patet quoque ratio, calidū natium esse quoddam mixtum: quia vt docet Galenus in comm. sequenti, & alibi, edit omnes operationes: addimus Nos minorem; sed sic est quod operationes sunt suppositorum, vt docet Aristoteles 2. de anima tex. 24. quod suppositum non est simplex  
sed



sed mixtum. Hinc Aristoteles 1. de anima tex. 66. vult ipsum intelligere non esse operationem animæ, sed hominis, sufful-  
tus hoc principio, quod operationes sint  
compositorum, & non simplicium.

Demum idem confirmatur per fontem  
analyticum: eo quia omnes operationes  
definiuntur per subiecta, quæ sunt co-  
posita ex materia & forma substantiali, &  
prædicantur in secundo modo dicendi per  
se: dicimus definiti per subiecta substantia-  
lia: quia accidens ex Aristotele 4. metaphis.  
tex. 14. non est accidentis accidens, sed est  
accidens solius substantiæ. Quod verò hoc  
subiectum, de quo prædicantur operatio-  
nes, sit compositum, patere potest inductio-  
ne: quia visio prædicatur de oculo: auditus  
de auribus in secundo modo & sic de alijs.

Qui verò arbitrantur, calidum innat-  
um esse calorem temperamenti, fortasse  
lapsi sunt in hanc opinionem, quia tenent,  
quatuor primas qualitates esse, formas  
substantiales elementorum, alioqui non  
possent defendere, quod calidum innatum  
à quo, & esse, & viuere, & operationes de-  
pendet, sit qualitas accidentalis: esse enim  
& viuere à rei forma & substantia, & non  
ab accidente dependent.

Sed quam vana sit istorum opinio, quod  
primæ qualitates sint elementorum formæ  
substantiales colligitur ex Aristotele præci-  
puè 3. metaphis. tex. 17. ubi ait, quatuor qua-  
litates esse elementorum passionēs, & non  
substantias. Idem colligitur ex hoc fa-  
moso Aristotelis axymate, quod vni est  
accidens alteri non potest esse substantia:  
quare si primæ qualitates sunt passionēs,  
& accidentia, non possunt esse formæ sub-  
stantiales elementorum.

Respondent non esse vniuersaliter verum  
axyma: quia & figura orbicularis est Cæ-  
li forma & substantia: tamen in elemen-  
tis est accidens. Quibus respondemus fi-  
gu ram orbicularem Cæli differre genere  
ab orbiculari elementorum: si esset ea-  
dem, certè si in Cælo est substantia, esset  
quoque in elementis.

Demum quod calidum innatum non sit  
calor temperamenti, ex eo patet, quia ca-  
lidum hoc innatum non solum habet vim  
calefaciendi, sed etiam refrigerandi, hume-

ctandi, & exiccandi: si esset calor tempe-  
amenti non superaret morbos calidos, r

Quod verò superet, & febres & calorem  
erysipelatis patet evidentissima experien-  
tia: quia nisi haberet vim refrigerandi, sed  
solum calefaciendi illos, qui morbis calidis  
vexantur, interimeret.

Nec valet dum dicunt, calorem tempe-  
ramenti resoluendo calidos humores re-  
frigerare: quia dantur intemperies calide  
simplices sine vlla materia, quæ ab ipso ca-  
lido nativo superantur: ergo nullo modo  
calidum nativum erit simplex calor tem-  
peramenti.

Præterea idem experientia, & Galeni au-  
ctoritate 3. de temp. comprobatur hoc mo-  
do: si in ventriculum cibi valde calidi,  
cuiusmodi sunt capræ, allium, vel aromata  
ingerantur, nunquam in chylum transmuta-  
buntur, nisi à calido innato superetur  
actualis, & potentialis cibi caliditas, quod  
si calidum innatum esset calor tempera-  
menti, certè eibus virtute calidi innati non  
deponeret actualem, & potentialem cali-  
ditatem.

Ideo dum asserunt, calorem tempera-  
menti esse calidum innatum, quia esse, &  
viuere similitudinis ab ipso calore depen-  
det, & ipso alterato alterari ipsū esse, & vi-  
uere: non rectè dicunt: quia dicemus Nos  
non solum à calore pendere esse & viuere  
similitudinis: sed etiam à frigido, ab hu-  
mido, & à sicco. Addimus, quod qualibet  
ex his qualitatibus alterata, sit frigida, sic-  
ca, vel humida, esse, & viuere similitudinem  
partium alteretur: quia vita, & essentia si-  
militudinem constituit à quatuor qualita-  
tibus, non ab vna tantum, nam elementa  
reducuntur ad vniōem, vt fiat pars simi-  
laris, non solum ratione caloris, sed etiam  
ratione frigiditatis, humiditatis, & siccita-  
tis: neque solum est de ratione calidi cō-  
tinere similitudinem, sed frigidi, humidi,  
& sicci, quare sicut, dum calor amittendo  
suam vim destruitur similitudo: sic dum  
frigus vel siccum, vel humidum, quod est  
aliarum qualitatum glutem, destruitur,  
similitudo destruitur: quia calidum innat-  
um formaliter est quoddam mixtum resul-  
tans ex quatuor primis qualitatibus: ergo  
non est calor simplex ipsius temperamenti.

Nec



Nec valet dum dicunt, omne calidum innatum, à quo viuere, & ipsa vita immediate dependet, est calor temperamenti, mediatè verò est influens cordis calor, à quo solum vita dependet, & sine ipso cordis calore temperamenta nec viuunt, nec opera sua obire possunt: ergo calidum innatū erit calor primo cordis, deinde temperamentorum.

Respondetur, negando, quod vita, & esse caloris innati à corde dependant: quod probatur auctoritate Galeni & ipsa experientia. Auctoritate primo de loc. aff. ult. & lib. de fetus formatione cap. 5. vbi dicit, facultates partium naturalium esse conatas & ab alio non pendere: ideo calidum natium non pendere à corde.

Præterea Galenus lib. de arte parua cap. 9. loquens de cartilagine, & alijs partibus, quæ ex seipsis habent regimen, ait, has partes vitam habere sine cordis auxilio: sic semen habet vitam sine corde.

Similiter probatur experientia: nonne plantæ euulsæ à radice habent vitam antequam inferantur? quare non omnis vita à corde dependet. Similiter in syncope affectis, & in ystericis partes corporis habent vitam absque eo quod pulset cor.

Nec valet, dum dicunt ex Aristotele 2. de part. animalium 3. dicente, alimēti coctionem, & mutationem fieri per caloris vim. Tertio verò de part. animalium 6. calorem obtinere vim agendi: 2. de anima tex. 41. ignem esse causam: quia respondemus Aristotelem per calorem intelligere calidum natium ex quatuor qualitatibus resultans, quod patet: quia secundo de generatione animalium tertio vult, quod hoc calidum insitum neque sit ignis, neque ex igne: ergo non erit calor temperamenti: quia hic calor temperamenti saltem est ex igne.

Demum quod Aristoteles per spiritum natium non intelligat solum calorem temperamenti, patet ex 5. de generatione animalium cap. 2. vbi dicit, spiritum natium in alijs pulsum, in alis spirationem efficere: addit in aure auditum, & in oculo visionem: tunc sic: sed sic est quod visio sit ratione totius temperamenti ipsius oculi: sic auditus non sit ratione caloris ipsius aeris: sed multò magis ratione frigiditatis, sed

adæquatè ratione totius temperamenti instrumenti auditus: ergo hic spiritus nativus erit temperamentum & non solum calor ipsius temperamenti: sicuti satis superque confirmabimus quæst. paulo infra.

Admittimus tamen in faciendo calidum natium, calorem tenere primum locum inter qualitates: sed in calido nativo facto totum temperamentum esse totum esse rei, & ab ipso operationes pendere.

## Q V Æ S T. LIV.

*An calidum innatum sit caeleste.*

**Q** Vidam (vt refert Albertus Magnus lib. 20. de animalibus) putabant Cæli substantiam reperiri in corporibus animalium, hancque esse ipsum calidum natium. Contra hanc opinionem satis superque dictum est ab Alberto.

Nostrates Alchimistæ asserunt, & in animalibus, & in omnibus mixtis inueniri substantiam caelestem, quam ipsi vocant Cælum, seu quintam essentiam: illam dicunt per sublimationem separari posse, hancque esse calidum natium, & totum esse ipsum mistum: Sed quam vana sit hæc opinio ab Alberto, & ab alijs à scholis est explosa.

Demum Fernelius 4. suæ physiologiæ, & plurimi Alij sustinent, calidum natium non esse elementare, sed caeleste. Argumenta præcipua Fernelij & sectatorum hæc sunt.

Primum argumentum desumptum est à viuentibus frigidissimis, taleque est: si calor innatus non esset Cælestis, mandragora, serpentes, & alia viuentia frigidissima non viuerent: quia in his calor est adeo exiguus, vt non posset regere ipsam mandragoram, & alia id genus viuentia: quia vita, & vitæ actio est prædominantis: ergo si hæc frigida viuunt, viuunt per calorem caelestem: qui licet sit exiguus potest prædominari his inferioribus, quatenus constant ex quatuor elementis.

Secundum argumentum: calori vitali ex Aristotele non frigus? sed extinctio opponitur: sicuti tenebræ opponuntur lumini: ergo calor vitalis erit caelestis, & non ele-



mentalis: quia elementalī calori frigus opponitur.

Tertium argumentum Fernelij desumptum est ab Aristotele 2. de generatione animalium cap. 3. vbi asserit, in semine esse calorem, qui facit semina fecunda, qui neque est ignis, neque aliquid ex igne: ergo erit Cælestis.

Quartum, Aristoteles 2. de part. animalium 7. & 2. de generatione animalium 3. loquens de calore innato, dicit proportionē respondere elemento stellatum: ergo erit Cælestis.

Demum confirmat Fernelius per Hippocratem lib. de carnibus, vbi inquit, calorem innatum esse Cælestem. Hæc sunt fundamenta, quibus tuentur, calorem innatum esse Cælestem.

Cæterum hæc Fernelij opinio reluctatur Hippocrati, Platoni, Aristoteli, Galeno & principiis Philosophiæ naturalis. Hippocrati, qui primo de natura humana comm. 1. tenet, quod omnia, quæ fiunt, fiant ex quatuor elementis: cum igitur calidum nativum, & fiat, & (vt probatum est superius) sit mixtum, non potest nisi ex quatuor elementis totum constare, esseque elementale, & non Cæleste.

Platoni aduersatur: qui in Timæo tenet, calidum innatum esse quasi igneum, idest ignem refractū, vt explicat Galenus lib. de decretis Hippocratis & Platonis.

Aristoteli, quia lib. de respiratione cap. 4. asserit animā operari mediante igne. Idem quoque colligitur 2. de anima tex. 41. vbi dicit post animam in corpore esse ignem cum causam augendi, & nutriendi, ergo calor innatus, qui est immediatum animæ instrumentum, non erit Cælestis. Insuper quarto Meteororum c. 2. habet hanc sententiam, quod generatio quæ inest animalibus, & stirpibus proueniat à quatuor virtutibus elementorum: ergo non à calore Cælesti.

Galeno Fernelius aduersatur, qui in hoc comm. & libello aduersus Lycum cap. 7. it, calidum innatum fieri ex semine, & a sanguine menstruo. Parimodo lib. de rigore cap. 6. vult, calidum innatum esse mixtum: ergo non Cæleste. Præterea Galenus clarissimè 8. de plac. cap. 7. asserit,

non esse ignem, sed ex ipso met Hippocrate fieri ex ignis commixtione, & ex alijs elementis resultare.

Ad primum argumentum de serpentibus, & mandragora respondemus, operationem mandragoræ, & aliorum viuentium frigidorum prouenire à temperamento mandragoræ, & non à simplici calore; temperamentumque edere omnes operationes: quate qui dicunt, quod sit priuilegium caloris vincere qualitates passiuas, quo ad regimem, non quo ad gradum intensionem, melius certè dicerent quod vincere qualitates passiuas sit priuilegium temperamenti primigenij mandragoræ: quia totum esse mandragoræ est temperamentum, & non solus calor: atque à temperamento adæquatè, & non à calore prouenire operationes.

Insuper si calor mandragoræ esset Cælestis, mandragora, & Nos cum illa essemus immortales: quia Cælestia sunt immortalia: nisi dicamus esse Cælestem effectiue seu æquiuocè, vt infra probabimus. Immo addimus, quod hoc temperamentum seu calidum innatum non solum differat à calore Cælesti, sed etiam aliqua ex parte à calore elementalī; quia dum generatur, generatur per veram elementorum transmutationem, itaut resuletur virtus noua, & ab elementis formaliter diuersa.

Deinde quod hic calor Cælestis, qui gubernat, & regit mandragoram, & serpentes diminuatur, & corrumpatur, non negat Fernelius asserere verò quod aliqua cæli portio sit corruptibilis, non solum est falsum, sed ridiculum.

Præterea non valet, dum dicunt, calidum innatum non esse factum per totalem mutationem seminis, & sanguinis menstrui: quia in infantibus ex Galeno locis citatis adhuc conseruatur semen, & sanguis menstruus, cum ipsa ossa infantium sint adhuc sanguinolenta.

Respondemus, materiam seminalem, & sanguinolentam esse quidem in infantibus, sed non eandem numero cum sanguine menstruo matris, & semine patris: sed esse eandem speciem: quia dum sit embrio, statim corrumpuntur semen, & sanguis menstruus: deinceps ex calido innato embrio-



brionis sit similis materia seminalis, & sanguinolenta: simile enim generat simile.

Sic Galenus lib. 1. de sem. cap. 16. habet hanc sententiam, quæ nostram opinionem confirmat, testes efficiunt semen: arterias quoque, & venas (ait) idem efficere, sed non ita multum & exquisitè coctum semen, ut faciunt testes: in infantibus vero spermatica partes cum sint feraciores in feminis generatione, & sanguinis generatione, non est mirum, si ossa ipsa, & alia membra spermatica sint sanguinolenta.

Quod verò semē, & sanguis menstruus, dum sit embrio, transmutetur, & in embrione idem numero non relinquatur: probari potest argumento à minori, taleque est: ex Galeno 3. de facul. nat. cap. 7. & ex ipsa experientia: ipse cibus qui in ore agitur, manifestè mutatur in alteram speciem eadem hora, quamvis ad perfectionem non transformet, ut iisdem Galeni verbis utar: quanto magis semina parentum, & sanguis menstruus aliquorum dierum spacio in utero in generatione embrionis transmutabuntur?

Ad secundum argu mētum de calore vitali, quod extinctio, & non frigus opponatur calori vitali, & per consequens esse Cælestem. Respondemus oppositorum alia esse priuatiua, alia contraria, alia contradictoria, & alia relatiua, ut docet Aristoteles in post. Pradicamentis: hoc posito, dicimus, quod caloris extinctio sit oppositum priuatiuum ipsi calori vitali: sicuti tenebræ sunt oppositæ luminī, de hac oppositione dicimus intelligere Aristotelem: frigus verò calori vitali esse oppositum positionem contrarium.

Præterea calor quinque modis extinguī potest, nempe, vel à calore, sicuti dum à calore febris ardentis destruitur hepatis calor: vnde hydrops: est Hippocratis 2. Prognost. tex. 1. ubi habet, „ A febre acuta hydrops. Secundo destruitur calor à nimia fluxione: de hoc modo Galenus mentionem facit 2. de facul. nat. 8. Tertio extinguitur à defectu pabuli: hic modus differt à secundo, quia calor extinguitur quoque à nimia puris euacuatione. Quarto à nimia suffocatione: de hoc Hippocrates 6. aphotis. 12. Quinto à nimio frigido aclua-

li, ut à niue, vel à potenciali, ut ab opio.

Ad tertium Fenelij argumētum desumptum ab Aristotele, quod scilicet calor innatus neque sit ignis, neque ex igne. Nonnulli respondent id dixisse: quia calor innatus est aereus, idest calidus & humidus & suauis resultans ex semine, & sanguine menstruuo, in quo mixto prædominatur temperamentum calidum & humidum, & non calidum & siccum: ideo neque est ignis, neque ex igne.

Hæc responsio non omninò tollit difficultatem: quia calidum innatum constat ex quatuor elementis: ergo & ex igne.

Respondemus nos, calidum innatum pendere quidem à Cælo tamquam à causa efficiente remota, & accidentalī. A semine verò & sanguine menstruuo tamquam à causa per se proxima efficiēte, & materiali.

Causa verò cur non sit ignis, neque ex igne est, quia dependet ex refractione luminis solis, & aliorum Astorum: non tamen dicimus, calorem esse in Cælo, sed per refractionem fieri de nouo in ipsa terra: huncque calorem neque esse ignem, neque fieri ex igne; sed vocari quoque ab ipso Aristotele Cælestem. De hoc loquens secundo de generatione animalium cap. 3. inquit, non esse ignem, vel ex igne, sed corpus magis Diuinum, quam sint elementa; quia ex sole, & astris genitum est.

Parimodo tertio de generatione animalium vndecimo ait, in vniuerso esse calorem animalis, ita ut quodammodo animæ plena sint omnia: Ecce quod calor Solis sit apud Nos ex refractione luminis.

Similiter ex refractione luminis Lunę fit aliquis calor apud nos, qui conducit ad omnes generationes: ideo Aristoteles 4. de generatione animalium decimo dicit, Lunam esse principium caloris propter Solis societatem: hic calor fit apud Nos non tamen demissus à Cælo: talisque, neque est ignis, neque ex igne.

Quātus verò sit hic calor factus in terra à refractione luminis Lunę: & in qua proportionē respectu solis, ostendimus in commentarijs nostris Auicennæ quæst. vndecima, ubi proposuimus tria instrumenta, quibus calorem Lunæ dimetiri possumus.

Auerroes 12. metaphys. comm. 18. loquens



quens de hoc calore habet hæc „ semina agunt per calorem, qui est in eis non per calorem igneum: quia calor ignis corrumpit, & non generat; ideo Aristoteles dixit, calorem, qui est in semine, neque esse ignem, neque ex igne: subdit Auerroes „ Aristoteles dixit, homo factus est ex Sole, & homine, & calor factus est ex terra & aqua à calore Solis admixto cum calore aliarum stellarum.

Ecce quod calor diffusus per orbem dici potest Cælestis: non tamen ipse calor est demissus à Sole, vel à Stellis: quia ibi non est calor: sed factus est ex terra & aqua per luminis refractionem. Subdit Auerroes „ calor solis, & stellarum diffusus in aqua, & terra generat animalia ex putrefactione: calor verò ignis, ut reperit Auerroes lib. de substantia orbis cap. 2. corrumpit & destruit entia: calor verò corporum Cælestium (supple factus in terra ex refractione luminis) largitur vitam vegetabilem, sensibilem, & animale.

Quo pacto verò fiat calor ex refractione luminis, Cæsar Cremoninus Philosophus peripateticus celeberrimus inquit, ex refractione excitari calorem, quia lumen rarefacit: lumenque esse actum perspicui, quæ perspicuitas pertinet ad raritatem, quam raritatem dicit sequi excitationem caloris.

Tot errata, quor verba.

Primum dum inquit, calorem excitari, quia motus Cæli disgregat materiam, dico quod quanto magis disgregat, tanto minus calefacit: hinc ignis in sua sphaera, quia est maxime disgregatus, & rarefactus, neque lucet, neque actu calidus est.

Parimodo si lumen rarefaciet: ergo non excitabit calorem.

Demum falsum est, quod perspicuitas pertineat ad raritatem: non ne adamans est perspicuus, tamen est res densissima.

Parimodo aqua est perspicua; tamen dum agitur in bullas conuertitur unde fit rarior, & ita rara euadit opaca.

Iridem spongia est rarissima & opacissima; fumus rarus, & opacus, alia quoque exempla proposuimus in nostra arte parua fol. 291. quibus ostendimus, nec raritatem pertinere ad corpus perspicuum, nec

opacitatem ad corpus densum.

Hinc alia non sunt opaca, quia sunt densa, nec cælum est diaphanum, quia sit ratum. Quopacto verò diaphanum fiat, & opacum: & quomodo diaphanum, & opacum propriè conueniant Cælo, in arte parua satis superque ostendimus: itaut maxime à veritate recedant, qui tenent, quod qualitates primæ eo modo conueniant Cælo, quo raritas, densitas, perspicuitas, & opacitas: quia qualitates primæ neque per prius & posterius, neque vlllo modo conueniunt Cælo: perspicuitas verò & opacitas nõ equiuocè, vel per prius & posterius, sed æquè propriè cælo, & elementis conueniunt.

Quo pacto verò calor, vel lux ex refractione luminis fiat, ostendimus ratione, & experientia in commētarijs nostris in Aui-cennam col. 155. nullam lucem, nullumque calorem fieri, nisi ex refractione luminis facta in opaco: quia calor, & lux sunt accidentia corporis opaci & non diaphani.

Si in Cælo essent mille Soles; & terra globus, & nos essemus diaphani, apud nos nullus esset calor, & nulla lux: quia de ratione lucis, & caloris est radiorum repercussio: repercussio verò radiorum fieri non potest, nisi ubi est corporis opacitas: quare cum supra aerem infra Lunam ubi est ignis, & act, nulla sit opacitas, nulla lux obseruatur.

Cut quæso crepuscula non apparent secunda vel tertia hora noctis, quo tempore radij solis sunt effusi in aerem supra terram ultra 52. milliaria? quia vapores qui participant aliquam opacitatem, & qui possunt crepuscula efficere ultra 52. milliaria non eleuantur: ideo nulla lux, & nullus calor radiorum solis tunc obseruatur.

Media nocte radij solis sunt effusi, & per ignis spheram, & per omne Cælū, sed cur non videntur? quia ibi non duplicantur, cur non duplicantur? quia nulla est opacitas, nisi in Stellis: ideo ipsas solas videmus: in illis tamen nõ sit calor, quia stellarum materia non est capax caloris: nõ est capax, quia non est eiusdem generis cū materia inferiorum: si esset eiusdem generis duplicatio radiorū in Luna, & alijs Stellis efficeret calores, & calores vapores, & vapores



pores nubes, & nubes pluuias, & pluuiæ flumina, maria, & animantia ipsa, quod est omnino à veritate alienū, quoniam si quis esset in Luna, dum magna Europæ pars niue albescit, videret magnam aspectus mutationem, attamen Nos neque specillo nuper inuento vllam nunquam mutationem in luna videmus: nec valet dum dicūt, materiam Cæli esse sua forma contentam, & satiātam: quia quando esset eiusdem naturæ à perpetua radiorum refractione dissiparetur, & in vapores, & in reliqua, quæ dicta sunt, resolveretur.

Sed vt redeamus vnde digressi sumus cōcludimus, calorem nostrum vocari posse cælestem, non quia formaliter à Cælo descendat, quia in cælo, nec calor, nec frigus est, sed effectiue, quatenus astrorum lumen est causa efficiens remota, & accidentalis: quia ex continua luminum refractione facta in terra, & aqua duplicantur radij, & ita duplicati efficiunt calorem, qui dicitur Cælestis, à quo esse & viuere viuentium dependet.

Quo pacto vero duplicatio radiorum efficiat calorem facile intelligunt, qui tenēt, radios esse corporeos, sed de hac quæst. an sint corporei, vel incorporei, hic non est locus.

Cæsar Cremoninus, qui tenet, calorem innatum esse calorem temperamenti, quærit, cur calor noster innatus ab Aristotele vocetur Cælestis. Respondet: quia est subordinatus Cælo, agitur quatenus regulatur ab ipso Cælo: addit quod omnia agentia sublunaria quatenus sunt ordinata ab ipso Cælo possint dici Cælestia.

Si esset vera hæc expositio, possemus dicere non solum calorem, sed frigus, humidum, & siccum, & omnia mixta vt agentia vocari posse Cælestia: quia omnia agentia sublunaria, tam calida, quam frigida, sicca, vel humida æquè subordinata sunt superioribus latioribus: sic penis, vulua, clunes, stercus, & si quid vilius istis inueniatur quatenus agentia vocarentur Cælestia; sed certè locutio ista esset nimis impropria. Satius est, vt dicamus, calorem hunc esse Cælestem quatenus ex accidenti prouenit à Sole, & alijs astris, vt dictū est, ad differentiam caloris ignei, & nō quatenus sub-

ordinatus: quia non solum calida, sed frigida, humida, & sicca vt agentia sunt subordinata, quæ certè à Cælo non proueniunt, & per consequens Cælestia dici non possunt.

Respondemus quoque alio modo, cur calidum innatum non sit ignis, nec fiat ab igne, dicendo, calidum innatum fieri ex sem. & sanguine menstruo post factam totalem mutationem seminis & sanguinis menstrui in calidum innatum, quod edit operationes omnino diuersas ab igne: quia est quoddam mixtum, quod non est ignis, nec pendet ab igne: quia antequam fiat ignis est transmutatus: nisi dicamus ignē esse incorruptibilem: credimus enim Nos elementa potentia, & non actu manere in mixto.

Hinc est quod calidum innatum vt mixtum edit operationes diuersas ab operationibus suorum principiorum, & aliquando contrarias.

Quod verò calidum innatum fiat ex mutatione seminis & sanguinis menstrui totius in totum, probari potest experientia, & Galeni auctoritate: Galenus enim secundo de sem. cap. quarto ait, vt primum semen coniectum est in vterum vna pars in membranam, alia in vasa, & in alias partes conuertitur: ergo dum fit calidum innatum ex semine & sanguine menstruo oportet, vt transmutentur semen & sanguis mensurus totius in totum.

Quod verò mixtum edat operationes diuersas, & contrarias, pater argumento à minori efficacissimo, hoc modo: si medicamentum compositum à Pharmacopola, quod non est verè mixtum, sed iuxta positum efficit operationes diuersas, & interdum contrarias operationibus suorum principiorum: quātō magis mixtum ex quattuor elementis, quod est verè mixtum, cuiusmodi est calidum innatum, edere poterit operationes diuersas? Sic calidum innatum non solum habet vim calefaciendi, sed etiam refrigerandi, vt superius probatum est: hac ratione dicimus, calidum innatum non esse ignem. Hac ratione Galenus octauo de placitis septimo damnat Platonem dicentem, calidum innatum esse ignem, quod si esset, sequeretur (a i



Galenus) quod febricitantes melius, quam sani homines concoquerent, quod est, aperte absurdum.

Præterea confirmatur ex Galeno, & experientia, quod non solum mixtum, sed iuxtapositum artificiale edere possit operationes contrarias operationibus suorum principiorum. Ex Galeno enim 3. Meth. cap. secundo habetur, æruginem, ceram, & oleum efficere mixtum, quod est Sarcoticum præstantissimum, quod vlcera caua potest carne implere: tamen oleum, cera, & ærugo seorsum sumpta, & applicata excauant, & non implent vlcera: quare si iuxtaposita non edunt operationes virtute simplicis prædominantis, tantò minus mixta, quæ per alterationem fiunt longè magis diuersa, quam sint iuxtaposita, virtute ignis, vel alterius elementj suas edent operationes.

Experientia quoque confirmatur, operationem mixti artificialis non prouenire à simplicium operatione. Anne sibi vltimum, & crisocolla simul vnita efficiunt medicamentum purgans? tamen hæc seorsum sumpta nullam habent vim purgandi. Idem tetracharmum emplastrum quod fit ex aceto, litargiro, & oleo veteri est sarcoticum: tamen singula separata non sunt Sarcotica. Ceratum de Euforbio maximè, ruuat partes conuulsas, vt Mesues animaduertit: tamen simplicia, quæ component hoc ceratum, quæ sunt cera, oleum, & euforbium seorsum sumpta si applicarentur partibus conuulsis valde nocerent.

Demum puluis pyrius est adeo impetuosus, vt per ipsum accensum grauissimæ pillæ ferreae eant illicò volatim in partes admodum distantes. Simplicia verò, quæ illum component sunt sulphur, carbones, & nitrum: hæc nullum impetum faciunt, si seorsum acendantur.

Ex his sic argumentamur: si mixta artificialia edunt operationes à suis simplicibus componentibus ita diuersas, quanto magis naturalia mixta, quorum principia sunt trasmutata id efficient?

Sic mandragora licet sit exiguo calore donata dicimus, operationes non pendere ab illo calore, sed ab eius calido innato, quod est quoddam mixtum resultans ex

sem. & sanguine menstruo, & factum de nouo, vt probatum est, quod habet vim non solum calefaciendi, sed etiam refrigerandi, prout opus est.

Valent igitur qui dicunt, mixta operari mediante igne, nisi per ignem intelligamus calidum innatum: quare si instrumentorum artificialium operationes, prodire possunt à mixto, vt mixtum est, & non à simplicibus ipsum mixtum componentibus, tantò magis in mixtis naturalibus, & de nouo genitis operationes prodibunt à natura seu à calido innato, quod continet totam mixti essentiam, quæ neque est ignis, neque ex igne: quia ex astrorum calore (vt dictum est) tanquam à causa efficiente remota, & accidentali, natius calor originem ducit.

Ad quantum argumentum dum dicebant ex Aristotele, calidum natium proportionem respondere elemento Stellarum: ideo esse Cæleste: dicimus totum oppositum inferendum esse: hoc modo: proportionem responderet elemento stellarum: ergo non est Cæleste. Sic sphaera lignea proportionem responderet sphaeræ Cælesti: ergo non est Cælestis. Sic caput nostrum, quod est rotundum proportionem quadam responderet Cælo: tamen non est Cæleste: quæ enim conueniunt proportionem, genere differunt.

Calidum natium habet proportionem cum Cælesti calore: quia sicuti Cælum non comburit, sed conseruat, sic calor natius bene temperatus est ita suavis, & mitis, vt saltem per aliquod tempus non conseruet, & non comburat.

Ad quintum dum dicebant ex Hippocrate calorem nostrum esse Cælestem. Respondemus à refractione luminis solis fieri calorem: hocque modo dici Cælestem: quamuis calor genitus à sole non mittatur à Cælo: quia in Cælo nec calor, nec frigus stare possunt: sed calor fit in terra ex radiorum refractione: ideo habita relatione ad diuersa potest dici terrestis, & Cælestis.

Similiter radij Solis refranguntur quidem in Luna: in ipsa tamen nullus generatur calor: quia Lunæ corpus est ineptum ad generandum calorem: si enim ibi fieret calor, statim, & vapores, & pluuia, & nives



niues fierent, quod repugnat experientia: quoniam si in aliqua Lunę parte interdum essent niues, nobis apparerent varij Lunę aspectus, & non vnicus impermutabilis. Si verò nos essemus supra Lunam, & terrę partem aliquam niue circumuentam inspiceremus, aspectus varietatem admiraremur, quam in Luna nemo vnquam obseruauit.

## Q V Æ S T. LV.

*Quod calidum innatum sit temperamentum & non calor temperamenti.*

**G**alenus in comm. sequenti, & libello aduersus Lycum cap. 7. dicit quod illa quę calidum innatum ἀρχηγόνος idest primigenium complent sunt sanguis menstruus, & seminalis materia. Addit, ex hac primigenia nostra substantia in prima generatione fieri constitutionem partium videlicet similarium, quę sunt illę, in quibus perficitur augmentum, & nutritio vsque ad mortem.

Hinc calidum innatum vel consideratur quatenus immediatè sit ex semine, & sanguine menstruo, quod vocatur ἀρχηγόνος seu primi genium: vel quatenus est prima constitutio genita à calido archigono, quę constitutio est totum esse partium similarium. In primo calido quod est primigenium (vt docet Auicennas doct. 6. in prima primi) continetur alteratrix, quę præbet temperamentum omnibus partibus similaribus, & formatrix, quę præbet omnibus partibus compositionem, videlicet situm, numerum, figuram, & meatus.

In secundo calido innato, quod sit à primigenio, nec virtus generatrix, quę de nouo facit partes, nec formatrix continetur: quia in seru formato nulla virtus reperitur, quę de nouo membra efficere, vel componere possit: in ipso tamen continentur virtus auctrix, nutritrix, & ceterę facultates famulantes: neque de hac re Auicennas, Galenus, & Hippocrates vnquam dubitarunt. Quomodo verò calidum innatum primigenium differat à calido innato partium similarium, paulo infra quoque declarabitur.

Quærimus modo quid sit calidum innatum communiter sumptum, quod videlicet prædicatur de primigenio, & de facto à primi genio. Pro intelligentia sciendum, quod calidum aliud est essenziale, & aliud accidentale. Sic Galenus in hoc commento ait, calidum interdum transferri ad qualitatem, interdum ad corpus calidum: citatque Theophrastum dicentem, apud Antiquos in omni vita fuisse in vsu, vt per calidum intelligamus corpus calidum.

Parimodo temperamentum aliud est accidentale, quod solum consideratur in puris qualitatibus: aliud est essenziale, quod consideratur respectu quattuor elementorum efficientium ipsum mixtum.

Cæterum quod vtrumque calidum innatum videlicet primigenium, & à primigenio factum formaliter sit temperamentum essenziale partium similarium, confirmari potest ratione, auctoritate Hippocratis, Galeni, Aristotelis, & experientia ipsa.

Hac ratione comprobatur, calidum natium esse temperamentum. Illud in quo constat esse, & viuere est calidum innatum, sed temperamentum est id in quo constat esse, & viuere: ergo calidum innatum est temperamentum: ergo non est solus calor temperamenti. Maiorem omnes concedunt. Minorem probamus quia totum esse partium similarium non solus est calor temperamenti, sed temperamentum ipsum, quatenus constat ex calido, frigido, humido, & secco.

Vocatur tamen calidum innatum à præcipua qualitate calida, quę est maximè omnium actiua: non tantum tollitur, quin calidum innatum constet ex omnibus quattuor qualitatibus: sic piper dicitur calidum: non propterea sequitur, quod piper non sit quoque frigidum: non tamen vocatur frigidum: quia caliditas, & non frigiditas prædominatur, & denominatio semper fit à qualitate excedente temperatum. Idem dici potest de alijs mixtis.

Dū dicunt, elementa à calore esse redacta ad homogeneitatem seu similaritatem: ergo calor est totum esse, & viuere similaritatis: non valet: quia ad constituendam partem similem, incipit quidem calor, sed calor,



ris actio esset vana, nisi concurreret actio frigiditatis, humiditatis, & siccitatis.

Præterea esto, quod elementa redacta sint ad similitudinem à solo calore, nos non querimus à qua causa similitudo fieri incipiat, sed querimus de esse partis similis, iam factæ, cuius essentia non ex vna, sed ex quatuor qualitatibus essentialibus resultat.

His positis, cessant omnes difficultates: dum dicunt, quodlibet minimum vivit, & nutritur per calidum innatum: ergo calidum innatum in parte similari erit ubique: ergo hoc calidum erit calor temperamenti qui in qualibet mixti parte esse potest.

Nos vero inferimus hoc modo: quodlibet minimum partis similis nutritur per calidum innatum: ergo hoc calidum erit temperamentum ipsum: quia temperamentum est in qualibet minima parte: estque totum esse partis similis, tam in viventibus, quam in alijs mixtis. Hinc in metallis, ut in argento, & auro temperamentum essentiale (non loquor de accidentali) est totum esse argenti, & auri: illoque destructo, destruantur metalla: quare calidum innatum erit temperamentum essentiale, & non solus calor temperamenti.

Præterea confirmatur ex Galeno 2. aphor. § 1. ubi dicit, naturam consistere in elementorum commoderatione: sed hæc commoderatio est ipsum temperamentum. Sed quid intelligit per ipsam naturam? certè intelligit calidum innatum: quia & lib. de marcore, & multis in locis Galenus calidum innatum vocat ipsam naturam.

Insuper Galenus 1 §. comm. huius primæ sec. ait, tria esse corpora, quæ primigeniam nostram substantiam complent, nempe spiritum, sanguinem, & seminalem materiam: sed sic est quod hæc tria sunt illa ex quibus constituitur natura seu temperamentum essentiale: ergo.

Hippocrates verò (referente Galeno 8. de plac. cap. 7.) habet hanc sententiam à Galeno citatam his verbis, Hippocrates semper calidum innatum voluit esse auctorem omnium naturalium operationum: sed sic est, quod temperamentum est auctor omnium naturalium operationum, ut infra quoque patebit: ergo calidum innatum nihil aliud erit, quam temperamen-

tum, repetit quoque Galenus §. in 6. epid. comm. §. quod calidum innatum sit naturalium actionum auctor.

Ad hæc calidum innatum est ipsa natura & essentia rei (ut probatum est) sed temperamentum est huiusmodi. Hinc Galenus primo de Vsu P. 9. & in commento sequenti ait, carnis esse est temperamentum carnis, esse ossis temperamentum ossis: ergo ex Gal. temperamentum est calidum innatum partium: sic esse argenti vel auri est temperamentum argenti & auri quod idem est, ac si diceremus esse argenti, & auri esse calidum innatum argenti, & auri. Ostendimus superius ex Aristotele & Galeno omnia mixta esse talia per suum calidum innatum, idest per suum temperamentum essentiale, quo destructo destruantur mixta.

Insuper patet ex Hippocrate, & Galeno secundo de facul. nat. cap. 9. quod operationes dependant à rei similis temperamento: quia ibi refert, Hippocratem asserere, temperamentum actionis causam esse: ideo actionem ladi primario ab intemperie: quare cum esse, & in ipsis viventibus ipsum vivere, & actiones ipsæ dependant à calido innato, calidum innatum erit partium temperamentum.

Hinc Galenus 3. de causis pulsuum nono considerans à qua causa fiat ipsa coctio, quæ est actio ita præcipua, profert hanc sententiam, calor nativus est qui concoquit: quare si temperatura est causa actionis, temperatura erit ipsum nativum calidum.

Accedit quod Galen. 4. de Vsu P. 12. considerans à qua causa proveniat hepatis coctio, dicit quod auctor coctionis in hepate est propria caro hepatis: sed propria caro talis est propter eius temperamentum: ergo calidum innatum erit temperamentum.

Amplius Galenus 3. de temp. 4. habet hæc verba, Naturam cum dico intelligo univrsam substantiam, & ipsam temperiem: sed univrsa substantia rei est calidum innatum: ergo calidum innatum erit temperamentum & non calor temperamenti.

In-



Insuper Galenus libello aduersus Lycum cap. 7. declarat, quomodo fiat primum similarium constitutio à calido innato primigenio, quod vocatur *ἀρχήγονον* habetque hæc verba „ calidum innatum est corpus, videlicet sanguis menstruus, & semen, supple cum spiritu vitali (addit) ex his fit prima constitutio ! sed addimus nos, non dari aliam primam constitutionem, quam temperaturam, & quamuis constitutio prædicetur non solum de temperatura, sed de compositione, & unitate : tamen temperatura est prima constitutio : ideo Galenus 1. de Vsu P. cap. 9. collocat compositionem, & unitatem inter ea, quæ necessariò accidunt temperaturæ : prima igitur constitutio est temperatura : ergo calidum innatum factum ex sem. & sang. menstruò ex Gal. erit ipsamet temperatura essentialis.

Hinc Galenus 8. de Vsu P. cap. 13. videns operationem pendere à temperatura seu à calido innato loquens de intellectu ait „ intellectum sequi non compositionis varietatem, sed corporis quod cogitat, atque intelligit bonam temperiem : quare si operationes pendent à calido innato : similimodo dicat Galenus pendere à temperatura : calidum innatum erit ipsamet temperatura.

Similiter primo de præsa. ex pulsibus c. 4. dicit Galenus „ essentiam facultatis in commodo temperamento positam esse : quia quælibet pars, si sit temperatissima, obit strenuè suum munus : ecce quod si temperamentum nõ esset ipsum calidum innatum, non posset dici, quod essentia facultatis consisteret in commodo temperamento, nec posset dici quod pars, quatenus sit temperatissima, obiret strenuè suum munus.

Parimodo Galenus 3. de symp. causis loquens de prima concoctione, his verbis ostendit à temperatura prodire dicens „ primam ciborum coctionem fieri à quadam temperie ex quatuor elementis facta, quæ proprietatem corporis ventriculi constituit, plurimum ad hanc rem conferente calido elemēto, videlicet calore influente, & actuali : quare si calidum innatum est auctor coctionis, hoc erit ip-

sum temperamentum.

Qui verò interpretantur per proprietatem corporis ventriculi temperaturam coniunctam cum semine, & sanguine menstruò, quæ ab initio generationis constituit corpus ventriculi, errare videntur toto Cælo : quia ab initio illa substantia menstrualis, & seminalis corrupta est, si verum est hoc axioma, quod generatio vnus sit corruptio alterius.

Si verò dicerent, conservari in partibus ipsis similaribus substantiam seminalem, & menstrualementem : negamus omninò conservari eandem numero, sed solum eandem specie : quia est omninò à ratione alienum, quod semen, & sanguis menstruus parentum idem numero conservetur spacio 70. vel 80. annorum, & ultra in partibus similaribus ab initio genitis.

Demum quod est immediatum animæ instrumentum est calidum innatum : sed temperamentum est immediatum animæ instrumentum : ergo. Maior est Galeni 5. simp. cap. 9. ubi inquit, calidum innatum si non sit animæ essentia, saltem est primum eius instrumentum. Minor patet, quia illud est animæ instrumentum, & primum à quo operationes fiunt : sed operationes fiunt à temperamento ex Galeno lib. de const. art. med. 5. 1. meth. cap. 6. & pluribus alijs in locis superius citatis : ergo calidum innatum erit temperamentum.

Idem quoque colligi potest ex Aristotele quinto de generatione animalium secundo, ubi vult, calidum nativum in arteria pulsus efficere, in oculo visionem, & in aure auditum : sed sic est quod visio à temperamēto oculorum & auditus à temperamento aeris interni, & aliorum instrumentorum fit : ergo non solum à calore : Immo crystallini, & aeris interni aurium calor minus conspirat in sensorij actionem efficiendam, quam aliæ qualitates : ideo colligimus temperamentum esse calidum innatum, quod est instrumentum facultatis primum, & adæquatum, & non solus calor.

Nec valet argumentum allatum contra Cremoninum, quod nihilominus ei maximè fauet, videlicet Balbum Stoicum di-



centem in 1. denatura Deorum, caloris naturam habere vim in se vitalem per omnem mundum pertinētem (addendo) ex terræ cauernis, ex attritu lapidum elici ignem, ex qua Balbi sententia colligi potest. ipsum calorem esse calidum natium, & non temperamentum : quia respondemus hunc calorem esse causam efficientem calidi natiui, & non ipsum calidum natium : neque implicat dicere esse causam & effectum calidi innati, habita varia consideratione : quia calidum innatum primi genium erit causa : calidum verò secundo genitum erit effectus primi & causa immediata ope rationum.

Denique non deessent experimenta, quibus ostendi posset, calorem temperamenti non esse calidum innatum. Afferatur hoc vnum : si aliqua similis pars magnos deflagret ardore redire potest ad pristinum statum à calido innato, si calidum innatum erit temperamentum : quia temperamentum habet quoque vim refrigerandi, sed si calidum innatum erit solus calor ipsius temperamenti certè nec per se nec per accidens refrigerabit : & præcipue vbi nihil est quod possit resolui.

Hinc febres hecticæ sæpè sanantur non à simplici calore temperamenti, sed à toto temperamento, quod est calidum innatum, à quo solum omnes operationes dependent.

Posito, quod calidum innatum sit ipsum temperamentum essentiale : instantiæ contra illos, qui arbitrantur, calidum innatum esse corpus concretum ex semine & sang. menstruo contra nos non habent locum, quia dum dicunt, in animalibus ortis ex putredine non esse hoc corpus concretum ex sem. & sanguine : dicimus in his esse quid proportionale, quod habeat tale temperamentum, quod possit partes spermaticas illorum animalium efficere.

Quodnam sit hoc proportionale in ortis ex putredine, & quodnam sit proportionale in generatione plantarum non pertinet ad nos : illud quod proportionale responderet menstruo in plantis ex Alberto Magno est humidum pluuiatile. Quod verò responderet ortis ex putredine est cer-

tè humiditas, quæ caret nomine.

Dum verò querunt, vbi sit hoc corpus in viuentibus. Respondemus in viuentibus & in omni mixto hoc corpus esse temperamentum compositum ex quatuor elementis : sic ipsa caro viuens est hoc corpus : ipsum os viuens est hoc corpus, seu temperamentum, quo abolito cessat vita, & esse ipsarum partium : dicimus esse : quia non solum intelligimus de viuentibus, sed de metallis, & omnibus mixtis, quæ talia sunt per suum calidum natium idest per suum temperamentum. Hoc igitur posito, non sequitur dari penetrationem corporis : quia hoc calidum innatum est ipsa essentia partium, quæ essentia, neque diffunditur, neque penetrat suas partes intus foris, nisi per suas qualitates.

Denique ex hoc corpore factò ex sem. & sanguine menstruo resultat calidum innatum viuens.

Nee valet, dum dicunt ex Galeno hoc calidum non esse instrumentarium : quia ex ipso Galeno postea adnascuntur instrumenta : inde colligunt non viuere : quia anima est actus corporis instrumentarii.

Cui instantiæ respondemus, illud calidum archigonon ex sem. & sanguine menstruo factum viuere in utero vita parentum : sicuti, qui versati sunt in Anatomia viuorum, sciunt : in principio enim fetus per arterias umbelicales, licet non sint facta instrumenta, in fetum effunditur ipsa vita. Deinde quando facta sunt instrumenta incipiunt infantes vita propria gaudere.

Ex his facile quoque colligimus, calidum innatum non esse substantiam aeream, pinguem, seu oleosam : quia hæc substantia pinguis, & oleosa talis est per temperamentum.

Præterea hæc non est viuens : quia est liquida, & inter contenta, vitæ experta, & non inter continentes & solidas partes est collocanda : vna enim est omnium Philosophorum, & Medicorum vox, quod operationes prodeant à partibus viuentibus, & non à vita carentibus.

Dum verò Galenus dixit, calidum natium esse substantiam aeream, & oleosam intellexit de materia ex qua fit calidum natium, & non de eius forma.

In-



Insuper si substantia oleosa esset calidum innatum, sequeretur, quod pars viuens, quo magis participaret talem substantiam, diutius viveret: at totum oppositum obseruatur, quia ossa, quæ substantia oleosa ferè sūt destituta, diutius conseruantur: quare dicimus calidum natium seu temperamētum ex substantia aerea, & oleosa in prima generatione resultare, atque iterum à temperamento substantiam pinguem, & oleosam non dissimilem progigni.

Accedit, quod in mortuis destruitur temperamentum, & calidum ipsum natium non tamen illicò destruitur substantia pinguis, & oleosa, qua calidum innatum viuēs fouebatur: hæc enim in animali statim interfecto eadem remanere, & conseruari videtur.

Dum Albertus lib. de long. & breuit. vitæ dicit humidum pingue, & oleo simile esse subiectum calidi natui, non intellexit illud humidum formaliter esse calidum natium: sed esse subiectū ex quo fit: proponit enim triplex humidum, videlicet, aqueum, quo mixta sunt mixta: vitale, quo viuētia viuunt, quatenus illo tamquam pabulo aluntur, cuiusmodi est semen, & sanguis menstruus. Tertium est alimentale, quod ex cibo fit, quo quotidie nutrimur. Ecce quod calidum natium fit ab humido vitali, idest à sem. & sang. menstruo, quod formaliter calidum natium esse non potest.

Ad hæc calidum natium est in omni mixto: quia omne mixtum vt mixtum, est putredini obnoxium, & vt tale habet calidum proprium, & natium, vt docet Aristoteles, vbi definit putredinem. Hoc posito dicant mihi vbi sit hæc substantia pinguis, & oleosa, quam putant esse calidum natium in argento & alijs metallis? quod verò in quolibet mixto sit temperamentum, certè nemo est qui nesciat.

Denique si substantia aerea pinguis, & oleosa esset calidum natium, sequeretur, quod vbi talis substantia esset copiosior, ibi actiones essent vegetiores, & ibi vita esset magis longæua: at sic est, quod copiosior potest esse hæc substantia in puero mortuo quam in sene viuo: ergo nulla ratione dici potest quod formaliter sit calidum natium, calidum enim innatum habet hoc

privilegium, quod vbi plurimum sit, ibi actiones sint vegetiores: quare credimus hoc calidum esse temperamentum essentiale, quod à Galeno vocatur essentia partium similarium, quo corrupto cessant operationes, & per consequens ipsa vita.

Andreas Laurentius de cordis temperamento quæst. 14. dicit, calorem natium nihil aliud esse quam humilū primigenium spiritu infuso & calore perfusum. Quot verba tot errata: quia humidum nō est calidum: deinde quæritur adhuc quid sit calor natuus. Præterea calidum natium est res solida & vitam habet, & habet actiones, quas humidum non habet: quare illud debet esse calidum innatum, à quo proueniunt operationes, sed temperamentum est huiusmodi.

Hinc Galenus (vt probatum est) octauo de plac. septimo ait, calidum natium esse auctorem omnium naturalium operationum. Tertio verò de causis pulsuum cap. 9. asserit, calorem natium esse illum, qui concoquit, & non substantiam oleosam. Parimodo Gal. 2. de facul. nat. 9. dicit temperamentum esse causam operationum: lib. verò de const. artis cap. 5. determinat operationes à temperamento partium similarium primò prodire. Similiter Aui-cennas cap. 2. doc. 3. in prima fen. loquens de temperamento habet hanc sententiam. Deus dedit temperamentum conueniens suis operationibus: ergo operationes procedunt à temperamento: ergo calidum innatum, à quo dependēt operationes (vt dictum est) in idem recidet cū temperamēto.

Omissimus alia Galeni, & Hippocratis loca ad disputationis cardinem minimè pertinētia, ne incidamus in περισολογίαν, sicuti quæ dicuntur ab Hippocrate de calido innato omnino à veritate aliena lib. de carnibus fortasse infecta ab aliquo Poeta, his ferè verbis: calidum innatum esse immortale, cuncta intelligere, videre, audire, & scire omnia præsentia, & futura, quæ attributa, nec temperamento, nec substantiæ aeræ & oleosæ aptari possunt: ille enim est conceptus & falsus & ridiculus: quia soli Deo omnipotenti illa attributa conueniunt.

Omittimus libenter, quæ in medi-



na non habent locum, sicuti sunt Poetica figmenta, vel quæ rebus, de quibus agitur, offundunt tenebras: Galenus 4. de ratione vic. 18. habet hanc pulcherrimam sententiam, „ vt in alijs plerisque manifestò homines peccant: sic in eo, quod gaudent ijs quæ obscurè dicuntur: cum tamen vno ferè ore omnes dicant perspicuitatem esse orationis virtutem: obscuritatem verò vitium. Sed occurrunt nonnulla dubia circa ea, quæ dicta sunt.

Prima dubitatio Auerroes 1. coll. ait, partes agere, & affici à calido innato, qui alius est à temperamento: ergo calidum innatum non erit temperamentum, vt dictum est.

Solutio talis est, quod calor innatus sit alius à temperamento videlicet accidentaliter à quo actiones non fiunt: quia ex Aristotele 4. metaphy. tex. 14. accidens non est accidentis accidens; fiunt tamen à temperamento essentiali, quod dat esse partibus similibus.

Secunda dubitatio in comm. isto 14. dicit Galenus, substantiam nostri calidi innati esse aeream & aqueam, seu oleaginosam: ergo non est temperamentum.

Respondemus temperamentū fieri immediatè ex hac substantia aerea, & aquea: immo ostendimus superius, dum calidum innatū factum est, illico corrumpi semen, & sanguinem menstruum, seu illam materiam aeream, & aqueam: idem tamen calidum innatum rursus efficere feminalem materiam, sed nō eandem numero, sed eandem specie, quæ est effectus, & non forma calidi innati similiarium partium.

Neque fetum totū (vt aiunt) in suo exordio credimus esse calidum innatum: quia tūc in fetu sunt sua excrementa, humores, spiritus, influentes, quæ reuera non pertinent ad calidum innatum, quod est initium omnium operationum, & licet ex Galeno in apparente genitura excreta, quam enarrat Hippocrates lib. de natura pueri de Psaltria, sit calidum innatum, atque ossa, venæ, arteriæ, nerui, tendines, vel ligamenta appareant; tamen non est dicendum, calidum innatum formaliter esse carnem illam mollem, seu illum sanguinis grumum, sed in grumo, seu car-

ne molli esse ipsum calidum innatum, seu temperamentum primigenium: nonne præter temperamentum in grumo illo sunt humores spiritus influentes, & excrementa?

Tertia dubitatio, quomodo calidum innatum potest esse temperamentum (vt ostensum est) si temperamentum est vna qualitas, vt docet Auicennas, resultans ex actione, & passione contrariarum qualitarum? Quæ Auicennæ opinio maximè consentit doctrinæ Galeni in lib. de temperamento.

Respondetur, temperamentum sumi duobus modis, vel pro qualitate prædominante, quæ qualitas est accidens calidi innati, seu temperamenti essentialis: hoc modo temperamentum est in Prædicamento qualitatibus: vel sumitur temperamentum penes subiectum factum ex sem. & sang. menstruo, vnde fit calidum innatum, quod est temperamentum essentialiter, & totum esse partium similiarium: hoc modo est in prædicamento substantiæ.

De hoc temperamento Galenus 1. de Vsu. P. 9. habet hæc verba, „ Qui dicit carnem, dicit totum esse carnis, qui dicit os, dicit totum esse ossis: hoc totum esse ossis, vel carnis dicit esse temperamentum. Nos addimus hoc totum esse partium similiarium esse calidum innatum, per quod singulæ partes differunt inter se: sic argentum differt ab auro per suum calidum innatum, seu per eius temperamentum essentialiter.

Sic Galenus 2. de fac. naturalibus dicit temperaturam esse causam actionis: tertio verò de causis pulsuum vult calidum innatum esse causam actionis, qui calor innatus est ille qui concoquit, 3. de Placitis septimo dicit, calidum innatum esse causam omnium naturalium actionum: quare calidum innatum in idem recidit cum temperamento.

Hac ratione Galenus 6. de plac. cap. 3. videns temperamentū esse totum esse partium dicit, si aliqua pars corporis haberet cerebri temperamentum haberet quoque cerebri operationes: quia si haberet cerebri temperamentum haberet ventriculos, & alias cerebri conditiones quæ per-



pertinent ad compositionem: quia compositio seu conformatio collocata est à Galeno 1. de Vſu P. 9. inter ea quæ neceſſariò accidunt temperamento.

Quarta dubitatio: probatum est ſuperius à Galeno, calorem innatum eſſe opificem omnium operationum: tamen Galenus 1. de loc. aff. vlt. vult à cerebro, vt lumen à ſole, & 2. ad Glauc. cap. 2. vult à corde, iecore, & cerebro facultates in totum corpus deſluere, & inde à facultatibus operationes: ergo non à calido innato.

Reſpondetur à iecore, & corde facultates materialiter, & nõ formaliter effundi: dicimus materialiter, quia à Iecore non facultates naturales, ſed ſanguis tamquam pabulum tranſmittitur in totum corpus: quia ex Galeno 1. de loc. aff. vlt. facultates naturales ſunt connatæ, & non tranſmittuntur in alias partes.

A corde vero tranſmittitur ſpiritus vitalis, vel ipſorum radij in omnes corporis partes, qui ſunt calidi innati pabulum: ſic vita ſingularum partium corporis immediatè dependet à calido innato: cor igitur dat mediatè vitam, quatenus dat pabulum calido natiuo: quod inſeruit non pro vita, ſed pro vita diuturniori, quod non ita benè intellexit Ariſtoteles, vt Galenus: Ariſtoteles enim putabat à corde non ſolum vitam immediatè prodire, ſed ab ipſo omnes alias operationes.

Deinde reſpondemus, iecur quoque mittere facultatem ſanguificandi omnibus venis, & cor facultatem pulſandi omnibus arterijs: quare cum venæ, & arteriæ per totum corpus ſint diſſeminatæ, non immeritò ſecundum hunc ſenſum Galenus dixit iecur, cor, & cerebrum communicare ſuas facultates toti corpori.

Quod verò qualibet corporis pars viuatur proprio, & innato calore, & non calore cordis, vel hepatis, Galenus his verbis primo de loc. aff. vltimo declarat, „ ſi eſſentia partium eſſet permanens non indiguiſſet venis, & arterijs: per quæ verba oſtendit quamlibet partem viuere proprio, & innato calore: viuere vero calore cordis, & iecoris non ad vitam, ſed ad longiorem vitam.

Cerebrum verò cõmunicat facultatem

ſentiendi, & mouendi dependentem ab ipſo cerebro, vel ſpinali medula; itaut à ſpiritibus animalibus, vel ipſorum radijs, immediatè & effectiue animales operationes depẽdeant: ideo Galenus primo de loc. aff. citato vult, partes præditas ſenſu & motu recipere facultatem à cerebro, vel à ſpina, itaut interdum lædatur ſenſus, vel motus nulla exiſtente mala affectione in ipſis partibus, quod non poteſt dici de naturalibus facultatibus: ſemper enim læſio facultatis naturalis ſupponit affectum eſſe per eſſentiam: quia naturalis facultas eſt conata, neque aliunde venit.

### Q V Æ S T. LVI.

*Quotuplex ſit calidum innatum ſeu temperamentum innatum.*

**R** Eſtat, vt videamus quotuplex ſit calidum innatum ſeu temperamentum innatum, quod dat eſſe partibus ſimilaribus. Ex Antiquis Latinis, & tandem ex Hugone Senenſi tria dantur, tẽperamenta.

Primum eſt temperamentum innatum ſiue implantatum ab ortu naturæ, quod à Galeno primo aphoriſmorum com. 1. 5. vocatur vniuerſa ſubſtantia, quod eſt initium omnium operationum: per hoc temperamentũ (vt docet Galenus primo de Vſu. P. cap. 9.) os eſt, os, & caro eſt caro.

Secundum eſt calidum influens ſeu temperamentum influens: hoc quoque poteſt dici innatum, quia licet ſit influens habet in ſe ipſo ſuum innatũ calorem: hoc tranſmittitur à corde, & à cerebro in ſingulas corporis partes, in quibus efficit quandam craſim ſeu temperamentum, quod dicitur influens, quod non eſt tamquam forma partium, vt putat Auerroes 4. coll. cap. 2. ſed eſt tamquam materia ſeu pabulum, quo nutritur calidum inſitum, & implantatum hocquẽ promouet partes ad agendum, alioqui torpent, & ſeriantur: hoc temperamentum eſt calidum & humidum, & non ſiccum, vt nonnulli putant: quod patet ratione, & auctoritate: ratione: quia vita quæ ab hoc calido dependet conſiſtit in humido: auctoritate, quia Ariſt. lib. de long. & breuit. vite idem conſirmit.

Quod



Quod verò hoc calidum influens non solum à corde transmittatur in omnes corporis partes, sed etiam à cerebro, probatur experientia: ex eo quia pars corporis paralytica affecta, radijs facultatis animalis destituta excoarctatur & refrigeratur, licet cor, & arterie partis laesae nullam prorsus laesionem habeant.

Tertium temperamentum est mixtum ex innato, & influente: ex innato tamquam forma, ex influente tamquam ex pabulo tam nutriente calidum implantatum, quam actiones promouente, atque ad actum ipsum illas reducete.

Ab hoc temperamento sic mixto immediate, & adaequatè dependent operationes omnium partium corporis: per hoc temperamentum oculi vident, & ceterae corporis partes exercent sua officia: per hoc cerebrum generat spiritus animales, dum spiritus vitales influunt in plexum mirabilem: ubi ferunt quādam crasim seu temperamentum, quod dicitur influens, ex quo, & ex innato fiunt animales spiritus, quibus exercentur operationes animales.

Sic ventriculus si diminutè chylicat vel ob defectum caloris influentis à corde in ventriculum ob nimium coitum dissipati, vel ob defectum spiritus animalis influentis à cerebro ob nimiam stultitiam, & nimias cogitationes, certè tunc non est confugiendum ad stillicidia, ut faciunt Medici Plebei, quoniam tunc esset confugiendum (si defectus esset ratione spiritus cordis ob coitum consumptum) ad cibos, qui faciliè augere possent spiritus vitales, quales sunt carnes pulorum, vina odorifera, ad diambaram, ad confectionem hiacinthinam, & ad species cordiales. Si verò defectus esset ratione spiritus animalis consumpti ob nimias cogitationes confugiendum esset ad quietem animi, & corporis: ad somnum, qui tenet in gignendis spiritibus vitalibus, & animalibus tenet primum locum. Si verò ob potum frigida laderetur chylicatio, tunc iuarent olea calida, & stillicidia super ventriculi fundum, & alia id genus, quae ventriculo applicantur.

Sed praeter temperamenta proposita dantur duo alia temperamenta: alterum quod conuenit toti indiuiduo: alterum

verò quod conuenit alicui particulae similari, quod solum consistit in mutua actione, & passione quatuor qualitatuum accidentium. Haec duo temperamenta valde differunt ab innato, ab influente, & à mixto ex his: quia haec tria respiciunt substantiam: haec duo postremo proposita respiciunt accidentia.

Quare loquendo de calido innato seu de temperamento innato essentiali dicimus, hoc calidum innatum, seu hoc temperamentum essenziale reperiri in omni mixto ut mixtum est: quod probatur, quia omne mixtum est putredini obnoxium: at sic est, quod ex Aristotele 4. Meteorum de ratione putredinis est corruptio proprii & innati caloris: ergo in omni mixto erit calidum proprium & innatum, quod nos vocamus temperamentum essenziale ipsius mixti.

Sed si loquamur de calido innato, quod pertinet ad No. dicimus quod triplex sit: primum est ἀρχήγονον, quod ex Galeno lib. aduersus Lycum cap. 7. statim fit ex semine, & sanguine menstruo. In hoc calido collocata est virtus alteratrix, quae de nouo fabricat nervos, membranas, & ceteras partes similes, mox virtus formatrix, quae componit, datque partibus viuentibus situm, numerum, figuram, & meatus, ut probatum est superius.

Secundum calidum innatum est constitutio partium similiarum, seu temperamentum partium similiarum, quod dependet ab archigono idest à semine, & sanguine menstruo, ut filius à patre, quod probatur ex Galeno lib. aduersus Lycum loco citato ubi dicit ex semine, & sanguine menstruo fieri constitutionem similiarum.

Similiter Galenus 2. de sem. cap. 4. habet hanc sententiam, „ ut primum semen coniectum est in vterum, vna pars in membranam, alia in vasa conuertitur. Eadem vasa quoque generant materiam seminalem, sed non ita excoctam, & perfectam (ait Galenus) quod possint de nouo generare partes similes, ut facit illud archigonon, quod statim ex semine & sanguine resultat, antequam genitrix sint similes partes. Ex his colligimus, quod

secun-



secundum calidum innatum fiat ex sem. & sanguine mēstruo per veram generationem, itaut definant esse illud semen, & sanguis mēstruus, & aliud simile generetur, a secundo calido idest à temperamento similariū factū ab archigono calido, quæ feminalis subitātia specie conuenit, sed non numero cum primo semine efficiente calidum archignoni.

Quare, licet Galenus dicat loco citato, & in hoc comm. quod idem semen perseueret vsque ad obitum, intelligit idem specie, & non numero: ridiculum enim est quod semen parentum perseueret in filio vsque ad obitum: quasi quod esset ingenerabile, & incorruptibile.

Tertium calidum natiuum conuenit sanguini, & spiritibus, quatenus sunt corpora mixta: habent enim suum calidum innatum seu temperamentum essenziale, per quod spiritus sunt spiritus, & sanguis est sanguis. De his tribus duo viuunt, nempe calidum natiuum archigonum, & natiuum partium similariū, quod est ipsum esse, & ipsum viuere illarum; calidum verò innatum humorum, & spirituum non viuunt: ideo habet solum vsum, & non actionem: actio enim solum à viuētibz perficitur.

Hinc in corpore ægrotantium duæ obseruantur intemperies: vna in solidis, quæ primariò edit actionem: alia in humoribus, & spiritibus, quæ secundariò solum lædit actionem, quatenus scilicet solidarum partium temperamentum, seu calidum innatum officit. Curatio quoque varia est: quia intemperies, quæ primariò est in solidis, alterantibus tollitur: quæ verò est in humoribus, purgantibus, nec non etiam alterantibus.

Hanc distinctionem, quæ est Galeni (vt infra) medici vulgares nō animaduerrunt: ideo dum medentur sæpè ægrum præcipitant. Hanc distinctionem proponit Galenus 8. de comp. med. secundum locos cap. 7. vbi dicit, dari duas intemperaturas in hepate: vnam in parenchymate: aliam longè diuersam in humoribus contentis in arterijs, venis, & sparsis viceris. Idem dici potest de intemperie omnium partium, quod videlicet alia sit in solidis, alia

in humoribus: vnde sæpè sequitur inæqualis intemperies: itaut humorum intemperies sit humida, & solidæ partis sit sicca.

Non enim valet, intemperies in humoribus est humida: ergo est quoque humida in parenchymate: ideo Gal. 2. de temperamēti 2. dicit senes quo ad solida sunt sicci; quo ad humores sunt humidi. Parimodo hydropici quoad solida sunt sicci, quo vero ad humores sunt humidi. Quod solida hydropicorum sunt sicca patet ex Galeno in arte parua cap. 59. vbi loquens de habitu sicco ait: si caro est dura, & pauca habitus siccus est: sed sic est, quod caro hydropicorum est pauca & dura: ergo quo ad solida sunt sicci: quoad excrementa sunt humidi.

Nec valet, aqua hydropicorum, cum sit humidissima, ex necessitate intemperiem humidam in solidas partes introducat oportet: quia Galenus 4. aphorif. comm. 13. loquens de aqua habet hæc verba „ aqua neque epota, neque extrinsecus occurrans natura apta est solidas animales partes humectare, licet enim aqua madefaciat, non tamen ex necessitate habitum humidum facit. Similiter potest stare catarrhus cum sicca intemperie: quoniam est Galeni 2. de temperamentis ultimo: catarrhum sua natura humidum & pituitosum à sicca intemperie fieri posse: quod Sebastianus Paparella non intellexit.

Dubitatio occurrit circa temperamentum influens à corde, & cerebro: non enim videtur, quod dari possit temperamentum influens: quia temperamentum est constitutio: constitutio est quid in facto esse: influens verò virtus solum est in fieri: ergo implicat dicere esse temperamentum, & esse influens.

Respondetur, quod influens virtus, quatenus est influens, non sit temperamentum formaliter, sed effectiue, quatenus efficit, dum in aliquam partem influit crasim seu temperamentum quoddam, quod deinde est in facto esse, & est vera constitutio.

## Q V Æ S T. LVII.

*An calor innatus differat specie, vel gradu  
ab ascititio.*

**A**N calor innatus, & ascititius sint duo calores specie, vel solum gradu distincti, duæ vagantur per scholas opiniones. Quidam dicunt, calorem ascititium differre specie ab innato: itaut in corpore animato sint duo calores realiter, & specificè distincti. Quidam verò dicunt, naturalem calorem, & ascititium non differre specie, sed solum gradu, & intensiorie, quia dum eadem caliditas nativa calidi nativi fit mordax dicitur ascititia, quæ non differt specie à qualitate nativa, sed gradu.

Qui putat esse duos calores specie distinctos, inter quos erat Rudius amicus ex animo, conantur id probare auctoritate, & ratione. Auctoritate: quia Galenus 1. Prognost. côm. ultimo dicit, in puris generatione modò apparere indicia nativi caloris vincentis: modò apparere indicia extranei caloris vincentis: ergo erunt duo calores specie distincti. Accedit quod Galenus 2. aphor. 47. dicat, pus fieri à calore mixto ex naturali & præter naturam: ergo erunt duo specie distincti.

Idem confirmant ratione, quod scilicet caliditas nativa, & ascititia specie differant hoc modo. In febribus dantur duo scopi, alter conservandi calorem partis, alter verò extinguendi calorem febrilem: hinc dari quoque (dicunt) duo remedia, alterum roborans, & conservans calorem naturalem, alter verò curatorium, & extinguens calorem extraneum: ergo duo erunt calores specie distincti.

Secunda ratio: si vnum, & idem esset calor febrilis, & innatus, nunquam fieret sanitas, & si fieret, à quo? Postremò addunt; si vnum & idem esset calor febrilis, & innatus: destructa febre destrueretur calor nativus, & sic omnes febres essent mortales.

Pro solutione argumentorum. Primo notandum, calidum nativum dupliciter considerari, vel ut est corpus mixtum pertinens ad prædicamentum substantiæ: &

ut tale est inalterabile: & ut tale neque effectivè efficit febrem: quia substantia est inalterabilis: ideo in eius prædicamento neque alterationes, neque potentiæ agendi collocantur: quia & alteratio, & potentiæ agendi pertinent ad prædicamentum qualitatis. Vel consideratur calidi nativi qualitas accidentalis, quæ ut talis pertinet ad prædicamentum qualitatibus: hac ratione, & est alterabilis, & suscipit magis & minus. Quando verò Galenus 1. aphor. côm. 16. dixit, febrem esse conversionem nativæ caliditatis ad igneam intellexit de caliditate, quæ est qualitas calidi nativi, quæ est alterabilis, & suscipit magis, & minus, & non de substantia calidi nativi: dixisset enim esse conversionem nativi calidi, & non nativæ caliditatis.

Secundò notandum, quod caliditas, quæ est qualitas nativi caloris consideretur vel ut est moderata, vel immoderata: ut moderata est mitis, suavis, & iucunda, non acris, & fuliginosa: immo quo moderatior eo excellentior est in operatione, id est in concoquendo.

Hic obiter illorum erratum animadvertitur, dum putant, coctionem quæ fit in ventriculo iuvare calidis, & acris, ut pipere, & similibus, quæ concoctionem maximè perturbant: si verò consideretur, quatenus est qualitas nativi caloris immoderata, tunc est acris, mordax, fuliginosa, & aliquando febrilis: hæc dicitur ascititia, quæ oritur dum siccitas adnectitur calori: quia siccitas est caloris lima. Hæc ascititia solum gradu, & intensione differt à caliditate naturali: quia est eadem caliditas naturalis intensior facta vel ob humidum nativi deperditionem, vel ob calorem extraneum: differt gradu à nativa eo modo, quo differt immoderata caliditas aquæ à caliditate moderata.

Quod verò hæc caliditas ascititia differat gradu à nativa; probari quoque potest auctoritate Hippocratis, Aristotilis, & ratione ab experientia desumpta. Auctoritate Hippocratis in hoc aphorismo: ubi dicit, senes non æquè in febres acutas incidere, ut iuvenes; quia modicum habent cali-

cali-



calidi natiui : argumentum Hippocratis esset vanissimum, si caliditas natiua differret specie à febrili : quia possemus dicere calorem febrilem differre specie à natiuo : ideo argumentum esset vanum : posset enim stare modicum natiui cum multo ascititio, si natiuus differret specie ab ascititio : eatenus valet argumentum Hippocratis, quatenus calor natiuus conueniat specie & differat gradu à febrili & ascititio, & non alio modo.

Probatur quoque auctoritate Aristotelis, quod natiuus non differat specie ab ascititio : quia Aristoteles, dum in secundo de generatione & corruptione tex. 23. per numerum primarum qualitarum concludit quatuor esse elementa, quia quatuor sunt qualitates : argumentum esset vanum, quia si essent duo calores specie inter se distincti, quinque essent primæ qualitates, & sic argumentum Aristotelis concluderet quinque esse elementa, & non quatuor.

Præterea probatur ratione : quia si calor febrilis specie differret à natiuo, cadauera quoque possent febricitare, dum putrescunt.

Demum patet ratione ab experientia desumpta : quia si iste calor ascititiuus, & febrilis differret specie à natiuo, non auferret morbos perniciosos, nec sanitatem introduceret eodem prorsus modo, sicuti facit natiuus calor.

Quod verò febrilis calor introducere possit sanitatem, perinde ac natiuus calor, confirmatur ex Hippocrate, Platone, & experientia ipsa. Ex Hippocrate 2. aphorif. 26. ubi dicit, calorem febrilem iuuare conuulsos. Similiter 7. aphorif. § 2. habet febrem auferre dolorem hepatis vehementem ; & licet febrilis calor sit immoderatus, tamen respectu conuulsionis, vel doloris à frigida causa prodeuntis est moderatus.

Ex Platone in Timæo probatur, ubi habetur, febrem sanare distentiones à flatu factas.

Idem cõfirmatur experientia : quia ipsa quartana febris sanat conuulsos, perinde ac natiuus calor : ideo Galenus 5. aphorif. 71. dicit, calorem quartanæ concoquere

humores, qui faciunt conuulsionem : si specie differret à natiuo, idem non efficere.

His positis facile respondemus ad omnia argumenta.

Ad primum dicimus, caliditatem natiuam in vna parte esse posse moderatam : in alia verò immoderatam : quo fit, vt modò appareant indicia caloris moderati, modò immoderati. Sic in apostematibus caliditas natiua potest esse moderata in solidis, vel in aliqua parte solidorum, & immoderata in humoribus, qui debent conuerti in pus : quia fieri non potest, vt aliqua pars habeat calorem moderatum, & immoderatum respectu vnius & eiusdem.

Neque rectè dicunt nonnulli de hepate hydropicorum febricitantium, quod sit frigidum, & calidum, nempe quod habeat intemperiem frigidam & intemperiem calidam respectu vnius, & eiusdem partis hepatis : negamus in natura inueniri duobus contradictoria esse simul vera : negantque ipsi Theologi, quod ipse Deus id efficere possit, quia hoc Deo tribuere esset defectus, & non perfectio.

Dicimus nos de hepate hydropicorum febricitantium, quod sit frigidum, & calidum respectu diversorum, frigidum respectu caliditatis innata ipsius hepatis : calidum verò respectu caliditatis influentis : quia febris non est immoderata caliditas calidi natiui ipsius hepatis : quia hæc loco distanti non dimouetur ; sed est immoderata caliditas calidi influentis, quæ formaliter est ipsa febris, quia hæc caliditas est illa, quæ à corde communicatur per venas, & arterias omnibus corporis partibus, & non caliditas natiua implantata, quæ à corde non provenit.

Præterea calor immoderatus, qui conuertit humorem in pus, non est æquè immoderatus in humoribus, & in solidis partibus : quia non fieret conuersio in pus, sed vel fieret corruptela, vel gangæna, vel mors : omnis enim pars, quæ sanatur, ratione partis sanæ sanatur.

Hinc Diuus Thomas 2. de anima tex. § 8. protulit hanc sententiam in nostra arte notatu dignam, „ Sanitas alicui reddi non potest, nisi aliqua pars sana sit. Pati-



modo Galen. in 3. parte artis med. 90. ubi agit de scopis sanandi vlcera dicit, partem circumstantem sanam sanare ipsa vlcera. Idem 4. meth. cap. 1. habet hæc verba, „ Nec vlcus, nec vulnus sanari potest, nisi pars circumstans ipsum vlcus, vel vulnus sana sit.

Sic nos dicimus, dum fit pus, nisi aliqua pars esset sana, pus fieri non posset: sanitas est in parte solida vicina: in humoribus verò, qui debent conuerti in pus, debet esse calor immoderatus: quando verò calor esset æquè immoderatus in humoribus, & in solidis, nullomodo posset fieri in pus conuersio, sed necessario sequeretur vel humcrum corruptela, vel gangrena, vel mors.

Quando Rudius dicebat, contraria ab vnico calore non posse prouenire: sed febrilem à calore extraneo, & sanitatem à naturali: istosque calores propterea specie differre.

Respondemus respectu diuersorū graduum contraria euenire posse: sic eoctio fit à caliditate natua moderata: ab eadem caliditate natua reddita immoderata fit calor febrilis acris, & mordax.

Dum dicebant, pus fieri à calore mixto, & propterea esse duos calores, duos scopos, & duo remedia.

Respondemus esse duos calores diuersos gradu, & non specie, qui sunt in diuersis partibus, & inde oriri duos scopos, & duo remedia.

Dum dicebant, si vnus esset calor, destructa febre, destrueretur calor natuus.

Respondemus destructa febre destrui qualitatem immoderatam caloris natui, & non calidum natuum, quod est substantia.

### QVÆST. LVIII.

*Quodnam sit subiectum caloris febrilis, & naturalis.*

**Q**Varitur in hoc aphorismo quodnam sit subiectum caloris febrilis, & caloris naturalis. Nos arbitramur, idem esse subiectum caloris naturalis, & caloris febrilis. Primò quia Gale-

nus in comm. 16. huius sect. inquit, febre esse conuersionem caliditatis natue ad igneam, intelligendo per caliditatem natuam qualitatem accidentalem calidi natui, & non substantiam calidi natui: quia si per caliditatem natuam intellexisset substantiam, dixisset febre esse conuersionem calidi natui, & non caliditatis natue. Deinde per caliditatem natuam intelligi non potest substantia: quia substantia non alteratur, neque est capax alterationis: alteratio enim pertinet ad predicamentum qualitatis: quando verò ipsa substantia calidi natui conuertitur ad igneam, tunc non sequitur febris, sed etiam ipsa mors idest ipsa substantialis corruptio, quæ est mutatio totius in totum.

Præterea ex Hippocratis aphorismo intelligimus, idem esse subiectum caloris naturalis, & febrilis: quia, inquit Hippocrates non æquè incidere in febres senes, vt iuuenes, quia senes modicum habent calidi natui: ratio Hippocratis esset vana si subiectum caloris febrilis esset diuersum à subiecto caloris naturalis, namque posset stare, quod senes haberent modicum calidi natui, & plurimum caloris acritis, ob quem essent magis proclives ad febre, quam iuuenes.

Colligimus ergo, quod subiectum natue caliditatis conuerse ad igneam sit eadem calidi natui substantia, quæ sit subiectum immediatum, & adæquatum omnium februm: ac meritò quidem, quia, dum fit alteratio alicuius qualitatis, illud debet constitui subiectum alterationis, quod est subiectum qualitatis alterate in qualibet enim mutatione, quæ fit à contrario in contrarium debet constitui medium subiectum, & hoc in febribus est substantia caloris natui: at quia in omni febre afficitur cor, & deinde totum corpus: ideo primum subiectum februm erit calidum innatum cordis, & deinde calidum innatum aliarum partium.

Montanus putat, subiectum februm non esse calidum innatum, sed calidum existens in sanguine, & spiritu: sed quomodo poterit saluare Galenum, qui dicit comm. 16. huius sect. febre esse conuersionem caliditatis natue ad igneam?

Præ-



Præterea calidum nativum semper minuitur, & nunquam augetur: caliditas verò sanguinis, & spiritus aliquando augetur, & aliquando minuitur: immo interdum accidit, quod iuvenes calidum huiusmodi huiusmodi pariantur, ut ferè totus sanguis, & spiritus resoluantur: relinquanturque frigidi, & exangues: deinde tamen brevi spatio iterum sanguis & spiritus augentur, & corpus incalcescat, quod calido innato certè convenire non potest: quia hoc calidum nunquam augetur: Galenus lib. de marcore habet, si calidum innatum posset augetur, vita reddi posset æterna & immortalis.

Prima dubitatio ex dictis oritur de subiecto febris: quia calidum nativum subiectum febris certè esse non potest: quia est substantia, & substantia est inalterabilis.

Pro solutione sciendum, quod duplex est calidum nativum: alterum quod nunquam discedit à parte, in qua est, ut docet Galenus comm. 1. huius primæ sectionis, ubi confirmat iuramentum, dicendo, non per Iovem discedere è suis sedibus: quia reuera apud Galenum calidum innatum carnis est ipsum esse carnis, vel eius temperamentum: at esse carnis non discedit à carne, vel ab ipso temperamento, quod idem est, ut alibi ex Galeno ostendimus: Ideo hoc calidum nativum quoad eius substantiam non pertinet ad rationem formalem ipsius febris.

De hoc calido loquens Galenus lib. de rigore, & palpatione cap. 6 sic illum definit: calidum innatum est substantia quædam perpetuo mobilis, intus extra, & extra intus, quæ calidi definitio convenit quoque influenti calori: quia etiam influens habet suum proprium innatum ad differentiam calidi nativi implantati, quod movetur quidem intus, & extra quod ad qualitatē, nō tamen facit illum transire ab una ad aliam partem, ut facit influens.

Calidum implantatum habet duplicem motum, unum intus deorsum ad pabulum, quod alitur: alium extra sursum ad ignis spiritum, quod in omni igne observatur ad instar ignis lucernæ, sed non mutat locum.

His positis quādo Galenus dixit, febrem

esse conversionem nativi caloris ad igneam dicimus, hanc definitionem primo esse formaliter veram de caliditate influente: de caliditate vero innata, & implantata esse veram effectivè, quatenus videlicet est causa efficiens: quia dum caliditas implantata redditur immoderata efficit caliditatem influentem quoque immoderatam, quæ formaliter constituit febrem: ideo soliti sumus sic distinguere: quod illa febris definitio respectu caliditatis implantatæ sit causalis: respectu verò caliditatis influentis sit formalis: quia calor febrilis, qui diffunditur per universum corpus inheret caliditati influenti, & non innatæ, & implantatæ.

Hac ratione posset aliqua ex parte defendi Montanus dicens, subiectum febris esse calidum existens in sanguine, & spiritu.

Illorum tamen sententia, qui dicunt, febrem formaliter esse conversionem caliditatis nativæ ad igneam, non potest defendi, quia solum caliditas influentis caloris immoderata est illa, quæ potest diffundi in totum corpus per venas, & arterias, quæ dum redditur immoderata est causa formalis ipsius febris: vel formaliter est ipsa febris: caliditas verò immoderata calidi implantati est causa efficiens ipsius febris.

Secunda dubitatio exoritur ex dictis, non videtur, quod calidum nativum sit subiectum febris, quia ex Galeno 1. de differentiis morborum in principio, in febre ephemera & putrida spiritus, & humores sunt in calefacto esse: partes verò solidas quæ à calido nativo constituuntur, sunt in calefactis sed sic est, quod de ratione febris est etiam calidum in facto esse.

Respondetur in spiritibus alteratis, & in humoribus putridis non esse formaliter febres, sed solum effectivè, ut alibi probavimus ex Galeno 1. 1. method. & tertia parte artis med. formaliter verò febrem putridam & ephemeram esse in solidis.

Quādo verò dictum est, in febre ephemera, & putrida partes solidas esse in calefactis id intelligitur respectu hecticæ, quæ non solum est in calefacto esse, sed etiam in habitu: Galenus enim lib. de differentiis symp. vult, quod de ratione morbi sit aliquid in facto esse ad differentiam symptomatum,



matum, quæ sunt in fieri, & insequuntur morbum, vt umbra corpus: ideo febris ephemera & putrida sunt morbi, quatenus sunt in calefacto esse: quatenus verò sunt in calefieri non dicuntur morbi.

Quoad subiectum caloris ascititij similiter pro subiecto habet calidum natium: ascititius enim calor sic fit: dum ex sem. & sanguine menstruo oritur calidum natium, tunc in prima generatione est calidissimum & humidissimum, sicuti docet Hippocrates 1. de natura humana 12. his verbis „ Nam hoc scire expedit hominem prima die calidissimum sui ipsius esse, extrema vero die frigidissimum.

Deinde repetit paulo infra, nempe tex. 17. his verbis „ Atque hac ratione homo prima die, quo maius suscipiat incrementum, eo sit calidior. Quo etiam postrema die plus marcescit & frigidior sit necesse est.

Idem calidum natium est illud quod efformat prima stamina omnium partium corporis, quibus fabrefactis incipit calor absumere humidum: vnde partes aliquæ duriores, aliquæ molliores redduntur: sic ossa in principio veluti cerea in infantibus apparent: deinde duriora semper vsque ad vltimam senectutem redduntur.

Hinc 17. ossa in infantibus deficiunt: quia calor adhuc sufficienter non exsiccat. Hæc quæ deficiunt sunt duo ossa bregmatica, quæ in prima infantia adhuc sunt cartilaginea: os ithmoide: duo ossa stilloidea: quatuor ossa cocygis: 3. dentes: 48. semmoidea: 16. ossa corporum: octo tarsorum, & dec. patellæ, quæ ossa in adultis inueniuntur: sed in infantibus non sunt: sunt tamen dum pueri incipiunt exsiccati. Itaque prima exsiccatio est primus gradus caloris ascititij, idest acris, & mordacis: quia de ratione ascititij caloris est mordacitas: causa vero, cur dum siccitas adnectitur calido nativo, fiat caloris mordacitas, est, quia siccitas est lima caloris: hæc mordacitas pertinet ad qualitatem calidi nativi: quare concludimus, idem esse subiectum febrium, & caloris ascititij.

**Q**uo ad calorem influentem. Medicus per calorem influentem intelligunt spiritus, & ipsorum radios, valde tamen dissentiant de numero spirituum. Quidam dicunt dari tres spiritus, nempe animales, vitales & naturales.

Quidam, vt Manardus, & plurimi alij negant dari spiritus naturales: conceduntque solum animales, & vitales. Similiter Auerroes primo coll. cap. 14. habet hæc verba „ spiritus duo sunt: spiritus apparens in corde, & spiritus apparens in cerebro: sed spiritus in hepate non apparet per viam sensus: ecce quod ex Auerroes sunt solum duo spiritus.

Auicennas verò, an detur hic spiritus naturalis, videtur dubius.

Quidam verò, vt Argenterius, tenent dari solum vnum spiritum, huncque esse vitalem, qui dum est in corde exerceat munia vitæ, dum est in cerebro præbeat sensum, & motum cerebro, & vniuerso corpori: propterea negant dari spiritum naturalem, & animale speciem diuersos à vitali.

Sed antequam accedamus ad disputationem, an scilicet detur spiritus naturalis, sciendū est, omnes Auctores in hac sententia conspirare, quod de ratione spiritus quatenus sunt spiritus, sit hæc conditio, vt illico influant, vel per se, vel per radios in singulas partes: si per radios in instanti facultates seu virtutes demandari ab illo viscere, in quo fiunt, in omnes corporis partes relinquendo locum, siue viscus, in quo fiunt, ita ut nisi noui spiritus semper fiant, cesset vita, & cessent sensus, & motus.

His positis probabimus auctoritate, & ex experientia non dari spiritum naturalem.

Primum argumentum desumitur à Galeni auctoritate primo de loc. aff. vlt. vbi dicit, virtutes naturales esse conatas partibus, & non esse influentes: inde necessarium colligi posse, non dari ex Galeno spiritum naturalem: ibi enim inquit, virtutem naturalem esse conatam, sicuti virtus magnetis est conata magneti: eius virtus



non quotidie fit, sed semel tantum facta à principio generationis nūquam relinquit magnetem: sic facultates naturales, nempe attractrix, retētrix, cōcostrix, & expultrix à principio generationis semel factæ non amplius fiunt: manentque conatæ partibus, ac nunquam ipsas partes relinquūt.

Quod non potest dici de vitali, & animali; nō de vitali, quia ista relinquit cor, & mittitur in alias partes: quare nisi cor euectio generaret nouum spiritum vitalem, fieret syncope, & cessaret vita.

Non de animali: quia hæc virtus similiter relinquit cerebrum, ac mittitur per vniuersum corpus: quare nisi cerebrum illico generaret nouum spiritum, cessaret sensus & motus, statimque succederet apoplexia: & mors.

Confirmat Galenus 1. de loc. aff. vlt. virtutes naturales non esse influentes, sed semper esse conatas, eo quia morbi pertinentes ad instrumenta naturalia semper sint per essentiam, & nunquam per consensum. Hoc potest probari de intemperie, mala compositione, & soluta vnitatem. Intemperies enim, tumores, & soluta vnitates si in ventriculo, vel alijs partibus naturalibus existant absque dubio euadunt morbi conati illis partibus: quia ab ipsis partibus sunt inseparabiles: ergo ibi sunt per essentiam & nunquam per consensum. Hinc Gal. habet hæc verba loco citato „ Quoties instrumenta naturalia læduntur semper primaria affectione laborant: quia actio naturalis est conata, & non dependet ab alijs principijs: quod certè dici non potest de animalibus: quia partes animales, quæ tales sunt, quatenus habent sensum, & motum, sæpius conflictantur morbo per consensum.

Galenus pro hac re primo de loc. aff. 6. recitat casum Pausaniæ, qui veniens Romæ ex casu è vehiculo percussus circa septimam vertebra cervicis amisit sensum trium digitorum: affectus digitorum erat per consensum à ceruice, & nequaquam per essentiam in digitis: ideo Galenus applicatis emollientibus ceruici sanitatem digitis illico restituit. Nos in simili casu feliciter applicauimus ceruici amoniacum dissolutum in aceto, in quo ebullierint

maluæ, liquiritia, fenugræcum, & lini semina: vnde dispositione scirrhusa ceruicis emollita sensum digitis restituiamus.

Parimodo Galenus 4. de loc. aff. 4. recitat casum cuiusdam, qui amisit sensum pericranæi primaria affectione existente in ceruice. Ibi Galenus reprehendit quosdam medicos, qui vt restituerent sensum pericranio, illud exulcerabant, vt sensum reuocarent: Galenus verò vt primum applicauit calida ceruici, statim illum sanauit: intellexit Galenus illum hominem sub pluuia, & vento impetuoso ambulasse, & circa ceruicem piliū madefactum reddiderit ceruicem stupidam: vnde nervi ceruicis, qui excurrunt per pericranium facti hebetioris sensus, in ipso stupor factus est.

Secundum argumentum probans non dari spiritum naturalem colligitur ex Galeno 3. de facult. naturalibus 14. vbi dicit, de ratione spiritus esse, vt sit tenuior vapore: quare si spiritus naturalis esset in venis exhalaret, quia venæ non sunt densæ, vt arteriæ, in quibus stabulantur spiritus vitales. Immo Galenus non vno in loco laudat Herophilum, qui dicebat, arterias esse sextuplo crassiores venis. Similiter animales spiritus sunt in nervis, qui sunt valde densi, vel sunt in ventriculis cerebri, vel in spina, quæ partes ob crassitiem possunt ipsos coercere, ne exhalent.

Tertium argumentum tale est. De ratione spiritus ex Hippocrate 6. epid. 8. tex. 7. habetur, quod inter ὀρμύντα, id est impetum facientia collocentur: sed sic est, quod facultates naturales nullum habent impetum: ergo.

Quartum argumentum est Manardi, & tale est. Non datur locus generationis pro hoc spiritu naturali: ergo non datur iste spiritus naturalis. Relinquitur ergo, vt duo tantum sint spiritus, nempe vitalis, & animalis; vitalis fit in sinistro ventriculo cordis: animalis verò in ventriculis cerebri. In hepate quidem nulla est cavitates, vbi fieri possit hic spiritus naturalis: quare si non est in hepate locus generationis istius spiritus, nullibi erit: Galenus enim 12. meth. cap. 5. inquit, si daretur spiritus naturalis esset in hepate.



Quoad Argenterium, qui negat non solum naturalem, sed etiam animale, conatur probare vnum spiritum vitalem sufficere; habetque duo præcipua argumenta.

Primum est, quia, inquit, in cerebro vix conspicui posse plexum retiformem, in quo dicunt Medici magnam generari spirituum animalium copiam; deinde plexus est factus ex arterioli, & non ex nervis; ergo ille spiritus, qui existit in plexu, erit vitalis, & non animalis.

Secundum argumentum Argenterius desumit à motu dilatationis pupillæ, dicens, dilatationem non fieri à nervis: quia in pupilla non sunt nervi; ergo illa dilatatio fiet ab arterioli pupillæ: ergo motus proveniet à spiritu vitali, qui deservit per arterioli. Subdit, non ne clauso altero oculo, pupilla dilatatur, sed sic est quod inter pupillam & nervum opticum nullus se inter ponit nervus, sed solum sunt ipsæ arterioli; inde infert, spiritum vitalem non solum inservire vitæ, sed etiam sensui, & motui.

Ad primum argumentum de plexu retiformi, quod sit ita exiguus, ut vix in anatome conspiciatur, labitur Argenterius in plurima errata.

Primum ostendit se non vidisse humani cerebri anatomen: quia plexus retiformis est maxime conspicuus.

Præterea fallitur, dum putat, Galenum arbitrari, in plexu retiformi fieri spiritus animales, quod nunquam somniavit: quia plexus ex Galeno solum præparat materiam pro spirituum animalium generatione: deinde præparata materia spiritus perficiuntur in cerebri substantia.

Demum vacillat, dum reprehendit Galenum, quod sibi contradicat; quia asserat, spiritum animale, modo fieri ex aere, modo ex spiritu vitali, modo ex sanguine, modo in plexu, modo in ventriculis, & modo in cerebri substantia. Ostendit se non legisse Galenum, qui lib. de plac. & alibi vult fieri spiritum animale ex aere attracto per processus mamillares: à spiritu vitali, ut à materia proxima: à sanguine, ut à remota: in plexu præparari, & non fieri, sed fieri in ventriculis, & perfici in cerebri substantia.

Ad secundum argumentum de dilatatione pupillæ, dicimus Argenterium fuisse parum veritatem in Anatome: quoniam causas, cur pupilla dilataretur & contraheretur non sunt arterioli, sed est tunica ciliaris, quæ est basis omnium aliarum tunicarum videlicet corneæ, schlerodis, vitz, coroidis, hyaloidis anterioris & posterioris, & atanz antice & postice. Hæc tunica per stribus nigris colligat crystallinum. Hæc illam habet virtutem movendi modo introsum, modo extrosum crystallinum. Hæc aperit, stringit, pupillam retrahit & protrahit crystallinum. Si illi motus cessent vel ob paralyt, vel ob alias causas visio vel non fit, vel vix fit, quamvis cætera partes sint illæ, sed per pupillam autem.

Possumus quoque respondere, motum illum pupillæ non esse voluntarium: argumentumque nihil probare, quia motus animalis, quem querimus, est voluntarius, & non naturalis.

Quod verò dicitur spiritus animalis, Galenus 1. de plac. cap. 7. probat hæc experientia: Dum aliquis vulneratur visque ad cerebri ventriculos eo modo, quo contingit illi luenti in Smyrnam Ionie, quem cæsum sic refert Galenus in Aphorismis. c. 18. d. m. illud vulnus penetratum visque ad cerebri substantiam aperiebatur, ille juvenis statim amittebat sensum, & motum: dum verò adducebantur labia vulneris, atque clauderetur otificium, statim ille incipiebat recuperare sensum & motum: quia detinebantur spiritus animales, quibus decessis, facultas per irradiationem per universum corpus ita velociter in extremas partes diffundebatur, ac in proximæ.

Quod verò dicitur quoque spiritus vitalis, qui irradiativè, & in instanti radios effundat per universum corpus, quem admodum splendet à Sole: probatur à Galeno in lib. quod sanguis in arteriis continetur cap. 7. evidentissimis experimentis: probato de vitali, facile colligimus de animalis.

Sic de vitæ Galeno probatur, quod in instanti per corpus arterie moveatur & si fistulata in arteria in eam immittatur, & arteria supra fistulam ligetur, tunc quamvis spiritus cum sanguine arterioso diffuat



fluat ad partem inferiorem, nihilominus arteriæ pars inferior motu pulsus omnino priuatur. Addit Galenus loco citato, si mittatur fistula non caua in arteriam incisam, quæ obstruat totam arteriæ cauitatem, hac lege tamen, vt non ligetur arteria supra fistulam, tunc radij per tunicam in instanti transeunt deorsum, & efficiunt pulsationes in parte inferiori ipsius arteriæ: argumento est, quod non spiritus, sed radij transmissi in instanti sint illi, qui efficiant arteriæ pulsationes.

Præterea, quod vitales facultates per radios transmittantur in instanti à corde: patet, quia ligata arteria inguinis, tollitur statim pulsus digitorum pedis: soluta verò arteria, æquè velociter incipit moueri arteriola alicuius digiti, perinde ac arteria capitis: Argumento est, quod in instanti facultates vitales transmittantur.

### Q V Æ S T. LX.

*Quomodo calor natiuus perducatur nos ad senectutem, & mortem.*

**Q**uomodo verò calor natiuus, qui gratia conseruationis productus est, nos ad senectutem, ac mortem perducatur, Galenus 1. de elementis cap. 7. lib. de tabe cap. 4. & 1. de men. san. cap. 2. ponit duas causas necessarias, & ineuitabiles senectutis, ac mortis, quæ à calido innato trahunt originem.

Primæ est calor, qui semper agit in humidum exsiccando: sed vsque ad ætatis vigorem summo cum animantiū beneficio: quia exsiccando superfluum humiditatem partium corporis dat robur ipsis partibus: sed robōratis partibus (proh dolor heu nos miseros) ita perseverat exsiccando humidum radicale, vt perducatur animantia ad senectutem, & ad mortem.

Næquē vlla est contradictio in Galeno dum primo de tuenda citato dicit, calidum innatum semper exsiccare proprium humidum, & nos ad mortem perducere: lib. verò de tabe, calorem non assimilari flammæ: sed nos tueri: quia primo de tuenda san. intelligit nos exsiccare postquam membra per humidi superflui consum-

ptionem reddita sunt robusta: lib. verò de tabe nos tueri, dum absumit humidum superfluum in ætate puerili.

Non tollunt contradictionem, qui dicunt calorem innatum considerari dupliciter, vel vt innatus, & sic nos tueri, vel vt calor & sic nos ad senectutem perducere, quia calor innatus, vt innatus est ille met calor, qui agit in humidum, consideratur vt calor.

Secunda causa mortis est cōtinuus fluor totius substantiæ ab eodem calore natiuo factus, ob quem fluorem animal vnus diei spatio post ortum interiret, nisi esset inuentus cibus, qui remitteret quod continuo deperditur: sed remissio non est æqualis: vtinam reddi posset æqualis, quia succederet agerasia, & corpora redderentur immortalia.

Auxilia pro euitanda morte, si inuenirentur, duorum alterum respiceret, vel prohiberent, nec calor natiuus exsiccaret humidum radicale, vel tātum apponerent quantum continuo deperditur.

Spagirici putant se inuenisse remedium propriam intentione, quod scilicet calor non absumat amplius humidum per vsum auri potabilis: quod est incorruptibile: atque reuera sub orbe Lunæ aliud non inuenitur, quod videatur incorruptibile, nisi aurum: quia in fornacibus, nec vllō alio igne vehementissimo aurum absomitur: quod de alijs rebus dici non potest.

Contra Spagiricos duo sunt argumenta efficacissima delumpta à ratione, & experientia. A ratione, quia alimentum antequam conuertatur in humidum substantiæ cum res transmutari est opere præcium: aurum verò cum non sit obnoxium corruptioni vel transmutationi erit ineptum pro nutritione. Ab experientia: quia hætenus non est inuentus spagiricus, qui diutius viuat, quam rustici nostrates.

Auxilia verò pro secunda intentione, quæ scilicet tantum possent remittere, quantum deperditur, inueniri non possunt: quia in actu conuersionis, seu nutritionis humidum radicale exsiccat. Hinc Auicennas prima primi dicit, si calor naturalis esset infiniti vigoris, nisi quoque humidum esset infinitum, non sufficeret: quia



quia in conuertendo cibum in substantiam, quoduis humidum aliquo spatio exsiccat.

Auxilia verò pro retardantis ambabus mortis causis consistunt in his duobus. Primum in auferendis impedimentis.

Secundum in eligendis humidis alimentis, quæ prohibeant: ne citius iusto exsicce-  
tur humidum radicale: sed hæc duo pro-  
posita non possunt intelligi, nisi hæc qua-  
tuor præstentur.

Primum an cibus qui ingeritur quam-  
maximè restituat deperditum.

Secundum qua hora iterum sit cibandum.

Tertium qualis debeat esse cibus.

Quartum rectus vsus omnium rerum  
nonnaturalium, sed hæc quatuor distinctè  
& particulatim intelligi non possunt, nisi  
per staticam nostram: sine ipsa quidem  
sola coniectura satis incerta hæc perci-  
piuntur.

## APHORISMVS XV.



*ENTRES hyeme, &  
vere natura calidissimi  
sunt, & somni longissimi  
quare per ea tempora ali-  
menta copiosiora sunt ex-*

*hibenda: etenim tunc calor innatus  
plurimus est: unde & pluribus eget  
alimentis, indicio sunt atates, & A-  
thletæ.*

Cum Hippocrates in aphorismo 13. ege-  
rit de victu sanorum sumpta indicatione  
ab ætatibus, & in 14. tradiderit rationem,  
cur senes facillimè, & pueri difficillimè ie-  
iunium ferant: reliquum erat vt ageret in  
hoc aphorismo de ratione victus sanorū:  
sumpta indicatione ab anni temporibus,  
quia, & atates, & anni tempora sunt si-  
gna virtutis indicantis ipsum cibum.

Quod verò agat in hoc aphorismo de vi-  
ctu sanorum, & non ægrotorum, patet: quia

Galenus 1. de ratione vic. 24. loquens de  
victu ægrotorum dicit totum oppositum,  
nempe tempore hyemis in ægtis requiri vi-  
ctum tenuem: tempore vero æstatis vi-  
ctum pleniorē, seu minus tenuem:  
quia ægri tempore æstiuo non ita faci-  
lè possunt vsque ad vigorem perdura-  
re, vt tempore hyberno: est enim Hippo-  
cratis sententia aphorismo 9. & 10. quod  
tantum cibi ægris cōueniat, quantum pos-  
sint perdurare vsque ad morbi vigorem.  
Immo ex Galeno in comm. 4. huius sectio-  
nis vires ipsorum ægrotorum sunt consu-  
ptæ debiles: quia morbo superato statim  
reficiuntur: ideo addit in eodem comm.  
Galenus, si vires quales accepimus vele-  
mus cōseruare, fieret additio ad morbum:  
In hoc verò aphorismo totum oppositum  
dicit, nempe tempore hyemis plus cibi:  
ergo non de victu ægrotorum, sed de victu  
sanorum intelligit.

In hoc aphorismo duo facit, primo pro-  
ponit hunc aphorismum, ventres hye-  
me & vere plus cibi esse dandum. Dein-  
de confirmat aphorismum triplici ratio-  
ne, & duplici experimento.

Prima ratio est, quia tunc plus cibi dan-  
dum est, quando ventres sunt calidiores:  
sed hyeme & verè sunt calidissimi ergo.

Secunda ratio: quia hyeme somni sunt  
longissimi per quos maior sit concoctio:  
ideo plus cibi dandum est.

Tertia ratio aphorismi est: quia hyeme  
calor natiuus copiosior est, quam alijs tem-  
poribus.

Denique confirmat aphorismum dupli-  
ci experimento. Primum experimentum  
desumitur à pueris. Secundum ab Ath-  
letis: ambo hyeme, & vere egent co-  
piosiorem alimento, quam alijs temporibus:  
tuncque magis auidè appetunt cibum:  
ciborum enim cupiditas naturalis signifi-  
cat internum robur: quo existente plus ci-  
bi requiritur.

Tantum enim valet ciborum cupiditas  
in significando virium robur, vt Hippocra-  
tes in Heropito, quia nunquam amisit ap-  
petitum diuinauerit euasurum, licet in ip-  
so essent plurima signa mortalia: die enim  
1co. à morbi principio liberatur à morbo  
lethali.

Quo



Quo ad verborum explicationem αὐτοῦ quod proprie significat cavitatem, seu capacitatem: vnde Cælum deductum est, ἀπο τῆ κοίτης quia chilon seu Cælum significat cavitatem seu capacitatem vniuersi, & non superficiem, seu capacitatis circumferentiam. Dum verò Hippocrates nominat ventrem sine aliqua coarctatione intelligit ventriculum, & intestina: sicuti 6. aphorismorum 14. dum dicit „Hydrope detento, si aqua è venis in ventrem defluerit, soluitur morbus.

Dum verò per ventrem intelligit alias cavitates, cuiusmodi sunt cavitates thoracis, limitat cum alia dictione, sicuti 7. aphorismorum 38. ubi dicit „destillationes in vètre superiore supputant intra 20. dies.

Præterea patet quod in hoc loco per ventrem intelligat ventriculum: quia dictioni vetri appositus est articulus αὐτοῦ qui articulus significat determinatam cavitatem: quamuis aphorismus possit quoque ampliari ad alios ventres, vt ad cor, iecur, lienem, & renes: non tamen applicari potest ad pulmonem, cerebrum, & vesicam: quia istæ partes hyberno tempore sunt frigidiores.

„Hyeme. Pro intelligentia aphorismi sciendum est, annum diuisum esse ab Hippocrate in his aphorismis in quatuor partes, & in lib. de hebdomadibus in septem, vt refert Galenus primo epid. primo côm. primo.

Prima anni diuisio, quæ est in quatuor partes, desumpta est à duobus solstitijs, & à duobus æquinoctijs: ideo Galenus primo epid. & 3. aphorismorum 14. vult, quod ver incipiat ab æquinoctio, quod est circa vigesimum diem Martij, & perduret vsque ad ortum pleiadum seu virgiliarum idest circa octauam diem Maij.

Æstas verò incipit ab ortu pleiadum vsque ad ortum arcturi idest vsque ad octauam diem Septembris circiter, itaut æstas per quatuor menses perduret.

Autumnus ab ortu arcturi vsque ad occasum pleiadum excurrit, qui occasus fit circa decimumquintum diem Novembris.

Hyems verò deinde producit vsque ad æquinoctium vernale, videlicet vsque ad vigesimum diem Martij circiter.

Antiqui tamen, & ipse Hippocrates subdividebant æstatem in duas partes. Hyemen verò in tres, itaut antus illorum esset diuisus in septem partes.

Prima pars æstatis erat ab octaua Maij vsque ad ortum caniculæ, videlicet vsque ad principium Iulij: hanc partem vocabant oram: ideo fructus, qui maturabantur in hac parte, vocabantur orarij: ora significat solem, qui tunc præcipue dominatur.

Secunda pars æstatis erat ab ortu caniculæ vsque ad ortum arcturi, videlicet ad octauam diem Septembris, & vocabatur opora: fructus verò qui maturabantur in hac parte vocabantur oporari, quasi autumnales: opora enim apud Græcos significat autumnum.

Deinde diuidebant hyemen in tres partes. Primam vocabant sementum, idest tempus ferendi.

Secundam vocabant solstitium brumale.

Tertiam vocabant tempus inferendi arbores.

Hippocrates per hyemen intelligit omnes has tres partes, & præcipue mediam: quia in prima parte idest in mense Nouembris ventres adhuc non sunt calidissimi: calidissimi enim sunt in media.

Per ver Hippocrates intelligit præcipue illam partem veris, quæ hiemi adnectitur.

Natura calidissimi. Pro intelligentia sciendum, calidum aliud esse innatum, & aliud ascititium: innatum duplex est, aliud quod est implantatum, quod vt dicit Galenus in hoc comm. est natura animalium. Præterea est forma partium similarium quia vocatur à Galeno primo de Vſu P. 9. temperamentum substantiale, per quod os est os, & caro est caro. Similiter Gal. 3. de temp. 4. vult hoc temperamentum substantiale esse naturam, & vniuersam substantiam partium. De hoc calido innato implantato loquens Galenus in hoc comm. confirmat sacramento, dicendo non per Iouem separari à suis partibus, nec ab ipsis refugere quia est implantatum. De hoc calido innato intellexit Hippocrates in superiori aphorismo, dum dixit „qui crescunt plurimum habent calidi innati: quod tamen (vt probauimus) à prima generatione vs-



que ad obitum diminuitur, vt oleum in lucerna.

Datur aliud calidum innatum, quod à corde transmittitur per vniuersum corpus & vocatur innatum ab Hippocrate in hoc aphorismo, & à Galeno in comm. A medicis vero vocatur influens: hoc enim reuera non est forma partium, sicuti est implantatum: quia hoc influens hyberno tempore augetur, dum per antiperistalsim refugit ad partes internas, vnde fit quod ventres sint calidiores, æstate verò frigidiores. Calor innatus seu implantatus nunquam augetur; sed semper minuitur ad instar olei in lucerna: nec sequitur anni tempora, vt scilicet hyeme suscipiat augmentum, æstate decrementum: hic calor sequitur ætates, quæ nunquam redeunt: de hoc non intelligit Hippocrates in aphorismo.

Calor verò de quo intelligit est ille, qui sequitur anni tempora, qui dicitur influens, quippe à corde, & à cerebro effunditur in totum corpus: vnde hyeme actiones vitales, & animales sunt robustiores: æstate debiliores: hic sequitur anni tempora: hyeme enim est robustior ob antiperistalsim: ideo eger copiosiori cibo: æstate oppositum obseruatur. De hoc loquens Aristoteles 2. Probl. 33. dicit, hyeme calorem intus se contrahere, ideo melius concoquere: æstate verò diffundi per corpus; ideo minus concoquere.

De hoc influente calore Hippocrates 5. aphorif. 21. loquens de conuulsione habet hanc sententiam „ larga frigida perfusione æstate media reuocat calorem ad intus, & sanat conuulsionem. De hoc calore intelligit Hippocrates in hoc aphorismo. De hoc Galenus 3. de causis pulsuum 6. & lib. 8. de plac. 7. loquens, inquit, tempore hyemis, & veris plurimum esse calidi natiui, & parum afeititij: contra in æstate plurimum afeititij, & parum natiui.

Notandum tamen per calorem afeititium intelligendam esse qualitatem immoderatam caloris naturalis, seu natiui, & non substantiam calidi natiui, quæ non est alterabilis, sicuti neque aliæ substantiæ alterabiles sunt, quia alteratio solum est in prædicamento qualitatis.

Notandum, aphorismum verificari de robustis, hac duplici lege seruata.

Prima, vt hyems seruet suam naturam, itaut non habeat aliquem insolitum excessum.

Secunda vt non comittantur errata in victu, & alijs sex rebus non naturalibus: quia ob errata etiam corpora robustissima refrigerari possunt: robusta enim propter errata tendunt ad morbum: debilia verò ad mortem. Obseruatis igitur in robustis his conditionibus, calor influens dispersus per ambitum corporis hyberno tempore retrahitur ad ima, vnitusque cum implantato acquirit vires, propter quas cibus promptius concoquitur: ideo hyeme plus cibi dandum.

Qua ratione verò calor hyeme augeatur, dicimus ex Galeno lib. de causis morborum cap. 2. calorem augeri ob quinque causas, nempe per adhæsum rei calidæ, vel per putredinem, vel per motum, vel per constipationem, vel per alimentum. Ob quatuor ex istis causis tempore hyberno calor augetur. Prima per motum, quem facit antiperistalsis: quia calor ob frigus recurrens ad viscera ob motum istum factum in ipso corpore excitat maiorem calorem: itaut, dum fit constipatio, & simul antiperistalsis fiat febris, sed primò ephemera, deinde sequitur putrida, vel hectica, prout corpus est præparatum.

Quod verò per antiperistalsim calor augeatur, docet Aristoteles 8. Physicorum. Hippocrates 5. aphorif. 2. verò inquit, conuulsionem sanari posse frigide perfusione.

Similiter Galenus in hoc comm. & experientia ipsa animaduertitur, dum fabri ferarij volunt vigorare ignem, aquæ tantillum aspergunt.

Secunda causa augens calorem tempore hyemis est adhæsum idest vicinitas corporis calidi, dum scilicet influens sua natura calidum retractum ad ima, & vnitus implantato tangit viscera, illaque ex necessitate calefacit.

Tertia est constipatio à frigore facta ob quam duobus modis corpus incalecit. Primò impediendo ne calidum è corpore ita facile exhallet. Secundò detinendo acria excrementa, quibus retentis calor



calor solet maximè exetescere.

Quarta causa augmenti caloris est alimentum: quia hyberno tempore ob antiperistaltism calor maior factus maiorem excitat appetitum, magis concoquit, & conuertit alimentum in substantiam nutriti, vnde augetur calor.

Notandum antiperistaltism non solum calefacere, sed etiam roborare, sicuti colligitur ex hoc Galeni comm. vbi inquit, corpora aqua frigida lota per antiperistaltism robustiora fieri, quod non solum robusti, sed etiam debiles, si exiguo spatio lauentur maximè inuuantur, sicuti obseruat Galenus in hectica febre laborantibus, qui reuera nulla alia via sanari possunt, nisi hac propoſita 10. meth. cap. 10. qui tali ordine illos sanat, primò vsu balnei tepidi, vt humores effundantur, & acres fulgines exhalent; deinde vsu balnei frigidi, quod ita roborat, vt postea sanentur.

Ex his nos duo colligimus. Primum est frigidissimæ perſusione facta in carnosiss illic dolores collici, & nephritici tollantur. Immo cardialgia quæ est affectus magni momenti aquæ frigidæ perſusione remouetur: est enim Galeni præceptum 9. meth. 5. vbi habet hanc sententiã „ Aqua frigida cardialgiam momento temporis sanat intus, vel extra: vtimur. n. (vt tutius agamus) pano lineo madefacto aqua frigida, illumque affatim applicamus parti dolenti: vel pro auferenda cardialgia orificio vetriculi: panumque celerrimè amouetur: sed ne aquæ frigiditas imprimat aliquam noxam in partem læsam applicamus linteum aliquod actu calidum, ne actualis humiditas aliquid mali efficiat.

Parimodo Hippocrates 5. aphorif. 25. dicit, frigida largè effusa dolores podagricos, & conuulsiones sanat.

Alium tamen modum meliorem aduenimus pro auferendo dolore, & cardialgia non sine aſtantiũ admiratione, talisque est. Accipimus vesicam bouinam multam iue, vel glacie impletam, illamque sudariolo obuoluimus, de ab ægris, vel aſtantiũ animaduertatur: deinde parti dolenti sudariolum improuiſo applicando, statim dolor auferitur: mirificè tamen inuat, si paulo ante patientes inunctiones

actu calidas fuerint experti: De hoc modo sedandi dolores egimus in commentarijs nostris Auicennæ doc. 5. cap. 1. tex. 23. Vtimur vesica sudariolo inuoluta: quod hoc est miserrimum in humanis rebus, quod facilia, si cognoscantur, spernantur.

Sexta dubitatio: colligimus ex dictis, quomodo possint conciliari duo loca Hippocratis: dicit enim primo de natura humana tex. 32. & 36. hyeme pituitam augeri. In hoc loco verò hyeme ventres esse calidiores. Quomodo augebitur pituita, si ventres sunt calidiores?

Soluitur, quia pituita in debilibus, & robustis augetur, sed in robustis augetur, & concoquitur; in debilibus verò exereſcit, & sic cruda, & incocta relinquitur: Quare Hippocrates 1. de natura humana locutus est de debilibus: in hoc aphorismo verò de robustis.

Præterea dicere possumus, hyeme in robustis generari plurimum pituitæ naturalis, quæ est semifanguis, quæ faciliè concoquitur ad differentiã pituitæ excrementitiæ, quæ sunt vitrea, gypsea, acida, & salſa, quæ faciliè in debilibus cumulantur, & non concoquuntur.

Quinta dubitatio: si hyeme calidissimi sunt ventres: ergo bilis generabitur, & non plurima pituita, vt tenet Hippocrates 1. de natura humana tex. 36.

Respondet Galenus in comm. ventres esse calidissimos naturali calore, qui est temperatissimus, qui non bilem, sed sanguinem, & pituitam naturalem, quæ est semifanguis, adauget.

Tertia dubitatio: in vere non possunt ventres esse ita calidi, vt hyeme: ergo non sunt calidissimi.

Respondetur, in vere ventres esse calidissimos respectu æstatis, & autumnii, non respectu hyemis. Vel respondemus per ver intelligere partem veris, quæ a dnectitur hyemi: vel dicimus in vere esse moderatiorem temperaturam, ratione cuius ventres dici possint calidissimi, intelligendo per calidissimos calorem moderatissimum & temperatissimum, qui in concoquendo tenet primum locum.

Quarta dubitatio: Galenus dicit in com-



ventres hyeme esse calidissimos, quia ob antiperistasis augetur substantia calidi innati, namque Galenus lib. de tabe cap. 4. & alibi dicit, si augeretur substantia calidi innati, animal esset æternum, animal enim est mortale, quia hoc calidum semper diminuitur vsque ad mortem, sicuti oleum lucernæ accensæ, in qua diminuitur, donec lucerna oleo priuata extinguatur.

Responderetur, augeri calidum influens, & non innatum, quod est forma partis, quia os est os, & caro est caro. Præterea calidū influens non augetur simpliciter, sed in relatione ad alia tempora: si enim calidum influens augeretur, pari modo animal esset æternum; sed reuera augetur per accidens, quatenus calidum diffusum iterum reuocatur ad viscera, & vnitur cum implantato, vnde vitrus vnita redditur fortior, & caloris videtur esse factum augmentum.

Quo ad ver. Notandum diuidi in tres partes, nempe in priorem, posteriorem, & mediam. In priori parte dicit Galenus in comm. conuenire victum similem victui hyemali. In posteriori similem æstiuo. In media conuenire victum veri proportionatum.

Philotheus vult, cibum esse exhibendum in vere pleniorē, quam in æstate, tum ratione partis prioris, in qua contrahitur calor, tum ratione partis mediæ ipsius veris, in qua non est facta caloris resolutio, ideo adhuc calor robustus conseruatur. Sed nos addimus, dummodo non adsit aliqua plethorica dispositio, quæ tempore veris, vt dicit Galenus vt plurimum obseruatur: quia tempore hyemis cumulatursanguinis multitudo: ideo cibus tenuis conuenire debet: hac de causa non sine ratione tempore veris ieiunium est institutum.

### QVÆST. LXI.

*An ver sit medium inter hyemem & æstatem per negationem, vel per participationem extremorum.*

**H**ic tractatur illa quæstio, an ver sit tempus medium per participatio-

nem extremorum, videlicet hyemis, & æstatis: vel per negationem. Galenus 1. de alimentis cap. 18. vult, ver esse medium per participationem extremorum: at tamen potest probari argumento efficaci desumpto ab Auerroe 4. Cæli 26. quo probat ver, non esse medium per participationem hyemis, & æstatis: ibi enim probat leuitatem, & grauitatem mediorum elementorum non esse medias per participationem: quia si hoc esset, darentur solum duo elementa.

Auer. sic probat, quæ sunt talia per participationem specie non differunt inter se: sed sic est quod grauitates, & leuitates sunt formæ elementorum: ergo erunt specie differentes. Accedit quod ver respondeat aeri, æstas igni, autumnus terræ, & hyems aquæ: sed elementa inter se differunt specie, ergo aer, & aqua, quæ sunt elementa media non erunt media per participationem, sed per negationem extremorum.

Præterea ver respondet sanguini, æstas bili, autumnus melancholiæ, & hyems pituitæ: sed sic est, quod quatuor humores differunt specie inter se: ergo humores mediij, vt sanguis, & pituita, non erunt mediij inter melancholiam, & bilem per participationem, sed per negationem extremorum.

Ad Galenum respondemus, non totum ver esse medium per participationem, sed mediam partem veris, quæ est media inter priorem, & posteriorem partem esse mediam per participationem videlicet prioris, & posterioris partis: totum ver, quod est medium inter æstatem, & hyemem esse medium per negationem extremorum.

*Somni longissimi.* Pro intelligentia nonnulla sunt considerata pertinentia ad naturam somni: secus intelligi non potest, cur hyeme, & vere longissimi sint. Conueniunt, & dissentiunt inter se Aristoteles & Hippocrates cum Galeno de somno.

Galenus cum Aristotele conuenit, somnum esse affectionem, & non opus: affectio est res in fieri, quia in somno virtus sensitiua non influit in partes externas: dicit enim Aristoteles 2. de part. animalium cap. 7. & lib. de somno, & vigilia, sensus externos in somno esse ligatos. Idem quoque



que videtur asserere Galenus lib. de instrumento odoratus.

### Q V Æ S T. LXII.

*De somno in quibus Galenus conueniat, & differat ab Aristotele.*

**P**Arimodo conueniunt Galenus & Aristoteles, quia ambo putant, dum sit vigilia, moueri calorem influentem ad corporis circumferentiam: dum sit somnus moueri à circumferentia ad centrum: hoc fine, vt duo calores, nempe natiuus, & influens vniantur, vt dicit Aristoteles 2. probl. 33. in gratiam concoctionis: sine qua vnione, nec cibus in chylum, nec chylus in sanguinem, nec sanguis in carnem possent vnquam conuerti: quoniam istæ transmutationes substantiales ab vno tantum calore fieri minimè possunt.

Præterea ambo conueniunt tempore hyemis ob frigiditatem extraneam facilius retrahi calorem influentem ad ima, & difficilius reuocari ad extrema, quam æstate: ideo hyeme somnos esse longiores.

Immo Aristoteles 14. sec. probl. 11. quaerit, cur in locis palustribus homines sint somnolentiores.

Respondet, quia ibi magis refrigeramur: quare cum refrigeratio sit quædam requies, faciliè suboritur somnus: ideo longior est tempore hyemis, quam æstate.

Sed vbi fiat somnus, & quæ affectio sit, & à qua causa fiat valde dissentiunt Aristoteles, & Galenus. Primò Aristoteles putat in somno cor esse affectum: Galenus vult in somno cerebrum esse affectum.

Secundò Aristoteles vult radicem omnium sensuum esse cor. Galenus cerebrum.

Tertiò Aristoteles putat in somno cor refrigerari: ideo hyeme somnos esse longiores propter frigus. Galenus vult cor in somno calefieri.

Quartò Aristoteles lib. de somno, & vigilia cap. 2. & Auerroes 2. coll. cap. 12. putant, somnum esse omnimodam quietem. Galenus verò lib. de motu musculorum 4. & primo de symp. causis primo negat esse omnimodam quietem: quia inquit, aliquos dormientes ambulasse.

Quintò Aristoteles lib. de somno cap. 5.

vult somnum fieri à vaporibus incrassatis à frigiditate cerebri: illosque descendere ad refrigerandum cor. Galenus verò primo de symp. causis octauo vult fieri à vaporibus humectantibus cerebrum, & non crasse factis à frigiditate cerebri.

Præterea comprobari potest per ipsam practicam, veram esse opinionem Galeni, somnum naturalem fieri à vaporibus humectantibus cerebrum. Tercio enim de loc. aff. 5. somnus, qui sit à vaporibus condensatis à frigiditate cerebri non est naturalis, sed est comatosus, qui est somnus præter naturam.

Quod hoc sit verum patet, quia frigida, vt opium, altercum, stramonium excitant somnum non naturalem, quia sunt frigida, ideo boni Medici sobriè istis narcoticis vtuntur.

Dum verò Medici somniferis vtuntur, illa corrigunt: sicuti si syrupo de papauere vtendum sit, faciendus est syrupus ex capitibus papaueris antea maceratis in aqua vitæ, quæ est veluti antidotus contra papaueris frigiditatem, vt colligitur ex Galeno 2. de antidotis cap. 7. & 3. simp. 20. & alibi, vbi admonet, quod ijs qui bibunt opium copiosum, merum dandum sit: sed nos salcius aquam vitæ eligimus.

Vel loco syrups de papauere vtimur puluere eorum capitum, quippè caret sapore, sæpèque vti fuimus drachma absque eo quod æger animaduertat.

Vel vtimur oleo seminum papaueris in aqua vitæ prius maceratorum.

Vel pane dulciario ex amygd. cum puluere capitis, vel cum lacte sem. papaueris.

Vel pillulis de cinoglosa ad mediū scrupulum.

Vel pillulis de citro ad gr. ij.

Parimodo laudantur requies Nicolai, Theriaca recens, & magna triphera, quæ omnia sanè sunt præstantissima in excitando somnum, qui reuera non est naturalis.

In eundem vsum proposuimus in commentarijs Auicennæ instrumentum, per quod vapores narcoticorum, qui inter hæc omnia tenere videntur primum locum in excitando somno non naturali quidem, sed potius commatoso.

Quæ verò conciliant somnum naturalem,



lem, vel sunt humectantia, vel mentem distrahentia, quæ sunt in causa, ut calor facile recurrat ad intus. Humectantia sunt lac amygdalinum, oleum amygdalinum, balneum aquæ dulcis, lotiones pedum & vapores humidi ex violis, & maluis effusi per instrumentum propositum, quæ reuera excitant somnum naturalem.

Distrahentia mentem sunt cantus suaves, tenebræ, quæ non solum distrahunt mentem, sed spiritus, qui sunt sua natura lucidi, & ob tenebras retrahuntur ad intus, quia fugiunt suum contrarium.

Præterea blandus tactus digitorum pedum.

Motus circularis qui fit in cunis puerorum, vel in lecto pensili.

Streptus aquarum decurrentium, & stillantium.

Pilla ex aureolata quæ edit sonum suauissimum distrahit, & somnum naturalem conciliat.

Quo ad somni definitionem, quæ inuenitur apud Paulum Æginetam lib. 1. cap. 47. mihi maximè probatur, quæ est, somnus est quies virutū animalium causata ex utili humiditate madefaciente cerebri. Addimus solum nos adiuta quoque à distrahentibus mentem. Hæc definitio consentit doctrinæ Galeni locis superius citatis.

Inde colligitur, Aristotelem non posse à medicis defendi, dum tenet cor, & non cerebrum in somno esse affectum. Similiter dum dicit, cor esse radicem omnium sensuum, & omnium neruorum, atque dum dicit, cor in somno refrigerari.

Primò non potest defendi Aristoteles, dum dicit, cor esse originem omnium neruorum: quia in corde solum inuenitur quedam neruea propago sexti paris quæ est adeo exilis, ut vix conspici possit.

Quidam peripaterici pro defensione Aristotelis insulse quidem dicunt, ab illa exigua propagine neruea habere originem non solum sextum neruorum truncum, sed omnes alios crassissimos neruos, qui à cerebro, & spina dependent: Quod certè est ridiculum: quia perinde est, ac si dicerent magnum arboris truncum pendere ab aliquo folio in summitate arboris existente. Immo idem est ac si dicerent,

plures arbores oriri à folio vnius arboris: quia neruorum capita sunt loco diffusa.

Præterea patet, neruos non oriri à propagine neruea, quæ inuoluit cor: quia hic neruus cordis potest separari à neruo recurrente, ut non semel in canibus fuimus experti: quo casu virtus sensitiva, vel motiva aliarum partium corporis non tollitur. Respondeant si possint huic experimento.

Insuper dū Aristoteles dicit, cor in somno refrigerari reluctatur experientia, & auctoritati Hippocratis: Experientia quia pulsus dormientium sunt celeriores, & vehementiores: ergo in somno cor calidius. Parimodo respiratio, & inspiratio maior, & frequentior fit: ergo cor calidius.

Auctoritati Hippocratis aduersantur, qui 6. epid. 4. tex. 14. dicit, in somno interna calefieri, & externa refrigerari: reddit rationem 6. epid. 5. tex. 3. his verbis, sanguis per somnum ad interiora magis abit, Galenus 4. in sextum 23. ait, sanguis per somnum partes internas petit: interimus nos, ergo sanguis in somno calefaciendus efficiet viscera calidiora.

**Q**uare per ea tempora alimenta copiosiora exhibenda. etenim tunc calor natiuus plurimus est.

Tres sunt causæ, cur hyeme plus fit natiui caloris, quam alijs temporibus. Prima quia virtus sensitiva tunc promptè refugit ad intus, & præcipue tempore somni, & tardè redit. Promptè refugit ad intus propter frigus externum: tardè redit propter tenebras factas ob noctium longitudinem: dicimus propter tenebras: quia ex Galeno 7. de plac. cap. 4. spiritus sunt lucidi, tenebræque effugiunt: quia sunt tenebris contrarij: hyeme tardè redit: quia ex Galeno 1. de symp. causis 8. aer frigidus inspiratus penetrat cerebrum, & densat meatus; quibus densatis, tardius remeat facultas animalis ad sensiteriæ: hæc occasione robustior fit.

Secunda causa, cur hyeme fit plus calidi natiui est, quia à frigido externo prohibetur caloris influentis exhalatio: ideo non sine ratione Olimpiodorus in meteorol. dicebat, calidum natiuum hyberno tempore geminare vires.

Ter-



Tertia causa desumitur à Galeno 3. de temper. §. ab Auerroë 3. coll. 7. ab Aristotele 2. probl. 33. qui dicunt, hyeme esse plus calidi natiui, quia natura per somnum longiorem melius concoquit, melius assimilat, & calorem magis multiplicat.

Cæterum tria occurrunt consideranda pro intelligentia aphorismi. Primum an tempore veris alimentum debeat esse ita copiosum, ut tempore hyberno. Ocasio istius questionis est, quia in aphorismo Hippocrates dicit hyeme, & vere. Secundum cur dandus sit cibus copiosior hyeme, quam æstate, cum maior sit diffusio æstate, quam hyeme. Tertium qua ratione sit plus calidi natiui hyeme, cum corpora robusta quoque ex ipso Hippocrate tunc magis abundant pituita.

### Q V Æ S T. LXIII.

*In quo anni tempore cibus debeat esse copiosior.*

**P**rimò quæritur, an tempore veris alimentum debeat esse ita copiosum, sicuti tempore hyemis.

Montanus putat, alimentum debere esse ita copiosum vere, ut hyeme: quia Hippocrates in hoc aphorismo indifferenter loquitur, dum dicit, hyeme, & vere plus cibi dandum. Addit Montanus, licet in vere tanta non sit caloris concentratio, quanta hyberno tempore; tamen in vere temperatura est melior, ita ut defectus concentrationis compensetur beneficio melioris temperaturæ.

Primò fallitur Montanus, quia Hippocrates 3. de ratione vic. lib. de salubri diætâ, Galenus in hoc comm. & Auicennas non vno in loco tenent, plus cibi dandum esse hyberno tempore, quam vere.

Secundò Hippocrates aphorif. 18. imperat, minus cibi dandum esse vere, hæc sunt verba, „ Æstate, & Autumno cibos difficillimè ferunt: secundum locum ver habet. Mirandum igitur est, quomodo Montanus versatissimus in Hippocratis aphorismis fuerit oblitus huius sententiæ Hippocratis.

Demum cõcedimus esse meliorem tem-

peraturam vere: attamen natura in diffusione non est valentior: quare cum cibus, ut probatum est, ex Hippocrate & Galeno multis in locis proportionetur diffusioni, plus cibi hyeme, quam vere conueniet, quia hyeme diffusio maior est, ut in staticis nostris probauimus.

Deinde quæritur, an plus cibi hyeme, quam æstate conueniat. Prima facie videtur plus cibi dandum esse æstate: quia corpora videntur magis diffilare.

Præterea corpora hyeme pluribus sentent sudoribus & meatibus apertiores redduntur: hyeme verò neque sudores, neque meatus aperti consistunt.

Immo est argumentum Plurquamcommentatoris contra hunc aphorismum Hippocratis: taleque est: quânto maior est dissolutio humidi substantifici, tantò maiori copia alimenti indigemus, sed maior dissolutio est in æstate: hyeme enim meatus sunt constipati; ergo æstate maiori copia alimenti indigemus.

Primò respondemus, aliud esse maiorem alimenti necessitatem, & aliud actum dandam esse maiorem copiam alimenti: exempli causa in languidis opus est plurimo alimento, tamen plurimum non damus, quia vis cõcoctrix est debilis: eadem ratione in æstate, cum vires sint languidæ, non plurimum damus, sed parum, & sæpè nutrimus.

Nos tamen auctoritate Galeni, & experiëntia moti putamus cõtra Plurquamcommentatorem, maiorem fieri dissolutionem hyberno tempore in robustis, quam æstate. Auctoritate Galeni qui 1. de ratione vic. 44 & 6. de tuen. sanit. 6. & in hoc comm. proponit hanc famosam propositionem, quam nos in staticis obseruauimus: alimentum proportionari diffusioni: sed sic est, quod ex Galeni comm. & experientia à nobis non semel in staticis facta maior sit diffusio tempore hyemis, quam tempore æstatis.

Ex Galeno, qui habet hæc verba in hoc aphorismo, „ corpora robusta per foramina insensibilia magis diffilare, quam æstate: ergo tunc plus alimenti: reddit rationem Galenus, quia alimentum debet proportionari diffusioni.

Deinde dicit, hyeme corpora melius

concoquere: ergo difflatio maior est. Addit in comm. illo, nutritio est eius quod euacuatur repletio: sed hyeme maior est nutritio, ergo maior debet esse repletio: ergo plus cibi.

Insuper Galenus 1. de ratione vic. 44. habet hanc sententiam: si nihil efflueret e corpore nostro aqua moles substantiæ semper conseruaretur, & alimento non indigeremus: quare dum corpora pluri indigent alimento magis perspirant, & imagis diffilant.

Addit in hoc comm. Galenus per insensibilem perspirationem, & materiam inutilem, & ea quæ sunt secundum naturam diffilare.

Dicimus nos tempore æstiuo maiorem copiam materiæ utilis diffilare: hyberno tempore verò maiorem copiam inutilis: hac distinctione posset defendi Plusquamcommentator, quamuis absolute loquendo nos experientia cognouimus, maiorem diffilationem fieri hyberno tempore, quam æstiuo.

Demum ipse Galenus 8. de plac. cap. 7. inquit, calorem fortiores edere meliores actiones, atque insensibiliter magis euacuare: quare esto quod euacuationes sensibiles maiores sint æstate, quam hyeme, tamen difflatio insensibilis facta hyeme superat omnes alias euacuationes: ideo nos proposuimus aphorismum quartum primæ sectionis nostræ, qui experientiæ certissimæ respondet, qui dicit, euacuationem insensibilem solam esse longè plenior, quam sint omnes sensibiles simul vnitæ.

#### Q V Æ S T. LXIV.

*Quomodo hyeme sit plus calidi innati, quam alijs temporibus.*

**Q**Uæritur quomodo hyeme sit plus calidi innati, quam alijs temporibus.

Si ex Hippocrate hyberno tempore etiam in robustis dominetur pituita, non videtur, quod sit plus calidi innati hyeme. Quod verò Hippocrates hoc dicat, patet ex primo lib. de natura humana tex. 35. ubi tenet, in omnibus corporibus hyberno tempore pituitam magis generari,

quam alijs temporibus: ergo hyeme non erit plus calidi natiui.

Deinde hyems est sua natura frigida & humida ut pituita: ergo tunc minus calidi innati.

Postremo sol tempore hyemis magis distat à vertice nostri capitis, quam alijs temporibus: quare corpora fient quoque magis frigida: ergo tunc non erit plus calidi innati.

Montanus respondet, aphorismum dicentem hyeme esse plus calidi natiui esse verum de robustis: rectè quidem dicit: sed non tollit difficultatem: quia argumentum Hippocratis, quo probat primo de natura humana, corpora constare ex quatuor humoribus, consistit in hoc, quod in quolibet anni tempore corpus nostrum magis vno, quam alio humore abundet; quare nisi intelligeret etiam de robustis argumentum Hippocratis esset vanum.

Saluus Solanus respondet pituitam hyeme per se dominari: per accidens verò nempe ratione concentrationis dominari sanguinem. Sed Solanus videns antiperistaltism hyeme perpetuam esse, & propter ea potius sanguinem, quam pituitam cumulari: addit, pituitam in omnibus corporibus hyeme dominari in parte externa, vel interna: subdit in corporibus robustis dominari in parte externa tantum, in debilibus verò in interna, & externa.

Sed quomodo qui sunt bene vestiti erunt in parte externa pituita referti? Quare non potest probari opinio Salui Solani, quod in corporibus robustis in parte externa hyeme prædominetur pituita.

Cardanus tenet, in corporibus quoque robustissimis non omnes partes internas esse calidiores hyeme, quam æstate: inquit enim non ne pulmo, cerebrum, vesica magis hyeme refrigerantur, quam æstate? Nonne propter hanc causam in his partibus magis dominatur pituita hyeme, quam æstate?

Hæc Cardani sententia certè non potest improbari: immo si ventriculus robustissimus non esset in corporis centro calefactus à tot visceribus esset frigidior hyeme quam æstate.

Sed cum ex Galeno 3. de facul. nat. 7. & 4. de



de Vſu P. octauo ventriculus ſit tanquam olla inter plures focos, abſque dubio tempore hyemis calidior eſt, quam tempore æſtuo: in parte enim dextra eſt iecur: in ſiniſtralient in poſteriori renes, magnæ arteriæ, & venæ: in anteriori omentum: in ſuperiori cor: in inferiori inteſtina, quæ omnia viſcera ex omnium conſenſu tempore hyberno calidiora ſunt, quam æſtuo.

Quare merito concludimus, quod magis poſſit concentratio caloris in calefaciendo, quam aer frigidus in refrigerando: itaut nocuum frigiditatis hyemalis in corporibus robuſtis compenſetur longè maiori beneficio concentrationis caloris.

Quinta dubitatio: poſtremò quæritur an calor natiuus hyeme poſſit augeri, vt affirmare videtur Hippocrates. Primo non videtur: quia ex libello contra Lycum cap. 4. calidum natium ſemper vſque ad obitum minuitur: ergo hyeme non erit plus calidi natiui, quam in æſtate præcedenti.

Deinde ſi poſſet augeri calidū natium ſequeretur, vt ait Galen. in lib. de tæbe cap. 4. quod homo poſſet reddi immortalis: immo non ſolum ſi poſſet augeri, verum etiam ſi poſſet conſeruari, redderetur immortalis.

Reſpondent nonnulli, calorem natium augeri, quia concentratur. Primò reiſciuntur, quia calor natiuus in carne eſt eſſe carnis, in oſſe eſt eſſe oſſis, vt docet Galenus 1. de Vſu P. 9. at ſic eſt, quod pars carnis, & oſſis non poſſunt concentrari: ergo calor non poterit augeri.

Præterea Galenus docet in hoc comm. calidum natium nō moueri de loco ad locum his verbis „ Non per Iouem carnibus ad hæc ſua ſede derelicta conſugientibus, ſed ſpiritu, & ſanguine: quaſi diceret, non concentratur calidū natium implantatum, ſed concentratur ſpiritus, & ſanguis quippe qui calidum implantatum ſouent quare quando dixit Hippocrates plus natiui caloris eſſe hyeme, & vere intellexit de calore innato ſanguinis & ſpiritus, qui calor non eſt implantatus, ſed influens.

*Indicio ſunt arates & Athleta.* Probat in his poſtremis verbis Hippocrates, quod vbi plus ſit caloris natiui, plus cibi dandum ſit: probatque duplici experimento.

Primum eſt de pueris, qui & plus ha-

bent calidi natiui, & plus cibi aſſumunt.

Secundum experimentum eſt de Athletis, qui & plus habent caloris natiui, & plus cibi aſſumunt intelligendo per calorem natium athletarum calorem influentem: habent enim iſti plus caloris influentis, quia vtuntur exercitio, ex quo augetur calor influens: quippe qui eſt immediatum pabulum natiui caloris: ideo egent copioſiori alimento: quia vbi augetur calor influens, melior ſit concoctio, & maior excrementorum exhalatio.

Quod verò exercitium augeat calorem, Galenus 1. de tuen. ſanit. cap. 14. & 2. lib. eiſdem cap. 2. recitat tria exercitij iuuenta.


Primum inquit per exercitium calorem augeri, quia motus eſt cauſa caloris.

Secundum propter exercitium muſculi, & tendines ſiunt duriores, quo ſit, vt in exercitio minus fatigentur, & lædantur.

Tertium per exercitium ſpiritus efficiuntur velociores, tenuiores & ad actiones promptiores.

Sexta dubitatio: ſed quomodo exercitium augere poterit calorem natium, vt dicit Galenus in comm. Non ne exercitium auger calorem aſcitiuum? ergo non augebit natium. Deinde Galenus 3. de temper. cap. 4. præcipit quod nihil poſſit augere calorem, niſi illud quod conuertitur in ſubſtantiam nutriti: at ſic eſt quod hoc eſt alimentum, & non exercitium.

Reſpōdetur, exercitium augere calorem natium, quatenus habet vim attenuandi ſanguinem, & auferendi impedimenta nempe excrementa, quibus peractis alimenta facilè attenuantur, & facilè in ſubſtantiam conuertuntur.





## APHORISMVS XVI.



*ICTVS humidus febricitantibus omnibus confert, maxime verò pueris, & alijs, qui tali victu vii consueverunt.*

Cum egerit Hippocrates à 4. aphorismo ad duodecimum de qualitate victus, qui conuenit solum ægris: atque in tribus præcedentibus aphorismis egerit, vt docet Galenus, de victus quantitate, quæ conuenit sanis. Reliquum erat, vt in hoc aphorismo ageret de illa quantitate victus, quæ, & ægris, & sanis conuenire potest. Victus vero qui sanis & ægris potest conuenire est victus medicinalis, qui indicatur à febricitantibus, à pueris, & ab ijs qui tali victu vii consueverunt.

Prima dubitatio: proponitur argumentum, quod videtur efficacissimum probans, nullum victum indicari posse ab ægris, vt ægri sunt: taleque est, quod non indicat genus, non indicabit qualitatem ipsius generis: sed sic est, quod morbus non indicat victum: ergo non indicabit qualitatem victus: ergo victus humidus non indicabitur à febricitantibus. Maior est Galeni lib. de opt. sec. 45. vbi contra methodicos, qui dicebant qualitatem, & quantitatem victus indicari à morborum temporibus, sic argumentatur. Quod non indicat genus, non indicabit qualitatem, & quantitatem illius generis: sed sic est, quod neque morbus, neque tempora morborum indicant genus victus: ergo neque morbus, neque tempora morborum indicabunt qualitatem, vel quantitatem victus. Minor est Galeni 1. de ratione vic. 44. vbi vult, morbum, vt morbus est, prohibere victum: ergo victus humidus non indicabitur à febricitantibus: immo ipse Hippocrates 7. aphor. 65. dicit, cibum ægrotanti fieri morbum: nihil enim magis nocet ægrotantibus: quam ipse cibus. Hinc si ægri possent perdurare vsque ad finem vigoris sine cibo faciliè ab omni morbo liberarentur.

Respondemus ad argumentum, in victu medicinali duas esse qualitates: aliam, quæ conuenit alimento, vt alimentum est: hancque dicimus non indicari à morbo,

sed à sola virtute, vt docet Galenus 1. de ratione vic. 44. aliam verò qualitatem esse in victu medicinali, quæ non conuenit alimento, vt alimentum est: sed vt est medicamentum, hancque qualitatem medicinalem dicimus non indicari à virtute, sed ab ipso morbo: huiusmodi qualitas medicinalis erit frigiditas, siue humiditas feri lactis, vel pristinæ hordeaceæ: sed de his paulo infra.

His positis dicimus, Hippocratem in hoc aphorismo intelligere de alimento humido medicinali, quod continet in se qualitatem alimentalem, & medicinalem: ideo indicari à virtute, & à morbo.

## Q V Æ S T. LXV.

*An solus victus humidus sit medicinalis.*

**N**Eque credendum est cum Capiuz-  
ceo solum victum humidum esse medicinalem: quia, si de ratione victus medicinalis sunt duæ conditiones, vna alimentalis, & alia medicinalis: ergo dabitur victus medicinalis non solum humidus, sed calidus, frigidus, siccus, laxatiuus, seu purgatiuus, quod probatur ratione, & experientia.

Ratione probatur, quia animal constat ex calido, frigido, humido, & sicco: ergo si ex his nutritur, ex quibus constamus: dabitur etia victus frigidus, siccus, vel calidus.

Probatur etiam experientia, quod datur alimentum medicinale calidum: non ne datur vinum de absynthio? quod habet qualitatem alimentalem, & medicinalem: vinum de sasaphras? quod sua qualitate medicinali cordis palpitationem auferit. Parimodo datur victus frigidus, vt serum lactis, lactuca, & alia id genus præter qualitatem alimentalem, quæ continet in se qualitatem medicinalem.

Nec valet, dum dicunt, frigidum esse naturæ inimicum, quia vt alimentale non est inimicum. Addimus etiam victum humidum in excessu esse naturæ inimicum: potest enim fouere putredinem. Similiter victus siccus, cuiusmodi est vinum ex falsa, & china, quod tollit cerebri destillationes est medicinale.

Demum datur victus laxatiuus, sicuti est



est vinum hypocraticum, quod valet ad collicos dolores a flatu; & ad quartanam febrem, quod fit ex epithimo, esula, poly-podio, garyophyllis, & cinamomo, & est Ainaldi. Et alia similia laxatiua alimentalia inueniri possunt. Hippocrates tamen solum de alimento humido medicinali mentionem fecit, quia hoc conuenit pueris, & febricitantibus.

Diuiditur hic aphorismus in duas partes. In prima agit de qualitate medicinali, quæ est febricitantibus contraria: & merito, quia curatio perficitur contrarijs, vt Galenus asserit in hoc comm. & Aristoteles prima sect. probl. 2. vbi docet, curationes semper fieri per aliquem excessum.

In secunda parte agit de qualitate alimentali, quæ conuenit pueris, & illis, qui tali victu vti consueuerunt: itaut Hippocrates in hoc aphorismo tangat duo præstantissima Medici officia. Primū est curare febrem, de quo officio in prima parte, dū dixit, victum humidum febricitantibus conferre. Secundū officium est, conseruare vires, de quo intelligit in secunda parte dum dicit, victum humidum conuenire pueris intelligendo de humido alimentali.

### QVÆST. LXVI.

*Quid intelligat per victum humidum.*

**Q**Uo ad verba dicit *scilicet* id est victus. Per victum in hoc loco intelligit cibum, & potū: potū tamen nomen dicitur seu victus ampliari ad sex res nonnaturales, vt docet Galenus 3. in 3. epid. comm. 9. itaut per victum humidum intelligat omnes res nonnaturales, quæ habent vim humectandi, cuiusmodi sunt aer, balneum, quies, & alia id genus.

Præterea per victum humidum intelligit humidum actu, & potestate, vt explicat Galenus in comm. & Celsus lib. 3. cap. 6. dicens, febricitantibus conuenire sorbitionem actu, & potestate humidam. Inueniuntur autem humida actu, quæ potestate sunt siccissima vt aqua vitæ, oleum sulphuris, & alia similia: dantur quoque actu sicca quæ potestate sunt humidissima vt glacies.

Quod verò illud humidum, quod est

potestate, & actu tale febricitantibus conueniat, patet ex Galeno lib. de optima secta cap. 14. vbi reprehendit Petrenam Medicum, qui in febricitantibus vtebatur carne porcina assata, & vino nigro: caro porcina assata humida quidem est potentia, & non actu. Vinum nigrum est humidum actu, & siccum potentia. Hippocrates igitur per victum humidum intelligit actu, & potestate humidum.

Hic obiter animaduerti debet erratum illorum qui febricitantibus dant hepaticum assatum, cum sit siccum actu, & potestate.

Secunda dubitatio ex aphorismo suboritur, cur Hippocrates proponat victum humidum, & non frigidum: quia febricitantibus frigidus, & non humidus conuenire videtur.

Respondetur ex Galeno lib. de optima secta ad Trasylb. cap. 4. Hippocratem per victum humidum intelligere victum liquidum, qui potest esse frigidus, calidus, humidus, & siccus: ideo Galenus 1. de ratione vic. comm. 18. de ijs qui habent coctionem debilem ait esse offerendum cibum liquidum: quia liquidus facilius concoquitur.

Deinde potest responderi, Hippocratem per victum humidum primò intelligere victum alimentalem: deinde alteratiuum.

Hac distinctione tollitur illa famosa difficultas, quæ est inter Auerroem, & Medicos, an in febribus hæcticis sit magis humectandum, quam refrigerandum. Auerroes 7. coll. cap. 15. tenet esse magis humectandum: medici verò magis refrigerandum: quia caliditas est magis essentialis febri hæcticæ, quam sit siccitas.

Conciliantur hoc modo. Auerroem intelligere de humiditate alimentali: Medicos verò de humiditate alteratiua: itaut in hæcticis febribus, si de alterantibus loquamur, sit magis refrigerandum, quam humectandum.

Demum ad dubium potest responderi, quod Hippocrates per victum humidum magis præcipue intelligat de victu indicato à virtute, quam de victu indicato à morbo: quæ distinctiones non nihil ad fugam inserviunt sed quia dubitatio est



solutu difficilis, videndum est quid dicant Alij.

Philotheus responder, Hippocratem prætermisisse victum frigidum, tamquam manifestissimum. Sed expositio Philothei non satisfacit, quoniam propria, licet sint manifestissima, non sunt omittenda.

Montanus responder, victum humidum comprehendere quoque victum frigidum: probatque hoc modo: omne humidum vel est acreum, vel aqueum: de aëreo non intelligit: quia hoc non conuenit febricitantibus, cum calidum sit: ergo per humidum intelligit aqueum, quod sua natura frigidum est.

Hæc responsio est ita artificiosa, ut nihil valeat: dum enim dixit, humidum acreum non conuenire febricitantibus, fallitur: immò nil magis potest vincere ipsas febres, quam humectatio facta per humidum acreum.

Oribasius responder, Hippocratem in hoc aphorismo proponere victum præternaturæ, & non curatorium: additque, siccitatem absumere humidum substantificum, & nocumentum febris potius procedere à siccitate, quam à caliditate: ideo Hippocrates de victu humido, & non de frigido egit.

Quæ responsio aduersatur Galeno & Auicennæ, qui non admittunt, siccitatem esse de essentia febris: Galenus enim lib. de diff. morborum cap. 5. loquens de intemperie calida simplici occupante totum corpus dicit hanc esse febrem, idest calorem præter naturam, nullam mentionem faciens de siccitate: quare si est simplex intemperies calida, est sine siccitate. Similiter lib. de causis morborum secundo dicit, febrem esse calorem immodicum, nihil dicens de siccitate. Parimodo 8. meth. in principio inquit, febrem lædere actionem ratione immodici caloris.

Ad eundem modum Auicennas prima quarti in principio primi capitis definit febrem, quod sit calor extraneus accensus in corde, & procedens ab eo mediantibus spiritibus, & sanguine, ita ut in definitione febris nihil dicat de siccitate.

Nec valet, dum dicunt, Galenum 1. de temperamentis 3. asserere febrem esse intemperiem calidam, & siccam, quia ibi id

sumit disputas cōtra sectatores Atheni, qui putabant, febrem esse calidā & siccam.

Nec valet dum dicunt ex Galeno 8. meth. cap. ult. victum frigidum & humidum conuenire febri: quia respondemus Galenum vbique reprobasse sectatores Atheni per fiduciariam reprobationem, quæ est dato, & non concessio, quod febris sit calida, & sicca non propterea sequitur, & cetera.

Præterea concedimus, febrem aliquando esse intemperiem siccam, dicimus aliquando, quia ut docet Galenus 1. de differentiis febrium 9. intemperies sicca, neque omnibus febribus hæcticis conuenit, sed solum marasmo: quare si hæctica febris interdum ut sicca non lædit actionem, non vocabitur morbus siccus, quia ad hoc ut morbus vocetur siccus, oportet, ut ratione siccitatis lædatur actio, secus inter siccos non connumerabitur.

Inde mirandum est, quomodo omnes ferè medici his temporibus hallucinentur dicentes, febrem esse intemperiem calidam, & siccam, cum febris, ut febris sit solum calida, & raro siccat: quia siccitas non solum essentialiter prædicatur de febre: sed neque sit accidens inseparabile ipsius febris hæctica.

Hinc non ineptè Arculannus, Gentilis, & Arabes plurimi putant non esse vniuersaliter veram definitionem febris propositam à Galeno in hoc cōm. dicere, febrem esse conuersionem naturæ caliditatis ad igneam, sed solum dicunt de aliquibus febribus verificari posse: ratio illorum est, quia febris ut sicca non semper lædit actionem, ergo caliditas febrilis non erit ignea, alioqui, ut sicca læderet actionem: sicut enim denominationes temperamentorum desumuntur à qualitate excedente temperatissimum: sic denominationes morborum desumuntur ab illa qualitate, quæ actionem lædit.

Nec valet siccitas est cum febre: ergo febris est sicca, quia ad hoc ut dicatur sicca oportet, ut ita prædominetur siccitas, ut lædat actionem.

Parimodo in butiro est siccitas, quia est compositum ex quatuor elementis: non tamen dicitur siccum: quia in ipso siccitas non prædominatur: sic siccitas est in quodammodo



tidiana, & in pluribus febribus, tamen, si ut sicca non lædat actionem, non dicitur sicca.

Sed redeuntes vnde digressi sumus dicimus, Hippocratem non proposuisse victum frigidum, quia mentionem facit de victu, qui conuenit pueris febricitantibus, in quibus prædominatur humiditas, quæ est caloris frænum, vel dicimus Hippocratem per victum humidum intelligere liquidum, vt interpretatur Galenus loco superius citato de optima sec. ad Trasylb.

Tertia dubitatio: queritur de victu humido, an conueniat omnibus febribus, quod non videtur, quia febris cum hydropse, & febris quotidianæ victus humidus non conuenit.

Respondet Galenus in comm. quando in ægro sunt affectus contrarii, & complicati attendendum esse vrgentiori, altero non neglecto. Ego sic me gero. Si febris insequatur hydropem, & non habeat alias radices: hydropi magis attendendum. Si verò febris habeat alias radices, & magis lædat ægrum, quam hydrops: tunc febris attendendum.

Pro hydropse, dum magis vrget, quam febris, vtimur pillulis de alicacabo cum elaterio: dum verò magis potest febris, pillulæ istæ læderent: tuncque eligimus mannan, quæ aquam felicius deducit.

Quo ad quotidianam febrem, quæ, vt febris est, indicat refrigerandum; atque vt humida exsiccandum: hoc est obseruandum; si febris quotidiana non valde vrgeat, veluti quando est in principio, tunc magis pituitæ attendimus, quo casu vtuntur oleo chnicino, quod fit ex semine cartami, quod euacuat pituitam per aluum, & interdum per vomitum: si verò febris sit in fine augmenti, & statu, quo tempore febris aucta est, tunc magis vrget, & febris potius attendendum est, quam causa.

### Q V Æ S T. LXVII.

*Methodus curandi affectus complicatos.*

**M**ethodus curandi affectus complicatos consistit in consideratione trium affectuum, vt docet Galenus 3. meth. 9. & 7. meth. 12. Primus est eius qui habet

rationem sine quo non, cuiusmodi sunt impedimenta, quæ nisi auferantur impeditur curatio. Secundus affectus est eius qui est causa alterius affectus. Tertius eius qui magis vrget. Nisi igitur adsit vrgens, curatio incipienda est à causa, & ab eo sine quo non. Exemplum proponitur à Galeno 4. meth. 4. de vlcere cauo, et fordido, in quo debet caro generari: sed non potest generari, nisi sordes auferantur abstergentibus: abstergentia sunt remedia sine quibus non.

Quo ad vrgens, dum adest, spernuntur causæ, & impedimenta, esto quod illico causæ & impedimenta non possint auferri. Immo respectu vrgentis spernuntur partes viuentes, quæ tamen non sint factæ gratia vitæ: si pars aliqua esset demorsa à vipera, vel à cane rabido, dicimus ex Galeno esse amputandam, vel profundè inurendam. Famofus est casus à Galeno propositus de rustico, qui digitum à vipera demorsum falce amputauit.

Similiter si aura frigida exiliens è digito cerebrum obrepit, epilepsiamque faciat, digitus cauterio confoditur.

Sic Galenus 3. meth. 9. dat exemplum de punctura, de luxatione, & de fractura. Dicit, si fracto capite fiat musculi conuulsio, nisi ex toto musculus præcidatur, homo moritur, & vt plurimum in septima. Idem dicit de punctura nerui. Similiter in maxima luxatione si fiat magna inflammatio, etiam si reponatur membrum, non sedata inflammatione, homo moritur, vel ob conuulsionem, vel ob gangrenam: quare factius est, vt membrum remaneat luxatum, quam quod homo moriatur. Parimodo in magna ossis femoris, vel tibiæ fractura ex casu, vel cõusione cum aliqua diæresi, si chyrurgi valde astringant partem fractam cum fasciis, & ferulis, calor putredinalis non exhalat, vnde statim fit gangræna, & homo moritur.

Si verò nullam adsit vrgens, tunc cura incipienda est à causa: si verò plures sint causæ, ab illa, quæ magis lædit, cura est inchoanda. Hinc Galenus 3. meth. 9. dicit in vlcere phlegmonoso inflammatione, & non ab vlcere esse incipiendum.

Valeant igitur illi chyrurgi, qui in hoc casu applicant pulueres exsiccentes vlceribus



bus & relinquunt inflammationem, quia hac via nunquam sanant. Hac doctrina consentit auctoritati Galeni 13. meth. cap. octauo & tertio de temperamentis quinto ubi habet, „ phlegmonem duplici ratione recedere à statu naturali, nempe feruore, & sanguinis multitudine, subdit in phlegmone indicationem euacuationis vincere indicationem refrigerationis: quia causa phlegmonis est sanguinis multitudo, itaut semper vera sit hac doctrina, quod à causa sit incipienda cura, & ab illa quæ maximè lædit.

### QVÆST. LXVIII.

#### *De serie omnium indicantium.*

**R**estat, vt ordinem, & omnium vrgentium, omnium causarum, & impedimentorum seriem proponamus: quo ordine percepto statim elucescent omnia indicantia, nempe cui primo est ex illis, cui secundo, vel tertio loco sit attendendum. Nec satis est in febre cum hydrope, & in quotidiana scire, quod (vt animaduertit Galenus in comm.) sit attendendum vrgentiori: nisi ordo, & series proposita præintelligatur, neque satis est præscire, quod dictum est à Galeno tertio meth. nono & septimo meth. duodecimo, ante morbum esse auferenda hæc tria, vrgens, causam, & impedimentum: nisi affectuum complicationum comparisonem faciamus. Galenus enim primo methodi cap. 4. vult esse præcipuum methodi fundamentum vt in complicatis affectibus præsciamus, cui primo, cui secundo, cui tertio loco sit attendendum.

¶ In quolibet morbo varia affectuum complicatio fieri potest; in ipsa febre putrida sex obseruantur affectus, vt animaduertit Galenus 11. meth. 13. quorum primus est humorum multitudo: secundus crassitudo: tertius lentor: quartus obstructio, seu aliqua alia prohibita perspiratio: quintus putredo: sextus febris continua, qui affectus, vt dixit Galenus locis citatis sæpè sunt contrarij, & contraria indicant remedia.

Deinde consideranda sunt ea, quæ sunt

secundum naturam, nempe temperatura, ætas, consuetudo, & reliqua, quæ eodem cap. à Galeno proponuntur. Hinc considerans Hippocrates indicationes contrarias 6. epid. 2. text. 9. inquit, in morbis curandis studeas, vt prorsus non noceas, intelligendo de his affectibus complicatis, in quibus adfunt contraria indicantia.

Notandum tamen proponi à medicis hanc sententiam Hippocratis sine vlllo artificio, quasi quod sit præcipuum Hippocratis præceptum, quod medicus non debeat nocere: certè non nocebit, si nihil efficiet: ceterum præceptum Hippocratis est de complicatis, & contrarijs affectibus, nimirum, vt materiæ remediorum applicentur sine nocumento alterius affectus contrarij.

Quoad affectuum complicationem dicimus, decem fieri posse omnium indicantium comparationes, & non plures.

Prima comparatio debet fieri inter vrgentia, si plura sint.

Secunda inter causas principales: Galenus enim 13. meth. cap. 8. considerans in phlegmone duas esse causas, nempe sanguinem, qui indicat euacuationem, & calorem: subdit, indicationem euacuationis vincere indicationem refrigerationis: In erysipelate vero indicationem refrigerationis vincere indicationem euacuationis.

Tertia comparatio debet fieri inter impedimenta, quæ reducuntur ad causam, sine qua non.

Quarta inter morbos.

Quinta inter vrgens, & causam.

Sexta inter vrgens, & impedimenta.

Septima inter vrgens, & morbum.

Octaua inter causam, & impedimenta.

Nona inter causam, & morbos.

Decima inter impedimenta, & morbos.

Istę decem comparationes pertinent ad curatricem: neque dantur alia indicationes, licet corpus centum ægritudinibus esset vexatum: omnes enim ad dicta capita reducuntur.

Quoad comparationes, quæ sunt inter vrgentia: sciendum est, dari quattuor vrgentium classes: quarum prima continet illa vrgentia, quæ vires è vestigio prosterunt; cuiusmodi sunt syncope, sanguinis totius



totius profluuium, apoplexia, conuulsio, cardialgia virulenta, & alij affectus, si qui sint, qui statim vires prosternunt, & de repente interimere solent.

Secunda vrgentium classis continet illos affectus, qui non actu prosternunt vires, sed impendit periculum, ne breui spatio vires extinguantur, sicuti sunt vigilæ, lien-teria, diarrhæa, dysenteria, magni dolores, & plures alij affectus, qui non illico, sed paulo post virtutem prosternunt.

Tertia continet affectus diuturnos, qui non vitam tollunt, sed ipsi ægri vrgent medico, vt studeat breuitati sanationis, spernendo causas, & impedimenta. De his Galenus 4. meth. 2. habet hæc verba „ sūt quidam, qui malunt quid vis subire, quam diutissime pati: sicuti illi, qui malunt, vt testiculus tumidus euellatur, quam toto vitæ curriculo illud pondus sufferre. Similiter sunt, qui malunt, vt auferatur gonorrhea, quod faciunt Empirici puluere de charabe exhibito cum ouo sorbili, vel sunt qui malunt, vt vlcera, aut vulnera potius ducantur ad cicatricem, quam expectare, vt causæ internæ superentur.

Quarta classis vrgentium pertinet ad decorationem: veluti sunt qui petunt adstringentia pro retinendis capillis, ne cadant in Alopeciam, & despiciunt causas, cuiusmodi est decoctum sem. acaciæ, hypocistidis, & licij cum paxillo tragacathi cum aceto, quo pericraneum madefaciunt, quod remedium detinet quidem capillos, luem tamen coerces, sed non sine periculo.

Tertia & quarta classis dependet potius ab ægrotō, quam à vera methodo: quia medicus debet prius tutò mederi: quod respondet vrgentibus primæ & secundæ classis: deinde citò, quod respondet tertiæ. Demum iucundè, quod respondet quartæ nempe decorationi.

Quo ad primam & secundam classem vrgentium Galenus tradit hoc præceptum 9. meth. 13. „ virtutem omnium primam esse custodiendam. Quod verò vrgentibus primæ classis magis sit attendendum, quam alijs vrgentibus, quam causis, & morbis, patet ex Hippocrate & Galeno.

Ex Hippocrate 2. epid. vbi refert, dedisse potentiam cum succo granatorum mu-

lieri cardialgia laboranti: vbi Hippocrates spreuit causam principalem, & impedimenta, quæ certè non tolluntur adstringentibus, sed laxantibus, & euacuantibus.

Ex Galeno 7. meth. 12. vbi admonet prius syncopem esse auferendam, quam alios affectus: in syncope enim à febre quoque prodeunte, Galenus 12. meth. cap. 4. aliquid vini præbet, spernit enim febrem, & causam principalem febris propter vrgēs primæ classis, quod est syncope. Similiter Galenus 3. meth. 9. inquit in curandis vlcerebus phlegmonosis prius esse attendendum conuulsioni, quàm causis phlegmonosis. Hinc conuulsio, vt vrgens indicabit, quod neruus transuersim incidatur, quod ab vlcere, & phlegmone valde prohibetur.

Post vrgentia primæ classis, magis est attendendum vrgentibus secundæ classis, quam alijs affectibus: sicuti Galenus 10. meth. cap. 3. præcipit, picrocholos nutriendos esse in principio paroxysmi, ne magis exsiccentur, & in hecticam cadant: in istis magis potest imminens periculum hecticæ febris, quam causa principalis febris, & quam ipsa febris, quæ omnino cibum prohibet. Parimodo primo ad Glauc. 14. in febre cum alui fluore quoque diminuto damnat phlebotomiam, & pharmacum. ne vires labantur: sed vt conseruentur.

Ecce quod Galenus spernit causam principalem propter vrgens secundæ classis, quæ causa principalis potest auferri pharmaco, vel phlebotomia.

Similiter Galenus 1. ad Glauc. citato in febre cum plethorica dispositione & cum morsu oris ventriculi prius corroborat stomachum, deinde euacuat: habet enim hæc verba „ si os ventriculi læsum non roboretur ante euacuationem, imminet vitæ periculum, quamuis roborantia augent causam morbi, & morbum ipsum.

Hinc valde errant, qui in affectibus splenis pluris faciunt indicationem præseruatoriam, quam vitalem: quare debemus roborare prius splenem adstringentibus: in parte illa laxa, & debili magis potest indicatio vitalis, quam præseruatoria. Hac ratione Galenus 11. meth. 16. præcipit in remedijs pro liene esse admi-

secunda



scenda astringentia: quia aperientia virtute astringentia destituta semper magis inflant ipsum lienem.

Hinc dulcia omnia, ut mel, & saccharum, quæ sunt efficacia aperientia, sed virtute adstringente omnino destituta, lienem, & partes alias debiles reddunt tumidiore.

Hinc fit, quod astringentia, cuiusmodi sunt aqua calybeata, tamariscus, scolopendria, & chalybs iuuant lienosos: roborato enim liene non amplius in ipso recipitur quod influit, & influxum facilius vincit.

Si verò fiat comparatio inter causas principales, tria sunt obseruanda. Primum quænam ex causis principalibus magis lædat. Secundum quæ causa ex illis sit magis reducibilis ad vrgentia. Tertium quæ causa magis foueat morbum.

Quo ad primum nempe, quæ causa magis lædat, consideranda sunt, quæ à Galeno proponuntur 13. quth. cap. 8. & 9. de temperamentis 5. de erysipelate, & phlegmone: ubi dicit in erysipelate feruorē magis lædere, quam sanguinis multitudinem: ideo vult refrigerandi indicationem vincere indicationem euacuandi: è contra verò in phlegmone, in quo sanguinis copia magis lædit, quam feruor: quia posset ob copiam fieri gangrenam.

Quo ad secundum nempe, quæ causa sit magis reducibilis ad vrgentia, ante oculos obijciendus est casus Pythionis, in quo duæ erant causæ principales. videlicet catarrhus tenuis, & putridi humores: cui dubium, quod putridi humores erant magis reducibiles ad vrgentia: quia citius poterant vires auferre, quam catarrhus: ideo Hippocrates in Pythione magis attendebat putridis humoribus, quam catarrho.

Quo ad tertium: inter causas videndum est, quæ foueat magis morbum: quia in medicina curatrice à causa magis fouente est exordienda cura: sic in Pythione humores putridi magis fouebant catarrhū, quam catarrhus putredinem, ideo cura à putredine incæpta est.

Si verò comparatio fiat inter impedimenta, statim videndum est quodnam ex impedimentis sit magis reducibile ad vrgentia,

quia vrgentioribus semper magis est attendendum. Exempli gratia in vulnere capitis possunt esse hæc duo impedimenta, pilli incisi detenti in vulnere, & ossis fragmentum supra duram matrem, absque dubio magis potest fragmentū, quia minatur cōuulsionem, quæ pertinet ad vrgentia primæ classis. Similiter in vulnere thoracis thrombus colligitur in cavitare: potest quoque in eadem cavitare esse costæ fragmentum: in eod magis potest? sine dubio thrombus: cur? quia minatur lypothimiam, & syncopem: ideo illic è est attendendum thrombo, deinceps costæ fragmento: seu eodem tempore, si fieri possit, ambo auferenda.

Similiter si fiat comparatio inter causas, & impedimenta, inter causas, & morbos, inter impedimenta & morbos, nisi adsint vrgentia, cura prius auspicanda est à causa, mox ab impedimentis, tandem à morbis, si verò simul omnia possent auferri, quod esset felicitatis specimen, illico, & eodem tempore omnia mala essent auferenda. Non negamus tamen neque unquam negauimus in methodis, quod impedimenta non debeant tolli etiam ante ipsa vrgentia, si facile, & sine detrimento aliorum indicantium auferri possint.

Hinc notatue errores quorundam chirurgorum, qui in ipsis vlcerebus licet non sint, vel causæ, vel impedimenta ablata, vtuntur exsiccantibus, cuiusmodi sunt vnguētum de thucia, triapharmacum, diapalma, lenimentum simplex, vnguētū de pomo citri, quibus lædunt, & nunquam sanant, nisi ipsa natura corrigat ipsorum erratum, ac tollat sensum causas, & impedimenta: sed præcipue lædunt propositis topicis vlcera phlegmonosa: huius doctrinæ fundamenta colliguntur ex Galeno 3. meth. cap. 9. & aliis in locis.

Causæ verò cur non sanentur vlcera ex Galeno 4. meth. 1. & cap. 4. non sunt ipsa vlcera. Sed vndecim sunt causæ, quæ impediunt sanationem vlcerū seu vulnorum.

Prima est affluxus humorum ob plethoram.

Secunda ob cacoehymiam vitio hepatis, vel lienis factam.

Tertia est tumor partis vlcerate.

Quar-



Quarta est intemperies simplex partis circumstantis.

Quinta est intemperies cum materia, quando scilicet partes circumstantes vlc-  
rum sunt humoribus imbibita.

Sexta est tumor.

Septima est varix aliqua in parte læsa : in Galeno cap. 4. citato in antiquis Græcis legitur *κίρτος*, idest varix.

Octaua est scyrrhus: quia apud Linacrum in tex. Galeni *σπύρρος* legitur: quare & varix, & scyrrhus partis possent impedire vlc-  
cerum sanationem.

Nona est labiorum durities.

Decima est aliquid tertij generis in vl-  
cere, vel vulneri quod impedit sanatio-  
nem, vt pilli, ossis fragmentum, vel aliquid  
huius generis.

Vndecima est vlc-  
ceris cauitas, qua non impleta non sanatur vlcus.

Tunc à qua causa, cum sint vndecim, est  
auspicanda cura? ab illa certe quæ fove-  
re potest alias causas: quænam est ista? ex  
Galeno est affluxus vel ob plethoram, vel  
cacochymiam factus vitio hepatis, vel lie-  
nis: quæ causa nisi auferatur, actum est de  
vlc-  
ceris, & vulneris sanatione. Amoto af-  
fluxu, & correctâ viscerum dyscrasia non  
statim confugiendum est ad sarcotica, vt  
chirurgi Plebei faciunt, sed oportet videre  
quænam ex illis foueat cauitatem, quæ ve-  
ra re sunt intemperies simplex, vel compo-  
sita, tumor, varix, scyrrhus partis, impedi-  
mentum tertij generis & durities labiorum.  
His solû ablatis cauitas sarcoticis impletur.

Sed quia pars vicina sana est illa quæ  
est opifex sanitatis, ideo si materia est im-  
bibita circa partem, vel sit tumor, con-  
fugiendum est ad diuinum præceptum ip-  
sius Galeni 3. præfag. comm. 29. vbi conclu-  
dit, partem debilem non esse tractandam  
digerentibus, & insensibiliter euacuantibus,  
sed suppurantibus: habet enim ibi  
hanc sententiam „ si vires sint validæ, &  
humores calidi, hi per excretionem termi-  
nantur: pergit Galenus „ si vires sint va-  
lidæ, & humores frigidi per absc-  
ssum hu-  
mores imbibiti suppurantur: si verò pars  
sit debilis, & humores calidi, similiter per  
abscessum: si debiles, & humores frigidi,  
vel moriuntur, vel vix longo tempore li-

berantur: quare nullo modo exsiccantia  
semper conuenient vlc-  
ceribus: quia, si pars  
circumstans derenta sit intemperie cum  
materia, non conuenient remedia exsic-  
cantia, sed suppurantia, quibus conuertitur  
in pus humor in illam partem confluxus, quo  
suppurato natura statim vlcus sanare potest.

Denique si fiat comparatio inter mor-  
bos, cura auspicanda est ab eo, qui magis  
nocet, & ab eo, qui fouet alium. Hinc Ga-  
lenus 8. meth. 8 admonet, in morbis com-  
plicatis auspicandam esse curationem ab  
illo morbo, qui fouet alium, quia morbus  
fouens se habet per modum causæ: sicut  
si esset febris, & obstructio, febris est mor-  
bus in intemperie, obstructio est morbus  
in mala compositione; ab obstructione est  
auspicanda cura, quia obstructio fouet fe-  
brem.

Quare dum Hippocrates dicit in apho-  
rismo, victus humidus omnibus febrici-  
tantibus confert, intellexit dummodo non  
ad sint vrgentia, quæ trahant ad se curatio-  
nem: dummodo non ad sint causæ principa-  
les, vt pituita in quotidiana, hydrops cum  
febre, & insignis putredo febrilium pestilen-  
tium: dummodo non sint impedimenta, quia  
hæc est suprema medicinæ curaticis lex,  
vt semper vrgentiori secundum seriem à  
nobis propositam magis sit attendendum,  
qua serie non intellecta, nec aphorismus,  
nec Galeni commentum, nec ipsa medendi  
methodus intelligi potest.

## Q V Æ S T. LXIX.

*An contraria contrarijs curentur.*

**R**estat vt declaremus, quomodo apho-  
rismus suscitatus sit duobus commu-  
nissimis medicinæ principijs: quorum al-  
terum est, contraria contrarijs curantur:  
alterum, similia similibus conseruantur.  
Dum dixit, victum humidum febricitan-  
tibus conuenire, ea ratione credendum est  
conuenire posse, quia contraria contrarijs  
curantur. Dum dixit, victum humidum  
conuenire pueris, & ijs, qui tali victu vti  
consueuerunt: dicendum est, ea ratione  
conuenire, quia similia similibus conser-  
uantur.



Multi tamen negarunt hæc duo axiomata. Primum negarunt mori ratione, auctoritate & experientia. Ratione: quia humores bilioli valde calidi tolluntur pharmaco: at sic est, quod ex Galeno comm. 23. huius primæ sec. omnia pharmaca sunt calida: ergo non est verum, quod contraria contrarijs curentur: calidi enim sunt humores bilioli, & calida sunt pharmaca, quæ illos euacuant.

Idem confirmant auctoritate: quia Hippocrates 6. epid. 2. tex. 9. inquit dolorem sedari dolore: at sic est quod dolor est similis: ergo non contrarijs: sed similibus omnia curabuntur.

Præterea Hippocrates 5. aphorif. 21. admonet, tetanum, qui est affectus frigidus in iuvene benè carnosofitate media frigida perfusione sanari: at sic est, quod aqua, & tetanus sunt frigida: ergo similia curabuntur similibus, & non contrarijs.

Insuper Amonius in Porphyrij introductione ait, medicos errare, dum putant semper contraria contrarijs esse remedia.

Denique per experientiam probant, contraria non tolli contrarijs: quia vesicantibus, quæ dolorem excitant in parte dolente, facillè tollimus dolorem coxendicum: sed dolor dolori non est contrarius.

Porro in variolis, quæ pertinent ad morbum valde calidum, vitur aqua noſturtij balneo maris stillata, quæ calida est, & benè sanat.

Similiter oleo de Kerua idest ricino sanantur vlcera capitis, & pſoræ: sed sic est quod hoc oleum, & hæc vlcera calida sunt: ergo similibus tolluntur morbi, & nō contrarijs. Quamplurima alia exempla posſent proponi idem ostendentia, sed his declaratis, cætera quoque euadent clara.

Pro ſolutione norandū, dū dicimus contraria cōtrarijs curari: per contraria dicimus Galenū 10. meth. 9. velle, intelligenda eſſe oppoſita, vel per ſe, vel per acci- dens, vel potentia, vel actū. Hoc poſito reſpon- demus ad primum argumentum, phar- macum euacuare humores calidos, & deob- ſtruere, & inde auferre calorem: sed sic est, quod addere, & auferre, euacuare, & replere, obſtruere, & deobſtruere ſunt contraria: ergo.

Ad ſecundum argumentum deſum- ptum ab Hippocrate 6. epid. 2. tex. 9. dici- mus cum Galeno in illo comm. dolorem ſedare dolorem per acci- dens, & dolorem eſſe contrarium dolori: quia diſtrahitur facultas ſenſitiua ab vno ſitu partis ad alium ſitum contrarium: itaut ſi dolor ſit in parte ſuperiori, dolor nouiter excitatus ſit in inferiori: vel ſi dolor ſit in parte in- terna, nouus dolor excitatus ſit in externa, ſicuti in dolore coxendico contingit, dum parti exteriori dolenti applicatur phenig- ma, quod phenigma non ſolum tollit dolo- rem coxendicum, quia euacuat, ſed quia diſtrahit facultatem ſenſitiuam ad ſitum contrarium: Octo enim ſunt differentiæ ipſius ſitus contrariæ, nempe, ante, retro, ſuſum, deoſum, intus foras, dextrum & ſiniſtrum. Simili modo ex Galeno 2. in 6. epid. 9. vomitus vomitu, & fluxus fluxu tollitur, quatenus per vehemētiorem euacuationem euacuatur quod non poterat euacuari: euacuatur enim quod replebat aliquam partem, atque euacua- re, & replere ſunt duo contraria.

Quoad tertium argumentum de tetano deſumptum ab Hippocrate 5. aphorif- morum 21. Reſpondemus cum ipſo Hip- pocrate in eodem aphoriſmo vbi dicit ob frigida perfuſionem calorem reuocari ad partes internas: deinde ab ipſo calore ſu- perari frigiditatem tetanum efficientem: quare contraria contrarijs curantur.

Quo ad experientia propoſita de aqua noſturtij pro variolis. Dicimus, aquam illam eſſe præſtantiffimum diureticum, ideo maximè iuuare non calefaciendo, ſed euacuando, præſertim in principio variola- rum.

Quo ad oleum de Kerua, quod ſanet vl- cera capitis, & pſoras. Reſpondemus vlce- ra ſanari exſiccantibus: quia vlcera vt vl- cera ſunt humida, & humida tolluntur ex- ſiccantibus: oleum verò de Kerua eſt ca- lidum & ſiccum.

Ad dolorem coxendicum, qui tollitur veſicante affixo parti dolenti. Reſponde- mus per dolorem excitatū à veſicante tra- hi humorem à parte interna ad externam: ſed ſic eſt, quod intus, & foris ſunt duæ di- ſferentiæ poſitionis contrariæ. Hinc Hip-



pocrates inquit, dolorem coxendicum sanari ferro ignito, vel caustico: immo subdit Hippocrates, nisi combutatur illa pars claudicant: ratio est, quia dum in parte interna detinetur humor, articulus ad motū redditur ineptus: ideo foras humor trahendus est.

## Q V Æ S T. LXX.

*An similia similibus conferuentur.*

**Q**Uoad secundum Axyoma, quod similia similibus conferuentur. Nonnulli negant hoc principium, ratione auctoritate, & experientia moti. Ratione, quia simile non agit in simile, quod est in primo de generatione & corruptione sumptum ab Aristotele tamquam axioma: ergo simile non conferuabit simile.

Confirmatur auctoritate Hippocratis, & Galeni, quod similia non conferuentur similibus: Hippocrates enim lib. de flat. cap. 6. ubi definit medicinam tam curatricem, quam conferuatricem, inquit, medicinam esse additionem & ablationem: ergo similia in medicina non habent locum: quia medicus semper addit, vel aufert. Similiter lib. de aere, aquis, & locis asserit, corpora calida melius conferuari in frigidis regionibus: ergo similia non conferuantur similibus.

Præterea confirmatur Galeni auctoritate in Trasyb. cap. 20. ubi probat exemplo duorum doliorum, totam medicinam esse artem correctivā. Dicitque, esto, quod sint duo dolia exiguis foraminibus terrebrata, plena tamen: sed hac lege, ut aliquis vni dolio assistat, & quantum liquoris egrediatur, tantum illic vicissim immittat. Alteri verò dolio nemo assistat, & nemo infundat liquorem, nisi quando notabiliter dolium est exinanitum: dicit Galenus primum dolium assimilari conferuatrici: secundum verò curatrici: Ecce inquit Galenus, quod conferuatrici, & curatrici pertineat ad artem correctivā, quæ non per similia, sed per contraria procedit.

Nonnulli respondent ex Galeno 3. de simp. medicina cap. 11. ubi inquit, simile triplex esse, videlicet simile minus, simile

maius, & simile æquale, quæ posita distinctione dicunt, simile æquale nullo modo agere in simile: simile verò minus, & simile maius agere, & pati inter se: addunt igitur similia conferuari similibus non æqualibus, sed maioribus, vel minoribus: sicque dicunt tolli omnem difficultatem.

Hæc responsio non adimit difficultatem. Primo quia simile maius, & simile minus quando agunt, & patiuntur inter se sunt contraria: sicque sufficient in arte medica vnum axioma, quod est contraria contrariis curantur: quia omnino simile non potest conferuare.

Deinde proposita responsio reluctatur Galeno in tertia parte artis med. tex. 20. ubi docet, remedia conferuantia corpora parum recedentia à temperatissimo esse dum generi: aliqua cōferuare in eodem statu, & hæc sunt similia æqualia: aliqua verò conferuare reducendo ad meliorem statum: certum est, quod illa quæ conferuant in eodem statu non possunt esse similia maiora, vel minora, sed æqualia: primo quia similia maiora, vel minora sunt remedia reducuntia corpora ad temperatissimum. Deinde ibi loquitur Galenus de corporibus parum recedentibus à temperatissimo.

Insuper Galenus lib. de tuen. sanit. cap. 3. loquens de corporibus sanis habet hæc verba „ corpora calida, & frigida tutius cōferuari per contraria: sed quæ sunt ista contraria in parte conferuatrici? similia maiora, & minora: quia impendit periculum, ne qualitates actiue similes corporibus applicatæ efficiant aliquem morbum: corpora verò sicca, & humida inquit Galenus, esse conferuanda per similia æqualia: curare hoc principium, quod similia similibus conferuentur debet intelligi de similibus æqualibus.

Nonnulli alij supponentes, quod simile æquale nullo modo agat in simile, dicunt, quod contraria, quæ tollunt exiguis lapsus, debeant dici similia in latitudine, & sic similia conferuari similibus in sua latitudine.

Cæterum per hanc responsionem incidunt in eandem scopulum: quia difficultas adhuc persistit in suo robore, quod scilicet



conseruatio fiat per contraria: quoniam ipsi non admittunt, simile æquale per similia omnino æqualia conseruari: quia licet in eadem latitudine contineantur simile maius, & simile minus, tamen hæc re vera sunt contraria.

Nos respondemus concedendo, quod simile æquale, quod est omnino eiusdem gradus, & eiusdem mansionis non possit agere in simile. neque possit corrigere suum simile: quia omne quod agit, agit in contrarium vel vincendo vel moderando passum.

Nos verò inuenimus modū, quo omnino simile æquale conseruet simile, esto quod sit eiusdem gradus, eiusdem mansionis, & eiusdem virtutis: sed quomodo? quatenus hoc simile auget eandem molem quæ aucta magis resistat, & per consequens magis conseruet, neque datur alius modus conseruandi similia.

Hinc ignis in maiori mole melius conseruatur quam in minori, magisque resistit contrarijs. Parimodo aqua maris in sua immensa mole, melius conseruatur, quam aquæ paucillimæ: quia in sua magna mole multum resistit. Hinc Aristoteles 4. Meteororum cap. 2. in fine ait, pars maris quæ separatur à toto citius fatet: quia destituitur natura totius maris: ideo in pauca mole facile destruitur: sic vinum in magnis dolijs melius conseruatur, quam in doliolis.

Eadem manus nostra stomacho applicata, vel omentum ventriculo superpositum conseruat ventriculum; tum quia prohibet, ne calor exhalat, tum quia omentum est simile, & quanto similis, eo melius conseruat: quia per simile æquale augeatur moles caloris, unde ventriculus magis resistit, & melius conseruatur. Similimodo similia omnino æqualia (si inuenirētur) applicata hepatis, plenæ, pulmōni, cerebro, vel cordi maximè cōseruarent: quia aucta moles rei similis nō agit, sed magis resistit.

Quod verò conseruatio non fiat per inæquale, patet per argumentum ex oppositis: quia si per simile non conseruatur simile: ergo conseruabitur per dissimile, quod dici non potest: sicque probatur, calidum vt duo curre per calidum vt vnum

non conseruari in eodem statu, sed refrigerari: ratio est quia calidum vt duo habet duos gradus frigiditatis: calidum verò vt vnum habet tres gradus frigiditatis: quare dum permiscebitur calidum vt duo cum calido vt vnum fient quinque gradus frigiditatis, & tres gradus caliditatis: quare hoc modo corpus refrigerabitur, & non conseruabitur in eodem statu: quia magis possunt quinque gradus frigiditatis quam tres gradus caliditatis: ergo vera cōseruatio neque per similia minora, neque maiora fiet, sed solum per similia æqualia, quæ omnino sunt similia.

**Q**uinta dubitatio circa tex. Gal. lib. de salubri diætā comm. 7. inquit, puerorum corpus, plus humiditatis continere, quam salubris habitus postulet: ergo victus humidus pueris febricitantibus non conueniet.

Respondent nonnulli, Hippocratem lib. de diætā locutum esse de pueris non febricitantibus, qui sunt humidiores: in hoc aphorismo verò de pueris febricitantibus.

Nos autem respondemus cum Galeno lib. de opt. sec. ad Trasylb. cap. 4. per victum humidum Hippocratem in hoc aphorismo intelligere victum liquidum, qui potest esse frigidus, & magis & minus humidus.

Sexta dubitatio: Galenus in comm. præter ætatem, & consuetudinem, quæ sunt duo coindicantia ipsum victum, proponit anni tempus, & regionem, quæ similiter indicant similia.

Triuerius Galenum reprehendit, dum inquit tempus anni indicare similia: tenet enim Triuerius tempus anni indicare contrarium, quia æstas nō indicat cibum calidum, nec hyems frigidum: ergo malè Galenus.

Triuerius primò fallitur: quia saltem ver indicat simile, & non contrarium. deinde tempus anni semper indicat simile quando morbus est contrarius tempori anni, veluti si in æstate esset hydrops, tunc æstas indicat simile. Similiter si in hyeme esset febris ardens, hyems indicaret frigidum. Demum aer æstius respectu cerebri est frigidus: quia Galenus 8. de Vsu P. cap. 2. dicit, cerebrum esse calidius aere æstiuo: ergo cibus respectu nostri corporis

est m.



tempore ætatis eligendus erit frigidus : ergo similis .

Addit Hippocrates , & *is qui tali victu vti consueverunt* : ex Galeno enim 8. meth. 9. & lib. de assuetudine natura gaudet consuetis. Hippocrates 2. de ratione vic. 33. asserit, melius concoqui consueta cibaria, quamuis mala sint, quam insolita, licet vitio careant. Similiter Hippocrates 2. sec. aphorismorum 50. vult, consueta deteriora esse minus molesta insuetis melioribus, suauioribusque .

Galenus, verò 6. de loc. aff. 4. refert de quodam homine lugente mortem vxoris & à concubitu, quo ante creberrimè vsus fuerat, abstinentes qui cibi cupiditatem ita amiserat, vt cibum tenuem, & exiguum coquere non poterat : refert Galenus ad pristinam consuetudinem coitus hunc hominem redeuntem, quam celerrimè fuisse liberatum. Quare non est mirum, si victus humidus solitus, & consuetus non solum conferat pueris illi assuetis, sed etiam omnibus alijs, qui tali victu vti consueverunt.

## APHORISMVS XVII.

**E**T quibus semel, aut bis, & quibus plura ne, an pauciora particulatim oporteat asferre considerandum. Condonandum autem aliquid tempori, & regioni, & ætati, & consuetudini.

Cum superius egerit Hippocrates ( vt ait Galenus in comm.) de quantitate, & qualitate victus. In hoc aphorismo agit de modo vtendi victu, seu de cibi partitione, seu de tempore exhibendi cibum.

Diuiditur aphorismus in duas partes. In prima proponit esse considerandum, in quibus ægrotantibus semel, aut bis, aut per plures vices sit cibandum, & an plura, vel pauciora cibaria danda sint.

In secunda parte vbi dicit, » *condonandum*

*aliquid est tempori*, proponit quatuor scopos cibandi minus principales, qui sunt, tempus, regio, ætas, & consuetudo : ex quibus colligimus modum cibandi, an scilicet parum, vel multum, vel raro, vel sæpè sit cibandum : dicimus esse scopos minus principales, quia vt inquit Galenus in comm. scopi principales in præbendo cibo sunt duo, nempe virtus, quæ est illa quæ propriè indicat cibum, & morbus, qui cibum permittit : refertque, dixisse condonandum : quia neque totum, neque maximum his quatuor scopis minus principalibus in præbendo cibo est deferendum.

Dicit condonandum est aliquid tempori : quia ( vt inquit Galenus ) hyeme multum, & raro sunt cibanda corpora : quoniam ventres hyeme sunt calidiores, & validiores. Æstate verò parum, & sæpè : quia ventres sunt frigidiores, & imbecilliores. In veris principio, quod sapit naturam hyemis, corpora sunt nutrienda, vt hyeme. In fine quod sapit naturam ætatis, sicuti in æstate : in media parte veris, quia corpora sunt plena, parum & raro, ne in plethoricam, & morbosam dispositionem cadat.

Hinc qui instituerunt ieiunium cum esu piscium in media parte veris, rationabiliter id fecerunt consentientes principijs & fundamentis medicinæ Galeni dicentis, in vere parum, & raro edendum, parum significat alimentum minus plenum, quod in piscibus, & non in carnibus inuenitur : raro verò significat ieiunium.

In autumno verò, si vires sint validæ, multum, & raro nutriendum : si inualidæ parum, & sæpè cibandum. Accedit, quod Galenus in comm. dicat, autumnum esse similem corporibus ortis ex corruptella cum virium languores : ideo parum, & sæpè alendum, intelligendo de debilibus.

Quo ad Regionem, par est ratio, vt dictum est de tempore : quia in regione calida parum & sæpè : in frigida multum, & raro : in sicca, vt in autumno : in temperata non vt in vere : quia in vere parum, & raro est cibandum, non ratione veris ; sed ratione hyemis præteritæ, in qua multus collectus fuit sanguis : in regione verò temperata id non consideratur : quia in regione temperata, si corpora sint temperata, & per



per consequens robusta, multum, & raro, ut in hyeme cibandum est.

Quoad aetatem: in pueris multum, & sæpè: quia virtus concoctrix est validissima, & diffusio est maxima. In iuuenibus multum & raro: quia diffusio non est tam magna, ut in pueris. In senibus in primo senio parum & raro, quia sunt reſerti pituita dulci, quæ in sanguinem conuertitur: quod enim in iuuenibus diffatur, in his magna ex parte in pituitam dulcem degenerat. In decrepitis parum & sæpè: quia eorum pituita est vitrea & coctioni rebellis.

Prima dubitatio ex dictis occurrit: si senes non possunt conuerrere pituitam in alimentum, tantò minus cibum, qui antequam nutriat, prius conuertitur in pituitam.

Responsio est, cibos conuerti in quatuor humores, itaut illa cibi portio, quæ conuertitur in sanguinem, sit illa quæ decrepitarum nutriat. Similiter illa cibi portio quæ in iuuenibus conuertitur in bilem, in senibus conuertatur in sanguinem nutritiõni maximè aptum: hanc doctrinam à Galeno desunt & simus lib. 2. de facul. nat. 8. ubi agens de melle inquit, mel in iuuenibus conuerti in bilem: in senibus verò in sanguinem; vnde quoque colligimus, quod omnes cibi, qui in iuuenibus conuertuntur in bilem, in decrepitis sint salubres, & ita proportionati, ut in bonum sanguinem conuertantur.

Quoad consuetudinem, cui certè, ut optime admonet Hippocrates, aliquid est condonandum: sciendum, quod tempore Hippocratis aliqui semel in die, aliqui bis, & ter soliti erant cibum sumere, sicuti refert Hippocrates in hoc aphorismo, dum dicit quibus *semel, aut bis, aut pluribus vicibus*: illorum consuetudo, quæ dum erant sani fruebantur, certè est conseruanda: quia consuetudo antiqua est serè altera natura.

Hinc Galenus semper magni faciens antiquam consuetudinem 11. meth. 3. 8. meth. 9. & 9. meth. 14. admonet, ægròs esse reducendos ad temperamentum, quod, dum nuper erant sani, fruebantur: neque vult ægròs esse reducendos ad tempera-

mentum primigenium: causa est, quia sæpissimè accidit, ut temperamentum aduentitium magis distet à temperamento primigenio, quam distet morbus ab aduentitio salubri.

Sic natura Mitridatis Regis vsu veneni reddita erat similis veneno, temperamētum aduentitium Mitridatis fortasse magis distabat à suo temperamento primigenio, quam ab ipso veneno.

Sic temperamentum aduentitium vetulæ atheniensis, quæ ex Galeno 3. de simp. medicina cap. 18. nutrebatur cicuta, fortasse magis distabat à suo temperamento primigenio, quam ab ipsa cicuta.

Hinc Galenus 2. de temperamentis cap. 4. dicit, mutari temperamentum frigidum in calidum, & humidum in siccum: itaut gratiles fieri possint pingues, & viceversa: quare temperamentum primigenium non solum potest esse diuersum ab aduentitio, sed etiam omninò contrarium: immo dum Hippocrates inquit, condonandum esse consuetudini, id dixit: quia consuetudo potest restituere illud temperamentum, quo ægri, dum erant sani, fruebantur. Valcant illi, qui solum à latitudine venarum, & ab alijs signis temperamenti primigenij colligunt recessus à naturali statu aduentitio, sano tamen.

Quare ex consuetudine sex rerum non naturalium colligemus, & rectè ciborum & remediorum administrationem, & futuros euentus, quod probari potest ratione, & experientia, hoc modo: sit vir temperamenti calidi in primo gradu, qui ob ciborum calidorum consuetudinem factus sit calidus in secundo gradu: sitque alter temperamenti calidi in tertio factus vsu frigidorum calidus in secundo: in vtrisque idem erit temperamentum aduentitium acquisitum per consuetudines contrarias. Esto quod ambo in morbum frigidum corruant, & quod ambo debeant calidis præſidijs sanari, quem creditis citius sanatum iri? pater experientia, & ratione, illum citius sanari, qui solitus erat vri calidis, quàm is alter fuerit calidior: ratio hæc est, quia ille, qui erat solutus vri calidis, potest dereperire, & sine periculo liberius vri calidis, cùm à quia transitus ad soli-



solita est facilis, ad insolita verò difficilis.

Hinc Hippocrates 2. de ratione vic. tex. 21. habet hanc sententiam „ melius est vti vitiosa victus ratione, quæ solita sit, quàm subito ad meliorem insolitam transire: melior sanè erat pto vetula Atheniensi vsus cicuræ solitus, & consuetus, quam caro vituli, vel perdicis omninò insolita: quare qui incidit in morbum frigidum, antea-que vsus fuerit calidis, citius liberabitur.

Deinde colligimus, his hominibus liberius esse danda calida: quia per hæc citius sanabuntur. Quod diximus de morbis frigidis intelligimus de calidis, & omnibus alijs morbis. Ecce quod ex consuetudine fex rerum non naturalium non solum colligendus est modus cibandi, sed etiam futurus euentus.

Secunda dubitatio circa aphorismum, Hippocrates in aphorismo 10. & 11. egit de modo cibandi, & de cibi partitione: ergo hic aphorismus, qui agit de eadem re, est superfluous.

Respondetur, Hippocratem superius egisse de modo vtendi cibo solum in ægris morbo acuto laborantibus: in hoc verò aphorismo de modo vtendi cibo in sanis, & ægris, vt docet Galenus in comm.

Præterea respondemus, Hippocratem in hoc aphorismo intelligere de cibo medicinali, & non de nutriente.

Alij respondent, Hippocratem superius egisse de quantitate continua alimentorum. In hoc verò aphorismo de discretâ, id est de numero oblationum alimentorum particulatim.

Vtraque responsio mihi probatur: Hippocrates sanè est accuratissimus in declarando modo vtendi ipsis cibis: carèt enim arte medica, qui vtendi modum non percipiunt. Galenus lib. de vsu theriacæ ad Pamphilianum habet hanc sententiã, qui vsus medicinæ non habet, quâuis medicinam intelligat, idem est, ac si lyram habeat, & eius vsu careat.

Tertia dubitatio: Hippocrates in aphorismo proponit quatuor cibandi scopos, nempe tempus, regionem, ætatem, & consuetudinem: sed sic est, quod duo tantummodo sunt cibandi scopi: quorum primus est virtus, quæ sola indicat cibum, vt do-

cet Galenus primo de ratione vic. 44. secundus scopus est morbus, qui nullo modo est indicans: sed dicitur, vel permittens, vel prohibens ipsum cibum: cibus enim ex Hippocrate & Galeno 7. sec. aphorif. 65. ægrotanti sæpissimè morbus sit.

Respondetur de virtute nihil dixisse: quia supposuit tamquam notissimum virtutem indicare cibum: proposuit tamen quatuor propositos scopos, qui declarant, quando virtus indicet, & quantum, nempe an semel, vel bis sit cibandum, & an plura, vel pauciora cibaria sint exhibenda: quæ omnia primariò colliguntur ex virtute: secundariò ex tempore, regione, ætate, & consuetudine: morbus verò est tamquam prohibens ipsum cibum, vel permittens.

Quarta dubitatio: Hippocrates inter scopos proponit tempus, ætatem, regionem, & consuetudinem, quæ variant numerum oblationum ciborum: omisit tamen temperaturam, Cæli statum, & symptomata varia, quæ mutare possunt cibandi modum, & numerum oblationum: ergo de doctrinæ imperfectione Hippocrates est arguendus.

Respondetur, temperaturam reduci ad virtutem: symptomata verò ad morbum: virtus enim, & morbus sunt duo scopi, de quibus Hippocrates superius egit. Deinde dicimus, Cæli statum ad tempus reducendum esse. Addimus quod omnia alia, quæ oblationum numerum variare possint, redigantur ad morbum & virtutem, vel ad quatuor propositos scopos in aphorismo.

Quinta dubitatio: in aphorismo loquitur de febricitantibus: sed sic est, quod morbus prohibet cibum ex Hippocrate loco citato: ergo nec bis, nec pluribus vicibus cibandum est. Præterea ex Hippocrate aphorif. 10. 2. sec. „ Impura corpora quo magis nutries, eo magis lædes: ergo nec semel, nec bis erunt ægri cibandi.

Respondetur, cibanda esse corpora ratione virium: ratione verò morbi cibum prohiberi: sed hac lege, quando magis pōt virtus ad indicandū cibū quam morbus ad prohibendum, tunc bis, ter, & quater æger cibandus erit: quando verò ma-



gis potest morbus ad prohibendum, quam virtus ad indicandum, sicuti accidit in robustis, tunc in morbis perperacutis nec bis, nec semel acri cibandi sunt.

Vel respondemus, Hippocratem in hoc aph. intelligere de victu medicinali. In aphorismo 9. de nutriente.

Sexta dubitatio: Hippocrates in aphorismo 7. dicit in peracutis aegros non esse cibandos: ergo dum dicit in hoc aphorismo semel & bis, & pluribus vicibus esse cibandos, sibi contradicit.

Respondetur Hippocratem in 7. aphorismo intelligere de acribus robustis. In hoc verò aphorismo de debilibus.

## QVÆST. LXXI.

### De quatuor regulis pro cibandis acrie.

**S**Ed accedamus ad Galeni comm. in quo tradit quatuor pulcherrimas regulas, quæ docet quibus parûs, & sæpè, & quibus multum, & sæpè: quibus parum & raro ac quibus multum, & raro sit dādus cibus.

Prima regula à Galeno in comm. proposita, hæc est, si vires sint languidæ, & morbus sit cum corruptella humorum, vel cum defectu humorum, acri parum, & sæpè cibandi sunt. Parum (ait Galenus) ratione virium: quia vires languidæ parum cibi possunt concoquere: dicit sæpè, quia ubi est humorum defectus, debemus multum reponere, sed virtus debilis hoc non permittit; ideo ait Galenus, parum, & sæpè nutriendum; quia alimentum parum, & sæpè exhibitum equiparatur multo.

Secunda regula: si vires sint validæ, & morbus sit cum corruptella, & defectu humorum, multum, & sæpè cibare oportet multum, quia vires sunt validæ: sæpè ratione defectus humorum, & sæpè ratione corruptellæ: quia intelligit de victu medicinali, qui tollit corruptellam, cuiusmodi sunt prîsana hordeacea, ferum lactis, & alia id genus, & quia ex Galeno 9. meth. 12. sanguis corruptus amplius nutrire non valet: ideo sæpè alendum: *sed id est de victu medicinali.*

Tertia regula: si vires sint languidæ, & humores sint mediocres aut multi, boni tamen, parum, & raro cibandum. No-

tandum intelligere Galenum de virtute facta languida per suffocationem: virtus enim potest fieri languida duobus modis, vel per resolutionem, vel per suffocationem, quæ suffocatio pendere potest ab humoribus alimentalibus, si multi sint: ideo ut suffocatio prohibeatur, parum & raro cibandum.

Quarta regula: si vires sint validæ, & humores sint multi, & boni, parum, & raro cibandum, secus æger incideret in plethoricam dispositionem, & tandem in suffocationem. Sed multæ se offerunt difficultates circa has regulas.

Septima dubitatio: hæc est circa primam regulam: quæ prima facie videtur falsa, nempe quod in morbo cum corruptella sæpè sit cibandum, ut dicit Galenus in comm. quoniam corruptella omnino prohibet ipsum cibum; quandoquidem impura corpora quanto magis nutriuntur, tanto magis læduntur.

Respondetur ex Galeno 11. meth. cap. 10. putredinem duplicem esse, aliam in fieri, & aliam in facto esse: hoc posito dicimus, putredinem in facto esse prohibere cibum, & non putredinem in fieri. Præterea in hoc loco Hippocrates, ut animadvertit Galenus in comm. intelligit de victu medicinali, qui resistit putredini, vel impedit, ne humores ex toto corrumpantur.

Octava dubitatio: non videtur, quod secunda regula sit vera, quod scilicet ubi sint vires validæ cum corruptella, multum, & sæpè sit nutriendum: primo quia Hippocrates videtur oppositum asserere 2. aphor. 10. dum dicit, impura corpora quo magis nutries, eo magis lædes. Deinde ex Galeno in hoc loco quando humores sunt corrupti, alimentum exhibitum convertitur in naturam humorum corruptorum: ergo ubi erit corruptella, nec multum, nec sæpè erit cibandum.

Præterea Galenus 1. de ratione vic. in ac. 44. asserit, in morbis acutis virtute existente valida cibum esse minuendum: virtute verò existente inualida potius cibum esse augendum, quam minuendum. Hinc Galenus in comm. 9. huius sect. admonet, si virtus possit perdurare usque ad vigorem, nihil cibi dandum esse: ex his colligimus,



mus, non esse veram Galeni sententiam, quod in virtute valida cum corruptella multum, & sæpè sit cibandum.

QVÆST. LXXII.

*Quomodo interpretandus sit aphorismus decimus secunda sec. „ impura corpora quanto magis nutries &.*

**V**Go Senensis dat duas solutiones interpretando duobus modis aphorismum vndecimum secundæ sect. Prima solutio est: dum dicit Hippocrates, impura corpora quo magis nutries, eo magis lædes, dicit magis lædi, dum corpora nutriuntur ultra convenientem quantitatem.

Hæc prima solutio rejicitur, quia aphorismus Hippocratis esset vanus. idem enim posset dici de robustissimis, & sanissimis corporibus, si nutrirentur ultra convenientem quantitatem, quod scilicet magis læderentur.

Secunda solutio Vgonis est, quod corpora impura considerentur, vel quatenus impura, vel quatenus habent aliquos humores bonos: quoposito inquit, quatenus sunt impura lædi, sed quatenus continent humores bonos, sæpè esse cibanda, & non lædi.

Primo rejicitur, quia vnicum indiuiduum simul, & eodem tempore non potest nutriri, & non nutriri: neque simul stare possunt duo scopi cibandi contrarij.

Deinde illud multum, & sæpè, vel nocet, vel non nocet: non est dicendum nocere, & non nocere in vnicò indiuiduo: quia de quolibet est affirmatio, vel negatio vera, quod est axioma indubitatum.

Tadeus Florentinus, & Paternus dicebant, aphorismum vndecimum secundæ sect. esse verum ante euacuationem, non post euacuationem: itaut, si vires sint validæ post euacuationem, multum, & sæpè sit cibandum.

Hanc solutionem refellimus hoc dilemate: post factam euacuationem in febribus putridis, vel adest corruptella, vel non adest: si adest, ergo corpora sunt impura, si non adest, de his non loquimur.

Montanus videns vndique difficultates,

nesciensque nodum soluere deereuit hanc secundam regulam à Galeno propositam in comin. reprehendere dicendo esse impossibile, quod cum defectu humorum, & corruptella vires possint esse robustæ.

Hallucinatur sanè Montanus: idque probamus ratione, auctoritate, & experientia. Ratione quia non valet, virtus deficit in humoribus & spiritibus, ergo & in solidis.

Auctoritate id confirmatur, quia dum Hippocrates 7. aphorif. 2. sectionis habet. Quæ longo tempore extenuata sunt corpora lentè reficere oportet, quæ breui breuit r: dum dicit, quæ longo tempore extenuantur, vult Galenus, quod intelligat de extenuatione solidarum partium: ideo in comin. inquit, dum breui tempore extenuata sunt corpora, potest esse defectus in spiritibus, & humoribus: in solidis verò virtus potest conservari robusta: si verò longo tempore sint extenuata, vires quæque solidarum partium deficere incipiunt.

Experientia quoque comprobatur, quia interdum ægrotantes spatio septem vel octavo dierum maximè extenuantur, tamen robur in solidis benè conservatur: virtus enim solidarum partium consistit in calido implantato, à quo omnes vires, & omnes actiones dependent vt testatur Galenus in comin. 15. huius sectionis.

Præterea nisi vires sint validæ, non fit sanguinis missio, vt admonet Hippocrates 4. de ratione vic. tex. 19. sed sic est, quod in febribus putridis, vbi reuera viget corruptella, præcipue conuenit sanguinis missio: ergo vires possunt in suo robore conservari, licet in corpore reperiat humorem corruptellum.

Demum nonnulli tenent, aphorismum „ Impura corpora quanto magis nutries esse verum de corruptella ventriculi: quocasu quanto magis nutries, tanto magis lædes: negantque aphorismum esse verum de corruptella facta in ipsis venis: Galenum verò in hoc comin. (dicunt) intelligere de corruptella facta in ipsis venis, & non in ventriculo.

Cæterum hæc solutio patitur instantias insolubiles: quia ægri ex quacunque corruptella, multum, & sæpè nunquam sunt cibandi: Galenus enim 1. de ratione vic. 44.

De d. in.



inquit, de ratione morbi esse cibumprohibere.

Nos dicimus Galenum in hoc comm. intelligere de victu medicinali, qui vt est animalis succurrit defectui, quatenus verò est medicinalis succurrit corruptellæ: Galenus in comm. ait, defectum humorum exigere additionem: corruptella verò epichrasim, idest contemperamētum.

Sciendum quod duplex est epichrasis, altera, quæ venit à verbo *ἐπιχράω* idest colubro, seu retineo: de hac mentionem fecit Galenus 9. meth. 10. dum dixit, in debilibus facienda est euacuatio, per epichrasim idest partim euacuando, & partim cohibendo, & nutriendo: altera verò epichrasis est, quæ venit à verbo *ἐπιχράω* idest, attempero. De hac mentionem facit Galenus multis in locis: sicuti 12. meth. cap. 8. vbi habet hæc verba „ si corpus ob copiam acrium humorum incidat in syn- copem, alterum de duobus facere oportet, nempe vel euacuare humores acres, vel vti epichrasi idest, attemperatione. Parimodo Galenus locutus est de his epichrasticeis idest attemperantibus acres, & mordaces humores lib. 1. de simp. medicina cap. 11. & 13. & 4. de ratione vic. in acutis. comm. 29.

### Q V Æ S T. LXXIII.

*Quando conueniant epichierastica. & quæ sint, & quomodo multum, & sæpè illis vi liceat.*

**S**ed tria occurrunt consideranda de epichierasticeis, idest de contemperantibus. Primum in quibus morbis conueniāt. Secundum quænam sint materiæ auxiliij epichierastici. Tertium cum dicat Galenus multum, & sæpè cibandum, si virtus sit robusta, quaritur in morbis ex corruptella & defectu humorum quid intelligat per illud multum, & per illud sæpè.

Quo ad primum sciendum, epichierastica esse illa, quæ temperando, calorem moderantur: Galenus in comm. vult, conuenire omnibus morbis ex corruptella: ratio est: quia in omni corruptella adest acrimonia, ergo vbi cumque erit acrimonia,

conuenient epichierastica: sicuti in omnibus febribus hecticis, ephemeris, & in omnibus morbis, qui fiunt à bile, & à melancholia adusta.

Quo ad secundum: quænam sint materiæ victus epichierastici Galenus 2. de simp. medicina cap. 12. & 13. proponit lac, vel eius serum, & prillanā hordeaceam: sed inter ista, lac est præstantissimum, & præcipuè asininum, vt arbitratur Galenus 4. de ratione vic. comm. 29. Post asininum est muliebre: deinde caprillum, separata aliqua ex parte substantia caseosa, & butyrosa, quod fit, vt primo bulliat lac, & mox quæ collentur, & separetur à parte crassa, quod adhuc apparet lac, sed valde tenue. Dicimus aliqua ex parte separata substantia caseosa, & butyrosa, quia serū omnino depuratum non est ita epichierasticum, sicuti est aliqua ex parte butyro permixtū: pars enim nitrosa in ipso continetur, quæ est aliquis salsedinis particeps: habet vim detergendi, & in infantibus mordicandi: si verò est permixtum aliqua ex parte butyro inter epichierastica collocatur.

Lacti præterea respondent quatuor humores: sanguis respondet butyro: melancholia caseo: bilis, & pituita sero, in quo sunt duæ naturæ, videlicet pars nitrosa, quæ est calida, & pars aquosa, quæ est frigida.

Post lac sunt iuscula parui puli, quæ ceteræquant humores, & acrimoniam non solum moderantur, sed etiam succurrunt defectui. Si verò in iusculo ebulliant lactuca, borago, indimā, & alia id genus, quæ attemperant calorem, habent vim epichierasticam.

Similiter iusculum Lymacium, amputatis capitibus, quæ reddunt iusculum valde mucilaginosum, & abiectis intestinis, si plena sint, calorem benè attemperant.

Insuper iusculum testudinum, & ranarum, lac amygdulicū ex tactum aqua Lymacium, seu aqua violarum, hac lege, vt amygdalæ sint recentes, optimum est. Item lac sem. melonum, & inter fructus præcipuè sunt poma.

Quo ad tertium: quo pacto videlicet multum, & sæpè (vt ait Galenus in comm.) dari debeat victus medicinalis, & quid per sæpè intelligat, non conueniunt Expositores.



res. Hippocrates 4. de ratione vic 29. loquens de lacte, quatenus est cibus medicinalis, putat vna die dari posse duodecim lactis haminas: hamina efficit nouem vncias: irant haminae duodecim efficiant nouem libras: Galenus in illo comm. inquit, Hippocrate intelligere de lacte asinino: illudque dedisse in magna quantitate: tum quia lac asinum non coagulatur: tum quia quatenus victus medicinalis succurrit (vt dicit Galenus in comm.) defectui, & corruptelae: sed casu quo esset corruptella sine defectu, ita copiosum non conueniret.

Præterea, dum Hippocrates tam copiosum lac exhibebat, non utebatur alijs cibis: ideo Nos debemus Hippocrate imitari in magnis caloribus, in febribus putridis vel hecticis solum præbendo victum medicinale: atque amouendo carnes, & oua, quæ sanè augment calorem: quia carnes, & oua pertinent ad victum plenum, qui ex Galeno 8. meth. 2. & 3. de facul. nat. 4. in nulla quantitate, quamuis minima, dandus est febricitantibus: ibi Galenus ait, in pane carnes & ouo duas esse partes, nempe, vtilem & inutilem: de vili inquit, licet conuertatur in ventriculo, tamen in venis ipsis non concoqui: quia pars utilis in febricitantibus admittitur: inutilis verò, quæ est in pane, carne, & ouo est acris & fumosa, & non frigida, & humida: ideo febribus præcipue acutis non conuenit.

Per quot vices verò dandus sit victus medicinalis, dicimus ter & quater in die: dummodo accessiones non prohibeant, & cibus exhibitus concoquatur.

Quod verò multoties dari debeat cibus medicinalis, præcipit Galenus in comm. dum inquit, multum, & sæpe id est per plures vices, si digeratur per vrinam, vel per aluum, & pars alimentalis in substantiam conuertatur.

Restat, vt consideremus tertiam regulam à Galeno propositam in comm. quæ erat, si vires sint languidæ, & humores sint mediocres (addit) vel multi boni, parum, & raro cibandum.

Montanus contra hanc regulam insurgit, præbatque, in medicina non habere locum: quia vbi humores sunt multi, & boni, ibi sunt multi, & boni spiritus: vbi sunt

multi, & boni spiritus, ibi virtus debilis esse non potest: quare infert contra Galenum, stare minime posse virtutem debilem cum multis, & bonis humoribus.

Instantia hæc Montani non euerit hanc Galeni regulam: primò quia habitus Athletarum est in vltimo termino bonitatis, & cum multitudine bonorum humorum: tamen Athletæ parum & raro sunt nutriendi, secus suffocarentur: habentque virtutem debilem non propter resolutionem, sed propter suffocationem: ergo stare possunt multi, & boni humores cum virtute debili.

Deinde Galenus lib. de plenit. cap. vlt. concludit, in maxima plenitudine bonorum humorum sequi tensionem & grauitatem cum totius corporis lassitudine: Ecce quod dari possunt multi boni humores cum lassitudine, & debilitate saltem per breue aliquod spatium.

Demum vires possunt esse debiles, humoribus quoque mediocribus existentibus, quando committuntur errata in coitu, vel alijs sex rebus non naturalibus.

Contra quartam regulam, quæ est quod in virtute robusta cum bonis, & multis humoribus parum, & raro sit nutriendum, proponitur argumentum efficacissimum, quod in hoc consistit: quia virtus valida indicat multum, & non parum esse cibandum.

Galenus in hoc comm. de medio tollit hanc difficultatem dicendo, parum & raro esse dandum non ratione virtutis, sed ratione corporis, ne cadat in plethoricam dispositionem: quia loquitur Galenus in hoc comm. de corpore habente plenitudinem quo ad vasa.





## APHORISMVS XVIII.



*Estate, & autumnno cibos difficillimè ferunt. Hyeme facillimè. Secundum locum ver habet.*

Hippocrates in superiori aphorismo loquens de cibi partitione dixit esse condonandum aliquid tempori, regioni, ætati, & consuetudini. In hoc aphorismo similiter considerans ciborum partitionem docet, quid sit condonandum tempori, nihil tamen dicit quid sit condonandum regioni, ætati, & consuetudini, mira, & artificiosa vtens breuitate; quoniam qui cognoscit quid sit condonandum tempori, statim cognosceret quid sit condonandum regioni, ætati, & consuetudini: quia regio, ætas, & consuetudo proportionem respondent tempori, vt colligitur ex Hippocrate 1. de natura humana, & alibi.

Quatuor enim anni temporibus respondent quatuor regiones, quatuor ætates, quatuor temperamenta primigenia, quatuor aduentitia, quatuor humores, quatuor elementa, & quatuor diei partes, vt alibi ostendimus ex Hippocrate & Galeno: ideo Hippocrates solum mentionem fecit de quatuor anni temporibus.

Neque hic aphorismus coincidit cum 15. Ventres hyeme: itaut secundum opinionem nonnullorum Hippocrates incidat in *ταυτολογίαν*, idest in eiusdem rei repetitionem, & aphorismus sit superfluus. Non coincidit cum 15. aphorismo quia in illo agit de cibi quantitate continua: in hoc verò de discreta: quia persistit in eodem proposito, quod est de cibi partitione.

Præterea in decimoquinto aphorismo egit de quantitate cibi sanorum: in hoc de portione cibi egrorum. In decimoquinto egit de maiori, vel minori copia. In hoc verò de facili, vel difficili tolerantia. In decimoquinto dixit, hyeme esse dandum multum cibi. Hic verò persistit in eodem proposito, an videlicet illud multum propositum in superiori aphorismo sit dandum vna vice, vel pluribus vicibus.

Diuiditur aphorismus in duas partes. In prima ponit hanc conclusionem: æstate, & autumnno præcipuè ægros difficillimè ferre cibi copiam. In secunda ponit aliam conclusionem, quæ est, hyeme corpora cibos facillimè ferre: vere minus facile.

Quo ad primam conclusionem, cur æstate, & autumnno difficillimè ferant cibos: ratio est, quia calor naturalis æstate, & autumnno languidus est: languidus est in æstate: quia à calore ambiente trahitur calor naturalis ad corporis superficiem.

## Q V Æ S T. LXXIIII.

*Vnde morbi autumnnales, & malignæ febres oriuntur.*

**L**anguidus verò est in autumnno naturalis calor ob tres causas. Prima ob aeris inconstantiam: corpora enim modò frigore, modò calore vexantur: vnde propter istos motus oppositos vires facillimè dissoluantur; quia motus oppositi non fiunt sine maxima violentia: atque hæc est ratio, cur Auicennas fen. 4. lib. 1. doc. 5. cap. 20. vbi agit de phlebotomia, dicat post somnum phlebotomiam statim factam esse malam: quia efficit in membris cum fractionem, neque post phlebotomiam statim est dormiendum. Quod verò dormitio, & phlebotomia fiat motus oppositi, patet: quia in phlebotomia sanguis mouetur ad exteriora: in somno verò ad interiora: natura quidem à motibus oppositis facillimè opprimitur.

Hinc ita possunt motus oppositi, & præcipuè in autumnno, vt corpora ad malignas febres, & ad mortem disponant: motus oppositi sunt, vt aer æstiuus feruidus coniunctus cum nimio cibo, vel cum maximo animi calore: aer enim æstiuus feruidus pellit sanguinem ad circumferentiam: nimius cibus, nimius somnus, vel maiores, & timores ad centrum. Aer gelidus copulatus cum nimia vigilia, vel cum nimio coitu, vel exercitio violento disponit egrorantes ad malignas febres: quia sunt motus oppositi: nimius cibus, somnus, maiores, & nimij timores compellunt malos humores ad cor, siue ad cætrum, in quo ar-



ma hostilia occultantur: nimia vigilia, nimius coitus, & nimium exercitium pellunt ad exteriora malos humores, immo & calorem ipsum influentem, quod diu separato ab implantato, membrorum vires dissolvuntur: quia ibi transmutatio in chylum, & sanguinem, & sanguinis in spiritus fieri non potest, nisi à calore influente unito cum implantato, ut probatum est aphor. 15.

Hinc motus symptomatici, si in agrotantibus, oppositi sint, ut plurimum minantur mortem: sicuti si eodem tempore ægri vexentur alui fluxu, & sudore, vel eodem tempore sudor, & principium paroxysmi fiant, vel fluxus & vomitus, vel fluxus sanguinis per hemorrhoidas, & per nares: hi sunt qui indicat finem exitiosum; tunc enim natura est victa, & de agrotante iacta est alea, quia dum ipsa vincit, vnus motus vniformis fit, & non oppositi. Inde fit, quod medici maximè lædant agrotantes, si eodem die, quo aluum purgant, faciant frictions, & applicent cucurbitulas, vel hyrrhuidines hemorrhoidibus; ac eadem de vomitoria præbeant, sed de his egimus libro sexto meth. nostræ cap. 2.

Secunda causa, cur in autumno virtus sit languida, est, quia tunc omnia sunt corruptioni obnoxia: ideo Galenus in comm. superiori inquit, autumnum assimilari corporibus ortis ex corruptella; autumnus enim dicitur *φθινόπωρον*, *φθίνω* significat corrodo: *πώρα* autumnum.

Tertia causa, cur vires in autumno sint languidæ est, quia tunc corpora sunt repleta humoribus adustis tempore æstiuo collectis: ex quibus non possunt fieri multi, & boni spiritus: causa enim immediata virtutis robustæ sunt humores temperati, & non adusti.

Prima dubitatio: Galenus in comm. superiori dixit, cibi partitionem primariò desumendam esse à viribus, & à morbo: secundariò verò à tempore, regione, ætate, & consuetudine. At hæc doctrina non videtur principiis methodi medendi consentire: quia in methodo sumitur hoc principium certum, tatum & minimè dubium, quod vnum indicet vnum, & vnum

indiceretur ab vno, & non à duobus, quod principium, si destruat, ruer tota medendi methodus: cibi partitionem est vna res: ergo non indicabitur à duobus, nempe à viribus, & à morbo.

Respondetur, cibos esse duum generum: alios esse solum nutrientes, hosque solum indicari à viribus: alios verò esse cibos medicinales; istosque indicari à viribus & à morbo, à viribus quatenus sunt præditi virtute nutriente, à morbo quatenus sunt præditi virtute medicinali.

Hæc posita distinctione respondemus Galenum dixisse, cibi partitionem esse desumendam à viribus, & à morbo intelligendo de cibo medicinali, qui est ille qui habet duplicem qualitatem, id est nutrientem, & medicinalem.

Victus medicinalis non solum est ille cibus, qui habet virtutem epichierasticam, cuiusmodi sunt, lac, trisana, & alia id genus: sed qualiscumque victus, qui habet qualitatem nutrientem, & medicinalem, licet non habeat virtutem epichierasticam dici potest medicinalis. Exempli causa diamoron, quod fit ex succo mororum, & melle, dicitur medicinalis, quia nutrit, & simul tollit oris vlcuscula, ac reprimat inflammationem. Similiter hydromel sine mulla, que fit ex aqua, & melle præparat, pituitam ad expulsionem & bene nutrit: Immo Galenus 3. de ratione vic. in ac. comm. 21. vult hydromel duplo magis nutrire, quam vinum oligosorum. Quod diximus de mulla intelligimus de multis alijs, ut de loch de pino, quod est bechichium præstantissimum in asthmate, & tussi diuturna: bene nutrit propter nucleos pini? Parimodo saponæa, quæ fit ex amygdalis, amylo, & saccharo nutrit, & simul incrassat tenuem catarrhum. Aquæ similes medicinales nutrientes innumera asserti possunt, quæ inter cibos medicinales collocantur. Fusius de his egimus propter illos medicos, qui putant solos cibos virtute epichierastica præditos, esse medicinales, & non alios.

Secunda Dubitatio: Hippocrates ait, ætate cibos difficillime ferri: Galenus tamen primo de ratione vic. in ac. 44. præcipit in ægris debilibus, & tempore æstiuo,



stius, in quo debiles sumus, cibum esse augendum, hyeme verò minuendum. Quomodo in aestate cibus est augendus, si sani, & longè magis agri illum difficillimè ferunt.

Respondetur: cibum duobus modis considerari: vel quatenus datur in vnica cibatione, vel quatenus datur in toto morbo: posita hac distinctione dicimus, in agris debilibus, vel tempore aestiuo, cibum esse augendum non in vnica cibatione, sed in toto morbo: ita ut plus cibi sit dandum debili in toto morbo, quam robusto; & aestate, plus, quàm hyeme, sed in toto morbo. Exempli gratia: Socrates est robustus, Plato verò debilis: vterque eadem febre laborat: dicimus quod spatium totius morbi plus cibi Platoni debili sit dandum, quam Socrati robusto. In vnica verò cibatione plus Socrati robusto, quam Platoni debili: quando verò dixit Galenus primo de ratione vic. 44. cibum in debilibus esse augendum, intelligendum est in toto morbo, & non in vnica cibatione.

Rationes verò, cur in agris tempore aestiuo in toto morbo plus cibi sit dandum, quam hyeme, tres sunt. Prima quia aestate fit maior spirituum resolutio in agris debilibus, quam hyeme.

Secunda causa est, quia hyeme humorum plenitudo obscurat indicationem, qua desumitur à viribus: quia vires ob plenitudinem diu stare possunt sine cibo: ideo minus hyeme, & vere.

Tertia ratio est, dato, & non concesso, quod hyeme nulla esset plenitudo, dicimus hanc propositionem esse semper veram, quod virtus agrorum quo robustior, eo tenuiorem cibum indicet: quo debilior eo plenior, hoc sine, ut possit perdurare eadem finem vigoris: in aestate in ipsis agris virtus debilis plenior cibum coindicat.

Tertia dubitatio exoritur, quomodo virtus in agris quanto est robustior, tanto tenuiorem cibum exigit: non ne Galenus superius dixit si vires sint robustae cum corruptella, & defectu, multum & saepe esse cibandum?

Respondetur Galenum locutum esse de cibo medicinali, qui tanto plenior esse debet quanto corruptella maior est, virtute amen existente robusta,

Quarta dubitatio: Hippocrates inquit autumnino cibi copiam difficillimè ferri. Contra hoc dictum Hippocratis duae sunt rationes: prima quia Galenus 3. aphorismorum 22. dicit autumnum esse frigidum: & frigidus, ergo à frigore fiet repulsio caloris ad partes internas: unde calor naturalis fiet robustior: si robustior, cibi copia facile feret. Secunda ratio est, quia nulla est differentia inter ver, & autumnum, quia in vere sol aequè distat à vertice nostri capitis, ac in autumnino: ergo corpora aequè calida erunt in vere, & autumnino, ergo aequè difficile ferent cibi copiam in vere, ac autumnino.

Respondetur, esse differentiam veris, & autumnini: quia in autumnino à precedenti calore aestiuo corpora facta sunt debiliora: id eo non ita facile ferunt cibi copiam.

Deinde aer autumnini ob precedentem calorem aestiuum redditus est tenuior, & magis dispositus ad suscipiendum frigiditatem & caliditatem, ideoque esse varium, & valde mutabilem: quod de alijs temporibus dici non potest.

Præterea in autumnino aer est refertus vaporibus & exhalationibus adustis, quæ non contingunt tempore veris: inde igitur patet veris, & autumnini varietas.

Quinta dubitatio: Hippocrates & Galenus in comm. dicunt, aestate parum cibi: hyeme verò ex Hippocrate aphorif. 18. multum, quia tunc plurimum est innati caloris: at tamen 1. de ratione vic. 44. Galenus præcipit, aestate plenius alendum, hyeme verò tenuius: similiter Auicennas 1. quarti tract. 2. cap. 8. ubi de febricitantium cibis tractat ait, aestate plus cibi dandum esse ob maiorem corporum resolutionem: hyeme verò minus ob cutis constipationem à frigore factam, ob quam minor fit resolutio, atque per consequens minor requiritur restauratio.

Respondemus duplicem esse causam, cur plus, vel minus cibi sit exhibendum. Prima est necessitas. Secunda est facilis tolerantia: hoc posito, dicimus cibandi necessitatem maiorem esse in aestate, quam hyeme: hyeme tamen tolerantiam esse faciliorem.

Præterea dicimus hyeme in robustis, & sanis



Sanis hominibus esse quoque maiorem necessitatem cibandi, quia maior sit resolutio, ut ostendimus aphorif. 15.

Præterea, si verum est, quod alimentum debeat proportionari diffinitioni, hyemeque diffusio maior sit, quia concoctio maior est: absque dubio hyeme maior fiet resolutio insensibilis, quam tempore æstiuo. Hoc in staticis satis superque probauimus.

**H**yme facilius vere minus. Hæc est secunda conclusio: si verò, cum hyeme corpora facilius ferant cibos, deinde ver, est, quia calor hyeme robustior est, deinde ver. Ex hac conclusione infert Galenus, hyeme multum & raro corpora esse cibanda: vere autem parum, & raro.

Sexta dubitatio: sed quomodo parum & raro in vere cibandum, si tunc corpora facilius ferunt alimentum? Montanus soluit hanc apparentem contradictionem hæc modo: Galenum dixisse parum comparatiue, videlicet respectu hyemis, & non absolute.

Hæc Montani solutio non explicat Galeni mentem: quia quando dicit, in vere parum, & raro esse cibandum: Galenus statim reddit hanc rationem, ne corpora incedant in plethoricam dispositionem: quia tunc venæ sunt plenæ ob multum & copiosum sanguinem hyberno tempore coactuatam; hæcque est vera solutio.

Septima dubitatio: sed quomodo ver ferre potest cibi copiam & non autumnus, non ne autumnus est similis veri? sicut enim ver in principio sapit naturam hyemis sic quoque autumnus in fine sapit naturam hyemis: sicut ver in fine sapit naturam æstatis; sic quoque autumnus in principio sapit naturam æstatis: quare nulla videtur esse differentia inter ver & autumnum.

Responsio paulo superius est proposita de differentia inter ver & autumnum, quæ pender ex præcedenti calore æstiuo: aer enim autumnalis est refertus adustis exhalationibus, estque tenuior, & maxime dispositus ad refrigerandum, & calefaciendum corpora vnius diei spatio, quod non conuenit veri.

**I**s qui per circuitus accessiones habent, nihil dare oportet, neque cogere: sed subtrahere ante indicationes.

Nonnulli sic introducunt aphorismum: dicunt Hippocratis propositum esse in hac prima sec. de triplici instrumento medico tractare, videlicet de pharmaceutico, chirurgico, & diæterico: dicuntque egisse in 2. aphorismo de pharmaceutico, in tertio de chirurgico, in quarto verò vsque ad decimum octauum inclusiuè de diæterico. In hoc verò aphorismo dicunt, Hippocratem proposuisse epilogum illorum, quæ hæcenus dicta sunt de fonte diæterico.

Primo hallucinantur: quia Hippocrates in 2. aphorismo non agit de instrumento pharmaceutico, sed de qualitate euacuationis in communi, quæ consideratio pertinet tam ad pharmaceuticum, quam ad chirurgicum fontem. In tertio verò aphorismo non agit de instrumento chirurgico, sed de norma circa nimias euacuationes, & nimias repletiones: quæ consideratio æque pertinet ad pharmaciam, chirurgiam, & diætam. A quarto autem aphorismo vsque ad hunc inclusiuè (ut dicit Galenus in comm.) Hippocrates agit de qualitate, quantitate, & de modo administrandi ipsum victum, videlicet à quarto aphorismo vsque ad duodecimum inclusiuè de qualitate victus ægrorum: in tribus sequentibus de quantitate victus sanorum: in decimosexto de victu medicinali, qui potest sanis, & ægris conuenire: in tribus verò sequentibus de modo administrandi victum, videlicet in decimo primo de partitione cibi: in decimo octauo de prabend cibo in varijs anni temporibus: in hoc verò decimonono de hora cibandi ægros.

Ex hac continuatione à nobis proposita primo intelligimus, ad victum pertinere hæc tria, qualitatem, quantitatem & modum administrandi. Secundo intelligimus, ad modum administrandi victum similiter pertinere hæc tria, cibi partitionem, cibi



cibi oblationem in varijs anni temporibus & horam cibandi, de quo agit Hippocrates in hoc aphorismo: Ecce quam mirificam, & Diuinam doctrinam non solum ex ipsismet aphorismis, sed ex illorum continuatione colligere possumus.

Præterea falluntur, qui dicunt, hunc aphorismum esse epilogum eorum quæ dicta sunt. Primum si esset epilogus contineret, quæ superius dicta sunt. sed sic est, quod nihil eorum continet, ut patet in verborum declaratione: ergo non est epilogus. Insuper epilogus ponitur in fine libri, & non multo ante finem. Addimus nos, Hippocratem neque in fine huius primæ sect. nec in fine totius operis vnquam vsum esse epilogis: ac merito, quia breuitas, seu dicendi grauitas ipsius Hippocratis non admittit epilogos.

Cōtinuatio igitur aphorismi hæc est: dixit in superiori aphorismo æstate, & autumno corpora diffici limē cibos ferre. In hoc aphorismo excipit accessiones, & tempus paulo ante iudicationem ipsorum morborum; in quibus accessionibus sit hyems, aut ver nihil cibi dandum est: quia in omni anni tempore paroxysmi, & tempus paulo ante crism cibum prohibent.

Diuiditur aphorismus in duas partes. In prima proponit hanc conclusionem: in accessionibus nihil dandum: ratio conclusionis est, quia natura est occupata in expellenda materia morbifica: ideo cibus non est distrahenda. In secunda parte, ubi dicit (nec cogere) ponit secundam conclusionem, quæ est ante iudicationem ægros ad cibum non esse cogendos, sed cibum esse demendum.

Quo ad explicationem verborum dicit „ *Hic quiper circuitus.* Sciendum, circuitum esse illud spatium, quod à principio vnius paroxysmi vsque ad principium alterius excurrit. Galenus lib. de morborum temp. cap. 6. diuidit circuitum in accessionem, & remissionem: accessionem in principium, inæqualitatem, augmentum, & statum; remissionem verò in declinationem, & interuallum. Dum dicit Hippocrates nihil dādum in accessionibus, intellexit nihil esse dandum in principio, nihil in inæqualitate, augmento, & statu, sed solum es-

se cibandos in declinatione, vel interuallo circuitus.

In principio accessionis nihil cibi dandum, quia impediretur transmissio peccantis humoris è venis maioribus ad minores, vnde febris intermittens fieret cōtinua, & continua maligna, & fortasse lethalis: si cuti obseruauit Hippocrates in ægro in-nominato, qui cenauit calefcens, ac propter hunc certorem ex humanis decessit.

Similiter filia Philonis, quia intempestiue cenauit, mortua est.

Filia Eurianactis ob vix tacetum in principio paroxysmi comestum incidit in phrenitidem.

Insuper nihil dandum est in principio paroxysmi: quia ex Galeno lib. de morborum temporibus cap. 3. & 3. præfag. comm. 3. tunc virtus est suffocata: atque à cibo magis suffocaretur.

Postremò nihil dandum in principio paroxysmi: quia Hippocrates 1. de ratione vic. tex. 40. prohibet tunc ipsam præflanam, quæ inter cibos tenues, & medicinales continetur. Demum quarto de ratione vic. 39. loquens de accidentibus principij paroxysmi Hippocrates habet hæc verba „ Venter de necessitate calet, fastiditque cibum, intenditur hypocondrium: subdit, dolet æger, lancinatur, velicaturque vomere affeclat: ergo nihil dandum cibi in principio paroxysmi.

Præterea nihil dandum est in augmento paroxysmi, quia tunc augetur calor, & ex cibo eleuātur vapores admodum acres, qui magis perturbant, quam alijs temporibus. Hinc Celsus lib. 3. „ satius est dare cibum instante febre, quam incipiente, & satius est consistente, quam crescente.

Insuper nihil dandum est in statu, quia tunc natura est in magno certamine cum morbo: ideo Galenus ex Hippocrate 1. de ratione vic. 46. inquit, cibum non esse præbendum, nisi caliditas reliquerit thoracem, & ad pedes descenderit, quod solum in declinatione, vel interuallo evenire solet. Notandum tamen, peccatum grauius esse cibum dare in principio accessionis, quàm in vigore: tum quia in principio cibus suffocationem minatur: tum quia errata principij communicantur augmento, &



vigori, sed non vice versa: præsens enim communicatur futuro, sed non praterito: vigotis verò peccatum non communicatur declinationi; quia declinatio non est peccati capax: agri enim in declinatione sunt in tuto.

An verò eibus dandus sit paulò ante accessionem, vel multo ante colligitur: ex his sex cõditionibus à Galeno propositis, nempe ex parte affecta, ex affectu, natura aegrotantis, natura principij, ex quantitate, & qualitate cibi.

Ex parte affecta: quia ex Galeno 10. meth. vlt. habetur, quod si iecur, & ventriculus grauitè afficiantur, multo ante esse cibandum.

Ex affectu ipso: quia in omni graui affectu multo ante est cibandũ, nisi ad sint cõtra indicantia, quæ sunt octo, nimirum morbus ventriculi, lãbrici, pestis, vel sint picrocholi, & cetera, de quib. egimus superius.

Ex natura aegrotantis, quia in biliosis paulò ante accessionem; in pituitosis multo ante est cibandum.

Ex natura principij paroxysmi, quia si in principio paroxysmi diu durat rigor, vel extremarum partium frigus, multo ante: si somnus sit profundus, multo ante: si verò ista non sint, paulò ante.

Parimodo ex quantitate, & qualitate: quia si quantitas cibi vel qualitas coctũ difficilis danda sit, multo ante: si coctũ facilis, paulò ante.

Præterea Hippocrates intelligit de morbis in hoc aphorismo, qui inuadunt per circuitus, atque habent plures accessiones: neque intelligit de illis, qui vnicam accessionem habent vsque ad finem, vt est febris synochus: quæ reuer. non iudicatur per etism: quoniam Galenus 9. meth. 4. loquens de synocha dixit, se per sanguinis missionem in principio vsque ad animi deliquium factam iugulasse febrem: quod certè fieri non posset, si per crism terminaretur: immo subdit, prætermissa venæ sectione, ad potum frigida ad sanitatem esse accedendum: quippe impedit crism, nihilominus calorem præter naturam de repente extinguit.

Nec valer. dum dicunt Nonnulli, sanguinis eruptionem per nares esse crism se-

bris synocha: quia est symptoma plenitudinis sanguinis, qui non est coctionis capax, quæ coctio in crisi perfecta necessariò requiritur.

Prima dubitatio circa primam partem aphorismi occurrit: quia aphorismus prima facie videtur superfluous, quoniam Hippocrates idem docet in aphorismo 11. dum dixit in ipsis paroxysmis abstinere oportet.

Respondetur in aphorismo 11. Hippocratem docuisse, abstinendum esse à cibo: in hoc verò aphorismo docet nihil dandum in paroxysmis: sed sic est, quod nihil dare, & abstinere valde differunt inter se. Similiter in 11. aphorismo egit de victus quantitate: in hoc verò de vtendi modo. Præterea in hoc aphorismo loquitur de iudicatione naturæ, additque non esse cõgandos aegros: in 11. verò de his ne verbum quidem.

Secunda dubitatio: non videtur quod in accessionibus nihil dandum sit: quod sic probatur: tunc est cibandum, quando calor influens ad interna recurrit: sed in principio paroxysmi recurrit: ergo tunc est cibandum: maior patet, quia dum influens recurrit ad intus corpora sunt robustiora.

Respondetur, calorem recurrere quidem ad partes internas, sed in igneam naturam conuerti, corporaque efficere debiliora, & ad conuocandum ineptissima.

Insuper notandum, hoc præceptum Hippocratis, quod nihil in accessionibus sit dandum, possit ampliari ad chirurgiam, & pharmaciam, id est in accessionibus, neque esse sanguinem mittendum, neque esse administranda lenientia, vel præparantia, vel pharmaca, vel corroborantia: ratio potissima est, quia hæc omnia maximè distrahant naturam à certamine cum morbo: quare remedia chirurgica, & pharmaceutica solum conueniunt in declinatione, aut intervallo, & non in accessione.

Tertia dubitatio: in accessione epileptica, vel apopletica, vel in comate somnolento, & lethargo cõueniunt ligaturæ in partibus extremis: in occipitio vesicatoria, & ferum candens, ergo non est verum quod in accessionibus nihil sit dandum.



Respondetur per proposita remedia in dictis morbis non distrahi naturam à certamine: sed ipsam sopitam ad certamen excitari: magisque posse hoc indicans, ut excitentur à sopore, quam prohibeat remedium applicitum in ipsa accessione.

Quarta dubitatio augetur, quia vrimur remedijs in principio paroxysmi, quando natura non est sopita, veluti quando in principio paroxysmi febrilis vrimur vomitorijs, summo sanè cum ægrotantium beneficio.

Respondemus non convenire vomitoria, nisi quando ipsa natura disposita est ad vomitum, ipsamque adiuuamus, illamque à certamine minimè distrahimus. Immo ut exemplis idem confirmetur, nos in principio accessionis quartanæ febris interdum assari pulverizati drachmam unam & semis in vino albo generoso exhibemus, quo remedio plurimos, qui ad vomitum erant proclives, brevi spatio sanauimus: magis enim potest indicant expellendi causam antecedentem, quam possit prohibens, ne natura distrahatur.

Præterea in principio accessionis summo cum ægrotantium beneficio vrimur in principio cardialgiæ repellentibus, quod desumpsimus etiã ab ipso Galeno 4. aphor. 25. vbi inquit, frigidæ persufusionem soluere dolores articularum, & podagricos, hebetando videlicet. Similiter Galenus 9. meth. 5. docet, aqua. n. frigidam momento temporis intus, vel extra sanare cardialgiam. Parimodo in alijs plurimis affectibus licet vti varijs, remedijs in principio accessionum.

Demum sciendum, naturam per repellentia non distrahi à certamine: sed repellentia ipsam pattem tueri, ne à morbo laxetur.

Amplius dum Hippocrates ait, in accessionibus nihil dandum, intelligendus est, dumodò non adsint vrgentia, quæ magis possunt, quam ipsi morbi: hac ratione in microcholis datus cibum: quia magis potest imminens febris hectica, quam paroxysmus febrilis.

In pestilentibus febribus in ipsa accessione datur cibus iusto copiosior, quia magis potest virium casus, quam morbus pesti-

lens: in illa enim pestilentia, de qua Hippocrates locutus est, solum illi sanabantur, qui ad comestionem cogeantur: ceteri verò parum, vel nihil sumentes ob virium casum moriebantur.

Quare aphorismi Hippocratis, nisi ordinentur, & disponantur secundum Galeni methodum, quam satis superque declarauimus in aphorismo 16. omnes videntur falsi: ostensum enim est ex Galeno loco citato, prius vrgentibus esse attendendum, quam causis, & prius causis, quam morbis ipsis. Parimodo Hippocrates aphorismo 8. vbi habet, „ Quando morbus in vigore constitit, vel tenuissimo victu vtendum, aphorismus sine proposita distinctione est falsus, quia si vires sint debiles, per victum vel tenuissimum ægri moriuntur. Similiter 15. aphorismus, qui dicit, „ Vntres hyeme calidissimi, falsus est de debilibus: decimus sextus, qui dicit victus humidus febricitantibus conuenit, falsus est in quotidiana febre: vigesimus secundus qui dicit concocta medicari, falsus est de aqua hydropicorum vigesimus tertius: vbi dicit euacuandum esse vsque ad animi deliquium, in debilibus est perniciosus aphorismus: ordinati tamen secundum Galeni methodum intellecti doctrinam quidem diuinam continent.

Quinta Dubitatio: Nec cogere Hæc est 2. pars aphorismi. Nonnulli sunt ita audaces, ut reprehendat Hippocratem; quod vsus sit verbo superfluo, dum dicit (nihil dare nec cogere) quia si nihil est dandum, supponitur, ægros esse cogendos.

Responsio facilis est: quia verbum nihil dare pertinet ad primam partem, verbum nec cogere ad secundam, ita ut hic sit sensus in accessionibus nihil est dandum neque ante iudicationem ægri sunt cogendi: quasi quod Hippocrates reprehendat medicos triuales, qui dum vident ægros ante iudicationem cibum non sumere, illos cogunt ad sumendum, licet morbus sit in vigore.

Ante iudicationes Galenus per iudicationes intelligit morbi vigorem & præcipuè accessiones, siue iudicationes quæ fiunt in accessione, & morbi vigore.

Triuerius & Montanus reprehendunt Galenum, quod dicat per iudicationem



Hippocratem intelligere morbi vigorem, & accessionem: ratio istorum est, quia si in hoc loco Hippocrates prohiberet cibum in accessione, & in morbi vigore, aphorismus esset superfluous, quia coincideret cum octavo, ubi ait, in morbi vigore tenuissimo vitu utendum, & coincideret cum undecimo, ubi inquit in ipsis paroxysmis nihil dandum: quare Triuerius vult Hippocratem per iudicationem intelligere ipsam crism in qua, paulo antequam fiat, cibus dandus non est.

Quod verò Hippocrates per iudicationes præcipuè intelligat paroxysmos, primo patet ex Galeni comm. dum dicit melius est, quod per iudicationes intelligamus accessiones, seu paroxysmos, quod idem est, nempe de morbi vigore, & per consequens de iudicatione, quæ fieri solet in ipso vigore. Deinde adest ratio potissima, quæ idem persuadet: quia ex Galeni comm. in hoc aphorismo agit de modo cibandi ægros: sed sic est, quod ægri quotidie sunt cibandi: ergo per iudicationes intelligit iudicationes, quæ quotidie sunt, talesque sunt accessiones, seu paroxysmi, & non perfectæ crises: quam Galeni artificiosam expositionem, nec Montanus, nec Triuerius intellexerunt.

Sexta dubitatio pulchra occurrit: inquit Hippocrates, nihil dare in accessione, nec cogere, sed demere cibum ante iudicationem, id est ante accessionem, & ante vigorem: quando igitur ægri erunt nutriendi? nunquam: quia non vult dare cibum in paroxysmis, neque ante paroxysmos, neque in vigore: neque ante vigorem: ergo nunquam: ergo aphorismus erit vanissimus.

Solutio colligitur ex text. Græco: quia dicit: ἀλλ' ἄρα, εἰ τὴν προσδίσιν ἀραιεῖν cum genitiuo significat aliquid demere: si dixisset τὰς προσδίσας cum accusatiuo intellexisset totalem cibi ablationem: sed dixit τὴν προσδίσιν quod significat aliquid tantum esse demendum, & non omnino cibum esse demendum, itaut dicendo Hippocrates ἀραιεῖν cum genitiuo, magno usus sit artificio: quia significat aliquid parum dandum esse, & non omnino ægros sine cibo relinquendos.



*Q*UÆ iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mouere, neque novare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere.

Cum Hippocrates à 4. aphorismo ad hunc vigessimum distinctè & particulatim egerit de ratione victus ægrorum & sanorum, ac de modo administrandi cibum: reliquum erat, ut ageret de præceptis pertinentibus ad euacuationem, quæ sit per chirurgiam & pharmaciam: quod facit in sex sequentibus aphorismis.

Connectitur hic aphorismus cum superiori, quia in superiori docuit quid agendum sit in crisi imperfecta, quæ sit in ipsis accessionibus, dicendo in accessionibus nihil esse dandum, & paulò ante crism cibum esse demendum.

In hoc verò aphorismo docet quid agendum sit in crisi perfecta, non amplius intelligendo de ratione victus, sed de remedijs chirurgicis, & pharmaceuticis: itaut Hippocrates mira occasione colligat & connectat tractatum de ratione victus cum tractatu chirurgico, & pharmaceutico.

In hoc tractatu ab hoc aphorismo vsque ad finem huius sectionis hæc considerat. In hoc aphorismo 20. docet quando medicus nihil agere debeat: illa sanè est magna medicorum sapientia, dum intelligunt quando in ægris nihil sit agendum, seu quando totum negotium sit naturæ permittendum ac quando medicus solum debeat esse spectator naturæ rectè operantis. In 21. aphorismo docet per quæ loca medicus debeat euacuare. In 22. quando sit facienda euacuatio. In 23. vsque ad quem terminum. In 24. quando in acutis corpora purganda sint. In 25. docet illam esse optimam euacuationem, quæ sit qualiter fieri debeat. Ita sunt suprema capita pertinentia ad euacuationem faciendam per instrumenta chirurgica, ac pharmaceutica.

*Quæ iudicantur.* In hoc aphorismo dicit esse quiescendum ab omni operatione chirurgica, & pharmaceutica, cum crisis est perfecta.



Prima ratio aphorismi est, quia si medicus tempore perfectæ crisis moueret, irritaret ad super purgationem, ac fluxum aliquem posset efficere, qui mouendo alium lapidem ægri fabricam euertere posset.

Secunda ratio, diuerteret naturam recte operantem ab opere suo.

Tertia, posset diuertere humores, qui per regionem conuenientem mouentur: eosque deducere ad regionem inconuenientem.

Quarta dum uelent auxilium afferre naturæ promptè operanti, auxilioque non indigenti, illam æque præcipitem redderent, quæ qui æquo currenti calcharia adderent. Hinc Ausennas prima quarti protulit illud famosum dictum „ si natura non mouet, moue tu motu eius: at si ipsa mouet, & actu mouet, dimitte eam, & operationem eius.

Quo ad diuisionem. Cum aphorismus sit vnica sententia sine ratione prolata non patitur diuisionem.

Quo ad uerborum explicationem dicit, *quæ iudicantur, & iudicata sunt*: quia ex Galeno tertio de crisis tertio crisis dupliciter consideratur, vel ut fient, vel ut facta est: dum dicit quæ iudicantur, intelligit de crisi quæ fit: dum dicit, quæ iudicata sunt, intelligit de crisi quæ facta est.

Prima dubitatio occurrit, dicit quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè. Contra hoc dictum habemus hanc instantiam; crisis, quæ fit, & adhuc non est facta, non est integræ & perfectæ: ergo illud integrè in hoc aphorismo non habet locum: ergo malè Hippocrates.

Respondetur, crislum perfectam dupliciter considerari, vel quo ad terminum, & finem crisis, vel quo ad conditiones perfectæ crisis: dicimus, crislum quæ fit esse perfectam quo ad conditiones perfectæ crisis, de quibus paulò infra.

Dicit *artios* idest integrè. Nonnulli ante Galenum; & Nonnulli post Galenum; ut Cardanus per *artios* explicabant nuper: quia apud Græcos *artios* interdum significat nuper: sed Galenus reprehendit istos: quia licet dictio nuper possit accommodari ijs quæ iudicata sunt: non tamen potest ibi benè accommodari ijs quæ actu iudi-

cantur, quæ actualis iudicatio est in fieri, nuper enim significat rem præteritam, & factam. Præterea sententia Hippocratis esset falsa; quoniam non semper est verum, quod nihil sit mouendum & innouandum in ijs quæ iudicata sunt nuper, quando crisis esset imperfecta.

Nonnulli Alij per *artios* intelligunt dies pares, in quibus neque mouere, neque nouare licet: quia reuera *artios*, apud Græcos dicitur de numero pari. Reijciuntur à Galeno, quia in die pari aliqua crisis imperfecta fieri potest: quo casu medicus debet mouere, & nouare.

Galenus per *artios* præcipuè intelligit perfectè, & integrè, quæ occasione medicus nihil agere debet: quia sufficit ut in crisi integræ, & perfectæ totum opus relinquatur naturæ. Quod uerò hæc sit Hippocratis mens colligitur ex lib. 2. de humoribus tex. 13. ubi reperens hunc aphorismum loco dictionis *artios* ponit *anapti*; quæ dictio indicat integrè & perfectè.

Secunda dubitatio, quæ explicat aphorismum uerbis æquiuocis est damnanda: sed Hippocrates hoc facit in aphorismo: ergo. Maior patet: quia ubi est æquiuocatio, ibi est ignoratia. Minor probatur: quia per illud aduerbium integrè in aphorismo Græco legitur *artios*: sed artios habet tria significata. Primo significat integrè. Secundo dies pares. Tertio significat nuper: ergo, est vox æquiuoca. Responso est, quod dū plura significata uocis æquiuocæ magis explicant sensum aphorismi, æquiuoca esse maxime desideranda, sic artios primo significat integrè, & hæc significatio est magis propria, quia in crisi integræ nil omnino nouandum. Secundo artios significat dies pares, quia in diebus paribus medicus non debet mouere: quia ex Galeno 3. de crisis. 2. in crisi sunt vigilie, anhelitus difficiles, & deliria: quare prius vires recreantur, & deinde est mouendum. Credimus tamen per artios præcipuè intelligere integrè: sed illud aduerbium posse artificiosè ampliari ad alia duo significata.

Parimodo Hippocrates utitur illa dictione *artios*. & pluribus alijs, quæ multa significata comprehendunt, ut superius explicauimus: neque alio modo pauca, quæ



medicinar archana poterat explicare.

3. Dubitatio. Qui vtitur verbis fuperfluis in aphorifmif non eft laudandus. fed Hippocrates id facit, dum dicit nil mouendum vel nouandum. Refpondeo fingula verba habere varia fignificata, (vt infra) deinde voluit efficaciter nobis comédare diuinum eius perceptum.

4. Dubitatio. Qui confultat de prateritis non eft audiendus. fed hoc facit in aphorifmo Hippocrates: dum dicit quæ iudicata funt, quod verbum eft prateritum. Refpódeo ex Galeno quarto aphorifmorum 21. tria requiri, vt fit factum iudicium, cōctio, feparatio, & euacuatio: quibus factis fit confultatio de præfentibus & non de prateritis.

5. Dubitatio: hic aphorifmus aduerfatur fequenti, quia hic dicit nil mouendū & in fequenti, quo natura vergit eo ducere. Refpondeo in hoc aphorifmo intelligere de perfecta crifi: in fequenti de imperfecta.

*Neque mouere.* Ratio eft, quia dum natura indicat, femper cum impetu mouet: ideo Galenus 3. de crifibus cap. primo, habet, quod de ratione crifis fit cum impetu mouere: ideo medicus non debet addere alium impetum: quia æquo currenti adderemus calcharia, atque agrum præcipitem ageremus.

*Dicit Neque nouare,* nempe vt non vtamur medicamentis in folitis. Montanius tenet, hanc dictionem nouare, ampliari poffe ad omnia externa non naturalia, quæ accidere poffunt, veluti funt aperire feneftras: talamum nimium calefacere, & alia id genus, quæ mutationes poffunt impedire perfectam crifim.

*Neque medicamentis foluentibus.* videlicet vtimur in perfecta crifi, *Neque irriamentis,* id eft lenientibus, clyfteribus, fupporifmif, fudorificis, & diureticis, vel alijs fimilibus: ne immerito ager vexetur: fed fingere oportet: non tamen fingere quod ad vi-ctus rationem: quæ requiritur tenuiffima quidem, ne natura ab incepto opere diuertatur: immo & poft crifim per duos dies eadem ratione victus obferuanda, ficuti admonet Galenus primo acutorum commentio 25.

Accedit, quod vt optimè admonet Gale-

nus 11. meth. cap. 11. quod vix inueniri poffit remedium, quod citra noxam iuuat: dat exemplum de exymellite, quod iuuat quidem, radit tamen inteftina, & partes neruofas lædit: immo lib. de optima fec. ad Trafyb. circa finem concludit, nullum remedium poffe in egris impune adminiftrari, cum omnia fint præter naturam: quare fi remedia blanda, & leuiffima nõ poffunt impune adminiftrari, quando etiam oportune applicantur: quanto magis applicita quando non oportet, nocebunt?

Galenus & in hoc comm. & primo de diebus decretorijs cap. 2. proponit fex conditiones optimæ crifis: fed antequam illas declaremus, sciendum ex Galeno 1. de diebus decretorijs cap. 1. & 3. de crifibus cap. 2. nomen crifis fuffe tranflatum à iudicio, quod fit in foro: quia ficuti in foro, dum agitur de vita, & morte, omnes timēt; fimiliter dum agitur de vita & morte egrotantis vocatur crifis, id eft iudicatio, quafi quod æger fit fub iudice conftitutus, debeatque expectare iudiciũ de vita, aut morte. Quod nomen crifis (ait Galenus) non fuit inuentũ à medicis, fed ab aſtantibus: optimi enim medici tempore crifis præuident falutem, vel mortem egrotantis: neque hæſitant de rerum euentu.

In fuper ſciendum ex Galeno 3. de crifib. primo, quod ægritudo fex modis terminari poffit: tribus ad falutem: & tribus ad mortem. Primus ad falutem eft dum ægrum fubita mutatione ad falutem terminatur. Secundus ad falutem eft, dum ægris aliqua fubita cōtingit mutatio ad melius: non tamen ſtatim, fed ſenſim ad ſanitatem, & dicitur crifis imperfecta. Tertius modus mutationis ad falutem eft dũ morbi terminantur non per ſubitam mutationem, fed per morbi diſſolutionem: atque iſte modus non pertinet ad crifim: ſecundum hunc modum hæctica primi gradus & ephemera terminantur.

Similiter tribus modis ad mortem terminantur ægritudines. Primus eft cum ſubita mutatione ad mortem. Secundus cum ſubita mutatione ad peius, & deinde ad mortem. Tertius eft cum virium diſſolutione, ſicuti hæctica, & omnes morbi, qui ſolum ſunt in facto eſſe. Hinc Hippocrates videns,



videns, duos modos non pertinere ad crissim 1. epid. 3. tex. 16. quatuor differentias crissis solum proponit. Prima dum fit cum subita mutatione ad salutem. Secunda cum subita mutatione ad mortem. Tertia cum subita mutatione ad melius. Quarta cū subita mutatione ad peius; hac lege, quod illud, quod remanet paulatim interimat.

Præter hos quatuor modos Saxonia mentionem facit de quinto modo, qui est, dum morbus in deteriore morbum mutatur: veluti, dum mali humores à loco ignobiliore ad nobiliorem transitum faciunt: hunc modum desumit ab Hippocrate 7. aphorif. 11. vbi ait, à morbo laterali pulmonis inflammatio, malum: Galenus verò aphorif. 12. à pulmonis inflammatione phrenitis, malum. Sed reuera iste quintus modus non est separatus à quarto, quia ad ipsum reducitur. Ad primum modum reducitur crissis perfectissima, de qua Hippocrates in hoc aphorismo intelligit, cuius perfectissima crissis conditiones ex Galeno in hoc comm. sex sunt.

## Q V Æ S T. LXXV.

*De conditionibus perfectissima crissis.*

**P**rima conditio perfectissimæ crissis est, quod fiat per affluxum, & per partem inferiorem & non per abscessum. Secunda quod fiat per euacuationem solius, & totius humoris peccantis. Tertia quod fiat *κατὰ φύσιν* idest secundum rectitudinem. Quarta cum tolerantia. Quinta quod humor, qui euacuatur sit concoctus. Sexta ut fiat in die critica. Addimus septimam, quæ colligitur ex tercio de crissibus cap. 6. quod crissis optima fiat in statu morbi. Unica deficiente ex his, crissis est insida, obscura, & cum periculo recidiuæ.

Quo ad primam conditionem optimæ crissis, notandum particulam per partem inferiorem esse delendam: quia in cod. Græco ipsius Galeni non inuenitur: immo Galenus 3. de crissibus cap. 2. proponens hanc primam conditionem crissis: dixit quidem fieri per affluxum: sed non dixit

quod fiat per partem inferiorem, vel superiorem.

Præterea si de ratione optimæ crissis esset euacuatio per partem inferiorem, sequeretur, quod crissis facta per partem superiorem non esset perfecta, quod non est dicendum: quia crissis per sudorem vniuersalem est omnium perfectissima, tamen non est per partem inferiorem.

Similiter febris atdens, dum terminatur per sanguinis eruptionem è naribus inter perfectissimas numeratur, tamen est per partem superiorem.

Quo ad secundam conditionem, quod scilicet perfecta crissis fiat per euacuationem solius, & totius humoris peccantis, patet experientia: quia si in quotidiana vel quartana fieret euacuatio humoris biliosi, tantum abest quod hæc esset perfecta crissis, ut & insida, & certum recidiuæ periculum indicaret.

Hinc errant illi, qui in quartana, vel quotidiana, vel hydropo viuunt medicamento euacuante bilem, sicuti est rhabarbarum: Galenus enim libello de purgantium medicamentorum facultatibus dicit medicamentum euacuans bilem in morbo pituitoso esse tamquam venenum. Idem testatur Auicennas, vbi agit de hydropo contra rhabarbarum quod euacuat bilem in hydropico sit tamquam venenum: quia in hydropo bilis desideratur. Parimodo qui in febre ardente viuunt medicamento euacuante pituitam, committunt errata, quæ sunt tanti momenti, ut agros ad recidiuam & interdum ad mortem perducant.

Deinde si humor peccans non euacuetur solus, sed permixtus alijs humoribus non peccantibus, crissis quoque est valde imperfecta: Galenus enim 4. aphorif. 22. proponit tres conditiones bonæ crissis. Prima est concoctio. Secunda separatio humoris peccantis à bonis humoribus. Tertia est euacuatio.

Insuper nisi totus humor peccans euacuetur, periculum recidiuæ impender: Hippocrates enim 2. aphorif. 12. habet hunc famosum aphorismum: quæ reliquantur in morbis recidiuas facere consueverunt.

Quo ad tertiam conditionem, quæ est quod



quod euacuatio fiat fecundum reftitudinem fuae κατ' ἰξιν non omnes intelligunt quid indicet hæc particula κατ' ἰξιν.

Petrus Brifotus in libro apologetico de pleuritide . Currius, Fernelius, & Leonicens per reftitudinem intelligunt reftitudinem refpectu partium, quæ fufum & deorfum funt: negantque à dextris ad finiftras partes, ab internis ad externas, & ab anterioribus ad exteriores effe reftitudinem.

Nos verò arbitramur reftitudinem inueniri in omnibus pofitionis differentijs. Primò quia Galenus 3. de fractu ris comm. 10. interpretatur κατ' ἰξιν è regione: fed fic eft quod pars dextra è regione refpicit finiftram: fic de alijs pofitionis differentijs dicendum eft. Deinde Galenus 5. meth. 3. & 4. meth. 6. afferit partem anteriorem ita aduerfari posteriori, ficuti fuperiori inferiori: quare κατ' ἰξιν, fuae hæc reftitudo conueniet omnibus differentijs pofitionis.

Demum eft experientia, quæ indicat reftitudinem fignificare è regione: quia ex Hippocrate frontem laborantem remedium appofitum occipitio fanat: quia occipitium è regione refpicit frontem. Hinc in magnis oculorum doloribus nullum eft præftantius remedium fetaceo, feu cauterio, quod & oculorum dolores à fluxione factos tollit, & mentagram, quam nos non femel eodem fetaceo fanauimus.

Quo ad quartam conditionem, quæ eft, quod optima crisis fiat cum tolerantia, videretur effe aliqua difficultas: quia Galenus 3. de crifibus 3. inquit, crifim fieri cum vehementibus fymptomatis, cum dolore capitis, cum difficili refpiratione, & alijs accidentibus. Quomodo ergo crisis optima erit cum facili tolerantia?

Refpondetur ex Galeno 3. de crifibus 3. & ex hoc comm. crifim dupliciter confiderari, vel vt fit, vel vt facta eft: prima eft cum labore: fecunda eft cum tolerantia, & cum virium leuamine.

Quo ad quintam conditionem, quæ eft, vt fit cum humorum peccantium coctione, clara eft: Galenus enim 4. aphorif. 22. habet hæc verba, „ Vbi eft cruditas humorum, tunc aliquid bene euacuare eft impoffibile: fiquidem oportet coctionem

præire, fubfequi feperationem, & pofttea euacuationem, vt optima fit crisis.

Quo ad fextam conditionem, quæ eft, vt fiat in die critica. Galenus 1. de diebus decretorijs cap. 7. inquit, nullum fignum futura recidiuæ fortius effe, quam dum crisis fit in die non critico.

Qui nam verò funt ifti dies critici, fciendum in peracutis exactè qui vocantur perperacuti, effe tertium, quartū, & quintum. Tertium Hippocrates obferuauit in Critone. Quartum in Pericle. Quintum in Erafino, & Metone.

In peracutis non exactè, critici funt fextus, feptimus & vndecimus. Sextum Hippocrates obferuauit in virgine Lariffæ. Septimum in Adolefcente decumbente in foro mendacij. Vndecimum in Sileno, & Melidia.

In acutis exactè funt dies decimusquartus, & decimusfeptimus. Decimum quartum Hippocrates obferuauit in muliere trimelfri fetu grauida. Decimum feptimum in Horofonte.

In acutis non exactè funt vigefimus & vigefimusprimus. Vigefimum Hippocrates obferuauit in vxore Philini. Vigefimum primum in vxore Dealcis.

In acutis ex decidentia exactè funt 24. 27. 34. & 40. Hippocrates quadragefimum obferuauit in Nicodemo. Vigefimum feptimū in Hermocrate. Trigeſimū quartum in Anaxione. Quadrageſimū in Pithione.

In acutis ex decidentia non exactè eft ſexageſimus: fed in hac die raro fit iudicium. In chronicis funt 80. 100. & 120. Hippocrates 80. in Cleonactide obferuauit, 100. in Heropito. 120. in Pario.

Addita eft ſeptima conditio optimæ crifis à Galeno 3. de crifibus cap. 6. quæ eft, quod crisis fiat in ftatu: in augmento verò licet cocti quoque ſint humores, crisis fieri non poteft: quia vt fiat crisis, requiratur hæ conditiones, quarum prima eft, vt humores peccantes ſeparentur à non peccantibus. Secunda vt crisis fiat per euacuationem, quæ non in augmento, neque in principio ſtatus ſed ſolum in fine ipſius ſtatus fieri ſolet.

Dubitatio: conditiones optimæ crifis ſuperius propoſitæ videntur inſufficientes: quia



quia Galenus 1. de diebus decretorijs cap. 2. vult, quod de ratione optimæ crisis sit hæc conditio, vt in diebus indicatorijs sit præostensa. Sic in septimo non fiet crisis nisi sit præostensa in quarto, neque fiet in 14. quæ non sit præostensa in 11. sicuti Hippocrates nos docet 2. sect. aphor. 14. vbi inquit, quod quartus sit index septimi & vndecimus decimi quarti.

Ideo Auerroes 4. coll. 4. proponit quinque conditiones optimæ crisis, prima vt fiat in statu. Secunda vt fiat post coctionem. Tertia in die laudabili. Quarta vt euacuetur humor peccans. Quinta verò vt sit præostensa.

Respondemus in die critica non fieri crism, nisi prius sit præostensa, quod licet Galenus in hoc comm. nihil dixerit, supposuit tamen non fieri crism, nisi sit præostensa.

Quo ad Auerroem, quem Nonnulli magis laudant in proponendis crisis conditionibus, quam Galenum.

Respondemus quod potius Auerroes sit insufficiens, quoniam omisit quartam conditionem, quæ sortasse est magis præcipua, quæ est, quod crisis fiat cum tolerantia.

Sed quatuor occurrunt considerata antequam vterius progrediamur. Primum quid agendum sit in die decretoria, si natura nihil agat. Secundum quid agendum in die decretoria, quando natura imperfectè operatur. Tertium quid agendum quando motus sunt symptomati, & an sint viles, & sint adiuuandi. Quartum vnde desumantur dies critici, & dies indicatorij, & de eorum numero.

## Q V Æ S T. LXXVI.

*Quid agendum in die decretoria, si natura nihil operetur.*

**Q**uamvis attinet ad primum, quid agendum sit in die decretoria, quando natura nihil operatur. Multi putant, quod tunc medicus in die decretoria dare debeat pharmacum. Id confirmant auctoritate Hippocratis, Galeni & Auicennæ. Hippocratis & Galeni 2. de ratione vic. 76. qui dant pharmacum in plenitudine

quarta die, quando natura nihil operatur: sed sic est quod quarta dies potest esse decretoria in peracutis exactè: ergo potest dari pharmacum in die decretoria, quando natura nihil operatur.

Auicennas verò in tractatu de cura febrium putridarum in genere. habet hæc verba „ Quando natura non mouet, mouetur: sed sic est quod motus naturæ est in die decretorio: ergo tunc pharmacum dari potest.

Nos putamus in die decretoria, si natura nihil prorsus operetur, nullo modo pharmacum dandum esse: quia tempus exhibendi pharmacum non desumitur à die decretoria, sed à materia per concoctionem disposita ad euacuationem: hæc verò dispositio ex necessitate cadit in aliquam diem decretoriam: sed non in quamlibet diem decretoriam.

Contra hanc solutionem disputat Capiuaceus contra Paternum: sed nihil boni affert, sicuti in eius expositione potest videri.

Nos ad auctoritatem Hippocratis & Galeni 4. de ratione vic. 76. respondemus Hippocratem & Galenum fuisse locutos de materia turgente, quæ illicò, & quacumque die appareat, si habet propensionem ad intestina, esse repurganda.

Ad Auicennam respondemus eius verba hoc modo esse legenda „ Quando natura non mouet, mouetur motu eius: scilicet conuenienti ipsi naturæ, qui motus conueniens solum fit quando humores euacuandi sunt cocti. Hæc expositio confirmatur ex Hippocrate, aphorismo 22. huius sect. dicente „ concocta medicari.

Dubitatio: sed aliquis possit obijcere, non ne dum humores sunt cocti euacuatur ab ipsa natura? si à natura: ergo medicus nihil agere debet.

Respondemus ex Galeno 4. aphorismo 22. naturam prius concoquere, deinde subsequi discretionem, & postea euacuationem: quare si natura non separat humores concoctos, separata tu: si verò natura illos non euacuat, euacua tu: quare medicus nullo modo vti debet medicamento, nisi humores sint concocti, & separatim: ideo si appauerint in die critico signa optimæ



coactionis, & separationis, quod in vrina animaduerti potest, vti poterimus medicamento.

Quo pacto verò signa coctionis cognoscantur, Galenus 9. meth. 5. non solum proponit id ex vrina, sed etiam ex pulsu dignosci, sed de hac re egimus comm. 12.

Quo ad secundum, quid agendum sit in die decretorio, quando natura diminuitur, & imperfectè mouet. Ex vna parte non videtur, quod medicus tunc aliquid agere debeat: Galenus enim 1. ad Glau. cap. 14. dicit, „ In febre cum alui fluore diminuto, neque purgandum, neque sanguinem mittendum: ergo quando natura diminutè, & imperfectè mouebit, nihil erit agendum. Præterea est Auicenna dictum sanis sanos, ventrem soluere supra ventris solutionem esse timorofum. Ex altera parte Galenus 9. meth. 5. sic dirimit hanc litrem, „ si fluxus sanguineus hæmorrhoidum, vel mensium fuerit diminutus, tantum sanguinis esse detrahendum, quantum tibi videbitur sufficere.

Respondemus pro solutione omnium difficultatum: motus vel esse criticos, vel symptomaticos, criticos vel esse perfectos, vel imperfectos. Quibus positis dicimus, in motu critico perfecto nihil esse agendum: in diminuto verò critico medicum semper debere auxiliari naturæ, vt docet Galenus 9. meth. cap. 5. motus verò symptomaticos non esse adiuuandos. Quo posito dicimus Galenum 1. ad Glau. 14. dum dixit, in febre cum alui fluore non esse euacuandum, intellexisse de fluxu symptomatico, & non critico: quia illud caput decimumquartum inscribitur de febribus cum symptomatibus.

Quoad Auicennam respondemus dixisse, ventrem soluere supra ventris solutionem esse timorofum: quia id faciendum est cum præmeditatione: non tamen negat esse adiuuandum motum diminutum: immo non solum ex Auicenna fluxus fluxu, & vomitus vomitu tollitur: sed etiam ex ipso Hippocrate & Galeno 2. in 6. epid. 9. qui saltem ex accidenti concedunt vomitum vomitu, fluxum fluxu, & dolorem dolore sedari.

## Q V Æ S T. LXXVII.

*An motus symptomatici sint adiuuandi.*

**Q**Varitur in hoc loco, an motus symptomatici sint adiuuandi. Ex vna parte si considerentur agrotum historia Hippocratis in Epidemicis, ex quibus sanè desumpta sunt præcepta huius dicinæ fundamenta, dicimus motus symptomaticos esse adiuuandos: quia multi agri ex illis per ipsos motus symptomaticos fuerunt liberati.

Primo in Metone id clarissimè obseruatur, qui die quinta liberatur à febre acutissima vrina exillente adhuc cruda: cui iussu Hippocratis fuit lotum caput, vt sanguis è naribus largius efflueret: quia paulo ante exigua sanguinis quantitas è naribus effundebatur.

Secundò in muliere trimestri sætu grauidà morbo existente cruda in decimaquarta per sudorem liberatur. Hæc sunt Galeni verba in illo comm. „ Paulò ante, alius agrotus per sanguinis eruptionem fuit iudicatus, & modò mulier per sadorum: cum tamen in vtrisque eadem die morbus esset incoctus, quæ res effecit, vt iudicatio minus absoluta facta sit. Ecce quod agrotantes ex moribus symptomaticis fructum non spernendum colligant.

Tertio in Sileno mors erat expectanda die nona, sed quia papulæ rubræ die octaua apparuerunt, delatum fuit iudicium ad vndecimam diem: ex hoc casu quoque colligi potest, motum symptomaticum aliquid opis afferre.

Quarto in Horophonte, in quibus prima die, & vrina nigra & extrema frigida apparuerunt: hic æger ad summum in quinta debebat mori, sed quia die quinta intrinsece lien morbo existente cruda, delatum fuit iudicium ad salutem quidem in die nona, propter motum symptomaticum, & in 17. perfectissimè iudicatur.

Quintum exemplum obseruatur in historia Simonis proposita 6. epid. 2. tex. 19. quia hic vir iuuatur vntionibus, & solutionibus calidis trahentibus materiam crudam, nempe frigidam & crassam à centro ad circumferentiam, quæ ad iudicium



symptomaticè mota faciebat pustulas laticas; unde morbo interno liberatur. Ecce quod hic æger à motu symptomatico iuuatur. Quod iste motus in Simone fuerit symptomaticus, patet: quia dum cruda mouentur, non critici, sed symptomatici motus vocantur.

Demum Valefius lib. 5. contro. cap. 13. sequitur eandem opinionem dicens, quod omnis euacuatio mali humoris, quamuis symptomatica, sit utilis.

Ex alia parte Conciliator, Plurquamcommentator, & plurimi Alij tenent, motus symptomaticos esse inutiles, & interdum perniciosos: ideo nullomodo esse adiuvandos. Hæc opinio comprobatur auctoritate & ratione. Auctoritate Galeni in Philisco dicentis „ Decretoria non iudiciaria, aut lethalia, aut difficilis iudicij: ergo non adiuvanda. Parimodo Galenus primo aphorismorum 12. habet hæc verba „ iudicatoria non iudicantia aliqua mortem, aliqua verò difficilem indicationem portendere.

Ratione idem probatur: quia humores crudi, dum symptomaticè mouentur relinquunt locum, in quo quiescebant, atque amittunt occasionem coctionis: coctio verò solum quiete fit: ac natura solum coquendo moderari potest calorem præter naturam, & per coctionem illum vincere.

Dum verò humor crudus mouetur, non amplius coquitur, sed loco coctionis acquirit acrimoniam, per quam vincere, & interrimere potest illas partes, per quas transit: sicuti dum excitatur vomitus in cardialgia facta à bile æruginosa, vel dū euomitur atra bilis illa, quæ exulcerat, & inde exanimat: ideo 4. aphorismorū 21. & 22. Hippocrates ait, atram bilem sursum, vel deorsum euacuatam lethale ob eandem rationem ex Hipp. 6. aphorismorum 38. „ Cancris citius curatis, quam non curatis, interimunt.

Ego meditatus sum quid posset dici in re tam difficili: & tandem amplexus sum hæc distinctionem, quam etiam proposui in lib. nostro de indicantiū æquilibrio, qui est liber decimus quintus methodi virādorū errorū, nempe euacuationem symptomaticā duplicem esse, aliam esse syncrè sym-

ptomaticam: hæcque dicimus semper nocere: atque esse malam vt signum, & vt causam: vt signum: quia indicat naturam esse domitam, & non dominantem: vt causam quia dum cruda mouentur, omnes partes, per quas transeunt, læduntur: alia verò esse euacuationem mixtam ex motu critico & symptomatico: tuncque dicimus, crude humores participare aliquam coctionem hosque motus mixtos, vel maximè participare de critica, & parum de symptomatica, & sic euacuationem symptomaticam vtile esse: vel dicimus parum participare de critica, & multum de symptomatica, & sic parum vtilem esse: vel nihil de critica participare, & sic euacuationem esse perniciosam: & lethalem, de qua Galenus loco citato dixit, vel mortem, vel difficillimam iudicationem portendere.

Alia quoque vagatur per scholas distinctio euacuationis symptomaticæ, quæ est quod euacuatio symptomatica vel ratione temporis, vel ratione exeuntis: ratione temporis est quando in morbo bilioso euacuatur bilis, morbo existente crudo; hæc euacuatio non est ita mala, vt non adferat aliquid opis: euacuatio verò symptomatica ratione exeuntis, illa semper est perniciofa, & vel mortem, vel difficilem portendit indicationem; euacuatio symptomatica ratione exeuntis si in morbo bilioso cruda existente materia fiat euacuatio materiæ pituitosa: vel in morbo pituitoso, in quo bilis potius desideratur, fiat euacuatio bilis in principio morbi, vel morbo existente crudo: hæc euacuatio symptomatica ratione exeuntis semper est mala.

His positis distinctionibus dicimus in Metone, sanguinem fluentem è naribus esse mixtum ex motu critico, & symptomatico, & maximè participare de critico: quis erat propè finem morbi.

Vel dicimus euacuationem illam esse symptomaticam ratione temporis admodum propinquæ salutis & non ratione exeuntis.

Idem dicimus de sudore mulieris trimestri sætu grandid.

Sic dicimus de papulis Sileni quod maximè participare de motu symptomatico, & parum de critico: ideo perijisse.

Idem



Idem potest dici de tumore lienis Horophontis: sed ob virium robur fuisse salutem præter rationem, ut dicit Galenus.

Tandem de Simone, quod fuerit liberatus interno morbo inunctionibus trahentibus materiam crudam ad cutem; diximus maximè de critico fuisse participem.

Demum reuocanda sunt ad memoriam quatuor differentiæ crisis proposiæ ab Hippocrate 1. epid. 3. rex. 16. quæ sunt, vel ad salutem, vel ad mortem, vel ad melius, vel ad peius. Meton, & mulier trimestri sætu grauida habuerunt crism ad melius, ac quod reliquum erat, fuit aliquo dierum intervallo paulatim à natura superatum.

### Q V Æ S T. LXXVIII.

*An critici dies pendeant à mense medicinali.*

**Q**uo ad quartum, nèpè à quibus principiis desumantur dies critici, & numerus dierum criticorum. Auctores non consentiunt. Prius Galeni opinionem considerabimus, an scilicet defendi possit: deinde propriam sententiam proponemus.

Quo ad Galeni opinionem 3. de diebus decretorijs 9. Galenus desumpsit dies criticos à mense medicinali, qui an sit realis, vel chimericus, paulò infra.

Uti igitur intelligatur, vnde oriatur menses medicinalis, sciendum ex Galeno loco citato dari quatuor menses.

Primus est mensis coniunctionis, qui est, dum Luna redit ad coitum Solis, qui fit diebus 29. & horis 12. atque hic mensis est realis.

Secundus mensis vocatur periodicus, qui fit, dum Luna peragrat duodecim signa Zodiaci, quod fit diebus 27. & horis 8. & est realis.

Tertius mensis dicitur manifestæ visionis, qui perdurat, donec Luna nobis appareat, de quo mense loquens Galenus loco citato dicit esse 26. dierum cum horis duodecim: sed quomodo Galenus, agens de hoc mense manifestæ visionis decipiat, paulò infra.

Quartus mensis est medicinalis: quem

Galenus hoc modo componit: sumit mensem manifestæ visionis, qui est dierum 26. cum horis duodecim: deinde sumit menssem periodicum, qui constat ex 27. diebus & horis 8. iungit hos duos menses, unde dicit resultare dies 53. & horas 20. deinde Galenus diuidit hunc numerum in duas partes æquales, itaut pro qualibet eueniât dies 26. & horæ 22. hucque Galenus vocat menssem medicinale: quem putat esse insignitum duplici influxu, solari videlicet, & influxu signorum Zodiaci: solarem dicit: recipere à mense coniunctionis: signorum vero influxum dicit recipere à mense periodico.

Ex hoc mense medicinali Galenus colligit omnes dies criticos, hoc modo: primo diuidit hunc mensem medicinale in duas partes: itaut qualibet constet ex diebus 13. & horis vndecim. Deinde iterum subdiuidit hanc partem in duas septimanas: itaut qualibet septimana constet ex sex diebus & horis 17. cum dimidia, quo fit, ut secunda septimana terminetur diebus 13. & horis 11. Tertia septimana diebus 19. & horis 19. vnde fit, quod dies vigesima & non 21. sit critica: quia de vigesima die solum relinquuntur quinque horæ: quo fit ut qualibet dies huius mensis medicinalis constet horis 25. & quatuor minutis.

Arbitror, quod neque in medicina, neque in alijs facultatib. inuenta sit chimera magis euidens, quam sit ista. Primò hæc opinio, quæ Galeno adscribitur, est falsa, & reprehensione digna: quia mensis manifestæ visionis, ex quo componuntur medicinale, non est 26. dierum cum dimidio: quia Luna intereū apparet die coitus cum sole: interdum secunda die post coitum, & raro tertia, vel quarta die.

Hæc apparitio lunæ post coitum variatur propter tres causas. Prima ob velocitatem, vel tarditatem cursus Lunæ.

Secunda ob breuitatem, vel longitudinem ascensionum signorum.

Tertia ob latitudinem, vel obliquitatem Lunæ respectu linearum ægypticarum: itaut, si omnes causæ cunctim apparitionis lunæ in vnum conspirerent, Luna eodem die, quo iungitur cum Sole videri possit: Similiter si



tause tardissimæ apparitionis in vnum cō-  
cutrant, Luna incipiet apparere solum  
quarta die post coitum cum Sole.

### Q V Æ S T. LXXIX.

*De causis citæ, & tardæ apparitionis  
Lunæ.*

**C**ausa verò citissimæ apparitionis sunt  
hæ tres. Prima est velocitas motus  
Lunæ, quæ contingit, dum Luna est in pe-  
rigeo.

Secunda est quando Luna progreditur  
per signa breuissimas ascensionis.

Tertia quando Luna est in latitudine bo-  
reali respectu eclipticæ.

Quando igitur Luna fuerit in perigeo  
ecclitrici, ac fuerit in Capricorno, Aquario,  
Pisibus, Ariete, Tauro, & Geminis, habue-  
ritque latitudinem quatuor siue sex gra-  
dum: dicimus tunc Lunam in regionibus  
Septentrionalibus sicuti sunt Hybernia, &  
Dania, eodem die quo coit cum Sole appa-  
rete posse, itant Luna vetus videatur sum-  
mo mane, vesperi verò appareat noua: ita-  
ur tunc mensis manifestæ visionis constet  
ex viginouem diebus, vel saltem ex 28.  
In nostris vero regionibus, tunc Luna ap-  
paret secunda die post coitum.

Causa verò tardissimæ apparitionis sūt  
hæ tres. Prima est, quando Luna est in apo-  
geo.

Secunda, quando Luna est in signis tardæ  
ascensionis.

Tertia, quando Luna est in latitudine au-  
strali.

Quando igitur Luna erit in apogeo, ec-  
centrici, nempe in Cæcro, Leone, Virgine,  
Libra, Scorpione, vel Sagitario, tunc in no-  
stris partibus neque primo, neque secundo  
neque tertio die post coitum apparebit;  
sed solum quarto die: tunc certe mensis  
manifestæ visionis constabit ex 25. diebus,  
& non ex 26. cum dimidia: ratio tamen ac-  
cidit, quod Luna videatur quarta die post  
coitum, vel eadem die coitus: dicimus ta-  
rò, quia Luna solum singulis quatuor annis  
est in perigeo, vel in apogeo eccentrici; non  
loquor modo de apogeo, & perigeo, epicy-

cli, quia hoc apogeo, vel perigeo epicy-  
cli singulis mensibus habetur, id est sin-  
gulis 14. diebus semel apogeo, & peri-  
geum habentur.

Ex his patet, mensē medicinale com-  
positum ex mense manifestæ visionis, & ex  
mense motus periodicij esse chimericum, ac  
pertinere potius ad arithmeticos, quam ad  
medicos, & astronomicos.

Cogimur igitur discedere à Galeni opi-  
nionē, non solum in ijs, quæ dependent ab  
hoc mense medicinali: sed etiam dum putat  
dies indicatorios & indicatorios à Luna  
aspectibus provenire, nempe à sextilis, qua-  
drato, trigono, vel opposito Lunæ respectu  
principij egreditudinis: putat enim quartum  
diem esse indicatorium ob aspectum sexti-  
lem, qui sit quatuor dierum spatio. Sed  
fallitur, quia hoc non respondet theoricæ  
lunæ: quoniam quando Luna est in perigeo,  
sextilis fit ante quartum diem: quando est  
in apogeo, sextilis est in quinto. Quare  
quartus dies propter aspectum sextilem  
non erit index septimi.

Parimodo hallucinati videtur Gal. dum  
putat, quadratum semper fieri septem die-  
bus, & ideo septimum esse criticum.

Similiter fallitur, dum putat trigonum  
fieri spatio undecim dierum: ideo ra-  
tione aspectus trigoni diem undecimum  
esse indicatorium decimiquatti.

Idem dum putat aspectum oppositum  
fieri spatio 14. dierum: idcirco decimum-  
quartum diem esse indicatorium: hæc cer-  
tè non respondent theoricæ planetarum;  
quia supponit, non dari motus lunæ retro-  
grados, non dari eccentricos, & epicyclo-  
quas quod neget prænomina, quæ quoti-  
diè ab astronomis obseruantur de Luna, &  
alijs planetis.

Præterea Hippocrates nullibi dixit, in-  
dicatorios, & indicatorios habere origi-  
nem à lunæ aspectibus, siue à mense medi-  
cinali. Insuper si unus dies mensis medi-  
cinalis constaret ex horis 25. & 40. minutis,  
sequeretur totus dies 80. horæ, & 120. non essent  
critici: sed 81. totus & 121. quia tertia  
hebdomada secundum opinionem illo-  
rū, qui instituerunt mensem medicinale  
perficitur diebus 20. & horis quatuor cum  
dimidia: quare in 20. dieb. excesserunt



hora 18. & in die 100. excreſcerent hora 22. cum dimidia, & in 120. excreſcerent hora 27. quæ omnino deſtruerent experimenta, & doctrinam ipſius Hippocratis, qui obſeruauit, Cleonactidem, mulierem habitantem ad frigidam aquam, uxorem Epicratis, & multos alios fuiſſe iudicatos in die 80. & non in 81. Heropitum eſſe iudicatum in 100. & Parium in 120. & non in 121. die.

Accedit, quod iſti, qui admittunt dies indicatorios, & indicatorios fieri à Luna, & ab eius aſpectibus ſibi ipſis contradicunt: quia aſſerunt, motiones bonas, vel malas oriri ab aſpectibus: bonas uidelicet ab aſpectu ſeſtili, & trigono: malas uero à quadrato, & oppoſito: quia deinde conſtat fateri ex Hippocrate, & Galeno motiones malas fieri die 6. 8. 10. 12. 16. & 18. in quibus diebus certè luna non eſt oppoſita, vel quadrangularis.

Demum quod 4. dies qui eſt index 7. non recipiat uirtutem à luna, patet: quia licet 4. ſæpè ſit index 7. & 11. decimi quarti & 17. vigefimi: tamen ultra 20. quater ni non habent uim indicandi: ſed ſepteni: ita ut 24. non poſſit eſſe index 27. neque 31. trigefimi quarti. Ultra uero 40. dicunt, & rectè non ſeptenos, ſed 20. eſſe criticos, ſed ſic eſt, quod à luna, vel ab aliquo aſpectu hæc provenire non poſſunt: ergo tantò minus à miſce medicinali.

Sunt tamen ex una parte plurimi medici Aſtologiæ defenſores, inter quos eſt Loſenicus ſepralius uir alioqui doctiſſimus in ſuis commentarijs de aere aquis, & locis qui conatur confirmare ex Ariſtotele, dies indicatorios, & indicatorios uirtutem ſumere ab aſpectibus reſtibus, & ab ipſa Luna. Ex alia parte eſt Magnus Aſtronomus, qui edidit libellum, in quo deſendit Galenum de menſe medicinali.

Quo ad Ariſtotelis auctoritatem ipſe primo Meteorum in primis uerbis habet, Oportet mandum hunc inferiorem eſſe totumque ſuperiorem latitibus, ut inde eius uirtus gubernetur: ergo & dies indicatorij & indicatorij à Cælo habent uirtutem. Similiter Ariſtoteles ſecundo Cæli inquit, propter motum ſolis in obliquo circulo fieri generationes & corrup-

ptiones: immo ſecundo de generatione & corruptione addit, propter motum ſolis & aliarum planetarum in obliquo circulo fieri generationes, & corruptiones: ſed clariuſ Philoſophus 4. de generatione animalium cap. ultimum. declarat ſolis, & Lunæ influxum in hæc inferiora his uerbis, Luna eſt principium propter ſolis ſocietatem: ſic enim Luna quæ alter ſol minor: ideo conducit ad omnes generationes, & perfectiones: calores enim & refrigerationes cum quadam moderatione faciunt generationes: ſine moderatione uero faciunt corruptiones. Demum primo Meteororum cap. 2. inquit, Cælum eſſe cauſam efficientem eorum impreſſionum, quæ ſiunt circa elementa: elementa uero eſſe cauſam materialem: hæc ſunt illa fundamenta quæ deſcunt ab Ariſtotele.

Ad prædictas Ariſtotelis auctoritates primò reſpondemus, Ariſtotelem ſecundo de Cælo tex. 42. determinaffe, Cælum agere lumine, & motu in hæc inferiora, & non influxu, & figura, ut putant Aſtologi. Qui igitur negant, Cælum agere in hæc inferiora influxu, & figura, negabunt quoque iſtas motiones in 7. 14. & 20. fieri à Luna, & ſyderum aſpectibus.

Secundò reſpondemus, Ariſtotelem locis citatis intelligere Cælum agere in hæc inferiora tanquam agens commune, & vniuerſale, non ut priuatum & particulare: Cælumque eſſe cauſam remotam, & non proximam: atque à remota nihil concludi affirmatiuè, ſed ſolum negatiuè in caſtibus.

Tertiò reſpondemus, Ariſtotele, de generatione animalium aſſerere, ſole accedente ad nos fieri generationes, nequè uere, & æſtate generari herbas, & alia plura: recedente uero ſole, i. autumno, & hyeme fieri corruptiones. Dum uero dicebatur ex Ariſtotele, Lunam propter ſolis ſocietatem conducere ad generationem. Reſpondemus, conducere ratione luminis, & motus: non ratione influxus, & figuræ. Ad poſtremum, dum dicebant ex Ariſtotele Cælum eſſe cauſam efficientem ipſarum impreſſionum: elementaque eſſe materiam recipientem impreſſiones, concedimus eſſe cauſam communem, & vniuerſalem,



lem, sed non priuatam, & particularem, atque efficere in elementa impressiones ratione luminum & motuum, & non ratione influxus, & aspectuum, à quibus dicunt dies indicatorios, & indicatorios particulares in agritudinibus pendere.

Quo ad Maginum, qui pro defensione Galeni & mentis medicinalis edidit libellum, in quo dicit Galenum proposuisse quartum, & non tertium & quintum esse diem indicatorium: quia voluit solum proponere motum medium, qui cadit in quarta & non in tertia, vel quinta die. Similiter inquit Maginus Galenū proposuisse septimum & non sextum & octauū diem esse iudicatorium: quia in septimo cadit motus medius: pari ratione dicit, proposuisse vndecimum, & non decimum & duodecimum: sic decimumquartum & non decimumtertium & decimumquintum, quia voluit tangere motum medium lunæ & non motū lunæ velociorē, vel tardiorē.

Credimus Nos Maginum dupliciter hallucinari: primò quia supponit Galenum cognouisse motum medium, quod non potest admitti: illi enim qui non cognoscunt eccentricos, vel epicyclos nō possunt cognoscere motum medium: sed sic est quod Galenus hæc nō cognouit: quia de his ne verbum quidem in suis libris. Deinde Maginus ostendit, se Galenum non legisse, quia Galenus semper negat, octauum esse iudicatorium: atque negat decimum & duodecimum esse indicatorios, atque absolute negat decimumquintum esse iudicatorium: quod non esset negandum; si dies indicatorij, & iudicatorij penderent à lunæ aspectibus. Preterea si Galenus cognouisset motum medium, cognouisset motū retrogradum, stationarium, & directum, ac per consequens cognouisset eccentricos; & epicyclos, sed de his neque somniauit Galenus.

### QVÆST. LXXX.

*Ostenditur quemlibet diem esse posse indicatorium, & iudicatorium.*

**N**Os tamen experientia Hippocratis suffulti putamus, quemlibet diem esse posse indicatorium, & iudicatorium:

quamuis in acutis frequentius sint quatuor septimus, vndecimus, decimusquartus, & vigesimus. Quod reuera ita sit, facile colligitur ex aegrotantibus Hippocratis in Epidemicis propositis, ad quos, tamquam ad exemplaria sufficientissima reduxit omnia experimenta, quæ desumpsit à tabulis, conerant in templo Esculapij innumerablem.

Hinc prima dies observatur indicatoria in Phrenetico, qui prima die virulentum vomuit, tertia vero die iudicatur ad mortem.

Secunda dies observatur indicatoria in Pericle: quia in 2. habuit urinas crassas, & in quarta per sudorem copiosum iudicatur ad salutem.

Tertia dies observatur indicatoria in Adolescente decumbente in foro mendacium: quia in tertia habuit extrema frigida, quæ indicabant mortem in quinta: tamē ob robur delatum fuit iudicium ad septimum.

Quarta dies observatur indicatoria in Sileno: quia in quarta die notabiliter omnia fuerunt exacerbata: in septima debebat mori, obmutuit tamen: ob robur fuit delatum iudicium ad nonum: sed quia die octaua eruperunt papulæ: ideo delatum fuit iudicium ad vndecimum, itant octaua fuerit index vndecimi.

Quinta dies observatur indicatoria in Horophonte in qua die intumuit lien, & in 17. iudicatur ad salutem.

Sexta dies observatur indicatoria in agrote, qui cœnuuit calefens in qua multum delirauit, & iudicatur ad mortem in vndecima.

Septima observatur indicatoria in molliere decumbente in foro mendacium, in qua die extrema apparuerunt frigida, sed ob maximum robur delatum fuit iudicium ad decimumquartum diem, in quo moritur.

Octaua dies observatur indicatoria in Pythione, quia in octaua die maior commotio fuit facta, & die decima iudicatur ad mortem.

Nona observatur indicatoria in agro innominato, in quo die friguit, indicauitque quid erat euenturum in vndecima, in qua die moritur.



Decimaſeptima obſeruatur indicatoria in muliere decumbente in Lio, in qua irritatur aluus & iudicatur in 21.

Sed aliquis inſtare poterit: ſi quilibet dies poteſt eſſe indicatorius, quomodo poterit inueniri in quolibet agrotante certus & determinatus dies indicatorius? Pro qua re dignoſcenda medicus in prima viſitatione ſtatim debet ideam, & motum morbi inuenire: nempe, an morbus ſit peracutus exactè, an peracutus non exactè, an acutus exactè, an acutus non exactè.

Dignoſcemus peracutum exactè (qui ſolet terminari in primo quaternione) ſi primo, vel ſecundo die notabiles fiant mutationes ad bonum, vel ad malum: ſi igitur iſtæ notabiles mutationes apparuerint primo die, primus erit indicatorius, vt dictum eſt de Phrenetico, & de Critone. Tertius verò in his erit vt plurimū indicatorius: dies enim indicatorius nihil aliud eſt, quā dum fiunt grauiora ſymptomata cum aliqua notabili mutatione ad bonum, vel ad malum.

Dignoſcemus peracutum nō exactè, qui in ſecundo quaternione terminari ſolet, ſi graui ſymptomata appareant tertio, vel quarto die, vt contigit Philifco, de quo Galenus loquens habet hæc verba „ Vbi tertius & quartus dies habent graui ſymptomata, iudicium expectandum eſt in ſexta vel ſeptima die.

Acutum verò exactè, qui ſolet terminari 14. die, dignoſcemus, ſi æger mutationes habeat graues in ſexto, vel ſeptimo die, qui dies ſunt indicatorij vndecimi, vel decimi-quarti, & ſic de alijs, vt plurimum contingere ſolet.

Quoad dies indicatorios, ſeu criticos, quod idem eſt, ſimiliter dicimus, quemlibet diem poſſe eſſe criticum.

Quod quilibet dies poſſit eſſe criticus probatur, per obſervationes ab Hippocrate deſumptas in Epidemicis, & alibi. Ex Hippocrate 3. prognost. 16. angina grauiſſima interdum primo die interimit, & prima die interdum ad ſalutem terminatur, 2. epid. Coi ſoror laborans hepatis inflammatione ſecundo die moritur: ergo primus & ſecundus dies poſſunt eſſe critici.

Nec valet, dum dicit Valeſius, illos dies

non eſſe vocādos criticos, qui mori ſolum, ſed illos qui ſanari etiam poſſint. Nec putat dari exempla morborum perperacutorum, qui ſanentur prima, vel ſecunda die.

Fallitur, quia ipſe Galenus 5. aphoriſ. 1. citat caſum iuuenis, qui liberatur prima die per vomitum bilis æruginofæ morbo lethali. Præterea innumeri anginoſi prima, vel ſecunda die ſanantur. Deinde 3. epid. 3. habetur, Critonē, & Phreneticum iudicari, & mori in tertio die.

Lariſſam caluum mori in quarto.

Periclem liberari in quarto.

Eraſinum mori in quinto.

Metonem liberari in quinto.

Philifeum mori in ſexto.

Virginem Lariſſæ liberari in ſexto.

Adoleſcentem decumbentem in foro mendacij mori, ſeu iudicari in ſeptimo.

Quod dictum eſt de prima ſeptimana poteſt applicari ſecundæ, & tertiæ ſeptimanz: quia tertia dies reſpōdet decimæ, quarta reſpondet vndecimæ, quinta, duodecimæ, ſexta decimetertiz, & ſeptima decimequartæ.

## Q V A E S T. LXXXI.

*A quibus cauſis promanant dies critici.*

**C**Auſæ verò dierū criticorum nō promanant immediatè à Cælo, vt probatum eſt: ſed à maiori, vel minori virtute agentium particulariū, & à maiori vel minori diſpoſitione patientium. Innumerabilia ſunt diſcrimina agentium, & patientium. Hinc eſt quod patiens modò vincitur ab agente horæ ſpacio, vt epilepſia: modò dier ſpacio, vt ephimera: modò vnius hebdomadæ curſu, vt febris ardens: modò duarum hebdomadarum interuallo, vt febris acuta exactè, modò in vigefima die, vt febris acuta non exactè: modò vnius anni ſpacio, & ultra, vt quartana; & modò nunquam, vt podagra nodola.

Parimodo ex ouis incubatis ſub glaciēti galina ſpacio 22. dierum paruuli naſcuntur, nec citius, nec tardius. Similiter bubo, qui fit ex ſanguine ſyncero in parte temperata ſeptem diebus ſuppuratur, non propter lunæ aſpectum quadrangularem: ſed quia



quia eius natura talis est: si verò sanguis fuerit mixta bilis citius suppurabitur, si putrida tardius.

Hinc Galenus 3. præfag. 29. protulit hanc diuinam sententiam, si vires sint robustæ, & humores peccantes sint calidi, cito iudicantur per excretionem; si verò vires sint robustæ, & humores sint frigidi, tardè iudicantur, & per abscessum: si vires sint debiles, & humores sint calidi, similiter per abscessum: si vires sint debiles, & humores frigidi, vel moriuntur, vel vix tandem coquantur. Hec Galenus.

Amplius excara facta à ferro cadenti separatur spatio sex dierum in temperamento humidiori: in sicciori paulò maiori intervallo, nempe septem dierum: quare non ratione aspectuum lyderum, sed ratione naturæ particularis.

Ad eundem modum sanguis menstruus in aliquibus mulieribus citius, in aliquibus tardius fluit, non ratione Lunæ, sed ratione diuersitatis virtutis temperaturæ, conformationis, & dispositionis sanguinis. Neque fluunt menses solum in Lunæ coitu cum Sole, vel in plenilunio, vt medicorum vulgus supponit: sed qualibet die, & qualibet mensis hora, prout varia est virtus, & varia est corporis dispositio.

Eadem ratione fructus citius, vel tardius maturescunt: quia eorum natura particularis id efficere potest. In principio mensis Aprilis maturescunt asparagi. In mense Maij cinera. In Iunio, vel paulò ante cerasa. Ficus in Iulio. Vuç in Augusto, tardius, vel citius, prout regiones sūt calidiores, vel frigidiores: quia à natura particulari, & à virtute agerum, & patientiū particularium hæc omnia fiunt. Hinc si vires in cerasum inferantur, vuç maturescunt multo ante, in Iunio videlicet: quia vires à ceraso citius, quam à terræ folio alimentum sumunt.

His igitur hunc in modum constitutis cessare debet admirationes de muliere decumbente in foromédaci, cur in septima habuerit extrema frigida & septimus fuerit index 14. q̃ non fuit Galeni principijs consentaneum, qui tenet quando dies indicatorius est in sextili, diem indicatorium debere esse in fine quadrati, intelligendo

per sextilem, & quadratum respectu principij, & graditudinis, & non respectu nouilunij.

Parimodo cessare debent admirationes de Pythione, de filia Euryanactis, de Hermocrate, & de alijs. De Pythione, qui iudicatus sit in decima & non in vndecima quodcum Galeni principijs reluctetur, dixit Galenus mendum esse in codice Hippocratis, itaut debeat legi iudicatum esse in vndecima & non in decima.

De filia Euryanactis Galenus miratur, cur mortua sit die 19. quæ neque est critica, neque villo pacto ex mense medicinali colligi potest. Deinde miratur, cur habuerit exacerbationes in die pari: videns igitur Galenus hanc Hippocratis historiam suis principijs non semper consentire, vt tollat difficultates, inquit in 19. mortuam fuisse filiã Euryanactis ob destillationes, & innatã tabem, quæ ordinem dierum criticorum permutarunt: nihilominus Galenus refert non fuisse tabidam, sed solum ad tabem fuisse propensam.

De Erasino miratur Galenus: quia omnia erant in secunda die exacerbata: tamen nõ fuit iudicatus in quarta, sed in quinta. Videns Galenus etiam hunc casum non respondere suis principijs protulit hæc verba, Si primam diem in casu Erasini non enumeres, cum fuerit quietus, illud iudicium erit in quarta, quod non tollit difficultatem: ex Hippocrate enim 2. aphorismorum 30. in principio & fine morbi omnia quietiora: quare in principio, & præcipuè prima die morbus semper est quietus, & hac ratione nunquam esset enumeranda prima dies, quod numerum criticorum dierum destrueret.

De Hermocrate Galenus, mirari videtur, quod non fuerit mortuus vigesima die quia omnia in 17. erant ita exacerbata, vt indicarent moriturum vigesima: tamen in vigesima bene habuit: solumque moritur 27.

Respondet Galenus cur Hermocrates in vigesima non fuerit iudicatus, dicendo decimam septimam fuisse exacerbatam à putredine absque eo quod calor natiuus operetur: Ecce quod ipsemet Galenus vel turate coactus tandem refert dies indicatorios



rios ad calorem natiuum, vt nos quoque superius probauimus: veritas enim habet hanc prerogatiuam, vt semetipsam ostendat: & vt dicit ipse Galenus 2. de simp. medicina cap. 27. „ ipsam veritatem celserrimam inuentionem obtinere.

Hinc Galenus 3. de diebus decretorijs cap. 10. rectè sentit, dies per accidens decernere, & indicare: subdit, nec tertium, nec quatum numerum esse auctorem scripsit, quæ sententia destruit quidem mensuram medicinalem, qui factus est ex numero, & non ex re numerata.

Parimodo veritati consentiens secundo de præfagijs comm. 28. dicit, febrem reddi longam, aut propter particulam malè affectam, cui agrè curatio adhereri possit, aut ob crassos, & viscidos humores, aut ob errorem commissum. Quare prout maius, vel minus est robur, & prout materia siue humores sunt magis, vel minus dispositi, quilibet dies potest esse indicatorius, & quilibet dies poterit esse iudicatorius, seu criticus: concedimus tamen, aliquos dies frequentius iudicare, sed non propter Lunam, sed propter particulares dispositiones superius allatas, quæ frequentius accidere solent.

Denum pro defensione Galeni dicimus, quod quæ dicta sunt ab illo de mense medicinali tertio de diebus decretorijs non fuisse proposita secundum propriam opinionem: quia ipsemet Galenus cap. 10. eiusdem libri habet hæc formalia verba „ Primus liber huius operis sufficit. Quod si non laboris fugitantiior sit, secundum quoque adijciat, à tertio autem absteineat: quia inuito illū scripsimus: subdit vos d. Dij immortales nouistis, vos in testimonium voco, hæc me amicorum quorundam precibus vehementer adactum scriptis, mādasse.

Ex his colligimus, quod ea, quæ continentur tertio libro de diebus decretorijs non esse proposita ex propria sententia, sed omninò à mente Galeni fuisse aliena. Inde factum est quod Galenus nullibi in suis voluminibus mentionem faciat de mense medicinali: quia reuera illum tamquam chimericum, vt quibusdam amicis satisfaceret, proposuit.



*Q*uæ ducere oportet, quo maxime natura vergit per loca conferentia eò ducere conuenit.

Docuit superius Hippocrates, quando medicus debet permittere totum negotium naturæ, dum dicebat quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè. In hoc verò aphorismo docet, per quæ loca debeant euacuari humores, qui neque iudicantur, neque iudicata sunt integrè, sumendo indicationem à duplici scopo. Primus à locis conferentibus. Secundus ab humoris inclinatione: itaut Hippocrates in hoc aphorismo breuissimè tradat artem inueniendi ipsa medicamenta in quauis agitudine. Si quis enim de inuentione medicamenti centum scriberet volumina non posset aliud in medium adducere, nisi hos quos scopos duobus verbis ab Hippocrate prolatis, videlicet humoris inclinationem, & loca conferentia.

Quod verò per hos duos scopos cognoscantur medicamenta, patet: quia dum cognoscimus humores inclinare ad vesicam statim intelligimus medicamentum debere esse diureticum: si ad ventriculum, esse vomitorium, si verò ad aluum, esse catharticum.

Alia continuatio huius aphorismi cum superiori vagatur per scholas non spernenda quidem, sed non ita artificiosa: talis est: euacuatio vniuersim cōsiderata est duplex, naturalis, & artificialis. Prima est dum natura spontè euacuat indicando perfectè ipsum morbum. Secunda est artificialis, quæ à medico molitur. In superiori aphorismo egit de euacuatione facta à natura integrè, & perfectè: in hoc verò agit de euacuatione artificiali, quæ à medico fit: quare intentio Hippocratis in hoc aphorismo est duo docere. Primum quid agendum sit à medico, quando natura rectè mouet humorem, sed euacuat imperfectè. Secundum docet, quid agendum à medico quando natura non rectè mouet humores



videlicet per loca conferentia: suffultus est aphorismus hoc principio, esse imitandam naturam bene operantem, quando mouet humores habentes propensionem, & per loca conferentia: secus natura non est imitanda: sed vt dicit Galenus in comm. à motu prauo distrahenda.

Prima dubitatio: videtur Hippocrates inordinatus, quia in hoc aphorismo agit per quæ loca sit facienda euacuatio. In sequenti aphorismo agit de tempore. In 23. de quantitate: sed sic est quod quantum antecedit tempus, & tempus antecedit locum, per quem sit euacuatio: ergo Hippocrates agens prius de loco est inordinatus.

Præterea quantum antecedit tempus, & tempus locum ex sententia ipsius Hippocratis, qui 6. epid. 6. tex. 32. hoc ordine rectam remedium administrationem proponit, quantum, quando, quomodo, & vbi, seu locum: ecce quod in fine proponit locum.

Respondemus ad instantiam, Hippocratem in hoc aphorismo non agere de loco, sed de inuentione medicamenti, quæ desumitur à duplici scopo, quorū alter desumptus est ab humoris inclinatione: alter verò à loco, per quem euacuatio fieri debeat. Quod verò, qui cognoscunt hos duos scopos, statim intelligāt quodnam debeat esse medicamentum, patet ex continuatione aphorismi superius allata: dum enim cognoscimus humores peccantes propensos esse ad vesicam. inde colligimus remedium debere esse diureticum, & sic de alijs, vt dictū est superius: ideo Hippocrates non agit in hoc aphorismo de recta medicamenti administratione, in qua absque dubio locus non præcedit alias condiciones: sed agit de inuentione medicamenti desumenda ab humoris inclinatione, & à locis conferentibus, vt dictum est.

Diuiditur aphorismus in duas partes.

In prima vult euacuandi occasionem esse desumendam ab inclinatione humoris peccantis. In secunda verò à locis conferentibus.

Quo ad verba „ *Que ducere oportet.* Galenus in comm. per ea quæ ducere oportet, intelligit illa, quæ neque iudicantur, neque iudicata sunt integrè, & hæc sunt

illa, quæ indigent medico auxilio.

*Quo natura maxime vergit.* In græco codice Cænomani dictio (natura) non reperitur: ideo illam remouet à suo tex. sed reuera poni debet, quia inuenitur in libro de venæ sectione aduersus Erasistratum, vbi Galenus exponens hunc aphorismum proponit dictionem (natura) alioquin aphorismus esset de motu symptomatico factò videlicet à morbo, & non à natura: atque aphorismus esset falsus: quia motus symptomatici, vt tales semper laedunt, & vt tales non sunt adiuvandi.

Dicit *quo maxime vergit.* ponit illud maxime, vt amplectatur non solum motum, & impetum humorū euacuandorū, sed etiam motum naturæ, id est facultatis expultricis, vel attractricis: quia si humores solo suo impetu mouerentur nō concurrente naturali expultrice, dicerentur rurgentes: humores verò, si non turgeant, non mouentur à se & proprio impetu, vt colligitur ex Galeno 2. de diff. feb. vlumo, & tertio de facul. naturalibus 13. secus omnis fluxio humorum ad inferiora fieret: mouentur enim vel à parte mittente expulsi, vel à recipiente attracti.

*Eo ducere oportet* supple, si loca sint conferentia. Ad locos affectos humores non sunt ducendi: neque per patres læsas euacuandi, nisi totum corpus prius sit bene purgatum, alioqui plura essent illa excrementa, quæ confluerent ad partem læsam, quam illa, quæ euacuantur. Galenus 2. in sextum epid. comm. 29. loquēs de Simone his verbis exprimit hanc doctrinam „ Per fomenta plus attrahitur in non purgato corpore, quam resoluitur.

## Q V Æ S T. LXXXII.

*Quando topica applicantur corpori non purgato.*

**H**Inc neque topica applicantur corpori non purgato, nisi in septem casibus: quorum primus est quando affectus est ita levis, vt sine purgatione tolli possit, vt docet Galenus primo de comp. mediorum S. L. cap. de alopecia: ac 2. aphorismorum 15. Galenus animaduertit, quod

si om-



Si omnia excrementa deposita sint in partem laſam corpore exiſtente nilis libero, quod cognoscitur per vrinā, & alui excrementa, topica applicari poſſint absque alia præcedenti euacuatione: hac ratione moti nos tollimus, & impetigines ſucco limonum cum criſochola, & mortuorum baſia, faciē abluendo aqua, quæ ſic præparatur. Recipe aquæ cōmunis lib. ſex ſublimati 3. 2. therebentina lib. mediam: bulliant donec therebentina fundum petat.

Secūdus caſus, dum materia eſt venefica, vel ex morſu, vel venenatis armis: tunc ſine præcedenti purgatione adurimus partem: quia venenum non dat inducias.

Tertius caſus, in apoſtematum principio vrimur repellentibus antea prius purgatione.

Quartus ex Galeno primo ad Glau. 14. ante aliam purgationem os ventriculi, ſi inbecillum ſit, roborandum eſt.

Quintus caſus ex Galeno primo ad Glau. 9. in tertiana legitima conuenit balneum ante euacuationem totius: hoc ſine, vt humores contemperentur: dum enim Galenus 11. meth. 9 prohibet balneum, niſi humores ſint concocti: dicimus ibi proponere balneum non ad temperandum, ſed ad expurgandum corpus per ſudorem.

Sextus caſus, dum adſunt vrgentia, ſicuti ſunt magni dolores, vel ſyncopes: ante alias euacuationes applicamus topica.

Septimus, applicamus fomenta, vt periculum faciamus, an morbus pendeat ex ſtatibus, vā fecit Hippocrates in Anaxione.

**P**er loca conferentia, vt dicit Galenus in comm. Hippocrates intelligit os, nares, aur es, ventriculi, intellina, hemorrhoides, vterum, veſicam, & demum meatus inſenſibiles, qui ſunt maximè conferentia, vt in ſtatica probauimus.

### Q V Æ S T. LXXXIII.

*Sex conditiones requiruntur, vt loca ſint conferentia.*

**N**otandum ad hoc, vt loca ſint conferentia, quod requirantur ſex conditiones.

Prima, vt loca, per quæ fieri debeant euacuationes, ſint illaſa: ratio eſt, quia excrementa ad partes laſas non ſunt ducēda: hoc præceptum eſt Galeni 13. meth. cap. 11. vbi aſſerit, ſi intellina ſint inflammata, vel alio affectu correpta, non eſſe purgandū per aluum, ſed potius per vrinam. Subdit, ſi leſi ſint renes, non eſſe euacuandum per vrinam. Idem præcipit Galenus 2. in ſextum epid. comm. 7. his verbis „ Veſica & renibus vitiatis præſtat per aluum euacuare: intellinis vero malè habentibus per vrinam. Quare niſi adſint duo ſcopi propoſiti ab Hippocrate in aphoriſmo, quorum primus deſumitur à natura habente inclinationem ad illam partem, ſecundus verò à loco conferente, per eam partem non trahimus: ſed diuertimus, & reuellimus.

Eandem doctrinam tradit Hippocrates 6. epid. 2. tex. 29. vbi inquit „ Reuellere, ſi quo non oportet, vergat, ſi autem quo oporteat aperire, vt ſingula vergant. Valeant igitur, qui in dyſenteria, & collica paſſione vtuntur pharimaco, & qui in nephritica paſſione vtuntur diureticis, quando renes ſunt inflammati, quo caſu neque diuretica frigida conueniunt, quia & ipſa ad inflammatos renes ferunt excrementa. Parimodo ex Galeno 5. aphoriſmorum 46. colligitur, mentes non eſſe mouendos, ſi os vteri ab omento, vel aliquo tumore comprimatur, quia tumor magis excreſceret.

Secunda conditio locorū conferentium eſt, vt loca per quæ facienda eſt euacuatio non poſſint ita lædi ab humoribus, qui per illam partem euacuari debent, vt potius in cōmodum, quam comodum recipiant; vt Galenus in comm. animaduertit.

Hinc ſi in vetriculi fundo eſſet atra bilis, vel bilis eruginola, vomitus nō conueniret, quia humoris venefici trāſitus per os poſſet derepēte interimere, & animaduertit Hippocrates cum Galeno 4. aphoriſmorum 22. his verbis „ atram bilem ſupra vel infra, lethale. Parimodo Galenus 5. aphoriſmorum 1. facit mētionem de quodam iuvene, qui euomit æruginola, ſtatimque eius corpus redditum fuiſſe cōuulſum, ac niſi tota fuiſſet expulſa, & fuiſſet



robustissimus, eadē die periisset. Idem dicimus de fece melancholica adusta, quæ non sit mouenda per vomitum, nisi prius eius acrimonia contemperetur, quod obseruare viderur Galen. 1. ad Glau. cap. de quartana, qui, dum vult per vomitum rejicere adustam melancholiam, admonet à cibo id faciendum, qui acrimoniam humoris, & ellebori, quo vritur ad vomendum, moderetur. Nos verò ante vomitum vrimur epichierasticis, cuiusmodi sunt serum lactis, vel lac asinum, quæ acrimoniam retundunt: vel vrimur vomitorio cum iusculo pingui, vel oleo amygd. quæ attemptant, & simul vomitum prouocant.

Tertia conditio locorum conferentium est, quod partes vicinæ principes non possint ab humoribus, qui euacuantur, notabiliter ladi, veluti in phrenitide, in qua præstat bilem euacuare per secessum, quam per vomitum: quia læso orificio ventriculi ab ipso vomitu, cerebrum per sextum par neruorum habēs sympathiam cum stomacho maximè læderetur.

Quarta conditio est, vt loca conferentia sint proxima humoribus euacuandis, quod ratione & auctoritate cōfirmatur. Ratione quia de natura omnium medicatū operationum sunt tres scopi, qui fuerunt inuenti ab Asclepiade, & à Galeno maximè celebrati, quippe sunt, cito, tuto, incūdē: cito ergo per proxima, nisi aliquid impediatur.

Idem patet Galeni auctoritate 2. in sextum epid. comm. 22. vbi laudat sabini sententiam, qui in fluxu sanguinis è naribus, secabat venā cubiti eiusdem lateris ob vicinitatem. Eādē doctrinam Galenus proponit 7. meth. ult. vbi inquit, si vitium sit in parte concana ipsius hepatis, faciendā est euacuatio per intestina: si in conuexa per vrinam: hoc sine sane, vt per proxima fiat euacuatio. Addit per vrinam, dummodo non sit vitiosi succi magna copia in renibus: quia tunc prius per cathartica faciendā est euacuatio, deinde per diuretica, quæ præcepta sanè maximè sunt obseruanda, antequam diureticis vtamur, quod nostratum plurimi non animaduertunt.

Demum idem confirmat Hippocrates secundo in 2. epid. tex. 27. in casu Bionis, qui per vrinæ profluuium lienis tumore li-

beratur. Consensus lienis cum renibus est per lienis arterias, quæ arterijs emulgentibus implantantur. In casu Bionis natura depleuit lienem per vrinæ vasa: quia & erant loca conferentia, & proximiora. Hinc medici sepiissimè citius sanant spleneticos diureticis, quam catharticis.

Quinta conditio est, vt conferentia sint respectu humorum euacuandorum recte transmittē diffusa: citius enim sanantur corpora, vbi est rectitudo vasorum: quia linea recta est omnium breuissima. Hinc Galenus lib. de curandi ratione per sang. missionem cap. 15. præcipit seruandam esse rectitudinem, vt egri citissimè sanentur.

Sexta conditio est, vt vasa sint communia inter humores euacuandos, & loca conferentia, vt euacuatio fiat (vt docet Galenus 13. meth. 11.) per vasa communia. Non omnes conueniunt quid intelligat Galenus per vasa communia.

Curtius lib. de venæ sect. & Alij plures per vasa communia intelligunt venas, eo quia nulla est corporis particula, quæ venis careat, itaut omnes venæ habeant societatem cum caua, vel porta.

Reijcitur hæc opinio: quia præter venas, plurimi sunt canales & emissaria, & plurimæ scatebræ, vt ventriculus, intestina, vterus, vteretes, vesica, arteriæ, spatia varia inter carnes, sunt nerui, membranz, & cutis totius corporis.

Ego autem puto per vasa communia intelligi posse non solum venas, sed omnes necatus, tam sensibiles, quam insensibiles. Hinc Galenus 1. meth. cap. 2. dicit ex Hippocrate totum corpus esse *εὐαεργὸν καὶ εὐαεργὸν*, id est, transpirabile, & conflatile per vasa nobis omnino incognita.

Quis enim est ille qui per scientiam anatomicam penetrauerat vias, quæ sunt inter processus mamillares, qui sunt instrumenta odoratus, & vterum?

Quod vero euentissimus sit iste consensus inter vterum, & odoratus instrumenta patet experientia, quia odores gratissimi alliciunt vterum ad partes supernas ingrattissimi illum deorsum depellunt.

Immo Aristoteles 8. de historia animalium cap. 24. refert, „ Odore extinctæ incernæ interdum sequi abortum: itaut à



malo odore extinguitur lucernæ poffit depelli factus extra vterum.

Præterea alij innumerabiles dantur cōfenfus per meatus occultos, quod ſæpè numero obſeruauit Hippocrates: ſicuti 6. epidemiorum, & lib. de humoribus refert, pleuritidem interdum per hæmorrhoidas ſolui pellendo humores conuerſos in pus per meatus inſenſibiles ad illas venas. Præterea pleuritis, vel aliqua alia inflammatio ſupra ſeptum, dum fit ſuppuratio, pus interdum per vrinam euacuatur.

De hac mirabili tranſumptione per meatus incognitos mentionem facit Galenus 7. ſec. aphoriſmorum comm. 35. & 54. de eadem re ſatis ſuſè 6. de loc. aff. cap. 4. & 5. meth. cap. 8. quem mirabilem euacuandi modum medici plebei neque intelligunt, nec mente fingere, vel comminifci poſſunt.

Similiter admiranda eſt caſus Clozomenij quomodo parotides fuerint per vrinas expurgati.

#### QVÆST. LXXXIV.

*Quenam ſint conditiones, quæ reddunt loca magis, & minus conferentia.*

**D**enum ſunt quatuor conditiones, quæ reddunt loca magis & minus conferentia. Prima eſt habitus corporis, quæ cōditio proponitur ab Hippocrate 4. aphoriſmorum 6. & 7. vbi dicit „ habitus gracilis per vomitum facile euacuatur, carnoſus & pinguis per alium: ratio eſt quia in gracili peccant humores bilioſi, qui leues ſunt: in carnoſo lenti, & ponderoſi.

Secunda cōditio pertinet ad anni tempora, de qua Hippocrates 4. aphoriſmorum 4. ait „ Aſtate per ſuperiora, hyeme per inferiora purgandum. Montanus tamen neſcio quâ ratione ductus potius laudet vomitum faciendū eſſe tempore hyberno quam æſtuo: idque colligit ex Auctore de ſalubri diætâ 15. Caterum mirandum eſt, cur Montanus reliquerit aphoriſmos, & receperit libellum de ſalubri diætâ: cuius auctor non eſt Hippocrates, ſed Polybij.

Hæc Montani opinio ob tres rationes reici pot, prima, quia hyeme abuſant humores craſſi, qui deorſum tendunt: ergo non per vomitum. Secunda quia velle ſu-

periores tempore hyberno ſunt magis reſerta: itaut inter vomendum poſſint in partibus ſuperioribus excitari inflammationes. Tertia ob vomitus impetum, venæ hyeme, cum ſint denſiores, & magis repletae, facile rum pi poſſent.

Tertia cōditio eſt magna excrementorum quantitas: Galenus enim 7. meth. ultimo: ſi in gĩbba eſt multa excrementorum viſcoſorum quantitas per pharmaca deiſciuntur: ſi medioeris quantitas per vrinales meatus: ratio eſt: quia copioſa excrementa per pharmaca educuntur, ne diuretica ferant ipſa excrementa in vaſa renum minora, & inde ita infarciuntur, vt nephritica affectio fiat. Valeant igitur illi, qui non benè purgato corpore, vel aquis diureticis thermalibus vtuntur, vel lacte ſemelonum, vel ſimilibus, quæ introducunt affectiones malas, & curatu difficiles.

Quarta cōditio pertinet ad proprietates indiuiduantes: aliqui enim ita reſpiciunt ſoluentia medicamenta, vt nullo modo ipſa admittant.

Alij phlebotomiam pati non poſſunt.

Alij ſyrupum roſatum ſolutiuum propter roſarum odorem in animi deliquium labuntur.

Atque alij alias habent proprietates, quæ certè innumerabiles quotidie in indiuiduis obſeruantur.

Quare medicus debet ad examē reuocare conditiones indiuiduantes, & in ſingulis ægrotantibus perquirere, an aliqua inueniatur noua, & omnind ab alijs diuerſa: quo peracto, deinde proponere id quod eſt proportionatum & quod certè iunet, & non noceat.

**P**rima dubitatio: Hippocrates proponit in aphoriſmo duas conditiones optime euacuationis: quarum prima eſt, vt euacuentur humores habentes propenſionem, & inclinationem ad euacuationem. Secunda vt euacuentur per regionem conuenientem. Ex alia parte totum oppoſitum videtur aſſerere Hippocrates 4. ſect. aphoriſ. 41. vbi habet hunc aphoriſmum „ ſudor multus per ſomnum factus copioſiore cibo corpus vt ſignificat: quod ſi partius epulanti hoc accidat vacuatione indigere.



Similiter Auicennas 2. 4. tra&. 1. cap. 68. inquit: in multo sudore ex repletionem facto per aluum esse euacuandum: ergo non est verum, quod euacuatio facienda sit per regionem conuenientem: quamuis humores sint inclinati, & propensi ad illam euacuationem.

Respondetur, aphorismum esse verissimum, dummodo aliquid non prohibeat: dum igitur corpus persusum est copioso sudore ex pluri cibo, inde resultat materia tenuis, & crassa: crassa certè per aluum est euacuanda, secus obstructions, & putredines excitantur: si tota materia peccans esset tenuis, & inclinaret ad sudorem, aluus non esset mouenda: sed cum in corpore materia tenuis permixta sit crasse, nisi fieret euacuatio per aluum, tenuis quidem euacuaretur: sed crassa relinqueretur tanquam multorum malorum soboles. Præterea separando tenuem à crassa curatio redderetur difficilior.

Secunda dubitatio: succus crudus interdum mouetur per aluum, interdum per urinam: medici igitur non debent vi medicamento euacuante humorem crudum: quia ex Hippocrate in sequenti aphorismo connotata, & non cruda sunt medicanda. præterea ex Galeno 4. de tuerenda sanit. c. 5. deiectio crudorum efficit tormina, cruda angustas vias reddunt & sunt impedimento, ne prauis humores euacuentur. Deinde esto, quod cruda moueantur per regionem conuenientem, efficiant decretoriū non iudicans, quæ decretoria non iudicantia ex Galeno comm. 12. huius sect. & in Philisco vel sunt lethalia, si iungantur cum aliquo signo lethali, vel saltem sunt difficilius iudicij. His positis, sequetur quod duæ conditiones propositæ ab Hippocrate in aphorismo indicantes optimam euacuationem, quarum prima est humoris euacuandi propensio, & locus conueniens, per quem sit euacuatio, non sufficiant: ergo aphorismus erit diminutus.

Respondetur, Hippocratem in hoc aphorismo non proposuisse omnes conditiones optimæ euacuationis, sed tantum duas præcipuas: supponit enim Hippocrates in omni affectu humores vergeat per loca conferentia esse euacuandos, nisi aliquid prohibeat: cruditas inter prohibentia

euacuationem collocatur.

Præterea respondemus, cruditatem esse duum generum, aliam esse aquosam, aliam verò crassam, & viscosam. De aquosa dicimus, si inclinēt ad loca conferentia commode euacuari posse, sicuti in hydropicis aquosa excrementa elaterio euacuari solent: cruditas verò crassa, & viscosa est immobilis, neque ad loca conferentia habet propensionem, quemadmodum animaduertit Galenus 2. de humoribus comm. 1. ubi habet hæc verba „ Humores incocti sunt stabiles, & ita infixi, vt difficulter demoueri possint medicamentis purgantibus, nisi coquantur: immo dum cruda & infixa, medicamentis euacuari tentamur excitantur tormina, & clauduntur viæ per quas excrementa praua ab ipsa natura possent euacuari. Deinde possent medicamenta efficere alia grauiora symptomata, vt refert Galenus multis in locis. Quare pro solutione dicimus, dum succus crudus habet inclinationem ad intestina, vel ad vasa urinaria, quod tunc medicus commode vi possit medicamento, vel diuretico proportionato.

Denum Galenus in comm. declarat quando medicus debeat ducere, quò natura vergit, & quòd reuellere debeat, habet hæc verba „ Oportet Medicum naturæ motum animaduertere, & si idoneus fuerit, ei subministrare: si verò contrarius, diuertere, seu reuellere. Nisi igitur aliquid intelligamus de natura detractionis, quæ est illa, quæ sequitur naturæ motum, & humorum peccantium inclinationem, atque aliquid intelligamus de natura reuulsionis, quæ sequitur motum contrarium ipsi naturæ, & inclinationi humorum, aphorismus certè intelligi non poterit.

## Q V Æ S T. LXXXV.

### De Reuulsionē.

**Q**uantum attinet ad reuulsionem. Et Hippocrate & Galeno de ratione reuulsionis quatuor sunt conditiones. Prima quod fiat per distantissimam. Secunda quod reuulsio fiat per rectitudinem. Tertia quod trahantur humores versus originem. Quarta quod fiat per vasa communia.

Quo



Quoad primam conditionem, quod scilicet reuulsio fiat per distantissima, colligitur ex Galeno multis in locis, sicuti 13. meth. cap. 1. vbi habet hæc verba „ in inflammationibus esse reuellendos humores longissimè à partibus inflammatis. Deinde 2. ad Glauc. 2. habet hæc „ si morbus est in genu sanguis est mittendus ex brachio gratia reuulsioni. Insuper in arte medica cap. 99. ait, reuulsionem esse faciendam per loca maximè distantia.

Nihilominus non credimus, hanc primam conditionem per se, & essentialiter conuenire reuulsioni. Quod confirmatur ratione, & auctoritate Galeni & Hippocratis. Ratione sic probatur: quod non conuenit alicui de omni, non conuenit per se & essentialiter: sed euacuatio per distantissima non conuenit reuulsioni de omni: ergo non conuenit per se, & essentialiter. Maior est clarissima: quia valet hæc: conuenit per se, ergo de omni: de omni: ergo semper & in omnibus: non conuenit de omni: ergo neque per se, neque essentialiter. Minor probatur auctoritate Galeni & Hippocratis: Galeni qui 5. meth. 14. applicat commissuræ coronali ceratum ex taphia, vt reuellat in contrarium humores, qui sunt in capite, & actu fluunt, & sunt fluxuri in pectus.

Deinde confirmatur ex ipso Galeno 2. in 6. epid. comm. 9. vbi inquit, reuellens locale reuellere ad locum proximum.

Similiter confirmatur ab Hippocrate 5. aphor. 68. vbi habetur hæc sententia: selecta vena frontis aufertur dolor occipiti, videlicet per reuulsionem.

Nec valet, dum dicunt, hanc esse reuulsionem localem, & non communem: quia locus non facit, quod res ipsæ inter se specie differant.

Hæc distinctio sanè est vanissima: quia dum Philosophi, vel medici tradunt essentielles distinctiones volunt quod res ipsæ sint natura & specie distinctæ. Postremo confirmatur ex Hippocrate 6. epid. 2. tex. 31. vbi habentur hæc verba „ In oculorum fluxu in fauces reuellere oportet: ergo reuulsio fiet per proxima.

Quoad Galenum qui dixit, reuulsionem fieri per distantissima. Respondemus duo-

bus modis. Primo dixisse reuulsionem fieri per distantissima ratione prohibentis idest ratione partis affectæ, ne scilicet multis excrementis obruatur, non ratione indicantis, idest humoris euacuandi: indicans enim semper indicat per proxima esse reuellendum: ratio est quia indicans semper indicat, vt cito sanetur.

Hinc reuulsio ratione diuersorum interdum fit per proxima: interdum per remota, & interdum per remotissima: per proxima, dum magis potest indicans, quam prohibens: sicuti dum applicatur ceratum ex taphia commissuræ coronali, quod licet lædat aliquo modo ipsum cerebrum, magis tamen potest imminere phthisis, quæ potest fieri à catarrho salso, quam illa læsio pericrani.

Per remota reuelimus dum magis potest prohibens: veluti dum in pleuritide ex brachio eiusdem lateris sanguinem euacuamus.

Per remotissima, dum prohibens maximè potest, veluti dum in pleuritico maxima est sanguinis plenitudo, in quo casu prius sanguinem euacuamus in latere opposito: deinde in eodem latere.

Præterea possumus sustinere, reuulsionem ratione humorum euacuandorum semper fieri per proxima: quamuis pars affecta maximè distet à loco euacuationis: exempli gratia inflammatio est in genu: humores irruentes, qui debent reuelli non sunt in crure, sed in vena cava; & respectu venæ cavae nulla est proximior, quæ tamen sit sectioni commodior, quam vena cubiti. Quare ostendimus nos vbi egimus de reuulsione in meth. vitandorum errorum, non solum reuulsionem, sed omnem medicam operationem per se seu ratione indicantis faciendam esse per proxima: quia de ratione omnium medicarum operationum sunt isti tres scopi, cito, tuto, & iucundè.

Quoad secundam conditionem, quod scilicet reuulsio fiat secundum rectitudinem, omnes admittunt, hanc conditionem per se, & essentialiter conuenire reuulsioni: sed per rectitudinem, vt interpretatur Galenus 3. de fracturis comm. 10. intelligimus de regione: quæ conditio non est solum parti-



bus superioribus, & inferioribus conuenit, sed etiam dextris, & sinistris, anterioribus & posterioribus, interioribus, & exterioribus ut docet Galenus 4. meth. 6. quod non intellexerūt Fernelius, Curtius, & Petrus Brisorus.

Quoad tertiam conditionem, quæ est, quod in reuulsione trahantur humores ad originem, quæ proposita est à Galeno 1. ad Glauco. cap. 14. non est essentialis. Primo probatur ex Hippocrate 5. aphorismorum 68. ubi dicit „secta vena frontis auferri laborem posterioris partis ipsius capitis, humores reuellendo in contrarium. Nemo certe assueuerabit, frõtem esse fluxionis originem.

Deinde Hippocrates 6. epid. 2. rex. 31. inquit in oculorum fluxione reuellimus in fauces: fauces tamen nõ sunt fluxionis origo. Similiter in iecoris inflammatione secamus cubitum, & secando sanguinem reuellimus: tamen cubitus non est fluxionis origo: quare hæc conditio non conuenit per se reuulsioni, quamuis sæpissimè in ipsa reuulsione obseruetur.

Quo ad quartam conditionem, an reuulsio fieri debeat per vasa communia: hæc sine dubio est essentialis: quia nisi essent communia, nihil euacuaretur.

Sed notandum est per vasa communia nos non intelligere solum venas: sed artenas, ventriculum, renes, vesicam, vterum, spatia inter vasa, carnes & alias partes.

Præterea adfunt multa vasa latentia, nobisque ignota, per quæ excrementa, licet crassa sint fluunt, & resuunt in corpore viuente. Quod confirmat Galenus 7. aphorismorum 54. his verbis „Hippocrates opinatur naturam validam semper inuenire viam materiæbus maximè crassis, & per angustissima foramina illas permeare, qui materiæ seu excrementorum transitus sit per transumptionem, de qua fusè Galenus non solum loco citato: sed etiam in comm. 35. septimæ sec. Parimodo 5. meth. 8. & 6. de loc. aff. cap. 4.

Colligimus ergo duas ex dictis conditionibus conuenire per se reuulsioni: quarum prima est, qd fiat reuulsio per vasa communia: secunda qd fiat secundum rectitudinem: alias duas scilicet per distantissima:

& quod ad originem trahendi sint mores, non per se conuenire reuulsioni: ex accidenti, nimirum ratione prohibet non tamen semper, & per se.

## Q V Æ S T. LXXXVI.

*An reuulsio, indicetur non solum à materia fluente sed à fluxa, & fluxura.*

**Q**uantum attinet ad illam difficultatem, an scilicet reuulsio solum indicetur à materia, quæ est in motu, vel à materia quoque fluxa, & fluxura: questio est, difficilissima. Communis opinio est, quod solum indicetur à materia, quæ est in motu.

Credimus nos moti ratione, & auctoritate, reuulsionem non solum desumi à materia, quæ est in motu, sed etiam à fluxa, & fluxura. Primò patet, quod desumi possit non solum ab humoribus actu fluentibus, sed à fluxis, & fluxuris, quatenus apti sunt in contrarium moueri. sicque argumentamur: Medici, & artifices omnes scientiis querunt quod est possibile, & non solum quod actu est: sed sic est quod non solum est possibile, ut fluentes humores in contrarium moveantur, sed etiam fluxi, & fluxuri: ergo. Maior probatur auctoritate Galeni lib. de morb. differentiis cap. 1. ubi docet ipsam sanitatem non esse definiendam per operationem actualem, sed per potentiam ad operandum: Galenus ibi habet hanc sententiam „dormiens non videt, tamen non dicitur cæcus: quia licet careat actu videndi, tamen non caret potentia: ideo definitiones sumuntur à potentijs, & non ab actuali operatione. Parimodo hominibus dicitur rationalis, quia habet potentiam ratiocinandi, non quia actu ratiocinetur: phrenetici enim sunt rationales, licet actu non ratiocinentur: sic risibilis dicitur quia potest ridere, quamuis rideat nunquam.

Definientes igitur nos reuulsionem dicimus, esse auersionem humorum, qui possunt trahi in contrarium: sed sic est quod tales, non solum sunt fluentes: sed interdum fluxi & fluxuri. Minor propositio, quod scilicet humores fluxi possint reuelli præcipuè quando sunt in capillaribus, quia quia



quia si essent in spacijs non reuellerentur :  
 à spacijs enim ad capillares venas non da-  
 tur transitus .

Pater ex Hippocrate & Galeno 4. de ra-  
 tione vict. 30. vbi habet hæc verba „ me-  
 dicamenta circumposita ceruici in angina  
 reuellent humorem, qui in partem ante-  
 riorem fluxit : Ecce, quod reuulsio humo-  
 ribus fluxis potest conuenire .

Quod verò reuulsio possit quoque con-  
 uenire humoribus fluxuris, pater ex Gale-  
 no 5. meth. 14. qui applicat ceratum ex  
 rapia commissuræ coronali gratia reuul-  
 sionis, ne scilicet catarrhus quiescens in ca-  
 pite moueatur, & ad pectus descendat : sed  
 inde reuellatur .

Demum probatur argumento desum-  
 pto à natura motuum oppositorum, reuul-  
 sionem posse conuenire humoribus quie-  
 scentibus, hoc modo : non ne dum sit re-  
 uulsio trahimus humorem in contrarium ?  
 at sic est, quod inter duos motus oppositos  
 semper mediat quies : ergo reuulsio conue-  
 nire poterit humoribus quiescentibus,  
 dum scilicet humores, qui sunt in motu,  
 trahuntur in contrarium .

### Q V Æ S T. LXXXVII.

*In quibus reuulsio, & deriuatio conueniant  
 & differant.*

**P**ostremò videndum est, in quibus re-  
 uulsio, & deriuatio conueniant, & in  
 quibus differant inter se .

Primò conuenit reuulsio cum deriuatio-  
 ne : quia vtraque est auersio .

Secundò conuenit, quia causa efficiens  
 reuulsionis, & deriuationis est æquiuoca :  
 modo enim fit deriuatio & reuulsio à fa-  
 cultate attrahente : modo à facultate expel-  
 lente, & modo ob vtraque .

Tertio conuenit, quia vtraque fit per va-  
 sa communia & secundum rectitudinem .

Quartò conuenit, quia non solum hu-  
 mores fluxi, sed etiam fluentes, & fluxuri  
 apti sunt vt reuellantur, & deriuentur .

Quod verò deriuatio conueniat fluxis,  
 omnes concedunt .

Quod possit conuenire fluxuris pater :  
 dum enim supprimuntur menses, si volue-

ris deriuare per venam tali promptè fluent  
 menses, qui antea erant fluxuri .

Quod verò conueniat fluentibus pa-  
 ter, quia dum diminutè fluent menses, si  
 vena tali secabitur promptius fluent : Ecce  
 igitur quod reuulsio, & deriuatio respi-  
 ciunt humores fluxos, fluentes, & fluxuros .

Differt reuulsio à deriuatione : quia re-  
 uulsio vt plurimum fit per distantissima :  
 deriuatio verò vt plurimum per proxima :  
 dicimus vt plurimum per proxima, quia  
 interdum deriuatio fit magis per longin-  
 qua, quam reuulsio. Pro hac opinione apud  
 Galenum inuenimus 100. exempla : Etenim  
 2. ad Glau. cap. 2. dicit, cucurbitulam ap-  
 plicatam mammis ab vtero reuellere, at-  
 que venam tali ab vtero deriuare : cui du-  
 bium, quod vena tali ab vtero magis distat,  
 quam mammillæ .

Differt reuulsio à deriuatione : quia re-  
 uulsio magis conuenit fluentibus, quam  
 fluxis, & fluxuris humoribus .

Deriuatio verò magis fluxis .

Differt quia deriuatio sequitur motum,  
 & humorum inclinationem : reuulsio verò  
 contrarium .

Differt quoque, quia reuulsio vt pluri-  
 mum trahit humores ad originem fluxio-  
 nis, deriuatio verò longè ab origine ab-  
 ducit .

### A P H O R I S M V S XXII.

**C**oncocta medicari, atque mo-  
 uere, non cruda neque in  
 principijs, modo non tur-  
 geant : plurima verò non surgent .

In superiori aphorismo egit de duobus  
 locis inseruientibus pro inueniendo medi-  
 camento, alter erat desumptus ab humo-  
 rum inclinatione : alter verò à locis conse-  
 rentibus . Cognito medicamento . In hoc  
 aphorismo agit de tempore exhibendi me-  
 dicamentum .

Hic aphorismus, licet in aliquibus codi-  
 cibus non inueniatur : Galenus tamen &

Hh hoc



hoc comm. & 4. de sanitate tuenda tener non solum esse Hippocratis, sed in arte medica esse tamquam oraculum.

¶ Diuiditur hic aphorismus in duas partes. In prima ponit hanc conclusionem: concocta esse medicanda, & mouenda: sed non in principio morbi.

¶ In secunda parte excipit materiam crudam, nisi turgat dicēs, quod raro accidat, supple, quod ita turgat, vt per medicamenta possint purgari: quia sæpissimè dantur materię turgentes: sed tamen raro accidit, quod possint expurgari, id est, quod habeant inclinationem ad intestina: quas, vt dicit Galenus 4. de ratione vic. in ac. 64. turgentes humores sunt purgandi, si circa ventrem murmurauerint: secus purgandi non sunt, quamuis in morbis peracutis sæpè turgant. Vnam in peracutis raro turgent: modò enim turgentes humores ex Galeno loco proximè citato efficiūt tumores circa fauces, modò circa pedes & crura, modò erumpunt in cutem & faciunt petiolas tuberculosas: quo casu certè turgentes humores purgandi non sunt per alium, cum ad intestina nullam habeant inclinationem.

¶ Quo ad verba: dicit (*concocta*) græca dictio est *πύρα*: deinde dicit (non cruda) id est *μη σπυρα*: nisi igitur confugiamus ad Aristotelem 4. lib. Meteor. cap. de coctione, vbi distinctè de coctione & cruditate loquitur, hic aphorismus nullo modo intelligi potest.

## QVÆST. LXXXVIII.

### De speciebus coctionis.

**A**ristoteles 4. Meteororum commēto de coctione definit coctionem in cōmuni hoc modo: coctio est perfectio à proprio, & naturali calido ex oppositis passivis. Deinde diuidit coctionem in tres species, id est in elixationem, maturationem, & assationem. Notandum ex Aristotele, quod hæc tria nomina, elixatio, maturatio, & assatio non explicant proprias, & vltimas differentias trium coctionum, quæ sunt in animalibus, sed solum per metaphoram illas declarat.

Patet de elixatione: quia elixatio propriè conuenit arte elixatis, solumque per translationem (vt ait Aristoteles) conuenit coctioni ventriculi: addimusque coctionem hepatis, & partium, quæ multa affluunt humiditate, licet sint innominatæ, assimilari elixationi.

Idem Philosophus de maturatione, quæ propriè conuenit fructibus: per translationem verò tuberculis, puri & pituitæ: itaut maturatio naturalis sit innominata: atque maturatio apostematis, & peccantium humorum nomine careant.

Idem docet de assatione, quæ similiter propriè conuenit arte assatis: assatio verò naturalis est innominata.

Videns igitur Aristoteles non esse adhuc inuenta nomina propria trium coctionum naturalium, illas descripsit per causas efficientes hoc modo: coctio, quæ est similis elixationi, est perfectio, quæ fit à calido & humido externo: atque hæc ex Aristotele conuenit coctioni ventriculi.

Hæc coctio, quæ est similis elixationi, ex Aristotele loco citato habet excessum & defectum: excessus caret nomine: defectus verò est *μόλυνσις* à Teophrasto vocatur inquinatio: sed reuera molinosis est cruditas (sicuti illa, quæ fit in ventriculi coctione) quæ nomine latino caret: sique ob defectum caliditatis, vel humiditatis externæ: dicimus externæ, quia caliditas interna est illa natia, & implantata, quæ non deficit vsque ad obitum, quæ est essentialis temperatura, & est veluti forma in ventriculo vel in quauis alia parte: caliditas verò quæ deficit est influens, quæ respectu calidi implantati dicitur externa.

Concoctio vero, quæ est maturatio, quæ conuenit propriè maturationi fructuum, per similitudinem verò maturationi tuberculorum & humorum, est perfectio, quæ fit à calido interno, adiuuante tamen calore externo. Hæc quoque concoctio, quæ dicitur maturatio habet suum defectum & excessum. Defectus dicitur omoris, qui fit ob defectum caliditatis internæ, vel externæ: atque hæc cruditas (vt dicit Aristoteles) obseruatur in natura & in arte. In natura obseruatur in vrinis, egestionibus, destillationibus, In tuberculis in pure, & in hu-



humoribus. Hinc cruditas vrinæ, facum alui & destillationum prouenit à defectu caloris interni, vel externi. Vnde oriuntur omnes catarrhi. Hinc tubercula, & apostemata cruda, pus nō mutatum, & humores pituitosi & crudi proueniūt à calore interno & externo diminuto: per exter- num intelligimus influentem, qui est exter- nus respectu naturalis implantati. In arte, ut in vasis fictilibus, dum ignis defectu manent cruda: excessus verò est innominatus.

Cocctio verò quæ est similis assationi est perfectio, quæ fit à calido & secco externo: hæc cocctio parimodo habet suū excessum, & defectum: excessus est rostitio: defectus caret nomine, & dicitur non assatio: nul- lum enim habet nomen.

Quarunt hic Philosophi & Medici, quænam sit assatio naturalis. Nonnulli dicunt, ut Picco homineus, ructus nidorosos fieri per assationem naturalem: sed quia ructus isti sunt præter naturam, non mihi eius sententia probatur.

Quatinus enim nos, quid sit assatio naturalis. Plurimi dicunt, cocctionem factā in partibus siccis, ut in ossibus, & cartilagini- bus esse assationem naturalem: quia à cali- do, & secco externo fit: rectè quidem: quia cocctio in ossibus non est elixatio: ossa enim sunt siccā: neque est maturatio: quia finis maturationis est mollior: ergo ex suffi- cienti partium enumeratione erit assatio.

Quantum attinet ad elixationē ex Ari- stotele 4. Meteororum, cocctio facta in ven- triculo est similis elixationi: rectè quidem: quia sicuti in elixatione hæc tria requirun- tur, olla, caro, & humiditas externa: sic in cocctione ventriculi, ventriculus est sicuti olla ex Geleno 3. de facul. nat. deinde est cibus, qui est sicuti caro, quæ coquitur in olla, & humiditas ipsius ventriculi, quæ respectu cibi est externa, & in ipsa, caro co- quitur.

Idem dici potest de cocctione, quæ fit in hepate: hepar est olla, chylus est ut caro, san- guis hepatis est humiditas externa, in qua fit elixatio. Idem dicimus de qualibet par- te humida, quod cocctio in ipsa fit, sicuti est elixatio.

Differentia verò inter cocctionem natu- ralem & artificialem est, quia in artificiali

olla non assimilatur: ventriculus vero & aliæ partes assimilant: ideo elixatio per simili- tudinem conuenit cocctioni ventriculi, ho- patis, & aliarum partium humidarum.

Hinc Valesius in comm. suo supra quar- tum Meteororū dum reprehendit Aristotelem dicentem, cocctionem ventriculi esse similem elixationi, incidit in plurimos errores, ut infra. Ratio Valesij est, quia in- quit in ventriculi cocctione deficere exten- sam humiditatem.

Primò errat Valesius: quia humiditas interna ventriculi respectu cibi est externa. Similiter interna humiditas hepatis respec- tu chyli est externa: idem dici potest de qualibet alia parte humida.

Secundò errat, quia similitudo non est identitas.

Tertiò errat, quia ex Aristotele, & omniū Philosophorum consensu tres sunt species cocctionis: ideo valet dicere, quod cocctio ventriculi, vel sit similis elixationi, vel assa- tioni, vel maturationi: non assationi: quia assatio fit à secco: non maturationi, quia hæc ex Aristotele conuenit fructibus, & tuber- culis: ergo erit similis elixationi.

Quarta species cocctionis non datur: si n- daretur, daretur quartū efficiens, quod re- uera dari non potest: quia cocctio naturalis semper fit à calido: calidum verò solum tri- bus modis naturaliter variare potest: nem- pe vel quia fiat à calido externo: vel à ca- lido interno adiuuante externo, vel fit à ca- lido & secco externo: quare tres solum erūt species cocctionis.

Hinc valde hallucinatus est Capiuaceus dum in explicatione huius aphorismi enu- merat quatuor species cocctionis, dicens, duas species fieri à natura, & duas ab arte: duas à natura, ait esse cocctionem, & ma- turationem: duas ab arte, elixationem, & assationem.

Capiuaceus tria ni fallor committit er- rata. Primum quia sumit nomen generis loco speciei, dicendo, cocctionem esse spe- ciem diuersam, cum sit genus, quod sub se habet solum tres species, nempe elixationem, maturationem, & assationem: triangulus sub se habet tres species, nempe Isoschielem, equilaterum, & scalenum: ipse verò trian- gulus non est species, sed genus.



Secundum erratum est, dum dicit, quatuor esse coctiones, cum Aristoteles ponat solum tres.

Tertium dum dicit, maturationem conuenire fructibus per metaphoram. cū Aristoteles totum oppositum dicat. maturationem scilicet propriè conuenire fructibus: per metaphorā tuberculis, puri, & pituita.

**H**is declaratis facilè est videre quid intelligat Hippocrates per *πέποινα*, & quid per *μη ώμα*. Dicimus per *πέποινα* intelligere matura, & non concocta. Primo, quia Aristoteles inquit, quod coctio, quæ conuenit humoribus, & tuberculis sit maturatio, & non elixatio, vel assatio: itaut *πέποινα* non deriuetur à verbo *πέπω* idest concoquo, sed à verbo *πέποινα* idest maturo.

Secundo per *pepona* intelligit illam coctionem, cuius defectus est illa cruditas, quæ dicitur omotis, idest immatura: sed sic est, quod coctio, cuius defectus dicitur *αμάτης* est maturatio: ergo per *pepona* intelligit matura, & non concocta. Maior est, Hippocratis in tex. dum dicit *μη ώμα*. Minor est Aristotelis 4. Meteorum citato, vbi dicit, quod maturatio est illa coctio, cuius defectus dicitur omotis.

Tertio si per *pepona* intellexisset concocta in genere, aphorismus esset falsus: quia cōcocta vt cōcocta non purgatur: elixata certè, & assata non indigent purgatione. Similiter chylus perfectus, qui pertinet ad illam concoctionem, quæ dicitur elixatio, non indiget pharmaco.

Quarto si per *πέποινα* intellexisset concocta non dixisset *μη ώμα*, sed dixisset *μη ώμας*, quia *απεψία* est defectus coctionis, vt coctio est.

Quinto si per *pepona* intellexisset elixationem, quæ est similis coctioni ventriculi non dixisset *μη ώμα*, sed *μη μεμώσμενα*.

Sexto, *πέποινα* significat molle, quod est terminus, & finis maturationis: & non coctionis: sic tubercula, & apostemata, dum sunt matua fiunt mollia: Similiter fructus, dum sunt maturi, fiunt molles: similiter dum excrementa purganda sunt fluida sunt matura: hæc non possunt dici de concoctis per elixationem, & assationem,

quoniam hæc quantò magis sunt concocta, tantò magis crassescunt, & durescunt.

Insuper sciendum, *pepon* significare vltimum terminum coctionis, quia nomina adiectiua desinentia in *ος*, significant rem in habitu, & in esse suo perfectò: quare *pepona* significat res exactè coctas, quod accidere solet in fine status, & in principio declinationis, quando scilicet natura incipit separare, & mouere humores ad intestina: dum enim materia est perfectè cocta morbus est in statu, vt docet Galenus 3. de crisib. cap. 5. dum verò post coctionem natura separat, & euacuat cocta incipit esse in principio declinationis, vel in fine status, quo tempore dandum est pharmacum elictiuum, & non ante.

Quod verò *πέποινα* apud Galenum sumatur pro maturis patet ex lib. 8. de simp. medicina cap. de cucumere, vbi habet hæc verba *σίκυες ή πέποινα ή μη πέποινα* idest cucumeres vel maturi, vel non maturi. Ecce quod *πέποινα* est nomen æquiuocum & quod mirificè declaratum est ab Hippocrate per *μη ώμα* significando matura, non concocta: quasi dicat Hippocrates aduertat, quod *πέποινα* potest pendere à verbo *πέπω* & à verbo *πέποινα*, sed vt de medio auferatur æquiuocatio seu ambiguitas apposui illam dictionem *μη ώμα* idest non cruda, quæ cruditas est defectus (vt dictum est ex Aristotele) maturationis, & non coctionis.

Notandum quod licet idioma Græcum incredibili nominum varietate abundet, tamen interdum destituitur verbis vniuocis declarantibus propria significata: vnde Cicero 2. Tusc. quæst. reprehendit linguam Græcam, quæ solet verbis abundare, nihilominus ait in aliquibus deficere, citatque dictionem *ώμας*, quæ Græci multa significant: sic nos citare possumus hanc dictionem *πέποινα*, quæ potest significare & concocta, & matura: in hoc aphorismo tamen significat matura: quia solum maturatio est illa, cuius defectus est omotis, vt dictum est.

Notandum tamen de maturatione, quod maturatio triplex sit.

Prima est, dum sanguis conuertitur in pus, quæ conuersio ab Aristotele vocatur



maturatio, vt dictum eft.

Secunda maturatio eft, dum humor fit femiputridus: poteft tamen ad pristinam bonitatem reuerti: hic humor non eft ille, qui pharmaco debet euacuari: quia dum redactum eft ad priftinum ftatum, poteft quoque nutrire: eftque ficut docet Galenus 1. meth. quemadmodum vinum aefcens, nempe antequam aefcat, quod poteft reduci ad priftinam bonitatem.

Tertia maturatio eft humoris in putrefacto effe, qui eft omnino putridus.

Humor verò putridus a requam pharmaco euacuetur duobus modis præparari poteft: prima præparatio fit aperiendo meatus, per quos poffit fluere, & per pharmacum educi: quam præparationem tangunt Hippocrates & Galenus 2. aphorif. 9.

Secunda præparatio eft, vt amittat acrimoniam, & feruorem antequam purgetur, ne lædat partes, per quas tranfit: de hac præparatione locutus eft Galenus 2. de ratione vic. in ac. 45. Hippocrates verò in hoc aphorifmo folum intelligit de hac tercia maturacione.

Cruda verò quæ funt oppofita huic maturacioni non funt purganda: imino ex Hippocrate & Galeno 4. de ratione vic. 44. fi purgarentur frangerentur vires: impediretur concoctio, & morbus diuturnior fieret: Hinc Hippocrates in tex. ibidẽ dicit, medicamenta purgantia in principio cruda effiſſente materia non admouebis, ſecus vrina non maturabitur: ſubdit, ſedẽ citra iudicationem in longũ protrahi.

» *φάρμακον* id eft purgare medicamento electiuẽ ſolvente: ſicuti inter pharmaca bilem electiuẽ purgantia funt rhabarbarum, ſcamonium, folia, & flores arboris perſice, ſemina piluli, &c.

Inter purgantia pituitam funt agaricus, hermodactilus, turbit, colocintis, pepulus, gratiola, ſemina cartami, flores cartami, catapucia, &c.

Inter melancholiam purgantia funt eleborum nigrum, & album, epithymum polipodium, ſemina cartami & ſena.

Inter purgantia ſeroſos humores funt elaterium, guma gutte, flores ſambuci, mecochan, ſalappa, ſuccus Ireos non clarificatus. Hæc funt præcipua pharmaca electi-

uẽ ſoluentia ad differentiam lenientium, cuiusmodi funt caſſia, tamarindi, mana, & alia id genus.

Alia plura & purgantia & lenientia ad vſum noſtrum accommodata inuenietis in Giorgij melichij antidotaſio nuper edito, addita ab Alberto ſtechino ad ſignum ſtucij, qui in hoc ſuo obeundo officio in hac ampliffima ciuitate eft adeo clarus, vt inter tot peritiſſimos pharmacopolas nemini ſecundus reputetur.

» *Et mouere non cruda*. Quidam dicunt, Hippocratem per verbum mouere intelligere de minoratiuis; leguntque hoc modo aphoriſmum, Concocta medicari, & faciunt punctum: deinde dicunt & mouere non cruda, intelligendo per non cruda quæ partim funt cocta, & partim cruda, itaut hic ſenſus aphoriſmi: purganda ſunt atque eradicanda quæ ex toto ſunt cocta: quæ verò ſunt non cruda, id eſt partim cocta, & partim cruda ſunt minoranda: addunt quæ verò ſunt omnino cruda, neque purganda, neque minoranda, niſi turgeant.

Dicunt hanc expoſitionem colligi ex Galeno 4. de ratione vic. 8. vbi citat hunc aphoriſmum.

Primo reiſciuntur: quia Galenus loco citato nihil dicit de hac re: imino neque ſomniauit ſic exponere aphoriſmum.

Deinde ſi materia partim cocta, & partim cruda eſſet minoranda, pharmacum minoratiuum eſſet dandum in augmento morbi, & non in principio, quod reſtatur Hippocrati 2. aphorif. 29. vbi vult, quod inchoantibus morbis potius ſit mouendum, quam in augmento.

Ratio deſumitur ab ipſomet Galeno 2. de humoribus comm. 13. vbi dicit non eſſe dandum medicamentum, quando natura eſt occupata: ſed ſic eſt quod in augmento eſt occupatiſſima: ideo Galenus 2. de humoribus comm. 21. dicit iudicationem præuenire malum: quare exhibendo medicamentum in augmento eſt præuenire iudicationem, quod non eſt faciendam.

Tertio falluntur iſti: quia Galenus in hoc comm. vult per mouere Hippocratem intel ligere euacuationẽ per ſudorẽ & per vrinam: ergo nõ intellexit de minoratiuis.

Præ-

Præterea dum Hippocrates 2. aphorif. 29. dicit „ ſi quid tibi videtur mouendum, moue in principio, Galenus in côm. per mouere præcipue intelligit miſſionem ſanguinis : dicimus præcipue : quia dum dicit, ſi quid tibi videtur &c. dictio mouere poteſt ampliari ad alias euacuationes, quæ in principio fieri poſſunt, & non in augmento : in quo ſolum quies deſideratur.

## Q V Æ S T. LXXXIX.

*Quid intelligat per non cruda.*

**N**onnulli alij ſic legunt „ concocta medicari, & mouere. Et faciunt punctum : deinde legunt „ non autem cruda : vt hic ſit ſenſus, cruda neque medicanda, neque mouenda.

Illi non poſſent omninò improbari, niſi admitteret in Hippocrate vanam eiſdem ſententiæ repetitionem : tatis enim fuiſſet, ſi dixiſſet, concocta eſſe medicanda : quia cruda reuera neque ſunt purganda, neque mouenda.

Hinc Galenus 4. de tuenda ſani. cap. 5. & 6. dicit „ quando corpora abundant crudis humoribus, abſtinendum eſſe ab euacuatione effatu digna : ab omni motu violento, à balneo, exercitio, cucurbitulis, frictionibus, & ab ijs quæ habent vim trahendi humores ad cutem : vultque omnimodam quietem eſſe obſeruandam : quia per quietem fit coctio, vt docet Hippocrates 4. de ratione vic. 44. & Ariſtoteles 4. Meteororum.

Similiter Galenus 1. de humoribus côm. 2. vult, ineptos eſſe ad purgationem, qui habent hypocondria ſtatibus diſtenta.

Valeant igitur, qui corpore exiſtente pleno crudis humoribus in ipſo morbi principio vruntur pharmaco electiue ſolvente, frictionibus, cucurbitulis, inunctionibus, balneis, ſudorem excitantibus : humores enim agitantur, atque agitati ſunt coctioni magis rebelles. Idem confirmatur ex Hippocrate & Galeno 4. de ratione vic. 44.

Parimodo ægros lædunt, dum in princi-

pio putridæ febris blandis lenientibus permisceant eſtuaria ſcamoneata, cuiusmodi ſunt diaphinicon, electuarium de ſucco roſarum, confeſ. hamech, electuarium eleoſcof. & alia id genus.

Cauſa verò, cur in principio febris non conueniant pharmaca, quatuor ſunt : prima quia cruda non admittunt purgationem.

Secunda cauſa eſt, quia in principio morbi humores ſunt firmati, vt per pharmaca dimoueri non poſſint : Galenus enim 2. de humoribus 15. dicit excrementa ex toto incocta ſtabilia, & infixæ eſſe.

Præterea 4. de ratione vic. 76. docet, dum humores ſunt firmati, expectandam eſſe coctionem.

Tertio, quia ex Hippocrate 4. de ratione vic. 44. coctio quiete fit.

Quarta eſt, quia omnia pharmaca calida ſunt : vnde augent calorem febrilem : quare ſolum danda ſunt, quando præparatis humoribus, ceſſat calor.

Montanus interpretatur illam dictionem *non cruda*, dicendo quod ſit nomen infinitum, ſicuti eſt non homo : per non homo omnia intelliguntur præter hominem : paries quoque eſt non homo : ſic dicit Montanus per mouere non cruda eſſe mouenda omnia præter cruda.

Hæc Montani expoſitio à multis laudatur, eſſetque admittenda, ſi inter coctum & crudum eſſent multa media, vel ſaltem vnicum : ſed tantum abeſt, quod ſint multa media, vt omnis humor non crudus ſit coctus, & omnis coctus humor ſit non crudus : quare crudum & coctum ſunt oppoſita priuatiua, habent tamen vim cōtradiſtoriam : valer enim hæc conſequentia, eſt humor non crudus, ergo eſt coctus : nomen infinitum dicitur, quod præter illud, infinita conj. rehenduntur.

Præterea expoſitio eſt inepta : quia admittit vanam eiſdem ſententiæ repetitionem : idem enim eſt coctum & non crudum.

Denum eſt falſum, quod non cruda ſint purganda : inter non cruda collocantur ſanguis perfectè coctus, optimus chylus, quæ certè non ſunt purganda, vel mouenda.

Nonnulli alij dicunt, Hippocratem bis  
Re-



repetere hanc sententiam dicendo, concocta medicari, & mouere, & non medicari, & mouere cruda: quia quæ sunt magni momenti bis repetita placent.

Hæc expositio est omnium vanissima quia hac ratione singula Hippocratis verba essent repetenda: singula enim sunt misteriosa, & magni momenti: quare non est dicendum, Hippocratem committere hanc vanissimam ratiologiam: quia idem est dicere concocta, & non cruda.

Præterea laconismus Hippocratis, grauitas, & aphoristica doctrina non admittunt eiusdem sententiæ repetitionem.

Zechius, & nonnulli alij arbitrati sunt, Hippocratem per cruda intelligere illa, quæ possunt conuerti in substantiam, & de his intelligendo dicunt non esse mouenda.

Sed valde falluntur: quia cruditas quæ potest conuerti in substantiam, dicitur molinsis, & non omotis, vt dictum est superius. Quare si per non cruda intellexisset illa quæ possunt conuerti in substantiam Hippocrates dixisset *μη μεμώδυσμένα* & non *μη ωμα*.

Dicimus igitur Nos, Hippocratem dixisse non cruda idest *μη ωμα* vt tolleretur ambiguitatem, & æquiocationem, quæ continebatur in illa dictione *πέποινα* quæ potest significare cocta, & matura, quia potest provenire, vt dictum est à *πέποινα*, & à *πεποινα*: ideo dixit *μη ωμα* vt indicaret se intelligere de maturacione: quia omotis est cruditas maturacionis. Propterea putamus nos in aphorismo Latino dictionem non cruda esse superfluum: quia habemus nomen distinctum, in quo nulla continetur æquiocatio, dicendo matura: ita ut aphorismus sit hoc modo legendus, „ matura medicari, & mouere delendo dictionem non cruda tamquam superfluum.

Insuper omnes errant, qui interpretati sunt per *μη ωμα* non cruda, quia oportebat interpretari non matura, cum omnino sit defectus maturacionis, & non coctionis.

**N**æque in principijs Galenus 1. de crifib. c.9. inquit principium morbi sumi tripliciter. Primo sumitur pro primo insultu. Secundo pro primis duobus vel tribus diebus. Tercio pro toto illo tempore, in quo nul-

lum coctionis vestigium in vrina apparet. Hippocrates per principium intelligit hunc tertium modum, in quo nullum coctionis signum apparet: quasi diceret Hippocrates non solum esse purgandum, vel mouendum, in augmento, sed neque in principio.

Prima dubitatio occurrit, quia oppositum videtur dicere Hippocrates 2. sec. aphorismorum 29. vbi habetur „ inchoantibus morbis, si quid tibi videtur mouendum moue: ergo in principio licebit dare medicamentum.

Respondemus in aphorismo citato non intelligere de medicamento purgante: sed de venæ sec. & de blandis lenientibus. Præterea non est purgandum in principio, nisi casu, quo materia turgat, vt docet in hoc aphorismo Hippocrates.

Causa verò cur in statu morbi conueniatur pharmaca est: quia in statu materia est concocta, & concocta sunt medicanda pharmaco electiue soluente.

*Nisi turgant, raro autem turgent*, Per turgere Galenus vult, Hippocratem: intelligere humores, qui non sunt firmati, qui vagentur modo huc, modo illuc.

Quod verbum turgere, vt ait Galenus in comm. est desumptum ab animalibus habentibus maximum pruritum ad coitum, quæ animalia huc & illuc mouentur, loco stare nequeunt, & quarunt modum, quo egrediatur humor, qui protitat sic (ait) humores turgent huc & illuc mouentur, loco stare nequeunt, & exitum quarunt: ideo illic sunt purgandi, ne perant partem principem, & ægrum interrimant, vt dicit Galenus 4. aphorismorum 10. vbi legitur hic Hippocratis aphorismus „ medicamentum in morbis acutis eadem die dandum, si materia turgat, nam tardare in istis noxium est.

Similiter Galenus 4. de ratione vie 76. dicit in principio purgandos esse humores, si in aliqua parte corporis non sint firmati: quia quando sunt firmati, oportet expectare coctionem.

*Raro autem turgat*. Nos non interpretamur, quod humores raro turgent: quia in morbis peracutis humores sapissime turgent: sed raro ita turgent, vt per pharmaca possint purgari: sic in Critone, qui mor-

morbo peracuto moritur in tertia, humores erant maximè turgentibus: sed ad pedes, & non ad intestina tendebant: dicit igitur Hippocrates, cum pesillos humores capere non poterat, retrocesserunt ad caput, unde mors Critonis secuta est: in quo casu Hippocrates non dedit, nec dedisset pharmacum.

Similiter Latissa caluus moritur in quarta cum turgentibus humoribus ad femur irruentibus, qui humores turgentibus ab Hippocrate pharmaco non fuerunt expurgati, & merito: quoniam illi solum expurgari possunt, qui habent aliquem impetum ad hepatis concavum, ad mesenterium, vel intestina, sicut colligitur ex ipso Galeno 4. de ratione vic. comm. 64. ubi loquens de turgentibus admonet esse purgandos, si circa ventrem muturauerint. Hinc si materia turgens movetur ad caput, ut in Vxore Dromedæ, quæ moritur in sexta, pharmacum certè iuvare non potest, nisi tamen habeat aliquam inclinationem ad ventrem.

Parimodo, si humores turgentibus moveantur ad crura, ut in Horofonte, usus pharmaci Horophonti nocuisset; quia à cruribus fuisset factus retrocessus ad viscera superiora, & inde perisset: sicut contingit Critoni, & alijs ægrotantibus.

Ideo credimus nos non esse dandum medicamentum purgans in turgente materia, nisi aliquam habeat inclinationem ad ipsa intestina. Quare per rarò turgere intelligimus, quod rarò turgant, ut per pharmacum humores possint euacuari. Hæc doctrina consentit aphorismo superiori, ubi vult duo esse observanda in usu medicamenti, nempe inclinationem humoris, peccantis, & loca conferentia: quare si turgentibus humores non habent inclinationem ad venam portam, ad mesenterium vel intestina, pharmaca nullo modo essent exhibenda, si verus est aphorismus declaratus, cui natura vergit, &c.

Pro intelligentia aphorismi tria antequam questionem de minoratiis agrediamur sunt intelligenda: primum cur in principio morbi, dum turget materia, sit purgandum. Secundum an de ratione materiæ turgentis sit tenuitas, ita ut humores crassi nunquam

turgant. Tertium an materia tenuis sit increffanda.

Quo ad primum, cur scilicet in principio, cum materia turget sit purgandum? Prima causa est, quia impendit periculum, ne humores petant partem principem, & intermiant.

Secunda quia Hippocrates 4. aphorismorum 11. dicit „ medicandum esse in valde acutis, si materia in inter ad excretionem eadem die: nam tardare in his malum est materia verò dum turget inuitat ad dandum pharmacum, dum habet inclinationem ad intestina.

Tertia quia Galenus in comm. vult, esse euacuandum eadem die, antequam virium robur dissoluatur.

Quarta causa desumitur à Galeno 5. meth. 15. ubi admonet, quando periculum est in mora, non à leuioribus sed ab extremis esse exordendam curationem.

Quo ad secundum: an scilicet de ratione turgentis materiæ sit tenuitas. Moderni dicunt, materiam turgentem interdum esse posse crassam: sicut in febribus pestilentibus, propter quas fiunt magnæ adustiones: humores tunc aduruntur, & crassescunt. Confirmant hanc suam opinionem per casum Critonis, in quo materia furiosa erat crassa.

Dicimus nos materiam turgentem crassam esse non posse: quia de ratione materiæ turgentis est, ut in ipsa sit principium motus: sed sic est quod materia crassa non potest esse principium motus: ergo crassa non turgabit.

Præterea materia crassa non potest modò unam partem, modò aliam inuadere: ergo turgens esse non poterit.

Ad rationem Respondemus, in pestilentibus febribus esse posse materiam tenuem, & materiam crassam. In pestilentibus verò febribus & in Critone, materiam turgentem non fuisse portionem crassam, sed tenuem.

## Q V Æ S T. XC.

*An materia tenuis sit increffanda.*

Quo ad questionem, an scilicet materia tenuis sit increffanda. Ex una parte



parte Galenus lib. de conft. artis cap. 19. inquit, fi humores fint craffi, attenuandi, fi tenues, incraffandi. Addit fic faciendo, utrofque pariter concoques.

Deinde Auicennas in cura febrium putridarum in cōmuni vult, materias tenues effe incraffandas.

Postremò Hippocrates lib. de veteri medicina verſus finem ait, „ concoqui, & praparari humores, dum redduntur mitiores: redduntur mitiores, fi calidi à frigidis, & frigidi à calidis alterentur: fi craffi fiant tenues, & tenues craffi. Immo Hippocrates ibidem loquēs de crudis, & tenuibus deſtillationibus (ait) quando deſtillationes erunt ſuperatæ à natura fient craſſæ, & ſine ſalfedine, & ſine acrimonia: Ecce igitur quod tenues humores ſunt incraffandi.

Ex alia parte Galenus 2. aphorif. 9. dicit humores craſſos ſemper effe ita attenuandos, vt fiant fluxiles, atque Hippocrates in aphoriſmo dicit „ corpora cum quis purgare voluerit oportet fluida facere: ergo humores potius erunt attenuandi, quam incraffandi.

Reſpōdemus ad inſtantias, quod humores dupliciter conſiderentur, vel vt ſunt purgandi: hac ratione, nunquam ſunt incraffandi; ſed ſemper attenuandi. Vel conſiderantur humores, vt ſunt alterandi, nempe ſi ſint tenues incraffandi, non vt purgentur, ſed ne ad penitiores partes excurrant, ad viſcera videlicet ad pulmonem, cuiuſinodi eſt catarrhus ſaluſ, qui, vt tenuis eſt incraffandus. Similiter ſanguis tenuis, qui efficit hæmorrhagiam eſt incraffandus: ſic in diarrhæa, ne bilis exeat in teſtina, eſt incraffanda, videlicet tragacantho, troſciſcis de caſabe gummi arabica, amylo, polycr. 2, ſyrup. de papauere, requie Nicolai, magna triſphæra, pillulis de cynogloſa, diacodio in rotulis, vel liquido: hæc varia ſunt, prout materia tenues vario modo, & varijs in locis corpora labefaciunt: ſi verò bilis in diarrhæa exeat, inter cætera iuſculum pedum vituli, amyli, & tragacanthum impediunt ne fiat dyſenteria: quare propoſita diſtinctione omnia loca conciliari poſſunt.

**S**Ecūda dubitatio occutrit circa aphoriſmū: quia Hippocrates inquit in principijs morborū non eſſe medicandū & mouendum. Oppoſitum tantum dicit aphoriſmo 29. ſecundæ ſec. „ ſi quid tibi videtur mouendum moue in principio, ergo vel male hic, vel ibi.

Reſpondetur in hoc aphoriſmo loqui de materia cruda, quæ non eſt purganda, niſi ſit concocta, concoquitur verò perfectè ſolum in ſtatu, vt docet Galenus 3. de criſibus cap. 5. in aphoriſmo verò 29. ſecundæ ſec. loquitur de materia turgente, & de materia euacuanda (vt ait Galenus) per ſanguinis miſſionem: ſanguis enim euacuatur quatenus copia peccat.

Tertia dubitatio bilis eſt ſuperflue cocta: ergo in principio eſt purganda, quamuis non turgat.

Reſpondetur bilem dupliciter conſiderari vel reſpectu ſui, vel reſpectu naturæ, quæ læditur ab ipſa bile: primo modo eſt ſuperflue cocta: ſecundo modo conſiderata videlicet quatenus non eſt domita, & ſuperata à natura: dicimus, quod ſi euacuaretur, vt talis exederet partes, per quas tranſit, & poſſet quoque agrum interimere. Sic caro nimis cocta dum ingeritur in ventriculum reſpectu chyli eſt cruda: chylus reſpectu ſanguinis ſimiliter dicitur crudus: ſimiliter ſanguis optimè coctus reſpectu lactis, in quod debet conuerſi, crudus eſt. Idem dicimus de bile, quæ reſpectu ſui eſt cocta, reſpectu verò naturæ, quæ ab læditur, quia nō eſt ſuperata, dicitur cruda.

Quarta dubitatio: nō videtur, quod medicamentum non conueniat in principio morbi, quod probatur hac ratione: tunc eſt dandum medicamentum purgans quando virtus eſt robuſtior: ſed virtus eſt robuſtior in principio morbi: ergo in principio dandum eſt medicamentum purgans.

Reſpondetur tunc eſſe dandum medicamentum purgans, non quando virtus eſt robuſtior, ſed quando materia euacuanda per medicamentum eſt diſpoſita ad purgationem, ſeu euacuationem: ſed ſic eſt quod materia eſt diſpoſita, quando eſt concocta, nempe quando facta eſt fluida, & perti ſunt meatus, per quos tranſire, & uacuari debet: perfectè verò concocta



ex Galeno 3. de crisib. §. est in statu: ergo tunc solum erit dandum medicamentum, & non in principio, nisi materia turgescat, & vnā inclinet ad ventrem.

Auerroes in colligēt miratur, cur natura non vincat morbum in principio, sed solū in fine status, cum in principio virtus sit valde robusta, & in fine status valde debilis. Respondet, & rectē quidem, virtutem valde debilem longē facilius vincere materiam dispositam, quam valde robustam materiam non dispositam.

## Q V Æ S T. XCI.

### *De minoratiuis.*

**Q**Varitur, an in principio morborum materialium, qui fiunt ex vitiosis humoribus, liceat vti minoratiuo idest pharmaco electiue soluente: dicitur minoratiuum: quia datur pro diminuenda materia cruda: diximus in principio morbi: quia ex omnium consensu in principio morbi tota materia est cruda: dicimus morborum materialium, quia morbi sine materia, cuiusmodi sunt hectica, & omnes intemperies sine materia quatenus tales nullo indigent pharmaco: dicimus, qui fiunt quia etiam morbi materiales, qui facti sunt, & non amplius fiunt, vt tales nullo indigent pharmaco: quia morbi, vt facti, non tolluntur ad ablationem causae antecedentis, per pharmacum videlicet.

Quinque in hac quaest. sunt animaduertenda. Primum non est dubitandum de medicinis laxantibus, vt de cassia, tamarindis, & similibus: quia haec omni tempore iuant, non enim purgant electiue: sed solum reddunt aluum lubricam, & humectam.

Secundō quaestio non est de turgentibus, quia turgētes humores sunt tenues, & renues, quāuis sint crudi, purgari possunt.

Tertiō quaestio est de minoratiuo portionis materiae crudae, & non de minoratiuo portionis materiae perfecte coctae: quia de hoc non est dubium: Galenus enim 1. ad Glauc. c. 11. loquēs de quartana habet haec verba „ si apparuerint signa perfecte co-

ctionis semel, & saepius, si oportuerit, corpus erit purgandum pharmaco.

Quartō quaestio est de materia cruda, quae tamē sit apta coctioni, sicuti est crassa, viscida, non de inepta, cuiusmodi sunt hydropicorum serositates, quae coctioni sunt ineptae.

In venenis, & humoribus omnino coctioni rebellibus non est expectanda coctio: sed valde tempestiue pharmaca efficacissima sunt praebenda: sicuti in illa exitiali cynanche, quae eadem prorsus symptomata profert, quae canina rabies: de qua Iosephus de Aromatarijs assinnate vir & arte medica, & facunda insignis libro suo doctissimo & curiosissimo de rabie contagiosa probat priscorum sapientum auctoritate, longa periclitatione, & experimento certissimo ab illo obseruato in quodam Sacerdote, rabidum virus esse Cynanchem.

Quinto quaestio est de minoratiuo, non de eradicante: Immo si de eradicante loquamur medicus in tali euacuatione omni tempore debet infra terminum subsistere, neque vnquam vti debet exactissimo eradicante. Hinc ex Hippocrate & Galeno 6. aphorismorum 27. medici neque totum pus in suppuratis: neque tota aqua, immo neque multa pro vice in hydropicis euacuant. Vnde Mesues, & Graeci ferē omnes expressē admonēt, in omni euacuatione satius esse aliquid naturae permittere, quam exactissime euacuare.

In hac quaestione de minoratiuis variae sunt opiniones.

Rasis 10. ad Almanforem. Manardus, & quamplurimi alij putant, in principio morbi, quando cruda materia est copiosa semper vtendum esse pharmaco minoratiuo.

Fernelius, & Montanus dicunt, humores crydos melius purgari in augmento: quā in principio, & longē melius in statu.

Rasis & Alij dicunt, solum tenues humores ante coctionem esse purgandos & non crassos: quia dicunt serosos esse ineptos coctioni.

Alij dicant, Hippocratem & Galenum non esse vsos minoratiuis. Nos tamen illis vti posse: quia habemus pharmaca bene dicta, quibus carebat antiquitas.

Demum sunt, qui tenent, minoratiua conuenire pro illis humoribus crudis, qui sunt



sunt in intestinis, & meseraicis venis.

Ista sunt opiniones, quæ vagantur per scholas de minoratiuis. Nos prius proponemus fundamenta, quibus ex Hippocrate & Galeno ostendere possumus, minoratiua in arte medica non habere locum. Deinde argumenta aduersariorum, & eorum solutiones proponemus.

Quo ad fundamenta pronostica opinione contra minoratiua, hæc sunt. Primum desumitur ab Hippocrate in hoc aphorismo dum dicit „ concocta medicari: si concocta medicantur: ergo non cruda erunt medicanda. Nec valet dum dicunt ex Cœciliatore differentia 161. Hippocratem loqui de euacuatione eradicatiua, & non de minoratiua: quia dum subdit Hippocrates & mouere non cruda) dicit excludere non solum diuretica, sudorifica, & minoratiua, sed omnia illa quæ aliquo modo possent mouere cruda.

Secundum fundamentum desumitur à Galeno 2. aphorismorum comm. 9. vbi dicit, purgationem ante coctionem materiæ esse malam: quia sequuntur colliquationes, mali pulsus, aliquando vertigines, & alia praua symptomata. Rationem Galenus proposuit 2. de humoribus comm. 14. vbi dicit „ Quæ sunt incocta sunt stabilia, & infixa, itaut maxima cum difficultate trahi possint: quare quando pharmaco electiue soluente humores crudi, qui stabiles, & infixi sunt, à suo loco dimouentur, suboriuntur ob illam violentiam colliquationes, mali pulsus, vertigines, febres, & varia symptomata, prout corpora sunt ad varia mala propensa, & disposita.

Tertium desumitur à Galeno 4. aphorismorum 22. vbi dicit „ Quando materia: est cruda, impossibile est aliquid rectè euacuare; dicit aliquid vt excludat euacuationem minoratiuam: quia minoratiua euacuant non totam materiam crudam, sed aliquid materiæ crudæ.

Quartum desumitur ab Hippocrate lib. 4. acutorum tex. 22. vbi leguntur hæc verba „ Quiconantur in principio morborum corpus soluere medicamento, partes inflammant, & nihil adimunt à parte inflammata. Immo per medicamenta colliquant partes sanas: si verò corpus sit imbecillum,

morbus praualeat, & mors subsequitur.

Præterea patet experientia, humorem crudum esse impactum, & infixum, vt docet Galenus 4. de ratione vic. 79. & 2. de humoribus 15.

Idem quoque evenit, dum chirurgus incidit apostema crudum, ac licet illud maxime aperiat, nihil humoris crudi foras effunditur, sed solum portio sanguinis tenuis, quæ non pertinet ad ipsum apostema: ergo multo minus medicamentum euacuabit humores crudos infixos, & impactos in aliqua corporis parte.

Quintum fundamentum desumitur à lib. 4. de tuen. sanit. cap. 5. vbi loquitur de humoribus crudis existentibus in mesenterio: habet hæc verba „ Purgas medicamentum, vbi sunt humores crudi, erosiones, & tormina efficit, atque nihil notatu dignum euacuat: quia crudi succi ob crassitatem vias obstruunt, itaut nec ipsi exeat nec alios exire permittant: subdit „ Vbi adest copia crudorum succorum non licet exercitare, vomitum mouere, nec lauare, nec fricare.

Præterea 4. acutorum 44. habet hanc sententiam „ sicuti quies iuuat coctionem: sic quælibet agitatio impedit coctionem: pharmaca enim maximam excitant agitationem: vnde maximum suboritur malum, tum quia natura ob agitationem incalescit: tum cura distrahitur ab opere suo.

Hinc Galenus 2. de humoribus 13. inquit, non esse dandum medicamentum purgans in augmento, vel in principio status: quia tunc natura est occupata in certamine cum morbo.

Sextum desumitur à Galeno secundo in secundum prout: comm. 57. vbi hæc dicit alius in quo vis morbo spore profluens sine signis coctionis nihil iuuat: si vero implacidius operetur, præterquàm quod nihil iuuat, nocuerunt etiam afferi: quare si alius profluens materia existere cruda, non iuuat, tantò minus iuuabit pharmacum.

Septimum desumitur à Galeno comm. 24. huius sect. vbi habet „ In morbis longis semper oportet expectare coctionem: in acutis verò solum dum materia turget in principio licet purgare, & hoc cum multa cautione.



Deinde alijs verbis pręgnatibus quidem damnat omnia pharmaca, si materia non sit concocta.

Immo secundo de humoribus comm. 21. proponit etiam hanc diuinam sententiam „ prope iudicationem expurgare malum. Similiter addit, iudicationem pręuenire malum: sed sic est, quod propę iudicationem materia adhuc nō est cōcocta, & magnum malum est iudicationem pręuenire, sicuti nostrarum plurimi faciunt, qui transacto 7. die, vel 14. nulla facta consideratione, an bene cōcocta sit materia pręueniunt iudicium ante cōctionem.

Errant pręterea, dum putant, humores totius morbi esse cōctos, dum vident cōctionem in aliqua parte corporis: sæpę enim ex humanis decedunt ægri, qui habent humores crudos in toto, & in parte cōctos, vt refert Galenus 2. in 1. epid. 84. de Cratistonaacte, & Ancilla pictoris, qui mortui sunt, cum parotides suppurasent; in illis cōctio erat in parte: cruditas verō erat in toto.

Octauum desumitur ab Hippocrate & Galeno 4. de ratione vic. 44. vbi dicit „ in principio morbi licet vti clystere, & non pharmaco: Galenus verō in illo comm. inquit, non pharmaco, quia impediretur cōcoctio: Ecce Galenum intelligere de minoratiuo, quod non ex toto euacuat: si enim de eradicante intelligeret: euacuatio non impediretur: quia tota materia esset iam euacuata.

Ratio verō cur non conueniant minoratiua materia existente cruda, est quia per minoratiua euacuantur solum materię tenues: crassę verō solum agitantur: vnde duo magna incommoda sequuntur: primum ex agitatione crudorum fiunt maiores obstructions, vt animaduertit Galenus 4. de tuen. sanit. 5. secundum, crassę materię fiunt magis rebelles, & inobedientes cōctioni, & expulsionī: cōctioni, quia per quietem humores coquantur, & superantur: expulsionī, quandoquidem euacuato tenui per minoratiuum, relinquitur crassum expulsionī ineptum, quia tenue est vehiculum crassi.

Quare minoratiua quinque nocumenta pręcipua adferunt.

Primum partes sanas colliquant.

Secundum humores viles euacuant, & inutiles relinquunt.

Tertium ob agitationem augent calorem febrilem, & obstructions.

Quartum impediunt cōctionem, quę sola quiete fit.

Quintum euacuant tenues humores, qui sunt crassorum vehiculum: crassi verō vehiculo destituti, deinde non possunt expelli.

Cognita veritate, videlicet minoratiua non habere locum in medicina, consideranda sunt aduersariorum argumenta.

Primum argumentum illorum tale est: si licet purgare materiam turgentem in principio morbi, hoc sine, ne petat aliquam partem principem, multo magis licebit purgare materiam crudam non turgentem, quę actu habet raptum ad partem principem; quare minoratiuum conueniet in cruda materia non turgente.

Ad hoc argumentum respondemus, materiam quę habet raptum ad partem principem, vel habere in seipsa principium motus, vel habere principium motus extra se, id est à parte principe nimium excalefacta, quę ratione caloris attrahat. Posita hac distinctione: dicimus omnem materiam habentem in se principium motus esse turgentem: de hac re non est dubium, vt superius explicauimus.

Si verō materia peccans habet principium motus extra se, dicimus, non esse turgentem, & propterea non esse purgandum, si cruda sit: quia si agitaretur euaderet perniciosior.

Deinde dicimus secundum veram Galeni methodum esse remouendum calorem partium principum, ratione cuius fit attractio: sed calor certē non remouebitur pharmaco: quia ex Galeno comm. 23. huius sectionis, omnia pharmaca calida sunt.

Secundum argumentum desumunt à Galeno 1. de comp. med. secundum locos cap. 2. vbi faterur, se curasse adolescentem alopecia correptum in prima visitatione medicamento ex colocintide: atque sine alijs localibus illum liberaſſe.

Respondemus, materiã, quę est in corpore dupliciter considerari posse: vno modo,



do, vt eft in toto corpore cocta, & in aliqua tantum parte cruda, alio modo, vt eft in parte cocta, & in toto cruda. Hæc diftinctio eft Hippocratis & Galeni 1. epid. 2. tex. & comm. 84. vbi propofuit illos infirmos, in quibus apparuerunt parotides, quæ ad fuppuratorem deueniunt, nihilominus mortui funt. Galenus in comm. ait, illos mortuos fuiſſe propter materiam crudam exiſtentem in toto, & non propter parotides, in quibus materia erat cocta.

Præterea patet, materiam eſſe poſſe in toto coctam, & in parte crudam, veluti dum morbus totius corporis reſoluitur in abſceſſum: quo caſu totum liberatur materia cruda: pars tamen eadem materia cruda correpta eſt.

Similiter dum pars corporis vulneratur, humor confluxus dicitur crudus: egerque maturatione: attamen in toto poteſt eſſe materia cocta, totumque optima fanitate gaudere.

Poſita hac diſtinctione, dicimus in Adoleſcente alopecia correpto exigua portionem melancholiæ fuiſſe tranſmiſſam ad caput, & in toto fuiſſe materiam coctam; qua expurgata per pharmacum, deinde à natura id quod confluxit ad caput fuiſſe facile reſolutum per localia: ideo poterat Galenus dare medicamentum in prima viſitatione, materia in toto exiſtente cocta.

Tertium: Galeus 2. aphoriſ. 29. in comm. dicit, in principiis morborum vtendum eſſe venæ ſectione, & interdum purgatione: ergo minoratiuum interdum conueniet in principio.

Reſpondemus, Galenum locutum fuiſſe in illo comm. de materia turgente, quia dixit (interdum).

Deinde reſpondemus, in principiis morborum poſſe quoque reperiri materiam coctam, ſed non illius morbi, ſed alterius præcedentis diſpoſitionis, quæ in principio noui morbi pharmaco purgari poſſit. Hæc doctrina eſt Hippocratis 4. de ratione vic. 43. his verbis, quibus in principio vrinæ, & nebulofæ, & craſſæ exiſtunt, hos annuentibus cæteris, purgare conuenit. Quod ſi vrinæ inter initia tenues fuerint, tales non purgabis.

Quare præter materiam, quæ facit mor-

bum, quem curare intendimus, poteſt eſſe aliqua materia cocta alterius morbi præcedentis, vel malę diſpoſitionis illius patientis, quæ materia in principio noui morbi ſit euacuanda. Hinc dum Hippocrates 2. aphoriſ. 29 dixit „ Inchoantibus morbis ſi quid tibi videretur mouendum moue, non ſolum id propoſuit propter excrementa contenta in primis vijs, & propter turgentem materiam: atque vt ſanguis euacuetur; ſed id quoque dixit propter materiam coctam alterius affectus antecedentis, quod ſæpè accidere poteſt.

Quantum argumentum: Hippocrates lib. 2. de ratione vic. 10. loquens de principio pleuritidis dat nobis hoc præceptum: ſi dolor inſeſter partes infernas, dandum eſſe elleborum: ergo conueniet minoratiuum in principio.

Reſponder Triuerius, Hippocratem uſum fuiſſe pharmacum in illo dolore deſcendente non ratione euacuationis illius humoris: ſed ratione reuulſionis. Dicit præterea Hippocratem in hoc aphoriſmo (concocta medicari) locutum fuiſſe de euacuatione, & non de reuulſione: quaſi quod reuulſio fiat ſine euacuatione, & ſit ens rationis, & chimera.

Nos tamen reſpondemus, Hippocratem loco citato dediſſe pharmacum, vel quia materia erat turgens, vel quia materia erat concocta ſecundum partem, vel quod fuerit materia cocta, ſed non illius morbi, ſed alterius præcedentis diſpoſitionis.

Quintum argumentum deſumunt ab Hippocrate 4. de ratione vic. 64. vbi loquens de materia cruda ait „ circa diem quintum/ſi venter murmurauerit, licet it corpus mediocriter purgare ſcamonio: ergo minoratiua conuenient.

Reſpondemus, Hippocratem fuiſſe locutum de materia turgente: quod patet ex tex. ſuperiori, in quo propoſuit ægros, qui modo patiebantur tumores circa pedes, modo circa genua, modo circa crura, & modo humores deliteſcebant circa fauces, qui deinde ſuffocabant ægros: quare eſt luce meridiana clarius, quod Hippocrates loco citato locutus ſit de materia turgente.

Duo tamen in hoc loco ex dictis ſunt  
colli-

colligenda : primum quam sint symptomata turgentis materię .

Secundum, dum Hippocrates subdit, dandum esse scemonium, si venter muturauerit, colligimus non velle esse dandum pharmacum in turgente materia, nisi ipsa habeat inclinationem ad ventrem .

Sextum Galenus lib. quos & quando purgare oportet docet, humores peccantes ostendere tempus purgandi : quia si humores sint crassi, & viscosi, ut est pituita, & atra bilis coctionem esse expectandam : si tenues, & serosi inter initia esse purgandos . Ecce (dicunt) ex Galeno vtendum esse minoratiuis, si crudi humores sint tenues .

Respondent Nonnulli, Galenum intelligere per tenues, & serosos humores ichores, seu serositates, quę non sunt coquenda, sed euestigio euacuanda .

Falsitur, dum dicunt ichores serosos non esse coquendos : Galenus enim 2. de ratione vic. 44. asserit, ichores interdum esse crudos, & interdum coctos. Nos credimus quod serosi humores, licet sint crudi, possint purgari : negamus tamen, quod à virtute robusta non possint coqui .

Alij respondent ad argumentum, Galenum loqui de materia turgente, quod reuera nos non admittimus : quia ibi mentionem facit de crassitie, & subtilitate materię peccantis .

Alij dicunt, ut de medio tollant argumentum, & rectè quidem, librum quos & quando purgare oportet non esse Galeni sicuti nos quoque credimus .

Septimum desumitur ab ægrotantibus Hippocratis quia nonnulli, ut Meton fuerunt liberati per narium hemorrhagiam cruda existente materia . Similiter Mulier trimestri fetu grauida liberatur acuta febre per sudorem, cruda existente materia : ergo & medicus naturę imitator minoratiuo poterit purgare cruda .

Respondemus hemorrhagiam Metonis, & sudorem mulieris trimestri fetu grauidę non fuisse motus merè symptomaticos : sed mixtos ex critico & symptomatico, atque illo die non fuisse à febre acuta omninò liberatos : sed sentim reliquias fuisse à natura superatas .

Octauum argumentum desumunt à Galeno 3. epid. 3. comm. 76. vbi loquens de Larissa, inquit : si vehementes dolores non possint anodynīs sedari, vtendum esse pharmaco electiue soluente : ergo Galenus concedit minoratiuum : materia enim cruda, & non cocta est illa, quę efficit dolores vehementes .

Hinc Galenus 6. meth. 2. loquens de punctura nerui ait, si maximus exciteretur dolor, statim vtendum est medicinis purgantibus, ne humores confluant ad puncturam, & conuulsionem efficiant .

Similiter 6. de loc. aff. 3. loquens de dolore vehemēti ipsorum renum admonet : in principio sine aliqua humorum preparatione vtendum esse pharmaco, hoc finē humores ad renes fluant . Quamplurima alia argumenta similia possunt inueniri, in Hippocrate & Galeno, quę facile de medio tolli possunt propositis solutionibus .

Ad hoc argumentum Altimarus respondet in vehementissimis doloribus nos posse vi minoratiuis : sicuti docere videtur Galenus in sequenti aphorismo .

Falsitur Altimarus, quia Hippocrates & Galenus in sequenti aphorismo agunt de sanguinis missione, non de purgatione .

Quidam alij dicunt, dum dolores sunt vehementes, materiam esse turgentem . Parimodo falsitur isti : quia de ratione turgetis materię est, ut in seipsa sit motus principium : sed sic est, quod in punctura nerui excitatur dolor conuulsivus : materia est firmata, & non turget, licet dolores sint vehementissimi .

Respondemus non esse purgandos humores coctos, & fluidos, qui sunt in corpore sano, ne scilicet fluant ad partem dolentem .

Neque accipienda est solutio Nonnullorum dicentium, Hippocratem & Galenum non fuisse vsos minoratiuis : quia carebant medicamentis purgantibus, quę sunt apud nos, & quę vocantur purgantia benedicta, cuiusmodi sunt Diacatolicum, diaphinicum electuarium de succo rosarum, & alia blandiora, quibus nos vtimur . Sed nescio quidem à quo Pontifice fuerint benedicta .

Contra istos sic argumentor : si Hippocra-



crates & Galenus putant, cruda non posse purgari purgantibus validissimis sine grauiissimis accidentibus: quia materia cruda est infixæ, & impacta, quæmodum in crudo apostemate apparet: tantò minus poterunt purgari purgantibus benedictis, quæ sunt inferioris virtutis.

# APHORISMVS XXIII.

**E**iectiones non multitudine sunt extimandæ: sed si talia deiciantur, qualia conueniunt, & ægri facile tolerant. Atque ubi usque ad animi defectiorem expedit ducere, faciendum, si æger possit tolerare.

In superiori aphorismo egit Hippocrates de tempore purgationis, & euacuationis: quia dum dixit (concocta medicari) intellexit de euacuatione, quæ fit per pharmacum. Dum dixit, „ (& mouere non cruda) intellexit de quacumque alia euacuatione, quod scilicet cruda vt cruda non sint mouenda.

In hoc verò aphorismo agit de quantitate euacuationis, quatenus est communis euacuationi quæ fit per pharmacum, & quæ fit per venæ sectionem, sumpta indicatione à qualitate euacuationis, & à virium tolerantia.

Prima dubitatio statim oritur, quia hic aphorismus videtur superfluus: quia est inclusus in tertio aphor. in quo egit de quantitate euacuationis.

Respondetur, hunc aphorismum differre à tertio, quia ibi egit de quantitate euacuationis pertinentis ad chirurgiam, pharmaciam, & dietam: hic verò solum agit de quantitate euacuationis ad pharmaciam, & chirurgiam pertinentis, & nequaquam ad dietam.

Secunda dubitatio occurrit: quia Galenus in comm. 3. aphorismi huius sect. asserit, magnam quantitatem humorum indicare magnam euacuationem: modicam quantitatem modicam euacuationem.

Hippocrates verò in hoc aphorismo inquit, magnam quantitatem euacuationis indicari à qualitate euacuationis, quod stare non potest: quia in indicationibus non est transeundum de genere in genus: indicans enim & indicatum sunt duo contraria: at contraria sub vno genere proximo continentur: ergo quantitas euacuationis non indicabitur à qualitate, quod est genus omninò diuersum.

Montanus, & Capiuaceus soluentes hanc difficultatem dicunt, quantitatem purgationis, seu euacuationis dupliciter considerari posse, vel ante euacuationem, vel in tempore euacuationis: addunt ante euacuationem magnam quantitatem euacuationis indicari à magna quantitate humorum & modicam à modica quantitate. In tempore verò purgationis, seu euacuationis (addunt) magnam quantitatem euacuationis non indicari à quantitate humorum, sed ab humorum qualitate & à virium tolerantia.

Idque probant Auctoritate Hippocratis & Galeni: Hippocratis 2. de ratione vict. tex. 10. vbi vult, in pleuritide terminū euacuationis sanguinis esse mutationem coloris sanguinis ad liuidum: sed sic est, quod mutatio coloris pertinet ad qualitatem, & non ad quantitatem: ergo.

Deinde probant ex Galeno primo ad Glauc. cap. de cura quartana, vbi dicit: „ si sanguis sit crassus, & niger permittendus est vt fluat, si serosus, & rubeus supprimendus.

Primò Montanus, & Capiuaceus saluntur: quia si ante euacuationem quantitas euacuationis indicatur à quantitate humorum euacuandorum: ergo & in tempore euacuationis: quia res ex Aristotele 2 metaphys. sicuti se habent ad esse, ita & ad cognosci, & operari.

Ad auctoritatē Hippocratis in hoc aphorismo respondemus Hippocratem nō agere de quantitate humorum euacuandorum, sed de qualitate euacuationis, secus aphorismus interdū esset falsus: quia sepius accidit, quod ægri paulo ante obitū euacuent excrementa venefica, & qualia oportet cū optima tolerantia: tamen paulo post moriuntur: causa est: quia hec euacuatio fa-

ita sit excrementorum qualia oportet, tamē non est facta qualiter idest quantum, quādo, quomodo, & ubi oportet: dicimus quātum, quod scilicet euacuatio facta sit totius humoris peccantis, & quod facta sit in die critica, facta coctione, & cum vitium tolerantia, & quod non adsint prohibentia, & ubi oportet, nempe per regionem convenientem.

Quare dicimus Hippocratē in hoc aphorismo agere de qualitate euacuationis, qualiter videlicet fieri debeat in chirurgica & pharmaceutica parte, & non de qualitate humorum euacuandorum.

Ad auctoritatem Hippocratis & Galeni quod quantitas euacuationis indicetur à qualitate idest à mutatione coloris. Respondemus quantitatem purgationis, seu euacuationis primariò indicari à quantitate humorum: secundariò verò à qualitate, non tamquam ab indicante, sed tamquam à signo ostendente indicans esse præsens, vel non præsens.

Diuiditur aphorismus in duas partes: in prima docet quantitatem euacuationis in pharmacia, & chirurgica esse desumendam à duobus locis videlicet à qualitate bonae euacuationis (idest quod fiat qualiter fieri debeat intelligendo per qualiter quod fiat tempore opportuno, videlicet facta coctione, & in die critica) & à vitium tolerantia.

In secunda exemplificat de euacuatione faciendā per phlebotomiam vsque ad animi deliquiū, si vires ferant, quæ solum temerari potest per phlebotomiam: quia stat in potestate medici eam suppressere quando vult: quod fieri non potest in euacuatione facta per medicamenta purgantia, quia eam sistere non possumus, quando volumus.

Quo ad verba dicit *τα χυμώδη*: quod verbum significat excretionem in communi: fiant per aluum, per venas, vel per alias partes: Galenus enim 2. aphorismorum comm. 18. ait, excretionem, quæ fit per aluum vocari *ὑποκόπην* idest subductionem, & non *χυμώδη* idest excretionem communem omnibus excretionibus: ideo errant qui per *τα χυμώδη* explicant deiectiones quæ significant alui deiectiones: melius sanè interpretabimur per

*τα χυμώδη* eorum quæ euacuantur intelligendo de quacumque excretionem.

Deinde dicit *ἀλλ' οὐδ' ὡς χυμώδη* si idest sed si qualiter oportet euacuentur. Per *ὡς* intelligit qualiter, & non qualia: quia apud Græcos omnia neutra adiectiua sine articulis sumuntur aduerbialiter.

Parimodo Hippocrates aphorismo 13. per *ευκόλως* intelligit facilius & non facillima, quamvis *ευκόλως* sit neutrum plurale artamen, quia est sine articulo, & est neutrum adiectiuum sumitur aduerbialiter idest facilius. Similiter *δυσκολότερα* in 18. aphorismo significat difficiliora, tamē est eutrum plurale sine articulo: ideo sumitur aduerbialiter.

Præterea apud Herodotum & Tucididem, ut animaduertit Io. Scapula in suis annotationibus, hæc dictio *ὡς* sumpta est aduerbialiter, significando qualiter, & non qualia.

Sic Hippocrates primo de ratione vic. 23. ait, si quæ à pulmone excernuntur sint qualia oportet augenda est sorbitio. Galenus in comm. per qualia interpretatur qualiter, quia dicit, Hippocratem per qualia intelligere excretionem factam à pulmone cum noris concoctionis.

Demum multi ex praua intelligentia istius dictionis *ὡς* sæpius incidunt in errata magni momenti, sed hoc vnum liceat offerre, quod legimus in Saxonia in illa disputatione, an euacuatio symptomatica, quæ fit in principio diarrhææ, quæ est cum tolerantia, & quæ respondet morbo, idest quod in morbo bilioso biliosa euacuetur, sit suppressenda, vel fouenda, Saxonia tenet esse fouendas, hac praua intelligentia motus: si qualia oportet purgari interpretando per *ὡς* qualia, & non qualiter. Amplius in principio diarrhææ non potest fieri euacuatio qualiter fieri deberet: quoniam Galenus 4. aphorismorum 22. inquit, ante vtilem euacuationem præire coctionem, & deinde separationem: sed sic est quod in principio diarrhææ nulla coctio observari potest: ergo non est faciendā euacuatio.

Demum licet in principio morbi in euacuatione symptomatica observetur aliqua tolerantia, id evenit ratione principij morbi:



bi: quia ex Hippocrate 2. aphorif. 30. in principio, & fine morbi omnia remiffiora.

Insuper Criftoforus Vegha veritate ductus in fuis commentarijs inquit per oīa Hippocratem intelligere non folum speciem peccantis humoris, fed omnes conditiones, quæ requiruntur ad optimam euacuationem: in qua, fi adfint, euacuatio fit qualiter fieri debeat, quod noſtrę expofitioni maximè refpondet.

*Vſque ad animi defectionem.* Galenus declarans quid fit intelligendum per animi defectionem, inquit, Hippocratem non intelligere illam animi defectionem, quæ fit ob timorem, vel morſum oris ventriculi: fed illam quæ fit ob nimiam euacuationem.

Præterea notandum, Hippocratem per animi defectionem non intelligere ſyncopem, fed lipothymiam.

Differentia non parua eſt inter ſyncopem, & lipothymiam: quia ſyncope omnino tollit ſentum & motum: lipothymia verò non aufert omnino ſentum: immo tales ægri recordantur, & in ſyncope, nequæ recordantur, neque in ſyncope vlla animalis operatio, vel vitalis viget: ideo Galenus 12. meth. 5. definiens ſyncopem dixit, eſſe præcipitem omnium virium lapſum: primo verò ad Glauc. 14. ait, lipothymiam eſſe viam ad ſyncopem: Eclyſim verò eſſe viam ad lipothymiam. Eclyſis ſignificat reſolutionem.

Insuper notanda ſunt hæc tria vocabula Italica, quæ reſpondent tribus latinis: ambafia, faſtidio, angofſa. Ambafia eſt illa Eclyſis, quæ latinè dicitur anxietas. Faſtidio dicitur, lipothymia, ſeu animi defeſio: angofſa dicitur ſyncope.

Cauſa immediata ſyncopes & lipothymię eſt defeſtus ſpiritus vitalis, & non innati, & implantati: quia deficiente innato, ſeu implantato, ſtatim ſequitur mors: remanente verò innato, licet vitalis extinctus fit, poteſt tamen redire.

Cauſæ extinctionis vitalis caloris, & deinde innati quatuor ſunt.

Prima eſt alteratio à cauſa contraria, vt ab opio, aqua frigida, vel aere frigidiffimo.

Secunda eſt ſuffocatio, qua fit vel à ſanguinis nimietate, vel ab anguſtia in vena

arterioſa, vel arteria venoſa, vel à catarrho ſuffocante.

Quod calor per ſuffocationem extinguitur, declaratur à Galeno & Hippocrate 4. acutorum 23. vbi dicit, per venarum interceptiones factas à ſanguinis multitudine extingui calorē. Similiter Galenus 2. de naturalibus facultatibus 8. ait, ex ſuppreſſis menſibus calorem ſuffocari poſſe, & hydropem fieri. Pari modo Hippocrates 6. aphorif. 12. inquit, Diuturnas curanti hemorrhoidas, niſi vna ſeruetur, impenet periculum ſuffocationis, & hydropis; idem confirmat Galenus in comm.

Tertia cauſa extinctionis caloris eſt defeſtus alimentis, qui accidere poteſt, vel ob nimiam euacuationem, vel ob prauum ſucum nutritioni ineptum, vt in hydropicis, vel ob pabulum immoderatum poſt nimium coitum aſſumptum: de hoc modo extinctionis Galenus mentionem facit 2. de facult. nat. cap. 8. Nimius cibus impedit, ne debiles alantur, immo calorem debilem extinguit ſuffocando.

Quarta cauſa eſt reſolutio caloris, quæ fit, vel à vehementi calore, cuiusmodi eſt in cauſone: quia maior flamma extinguit minorem, vel à cauſa nimium rarefaciente, vel nimium mordicante, quæ calorem maximè reſoluit. De hac cauſa loquitur Hippocrates 2. prognof. rex. 1. & Galenus fuſius in comm. vbi Hippocrates proponit hæc verba, aqua inter cutem à morbo acuto mala.

Tertia dubitatio: in ſanguinis euacuatione requiruntur vires, ſine quibus medicorum nemo audeat ſanguinem mittere: ergo nunquam erit facienda ſanguinis euacuatio vſque ad animi defectionem: ergo æger nunquam par eſſe poterit in ſimili euacuatione toleranda: quia & in animi defectione, & paulo ante, vires non permittunt.

Reſpondetur, tolerantiam duplicem eſſe: aliam actualem, aliam potentialem: in lipothymia tolerantia potentialis adefſt: quia adhuc conſeruatur potentia generandi nouos ſpiritus, & nouas vires, in ſyncope verò neque eſt potentialis, neque actualis.



## QVÆST. XCII.

*An euacuatio sanguinis vsque ad animi deliquium fieri possit.*

**Q**uestio est in hoc aphorismo ab alijs considerata, an euacuatio sanguinis aliquñ vsque ad animi deliquiũ fieri possit.

Auerroes 2. coll. cap. 8. probat tribus efficacissimis argumentis contra Hippocratem & Galenum, euacuationem sanguinis vsque ad animi deliquium nullo modo in medicina habere locum.

Primum argumentum Auerrois tale est. Medicus debet naturam rectè operantem imitari: sed natura rectè operans nunquam euacuat vsque ad animi deliquium: ergo nec medicus.

Respondemus, assumptũ esse falsum, quod scilicet medicus solum imitari debeat naturam rectè operantem: quia interdum medicus potest facere, quæ ab ipsa natura fieri non possunt, vt dicit Galenus lib. de const. artis med. cap. 12. sicuti dum luxata reponit: carnem supercrecentem remouet: deponit cataractam: vrit, vel abscindit membrum sfacello correptum: vel calculus è vesica à lithotomo extrahitur.

Præterea negamus minorem, quod scilicet natura rectè operans nunquam euacuet vsque ad animi deliquium: Auerroes ostendit se non esse versatum in medicina: quia interdum natura per nares in causone euacuat sanguinem vsque ad animi deliquium: interdum per vterum, vel per hæmorrhoidas: & æger sanatur: immo Aui-cennas 17. tertij vult, sanguinem hemorrhoidalem non esse sistendum, priusquam æger animo deficiat.

Secundum argumentum Auerrois contra Hippocratem tale est: medici intentio solum est euacuare superfluum: sed euacuatio vsque ad animi deliquium euacuat non solum superfluum, sed etiam vtile: ergo.

Respondemus negando, quod medici intentio sit auferre superfluum: quia medici intentio est sanare: medici officium est addere, & auferre: & abscindere neruum punctura correptum, & vtre partem à cane rabido demorsam. Quod verò medicus tollat etiam illud quod non est superfluum gratia sanitatis patet in ijs qui cadunt

ab alto, vel vulnerantur, in quibus secatur vena, licet nulla adsint signa plenitudinis.

Tertium argumentum Auerrois. Medicus debet habere pro scopo non solum sanitatem: sed etiam vitæ custodiam: sed euacuatio vsque ad animi deliquium deducit egrum ad graue vitæ periculum: ergo non est faciendæ.

Respondemus negando, quod per sanguinis missionem vsque ad animi deliquium ducantur ægri ad maximum vitæ periculum. Aliud enim est animi deliquium, & aliud syncope, quod Auerroes confundit, neque intelligit Auerroes beneficia, quæ afferre solet animi deliquium: Galenus enim in hoc comm. & 9. meth. 4. loquens de lipothymia vti itatibus hæt hæc „ Celerimè per lipothymiam corpus refrigeratur: subdit nemo potest inuenire remedium lipothymia iucundius, & vtilius naturæ, & ægris: sequuntur enim à lipothymia alui deiectiones, vomitiones bilis, madores, sudores, & refrigerationes.

## QVÆST. XCIII.

*In quibus casibus conueniat sanguinis euacuatio vsque ad animi deliquium.*

**Q**uestio non spernenda proponitur in declaratione huius aphorismi. In quibus casibus conueniat sanguinis euacuatio vsque ad animi deliquium.

Galenus in comm. proponit tres casus, in quibus conuenit euacuatio vsque ad animi deliquium: quorum primus est in febribus ardentibus. Secundus in vehementissimis doloribus. Tertius in maximis inflammationibus.

Montanus, & nonnulli alij ponunt quartum casum id est in febre synocha.

Isti tamen errarunt: quia Galenus 2. de diff. feb. 2. & 2. de crisi bus 6. collocat febres synochas inter ar dentes: quare non dabitur quartus casus, cum synocha sit inter ar dentes.

Deinde Montanus, & alij plures fuerunt decepti à praua interpretatione leoniceni, & Cenomani, qui interpretati sunt in febribus ardentibus: cum in Græco codice legatur *ἐν θερμότητι πυρετῶς* id est in febribus calidissimis, & non ardentibus: neque in vllò Galeni tex. legi-



tur ἐν πυρετοῖς πυρετοῖς, id est in febribus ardentibus. Addimus febrem synocham esse febrem calidissimam: ergo in illis tribus casibus est quoque inclusa synocha febris.

Insuper si Galenus dixisset in ardentibus febribus, sanguinem esse mittendum usque ad animi deliquium, non potuisset defendi: quia in exquisitis ardentibus peccat bilis, & non sanguis: ideo non solum in febribus ardentibus euacuandus est sanguis usque ad animi deliquium: sed neque omnino tutum est aliqua moderatam quantitatem sanguinis euacuare.

Hinc Avicennas in cura febrium putridarum in communi cap. de phlebotomia non euacuat sanguinem in ardentibus exquisitis, ne succedat cholicorum ebbullitio: quam causam Aliqui non omnino admittunt: quia in febribus ardentibus nunquam sanguis esset mittendus, quod est contra Galenum 11. meth. 15. vbi vult, in omnibus febribus putridis sanguinem mitti posse, si vires permittant. Neque Galenus in febribus biliosis inter prohibentia phlebotomiam vnquam posuit cholicorum ebbullitionem.

Dicimus tamen nos in ardentibus exquisitis parum sanguinis esse euacuandum: quia sanguis est frenum bilis, illo enim euacuato, vires cadere possent. Quare ut ad propositum nostrum reuertamur, dum Galenus proponit in febribus ardentibus sanguinis euacuationem usque ad animi deliquium, per febres ardenes debemus intelligere febres calidissimas, sicuti in text. Græco legitur; inter quas calidissimas, febris synocha præcipue collocatur: atque ideo dicimus Galenum præcipue de synocha non putrida intelligere: in qua nisi fieret insignis sanguinis euacuatio, tota massa putresceret, fieretque synocha pestilens, vnde mors.

Causa verò, cur euacuatio sanguinis usque ad animi deliquium in febribus calidissimis maxime iuuet, proponitur à Galeno 9. meth. cap. 4. vbi habet hæc „ Celestinè per lipothymia totum corpus refrigeratur: subdit nemo potest inuenire remedium lipothymia incundius & virilior aëris, & natura: sequuntur enim à lipothymia alui defectiones, bilis vomitiones,

madores, sudores, & refrigerationes.

Parimodo hæc sanguinis euacuatio usque ad lipothymiam, seu animi deliquium quod id est, valde conuenit in maximis inflammationibus, vt docet Galenus in hoc comm. Primò, quia totum corpus ex hac euacuatione maxime refrigeratur: deinde per hanc euacuationem fit maxima reuulsio à parte inflammata: Galenus enim 13. meth. 6. dicit, quod omnis inflammatio vt inflammatio à sanguinis fluxu fit, qui tollitur sanguinem euacuando, & reuellendo à parte inflammata.

Istæ magnæ inflammationes, quæ hac euacuatione sanguinis usque ad animi deliquium præcipue tolluntur, sunt tres, videlicet ophthalmia, carbunculus, & pleuritis.

De ophthalmia patet: quia Galenus lib. de curandi ratione per s. m. cap. 17. in sermo Economio ophthalmico misit sanguinem ad quatuor libras, illumque citissime liberavit.

De carbunculo Galenus 14. meth. cap. proprio dicit, in carbunculo, & antracæ: quia est maxima inflammatio, conuenit hæc insignis sanguinis euacuatio.

De pleuritide Hippocrates 2. de ratione victus 10. dicit eo usque esse sanguinem mittendum, quousque appareat coloris mutatio, sanguisque exeat liuidus à pleura videlicet separatus, & per venam sectam euacuatus: quod non fiet, nisi præcedat insignis sanguinis euacuatio.

Conuenit quoque euacuatio usque ad animi deliquium ex Galeni comm. in vehementissimis doloribus: primò quia per hanc magnam euacuationem facultas sensitiva aliqua ex parte sopita redditur: vnde dolores mitigantur. Secundò quia fit reuulsio sanguinis facientis inflammationem, & dolorem. Hinc Galenus lib. de curandi ratione per sang. mis. cap. 17. citato in illo iuvene habente oculorum inflammationem cum vehementissimo dolore, euacuauit vna vice tres libras sanguinis, & post quatuor horas aliam libram, & statim dolorem superauit: noluit euacuare usque ad animi deliquium: quia erant elapsi dies 20. quod illo affectu laborauerat: sed mirandum est, quod in euacuatione trium



librarum non deliquerit, vel animo defecerit & tanto magis, quanto importuna inedia per aliquot dies fuerit à medico diatriario vexatus.

Tertia dubitatio: Galenus 1. ad Glauco. 74. ait, vigilias, aut dolores internos prohibere subitas, & multas euacuationes: quomodo igitur in vehementissimis doloribus erit euacuandus sanguis vsque ad animi deliquium? vt in hoc comm. docet Galenus.

Respondemus, si dolor fuerit factus ab humoribus calidis in ipsis venis contentis, qui foueant ipsum dolorem, dolorem non impedire euacuationem vsque ad animi deliquium: si verò dolor fuerit factus ab humoribus frigidis, sicuti est dolor collicus à vitrea pituita, vel podagricus à causa frigida, dicimus nullo modo sanguinis euacuationem esse faciendam, licet dolores essent vehementissimi vsque ad animi deliquium: tum quia in his non peccat sanguis: tum quia vires non tolerant.

Præterea nisi adsint vires permittentes in vehementissimis doloribus, nulla, vel exigua sanguinis euacuatō fieri debet: supponitur enim præceptum Hippocratis 4. de ratione vic. 19. esse obseruandum tamquam oraculum, quod præter morbi magnitudinem requirantur vires permittentes, si sanguinis euacuatio fieri debeat.

Demum notandum est erratum quorundam, qui tribus casibus à Galeno propositis addunt quartum, nempe sanguinem esse mittendum vsque ad animi deliquium in lassitudine tensiua: sed nisi adsit inflammatio nulla est occasio, quod tam insignis sanguinis euacuatio fieri debeat in lassitudine tensiua: quare sufficient tres casus propositi ab ipso Galeno in comm.

Duo præterea occurrunt considerata pro intelligentia aphorismi 1. Primum quò tempore in maximis inflammationibus possit conuenire missio sanguinis vsque ad animi deliquium. An in principio inflammationis, vel augmento, vel in vigore. Secundum an in vehementissimis doloribus ante sanguinis missionem vsque ad animi deliquium conueniant anodyna externa, vel interna.

Quo ad primum, id est, quo tempore in

maximis inflammationibus conuenire possit missio sanguinis vsque ad animi deliquium: prima facie non videtur, quod vilo tempore possit conuenire: non in principio, quia in principio inflammatio non est maxima: Hippocrates enim 2. aphorif. 30. ait, „ In principio & sine omnia remissiora. Non in augmento & statu; quia tunc sanguis est confluxus in partem inflamatam: tuncque effugit tempus reuellendi in contrarium: ergo nunquam conuenit.

Respondemus missionem sanguinis vsque ad animi deliquium, præcipuè faciendam esse in principio, vel paulo post, quo tempore fluit sanguis. Præcognoscitur, maximam fore inflammationem ex maxima plenitudine, ex celeritate confluxus, atque ex dolore vehemente.

#### Q V Æ S T. X C I V.

*An in magnis doloribus ante phlebotomiam conueniant anodyna.*

**Q**Vo ad secundum, an in vehementissimis doloribus ante sanguinis missionem conueniant anodyna: controuersia videtur esse inter Galenum, & Auicennam, Auicennas vbi agit de inflammatione habet hæc verba „ si volueris euacuare, prius sedare dolorem: ita ut velit, ante sanguinis euacuationem prius esse sedandos dolores anodynīs: Galenus verò in hoc loco in vehementissimis doloribus vult sanguinem esse mittendum vsque ad animi deliquium. Præterea in arte medica ante euacuationem topica non conueniunt: ergo neque anodyna.

Montanus conciliat Auicennam cum Galeno hoc modo dicendo curam secundum Auicennam, qui vult prius sedare dolorem, esse regularem: secundum Galenum verò esse coactam: & rectè quidem: quamuis Montanus non declarat, quomodo sit regularis.

Nos primo dicimus, Galenum non improbare, quod possit fieri sanguinis missio, & simul, & eodem tempore applicentur anodyna: Immo Galenus 2. in 6. epid. comm. 8. vult, ante sanguinis euacuationem



hem eſſe mitigandos dolores anodynif: hoc fine, vt à parte affecta fiat melior reuulſio, auxilio ſanguinis miſſionis: quia quando in parte affecta non eſt dolor, pars nihil attrahit, vnde per phlebotomiam reuulſio redditur promptior. Hinc Hippocrates in Anaxione patiente pleuritidem, prius ſedauit dolorem, deinde ſanguinem euacuauit.

Dicimus igitur nos prius eſſe dolorem ſedandum: ſed eodem tempore ſanguinem quoque eſſe mittendum, curamque eſſe regularem, ſi prius ſedetur dolor: quia anodynum eſt remedium vrgentis: phlebotomia verò eſt remedium cauſæ: ſed ſic eſt quod vrgenti prius eſt attendendum, vt docet Galenus in comm. 16. huius ſectionis.

Dum verò dicebant, topica non conuenire ante euacuationem totius. Reſpondemus reuocandos eſſe ad memoriam ſeptem caſus, in quibus licet applicare localia ante totius euacuationem.

Primus caſus eſt, ſi affectus ſit leuis, vt notat Galenus lib. 1. de comp. med. per locos c. 8. vbi agit de Aloperia, quam ſtatim ſanauit topicis adhibitis ſine alia præcedenti euacuatione.

Secundus, quando materia eſt venefica, quæ illicò caſtifico, vel ferro candente, ſine præcedenti corporis euacuatione ſuperatur: ſicuti in morſu viperæ, vel canis rabidi, vel ob arma venenata.

Tertius in apoſtematibus, in quorum principio ſtatim vrimur repellentibus.

Quartus eſt, dum roboramus os ventriculi antequam pharmaco purgemus: hic caſus proponitur à Galeno 1. ad Glau. 14.

Quintus eſt, dum vrimur balneo con-temperante, & eſt Galeni 1. ad Glau. 9.

Sextus, dum vrimur anodynif.

Septimus, cum periculum facimus, an dolor à flatu, vel ab alia materia peccante exoritur, vt Hippocrates expertus eſt in Anaxione.



*N* acutis paſſionibus, raro, & in principijs, medicinis purgantibus vti, & hoc cum præmeditatione faciendum.

In 22. aphoriſmo docuit Hippocrates quo tempore purganda ſint corpora: dixitque, vel quando materia eſt matura, vel quando turget. Duo adhuc de euacuatione relinquebantur conſideranda.

Primum ad quam menſurâ corpora poſſint euacuari, de qua euacuationis menſura & quantitate, egit in aphoriſmo ſuperiori.

Secundum erat declarandum, in quibus morbis, & quando, & quomodo materia turgens erat purganda: hoc facit in præſenti aphoriſmo docens hæc quatuor, quæ certè ſunt magni momenti.

Primum inquit, in morbis acutis turgentem materiam eſſe purgandam.

Secundum dicit raro hoc eſſe faciendum.

Tertium in principio morbi.

Quartum id eſſe faciendum cum præmeditatione; ſed infrâ diſtinctè omnia declarabimus.

Diuiditur aphoriſmus in duas partes. In prima inquit, in morbis acutis raro, & in principijs materiam turgentem eſſe purgandam.

In ſecunda parte docet id faciendum cum præmeditatione.

Quoad verba dicit *in morbis acutis*, quia in chronicis, vt docet Galenus in comm. materia nunquam turget: quoniam morbi chronici ſunt ex humoribus craſſis, & viſcidis, quippe qui ob duas cauſas turgere non poſſunt: prima quia de ratione turgentis materie eſt quod in ſe habeat principium motus, quod frigidis humoribus non conuenit: hinc ſeroſi humores in hydropicis, licet ſint tenues, nunquam turgent: quia vt frigidi in ſe ipsis non habent principium motus.

Secunda cauſa eſt: quia de ratione turgentis materie eſt tenuitas: vnica igitur ex his cauſis, deficiente humores turgere non poſſunt.

Dicit

Dicit raro, & in principio, supple materiam turgentem esse purgandam: non quod raro in peracutis humores turgeant, ut omnes alij exponunt: sed raro evenit, quod turgent in peracutis habeant inclinationem ad intestina: quo casu tantummodo in principio vii possumus pharmacum, ut ostensum est in tractatu de minoratiis.

Quid verò intelligat per principium Hippocrates. Primò sciendum ex Galeno 1. de crifib. 9. & in côm. 2. huius sect. principium morbi sumi tribus modis, vel pro primo insultu: vel pro duobus diebus, vel donec perseverat cruditas sine ullo signo coctionis: Galenus in comm. vult, Hippocratem per principium intelligere primum diem, vel non ultra secundum: quare dum turget materia, purganda est prima die, vel ad summum secunda, & rectè quidem: cum Hippocrates dicat 4. aphorif. 10. „ medicari in valde acutis eadem die, nam tardare mahim: dicit in valde acutis: quia in his materia sæpè turget, sed raro evenit quod habeat inclinationem ad mesenterium & intestina.

#### Q V Æ S T. C X V.

*Antequam materia turgens purgetur, quæ sint præmeditanda.*

**D**ixit cum præmeditatione, sed quid intelligat per præmeditationem; sciendum est, quod ad quinque capita reduci possunt omnia illa quæ sunt præmeditanda, ante: nam pharmacum in materia turgente exhibeatur.

Primum caput continet illas præmeditationes, quæ sunt faciendæ circa agrotantes. Secundum quæ sunt faciendæ circa morbum. Tertium quæ circa medicamentum. Quartum quæ circa humorem turgentem. Quintum quæ circa virtutem.

Quo ad primum, id est quo ad præmeditationes, quæ sunt faciendæ circa agrotantes, quatuor sunt, quæ colliguntur ex ipso Galeno.

Primum quod æger nec puer, nec senex sit: ætas enim ex Hippocrate 4. de ratione

vic. 19. prohibet remedium magnum: quod non solum est sanguinis euacuatio: sed etiam medicamentum: non puer, quia ut docet Galenus 9. meth. cap. 17. „ Puerorum substantia omnium facillimè dissipatur: ideo non eget præsidio euacuationis, cum habeat ex seipsa, unde naturaliter euacuetur, per halitum videlicet. Hæc est ratio proposita à Galeno, cur in pueris, nec sanguis sit euacuandus, nec pharmacum sit exhibendum. Non senes pharmacum purgantur: quia senectus est viribus destituta.

Secundum, quod æger non sit de illis, qui facillè incidat in lipothymiam, syncope, seu cardialgiam: quia talis æger pharmacum pati non potest: euacuatio enim facta per pharmacum non potest supprimi quando volumus.

Tertium, videndum est, quod æger non habeat hypochondria tensa, & supradum calida: ideo Galenus in comm. vult esse ineptos purgationi, qui laborant multa cruditate, qui habent obstructions, & qui paulo ante fuerint alti cibis crassis, & tenacibus. Similiter Galenus 1. de humoribus côm. 2. & côm. 12. vult, qui habent hypochondria flantibus distenta ineptos esse ad purgationem.

Quantum addit Galenus in comm. quod si adsint inflammationes in ventre, vel circa ventrem, & pharmacum nullo modo convenire possit: tum quia omnia pharmaca, ut dicit in hoc comm. potentia calida sunt: tum quia agitatio facta circa partes inflammatas maximè auget morbum: quare licet materia in acutis sæpè turgeat, ratio tamen dandum est pharmacum.

Quo ad præmeditationes, quæ sunt faciendæ circa morbum, duo sunt consideranda. Primum, an morbus sit cum inflammatione ventriculi, hepatis, lienis, & partium vicinarum: quia ex Galeno 13. meth. 11. habemus hæc verba „ quando iecur incipit phlegmone laborare, & aliquis tentet medicamenta exhibere, maximam excitabit inflammationem: quia per medicamenta excrementa ad partes inflammatas trahuntur. Quo pacto verò illarum partium inflammatio dignoscatur, nos docet Galenus lib. quos & quando, in quo loco



loco vult ex hypocondrijs calidis, & feruidis illarum partium inflammationes dignofci.

Secundum eft cogitandum, an fint obftructiones, quæ fi adfint, docet Galenus in comm. ante pharmacum dandum effe melicraton, in quo decoctum fit aliquid hyfopi, vel origani, vel tragorigoni, vel thimi, vel pulegij, quæ licet calida fint, maius tamen afferunt beneficium aperiendo, & attenuando, quam maleficium in calefaciendo: fed femel, vel bis vtendum eft hoc decocto: quia illicò turgente materia eadem die, vel in principio alterius diei pharmacum exhibendum eft: deinde itatim exhibitò pharmaco ex Hippocrate 2. de ratione vic. 12. datur ptiffana, tum vt attemptetur medicamenti acrimonia, tum vt detergat, & deorfum pellat ipfum pharmacum.

Quod ad tertium: id eft quoad præmeditationes, quæ debent fieri circa medicamentum, quatuor funt præmeditanda.

Primum, cum omnia pharmaca fint potestate calida & ficca, illud erit eligendum medicamentum, quod minus calidum fit, cuiusmodi funt electuariũ de fucco rofarũ, diacatholicum, & alia id genus. fi vero calidiora requirantur: quia ager indigeat potentioribus, optimum eft veratrum nigrum, fi maiori indigeat, maius quoque debet effe medicamentum. Galenus 2. de ratione vic. 11. exhibet in pleuritide hierã dracolocintidos, quod medicamentum, vt ibidem docet Galenus in turgente materia eft potentius veratro nigro.

Secundum eft præmeditandum, quodnã debeat effe pharmaci correctiũ. Hippocrates & Galenus 2. de ratione vic. 11. docent admifcenda effe odorata, ne medicamenta fua venenofitate lædant os ventriculi: cuiusmodi funt fpica, feu cinamomi paxillum: noftrates tamen permifcent cum medicamento maluatici paxillum: quod mihi non probatur: quia vinum maluaticum mixtum pharmaco non folum gratiã amittit, fed ad vomitum inuitat: nos potius fumpto pharmaco gratia corroborandi os ventriculi præcipimus, regri maluatico abluant os: quod præftat duo beneficia: alterũ, fumpto pharmaco nullus phar-

maci odor ea die percipitur: alterum maluatici paxillum ita fyncerum odoriferum, & incontaminatum minimum quod elabitur deorfum (licet adfit febris) mirificè os ventriculi corroborat.

Tertium eft obferuandum Auerrois præceptum 7. coll. cap. 9. vbi inquit, in acutis pharmaco effe admifcenda refrigerantia, vt temperetur eius acrimonia: hac ratione Hippocrates 2. acutorum 12. poft fumptũ medicamentum, illicò exhibet ptiffanam.

Præterea notãdum, quod refrigerantia, quæ cum pharmaco, vel affumpto pharmaco fumuntur, fint epichierastica quod confirmatur ex Hippocrate & Galeno qui vt bantur lacte afinino cum fcamonio: Hinc Galenus 14. meth. 17. fanauit Matronã Romanam vlceribus pedum correptam lacte, in quo elanculum coniecit fcamonium: hinc communis vfus laudandus eft, dum pharmaca in fero lactis infufa, vel in decoctione florum & fructuum, vel in aquæ endiuiz vel acetoſæ exhibentur.

Valeat igitur Oddus, dum dicit, frigida admixta pharmaco auferte pharmaci operationem, ideo non effe admifcenda, quali quod pharmaca non alia ratione purgent, quam vt calida: cum purgatio dependeat à fua proprietate, feu ab idioſyncrifiã: quæ refultat ex permixtione, & alteratione innumerabilium qualitatũ, vt oftendimus ex Galeno in lib. 8. meth. noftræ: fic Euforbium calidiſſimum attrahit phlegma, quod eft frigidum: itaut medicamentum non atrahat fimile in temperatura, fed fimile in idioſyncrifiã.

Quod verò frigida nõ impediãt pharmaci operationem, patet experientia: multi enim vt effugiant medicinæ nauſeam, niue ipſam refrigerant: attamen æquè purgat, ac fi eſſet actu calida.

Quartum, præmeditanda eft doſis medicamenti: quia in minori quantitate exhibitum parum euacuat, & multum agitatur: agitari vero humores ex Galeno 2. de ratione vic. 11. maxime nocent: atque vt ipſe docet 3. de ſimpli. med. 24. medicamentum conuertitur in humorem, quem euacuare natum erat: exhibitum vero medicamentum in maiori quantitate, quam pars fit, corpora colliquat: ideo hæc conſideratio de medi-



medicamenti quantitate requirit medicū exercitatum.

Demum notandum ex Galeno lib. quos & quando purgare oportet cap. 24. quod medicamentum ob sex causas alium mouere non potest.

Prima ob agrotantis naturæ proprietatem.

Secunda ob medicamenti exiguitatem.

Tertia ob stercus densatum, quod propterea clystere prius est educendum.

Quarta quia natura antea mouit per urinam.

Quinta quia medicamentum in prauum alimentum conuertatur, videlicet in illum humorem, quem trahere natum erat, vt 3. simpli. citato docet Galenus.

Sexta causa est, quia interdum medicina mutatur in venenum.

Quo ad præmeditationes, quæ sunt faciendæ circa humorem turgentem: medicus debet hæc duo obseruare. Primum in quam corporis partem turgentes humores inclinent. Secundum an in corpore adhuc viscositas, & humorum crassities, quæ possit transitum turgentium impedire.

Quo ad primum, si humores inclinent ad alias regiones, quam ad alium, pharmacum non iuuat: ideo dādum non est: quod quidem colligitur ex ipso Hippocrate 4. de ratione vic. 64. vbi loquens de materia turgente quorundam egrotantium, in quibus modo excitabat tumores circa pedes, modo circa crura, modo circa fauces, vnde strangulabantur: loquens de his ait, tales ægros esse purgandos si venter murmurauerit: si non murmurauerit, à medicamentis abstineto: Ecce quod Hippocrates non vult purgandum esse materiam turgentem, nisi habeat inclinationem ad intestina.

Quod vero Hippocrates in hoc text. citato intelligat de materia turgente patet ex motu furioso humorum modo descendentiū ad crura, modo ascendentiū ad guttur cum ingenti febre, modo ad cerebrum delirium efficientiū: hæc materia, quæ stare locis non potest, quæ exitum querit absque dubio turgentis materia conditionem habet: de hac igitur loquens Hippocrates dicit, nisi venter murmurauerit à pharmaco abstineto, quia pisi habeat aliquam inclinationem ad ventrem pharmaco non pos-

set euacuari: esset sane medici euidens fatuitas, qui daret pharmacum, quo non posset humor turgens euacuari: quando videlicet esset in venis cauis, in venis pedum, vel gutturis, quæ nullum consensum habet cum ventre, vel cum parte concaua ipsius hepatis. Hinc Hippocrates dixit cum præmeditatione, nempe, vt præmeditemur, antequam demus pharmacum, an humores turgentes inclinēt ad mesenterium, vel intestina, & an possint per alium educi.

Hinc credendum est, Hippocratem non dedisse pharmacum Pericli, in quo materia turgebat, erat tamen inclinata, vt per nares sanguinis eruptione euacuaretur, & per urinam, & sudorem, per quæ loca demum fuit liberatus.

Similiter in Metone humores turgentes habebant propensionem ad sanguinis eruptionem per nares, in quo casu non dedit pharmacum: immo si dedisset, naturam rectè operantem ab opere suo diuertisset.

Idem in Muliere morosa, quæ 3. die liberatur, quia menstrua eruperunt: in quo casu humores turgebant: attamen Hippocrates non dedit pharmacum.

Parimodo in Virgine Larissa sexta die eruperunt menses: nihilominus licet materia turgeret, nullum fuit exhibitum pharmacum: quia turgens materia nullam habebat inclinationem ad ipsa intestina.

Demum præmeditandum est, an corpora sint repleta viscosis humoribus: quod Galenus in comm. admonet esse obseruandum, & rectè quidem: tum quia ex Hippocrate 2. aphor. 9. „ Corpora cum quis purgare voluerit oportet fluida facere: tum quia ob succos viscosos humores turgentes, licet sint tenues, ad ventrem non transirent.

Quo ad quintum, quod est de virtute permittente ipsum pharmacum, Galenus 2. de humoribus 27. & 2. præfag. comm. 60. admonet, medicamenta interdum non operari ob aliquam ex tribus causis.

Prima quarū est ob partium expurgantium imbecillitatem, quæ imbecillitas à quacumque intemperie prodire potest, vt probat Galenus 7. meth. 4.

Secunda ob angustiam meatuum, quæ fieri potest vel obstructione vel tumore comprimente, vel ab oclusione facta ob adra-



idnatum germens. Tertia vel à vitio excrementi: vitium excrementi (addit Galenus) est craffitudo, aut vifcofitas, aut humoris multitudo.

## APHORISMVS XXV.



*I qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facile ferunt: fi contra diffculter.*

Nonnulli putant, hunc aphorifmum effe epilogum huius primæ fectionis. fic probant: Hippocrates in hac prima fectione, egit de victus qualitate, quantitate, & de modo adminiftrandi victum, & adminiftrandi remedia pharmaceutica, & chirurgica euacuationem refpicientia: addit: fed fic eft, quod fub illis verbis (talìa & qualia) continentur, qualitas, quãtitas, & modus adminiftrandi victũ, & remedia euacuantiã, de quibus omnibus egit in hac prima fectione, ergo hic aphorifmus eft epilogus.

Reiunguntur illi: quia in hoc aphorifmo non facit mentionem de victus ratione: at fic eft, quod maior pars iftius tractatus, qui habetur in hac prima fectione, eft de victus ratione, de qua egit à quarto aphorifmo vfque ad vigefimum excluſiuẽ.

Præterea in hoc aphorifmo ſolum mentionem facit de purgatione: quia dicit *καθάρσει*, id eſt, quod vocabulũ ſolum pertinet ad purgationem, quæ fit per pharmaca.

Inſuper in hac prima fectione, non ſolum agit de victus ratione, & de purgatione, quæ fit per pharmaca, ſed de quacunque euacuatione, ſive fiat per vrinam, per vterum, per ſudorem, per hæmorrhoidas, ſive per alias regiones: idque probatur ex quatuor aphorifmis præcedentibus: dum enim dicit in vigefimoprimo aphorifmo, quo natura vergit, amplectitur indicationem humorum euacuadorum per quamlibet partem: dum verò dicit in aphorifmo 22. concocta medicari, intelligit de purgatione: dum dicit mouere, intelligit de quacunque euacuatione chirurgica vel pharmaceutica: dum verò dicit in apho-

rifmo 23. quæ euacuantur non multitudine metienda, parimodò intelligit de omni euacuatione per remedia ad pharmaciã vel chirurgiã pertinentia: quare in hac prima fectione non ſolum agit de victus ratione, ſed de purgatione, & de quacunque alia euacuatione.

Polſtremò non eſt dicendum, Hippocratem vti epilogis, quia dicendi grauitas, & laconiſmus Hippocratis epilogum nullo modo admittunt.

Multi alij dicunt, hunc aphorifmum eſſe ſuperfluum; quia coincidit cum 2. probatque ex Galeno, qui in comm. habet hæc verba „ Hippocratem non piguit bis repetere ea quæ ſunt magni momenti. Similiter Galenus 4. aphorif. comm. 22. habet hæc verba „ ea quæ ſunt ad artem maximè neceſſaria ſæpè tractare eſt melius.

Respondemus ipſum Galenum reuera Hippocratis doctriinam multoties repetere, quia Galenus erat Aſiaticus, & non poterat ſe continere, quin Hippocratis dogmata multoties repeteret: negamus tamen Hippocratem eandem doctriinam, licet eadem verba ſæpè proferat, repetere.

Quare dicimus verba Hippocratis repetita quidem; ſed alio fine, & alia arte, vt propterea hic aphorifmus ratione finis ſit nouus, & omninò diuerſus à 2. aphorif. ratio eſt, quia hic poteſt applicari ſolum euacuatiõem faciendã per pharmacum, de qua in proximis aphorifmis locutus eſt: ille verò applicatur euacuationi faciendæ per pharmacum in communi: hic verò applicatur ijs quæ dicta ſunt in 22. & 24. aphorifmo, in quibus de purgatione locutus eſt.

Similis docendi modus inuenitur in Ariſtotele, qui in varijs libris eandem doctriinam repetere videtur, ſed alio fine; non ne in lib. priorum agit de ſylogifmo in communi? in fine tamen primi poſt. agit de eodem ſylogifmo, ſed applicato materiæ neceſſariæ. Parimodò in primo phyſicorum agit de materiã prima: de eadem materiã prima agit in primo de generatione, ſed applicata generationi. In quarto phyſicorum agit de infinito: in

primo de Cælo similiter agit de infinito, sed applicato mundo, quod scilicet mundus non sit infinitæ molis. In 12. metaphysices agit de Deo vt est prima substantia & caput omnium entium. In 8. physicorum agit de Deo vt est primus motor & vtitur utrobique isdem ferè verbis. Similiter Hippocrates in secundo aphorismo intellexit de purgatione in communi qualiter fieri debeat: in hoc verò aphorismo protulit eadem verba: sed solum cum relatione ad purgationem: quasi diceret, si purgatio taliter sit qualiter dictum est in 22. aphorismo, vbi sumebat indicationem purgandi à materia concocta & à materia turgente: & purgatio fiat qualiter dictum est in 23. aphorismo, vbi egit de mensura purgationis, & euacuationis: & purgatio fiat qualiter dictum est in 24. aphorismode tēpore purgationis in morbis acutis, & quod fiat cum præmeditatione. In hoc 25. concludit quod si taliter fiat, qualiter dictum est in quinque dictis aphorismis, ægri facile ferent: si minus difficulter, non seruatis præceptis propositis in superioribus aphorismis.

Quod verò Hippocrates per talia & qualia intelligat qualitatem purgationis, & non qualitatem humorum purgandorum. Primò pater quia Galenus 4. aphor. 2. inquit, Hippocratem in illo aphorif-

mo locutum fuisse de euacuatione in communi, nempe vt est euacuatio.

Secundò pater ex verbis Hippocratis: quia dicit *ὅσα δει*: per quæ verba significatur qualiter, & non qualia: primò quia omnia neutra adiectiua sine articulo sumuntur aduerbialiter: vnde Hippocrates aphor. 13. dicit *εὐεργατα*, id est facillimè, quod vocabulum, nisi sumeretur aduerbialiter, significaret facillima & sic aphorismus nullum haberet sensum. Similiter in aphor. 18. dicit *δυσεργατα* id est difficillimè, quia est neutrum adiectiuum sine articulo, & in numero plurali, quæ adiectiua sine articulo, & præcipuè in numero plurali semper transeunt in naturam aduerbiorum: vt locis citatis probatū est.

Insuper *ὅσα* ab Herodoto, & Tucidide sumitur pro qualiter: sicut quoque pater in annotationibus Ioannis Scapulæ. Demū neutra numeri pluralis, vt *ὅσα*, & *τοια* apud Græcos, si iungantur cum verbis numeri singularis possunt significare talia, & qualia: sed si iungantur cum verbis numeri pluralis semper aduerbialiter sumuntur. Modò in hoc aphorismo hæc dictio *ὅσα* iungitur cum verbo numeri pluralis: quia dicit *καὶ δεῖ ποτε*: ergo aduerbialiter sumi debet: hæc enim satis clara, & manifesta sunt apud illos, qui in lingua Græca versati sunt.

F I N I S.



*Errata nonnulla Corrigenda.*

αταλάτεςθαι	lege	αταλλάτεςθαι	columna 6.	linea	15
Quo	lege	quod	col. 13.	linea	3
Crux	lege	crus	col. 15.	linea	50
Stabo	lege	Strabo	col. 17.	linea	49
Extentes	lege	existentes	col. 20.	linea	44
Exhibentur	lege	exhibeatur	col. 23.	linea	44
ὄζυς	lege	ὄζυς	col. 30.	linea	6
Quid igitum	lege	Qui digitum	col. 30.	linea	40
Verl	lege	Vel	col. 48.	linea	52
Vutiri	lege	Nutriri	col. 68.	linea	31
εχάτω	lege	εχάτω	col. 74.	linea	4
Alteratio	lege	Altercatio	col. 81.	linea	2
Conuindicans	lege	Contraindicans	col. 84.	linea	10
Cap. 4.	lege	Cap. 5.	col. 89.	linea	40
ἀτι	lege	ἀτι	col. 113.	linea	27
Non didetur	lege	videtur	col. 116.	linea	27
Pieniori	lege	Tenuiori	col. 128.	linea	39
Et	lege	Vt	col. 177.	linea	3
Sectione	lege	Sectione septima	col. 177.	linea	50
Morbo acuto	lege	A' morbo acuto.	col. 197.	linea	16
A' quanto	lege	Quanto	col. 197.	linea	18
ὑπερκρίσις	lege	ὑπερκρίσις	col. 267.	linea	2
Andiperistasisim	lege	Antiperistasisim	col. 373.	linea	8
Eit	lege	fit	col. 378.	linea	44
Solanus	lege	Sclanus	col. 384.	linea	21
Peribus.	lege	Paribus	col. 440.	linea	40
Exymellite	lege	Oxymellite	col. 442.	linea	3
Tantum	lege	tamen	col. 498.	linea	4
Ab	lege	Abca	col. 498.	linea	34
Per ti	lege	Aperti	col. 498.	linea	50
υποχωρησις	lege	υποχωρησις	col. 511.	linea	47













